Resumos de Pediatria

Batistaz

Revisão Flash · Neonatologia

Reanimação Neonatal

Sala de parto: ≥ 34 e < 34 semanas (SBP 2026)

Internato de Pediatria

10º período · 2026.2

Reanimação neonatal

Leitura de 5 minutos

Em uma frase

Preparar antes, clampear o vigoroso depois de 60 segundos e, no que não respira ou tem FC abaixo de 100, ventilar no primeiro minuto (21% no ≥ 34 semanas, 60% no prematuro); massagem só com FC abaixo de 60 e ventilação efetiva.

1. **Sala:** 23–25 °C; RN em 36,5–37,5 °C.
2. **Vigoroso:** cordão ≥ 60 s, pele a pele. Sem vitalidade: estímulo 15 s e mesa.
3. **Passos iniciais:** 30 s; sem aspiração de rotina, mesmo com mecônio.
4. **VPP:** apneia, respiração irregular ou FC < 100, até 60 s de vida; 30–60/min.
5. **O2:** ≥ 34 sem 21%; < 34 sem 60%; massagem 100%.
6. **SpO2 alvo:** 2′ 65–70 · 3′ 70–75 · 4′ 75–80 · 5′ 80–85 · 10′ 85–95%.
7. **Massagem:** FC < 60 com cânula; polegares, terço inferior, 3:1, 120 eventos/min.
8. **Adrenalina:** 1 mL em 9 mL SF; veia 0,2 mL/kg + flush 3 mL, a cada 3–5 min; cânula 1 mL/kg, uso único.

Peça T no ≥ 34 semanas

Parâmetro	Valor
Fluxo	10 L/min
Pressão inspiratória	20–30 cmH2O
PEEP	5 cmH2O
Pressão máxima	40 cmH2O

Pegadinha

FC que não sobe com VPP: corrigir a ventilação antes de subir o O2 ou começar massagem.

Checklist antes do plantão

- ☐ Monto e testo o material
- ☐ Sei quando clampear o cordão
- ☐ Faço os passos iniciais em 30 s
- ☐ Inicio a VPP no 1º minuto
- ☐ Escolho 21% ou 60%
- ☐ Uso a tabela de SpO2
- ☐ Corrijo a ventilação que falha
- ☐ Faço massagem 3:1
- ☐ Diluo e dou a adrenalina