Bronquiolite · Cartão de Plantão

Para consultar à beira do leito; confira no protocolo do serviço

Classificar [MS]

	Leve	Moderada	Grave
SatO2	> 92%	90–92%	< 90%
Esforço	Nenhum/leve	Moderado	Gemência, balanços
Mamada	Normal	Difícil	Recusa
Apneia	Não	Não	Sim

FR alta: < 2 m > 60 · 2–12 m > 50 · 1–5 a > 40.

Internar se [MS]

Apneia · prostração · desconforto grave ou SatO2 < 92% persistente · desidratação · recusa alimentar · **< 2 meses**. Pesar: fator de risco, social, acesso.

Suporte respiratório [MS]

O2	SatO2 ≤ 92%: cateter 1–3 L/min
CNAF	≤ 12 kg: 2 L/kg/min (desmame 1); FiO2 40% → SatO2 ≥ 92%
Falha CNAF	FiO2 > 50–60%, apneia, hipercapnia
Não usar CNAF	Falência iminente, letargia, má perfusão, apneia: CPAP/VNI ou intubar
CPAP	7–8 cmH2O, FiO2 40%
Intubar	FiO2 ≥ 60% p/ SatO2 ≥ 90%, apneias, rebaixamento

Alta [MS]

Estável 12 h · SatO2 > 92% em ar · mamando · família orientada · retorno em até 48 h.

Ensinar aos pais: voltar já se [MS] [NICE]

Mama ou bebe mal, vomita as mamadas · 12 h sem fralda molhada · gemido, costelas afundando, respiração rápida · pausas na respiração · lábios roxos · sonolência, choro fraco · convulsão. Piora esperada no 3º–5º dia.

Isolamento [MS]

Contato + gotículas. VNI, intubação: N95/PFF2. Notificar SRAG hospitalizada no Sivep-Gripe em 24 h.

Hidratação [MS] [ABG] [HS]

Oral → **SNG** → EV. EV só isotônico: SF 0,9% ou balanceado + glicose 5% (≤ 4 sem de idade corrigida: G10% ou glicemia).

Peso	Manutenção (Holliday-Segar)
Até 10 kg	100 mL/kg/dia
10–20 kg	1.000 mL + 50 mL/kg acima de 10

Considerar **50–75%** da manutenção (ADH alto). Ex.: 6 kg = 600 mL/dia → 300–450 mL/dia.

Antitérmico, só se desconforto [SBP]

Fármaco	Dose
Paracetamol	10–15 mg/kg/dose; máx. 75 mg/kg/dia. < 1 mês: único permitido, com dose ajustada à idade gestacional
Dipirona	10–12 mg/kg/dose. No produto de referência, 1 gota = 25 mg: "1 gota/kg" é superdose. Gotejadores variam: prescrever em mg
Ibuprofeno	5–10 mg/kg/dose (antitérmico)

Não alternar nem associar.

Nirsevimabe [CVE-SP]

Prematuro ≤ 36s6d (mesmo com mãe vacinada; o ano todo) e < 24 m com comorbidade nos critérios do protocolo (fev–ago). IM, vasto lateral, dose única: **< 5 kg 50 mg · ≥ 5 kg 100 mg**; 2ª sazonalidade 200 mg (2 × 1 mL). Não somar duas de 0,5 mL.

Não prescrever

Salbutamol · ipratrópio · adrenalina · corticoide · salina hipertônica · montelucaste · antibiótico sem foco bacteriano · antitussígeno · descongestionante.