Resumos de Pediatria

Batistaz

Revisão Flash · Neonatologia

Icterícia Neonatal

Da bilirrubina indireta à colestase

Internato de Pediatria

10º período · 2026.2

Icterícia neonatal

Leitura de 5 minutos

Em uma frase

Icterícia antes de 24 horas é hemólise até prova em contrário; decide-se pela BT em horas de vida e idade gestacional, a fototerapia é o tratamento, e icterícia depois de 2 semanas exige bilirrubina fracionada e olhar as fezes.

1. **Fisiológica:** após 24 h, pico ~12 mg/dL no 3º–4º dia.
2. **Patológica:** < 24–36 h, subida rápida, BT alta, prolongada, fezes claras.
3. **Hemólise:** Rh e ABO (mãe O; Coombs + em só 20–40%), G6PD.
4. **Medir:** BT sérica; transcutânea boa até ~15 mg/dL; Kramer não confiável.
5. **Fototerapia ≥ 38 sem:** 10 (24 h) · 11,5 (36 h) · 13 (48 h) · 15 (72 h) · 16 (96 h) · 17 (5–7 d).
6. **Agravantes:** hemólise, G6PD, asfixia, sepse, acidose, albumina < 3: −2 mg/dL.
7. **EST:** nível da tabela, +5 acima ou encefalopatia (imediata). Imunoglobulina 0,5–1 g/kg na hemólise imune.
8. **Colestase:** BD > 1 mg/dL, acolia: encaminhar já; Kasai antes de 60 dias.

Fototerapia 35–37⁶ semanas

Idade	BT
24 h	8
48 h	11
72 h	13
5–7 dias	15

Pegadinha

Usar a BT total, sem descontar a direta, nas tabelas de fototerapia e EST.

Checklist antes do plantão

- ☐ Reconheço encefalopatia bilirrubínica
- ☐ Sei quando a icterícia não é fisiológica
- ☐ Separo ingestão insuficiente de leite materno
- ☐ Peço a investigação de hemólise
- ☐ Sei quando dosar BT antes da alta
- ☐ Uso a tabela por horas e IG
- ☐ Prescrevo e suspendo a fototerapia
- ☐ Sei as indicações de EST
- ☐ Fraciono a icterícia prolongada