Batistaz

Revisão Flash · Gastroenterologia

Diarreia Aguda e Desidratação

Planos A, B e C

Internato de Pediatria

10º período · 2026.2

Diarreia aguda e desidratação

Leitura de 5 minutos

Em uma frase

Classificar a hidratação pelo quadro do MS, reidratar pelo plano A, B ou C, manter a alimentação, dar zinco ao menor de 5 anos e reservar o antibiótico para a disenteria com comprometimento do estado geral.

1. **Definição:** ≥ 3 evacuações líquidas/dia, até 14 dias. > 14 dias: persistente.
2. **Classificar:** ≥ 2 sinais = desidratação (B); ≥ 2 com ao menos 1 grave (letargia, não bebe, pulso fraco) = C.
3. **Plano A:** líquido após cada evacuação (50–100 mL < 1 a; 100–200 mL 1–10 a), comida habitual, zinco.
4. **Zinco:** 10 mg/dia até 6 m; 20 mg/dia de 6 m a 5 anos; 10–14 dias.
5. **Plano B:** SRO 50–100 mL/kg (média 75) em 4–6 h no serviço; ondansetrona se vômito persistente; 6 h sem melhora: internar.
6. **Plano C:** < 1 ano 30 mL/kg/1 h + 70/5 h; ≥ 1 ano 30/30 min + 70/2 h 30. SF 0,9% ou Ringer.
7. **Manutenção:** SG 5% + SF 4:1 (Holliday-Segar) + reposição 1:1 50 mL/kg/dia + KCl 10% 2 mL/100 mL.
8. **Disenteria:** azitromicina 10 mg/kg no 1º dia + 5 mg/kg/dia × 4 (até 30 kg); reavaliar em 48 h.

Ondansetrona (dose única)

Idade	Dose
6 m a 2 anos	2 mg
2 a 10 anos (até 30 kg)	4 mg
> 10 anos (> 30 kg)	8 mg

Pegadinha

Zinco de 5 mg é da OMS; o MS usa 10 ou 20 mg. Prova brasileira: MS.

Checklist antes do plantão

- ☐ Sei o quadro de hidratação e os asteriscos
- ☐ Prescrevo o Plano A completo
- ☐ Calculo a SRO do Plano B
- ☐ Sei quando dar ondansetrona
- ☐ Calculo a expansão por idade
- ☐ Monto manutenção, reposição e KCl
- ☐ Sei quando dar antibiótico e qual
- ☐ Não prescrevo antidiarreico
- ☐ Sei o que mudou no cartaz