Icterícia Neonatal · Cartão de Plantão

Para consultar à beira do leito; confira no protocolo do serviço

Fototerapia e EST, RN ≥ 35 sem (BT mg/dL) [SBP]

Idade	F 35–37⁶	F ≥ 38	EST 35–37⁶	EST ≥ 38
24 h	8	10	15	18
36 h	9,5	11,5	16	20
48 h	11	13	17	21
72 h	13	15	18	22
96 h	14	16	20	23
5–7 d	15	17	21	24

≥ 35 sem: −2 mg/dL na fototerapia se hemólise, G6PD, asfixia, letargia, instabilidade térmica, sepse, acidose, albumina < 3. BT total.

RN < 35 sem, IG corrigida [SBP]

IG	Foto	EST
< 28	5–6	11–14
28–29⁶	6–8	12–14
30–31⁶	8–10	13–16
32–33⁶	10–12	15–18
34–34⁶	10–12	17–19

Valores inferiores se agravante. ≤ 1.000 g ou ≤ 26 sem: fototerapia profilática até 12 h, sem alta intensidade.

Investigar [SBP]

< 24–36 h, BT ≥ 12, subida rápida, prolongada. BT e frações, tipagem mãe/RN, Coombs direto, Hb/Ht, reticulócitos, G6PD, TSH/T4 conforme o caso.

Alta intensidade e controle [SBP]

BT 17–19: BT em 4–6 h · 20–25: em 3–4 h · > 25: em 2–3 h e preparar EST.

EST e imunoglobulina [SBP]

EST **imediata**: encefalopatia ou BT ≥ 5 acima do nível. Se não, fototerapia intensiva já, BT em 2–3 h e reavaliar. < 35 sem: também se BT sobe apesar da alta intensidade. Duas volemias (2 × 80 mL/kg), 2/3 hemácias + 1/3 plasma. Hemólise imune perto (2–3 mg/dL) do nível: **considerar imunoglobulina IV 0,5–1 g/kg em 2 h**, repetir em 12 h se necessário.

Suspender a fototerapia [SBP]

Até o 5º dia: ≥ 38 sem BT ≤ 11,5 · 35–37 sem ≤ 9,5. Depois do 5º dia (≥ 35 sem): ≤ 14. < 35 sem: 2 abaixo do nível. Com risco: observar 12 h antes da alta.

Colestase [SBP] [NASPGHAN]

Ictérico > 2 semanas: BT e frações + cor das fezes. **BD > 1 mg/dL**, acolia, colúria: encaminhar já ao hepatologista. Kasai antes de 60 dias.

Não fazer

Decidir pela zona de Kramer · descontar a BD · suspender o aleitamento · chamar de "leite materno" sem fracionar · alta antes de 48 h · esquecer a consulta até o 5º dia.