Reanimação Neonatal · Cartão de Plantão

Para consultar à beira do leito; confira no protocolo do serviço

Ao nascer [SBP-34] [SBP-P]

Vigoroso	Respira/chora + tônus: cordão ≥ 60 s, pele a pele (prematuro 32–33⁶ sem: pode, monitorado)
Sem vitalidade	Estímulo dorsal ~15 s; respirou: cordão ≥ 60 s; sem resposta: clampear, mesa
Calor	Sala 23–25 °C; RN 36,5–37,5 °C; < 34 sem: saco plástico + touca dupla

Passos iniciais e VPP [SBP-34] [SBP-P]

Até 30 s: calor, posição, vias aéreas só se obstruídas. Apneia, irregular ou FC < 100: **VPP até 60 s**, 30–60/min. Oxímetro pulso direito + monitor.

O_2 inicial	≥ 34 sem: **21%** · < 34 sem: **60%** · após intubar: 60%
Peça T ≥ 34	10 L/min · Pinsp 20–30 · PEEP 5
< 34 sem	Pinsp 20–25 · PEEP 5–6
CPAP < 34	Respira, FC ≥ 100, desconforto: 5–6 cmH_2O, peça T + máscara (balão não faz CPAP)

SpO_2 pré-ductal [SBP-34]

2 min 65–70%	3 min 70–75%	4 min 75–80%
5 min 80–85%	10 min 85–95%	

FC não sobe [SBP-34]

Corrigir: máscara, cabeça, secreção, boca, pressão, vazamento. Considerar máscara laríngea ou cânula. Só depois aumentar O_2.

Massagem [SBP-34]

FC < 60 após **30 s de VPP por cânula** correta. Polegares no terço inferior, ⅓ do tórax · **3:1** · 120 eventos/min (90 + 30) · **O_2 100%** · reavaliar em 60 s.

Adrenalina [SBP-34]

FC < 60 após ≥ 60 s de massagem + VPP por cânula com O_2 100%.

Diluir	1 mL de 1 mg/mL + 9 mL SF (0,1 mg/mL)
Veia/IO	**0,2 mL/kg** (0,02 mg/kg), rápido + flush 3 mL; repetir 3–5 min
Cânula	**1 mL/kg** (0,1 mg/kg), uso único, ventilar
Peso	2 kg: 0,4 / 2 mL · 3 kg: 0,6 / 3 mL · 4 kg: 0,8 / 4 mL (veia / cânula)

Volume e depois [SBP-34]

Hipovolemia: **SF 10 mL/kg em 5–10 min**. Sem resposta a nada: pneumotórax? tamponamento? Não transportar com FC < 100. Apgar < 7 no 5º min: repetir a cada 5 min até 20 min.

Não fazer

Aspirar traqueia de rotina · VPP com 100% no ≥ 34 sem · massagem antes de ventilação efetiva · adrenalina sem diluir · dose > 0,1 mg/kg · flush traqueal.