

HABILIDADES CIRÚRGICAS



MONITORIA DE TOCE

*Revisão Flash* • SESSÃO 09

# Afecções Urológicas

*O essencial para a prova em uma página*



Técnica Operatória e Cirurgia Experimental

UnibH Vespasiano

8º PERÍODO • 2026.2

*Elaborado por* JOÃO BATISTA FERNANDES JÚNIOR • *Monitor de TOCE*

*Material de apoio da monitoria. Não substitui as aulas, os slides nem as referências indicadas pela disciplina.*

# Afecções urológicas

Leitura de 5 minutos

## EM UMA FRASE

*AINE na cólica e descompressão se houver febre; sonda na retenção; escroto agudo é torção até prova em contrário; e nunca sondar com sangue no meato.*

- |                                                                                                      |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1 Cólica renal:</b> AINE é a 1ª escolha. Opióide é 2ª opção.</p>                               | <p><b>2 Imagem:</b> TC sem contraste confirma. Gestante e criança começam pela ultrassonografia.</p> |
| <p><b>3 Cálculo &lt; 5 mm no ureter distal:</b> 89% eliminam sozinhos.</p>                           | <p><b>4 α-bloqueador:</b> para cálculo do ureter distal &gt; 5 mm.</p>                               |
| <p><b>5 Obstrução + febre:</b> duplo J ou nefrostomia + antibiótico; o cálculo fica para depois.</p> | <p><b>6 Retenção:</b> sondagem de alívio; se a sonda não passa, cistostomia.</p>                     |
| <p><b>7 Torção:</b> janela de 4–6 h; o Doppler não pode atrasar a cirurgia.</p>                      | <p><b>8 Sangue no meato:</b> não sondar; uretrografia antes.</p>                                     |

## TORÇÃO × EPIDIDIMITE

|                     | TORÇÃO     | EPIDIDIMITE |
|---------------------|------------|-------------|
| <i>Cremastérico</i> | Ausente    | Presente    |
| <i>Prehn</i>        | Não alivia | Alivia      |
| <i>Doppler</i>      | Sem fluxo  | Hiperfluxo  |

### PEGADINHA

Fluxo ao Doppler **não exclui** torção. Na sondagem, só insufla o balão depois de ver urina.

## CHECKLIST ANTES DA PROVA

- ☐ Sei a analgesia e a imagem da cólica renal
- ☐ Sei quando descomprimir o rim
- ☐ Sei conduzir a retenção urinária
- ☐ Sei os remédios da HPB e quando operar
- ☐ Diferencio as três causas de escroto agudo
- ☐ Separo priapismo isquêmico do não isquêmico
- ☐ Sei a técnica e as contraindicações da sondagem