



1. Dada la definición de  $R_x(\theta)$  vista en clase, resuelve lo siguiente:

- $R_x(\theta)|0\rangle \Rightarrow R_x(\theta)|0\rangle = \begin{pmatrix} \cos(\frac{\theta}{2}) & -i \sin(\frac{\theta}{2}) \\ -i \sin(\frac{\theta}{2}) & \cos(\frac{\theta}{2}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\frac{\theta}{2}) \\ -i \sin(\frac{\theta}{2}) \end{pmatrix} = \cos(\frac{\theta}{2})|0\rangle - \sin(\frac{\theta}{2})|1\rangle$
- $R_x(\theta)|1\rangle \Rightarrow R_x(\theta)|1\rangle = \begin{pmatrix} \cos(\frac{\theta}{2}) & -i \sin(\frac{\theta}{2}) \\ -i \sin(\frac{\theta}{2}) & \cos(\frac{\theta}{2}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -i \sin(\frac{\theta}{2}) \\ \cos(\frac{\theta}{2}) \end{pmatrix} = -i \sin(\frac{\theta}{2})|0\rangle + \cos(\frac{\theta}{2})|1\rangle$
- $R_x(\theta)(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) \Rightarrow R_x(\theta)(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) = \begin{pmatrix} \cos(\frac{\theta}{2}) & -i \sin(\frac{\theta}{2}) \\ -i \sin(\frac{\theta}{2}) & \cos(\frac{\theta}{2}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \cos(\frac{\theta}{2}) - i\beta \sin(\frac{\theta}{2}) \\ -i\alpha \sin(\frac{\theta}{2}) + \beta \cos(\frac{\theta}{2}) \end{pmatrix}$   
 $= \left[ \alpha \cos(\frac{\theta}{2}) - i\beta \sin(\frac{\theta}{2}) \right] |0\rangle + \left[ -i\alpha \sin(\frac{\theta}{2}) + \beta \cos(\frac{\theta}{2}) \right] |1\rangle$

2. Calcula lo siguiente ocupando las definiciones de las puertas cuánticas vistas en clase:

- $\sigma_y H|1\rangle \Rightarrow \sigma_y H|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} i \\ i \end{pmatrix} = \frac{i|0\rangle - i|1\rangle}{\sqrt{2}}$
- $\sigma_x H|-\rangle \Rightarrow \sigma_x H|-\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = |0\rangle$

3. Siguiendo la definición de producto tensorial visto en clase; calcula lo siguiente:

- $\sigma_x \otimes \sigma_y \Rightarrow \sigma_x \otimes \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} & 1 \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \\ 1 \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} & 0 \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -i \\ 0 & 0 & i & 0 \\ 0 & -i & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
- $H \otimes \sigma_z \Rightarrow H \otimes \sigma_z = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} & 1 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \\ 1 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} & -1 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
- $H \otimes |1\rangle \Rightarrow H \otimes |1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} & 1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ 1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} & -1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$
- $|0\rangle \otimes |+\rangle \Rightarrow |0\rangle \otimes |+\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ 0 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

4. Demuestra la siguiente igualdad:  $H\sigma_z H = \sigma_x$

$$H\sigma_z H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \sigma_x$$

$$\therefore H\sigma_z H = \sigma_x \quad \blacksquare$$