

	L,D = 1,1	L,D = 2,2	L,D = 3,3	L,D = 4,4	L,D = 5,5	L,D = 6,6
$(x_i) \mapsto (\exp(x_i))$	<b>0.0</b> <b>0.0</b> 0.0	0.4 0.3 0.3	1.9 1.6 1.1	3.8 3.4 2.1	5.7 5.2 2.9	7.6 7.1 3.4
Me	<b>0.0</b> <b>0.0</b> 0.0	0.2 0.2 0.2	1.1 1.0 0.6	2.2 2.1 1.0	3.1 3.0 1.1	4.1 3.9 1.2
Mo	<b>0.0</b> <b>0.0</b> 0.0	0.2 0.2 0.1	1.0 0.9 0.5	2.2 2.1 0.9	48.1 48.7 23.0	48.1 46.5 16.8
Ym	<b>0.0</b> <b>0.0</b> 0.0	0.4 0.3 0.2	1.7 1.5 0.9	3.1 2.9 1.4	4.7 4.4 1.9	6.4 6.3 2.2
Y	<b>0.0</b> <b>0.0</b> 0.0	1.1 0.7 1.1	4.7 3.3 4.4	7.7 6.1 6.0	77.4 74.8 39.9	77.5 72.4 30.1
Yb	<b>0.0</b> <b>0.0</b> 0.0	0.3 0.3 0.2	1.5 1.4 0.7	2.9 2.8 1.1	76.2 72.7 42.9	76.0 70.1 32.2
V	<b>100.0</b> - <b>100.0</b>	<b>100.0</b> - <b>100.0</b>	<b>100.0</b> - <b>100.0</b>	<b>100.0</b> - <b>99.7</b>	<b>99.6</b> - <b>99.2</b>	<b>98.2</b> - <b>97.1</b>

Table 1: **Influence de la dimension.** La même fonction générique est apprise et inversée pour différentes dimensions.