

		Méthode standard			Hypercubes latins			Méthode de Sobol		
Config. Olivine	F	78.3	6.4	3403.7	46.4	5.8	1995.9	75.4	6.7	4529.3
	L,D = 4,10	Me	12.6	10.7	8.7	12.0	10.0	14.9	12.6	10.2
	K = 80	Mo	9.1	7.6	6.2	8.5	7.6	10.7	9.0	7.2
	N = 5000	Y	11.8	7.2	13.2	10.2	6.5	12.6	7.5	15.5
	Local = None	Yb	4.8	3.3	5.1	3.8	3.1	5.2	3.5	5.2
	V	99.6 - 96.1			99.9 - 96.9			98.4 - 92.8		
Config. Olivine	F	25.5	3.3	805.1	27.5	3.5	732.9	26.5	3.3	1386.0
	L,D = 4,10	Me	9.3	7.4	6.8	9.8	7.8	10.9	8.7	8.2
	K = 100	Mo	6.6	5.5	4.5	6.8	5.7	7.8	6.4	5.6
	N = 100000	Y	6.5	4.3	7.2	7.5	4.7	8.3	4.7	12.4
	Local = None	Yb	2.5	2.1	2.0	2.7	2.1	2.9	2.2	2.9
	V	100.0 - 98.9			100.0 - 98.5			99.8 - 97.3		
Config. Olivine	F	29.2	5.7	501.9	162.4	5.7	40942.9	43.6	5.7	2168.5
	L,D = 6,10	Me	21.7	21.5	7.5	21.8	21.6	25.9	25.5	9.4
	K = 100	Mo	18.7	18.4	6.9	29.8	24.7	48.9	50.7	20.3
	N = 100000	Y	12.2	7.2	13.4	70.4	18.2	216.6	74.8	438.8
	Local = None	Yb	5.3	3.6	5.6	59.7	6.6	196.9	71.4	402.0
	V	99.9 - 97.7			99.9 - 97.6			99.6 - 95.6		

Table 1: Mean, median, standard deviation of relatives errors, accuracy (in %) . Cleaned values in parenthesis. Bold values show best values over the methods, for each criterium.