## 代数学方法 (第一卷) 勘误表

## 李文威

## 2021-03-03


以下页码等信息参照高等教育出版社 2019 年 1 月出版之《代数学方法》第一卷, ISBN: 978-7-04-050725-6, 这些错误将在新版一并改正.

- ◇ **第 12 页, 倒数第 8 行** 原文 也可以由稍后的无穷公理保证. 更正 也可以划入稍后的无穷公理. 感谢王东瀚指正.
- 。第 16 页, 定义 1.2.8 原文 若传递集  $\alpha$  对于  $\in$  构成良序集 更正 若传递集  $\alpha$  对于  $x < y \stackrel{\text{EV}}{\Leftrightarrow} x \in y$  成为良序集 感谢王东瀚指正.
- $\diamond$  第 19 页, 倒数第 5 行原文 $a_{\alpha} \notin C_{\alpha}$ 更正 $a_{\alpha} \notin \{a_{\beta}\}_{\beta < \alpha}$ 感谢胡旻杰指正
- ◇第23页,第3-4行 原文 真前段(出现两次) 更正 前段
- ◇ 第 38 页, 第 14 行 原文 由此导出对象和自然变换的同构概念, 其逆若存在则唯一. 更正 其逆若存在则唯一, 依此定义何谓对象间或函子间的同构. 感谢王猷指正.
- ◆ 第 42 页, 倒数第 2 行
   原文
   … 同构. Z(…) ≃…
   更正
   … 同构 Z(…) ≃…
   感谢

◆ 第 50 也, 第 3 行
 原文
 η<sub>X</sub>
 更正
 η

感谢蒋之骏指正

◇第54页最后 更正 图表微调成



兴许更易懂.

感谢熊锐提供意见.

- ♦ 第 94 页, 习题 5 倒数第 2 行 原文 Yang-Baxter 方程. 更正 杨-Baxter 方程.
- $\diamond$  第 116 页, 第 5 行
   原文
    $\bar{H} \subseteq N_{\bar{G}}(\bar{H})$  更正
    $\bar{H} \subseteq N_{\bar{G}}(\bar{H})$
- $\diamond$  第 126 页, 第 6 行
   原文
    $(\cdots)_{i=0}^n$  更正
    $(\cdots)_{i=0}^{n-1}$
- ◇ 第 149 页, 第 3 行 CRing 表交换环范畴. 另外此行应缩进.

感谢阳恩林指正

- **◇第 165 页, 5.3.11 之上两行 原文** ∃s ∈ R 更正 ∃s ∈ S
- **第 205 页,第 7 行** 原文
   M 作为 R/ann(M)-模自动是无挠的.
   更正
   M 作为

   R/ann(M)-模的零化子自动是  $\{0\}$ .
   感谢戴懿韡指正.
- ◇ 第 218 页, 第 13 行原文B(rx, ys) = rB(x, y)s,  $r \in R$ ,  $s \in S$ .更正B(qx, ys) = qB(x, y)s,  $q \in Q$ ,  $s \in S$ .
- **◇第220页** 本页出现的 Bil(◆ × •; •) 都应该改成 Bil(•, •; •), 以和 216 页的符号保持一致.
- ◇第230页,第13行 原文 萃取处 更正 萃取出
- $\diamond$  **第 235 页底部** 图表中的垂直箭头 $f_i, f_{i-1}$  应改为  $\phi_i, \phi_{i-1}$ .
- $\diamond$  第 237 页, 命题 6.8.5 证明最后两行原文故  $(v) \Rightarrow (i);$  更正故  $(iv) \Rightarrow (i);$

- ◇ **第 244 页, 倒数第 10 行 原文** 下面的引理 6.10.4 **更正** 引理 5.7.4 感谢郑维喆 指正
- ◇ 第 246 页, 第 2 行和定理 6.10.6, 6.10.7 "交换 Noether 模"应改为 "交换 Noether 环".
  两个定理的陈述中应该要求 R 是交换 Noether 环.
  感谢郑维喆指正
- $\diamond$  第 246 頁, 第 16 行  $\overline{\mathbb{R}}$   $u_i f_i$  更正  $u_i \alpha_i$  感谢陆睿远指正.
- ◇第 251 页起,第 6.12 节 术语 "不可分模" 似作 "不可分解模" 更佳,以免歧义. (第 4页倒数第 3 行也应同步修改)
  感谢郑维喆指正
- ◆ 第 252 頁, 第 2 行
   原文
   1 ≤ 1 ≤ n.
   更正
   1 ≤ i ≤ n.
   感谢傅煌指正.
- ◇ 第 255 页, 第 1 题 原文

$$N = \left\langle \alpha(f)(x_i) - x_j : i \xrightarrow{f} j, \ x_i \in M_i, x_j \in M_j \right\rangle$$

更正

$$N = \left( \alpha(f)(x_i) - x_i : i \xrightarrow{f} j, \ x_i \in M_i \right)$$

感谢郑维喆指正

- ◆ **第 264** 頁**,第 14** 行 **原文** 如果 ann(M) = {0} 更正 如果 ann(N) = {0}
- **⋄第274页,倒数第2行** 将两处 $A^k(M)$ 改成 $A^k(X)$ .
- **◇ 第 284 頁, 定理 7.6.6** 将定理陈述中的函子 U 由忘却函子改成映 A 为  $A_1$  的函子, 其余不变. 相应地, 证明第二段的  $\varphi: M \to A$  应改成  $\varphi: M \to A_1$ . 感谢郑维喆指正
- $\diamond$  第 285 頁, 倒数第 5 行  $T^n_\chi(M) := \{x \in T^n(M) : \forall \sigma \in \mathfrak{S}_n, \ \sigma x = \chi(\sigma)x\}$  感谢郑维喆指 正
- $\diamond$  **第 286 頁, 定理 7.6.10** 原 "因而有 R-模的同构" 改为 "因而恒等诱导 R-模的同构". 以下两行公式开头的  $e_1:$  和  $e_{\rm sgn}:$  皆删去. 感谢郑维喆指正
- **⋄第311页, 命题 8.3.2 证明第4行** 更正 分别取...... 和  $\overline{F}'$  | E' .
- ◆ 第 313 頁, 命题 8.3.9 (iii) "交"改为"非空交". 相应地, 证明第四行的"一族正规子扩张"后面加上"且 *I* 非空".感谢郑维喆指正

 $\diamond$  第 315 頁, 定理 8.4.3 (iv) 原文  $\sum_{k\geq 0}^n$  更正  $\sum_{k=0}^n$ 

感谢郑维喆指正

- ◇ 第 315 页, 倒数第 2 行原文deg  $f(X^p) = pf(X)$ 更正deg  $f(X^p) = p \deg f(X)$ 感谢杨历指正.
- ◇ 第 317 页, 倒数第 13 行 (出现两次)  $\boxed{\text{原文}}$   $\prod_{i=1}^{n}$  …  $\boxed{\text{更正}}$   $\prod_{m=1}^{n}$  …
- $\diamond$  第 348 页, 命题 9.3.6 原文  $\lim_{m \to \infty} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  更正  $\lim_{m \to \infty} \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$  感谢郑维喆指正
- ◇第352页,第7行
  原文
  p | n
  更正
  p | n

感谢郑维喆指正

感谢杨历指正.

- **◇ 第 360 页, 证明** 将所有  $\chi$ (···) = 1 改成  $\chi$ (···) = 0, 以确保与之前的惯例一致. 感谢 杨历指正.
- ◇ 第 363 页, 倒数第 4 行 **原文** η<sub>[E:F]</sub> 更正 η<sub>[L:F]</sub>

感谢郑维喆指正

- **今第372页,第20题** 问题 (b) 部分的  $P \in F[X]$  改成  $Q \in F[X]$ , 以免冲突. 相应地, 提示第一段的 P 都改成 Q.
   感谢郑维喆指正
- **◇第 395–396 页, 引理 10.5.3 的证明** 从第 395 页倒数第 3 行起 (即证明第二段), 修改如下:

置  $f_k = \sum_{h\geq 0} c_{k,h} t^h$ . 注意到  $\lim_{k\to\infty} \|f_k\| = 0$ , 这确保  $c_h := \sum_{k\geq 0} c_{k,h}$  存在. 我们断言  $f := \sum_{h\geq 0} c_h t^h \in K\langle t \rangle$  并给出  $\sum_{k=0}^{\infty} f_k$ .

对任意  $\epsilon > 0$ , 取 M 充分大使得  $k \ge M \implies \|f_k\| < \epsilon$ , 再取 N 使得当  $0 \le k < M$  而  $h \ge N$  时  $|c_k|_0 < \epsilon$ . 于是

$$h \ge N \implies (\forall k \ge 0, |c_{k,h}| \le \epsilon) \implies |c_h| \le \epsilon,$$

故 $f := \sum_{h>0} c_h t^h \in K(t)$ . 其次, 在K(t) 中有等式

$$f - \sum_{k=0}^M f_k = \sum_{h \geq 0} \left( c_h - \sum_{k=0}^M c_{k,h} \right) t^h = \sum_{h \geq 0} \underbrace{\left( \sum_{k > M} c_{k,h} \right)}_{|\cdot| < \epsilon} t^h,$$

从而 $f = \sum_{k=0}^{\infty} f_k$ .

感谢高煦指正.

- $\diamond$  第 397 页, 条目 V 下第 6 行
   原文
    $w_{x,-}$  更正
    $w_{x,-}$
- ⋄第417页,最后一行 它被刻画为对...