



بسم الله الرحمن الرحيم

أسئلة مساق الاسعافات الأولية

مع حلوها

أولاً: ضع علامة (✓) الإجابة الصحيحة وعلامة (x) أمام الإجابة الخاطئة

١. (x) الحمل بالأيدي هو أفضل الطرق لنقل المصاب في العمود الفقري
٢. (x) نضع العضو المصاب بعضة ثعبان سام أعلى من مستوى القلب
٣. (x) في عضة الثعبان يتم إخراج السم عن طريق تعصير مكان الإصابة
٤. ✓ يجب عدم تحريك العضو المصاب بعضة ثعبان سام
٥. ✓ في حالة فشل وقف النزيف بالضغط المباشر نضغط على الشريان الرئيسي المغذي للجزء النازف
٦. (x) نضع في الأذن مادة مطهرة إذا نزفت إثر حادث سير
٧. ✓ تنتقل المصابة بنزيف في الأشهر الأخيرة من الحمل إلى المستشفى فوراً لخطورة الأمر
٨. ✓ الحرارة عن طريق الفم أقل من الحرارة من الشرج بنصف درجة
٩. (x) في حالة الصدمة نحرص أن يكون الساقان أدنى من مستوى القلب
١٠. ✓ لوقف نزيف دماغي نضع الثلج على الجهة المضادة للشلل
١١. ✓ الجبيرة يجب أن تغطي مفصل أدنى ومفصل أعلى من مكان الكسر
١٢. ✓ في كسور الفخذ نستخدم جبيرتين متساويتين تمتدان من أسفل القدم إلى أعلى الفخذ
١٣. (x) أفضل وسيلة لنقل المصاب الذي يعاني من كسر في العمود الفقري حمله على نقالة
١٤. (x) أفضل طرق الإسعاف الأولي للحروق وضع معجون أسنان على الحرق
١٥. (x) تعتمد خطورة الحروق على عمق ومساحة ومكان الحرق
١٦. (x) في حالة الصدمة نرفع رأس المصاب أعلى من مستوى القلب

١٧. ✓ إذا زادت مساحة الحرق عن ٥٠% من مساحة الجلد فهناك خطورة كبيرة على الحياة
١٨. (X) نسبة الإصابة لشخص بالغ أصيب بحرق أصاب الأطراف الأربعة كاملة هي ٥٤%
١٩. ✓ لإسعاف نزيف من الأنف نجعل المريض ينظر إلى السماء ملقياً رأسه إلى الخلف
٢٠. ✓ من علامات التهاب الجروح الورم والألم والاحمرار
٢١. (X) بعد وضع الغيار ينبغي كشف الجرح باستمرار حتى نتأكد من وقف النزيف
٢٢. (X) معدل التنفس في الدقيقة لطفل في عامه الأول هو ١٨ مرة في الدقيقة
٢٣. ✓ متوسط معدل النبض في الأطفال أعلى منه في البالغين
٢٤. (X) يتكون العمود الفقري من (٣٥) فقرة وهو يحيط بالنخاع الشوكي
٢٥. ✓ مهمة المسعف في الكسور هي الحفاظ على حواف الكسر بدون حركة وإسعاف الصدمة
٢٦. ✓ الكسر هو شرخ في العظمة الواحدة بصورة لا توجد اصلاً في الوضع الطبيعي
٢٧. (X) غاز ثاني أكسيد الكربون ينتج عن احتراق الفحم ويسبب اختناق شديد
٢٨. ✓ من الأعراض الناتجة من التسمم عن طريق الفم هو تأثر منطقة الفم بالمادة السامة
٢٩. (X) الكبار أكثر عرضة للتسمم من الأطفال لكثرة تنقلهم من مكان لآخر
٣٠. (X) الشهيق هو عملية عودة القفص الصدري إلى وضعه الطبيعي (عملية سلبية
٣١. ✓ من أسباب الغيبوبة الإصابات في الرأس
٣٢. (X) أفضل طريقة للتعقيم هي استخدام الكحول بتركيز ٩٠%
٣٣. ✓ التطهير هو استعمال مواد كيميائية لقتل الجراثيم الضارة

٣٤. ✓ الإسعاف الأولي هو المساعدة التي تقدم لإنسان أصيب بحادث
٣٥. (X) أول خطوة في الإسعاف الأولي لمن تناول مادة قلووية هي القيء
٣٦. (X) التقلصات العضلية تحدث بسبب العرق الغزير مع إعطاء المصاب ماء دون الملح
٣٧. (X) أول خطوة لإسعاف التسمم عن طريق الفم إعطاء مادة ملينة
٣٨. ✓ أهم أسباب ضربة الشمس الإشعاعات
٣٩. ✓ تناول الحشيش لا يؤدي إلى تعلق جسدي
٤٠. (X) الحبوب المنبهة ضرورية للطلاب قبل الامتحان
٤١. (X) يعطى المصاب كوبا من العصير إذا دخل في غيبوبة تامة بسبب نقص السكر
٤٢. ✓ إصابة المرأة الحامل بالحصبة الألمانية قد يؤدي إلى تشوه الجنين.
٤٣. (X) لا توجد خطورة من إهمال تطعيم الطفل ضد الأمراض المعدية
٤٤. ✓ أهم ما يميز الحصبة ظهور نقاط كوبلك في الفم
٤٥. (X) أهم ما يميز مرض الجدري تضخم الغدد اللمفاوية خلف الأذن
٤٦. (X) لا مانع من تحريك الرأس في كسور فقرات العنق
٤٧. (X) لا حاجة لعمل جبيرة في كسور الترقوة وعظمة اللوح
٤٨. ✓ ينبغي علينا ألا نحاول إدخال نهايات العظام البارزة في الكسور المفتوحة
٤٩. (X) في حالة الكسور المفتوحة يجب غسل الجرح جيدا تحت الصنبور
٥٠. ✓ عند استخدام الأربطة في الأطراف يجب ترك نهاية الأطراف مكشوفة
٥١. (X) لمنع عض اللسان في حالة التشنج نضع قطعة من الخشب بين أسنان المصاب
٥٢. ✓ لا يعطى المصاب بالإعياء سوائل عن طريق الفم إذا كان يعاني من القيء

٥٣. ✓ لإسعاف مصاب بضربة الحرارة يغمس المصاب بماء بارد لا يضاف إليه ثلج
٥٤. (X) أول خطوة لإسعاف متناول لمادة الكيروسين هي القيء
٥٥. ✓ عند غسل عين مصابة بحرق كيميائي يوضع المصاب على جانبه المصاب
٥٦. (X) للحفاظ على درجة حرارة المصاب بالصدمة نضع على الجسم كمادات ماء ساخن
٥٧. ✓ في حالة نزيف الدماغ يضع المسعف كيساً من الثلج على الرأس في نفس الجهة المصابة بالشلل
٥٨. ✓ من أعراض فشل التنفس زرقة اللسان والشفاه وأطراف الأصابع.
٥٩. (X) يكون الالتئام بطيئاً نسبياً في الجرح القطعي إذا ما قورن بأي جرح آخر
٦٠. ✓ يجب قطع الحبل السري إذا تبين أنه ملتف حول عنق المولود
٦١. ✓ يسبب غاز أول أكسيد الكربون اختناق يحتاج الي فترة طويلة للتنفس الصناعي.
٦٢. (X) يمكن استخدام مواد كيميائية لاحتاد قيء عند المصاب بالتسمم في جميع الحالات.
٦٣. (X) عمل جرح فوق عضة الثعبان هي أول خطوات الإسعاف
٦٤. (X) اتساع حدقات العيون من أعراض الصدمة الأولية
٦٥. ✓ يجب على المسعف إبطال مفعول ما بقي من السم في جسم المصاب
٦٦. (X) ينقبض الحجاب الحاجز ويصبح أكثر استواءاً خلال عملية الزفير
٦٧. ✓ تكون درجة الحرارة حول معدلها الطبيعي في حالة الإعياء
٦٨. ✓ غياب الأكسجين عن المخ لمدة ٨ دقائق ينتج عنه ضرراً عاماً ودائماً
٦٩. ✓ تعمل الخمور على تثبيط الأجهزة العصبية
٧٠. ✓ التسمم بحامض كلور الماء يسبب بقعاً صفراء لامعة في الجلد

٧١. ✓ الغيبوبة هي فقدان الوعي وعدم إدراك الشخص لما يدور حوله
٧٢. (X) من الاعراض اللاحقة للصدمة ضعف قوة المصاب تدريجيا
٧٣. (X) يجب رفع الطرف الملدوغ فوق مستوى القلب دائماً .
٧٤. ✓ في حالة الصدمة نرفع قدمي المصاب أعلى من مستوى القلب
٧٥. (X) شرب الخمر لا يؤدي إلى تعلق جسدي أي إدمان.
٧٦. (X) يتم عمل غسيل معدة للمصاب بالتسمم المصاحب للغيبوبة
٧٧. (X) الادمان هو التعود الناتج عن تفاعل الدواء مع الجسم
٧٨. (X) في حالة غيبوبة نقص السكر نمتنع عن إعطاء المريض أي شيء في فمه قبل الغيبوبة
٧٩. ✓ من أسباب الغيبوبة تناول المنومات بأنواعها
٨٠. ✓ من أعراض الصدمة يكون التنفس سريعاً وسطحياً.
٨١. ✓ من أعراض النزيف الداخلي زيادة في معدل النبض و التنفس.
٨٢. (X) الكسر هو انفصال العظام المتقابلة عند منطقة التلامس في المفصل وعدم رجوعها.
٨٣. ✓ يجب فحص نبض المصاب قبل و بعد الجبيرة إذا كان الكسر في الذراع أو الساق.
٨٤. ✓ يستخدم الرباط المثلث كعلاقة للذراع في حالة كسر اسفل العضد
٨٥. ✓ الانطلاق السريع ينتج بسبب تناول جرعات وريدية متزايدة من المنبهات
٨٦. ✓ من اهم خطوات اسعاف الحروق من الدرجة الثالثة وضع الماء البارد على مكان الحرق
٨٧. ✓ عند غسل عين مصابة بحرق كيماوي يوضع العضو المصاب تحت الماء

٨٨. ✓ اذا ولد الذارع اولا علينا ان ننقل الام الى المستشفى فورا
٨٩. ✓ في حالة الولادة عند بروز كتفي المولود نرفع راسه قليلا
٩٠. (X) لمساعدة الام على الولادة نضغط على بطنها
٩١. (X) في حالة الصرع نبدا بالتنفس الصناعي اثناء التشنج
٩٢. ✓ تناول الكحول يؤدي الى نقص في معدل التنفس واختلال في التوازن وثقل في اللسان
٩٣. ✓ يستخدم الرباط الحلزوني المفتوح في الحروق
٩٤. ✓ من مضاعفات النكاف التهاب البنكرياس والمبيض
٩٥. ✓ كمادات الماء الباردة افضل الطرق لخفض الحرارة
٩٦. ✓ طريقة شيفر للتنفس الصناعي هي الافضل في حالة الغرق حيث يطرح المصاب على بطنه
٩٧. ✓ الانتحار العرضي يحدث لمتناولي المنومات لتكرار تناول الجرعة
٩٨. (X) تناول الخمر قد يؤدي الى الصدمة تنتهي بالوفاة
٩٩. (X) في حالة الاغماء الجلوس خير من الرقود
١٠٠. (X) يجب عزل المصاب بالجديري لمدة ستة ايام تبدا بظهور اول دفعة من الحلمات
١٠١. (X) يعطى بياض البيض لمن تسمم بتناول الكيروسين لمنع الامتصاص
١٠٢. (X) افضل الطرق لنقل مصاب وهو في حالة غيبوبة الحمل على الكرسي
١٠٣. (X) يمكن نقل الاطفال بالحمل على الذراعين وان كانوا مصابين بكسور
١٠٤. ✓ في حالة خلع المفصل نثبت المفصل بجبيرة ثم ينقل الى المستشفى
١٠٥. (X) لوقف نزيف شرياني في الجبين نضغط على الشريان الوجهي

١٠٦. ✓ تهيج الحلق وزيادة النبض واحمرار العيون والدوخة من التأثيرات الجسدية للحشيش
١٠٧. (X) ارتفاع الحرارة وزيادة العرق هما السبب المباشر لضربة الشمس
١٠٨. (X) يجب نزع الملابس المتفحمة قبل وضع الغيار على الحرق
١٠٩. (X) يجب معادلة المادة التي تسببت في حروق اصابت العين
١١٠. ✓ افضل طريقة لشفط السم عند عضه الثعبان عن طريق الفم
١١١. ✓ الخطوة الاولى لوقف النزيف الضغط المباشر على الجرح
١١٢. (X) تناول الكحول يؤدي الى ضيق الاوعية الدموية
١١٣. معدل التنفس في الدقيقة لطفل في عامه الاول اقل من ٢٠ في الدقيقة خ
١١٤. ✓ من الاسعاف الاولى لمصاب بالاعياء اعطاؤه ماء وملحاً عن طريق الفم
١١٥. ✓ يستخدم الرباط الحلزوني المفتوح في الجبائر المؤقتة
١١٦. (X) يستخدم الرباط المثلث كعلاقة للذراع في حالة كسور المرفق
١١٧. ✓ اول خطوة في اسعاف من شرب حمض نيتريك مركز اعطاء المصاب الحليب او الماء
١١٨. ✓ الولادة الطبيعية لا تعتبر وضعاً طارئاً لأنها تتطور بصورة متدرجة
١١٩. ✓ يمكن أن تتم الولادة على الأرض أو على سطح سوى أو على السرير.
١٢٠. (X) إذا تقرر نقل الأم إلى المستشفى للولادة يجب إرشادها إلى الحرق حينما يأتيها الطلق.
١٢١. ✓ بعد الولادة يبدأ الطلق مجدداً حتى يتم طرح المشيمة بعد انفصالها عن جدار الرحم.
١٢٢. (X) إذا ترك الحبل السري مربوطاً وغير مقطوع حتى تصل الأم إلى المستشفى فإن هذا يحدث ضرراً



١٢٣. ✓ الجرح المغلق قد يحدث نتيجة إسعاف خاطئ ومن أهم أعراضه النزف الداخلي
١٢٤. ✓ الطبقة القاعدية تساعد على التئام الجرح بطريقة سريعة بدون تكوين خلايا ليفية
١٢٥. ✓ وأهم علامات خبطة الدماغ الكبرى الشلل النصفي.
١٢٦. ✓ أهم علامات خبطة الدماغ الصغرى طنين الأذن والدوخة
١٢٧. ✓ من علامات الكسور الورم والألم وتشوه العضو المصاب
١٢٨. ✓ إذا أصيب الذراع بجرح قطعي فأفضل الطرق لوقف النزيف استخدام الرباط الضاغط.
١٢٩. ✓ تناول حمض النيتريك يؤدي إلى بقع صفراء حول الفم
١٣٠. ✓ نقوم بتمسيد بطن الأم بعد الولادة لمساعدة الرحم على الانقباض
١٣١. ✓ نزيف الأذن بعد الحادث خطير ويعني كسر في قاع الجمجمة
١٣٢. (X) عملية التنفس الصناعي في الصرع تكون عن طريق الفم للرم
١٣٣. ✓ في حال عدم توفر غيار معقم لتغطية جرح نازف نستخدم منديلا وإن أدى ذلك إلى تلوث الجرح
١٣٤. (X) لا مانع من جر المصاب من قدميه إذا كان يعاني من كسر في عظمة الفخذ
١٣٥. (X) الوضع الأفضل لمصاب بالغيبوبة النوم علي الظهر
١٣٦. (X) الخطوة الأولى لإسعاف حروق كيمياوية وضع العضو المصاب تحت الماء
١٣٧. ✓ من الإسعاف الأولى لنزيف المعدة إعطاء المصاب ثلجا عبر الفم
١٣٨. ✓ النزيف الشرياني لونه أحمر قاني ويخرج علي دفعات
١٣٩. (X) معدل التنفس يزداد بسبب تناول الخمر

١٤٠. (X) من أهم خطوات إسعاف الحروق من الدرجة الأولى وضع كمادات ثلج على الحرق
١٤١. ✓ معدل النبض عند المسنين أقل من معدله عن البالغين
١٤٢. (X) ينبغي مقاومة حركات العضلات المتشنجة ووقفها بالقوة أثناء التشنج
١٤٣. (X) في حالة خلع المفصل نعيد المفصل إلى وضعه السابق ثم نضع جبيرة
١٤٤. ✓ لا نستخدم الرباط الضاغط في إصابات العنق
١٤٥. (X) في الحروق من الدرجة الثانية ينبغي نزع الفقاعات المائية
١٤٦. ✓ من علامات التهاب الجروح الورم والألم والاحمرار.
١٤٧. (X) نسبة الإصابة لشخص بالغ أصيب بحرق أصاب الأطراف الأربعة كاملة هي ٥٤%.
١٤٨. (X) الخطوة الأولى لإسعاف حروق كيميائية وضع العضو المصاب تحت الماء.
١٤٩. (X) من أعراض غيبوبة ارتفاع السكر الرعشة والعرق والتوتر والشعور بالجوع.
١٥٠. (X) في حالة الصدمة نرفع رأس المصاب أعلى من مستوى القلب. .
١٥١. ✓ عند غسل عين مصابة بحرق كيميائي يوضع المصاب على جانبه السليم.
١٥٢. (X) أفضل وسيلة لنقل المصاب الذي يعاني من كسر في العمود الفقري حمله على نقالة.
١٥٣. ✓ يستخدم الرباط الحلزوني المفتوح في الجبائر المؤقتة والحروق.
١٥٤. ✓ الجبيرة يجب أن تغطي مفصل أدنى ومفصل أعلى من مكان الكسر.
١٥٥. ✓ من شروط الجبائر أن نأخذ النبض قبل وبعد الجبيرة.
١٥٦. ✓ يستخدم الرباط المثلث كعلاقة للذراع في حالة كسر المرفق الكوع.

## ثانياً: اختر الاجابة الصحيحة ((الاجابة مباشرة))

اختلال التكلم	١. من تأثيرات الخمر الهذيان اختلال التنفس .
الدورة الدموية التنفس تدفئة المصاب	٢. لإسعاف حالة الصدمة لا بد من مراعاة
ارتفاع في سكر الدم	٣. الغيبوبة التي تؤدي إلى انبعاث رائحة كرائحة التفاح التالف من فم المصاب ناجمة عن
الصدمة	٤. لا نبقي الرأس أعلى من مستوى القلب في الحالات التالية
ارتخاء في العضلات	٥. كل ما يلي له علاقة بالإصابات الحرارية عدا
ضربة حرارة	٦. يعمل في مخبز فارتفعت حرارته وازداد نبضه وجف جلده فهو مصاب بـ
نزع الملابس الثقيلة كمادات ماء بارد مروحة	٧. الاسعاف الأولي لمصاب بضربة حرارة
هي ١٨	٨. نسبة الإصابة لشخص بالغ أصيب بحرق الساق كاملة
نمنع تحريك العضو المصاب	٩. لحماية الجرح من التلوث في حالة الكسر المفتوح
لفت نظر المحيطين الي وجود غريق	١٠. عند إسعاف الغريق أول خطوة تكون .
صداع ، اختلال طفيف في الكلام تغيير طفيف في الذاكرة	١١. في حال خبطة الدماغ الصغرى يعاني المصاب من
جرح بتري في القدم	١٢. يستخدم الرباط الضاغط لوقف النزيف في
نقص في السكر	١٣. الغيبوبة الأشد خطورة على المصاب الذي يعاني من مرض السكر ناجمة عن
الثانية	١٤. إذا تكونت فقائيع مائية بسبب الحرق تكون درجة الحرق
ثانوي	١٥. النزيف الذي يحدث بعد أسبوع من الأصابة
ألياف مختلفة الطول و الشكل	١٦. العضلات عدة أنواع و هي عبارة عن
الرأس الأذن جانب الوجه	١٧. يستخدم الرباط المثبت في حالة الاصابات
٢٠ دقيقة	١٨. الرباط الضاغط لوقف النزيف يجب ألا يستمر أكثر من
النزيف	١٩. يحتفظ بالعضو المصاب أعلى من مستوى القلب في الحالات الآتية
تنفس صناعي	٢٠. الاسعاف الأولي لمصاب بخبطة دماغ كبرى
مرتفعة	٢١. إذا كانت درجة الحرارة من الأبط ٣٨ درجة مئوية فهي

٢٢. من أعراض الكسور المغلق	قصر في العضو المصاب تشوه في العضو المصاب ألم
٢٣. الحالات التي تحتاج الي مدة أطول في عملية التنفس الصناعي	التسمم بأول أكسيد الكربون
٢٤. أفضل الطرق لخفض الحرارة	كمادات الماء البارد
٢٥. الاسعاف الأولي لمصاب بكسر الترقوة	رباط مثلث
٢٦. من أهم أعراض الالتهابات الموضعية	إحمرار ارتفاع الحرارة الموضعية ألم
٢٧. تقاس درجة الحرارة لرجل يعاني من انسداد في الأنف عن طريق	الابط
٢٨. يعطى المصاب ماء و ملحاً في حالة	الحروق من الدرجة الثالثة الإعياء تقلص العضلات
٢٩. النزيف الذي يحدث في أول ٢٤ ساعة يسمى	تفاعلي
٣٠. النزيف الذي يحدث عند حدوث الجرح مباشرة يسمى	اولي
٣١. في غياب الطبقة القاعدية يتم التئام الجرح بتكوين	خلايا ليفية
٣٢. لا بد من استمرار التنفس الصناعي لمدة طويلة في حالة التسمم	بأول اكسيد الكربون التسمم بمواد مثبطة للتنفس
٣٣. أفضل طريقة لعملية تنفس صناعي لشخص أصيب بكسر في ضلعه	كول راوش
٣٤. يجب عمل غسيل معدة إذا مر على تناول الطعام المسموم	حتى ٤ ساعات
٣٥. أهم أعراض فشل الجهاز التنفسي	زرقة اللسان والأطراف فقد الوعي التدريجي
٣٦. أفضل طريقة تنفس صناعي لشخص مصاب بالغرق	شيفر
٣٧. أفضل اسعاف لحالة حرق كيميائي في المعدة (شرب حامض)	معادلته بمادة قلوية قوية
٣٨. أهم أعراض الذبحة الصدرية	احساس بثقل على الصدر
٣٩. تأثير المواد المهلوسة على كافة الأجهزة هو	التثبيط
٤٠. أهم اعراض خبطة الدماغ الكبرى	شلل نصف الجسم
٤١. يجب فك الرباط فوراً إذا حدث في الأطراف	انتفاخ او ورم او اختلاف لونه ودرجة

حرارته	
مقاومة حركة الجسم الإهتمام بلسان المصاب عمل التنفس الصناعي	٤٢. أهم عمل للمسعف لحالة تشنج هي
كسر الترقوة	٤٣. تستخدم طريقة سيدنا يحي لإسعاف
ورم فوري فوق منطقة الكسر تشوه ألم في منطقة الكسر	٤٤. أهم أعراض الكسر التي يلاحظها المسعف في أي حالة كسر
جذنين	٤٥. الكسر البسيط هو تنفصل العظمة إلى
جبيرة من منبت الفخذ إلى ما بعد القدم من الجهتين	٤٦. أفضل وسيلة لإسعاف كسر في منطقة الرجل
الألم	٤٧. لإسعاف كسر في عظمة الفخذ تحدث الصدمة من
الحصبة	٤٨. مرض فيروسي معدي ، يصيب الأطفال عادة ، أعراضه كالأنفلونزا، ومصدر العدوى في الإنسان عن طريق افرازات الأنف ، وأهم ما يميزه طفح يظهر على الوجه أولاً ثم يمتد إلى باقي الجسم هو
الحصبة الألمانية	٤٩. مرض فيروس يصيب الكبار والصغار وأعراضه كالأنفلونزا ، يبدأ الطفح على الوجه ثم باقي الجسم، يختفي في ٣ أيام يصاحبه ورم الغدد اللمفاوية خلف الأذن والرقبة ، إذا أصاب الحامل أدى إلى تشوهات جنينية خلقية
الجذري	٥٠. مرض يصيب الجلد يسببه فطر معين يبقى في الجسم ولا يزول إلا بعلاج مكثف ، يصيب الرأس ، ويسبب سقوط الشعر)
الزفير	٥١. العملية التنفسية التي لا تنقبض فيها عضلات التنفس هي
نقص السكر بالدم	٥٢. يكون الإنسان متوتراً ومغطى بالعرق وفاقداً للوعي في حالة غيبوبة
بالتدريج	٥٣. لإسعاف عضة الثلج لا بد من تدفئة المصاب
ماء بارد	٥٤. في حالة حرق من الدرجة الثانية يجب غمس الجزء المحروق في
غسل العين بالماء الجاري	٥٥. لإسعاف حرق كيماوي في العين
الراس ٩% الذراع ٩% الساق ١٨%	٥٦. شخص بالغ أصيب بحرق في الرأس والأطراف الأربعة تكون نسبة الحرق من المساحة الكلية للجسم هي
الضغط المباشر على الجرح	٥٧. أول خطوة لوقف النزيف

٥٨.	أطول الأوردة السطحية في الجسم هي	حبل الوريد
٥٩.	أهم أول أعراض مرض التيتانوس	ارتفاع درجة الحرارة
٦٠.	شخص أصيب بجرح نازف في منطقة الجبهة، لوقف النزيف نضغط على	الشريان الصدغي
٦١.	الصدمة هي	حالة هبوط في وظائف عدة أجهزة حيوية بالجسم
٦٢.	أهم الشرايين في جسم الإنسان وأكبرها	الأورطي
٦٣.	الغرغرينا تعنى للجزء المصاب	موت الجزء في الجسم الحي
٦٤.	الجرح الذي لا يلتئم إلا بتدخل الجراحة	الانتزاع
٦٥.	كمية النزيف تكون أكثر ما تكون في الجروح التالية	الانتزاع
٦٦.	سقوط جسم صلب على مقدمة الرجل يسبب جرحاً في الجلد من نوع	الجرح القطعي
٦٧.	أكثر الجروح أيلاماً	الهرسي
٦٨.	أهم مواد التعقيم المستخدم هي	البوليدين
٦٩.	أهم مناطق قياس النبض في الشخص المصاب الشريان الكعبري	بالذراع
٧٠.	معدل نبض رجل عمره سبعون سنة في الدقيقة	٥٥
٧١.	معدل درجة حرارة شخص بالغ عن طريق الشرج هي	اعلى بنص درجة من الفم
٧٢.	أفضل وسيلة لقياس درجة حرارة شخص مصاب بحرق في الفم	الابط
٧٣.	لإسعاف عضة الثلج يجب تدفئة المصاب بـ	ماء ساخن
٧٤.	أفضل طريقة لقياس درجة حرارة الأطفال عن طريق	الشرج
٧٥.	في حالة الغيبوبة يوضع المصاب على	جنبه
٧٦.	معدل النبض في الدقيقة لطفل في العاشرة من عمره	١٢٠
٧٧.	تناول سما فكان قيؤه فاتحاً ثم أصبح أسوداً فالمادة هي	نترات الفضة
٧٨.	لإسعاف حالات التشنج نقوم بما يلي	عمل تنفس صناعي
٧٩.	من مضاعفاته التهاب البنكرياس والتهاب المبيض	النكاف .
٨٠.	معدل النبض في الدقيقة لشخص في التسعين من عمره	أقل من ٧٠
٨١.	من أعراض الصدمة بسبب النزيف	يكون متوتراً و يحس بعطش شديد
٨٢.	نسبة الإصابة لشخص بالغ أصابت الحروق ذراعه الأيمن ورجله اليميني كاملين	٢٧ %
٨٣.	لا نستخدم الماء البارد في حرق من	الدرجة الثالثة

٨٤. لمنع التهابات الجروح نعمل ما يلي عدم تحريك العضو المصاب	عدم غسل الجرح عدم نزع الغيار
٨٥. أصيبت عينه بمادة حمضية، نبدأ ب	غسل العين بتيار من الماء
٨٦. يحتفظ بالعضو المصاب أسفل من مستوى القلب فيما يلي	عضة الثعبان
٨٧. نلجأ إلى طريقة براز مدمم مع تشنج في عضلات الساقين يعني التسمم ب	الجنزارة
٨٨. للقم رائحة الثوم مع أعراض الدوسنتاريا يعني التسمم ب	مادة فسفورية كالباراثيوم
٨٩. عملية التنفس الصناعي تتم	من الفم إلى الفم طريقة سلفستر طريقة هوفرد
٩٠. يستخدم الرباط حلزوني المفتوح في	تثبيت غيارات الحروق جبيرة مؤقتة رباط مؤقت لا تتوفر الاربطة الكافية

والله ولي التوفيق

دعواتكم