

——

(1) 质点在约束下可能发生的微小位移 $\delta \vec{r}$ 称为虚位移。质点实际运动产生的位移称为实位移。实位移是众多虚位移之中的一个。

(2) 若拉格朗日量中不显含某个广义坐标，则这个广义坐标称为循环坐标，其对应的广义动量是个守恒量。

(3) 某一时刻，刚体上速度为零的质点称为转动瞬心。

(4) 科里奥利力：

$$\vec{F}_c = -2m(\vec{\omega} \times \vec{v})$$

其中， \vec{F}_c 为科里奥利力， m 为质点质量， $\vec{\omega}$ 为旋转参考系的角速度， \vec{v} 为质点相对于旋转参考系的速度。

例子：傅科摆

(5)

限制在平面上的质点自由度：2

傅科摆自由度：2

水面上作匀速纯滚动的刚体球自由度：3

——
——

设粒子的静止质量为 m_0 ，粒子速度 $v = 0.9c$

运动质量：

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \frac{m_0}{\sqrt{1 - (0.9c)^2/c^2}} = \frac{m_0}{\sqrt{0.19}} = \frac{10m_0}{\sqrt{19}}$$

总能量：

$$E = mc^2 = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{0.19}} = \frac{10m_0 c^2}{\sqrt{19}}$$

动能：

$$T = E - m_0 c^2 = \left(\frac{10}{\sqrt{19}} - 1 \right) m_0 c^2$$

动量：

$$p = mv = \frac{10m_0}{\sqrt{19}} \cdot (0.9c) = \frac{9m_0 c}{\sqrt{19}}$$



虚功原理：受理想约束的力学体系平衡的充要条件是此力学体系的所有主动力在任何虚位移中所做的元功之和等于零，即 $\delta W = \sum_i \vec{F}_i^{(A)} \cdot \delta \vec{r}_i = 0$

三个受主动力的质点分别记为 1, 2, 3

选取 α, β 为广义坐标来描述所有质点的位置

$$\begin{aligned}\vec{r}_1 &= \frac{l_1}{2} \sin \alpha \vec{e}_x + \frac{l_1}{2} \cos \alpha \vec{e}_y, \\ \vec{r}_2 &= (l_1 \sin \alpha + \frac{l_2}{2} \sin \beta) \vec{e}_x + (l_1 \cos \alpha + \frac{l_2}{2} \cos \beta) \vec{e}_y, \\ \vec{r}_3 &= (l_1 \sin \alpha + l_2 \sin \beta) \vec{e}_x + (l_1 \cos \alpha + l_2 \cos \beta) \vec{e}_y\end{aligned}$$

主动力：

$$\begin{aligned}\vec{F}_1^{(A)} &= P_1 \vec{e}_x, \quad \vec{F}_2^{(A)} = P_2 \vec{e}_x, \quad \vec{F}_3^{(A)} = F \vec{e}_y \\ \delta \vec{r}_1 &= \frac{l_1}{2} \cos \alpha \delta \alpha \vec{e}_x - \frac{l_1}{2} \sin \alpha \delta \alpha \vec{e}_y \\ \delta \vec{r}_2 &= (l_1 \cos \alpha \delta \alpha + \frac{l_2}{2} \cos \beta \delta \beta) \vec{e}_x + (-l_1 \sin \alpha \delta \alpha - \frac{l_2}{2} \sin \beta \delta \beta) \vec{e}_y \\ \delta \vec{r}_3 &= (l_1 \cos \alpha \delta \alpha + l_2 \cos \beta \delta \beta) \vec{e}_x + (-l_1 \sin \alpha \delta \alpha - l_2 \sin \beta \delta \beta) \vec{e}_y\end{aligned}$$

虚功原理：

$$\sum_{i=1}^3 \vec{F}_i^{(A)} \cdot \delta \vec{r}_i = 0$$

即：

$$\delta\alpha \left[\frac{1}{2} l_1 P_1 \cos \alpha + l_1 P_2 \cos \alpha - F l_1 \sin \alpha \right] + \delta\beta \left[\frac{1}{2} l_2 P_2 \cos \beta - F l_2 \sin \beta \right] = 0$$

$\delta\alpha, \delta\beta$ 相互独立, 上式成立, 当且仅当:

$$\begin{cases} \frac{1}{2} l_1 P_1 \cos \alpha + l_1 P_2 \cos \alpha - F l_1 \sin \alpha = 0 \\ \frac{1}{2} l_2 P_2 \cos \beta - F l_2 \sin \beta = 0 \end{cases}$$

解得:

$$\begin{cases} \tan \alpha = \frac{P_1 + 2P_2}{2F} \\ \tan \beta = \frac{P_2}{2F} \end{cases}$$

ps: 也可以用广义力来写

四

ps: 参考答案错了

以质心为原点, 过原点垂直上底面为 z 轴建系

密度:

$$\rho = \frac{M}{\pi R^2 h}$$

柱坐标 r, θ, z 与直角坐标 x, y, z 关系:

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = z \end{cases}$$

柱坐标体积元:

$$dV = r dr d\theta dz$$

质量元:

$$dm = \rho dV = \rho r dr d\theta dz$$

积分区域：

$$\begin{cases} r \in [0, R] \\ \theta \in [0, 2\pi] \\ z \in [-\frac{h}{2}, \frac{h}{2}] \end{cases}$$

$$\begin{aligned} I_{zz} &= \int (y^2 + x^2) dm \\ &= \rho \int_{z=-\frac{h}{2}}^{z=\frac{h}{2}} \int_{\theta=0}^{\theta=2\pi} \int_{r=0}^{r=R} r^3 dr d\theta dz \\ &= \frac{1}{2} M R^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_{xx} &= I_{yy} \\ &= \int (x^2 + z^2) dm \\ &= \rho \int_{z=-\frac{h}{2}}^{z=\frac{h}{2}} \int_{\theta=0}^{\theta=2\pi} \int_{r=0}^{r=R} (r^2 \cos^2 \theta + z^2) r dr d\theta dz \\ &= \frac{1}{12} M (3R^2 + h^2) \end{aligned}$$

五

(1)

泊松括号：

$$\{f, g\} \equiv \sum_{\alpha} \left(\frac{\partial f}{\partial q_{\alpha}} \frac{\partial g}{\partial p_{\alpha}} - \frac{\partial f}{\partial p_{\alpha}} \frac{\partial g}{\partial q_{\alpha}} \right)$$

物理量对时间的全导数：

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + \{f, H\}$$

(2)

证明：

$$\{x, L_x\} = 0$$

$$\{x, L_y\} = z$$

$$\{x, L_z\} = -y$$

$$\{p_x, L_x\} = 0$$

$$\{p_x, L_y\} = p_z$$

$$\{p_x, L_z\} = -p_y$$

六

(1)

$$V_{\text{eff}}(r) = \frac{l^2}{2mr^2} + V(r) = \frac{l^2}{2mr^2} - kr^{-\beta}$$

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} V_{\text{eff}}(r) = +\infty$$

$$\lim_{r \rightarrow +\infty} V_{\text{eff}}(r) = 0^-$$

$$\left. \frac{dV_{\text{eff}}(r)}{dr} \right|_{r=r_m} = 0 \implies r_m = \left(\frac{2l^2}{mk\beta} \right)^{\frac{1}{2-\beta}}$$

可以画出 $V_{\text{eff}}(r)$ 的大致图像

质点只能在 $V_{\text{eff}}(r) \leq E$ 的区域内运动, 而 $E < 0$, 于是从图像上可以看出 r 不能趋于无穷大

(2)

$$V_{\text{eff}}(r) = \frac{L^2}{2mr^2} - kr^{-\beta} \leq E$$

由方程 $\frac{L^2}{2mr^2} - kr^{-\beta} = E$ 可得 r_{\min}, r_{\max}

角动量、能量守恒：

$$\begin{cases} L = mr^2\dot{\theta} \\ E = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) - kr^{-\beta} \end{cases} \implies E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{L^2}{2mr^2} - kr^{-\beta}$$

$$\frac{dr}{dt} = \sqrt{\frac{2}{m} \left[E - \frac{L^2}{2mr^2} + kr^{-\beta} \right]}$$

结合角动量表达式 $L = mr^2\dot{\theta}$, $\frac{dr}{dt} = \frac{dr}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} = \frac{L}{mr^2} \frac{dr}{d\theta}$, 代入上式, 得:

$$d\theta = \frac{dr}{r \sqrt{\frac{2mE}{L^2} r^2 + \frac{2mk}{L^2} r^{2-\beta} - 1}}$$

积分得:

$$\begin{aligned} \Delta\Phi &= \int d\theta \\ &= \int_{r_{\min}}^{r_{\max}} \frac{dr}{r \sqrt{\frac{2mE}{L^2} r^2 + \frac{2mk}{L^2} r^{2-\beta} - 1}} \end{aligned}$$

(3)

$$V_{\text{eff}}(r) = \frac{L^2}{2mr^2} - kr^{-\beta} \leq E = 0^-$$

当 $E = 0^-$, 可得:

$$\begin{cases} r_{\min} = \left(\frac{L^2}{2mk} \right)^{\frac{1}{2-\beta}} \\ r_{\max} = +\infty \end{cases}$$

将 $r_{\min}, r_{\max}, E = 0^-$ 代入 (2) 的积分式, 得:

$$\Delta\Phi = \int_{r=(\frac{L^2}{2mk})^{\frac{1}{2-\beta}}}^{r=+\infty} \frac{dr}{r \sqrt{\frac{2mk}{L^2} r^{2-\beta} - 1}} \quad (1)$$

令 $u = \sqrt{\frac{2mk}{L^2} r^{2-\beta} - 1}$, $\frac{L^2}{2mk}(u^2 + 1) = r^{2-\beta}$, 两边微分:

$$\frac{L^2}{mk} u du = (2 - \beta) r^{1-\beta} dr \implies r^{1-\beta} dr = \frac{L^2}{(2 - \beta)mk} u du$$

两边同时除以 $r^{2-\beta}$:

$$\begin{aligned}
\frac{dr}{r} &= \frac{L^2}{(2-\beta)mk} u du \Big/ r^{2-\beta} \\
&= \frac{L^2}{(2-\beta)mk} u du \Big/ \frac{L^2}{2mk} (u^2 + 1) \\
&= \frac{2}{2-\beta} \frac{u}{u^2 + 1} du \\
\Delta\Phi &= \int_{r=(\frac{L^2}{2mk})^{\frac{1}{2-\beta}}}^{r=+\infty} \frac{dr}{r \sqrt{\frac{2mk}{L^2} r^{2-\beta} - 1}} \\
&= \int_{u=0}^{u=+\infty} \frac{2}{2-\beta} \frac{1}{u^2 + 1} du \\
&= \frac{2}{2-\beta} \cdot \arctan u \Big|_{u=0}^{u=+\infty} \\
&= \frac{\pi}{2-\beta}
\end{aligned} \tag{1}$$

可见， $\Delta\Phi$ 与角动量无关