


В диапазоне масс от $m_1 = 6,3 \text{ кг}$ до $m_2 = 8,75 \text{ кг}$ есть три положения равновесия, центральное из которых является неустойчивым. Поэтому в этой области система обладает бистабильностью. Какое из возможных положений равновесия установится зависит от предыдущих состояний, следовательно, при увеличении нагрузки и последующем ее уменьшении будет наблюдаться петля гистерезиса (см. рис).



Задача 10. 2. До какой же степени..?

1. Напряженность электростатического поля E_1 , создаваемого диполем на больших расстояниях $r (r \gg l)$ вдоль линии, соединяющей заряды, найдем по принципу суперпозиции полей. Для этого следует построить векторную сумму напряженностей, создаваемых в точке наблюдения положительным \vec{E}_+ и отрицательным \vec{E}_- зарядами диполя

$$\vec{E} = \vec{E}_+ + \vec{E}_-.$$

Поскольку векторы \vec{E}_+ и \vec{E}_- на этой прямой противоположны друг другу, то модуль их суммы

$$E_1 = E_+ - E_- = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{\left(r - \frac{l}{2}\right)^2} - \frac{1}{\left(r + \frac{l}{2}\right)^2} \right). \quad (1)$$

Используя формулы приближенных вычислений $(1+x)^\alpha \approx 1 + \alpha \cdot x$ при малых x , получим

$$\frac{1}{\left(r \mp \frac{l}{2}\right)^2} = \frac{1}{r^2} \cdot \frac{1}{\left(1 \mp \frac{l}{2r}\right)^2} = \left\{ \begin{array}{l} \alpha = -2 \\ x = \frac{l}{2r} \end{array} \right\} = \frac{1}{r^2} \left(1 \pm \frac{l}{r}\right). \quad (2)$$

С учетом (2) выражение (1) примет вид

$$E_1 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r^2} \left(1 + \frac{l}{r}\right) - \frac{1}{r^2} \left(1 - \frac{l}{r}\right) \right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{2l}{r^3} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{2p}{r^3}. \quad (3)$$

Подставляя в (3) выражение для дипольного момента $p = ql$ системы, окончательно получаем

$$E_1(r) = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \cdot \frac{p}{r^3}. \quad (4)$$

С учетом направления вектора дипольного момента \vec{p} системы (4) можно переписать в векторном виде (в решении не требуется)

$$\vec{E}_1 = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\vec{p}}{r^3}.$$

Таким образом, как следует из (4), модуль напряженности поля E_1 , создаваемого диполем вдоль его оси на больших расстояниях ($r \gg l$) убывает обратно пропорционально кубу расстояния r до диполя

$$E_1 \sim \frac{1}{r^3}. \quad (5)$$

Заметим, что выражение (4) можно получить и традиционным способом, без использования приведенного в условии приближенного равенства. Действительно, приняв обозначения

$$\begin{aligned} r_1 &= r - \frac{l}{2} \\ r_2 &= r + \frac{l}{2} \end{aligned}$$

перепишем (1) в виде

$$E_1 = E_+ - E_- = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_1^2} - \frac{1}{r_2^2} \right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{r_2^2 - r_1^2}{r_2^2 r_1^2}.$$



С учетом того, что $r_2^2 - r_1^2 = 2rl$, и в рамках принятых приближений можно считать, что $r_2^2 \cdot r_1^2 \approx r^4$, получим

$$E_1 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{2rl}{r^4} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{2p}{r^3}.$$

Интересно, что зависимость, подобная (5), сохраняется и при нахождении напряженности поля E_2 «перпендикулярно» диполю, т.е. на прямой, перпендикулярной оси диполя и проходящей через его центр. В этом случае изменяется только безразмерный коэффициент

$$E_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{p}{r^3}.$$

Общая картина силовых линий диполя на большом расстоянии от него дана на рисунке справа. Расположение положительного и отрицательного зарядов диполя соответствует расположению, приведенному в условии задачи.




2. Согласно закону Кулона пробный заряд q_0 (он является

положительным точечным зарядом) будет притягиваться к точечному заряду $-q_1$ в вакууме с силой

$$F_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_0 q_1}{r^2}. \quad (6)$$

Согласно третьему закону Ньютона с такой же по модулю силой F_1 заряд $-q_1$ будет притягиваться к заряду q_0 .

Следовательно, в данном случае справедливо утверждение




$$F_1 \sim \frac{1}{r^2}.$$

Таким образом, в данном пункте задачи

$$n = 2. \quad (7)$$

3. При взаимном расположении диполя \vec{p} и пробного заряда q_0 как на рисунке взаимодействие будет носить характер отталкивания, поскольку одноименный (положительный) заряд диполя находится ближе к пробному (положительному) заряду, чем разноименный (отрицательный). В таком случае силы отталкивания преобладают над силами притяжения, что приводит к возникновению результирующей силы \vec{F}_2 , направленной вправо (см. рис).



Следовательно, в данном случае диполь будет отталкивать пробный заряд вдоль своей оси с силой

$$F_2 = q_0 E_1(r) = \{(4)\} = \frac{q_0}{2\pi\epsilon_0} \cdot \frac{p}{r^3}. \quad (8)$$

Заметим, что при изменении ориентации диполя ($-\vec{p}$), характер взаимодействия диполя с пробным зарядом изменится с отталкивания на притяжение.

Следовательно, в данном случае справедливо утверждение


$$F_2 \sim \frac{1}{r^3}.$$

Таким образом, в данном пункте задачи

$$n = 3. \quad (9)$$

4. Для определенности будем считать, что левый диполь \vec{p} создает напряженность поля в пространстве, которое действует на правый диполь $-\vec{p}$.

Поскольку одноименные заряды диполей находятся на меньших



расстояниях, чем разноименные, то согласно закону Кулона сила отталкивания в системе будет больше силы притяжения.

Это приведет к возникновению результирующей силы \vec{F}_3 отталкивания между диполями, направленной вправо (см. рис.).

Используя (4), для рассматриваемой системы можем записать

$$F_3 = q \left(E_1 \left(r - \frac{l}{2} \right) - E_1 \left(r + \frac{l}{2} \right) \right) = \frac{q p}{2\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{\left(r - \frac{l}{2} \right)^3} - \frac{1}{\left(r + \frac{l}{2} \right)^3} \right). \quad (10)$$

С помощью формулы приближенного вычисления $(1+x)^\alpha \approx 1 + \alpha \cdot x$ (при $x \rightarrow 0$) в данном случае находим

$$\frac{1}{\left(r \mp \frac{l}{2} \right)^3} = \frac{1}{r^3} \cdot \frac{1}{\left(1 \mp \frac{l}{2r} \right)^3} = \left\{ \begin{array}{l} \alpha = -3 \\ x = \frac{l}{2r} \end{array} \right\} = \frac{1}{r^3} \left(1 \pm \frac{3l}{2r} \right).$$

Соответственно, разность в выражении (10) примет вид

$$\frac{1}{\left(r - \frac{l}{2} \right)^3} - \frac{1}{\left(r + \frac{l}{2} \right)^3} \approx \frac{3l}{r^4}.$$

С учетом того, что $p = ql$, окончательно получим

$$F_3 = \frac{3p^2}{2\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r^4}. \quad (11)$$

Следовательно, в данном случае справедливо утверждение

$$F_3 \sim \frac{1}{r^4}.$$

Таким образом, в данном пункте задачи

$$n = 4. \quad (12)$$


Заметим, что выражение (11) проще получить, используя производную от (4) по расстоянию r , поскольку искомая сила F_3 вычисляется как

$$F_3 = -p \frac{\partial E}{\partial r},$$

однако подобный подход выходит за рамки действующей школьной программы.

5. Будем считать, что напряженность $E(r)$ электростатического поля, создаваемого точечным зарядом q_0 в области нахождения молекулы, меняется незначительно (в силу малости размеров молекулы) и равна

$$E(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_0}{r^2}.$$




Тогда индуцированный дипольный момент молекулы примет значение

$$p_i = \alpha\epsilon_0 E(r) = \alpha\epsilon_0 \cdot \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_0}{r^2} = \frac{\alpha}{4\pi} \cdot \frac{q_0}{r^2}.$$

В пункте 3 задачи мы вычислили силу взаимодействия диполя и точечного заряда, правда в рассматриваемом случае индуцированный (наведенный) дипольный момент \vec{p}_i имеет противоположное направление («от заряда»), что приведет к возникновению в данной системе силы притяжения.

Используя (8) и третий закон Ньютона, найдем силу притяжения вынужденно поляризованной молекулы к точечному заряду



$$F_4 = \frac{q_0}{2\pi\epsilon_0} \cdot \frac{p_i}{r^3} = \frac{q_0}{2\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r^3} \cdot \frac{\alpha}{4\pi} \frac{q_0}{r^2} = \frac{\alpha q_0^2}{8\pi^2 \epsilon_0} \cdot \frac{1}{r^5} \quad (13)$$


Следовательно, в данном случае справедливо утверждение

$$F_4 \sim \frac{1}{r^5}.$$

Таким образом, в данном пункте задачи

$$n = 5. \quad (14)$$

6. Будем считать, что напряженность электростатического поля, создаваемого диполем \vec{p} в области нахождения молекулы, меняется незначительно. Тогда согласно (4) можем записать



$$E(r) = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \cdot \frac{p}{r^3}.$$

Соответственно, индуцированный дипольный момент молекулы в этом случае примет значение

$$p_i = \alpha\epsilon_0 \cdot \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \cdot \frac{p}{r^3} = \frac{\alpha}{2\pi} \cdot \frac{p}{r^3}. \quad (15)$$

В пункте 4 задачи мы вычислили силу отталкивания между диполями, ориентированными «навстречу» друг другу. В данном случае диполи ориентированы в

одном направлении, поскольку наведенный дипольный момент всегда ориентирован «по полю». Это обстоятельство приведет к возникновению силы притяжения между диполями в рассматриваемой системе.

Считая взаимодействие диполей по формуле (11), получим величину силы притяжения между ними для рассматриваемого случая

$$F_5 = \frac{3p \cdot p_i}{2\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r^4} = \frac{3p}{2\pi\epsilon_0} \frac{\alpha}{2\pi} \cdot \frac{p}{r^3} \cdot \frac{1}{r^4} = \frac{3\alpha p^2}{4\pi^2\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r^7}. \quad (16)$$

Следовательно, в данном случае справедливо утверждение

$$F_5 \sim \frac{1}{r^7}.$$


Таким образом, в данном пункте задачи

$$n=7. \quad (17)$$

Интересно, что в пунктах 3 и 4 задачи имеет место сила отталкивания между объектами, а в пунктах 5 и 6, связанных с индуцированным дипольным моментом, всегда имеет место сила притяжения.

Это связано с тем, что направление напряженности внешнего электрического поля однозначно определяет направление возникающего дипольного момента \vec{p} поляризуемого объекта — он всегда ориентирован «по силовой линии» внешнего (индуцирующего) поля.

В завершение задачи на рисунке справа приведена достаточно забавная (но верная!) зависимость показателя степени n в выражении для силы взаимодействия F_i от номера N пункта задачи.



Как говорится, комментарии излишни, но так и не понятно, почему последняя точка не ложится «на прямую». Было бы так красиво...