

-3. Космический вальс

Условие

Задание 10-3. Космический вальс

*В классическом вальсе партнеры кружатся вокруг друг друга и одновременно движутся по кругу. В космическом вальсе - Земля и Луна вращаются вокруг общей оси и медленно движутся вокруг Солнца!

Оставим задачу о физике вальса на будущее, разберемся с более простой физической задачей о одной пары: Луны и Земли.*

Для упрощения будем считать, что траектории движения этих тел лежат в одной плоскости, все орбиты круговые, Земля имеет форму идеального шара.

Примем во внимание, что в характеристиках движения Земли есть очень «странные совпадения»: период вращения Земли вокруг своей оси равен точно одним суткам, период обращения вокруг Солнца в точности равен одному году, период обращения Луны вокруг Земли равен месяцу (правда, примерно). И еще один неожиданный факт – расстояние от Земли до Луны – одна световая секунда. Правда, сейчас, в век искусственного интеллекта, помнить эти данные и не обязательно – всегда можно спросить у Алисы (если нет интеллекта своего).

В конце данного задания приведены (округленно) значения параметров рассматриваемой пары тел, которые могут понадобиться при решении задачи. Рекомендуем добавить в таблицу значения угловых скоростей вращения рассматриваемых тел. Жюри это оценит.

Небольшие подсказки.

1. При описании движения во вращающейся системе отсчета (которая является неинерциальной), вместо перехода в инерциальную систему, удобно ввести центробежную силы. Эта сила, действующая на любое тело, по модулю равна $m\omega^2 r$ (m - масса тела, ω - угловая скорость вращения системы отсчета относительно какой-либо инерциальной системы, r - расстояние до оси вращения). Сила направлена по прямой перпендикулярной оси вращения от нее, радиально. Обозначайте эти силы «со звездочкой» - F^* .

Впрочем, еще А.Эйнштейн показал, что эта сила, как и другие силы инерции, принципиально неотличимы от гравитационных сил, или гравитационные силы ... тоже силы инерции.

2. Во всех частях задачи рекомендуем произведение гравитационной постоянной на массу центрального тела GM выразить через кинематические характеристики – угловые скорости и радиусы орбит.

3. Математическая подсказка. В данной задаче много малых величин, поэтому рекомендуем использовать различные обоснованные приближения. В частности известную формулу, справедливую при малых $x < 1$. Для любого показателя степени n (целого, дробного, положительного, отрицательного и даже комплексного...) можно использовать выражение:

$$(1+x)^n = 1 + \frac{n}{1!}x^1 + \frac{n(n-1)}{2!}x^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}x^3 + \dots$$

в этой формуле каждое следующее слагаемое меньше предыдущего, поэтому можно оставлять столько слагаемых, сколько Вы посчитаете необходимым.

Часть 1. Одинокая Земля

В этой части рассмотрим один эффект, связанный с вращением Земли вокруг своей оси. Влиянием Луны, Солнца, комет и туманности Андромеды пренебрегаем.

Обозначим ускорение свободного падения, обусловленное только гравитационным притяжением g_0 (назовем его гравитационным). Это ускорение свободного падения на абсолютно неподвижной Земле.

Некоторым известно, что ускорение на экваторе Земли меньше, чем на полюсах. Почему бы этим не воспользоваться спортсменам прыгунам в высоту? Допустим, спортсмен прыгает на полюсе Земли на высоту 2 метра.

1.1 Рассчитайте, на сколько увеличится высота прыжка (при той же начальной вертикальной скорости) на экваторе по сравнению с высотой прыжка на полюсе.

Часть 2. Взгляд с Луны

В этой части рассмотрим влияние Земли на ускорение свободного падения на Луне. Луна повернута к Земле все время одной стороной. Вращение Земли и Луны вокруг Солнца не учитывать.

2.1 Рассчитайте гравитационное ускорение на поверхности Луны g_M .


2.2 Рассчитайте численное значение отношения силы притяжения некоторого тела на поверхности Луны к Земле к силе тяжести на Луне $\frac{F_E}{mg_M}$.

Рассмотрим две точки на поверхности Луны на ее экваторе: в точке **A**, для которой Земля находится в зените, и противоположную точку **B** (Земля в надире). Величины, относящиеся к точке **A**, будем обозначать индексом (+), а к точке **B** – (-).

2.3 Рассчитайте относительную разность ускорений свободного падения в точках **A** и **B** $\varepsilon_{Mg} = \frac{g_{(+)} - g_{(-)}}{g_M}$, обусловленную только гравитационным притяжением к Земле.

2.4 Рассчитайте это же отношение с учетом движения Луны вокруг Земли (т.е. с учетом центробежных сил).

Часть 3. Взгляд с Земли



О Солнце можно забыть – точнее, пренебречь его влиянием!

Опять рассматриваем две точки на поверхности Земли, находящиеся на одной прямой с Луной: **A** – Луна в зените, **B** – Луна в надире.

3.1 Рассчитайте численное значение отношения силы притяжения к Луне и силы тяжести для тела, находящегося на поверхности Земли $\frac{F_{GM}}{mg_0}$.

Пренебрежем движением Земли (т.е. будем ее считать абсолютно неподвижной).

3.2 Рассчитайте относительную разность ускорений свободного падения, обусловленную только гравитационным притяжением к Луне $\varepsilon_{GM} = \frac{g_{(+)} - g_{(-)}}{g_0}$.


А теперь вспомним, как кружатся партнеры в Вальсе – они движутся оба!



3.3 Укажите вокруг какой точки вращается Луна и Земля.

3.4 Рассчитайте относительную разность ускорений свободного падения, обусловленную не только гравитационным притяжением к Луне $\varepsilon_{GM} = \frac{g_{(+)} - g_{(-)}}{g_0}$, но и движением Земли вокруг Луны.

Справочные данные (используйте в решении указанные обозначения этих величин)

Гравитационное ускорение на поверхности Земли	g_0	9,80	м/с ²
Гравитационное ускорение на поверхности Луны	g_M		
Радиус Земли	R_0	$6,40 \cdot 10^6$	м
Радиус Луны	r_M	$1,74 \cdot 10^6$	м
Расстояние до Луны	R_M	$3,00 \cdot 10^8$	м
Сутки	T_0	24,0	час
Угловая скорость вращения Земли	ω_0		
Лунный месяц	T_M	27,3	сут
Угловая скорость Луны	ω_0		
Отношение массы Луны к массе Земли	η	$1,23 \cdot 10^{-2}$	






Решение

Задача 3. Изучение закона электромагнитной индукции (ЭМИ) Фарадея.

3.1 Судя по графику в установке 6 катушек, а на фотографии их только 5.



3.2 ЭДС индукции пропорциональна скорости магнита. На графике видно, что максимумы ЭДС лежат примерно на одной прямой. Следовательно, скорость изменяется со временем по линейному закону, что свидетельствует о том, что падение магнита **является** равноускоренным. 3.3 Центр магнита проходит через центр очередной катушки, когда ЭДС обращается в нуль. По графику измерим (посчитаем клеточки) времена прохождения второй и третьей катушек (время прохождения первой примем за ноль): $\tau_1 = t_2 - t_1 \approx 21,5 \text{ кл} = 0,1075 \text{ с}$ $\tau_2 = t_3 - t_1 \approx 36,0 \text{ кл} = 0,180 \text{ с}$.

Из закона равноускоренного движения можно записать

$$\begin{aligned} l &= v_0 \tau_1 + \frac{g \tau_1^2}{2} \\ 2l &= v_0 \tau_2 + \frac{g \tau_2^2}{2} \end{aligned} \quad (1)$$

Из этих уравнений находим

$$l = \frac{g}{2} \frac{\tau_2^2 - \tau_1^2}{\frac{\tau_2}{\tau_2} - \frac{\tau_1}{\tau_2}} = 20 \text{ см} \quad (2)$$

3.4 Из закона Фарадея следует, что

$$|\varepsilon| = \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} \Rightarrow \Phi = \sum_k |\varepsilon| \Delta t \quad (3)$$

т.е. площадь под графиком зависимости ЭДС от времени равна изменению магнитного потока (точнее надо говорить об интеграле). Следовательно, площадь одного «всплеска» равна магнитному потоку через $N = 10$ витков катушки.. Считаем клеточки: получаем примерно 9 клеточек, что соответствует $\Phi \approx 5 \cdot 10^{-3} \cdot 5 \cdot 10^{-3} \cdot 9 = 2,6 \cdot 10^{-4} \text{ В} \cdot \text{с}$. Тогда индукция поля

$$B = \frac{\Phi}{NS} \approx 0,13 \text{ Тл} \quad (4)$$

Что соответствует современным неодимовым магнитам.

Задание 10-2. Необычные пленки!? Решение

Часть 1. Пленка №1

1.1 Так как всякая система стремится к минимум потенциальной энергии, то площадь пленки в свободном состоянии равна нулю.

1.2 При медленном растяжении пленки с помощью силы F , в пленке будет возникать сила упругости, равная по модулю внешней приложенной силе. При растяжении пленки на малую величину Δl , будет совершена работа

$$\delta A = F \Delta l, \quad (1)$$

которая пойдет на увеличение потенциальной энергии пленки

$$\Delta U = ah \Delta l. \quad (2)$$

Приравнивая эти выражения, находим, что сила упругости постоянна, не зависит от деформации и равна

$$F_{\text{упр}} = ah. \quad (3)$$

1.3 Для расчета давления воспользуемся тем же принципом. Пусть некий газ, изнутри увеличил объем шара на малую величину ΔV . Работа, совершенная газом $P \Delta V$ пошла на увеличение энергии пленки $a \Delta S$. Поэтому

$$P \Delta V = a \Delta S \quad (4)$$

Так как

$$\begin{aligned} V = \frac{4}{3}\pi r^3 &\Rightarrow \Delta V = 4\pi r^2 \Delta r, \\ S = 4\pi r^2 &\Rightarrow \Delta S = 8\pi r \Delta r \end{aligned} \quad (5)$$

То из формулы (4) получаем

$$P = \frac{2a}{r}. \quad (6)$$

Не сложно записать и обратную зависимость, но лучше сделать это в симметричной форме в виде уравнения

$$rP = 2a. \quad (7)$$

1.4 Для одного моля газа справедливо уравнение Менделеева-Клапейрона

$$PV = RT. \quad (8)$$

которое в паре с уравнением (7) позволяет связать две любые характеристики газа. В данном случае надо избавиться от давления, что сделаем с помощью формулы (16)

$$\frac{2a}{r}V = RT \Rightarrow \frac{2a}{r} \frac{4}{3}\pi r^3 = RT \Rightarrow \frac{8}{3}a\pi r^2 = RT. \quad (9)$$

Находим требуемую зависимость

$$r = \sqrt{\frac{3RT}{8\pi a}}. \quad (10)$$

1.5 Для расчета теплоемкости воспользуемся первым законом термодинамики

$$C\Delta T = P\Delta V + \frac{3}{2}R\Delta T. \quad (11)$$

В общем случае в задачах такого рода необходимо выразить работу газа через изменение температуры. Но в данном случае проще воспользоваться формулой (4)

$$P\Delta V = a\Delta S = a\Delta (4\pi r^2) = 4\pi a\Delta \left(\frac{3RT}{8\pi a} \right) = \frac{3}{2}R\Delta T \quad (12)$$

Окончательно из уравнения (11) получаем

$$C = \frac{\delta Q}{\Delta T} = 3R. \quad (13)$$

1.6 В этой задаче рассмотрена обычная мыльная пленка.

Часть 2. Пленка №2

Последовательность решения этой задачи традиционна, но требует известной аккуратности при выполнении алгебраических преобразований. По определению теплоемкость системы равна

$$C = \frac{\delta Q}{\Delta T}. \quad (14)$$

Для расчета количества полученной теплоты используем первый закон термодинамики для газа:

$$\delta Q = \Delta U_0 + \delta A. \quad (15)$$

Здесь

$$\Delta U_0 = \frac{3}{2} R \Delta T \quad (16)$$

изменение внутренней энергии одноатомного идеального газа. δA - работа, совершенная газом при изменении его температуры на малую величину ΔT . Эта работа равна изменению энергии пленки, т.е. $\delta A = P \Delta V = \Delta U$. Таким образом, необходимо рассчитать изменение энергии пленки при изменении ее температуры на ΔT . В условии сказано, что внутренняя энергия пленки явно не зависит от температуры. Но эта зависимость появляется из-за того, что изменяется радиус шара, следовательно, и площадь его поверхности. Очевидный путь дальнейшего решения – выразить все величины (и их изменения) через радиус шара (и его изменение). Будем использовать геометрические формулы (5). Для внутренней энергии пленки имеем

$$\begin{aligned} U &= b S^n = (4\pi)^n b r^{2n} \\ \Delta U &= 2n(4\pi)^n b r^{2n-1} \Delta r. \end{aligned} \quad (17)$$

Для того, чтобы получить уравнение процесса расширения газа в пленке найдем связь между радиусом пленки и температурой газа. Работа газа, с одной стороны, равна изменению энергии пленки, поэтому $P \Delta V = \Delta U$

$$P = \frac{\Delta U}{\Delta V} = \frac{2n(4\pi)^n b r^{2n-1} \Delta r}{(4\pi) r^2 \Delta r} = 2nb(4\pi)^{n-1} r^{2n-3}. \quad (18)$$

Далее используем уравнение состояния идеального газа, из которого находим температуру газа при заданном значении радиуса шара, а также изменение температуры при изменении радиуса шара:

$$PV = RT$$

$$T = \frac{1}{R} 2nb(4\pi)^{n-1} r^{2n-3} \cdot \frac{4\pi}{3} r^3 = \frac{2}{3R} nb(4\pi)^n r^{2n}. \quad (19)$$

$$\Delta T = \frac{4}{3R} n^2 b(4\pi)^n r^{2n-1} \Delta r$$

Наконец, аккуратно все найденные величины в формулу для теплоемкости


$$\begin{aligned} C &= C_V + \frac{\Delta U}{\Delta T} = \\ &= C_V + \frac{2n(4\pi)^n b r^{2n-1} \Delta r}{\frac{4}{3R} n^2 b(4\pi)^n r^{2n-1} \Delta r} = \frac{3}{2} R + \frac{3}{2n} R = \frac{3}{2} \frac{n+1}{n} R. \end{aligned} \quad (20)$$

Задание 10-3. Космический вальс

Решение

Решение всех пунктов этого задания достаточно традиционное, но требующее внимания, аккуратности и точности в расчетах. Если внимательно и вдумчиво дочитать условие задачи

до конца (к сожалению, далеко не все «олимпиадники» это делают), то можно понять основную идею задачи – учет малых поправок! В такой ситуации основное правило расчетов – найди малую безразмерную величину! А далее проводи разложение по степеням этой малой величины.



Часть 1. Одинокая Земля.

1.1 Как следует из рисунка, уменьшение ускорения обусловлено центробежной силой и равно

$$g_1 = g_0 - \omega_0^2 R_0 = g_0 \left(1 - \frac{\omega_0^2 R_0}{g_0} \right) \quad (1)$$

Здесь малой поправкой является центробежное ускорение. В качестве «меры» этой поправки служит безразмерная величина $\varepsilon_g = \frac{\omega_0^2 R_0}{g_0}$. Вычислим ее численное значение.

Угловая скорость вращения Земли $\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = 7,27 \cdot 10^{-5} \text{ с}^{-1}$;

величина центробежного ускорения $\omega_0^2 R_0 = 3,38 \cdot 10^{-2} \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$;

Относительное значение поправки $\varepsilon_g = \frac{\omega_0^2 R_0}{g_0} = 3,45 \cdot 10^{-3}$. Всего-то, чуть более трех десятых процента.

Таким образом, все поправки связанные с вращением Земли будут иметь такой порядок!

Запишем простую, но важную формулу, позволяющую проводить расчеты поправок, почти «в уме». Пусть $y = Cx^n$ (n - любое); тогда

$$\varepsilon_y = \frac{\Delta y}{y} = \frac{C(x + \Delta x)^n - Cx^n}{Cx^n} \approx n \frac{\Delta x}{x} = n\varepsilon_x$$

В частности, эта формула широко используется при расчете погрешностей косвенный измерений: например, погрешность измерения радиуса шара равна 2%, тогда погрешность измерения его объема в три раз больше, т.е. 6%

Вернемся к решению задачи. Высота прыжка равна

$$h = \frac{v_0^2}{2g}. \quad (2)$$

Следовательно, относительное изменение этой высоты равно $\frac{\delta h}{h} = -\frac{\delta g}{g_0}$. Отсюда получаем

$$\delta h = -h \frac{\delta g}{g_0} = -h \varepsilon_g = 6,90 \cdot 10^{-3} \text{ м}. \quad (3)$$

Часть 2. Взгляд с Луны

2.1 Гравитационное ускорение на поверхности Луны проще найти, если записать формулу для отношения

$$\frac{g_M}{g_0} = \frac{G \frac{M_M}{r_M^2}}{G \frac{M_0}{R_0^2}} = \frac{M_M}{M_0} \frac{R_0^2}{r_M^2} \Rightarrow g_M = g_0 \eta \frac{R_0^2}{r_M^2} = 1,64 \frac{\mathcal{M}}{c^2} \quad (4)$$

Далее немного подумаем: речь идет об изменении силы притяжения к Земле (следовательно, и ускорений) при малом изменении расстояния до Земли – в пределах диаметра Луны. Пусть тело находится на расстоянии x от центра Луны. Тогда сила его притяжения к Солнцу в соответствии с законом всемирного тяготения равна (запишем точную формулу и ее приближение с помощью формулы, приведенной в условии):

$$\begin{aligned} F_{GM} &= G \frac{M_M m}{(R_M + x)^2} = G \frac{M_M m}{R_M^2} \left(1 + \frac{x}{R_M}\right)^{-2} = G \frac{M_M m}{R_M^2} \left(1 - 2 \frac{x}{R_M} + 3 \left(\frac{x}{R_M}\right)^2 - 4 \left(\frac{x}{R_M}\right)^3 + \dots\right) = \\ &= F_0 (1 - 2x + 3x^2 - 4x^3 + \dots) \end{aligned} \quad (5)$$

где $F_0 = \frac{M_M m}{R_M^2}$ – сила притяжения тела, находящегося в центре Луны; $x = \frac{r}{R_S}$ – отношение смещения от центра к радиусу лунной орбиты – относительное смещение. Если тело находится на поверхности Луны это относительное смещение равно $x_0 = \frac{r_M}{R_M} = 5,8 \cdot 10^{-3}$ – вот ожидаемый порядок относительных поправок, связанных с притяжением Солнца.

2.2 Сила притяжения к Земле для тела находящегося в пределах Луны, определяется формулой (5). Выразим величину F_0 через более понятные величины, используя второй закон Ньютона для движения Луны по круговой орбите


$$G \frac{M_M M_0}{R_M^2} = M_M \omega_M^2 R_M \Rightarrow G \frac{M_M}{R_M^2} = \frac{M_M}{M_0} \omega_M^2 R_M = \eta \omega_M^2 R_M. \quad (6)$$

И запишем требуемое отношение для произвольного положения тела в пределах Земли

$$\frac{F_{GM}}{mg_M} = \frac{m \eta \omega_M^2 R_M}{mg_M} (1 - 2x + 3x^2 - 4x^3 + \dots) \quad (7)$$

Сколько слагаемых взять в этой формуле? Достаточно одного (т.е. 1) – остальные дадут поправку в пятом знаке. Поэтому следует принять окончательный результат (обозначим это отношение ε_0):

$$\varepsilon_0 = \frac{F_{GM}}{mg_M} = \frac{\eta \omega_M^2 R_M}{g_M} = 1,6 \cdot 10^{-5} \quad (8)$$



2.3 Запишем выражение для ускорения свободного падения в указанных точках (с учетом направления сил – см. рисунок)

$$\begin{aligned} g_{(+)} &= g_0 + \frac{F_{GM(+)}}{m} \\ g_{(-)} &= g_0 - \frac{F_{GM(-)}}{m} \end{aligned} \quad (9)$$

Их относительная разность равна

$$\begin{aligned} \varepsilon_{Sg} &= \frac{g_{(+)} - g_{(-)}}{g_M} = \frac{F_{GM(+)} + F_{GM(-)}}{mg_M} = 2 \frac{\omega_M^2 R_M}{g_m} \\ &= 2\varepsilon_0 = 3,2 \cdot 10^{-5} \end{aligned} \quad (10)$$

Понятно, что и в этом случае можно пренебречь поправками к силе притяжения Земли, т.е. считать, что $F_{GS(+)} \approx F_{GS(-)} \approx F_{GS}$. Ответ очевиден: с ближней стороны притяжение Земли уменьшает ускорение свободно падения, с дальней – увеличивает его на одну и ту же величину. Поэтому, кажется, что в полдень прыгать в высоту проще.

2.4 С учетом центробежных сил в формулы (9) следует добавить еще одно слагаемое:

$$\begin{aligned} g_{(+)} &= g_0 + \frac{F_{GM(+)}}{m} - \frac{F_{(+)}^*}{m} \\ g_{(-)} &= g_0 - \frac{F_{GM(-)}}{m} + \frac{F_{(-)}^*}{m} \end{aligned} \quad (11)$$

Центробежные силы действуют в противоположном направлении (см. рисунок). Поэтому из найденной разности (10), надо вычесть сумму модулей центробежных сил, а уж подсчитать эту разность проблем не возникает (причем, безо всяких приближений):

$$\frac{F_{(+)}^* + F_{(-)}^*}{m} = \omega_M^2 (R_M + r_M) + \omega_S^2 (R_M - r_M) = 2\omega_M^2 r_M \quad (12)$$

Теперь внимание: эта сумма в точности равна найденной поправке (10), обусловленной притяжением Солнца! Так, что же влияние Солнца исключено полностью? Нет – мы же использовали только начальное приближение в выражении для силы солнечного притяжения, следовательно, надо использовать более точное приближение. То есть считать, Сумму модулей сил точнее:

$$\begin{aligned} F_{GS(+)} + F_{GS(-)} &= F_{GS} \left((1 - 2x + 3x^2 - 4x^3 + \dots) + (1 - 2(-x) + 3(-x)^2 - 4(-x)^3 + \dots) \right) = \\ &= \omega_M^2 R_M (2 + 6x^2) \end{aligned} \quad (13)$$


В итоге получаем относительную разность ускорений, обусловленную влиянием Солнца:

$$\varepsilon_{Mg} = \frac{g_{(+)} - g_{(-)}}{g_M} = 6 \frac{\omega_M^2 R_M}{g_M} \left(\frac{r_M}{R_M} \right)^2 = 6\varepsilon_0 x_0^2 = 3,2 \cdot 10^{-9} \quad (14)$$

Часть 3. Взгляд с Земли

3.1 Отношение силы притяжения к Луне к силе притяжения к Земле

$$\varepsilon_0 = \frac{F_{GM}}{mg_0} = \frac{GM_M}{R_M^2} \cdot \frac{R_0^2}{GM_0} = \frac{M_M}{M_0} \left(\frac{R_0}{R_M} \right)^2 \approx 5,6 \cdot 10^{-6} \quad (15)$$




3.2 Относительное изменение ускорения свободного падения (по аналогии с выводом формулы (10))

$$\varepsilon_{GM} = \frac{g_{(+)} - g_{(-)}}{g_0} \approx 2 \frac{F_{GM}}{mg_0} = 1,1 \cdot 10^{-5}. \quad (16)$$

3.3 Далее необходимо принять во внимание, что вращение происходит вокруг общего центра масс системы Земля – Луна. Используем заданное значение отношения масс $\eta = \frac{M_M}{M_0} = 1,23 \cdot 10^{-2}$ и условие, определяющее положение центра масс

$$M_0 r_C = M_M (R_M - r_C) \Rightarrow$$

$$r_C = R_M \frac{M_M}{M_0 + M_M} = R_M \frac{\eta}{1 + \eta} \approx \eta R_M. \quad (17)$$



Численное значение показывает, что он находится внутри Земли на расстоянии

$$r_C = R_M \frac{M_M}{M_0 + M_M} \approx 3,65 \cdot 10^6 \text{ м}$$

от ее центра (примерно на середине радиуса).

3.4 Земля вращается вокруг оси, проходящей через центр масс системы Земля – Луна, поэтому центробежные силы с разных сторон Земли различны, что необходимо учесть при расчетах. Далее записываем выражения для сил тяжести, действующих в рассматриваемых точках

$$\begin{aligned} mg_{(+)} &= mg_0 + F_{GM(+)} - F_{(+)}^* \\ mg_{(-)} &= mg_0 - F_{GM(-)} - F_{(-)}^* \end{aligned} \quad (18)$$

И находим их разность

$$mg_{(+)} - mg_{(-)} = (F_{GM(+)} + F_{GM(-)}) - (F_{(+)}^* - F_{(-)}^*) \quad (19)$$

Отметим, при отсутствии вращения Земли вокруг Луны Выражении в скобках было бы равно нулю и это привело бы к катастрофическим последствиям на Земле, например, к высочайшим приливам! Разность центробежных сил рассчитывается элементарно:

$$F_{(+)}^* - F_{(-)}^* = m\omega_M^2(R_0 + r_C) - m\omega_M^2(R_0 - r_C) = 2m\omega_M^2 r_C = 2m\eta\omega_M^2 R_M \quad (20)$$

Гравитационную силу $F_{GM0} = G\frac{M_M}{R_M^2}m$ также выразим через угловую скорость вращения Луны. Из уравнения 2 закона Ньютона для движения Луны по круговой орбите находим

$$G\frac{M_M M_0}{R_M^2} = M_M \omega_M^2 R_M \quad \Rightarrow \quad G\frac{M_M}{R_M^2} = \frac{M_M}{M_0} \omega_M^2 R_M = \eta \omega_M^2 R_M$$

Тогда выражение для гравитационной силы может быть записано в виде

$$F_{GM0} = G\frac{M_M}{R_M^2}m = m\eta\omega_M^2 R_M \quad (21)$$

Сумма гравитационных сил в нулевом приближении

$$F_{GM(+)} + F_{GM(-)} = 2F_{GM0} = 2m\eta\omega_M^2 R_M$$

в точности равна разности центробежных сил. Иными словами, центробежные силы «спасают» Землю! Следовательно, для расчета разности ускорений необходимо использовать более высокое приближение для гравитационных сил, т.е. формулу (5). Для рассматриваемых точек

$$\begin{aligned} x_{(+)} &= \frac{R_0 + r_C}{R_M} \\ x_{(-)} &= -\frac{R_0 - r_C}{R_M} \end{aligned} \quad (22)$$

Тогда сумма гравитационных сил представляется в виде

$$\begin{aligned} F_{GM(+)} + F_{GM(-)} &= F_0 (1 - 2x_{(+)} + 3x_{(+)}^2 - 4x_{(+)}^3 + \dots) + \\ &+ F_0 (1 - 2x_{(-)} + 3x_{(-)}^2 - 4x_{(-)}^3 + \dots) \end{aligned} \quad (23)$$

Нулевое приближение исчезает, благодаря центробежным силам. В первом приближении сумма

$$x_{(+)} + x_{(-)} = 2 \frac{r_C}{R_M} = 2\eta \quad (24)$$

отлична от нуля. Поэтому этого приближения достаточно! Получаем, что разность сил описывается формулой

$$F_{GM(+)} + F_{GM(-)} = 2F_0 - 4F_0\eta \quad (25)$$

или

$$\varepsilon_{GM} = \frac{g_{(+)} - g_{(-)}}{g_0} = -4 \frac{F_0\eta}{mg_0} = -4\varepsilon_0\eta \approx 2,7 \cdot 10^{-7}. \quad (26)$$