

-3. Вода из воздуха

Условие

Задача 10-3. Вода из воздуха

Для дачных участков, удалённых от источников воды, предлагается следующий генератор воды из воздуха. Насыпается пирамида из камней. Днём в тёплое время года щебёнка прогревается прямыми солнечными лучами и потоками тёплого воздуха. Ночью водяные пары, содержащиеся в атмосфере, конденсируются на остывшей щебёнке, и вода стекает в место сбора. Для насыпки пирамиды используют крупную щебёнку, так как тогда вся конструкция будет свободно продуваться тёплым воздухом.

В данной задаче вам необходимо рассмотреть некоторые серьезные физические проблемы, связанные с этим не хитрым устройством. Во всех пунктах задачи предполагается, что при изменении температуры плотность водяных паров не изменяется. Зависимость давления насыщенных паров от температуры приведена в таблице.

$t, ^\circ C$	$P, \text{Па}$	$t, ^\circ C$	$P, \text{Па}$	$t, ^\circ C$	$P, \text{Па}$	$t, ^\circ C$	$P, \text{Па}$
0,00	611						
1,00	657	11,00	1313	21,00	2488	31,00	4246
2,00	706	12,00	1403	22,00	2645	32,00	4495
3,00	758	13,00	1498	23,00	2810	33,00	4758
4,00	814	14,00	1599	24,00	2985	34,00	5034
5,00	873	15,00	1706	25,00	3169	35,00	5323
6,00	935	16,00	1819	26,00	3363	36,00	5627
7,00	1002	17,00	1938	27,00	3567	37,00	5945
8,00	1073	18,00	2064	28,00	3782	38,00	6280
9,00	1148	19,00	2198	29,00	4008	39,00	6630
10,00	1228	20,00	2339	30,00	4246	40,00	6997

На отдельном бланке приведен график этой зависимости. При необходимости вы можете использовать его для проведения дополнительных построений. Для решения задачи используйте следующие табличные данные: Плотность воды - $\rho_0 = 1,00 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$;

Удельная теплоемкость воды $c = 4,18 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$;

Удельная теплота испарения воды $L = 2250 \frac{\text{кДж}}{\text{кг}}$;

Зависимостью этих величин от температуры можно пренебречь. Атмосферное давление считать постоянным и равным $P_A = 1,00 \cdot 10^5 \text{ Па}$

Наконец-то, вопросы задачи.

Температуры воздуха вечером равнялась $t_0 = 25,5^\circ C$, относительная влажность $\varphi = 71,0\%$.

1. При какой температуре начнется образование тумана и росы. 2. Какой объем воздуха прошел через пирамиду, если в генераторе было получено 10 л воды. Температура выходящего из пирамиды воздуха равна $t_0 = 15,0^\circ C$

Для получения воды из воздуха используется охлажденный до температуры $t = 0,0^\circ C$ булыжник. Масса булыжника $m = 2,5 \text{ кг}$, удельная теплоемкость камня $c = 1,80 \frac{\text{кДж}}{\text{кг}}$.

3. Какое максимальное количество воды можно извлечь из воздуха с помощью этого охлажденного булыжника. При каких условиях может быть получено максимальное количество воды?

В сосуд объемом $V = 10,0 \text{ л}$ вливают 1,00 л воды при температуре $t = 40,0^\circ C$ и сосуд закрывают. Считайте, что в сосуде находился сухой воздух (без водяных паров). Теплоемкостью воздуха и сосуда, а также теплообменом с окружающей средой следует пренебречь.

4. Рассчитайте, какая температура установится в сосуде после установления в нем термоди-

налического равновесия.



Решение

Задача 10-3. Вода из воздуха

Температуры воздуха вечером равнялась $t_0 = 25,5^\circ\text{C}$, относительная влажность $\eta = 71,0\%$.

1. Для определения температуры точки росы t_1 необходимо решить уравнение

$$P_s(t_1) = \varphi P_s(t_0) \frac{T_1}{T_0} \quad (1)$$

Сначала найдем приближенно, полагая, что $\frac{T_1}{T_0} \approx 1$

Для определения $P_s(t_0)$ для дробного значения температуры воспользуемся линейной интерполяцией

$$P_s(25,5) = \frac{P_s(25) + P_s(26)}{2} = 3266 \text{ Па.}$$

Рассчитываем парциальное давление водяных паров

$$P(t_0) = \varphi P_s(t_0) = 2319 \text{ Па.}$$

По таблице находим, что давление насыщенных паров при температуре, лежащей в диапазоне от 19° до 20° . В этом диапазоне зависимость давления насыщенных паром приблизим линейной функцией

$$P_s(t_1) = P_s(19) + (P_s(20) - P_s(19))(t_1 - 19) = 2198 + 141(t_1 - 19)$$

И запишем уравнение (1) в числах

$$2198 + 141(t_1 - 19) = 2319 \frac{t_1 + 273,15}{25,5 + 273,15} = 7,82(t_1 - 19) + 2284 \Rightarrow$$

$$(t_1 - 19) = \frac{2284 - 2198}{141 - 7,82} \approx 0,6$$

Следовательно, температура точки росы равна $t_1 = 19,6^\circ$.

2. Какой объем воздуха прошел через пирамиду, если в генераторе было получено 10 л воды. Конденсация началась при температуре $t_1 = 19,6^\circ$, а закончилась при температуре $t_2 = 15,0^\circ$ (в этом диапазоне температур пар оставался насыщенным). Плотность пара можно посчитать по формуле $\rho = \frac{P_s M}{RT}$. Следовательно, изменение плотности водяных паров равно

$$\Delta\rho = \frac{P_s(t_1)M}{RT_1} - \frac{P_s(t_2)M}{RT_2} = \frac{18 \cdot 10^{-3}}{8,31} \left(\frac{2283}{293} - \frac{1706}{288} \right) = 4,05 \cdot 10^{-3} \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}.$$

Фактически эта величина показывает, какая масса воды выделилась из одного кубометра воздуха. Так как всего выделилось $m = 10$ кг воды, то через пирамиду прошел объем равный

$$V = \frac{m}{\Delta\rho} = 2,5 \cdot 10^3 \text{ м}^3.$$

3. Максимальное количество сконденсируется, если вся теплота, выделяющаяся при конденсации, пойдет на нагревание камня от его начальной температуры до температуры точки росы:

$$Lm_{\text{воды}} = cm(t_1 - t_0) \Rightarrow m_{\text{воды}} = \frac{cm(t_1 - t_0)}{L} = \frac{1,8 \cdot 10^3 \cdot 2,5 \cdot 19,6}{2250 \cdot 10^3} \approx 40 \text{ г}$$

В сосуд объемом $V = 10,0$ л вливают $1,00$ л воды при температуре $t = 40,0^\circ\text{C}$ и сосуд закрывают. Считайте, что в сосуде находился сухой воздух (без водяных паров).

Теплоемкостью воздуха и сосуда, а также теплообменом с окружающей средой следует пренебречь.

4. Проведем оценочный расчет. Будем считать, что насыщенный пар будет иметь температуру 40°C , его давление при этой температуре $P_s = 6997$ Па. Масса водяных паров (равная массе испарившейся воды)

$$m = \frac{P_s V M}{RT} = \frac{6997 \cdot 18 \cdot 10^{-3} \cdot 9 \cdot 10^{-3}}{8,31 \cdot 313} \approx 4,4 \cdot 10^{-4} \text{ кг}.$$

На испарение этого количества воды пошло $Q = Lm = 980$ Дж теплоты. Эта теплоты выделилась при остывании воды, поэтому ее температура понизилась на $\Delta t = \frac{Q}{cm} \approx 0,2^\circ\text{C}$.

При расчете мы предположили, что температура насыщенного пара равна 40°C , полученной отличие не значительно, поэтому наш расчет можно признать удовлетворительным. Итого, температура воды понизилась на $0,2^\circ$ и стала равной $38,8^\circ\text{C}$