

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Физический факультет

ТермоДинамика и Статистическая Физика

Семинары выжившего

Автор: БВО

Семинарист: Глинский В. В.


Новосибирск, 2026

Оглавление

Семестр 1. Последний рубеж	2
Практическое занятие №1. Квантовые распределения и вырожденный ферми-газ	3
Статистические распределения	3
Условие применимости распределения Больцмана	4
Распределения Ферми и Бозе	5
Задача 1. Вырожденный электронный газ	8
Задача 2. Электроны проводимости в меди	14
Практическое занятие №2. Вырожденный ферми-газ и холодные звёзды	19
Задача 1. Оценка размера многоэлектронного атома	19
Задача 2. Равновесный радиус белого карлика	22
Задача 3. Ультрарелятивистский вырожденный газ	25
Основные результаты	30

Семестр 1

Последний рубеж



Практическое занятие №1

04.09.2026

Квантовые распределения и вырожденный ферми-газ

Статистические распределения

Будем использовать принятую в статистической физике систему единиц, в которой постоянная Больцмана положена равной единице:

$$k_B = 1.$$

Поэтому температура T имеет размерность энергии. Постоянную Планка при этом сохраняем явно.

Микроканоническое распределение

Рассмотрим изолированную систему с фиксированной энергией E_0 . Вероятность обнаружить систему в элементе фазового объёма $d\Gamma$ можно записать в виде

$$dw \sim \delta(E - E_0) d\Gamma.$$

Дельта-функция показывает, что ненулевой статистический вес имеют только состояния, удовлетворяющие условию

$$E = E_0.$$

Каноническое распределение

Если система находится в тепловом контакте с термостатом температуры T , используется каноническое распределение:

$$w_k = \frac{1}{Z} e^{-E_k/T},$$

где E_k — энергия k -го состояния, а

$$Z = \sum_k e^{-E_k/T}$$

— статистическая сумма.



Большое каноническое распределение

Если система может обмениваться с окружающей средой не только энергией, но и частицами, используется большое каноническое распределение:

$$w_{N,k} = \frac{1}{Z} \exp \left(\frac{\mu N - E_k}{T} \right).$$

Здесь

μ

— химический потенциал, а N — число частиц в системе.

Условие применимости распределения Больцмана

Для классического, или больцмановского, газа число частиц должно быть значительно меньше числа доступных одночастичных квантовых состояний.

Пусть характерный разброс импульсов частиц равен Δp . Число квантовых состояний в фазовом объёме порядка $V(\Delta p)^3$ оценивается как

$$N_{\text{сост}} \sim \frac{V(\Delta p)^3}{(2\pi\hbar)^3}.$$

Поэтому условие невырожденности газа имеет вид

$$\frac{V(\Delta p)^3}{(2\pi\hbar)^3} \gg N.$$

Для теплового движения характерный импульс можно оценить как

$$\Delta p \sim mv_T.$$

При этом

$$v_T \sim \sqrt{\frac{T}{m}},$$

поэтому

$$\Delta p \sim \sqrt{mT}.$$

Подставляя эту оценку в условие невырожденности, получаем

$$\frac{V(mT)^{3/2}}{(2\pi\hbar)^3} \gg N.$$

Или

$$\frac{Vm^{3/2}T^{3/2}}{(2\pi\hbar)^3} \gg N.$$

Отсюда

$$T^{3/2} \gg \frac{(2\pi\hbar)^3 N}{m^{3/2}V}.$$

Возводя обе части в степень $2/3$, получаем

$$T \gg \frac{(2\pi\hbar)^2}{mV^{2/3}} N^{2/3}.$$

Если ввести концентрацию частиц

$$n = \frac{N}{V},$$

то

$$T \gg \frac{(2\pi\hbar)^2}{m} n^{2/3}.$$

Таким образом, по порядку величины условие применимости Больцмановской статистики можно записать как

$$T \gg T_F,$$

где T_F — температура вырождения газа.

Для Больцмановского газа среднее число частиц в состоянии k имеет экспоненциальную зависимость от энергии:

$$\bar{n}_k = N w_k \sim e^{-\varepsilon_k/T}.$$

Распределения Ферми и Бозе

Для идеального квантового газа среднее число частиц в одночастичном квантовом состоянии k определяется выражением

$$n_k = (e^{(\varepsilon_k - \mu)/T} \pm 1)^{-1}.$$

Для фермионов выбирается знак “плюс”:

$$n_k^F = \frac{1}{e^{(\varepsilon_k - \mu)/T} + 1}.$$

Для бозонов выбирается знак “минус”:

$$n_k^B = \frac{1}{e^{(\varepsilon_k - \mu)/T} - 1}.$$

Для фермионов наличие знака “плюс” связано с принципом Паули: одно одночастичное квантовое состояние не может быть занято более чем одним фермионом.

Предел $T \rightarrow 0$ для ферми-газа

Поскольку

$$C_V = \left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_V > 0,$$

при уменьшении температуры энергия системы также уменьшается:

$$T \downarrow \implies E \downarrow.$$

При абсолютном нуле система находится в основном состоянии:

$$T = 0 \implies E = E_{\min}.$$

Для невырожденного основного состояния статистический вес равен

$$\Gamma = 1,$$

поэтому

$$S = \ln \Gamma = 0.$$

Рассмотрим теперь распределение Ферми–Дирака:

$$n_k = \frac{1}{e^{(\varepsilon_k - \mu)/T} + 1}.$$

Если

$$\varepsilon_k < \mu,$$

то при $T \rightarrow 0$

$$\frac{\varepsilon_k - \mu}{T} \rightarrow -\infty.$$

Следовательно,

$$e^{(\varepsilon_k - \mu)/T} \rightarrow 0$$

и

$$n_k \rightarrow 1.$$

Если же

$$\varepsilon_k > \mu,$$

то

$$\frac{\varepsilon_k - \mu}{T} \rightarrow +\infty,$$

следовательно,

$$e^{(\varepsilon_k - \mu)/T} \rightarrow \infty$$

и

$$n_k \rightarrow 0.$$

Таким образом, при $T = 0$


$$n_k = \begin{cases} 1, & \varepsilon_k < \mu, \\ 0, & \varepsilon_k > \mu. \end{cases}$$

Граничная энергия между заполненными и свободными состояниями называется энергией Ферми:

$$\mu(T = 0) = \varepsilon_F.$$

Поэтому

$$n_k = \begin{cases} 1, & \varepsilon_k < \varepsilon_F, \\ 0, & \varepsilon_k > \varepsilon_F. \end{cases}$$



Распределение Ферми–Дирака при $T = 0$: все состояния до энергии Ферми заполнены, а состояния выше ε_F свободны.

Задача 1. Вырожденный электронный газ

Условие:

В объёме V находятся N электронов. Найдём среднюю энергию и давление электронного газа в пределе

$$T \rightarrow 0.$$

Электрон имеет две возможные проекции спина, поэтому спиновая кратность равна

$$g = 2.$$

Для свободного нерелятивистского электрона закон дисперсии имеет вид

$$\varepsilon = \frac{p^2}{2m}.$$

При $T = 0$ распределение по состояниям представляет собой ступеньку:

$$n(\varepsilon) = \begin{cases} 1, & \varepsilon < \varepsilon_F, \\ 0, & \varepsilon > \varepsilon_F. \end{cases}$$

Число частиц и энергия Ферми

Число электронов записывается как интеграл по фазовому пространству:

$$N = 2 \int \frac{d^3p d^3r}{(2\pi\hbar)^3} n(\varepsilon).$$

Поскольку газ однородный,

$$\int d^3r = V,$$

и поэтому

$$N = 2V \int \frac{d^3p}{(2\pi\hbar)^3} n(\varepsilon).$$

Перейдём от импульса к энергии. Из

$$\varepsilon = \frac{p^2}{2m}$$

следует

$$p = \sqrt{2m\varepsilon}.$$

В сферических координатах в импульсном пространстве

$$d^3p = 4\pi p^2 dp.$$

Дифференцируя

$$p = \sqrt{2m\varepsilon},$$

получаем

$$dp = \frac{m}{p} d\varepsilon.$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} p^2 dp &= mp d\varepsilon \\ &= m\sqrt{2m\varepsilon} d\varepsilon \\ &= \frac{(2m)^{3/2}}{2} \sqrt{\varepsilon} d\varepsilon. \end{aligned}$$

Поэтому

$$\begin{aligned} d^3p &= 4\pi p^2 dp \\ &= 2\pi(2m)^{3/2} \sqrt{\varepsilon} d\varepsilon. \end{aligned}$$

Таким образом,

$$\frac{d^3p}{(2\pi\hbar)^3} = \frac{(2m)^{3/2}}{(2\pi\hbar)^3} 2\pi \sqrt{\varepsilon} d\varepsilon.$$

При $T = 0$ состояния заполнены только до энергии Ферми, поэтому

$$N = 2V \int_0^{\varepsilon_F} \frac{(2m)^{3/2}}{(2\pi\hbar)^3} 2\pi \sqrt{\varepsilon} d\varepsilon.$$

Вынося постоянные множители,

$$N = 4\pi V \frac{(2m)^{3/2}}{(2\pi\hbar)^3} \int_0^{\varepsilon_F} \varepsilon^{1/2} d\varepsilon.$$

Интеграл равен

$$\int_0^{\varepsilon_F} \varepsilon^{1/2} d\varepsilon = \frac{2}{3} \varepsilon_F^{3/2}.$$

Следовательно,

$$N = 4\pi V \frac{(2m)^{3/2}}{(2\pi\hbar)^3} \frac{2}{3} \varepsilon_F^{3/2}.$$

Отсюда

$$\varepsilon_F^{3/2} = \frac{3N}{8\pi V} \frac{(2\pi\hbar)^3}{(2m)^{3/2}}.$$

Возводя обе части в степень $2/3$, получаем

$$\varepsilon_F = \left(\frac{3N}{8\pi V} \right)^{2/3} \frac{(2\pi\hbar)^2}{2m}.$$

После упрощения численного коэффициента:

$$\boxed{\varepsilon_F = \frac{\hbar^2}{2m} \left(3\pi^2 \frac{N}{V} \right)^{2/3}}.$$

Вводя концентрацию

$$n = \frac{N}{V},$$

получаем

$$\boxed{\varepsilon_F = \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 n)^{2/3}}.$$

Импульс Ферми

По определению

$$\varepsilon_F = \frac{p_F^2}{2m}.$$

Следовательно,

$$p_F = \sqrt{2m\varepsilon_F}.$$

Подставляя найденную энергию Ферми,

$$\begin{aligned} p_F &= \sqrt{2m \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 n)^{2/3}} \\ &= \hbar (3\pi^2 n)^{1/3}. \end{aligned}$$

Таким образом,

$$p_F = \hbar (3\pi^2 n)^{1/3}.$$

Или через N и V :

$$p_F = (3\pi^2)^{1/3} \hbar \left(\frac{N}{V} \right)^{1/3}.$$

По порядку величины

$$p_F \sim \hbar n^{1/3}.$$

Средняя энергия электронов

Полная энергия электронного газа равна

$$E = 2 \int \frac{d^3p d^3r}{(2\pi\hbar)^3} \varepsilon n(\varepsilon).$$

Для однородного газа

$$E = 2V \int \frac{d^3p}{(2\pi\hbar)^3} \varepsilon n(\varepsilon).$$

При $T = 0$

$$E = 2V \int_0^{\varepsilon_F} \frac{(2m)^{3/2}}{(2\pi\hbar)^3} 2\pi \varepsilon^{3/2} d\varepsilon.$$

Следовательно,

$$E = 4\pi V \frac{(2m)^{3/2}}{(2\pi\hbar)^3} \int_0^{\varepsilon_F} \varepsilon^{3/2} d\varepsilon.$$

Интегрируя,

$$\int_0^{\varepsilon_F} \varepsilon^{3/2} d\varepsilon = \frac{2}{5} \varepsilon_F^{5/2},$$

получаем

$$E = 4\pi V \frac{(2m)^{3/2}}{(2\pi\hbar)^3} \frac{2}{5} \varepsilon_F^{5/2}.$$

Для числа частиц ранее было найдено

$$N = 4\pi V \frac{(2m)^{3/2}}{(2\pi\hbar)^3} \frac{2}{3} \varepsilon_F^{3/2}.$$

Поэтому

$$\begin{aligned} \frac{E}{N} &= \frac{\frac{2}{5} \varepsilon_F^{5/2}}{\frac{2}{3} \varepsilon_F^{3/2}} \\ &= \frac{3}{5} \varepsilon_F. \end{aligned}$$

Таким образом, средняя энергия одного электрона равна

$$\bar{\varepsilon} = \frac{E}{N} = \frac{3}{5} \varepsilon_F.$$

Полная энергия газа:

$$E = \frac{3}{5} N \varepsilon_F.$$

Подставляя выражение для энергии Ферми,

$$E = \frac{3}{5} N \frac{\hbar^2}{2m} \left(3\pi^2 \frac{N}{V} \right)^{2/3}.$$

Раскрывая степени,

$$E = \frac{\hbar^2}{2m} \frac{3^{5/3} \pi^{4/3}}{5} \frac{N^{5/3}}{V^{2/3}}.$$

Таким образом,

$$E \propto V^{-2/3}$$

при фиксированном числе частиц N .

Давление вырожденного электронного газа

Для классического идеального газа

$$pV = NT.$$

Если формально положить $T = 0$, эта формула дала бы

$$p = 0.$$

Однако для ферми-газа это неверно. Даже при абсолютном нуле электроны не могут находиться в одном и том же одночастичном состоянии из-за принципа Паули. Поэтому они заполняют состояния с ненулевыми импульсами вплоть до p_F , что приводит к **давлению вырождения**.

Используем термодинамическое соотношение

$$dE = T dS - p dV + \mu dN.$$

Отсюда

$$p = - \left(\frac{\partial E}{\partial V} \right)_{S,N}.$$

При $T = 0$

$$S = 0.$$

Поскольку

$$E = C N^{5/3} V^{-2/3},$$

где C не зависит от V , имеем

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial E}{\partial V} \right)_{S,N} &= -\frac{2}{3} C N^{5/3} V^{-5/3} \\ &= -\frac{2}{3} \frac{E}{V}. \end{aligned}$$

Поэтому

$$p = \frac{2}{3} \frac{E}{V}.$$

Так как

$$E = \frac{3}{5} N \varepsilon_F,$$

то

$$\begin{aligned} p &= \frac{2}{3} \frac{1}{V} \frac{3}{5} N \varepsilon_F \\ &= \frac{2}{5} \frac{N}{V} \varepsilon_F. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$p = \frac{2}{5} n \varepsilon_F.$$

Подставляя энергию Ферми,

$$\begin{aligned} p &= \frac{2}{5} n \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 n)^{2/3} \\ &= \frac{\hbar^2}{5m} (3\pi^2)^{2/3} n^{5/3}. \end{aligned}$$

Итак,

$$p = \frac{\hbar^2}{5m} (3\pi^2)^{2/3} n^{5/3}.$$

Ответ

Для полностью вырожденного электронного газа

$$\varepsilon_F = \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 n)^{2/3},$$

$$\bar{\varepsilon} = \frac{3}{5} \varepsilon_F,$$

$$p = \frac{2}{5} n \varepsilon_F = \frac{2}{3} \frac{E}{V}.$$

Задача 2. Электроны проводимости в меди

Условие:

Найти химический потенциал, среднюю энергию и давление электронов проводимости в меди, если

$$A \simeq 64 \frac{\text{г}}{\text{моль}},$$
$$\rho \simeq 9 \frac{\text{г}}{\text{см}^3},$$

и каждый атом меди предоставляет один электрон проводимости.

В рамках рассматриваемого приближения считаем электронный газ полностью вырожденным:

$$T \rightarrow 0.$$

Поэтому

$$\mu = \varepsilon_F.$$

Концентрация электронов проводимости

В одном моле меди находится число Авогадро атомов:

$$N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ моль}^{-1}.$$

Число молей меди в единице объёма равно

$$\frac{\rho}{A}.$$

Поскольку каждый атом предоставляет один электрон проводимости, концентрация электронов равна

$$n = N_A \frac{\rho}{A}.$$

Подставляя численные значения,

$$\begin{aligned} n &= 6.022 \times 10^{23} \frac{9}{64} \text{ см}^{-3} \\ &= 6.022 \times 10^{23} \cdot 0.140625 \text{ см}^{-3} \\ &\simeq 8.47 \times 10^{22} \text{ см}^{-3}. \end{aligned}$$

Так как

$$1 \text{ см}^3 = 10^{-6} \text{ м}^3,$$

получаем

$$n \simeq 8.47 \times 10^{28} \text{ м}^{-3}.$$

Импульс Ферми

Используем выражение

$$p_F = \hbar(3\pi^2 n)^{1/3}.$$

Сначала найдём

$$\begin{aligned} 3\pi^2 n &\simeq 29.61 \cdot 8.47 \times 10^{28} \\ &\simeq 2.51 \times 10^{30} \text{ м}^{-3}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$(3\pi^2 n)^{1/3} \simeq 1.36 \times 10^{10} \text{ м}^{-1}.$$

Таким образом, ферми-волновое число равно

$$k_F = (3\pi^2 n)^{1/3} \simeq 1.36 \times 10^{10} \text{ м}^{-1}.$$

Используя

$$\hbar = 1.055 \times 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с},$$

получаем

$$\begin{aligned} p_F &= \hbar k_F \\ &\simeq 1.055 \times 10^{-34} \cdot 1.36 \times 10^{10} \\ &\simeq 1.43 \times 10^{-24} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$p_F \simeq 1.43 \times 10^{-24} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}.$$

Химический потенциал

При $T = 0$

$$\mu = \varepsilon_F.$$

Энергия Ферми равна

$$\varepsilon_F = \frac{p_F^2}{2m_e}.$$

Используем массу электрона

$$m_e = 9.109 \times 10^{-31} \text{ кг}.$$

Тогда

$$\begin{aligned} \varepsilon_F &= \frac{(1.43 \times 10^{-24})^2}{2 \cdot 9.109 \times 10^{-31}} \\ &\simeq \frac{2.05 \times 10^{-48}}{1.822 \times 10^{-30}} \\ &\simeq 1.13 \times 10^{-18} \text{ Дж}. \end{aligned}$$

Для перевода в электронвольты используем

$$1 \text{ эВ} = 1.602 \times 10^{-19} \text{ Дж.}$$

Поэтому

$$\begin{aligned}\varepsilon_F &= \frac{1.13 \times 10^{-18}}{1.602 \times 10^{-19}} \text{ эВ} \\ &\simeq 7.03 \text{ эВ.}\end{aligned}$$

Следовательно,

$$\boxed{\mu(T = 0) = \varepsilon_F \simeq 7.0 \text{ эВ.}}$$

Средняя энергия электронов

Для полностью вырожденного газа

$$\bar{\varepsilon} = \frac{3}{5} \varepsilon_F.$$

Поэтому

$$\begin{aligned}\bar{\varepsilon} &= \frac{3}{5} \cdot 7.03 \text{ эВ} \\ &\simeq 4.22 \text{ эВ.}\end{aligned}$$

Следовательно,

$$\boxed{\bar{\varepsilon} \simeq 4.22 \text{ эВ.}}$$

В джоулях

$$\begin{aligned}\bar{\varepsilon} &= \frac{3}{5} \cdot 1.13 \times 10^{-18} \\ &\simeq 6.76 \times 10^{-19} \text{ Дж.}\end{aligned}$$

То есть

$$\boxed{\bar{\varepsilon} \simeq 6.76 \times 10^{-19} \text{ Дж.}}$$

Средняя энергия меньше энергии Ферми, поскольку ε_F является энергией верхнего заполненного состояния, тогда как электроны занимают все состояния от 0 до ε_F .

Давление электронного газа

Используем найденное в первой задаче соотношение

$$p = \frac{2}{5} n \varepsilon_F.$$

Подставляя

$$n = 8.47 \times 10^{28} \text{ м}^{-3}$$

и

$$\varepsilon_F = 1.13 \times 10^{-18} \text{ Дж},$$

получаем

$$\begin{aligned} p &= \frac{2}{5} \cdot 8.47 \times 10^{28} \cdot 1.13 \times 10^{-18} \\ &\simeq \frac{2}{5} \cdot 9.54 \times 10^{10} \\ &\simeq 3.82 \times 10^{10} \text{ Па}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$p \simeq 3.82 \times 10^{10} \text{ Па}.$$

Это соответствует давлению порядка

$$p \sim 3.8 \times 10^5 \text{ атм.}$$

Таким образом, даже при $T \rightarrow 0$ давление электронного газа не обращается в нуль.

Температура Ферми

Для оценки степени вырождения электронов меди найдём температуру Ферми:

$$T_F = \frac{\varepsilon_F}{k_B}.$$

Используя

$$k_B = 1.381 \times 10^{-23} \frac{\text{Дж}}{\text{К}},$$

получаем

$$\begin{aligned} T_F &= \frac{1.13 \times 10^{-18}}{1.381 \times 10^{-23}} \\ &\simeq 8.2 \times 10^4 \text{ К}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$T_F \simeq 8.2 \times 10^4 \text{ К}.$$

Даже при комнатной температуре $T \simeq 300 \text{ К}$

$$\frac{T}{T_F} \simeq \frac{300}{8.2 \times 10^4} \sim 4 \times 10^{-3} \ll 1.$$

Поэтому электроны проводимости меди при обычных температурах представляют собой сильно вырожденный ферми-газ.

Ответ

Для меди в модели свободных электронов получаем

$$n \simeq 8.47 \times 10^{28} \text{ м}^{-3},$$

Практическое занятие №2

11.09.2026

Вырожденный ферми-газ и холодные звёзды

Задача 1. Оценка размера многоэлектронного атома

Условие:

В атомах с большим числом Z электронов большая часть из них движется вблизи ядра в объёме с характерным размером R . В модели Томаса–Ферми эти электроны рассматриваются как вырожденный газ, температура которого равна нулю. Пренебрегая кулоновским взаимодействием электронов друг с другом, оценить величину R .



Решение

При $T = 0$ электронный газ является полностью вырожденным. Полную энергию атома оценим как сумму кинетической энергии электронов и их потенциальной энергии в поле ядра:

$$E = E_{\text{кин}} + E_{\text{пот}}.$$

Кинетическая энергия электронов

Для нерелятивистского вырожденного электронного газа

$$\varepsilon_F = \frac{p_F^2}{2m_e}.$$

По порядку величины импульс Ферми равен

$$p_F \sim \hbar n^{1/3}.$$

В атоме имеется Z электронов, заключённых в области объёма порядка

$$V \sim R^3.$$

Поэтому концентрация электронов имеет порядок

$$n \sim \frac{Z}{R^3}.$$

Следовательно,

$$p_F \sim \hbar \left(\frac{Z}{R^3} \right)^{1/3} = \frac{\hbar Z^{1/3}}{R}.$$

Энергия Ферми тогда равна по порядку величины

$$\varepsilon_F \sim \frac{\hbar^2 Z^{2/3}}{2m_e R^2}.$$

Поскольку электронов всего Z , полная кинетическая энергия имеет порядок

$$E_{\text{кин}} \sim Z \varepsilon_F \sim \frac{\hbar^2 Z^{5/3}}{2m_e R^2}.$$

Потенциальная энергия

Потенциальная энергия одного электрона в поле ядра с зарядом $+Ze$ при характерном расстоянии R имеет порядок

$$U \sim -\frac{Ze^2}{R}.$$

Для всех Z электронов

$$E_{\text{пот}} \sim -\frac{Z^2 e^2}{R}.$$

Здесь, как и в рукописном решении, используется гауссова система единиц, поэтому множитель $1/(4\pi\varepsilon_0)$ явно не пишется.

Таким образом,

$$E(R) \sim \frac{\hbar^2 Z^{5/3}}{2m_e R^2} - \frac{Z^2 e^2}{R}.$$

Равновесный размер атома

Равновесному размеру соответствует минимум полной энергии:

$$\frac{dE}{dR} = 0.$$

Дифференцируя,

$$-\frac{\hbar^2 Z^{5/3}}{m_e R^3} + \frac{Z^2 e^2}{R^2} = 0.$$

Умножая на R^3 , получаем

$$-\frac{\hbar^2 Z^{5/3}}{m_e} + Z^2 e^2 R = 0.$$

Следовательно,

$$Z^2 e^2 R = \frac{\hbar^2 Z^{5/3}}{m_e},$$

откуда

$$R \sim \frac{\hbar^2}{m_e e^2} Z^{-1/3}.$$

Введём боровский радиус

$$a_0 = \frac{\hbar^2}{m_e e^2}.$$

Тогда окончательно

$$R \sim \frac{a_0}{Z^{1/3}}.$$

Таким образом, при увеличении заряда ядра характерный размер внутренней электронной области уменьшается как

$$R \propto Z^{-1/3}.$$

Задача 2. Равновесный радиус белого карлика


Условие:

Когда в обычной звезде выгорает заметная часть водорода, термоядерная реакция прекращается и звезда, излучая, будет остывать и сжиматься. При сжатии гравитационная энергия уменьшается, однако энергия вырожденного электронного газа возрастает.

В результате холодная звезда, называемая белым карликом, достигает некоторого равновесного радиуса. Оценить радиус белого карлика из условия минимума полной энергии.

Использовать

$$M_{\star} = 2 \times 10^{33} \text{ г}, \quad G = 6.6 \times 10^{-8} \frac{\text{дин} \cdot \text{см}^2}{\text{г}^2}.$$



Полная энергия звезды

Будем считать звезду холодной, поэтому электронный газ практически полностью вырожден.

Полная энергия имеет вид

$$E = E_{\text{грав}} + E_{\text{кин},e} + E_{\text{кин},\nu}$$

где $E_{\text{кин},e}$ — кинетическая энергия электронов, а $E_{\text{кин},\nu}$ — кинетическая энергия ядер.

Гравитационная энергия

По порядку величины гравитационная энергия звезды массы M и радиуса R равна

$$E_{\text{грав}} \sim -\frac{GM^2}{R}.$$

Численный коэффициент порядка единицы здесь несущественен, поскольку требуется оценка.

Число электронов

Основная часть массы звезды заключена в ядрах. По порядку величины число электронов можно оценить как

$$N_e \sim \frac{M}{m_p}.$$

Более точный коэффициент зависит от химического состава белого карлика, но для оценки он несущественен.

Электроны и ядра

Для нерелятивистского вырожденного газа энергия Ферми имеет вид

$$\varepsilon_F = \frac{p_F^2}{2m}.$$

При сравнимых концентрациях характерные импульсы Ферми электронов и ядер имеют один порядок, но

$$m_e \ll m_{\text{я}}.$$

Следовательно,

$$\varepsilon_{F,e} \gg \varepsilon_{F,\text{я}},$$

и поэтому

$$E_{\text{кин},e} \gg E_{\text{кин},\text{я}}.$$

В дальнейшем вкладом ядер в кинетическую энергию пренебрегаем.

Кинетическая энергия вырожденных электронов

Энергия Ферми электронов

$$\varepsilon_{F,e} \sim \frac{\hbar^2 n_e^{2/3}}{2m_e}.$$

Полная кинетическая энергия имеет порядок

$$E_{\text{кин},e} \sim N_e \varepsilon_{F,e}.$$

Следовательно,

$$E_{\text{кин},e} \sim \frac{\hbar^2 n_e^{2/3}}{2m_e} N_e.$$

Концентрация электронов равна по порядку величины

$$n_e \sim \frac{N_e}{R^3} \sim \frac{M}{m_p R^3}.$$

Поэтому

$$n_e^{2/3} \sim \frac{1}{R^2} \left(\frac{M}{m_p} \right)^{2/3}.$$

Используя

$$N_e \sim \frac{M}{m_p},$$

получаем

$$E_{\text{кин},e} \sim \frac{\hbar^2}{2m_e R^2} \left(\frac{M}{m_p} \right)^{5/3}.$$

Таким образом, полная энергия белого карлика оценивается как

$$E(R) \sim -\frac{GM^2}{R} + \frac{\hbar^2}{2m_e R^2} \left(\frac{M}{m_p} \right)^{5/3}.$$

Равновесный радиус

Равновесие соответствует минимуму полной энергии:

$$\frac{dE}{dR} = 0.$$

Дифференцируя,

$$\frac{GM^2}{R^2} - \frac{\hbar^2}{m_e R^3} \left(\frac{M}{m_p} \right)^{5/3} = 0.$$

Умножаем на R^3 :

$$GM^2 R = \frac{\hbar^2}{m_e} \left(\frac{M}{m_p} \right)^{5/3}.$$

Отсюда

$$R \sim \frac{\hbar^2}{Gm_e} \frac{(M/m_p)^{5/3}}{M^2}.$$

Поскольку

$$\frac{M^{5/3}}{M^2} = M^{-1/3},$$

получаем

$$R \sim \frac{\hbar^2}{Gm_e m_p^{5/3}} M^{-1/3}.$$

Таким образом,

$$R \propto M^{-1/3}.$$

Чем больше масса белого карлика, тем меньше его равновесный радиус.

Численная оценка

Используем

$$\begin{aligned} \hbar &\simeq 1.05 \times 10^{-27} \text{ эрг} \cdot \text{с}, \\ m_e &\simeq 9.1 \times 10^{-28} \text{ г}, \quad m_p \simeq 1.67 \times 10^{-24} \text{ г}, \\ M &\simeq 2 \times 10^{33} \text{ г}. \end{aligned}$$

Тогда по порядку величины

$$R \sim 6 \times 10^8 \text{ см}.$$

Или

$$R \sim 6 \times 10^3 \text{ км}.$$

Полученный размер имеет порядок радиуса Земли, что характерно для белых карликов.

Задача 3. Ультрарелятивистский вырожденный газ

Условие:

Если звезда на начальной стадии имела массу, заметно большую массы Солнца, или масса белого карлика может увеличиваться за счёт захвата окружающего вещества, то газ электронов может стать ультрарелятивистским.

Оценить предельное значение массы белого карлика.

Найти давление ультрарелятивистского газа.

Найти соотношение между концентрациями электронов и нейтронов, считая их ультрарелятивистскими.

Релятивистская энергия частицы

Для свободной релятивистской частицы

$$\varepsilon^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4.$$

Или

$$\frac{\varepsilon^2}{c^2} = p^2 + m^2 c^2.$$

Лагранжиан свободной частицы имеет вид

$$L = -mc^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}.$$

Соответствующее действие можно записать в инвариантной форме:

$$S = -mc \int ds,$$

где

$$ds^2 = c^2 dt^2 - d\mathbf{r}^2.$$

Импульс частицы

$$\mathbf{p} = \frac{\partial L}{\partial \mathbf{v}} = \frac{m\mathbf{v}}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \quad \beta = \frac{v}{c}.$$

Энергия определяется преобразованием Лежандра:

$$\varepsilon = \mathbf{v}\mathbf{p} - L.$$

Подставляя $\mathbf{p}$ и L , получаем

$$\begin{aligned} \varepsilon &= \frac{mv^2}{\sqrt{1 - \beta^2}} + mc^2 \sqrt{1 - \beta^2} \\ &= \frac{mv^2 + mc^2(1 - \beta^2)}{\sqrt{1 - \beta^2}} = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - \beta^2}}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\boxed{\varepsilon = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - \beta^2}}}.$$

Импульс Ферми

При $T = 0$ электроны заполняют все состояния с импульсами

$$0 \leq p \leq p_F.$$

С учётом двух проекций спина

$$N_e = 2V \int_0^{p_F} \frac{d^3p}{(2\pi\hbar)^3}.$$

В сферических координатах

$$d^3p = 4\pi p^2 dp.$$

Поэтому

$$N_e = \frac{8\pi V}{(2\pi\hbar)^3} \int_0^{p_F} p^2 dp.$$

Так как

$$\int_0^{p_F} p^2 dp = \frac{p_F^3}{3},$$

получаем

$$N_e = \frac{V p_F^3}{3\pi^2 \hbar^3}.$$

Следовательно,

$$n_e = \frac{N_e}{V} = \frac{p_F^3}{3\pi^2 \hbar^3},$$

откуда

$$\boxed{p_F = \hbar (3\pi^2 n_e)^{1/3}}.$$

Для оценок будем использовать более простую запись

$$p_F \sim \hbar n_e^{1/3}.$$

Ультрарелятивистский предел

Если

$$p_F \gg m_e c,$$

то массой электрона в законе дисперсии можно пренебречь:

$$\varepsilon \simeq pc.$$

В частности,

$$\varepsilon_F \simeq p_F c.$$

Полная кинетическая энергия электронов по порядку величины равна

$$E_{\text{кин}} \sim N_e \varepsilon_F \sim N_e p_F c.$$

Так как

$$p_F \sim \hbar \left(\frac{N_e}{R^3} \right)^{1/3} = \frac{\hbar N_e^{1/3}}{R},$$

то

$$E_{\text{кин}} \sim \frac{\hbar c N_e^{4/3}}{R}.$$

Для белого карлика

$$N_e \sim \frac{M}{m_p},$$

поэтому

$$E_{\text{кин}} \sim \frac{\hbar c}{R} \left(\frac{M}{m_p} \right)^{4/3}.$$

Предельная масса белого карлика

Полная энергия звезды теперь имеет вид

$$E(R) \sim -\frac{GM^2}{R} + \frac{\hbar c}{R} \left(\frac{M}{m_p} \right)^{4/3}.$$

Вынесем $1/R$:

$$E(R) \sim \frac{1}{R} \left[\hbar c \left(\frac{M}{m_p} \right)^{4/3} - GM^2 \right].$$

В отличие от нерелятивистского случая, обе части энергии теперь зависят от радиуса одинаково:

$$E_{\text{кин}} \propto \frac{1}{R}, \quad E_{\text{грав}} \propto -\frac{1}{R}.$$

Поэтому устойчивый минимум при конечном R исчезает.

Чтобы электронное давление ещё могло противостоять гравитации, необходимо

$$\hbar c \left(\frac{M}{m_p} \right)^{4/3} \gtrsim GM^2.$$

Переносим степени массы:

$$\frac{\hbar c}{m_p^{4/3}} \gtrsim GM^{2/3}.$$

Следовательно,

$$M^{2/3} \lesssim \frac{\hbar c}{G m_p^{4/3}}.$$

Возводя обе части в степень $3/2$, получаем

$$M \lesssim \left(\frac{\hbar c}{G} \right)^{3/2} \frac{1}{m_p^2}.$$

Таким образом, характерная предельная масса равна

$$M_{\text{кр}} \sim \frac{(\hbar c/G)^{3/2}}{m_p^2}.$$


Численно

$$M_{\text{кр}} \sim 4 \times 10^{33} \text{ г},$$

то есть величина имеет порядок нескольких масс Солнца:

$$M_{\text{кр}} \sim M_{\odot}.$$

Это оценка по порядку величины. Точное значение предела Чандрасекара зависит от состава вещества, профиля плотности и численных коэффициентов, отброшенных в данной оценке.



Давление ультрарелятивистского ферми-газа

Теперь найдём давление более точно.

При $T = 0$ энергия газа равна

$$E = 2V \int_0^{p_F} pc \frac{d^3p}{(2\pi\hbar)^3}.$$

Используя

$$d^3p = 4\pi p^2 dp,$$

получаем

$$E = \frac{8\pi Vc}{(2\pi\hbar)^3} \int_0^{p_F} p^3 dp.$$

Так как

$$\int_0^{p_F} p^3 dp = \frac{p_F^4}{4},$$

имеем

$$E = \frac{Vc p_F^4}{4\pi^2 \hbar^3}.$$

Плотность энергии

$$u = \frac{E}{V} = \frac{c p_F^4}{4\pi^2 \hbar^3}.$$

Для ультрарелятивистского газа

$$P = \frac{u}{3}.$$

Следовательно,

$$P = \frac{c p_F^4}{12\pi^2 \hbar^3}.$$

Используя

$$p_F = \hbar(3\pi^2 n)^{1/3},$$

получаем

$$P = \frac{\hbar c}{4} (3\pi^2)^{1/3} n^{4/3}.$$

Итак,

$$P = \frac{\hbar c}{4} (3\pi^2)^{1/3} n^{4/3}.$$

По порядку величины

$$P \sim \hbar c n^{4/3}.$$

Соотношение концентраций электронов и нейтронов

При больших плотностях становится существенной реакция бета-равновесия

$$n \longleftrightarrow p + e^-.$$

Если нейтрино свободно покидают систему, их химический потенциал можно положить равным нулю, поэтому условие химического равновесия:

$$\mu_n = \mu_p + \mu_e.$$

В предельно ультрарелятивистском приближении

$$\mu_i \simeq p_{F,i} c.$$

Следовательно,

$$p_{F,n} = p_{F,p} + p_{F,e}.$$

Из условия электрической нейтральности вещества

$$n_p = n_e.$$

Для частиц со спином 1/2

$$n_i = \frac{p_{F,i}^3}{3\pi^2 \hbar^3}.$$

Поэтому из

$$n_p = n_e$$

следует

$$p_{F,p} = p_{F,e}.$$

Тогда условие бета-равновесия принимает вид

$$p_{F,n} = 2p_{F,e}.$$

Так как концентрация пропорциональна кубу импульса Ферми,

$$\frac{n_n}{n_e} = \left(\frac{p_{F,n}}{p_{F,e}} \right)^3 = 2^3.$$

Следовательно,

$$n_n = 8n_e.$$

Или

$$\frac{n_e}{n_n} = \frac{1}{8}.$$

Основные результаты

Для многоэлектронного атома в модели Томаса–Ферми

$$R \sim a_0 Z^{-1/3}.$$

Для белого карлика с нерелятивистским вырожденным электронным газом

$$R \sim \frac{\hbar^2}{G m_e m_p^{5/3}} M^{-1/3}, \quad R \propto M^{-1/3}.$$

Для ультрарелятивистского электронного газа возникает характерная предельная масса

$$M_{\text{кр}} \sim \frac{(\hbar c / G)^{3/2}}{m_p^2}.$$

Давление полностью вырожденного ультрарелятивистского газа:

$$P = \frac{\hbar c}{4} (3\pi^2)^{1/3} n^{4/3}.$$

В предельно ультрарелятивистском случае при бета-равновесии и электрической нейтральности

$$n_n = 8n_e.$$