Quiz Pertemuan 9

1. Tujuan utama dari CCA adalah mengidentifikasi dan menguraikan kombinasi linier simultan antara kedua kelompok variabel yang memiliki korelasi maksimum.
2. Jumlah maksimal *canonical functions* yang dapat terbentuk pada soal itu adalah 3, karena jumlah maksimum fungsi kanonikal ditentukan oleh jumlah variabel yang paling sedikit di antara kedua kelompok dari *canonical functions*.
3. *Canonical weight* menunjukkan bobot relatif atau kontribusi unik dari masing-masing variabel asli terhadap pembentukan fungsi kanonikal, dengan mengontrol variabel lainnya, sedangkan *canonical loading* mengukur korelasi linear sederhana antara variabel asli dengan *canonical variate* miliknya sendiri.
4. ρ_1^2adalah pangkat dari ρ_1 jadi $\rho_1^2 = 0.8^2 = 0.64$. Artinya, dalam koefisien determinasi (ρ_1^2), nilai 0,64 (64%) merupakan varians bersama antara variabel-variabel tersebut yang dapat dijelaskan.
5. Melihat semua *pairwise correlations* secara sendiri belum cukup karena analisis tersebut memiliki beberapa keterbatasan mendasar dalam penjelasan hubungan data secara utuh, dimana *pairwise correlations* hanya menangkap hubungan linier , bukan non-linear yang menganggap bahwa tidak ada hubungan tersebut.
6. Tujuan utama dari PCA adalah untuk mereduksi dimensi dari satu kelompok data yang sangat besar tanpa menghilangkan informasi yang penting, sedangkan tujuan dari CCA adalah untuk menemukan dan mengidentifikasi dan menguraikan kombinasi linier simultan antara kedua kelompok variabel yang memiliki korelasi maksimum.