

儿科

小儿生长发育的一般规律, 并举例

由上到下(先抬头后抬胸), 由近到远(臂到手), 由粗到细(全掌抓到手指取), 由低级到高级(看听到记忆判断), 由简单到复杂(画直线到图形)(每点2分).

小儿(婴儿)腹泻易感因素

1. 消化系统发育尚未成熟. 水代谢旺盛. 神经调节、内分泌、循环、肝肾功能发育不成熟. (2分)
2. 生长发育快, 所需营养物质相对较多. 食物液体为主, 入量较多, 胃肠负担重. (2分)
3. 机体防御功能差. (2分)
4. 肠道菌群失调. (2分)
5. 人工喂养. (2分)

喉梗阻的分度(4度)

- I 度: 静时如正常儿, 活动后出现吸气性喉鸣及呼吸困难. (1分)肺部听诊呼吸音及心率无变化(1分).
- II 度: 患儿安静时也出现喉鸣及呼吸困难(1分). 肺部听诊可闻喉传导音或管状呼吸音, 心率加快(1分).
- III 度: 除上述喉梗阻症状外(1分), 患儿因缺氧而出现烦躁不安, 口唇及指、趾发绀, 双眼圆睁、惊恐万状、头面部出汗(1分), 肺部呼吸音明显降低, 心率快, 心音低钝(1分).
- IV 度: 患儿出现衰竭、昏睡状态(1分), 由于无力呼吸, 三凹征可不明显, 面色苍白、发灰(1分). 肺部听诊呼吸音几乎消失, 仅有气管传导音, 心律不齐, 心音低钝、弱(1分).