

MA5701 Optimización no Lineal**Profesor:** Alejandro Jofré**Auxiliar:** Benjamín Vera Vera

Auxiliar 7

Mirror Descent

16 de mayo de 2025

P1. Dada $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y considerando la divergencia de Bregmann definida por

$$D_h(x, z) = h(x) - h(z) - \nabla h(z)^\top (x - z)$$

pruebe que se tiene la siguiente identidad:

$$\forall x, y, z \in \mathbb{R}^n : D_h(x, y) = D_h(x, z) - (x - z)^\top (\nabla h(y) - \nabla h(z)) + D_h(z, y)$$

P2. Sea $\|\cdot\|$ una norma cualquiera sobre \mathbb{R}^n y $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ m -fuertemente convexa con respecto a esta norma. Sea además $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ convexa y L -Lipschitz con respecto a $\|\cdot\|$ tal que f posee un mínimo x^* sobre $\mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^n$. Considere la iteración de Mirror Descent dada por

$$x^{k+1} = \operatorname{argmin}_{x \in \mathcal{X}} \left\{ f(x^k) + \nabla f(x^k)^\top (x - x^k) + \frac{1}{\alpha_k} D_h(x, x^k) \right\}$$

y sean además

$$\lambda_k := \sum_{j=0}^k \alpha_j, \quad \bar{x}^k = \frac{1}{\lambda_k} \sum_{j=0}^k \alpha_j x^j.$$

Pruebe que para $T \geq 1$ se tiene que

$$f(\bar{x}^T) - f^* \leq \frac{D_h(x^*, x^0) + \frac{L^2}{2m} \sum_{t=0}^T \alpha_t^2}{\sum_{t=0}^T \alpha_t}$$

Indicación: Recuerde que las condiciones necesarias de primer orden para x^{k+1} vienen dadas por

$$\left[\nabla f(x^k) + \frac{1}{\alpha_k} \nabla h(x^{k+1}) - \frac{1}{\alpha_k} \nabla h(x^k) \right]^\top (x - x^{k+1}) \geq 0, \quad \forall x \in \mathcal{X}$$