

Préparation à l'agrégation externe de Sciences Sociales

Mathématiques - DM1 - corrigé

2022-2023

Exercice 1 (2017)

I - Premier modèle : adhésion d'un an

1. Les adhérents sont a_n et les non adhérents sont $N - a_n$. Alors,

$$a_{n+1} = \frac{7}{10}a_n + \frac{9}{10}(N - a_n)$$

d'où

$$a_{n+1} = -\frac{2}{10}a_n + \frac{9}{10}N$$

et

$$a_{n+1} = -\frac{1}{5}a_n + \frac{9N}{10}.$$

2. (a_n) est une suite arithmético-géométrique. Alors,

$$a_n = C + \left(-\frac{1}{5}\right)^n (a_0 - C),$$

où C est l'unique solution de l'équation $C = -\frac{C}{5} + \frac{9N}{10}$. Un simple calcul montre que $C = \frac{3}{4}N$.
Finalement, comme $a_0 = 0$,

$$a_n = \frac{3}{4}N (1 - (-1/5)^n).$$

- 3.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3}{4}N (1 - (-1/5)^n) = \frac{3}{4}N.$$

II - Second modèle : adhésion pour deux ans

- 1.

$$u_{n+1} = \frac{8}{10}v_n + \frac{8}{10}w_n$$

$$v_{n+1} = u_n$$

$$w_{n+1} = \frac{2}{10}v_n + \frac{2}{10}w_n$$

En notation matricielle,

$$\begin{pmatrix} u_{n+1} \\ v_{n+1} \\ w_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 4/5 & 4/5 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/5 & 1/5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \\ w_n \end{pmatrix},$$

qui peut s'écrire $X_{n+1} = A X_n$ avec

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 4/5 & 4/5 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/5 & 1/5 \end{pmatrix}.$$

2. Pour $n = 0$,

$$X_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ N \end{pmatrix},$$

qui est égale à $I X_0 = A^0 X_0$. Pour $n = 1$, $X_1 = A X_0$. Pour $n = 2$, $X_2 = A X_1 = A A X_0 = A^2 X_0$. En général, si $X_n = A^n X_0$ pour $n \leq n_0$, alors $X_{n+1} = A X_n = A A^n X_0 = A^{n+1} X_0$. Comme on a vu que l'égalité est vraie pour $n \leq 2$, par récurrence on obtient que $X_n = A^n X_0$ pour tout $n \geq 0$. Alors,

$$X_n = A^n \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ N \end{pmatrix}.$$

3. (a) Le calcul peut être fait manuellement ou à l'aide d'une calculatrice :

$$A \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 4/5 & 4/5 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/5 & 1/5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

donc 0 est valeur propre de A .

$$A \begin{pmatrix} 4 \\ -5 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 4/5 & 4/5 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/5 & 1/5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ -5 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -16/5 \\ 4 \\ -4/5 \end{pmatrix} = -\frac{4}{5} \begin{pmatrix} 4 \\ -5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

donc $-4/5$ est valeur propre de A .

$$A \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 4/5 & 4/5 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/5 & 1/5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$$

donc 1 est valeur propre de A .

(b) La matrice A de taille 3×3 admet 3 valeurs propres distinctes, 0, $-4/5$ et 1. La matrice A est donc diagonalisable et il existe des matrices D et P telles que D est diagonale et $A = P D P^{-1}$. La matrice P se compose des vecteurs propres de A et les coefficients diagonaux de la matrice diagonale D sont, dans l'ordre, les valeurs propres correspondantes aux différents vecteurs propres qui constituent P :

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 4 \\ -1 & -5 & 4 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -4/5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

La matrice inverse de P peut être calculée par la méthode du pivot de Gauss ou à l'aide d'une calculatrice :

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} -1/4 & 0 & 1 \\ 5/36 & -1/9 & -1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \end{pmatrix}.$$

La puissance n -ème de la matrice D est

$$D^n = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & (-4/5)^n & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(c) De $X_n = A^n X_0 = P D^n P^{-1} X_0$ on déduit

$$\begin{pmatrix} u_n \\ v_n \\ w_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 4 \\ -1 & -5 & 4 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & (-4/5)^n & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1/4 & 0 & 1 \\ 5/36 & -1/9 & -1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ N \end{pmatrix}.$$

Un petit calcul montre que

$$X_n = \begin{pmatrix} \frac{4}{9}N (1 - (-4/5)^n) \\ \frac{5}{9}N (-4/5)^n + \frac{4}{9}N \\ \frac{N}{9} (1 - (-4/5)^n) \end{pmatrix}$$

d'où

$$\begin{aligned} u_n &= \frac{4}{9}N (1 - (-4/5)^n), \\ v_n &= \frac{5}{9}N (-4/5)^n + \frac{4}{9}N, \\ w_n &= \frac{N}{9} (1 - (-4/5)^n). \end{aligned}$$

(d) La somme vaut

$$u_n + v_n + w_n = \frac{N}{9} (4 - 4(-4/5)^n + 4 + 5(-4/5)^n + 1 - (-4/5)^n) = \frac{N}{9} 9 = N.$$

Ce résultat est attendu. En effet, la somme $u_n + v_n + w_n$ correspond à la totalité de la population, et devrait donc toujours être égale à N .

(e)

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n &= \frac{4}{9}N \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n &= \frac{4}{9}N \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} w_n &= \frac{N}{9} \end{aligned}$$

III - Comparaison des deux modèles

Dans le premier modèle le nombre d'adhérents converge vers $\frac{3}{4}N$ tandis que dans le deuxième modèle le nombre d'adhérents converge vers $u_n + v_n = \frac{4}{9}N + \frac{4}{9}N = \frac{8}{9}N$. À long terme, le deuxième modèle est donc plus avantageux car $\frac{3}{4}N < \frac{8}{9}N$. Le choix ne dépend pas de la taille de la population.

Exercice 2 (2011)

Situation 1 :

1. On peut définir les variables aléatoires auxiliaires X_1, \dots, X_n par :

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{si le colis arrive en retard le jour } i \\ 0 & \text{si le colis arrive en temps le jour } i \end{cases}, \text{ pour } i = 1, \dots, n.$$

On peut écrire $X = \sum_{i=1}^n X_i$ où :

- Pour tout $i = 1, \dots, n$, X_i suit une loi Bernoulli de paramètre $p = 0, 1$,
- Les variables X_i sont **indépendants**.

Alors, on peut conclure que $X \sim \text{Bin}(n; 0, 1)$ et $E(X) = 0, 1 \times n$.

2. (a) Parmi les n jours, le colis arrivera en retard X jours tandis que le colis arrivera en temps $(n - X)$ jours. Alors, on peut écrire C comme :

$$C = 8 \times (n - X) + 0 \times X = 8 \times (n - X).$$

(b) En utilisant la linéarité de l'espérance :

$$\begin{aligned} E(C) &= E(8 \times (n - X)) \\ &= 8 \times (n - E(X)) \\ &= 8 \times 0, 9 \times n \\ &= 7, 2 \times n \end{aligned}$$

Situation 2 :

1. Un colis peut arriver en retard par premier fois le 1^{er}, 2^e, 3^e... jour, sans limite supérieure théorique. Comme l'entreprise utilise l'agence **B le jour suivant** au premier retard,

$$Y(\Omega) = \{2, 3, 4, \dots\} = \mathbb{N}^* - \{1\}.$$

2. Si on appelle R la variable aléatoire représentant le numéro du jour où pour la première fois un colis arrive en retard, on a que $R \sim \text{Geo}(0, 1)$ et $Y = R + 1$. Soit $k \in Y(\Omega)$,

$$\begin{aligned} P(Y = k) &= P(R + 1 = k) \\ &= P(R = k - 1) \\ &= (0, 9)^{(k-1-1)} \times 0, 1 \\ &= 0, 9^{k-2} \times 0, 1. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3. \sum_{k=2}^{+\infty} P(Y = k) &= \sum_{k=2}^{+\infty} 0, 9^{k-2} \times 0, 1 \\ &= 0, 1 \times \sum_{i=0}^{+\infty} 0, 9^i \\ &= 0, 1 \times \frac{1}{1 - 0, 9} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Situation 3 :

On définit les événements suivants :

- A_n : l'entreprise utilise l'agence A le jour n ,
 B_n : l'entreprise utilise l'agence B le jour n ,
 T_n : le colis envoyé le jour n arrive en temps,
 R_n : le colis envoyé le jour n arrive en retard.

Avec cette notation, $p_n = P(A_n)$.

1. Le jour 1 l'entreprise utilise l'agence A , donc on a $p_1 = 1$.
2. La probabilité de que l'entreprise utilise toujours l'agence A le jour 2 est égale à la probabilité de que le colis n'a pas eu de retard le jour 1. Alors, $p_2 = 0, 9$.
3. Pour que l'entreprise utilise l'agence A le n -ième jour il y a que deux possibilités mutuellement exclusives :
 - (1) soit elle a utilisé l'agence A le jour précédent et le colis est arrivé en temps (événement $A_n \cap T_n$),
 - (2) soit elle a utilisé l'agence B le jour précédent et le colis a eu du retard (événement $B_n \cap R_n$).

Donc on peut écrire

$$p_{n+1} = P(A_n \cap T_n) + P(B_n \cap R_n).$$

On peut calculer $P(A_n \cap T_n)$ et $P(B_n \cap R_n)$ à l'aide des probabilités conditionnelles :

$$\begin{aligned} P(A_n \cap T_n) &= P(T_n \mid A_n) \times P(A_n) = 0, 9p_n, \\ P(B_n \cap R_n) &= P(R_n \mid B_n) \times P(B_n) = 0, 2(1 - p_n). \end{aligned}$$

Alors,

$$p_{n+1} = 0, 9p_n + 0, 2(1 - p_n) = 0, 7p_n + 0, 2.$$

4. (p_n) est une suite arithmético-géométrique. Alors, commençant la récurrence par l'élément p_1 ,

$$p_n = C + 0, 7^{n-1}(p_1 - C),$$

où C est l'unique solution de l'équation $C = 0,7C + 0,2$. Un simple calcul montre que $C = \frac{2}{3}$.
Finalement, comme $p_1 = 1$,

$$p_n = \frac{2}{3} + \frac{1}{3}0,7^{n-1}.$$

Comme $0 < 0,7 < 1$,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{3} \times 0,7^{n-1} = 0,$$

et alors :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n = \frac{2}{3}.$$

Donc, à long terme (n assez grand) la probabilité de que l'entreprise utilise l'agence A est $\frac{2}{3}$.