

Mat1a Formelsamling

1 Algebra S. 1

1.1 Kvadratsætningerne 1.2 Andengradsligninger

2 Udsagnslogik S. 2

2.1 Tautologier 2.2 Logiske symboler

3 Mængder S. 3

3.1 Delmængde 3.2 Tautologier

4 Funktioner S. 4

4.1 Funktions-egenskaber

5 Rekursion og Induktion S. 5

5.1 Induktion

6 Komplekse tal S. 6

6.1 Fra rektangulær til polær form 6.2 Fra polær til rektangulær form 6.3 Aritmetik 6.4 Find kompleks fra e opløftet i kompleks
6.5 Den komplekse eksponentialfunktion 6.6 Yderligere 6.7 Kompleks Konjugering

7 Polynomier S. 10

7.1 Rødder 7.2 Multiplikteter og faktorisering 7.3 Binomier
7.4 Divisions-Algoritmen

8 Lineære Ligningssystemer S. 12

8.1 Rækkeoperationer 8.2 Har Lineært ligningssystem en løsning?
8.3 Løs LLS 8.4 Har Hom.LLS en løsning?

9 Vektorer og Matricer S. 14

9.1 Addition og Subtraktion med matrix 9.2 Multiplikation af vektor og skalar, matrix og skalar 9.3 Multiplikation af matrix og vektor 9.4 Multiplikation af matrix og matrix 9.5 Algebra
9.6 Transponering 9.7 Inverse matricer 9.8 Lineær afhængighed

10 Determinanter S. 18

10.1 Determinant af 2×2 og 3×3 matrix 10.2 Determinant af større matricer (Laplace udvikling) 10.3 Egenskaber ved determinanter

11 Udspænding af vektorer S. 20

11.1 Ordnet basis for udspænding af vektorer 11.2 Er vektor i udspænding? 11.3 Vektor med ubekendt i udspænding 11.4 Dimensionssætning
11.5 Søjle-rum 11.6 Kernen / Nulrummet af en matrix 11.7 Koordinater med hensyn til ordnet basis

12 Vektorrum S. 24

12.1 Standardbasisvektoren 12.2 Find Beta-koordinater for en vektor ved række-reduktion 12.3 Om beta-koordinater 12.4 Ordnet basis af vektorrum 12.5 Bestem basisskiftmatrix 12.6 Underrum 12.7 Ordnet basis for underrum

13 Lineære Afbildninger S. 27

13.1 Matricer som lineære afbildninger 13.2 Find afbildnings-matrix 13.3 Afbildningsmatrice med hensyn til basis 13.4 Sammensætning 13.5 Basisskift som lineær afbildning 13.6 Find vektor der afbildes til en given vektor 13.7 Eksempler på lineære afbildninger 13.8 Find all vektorer der afbildes til w ved ordnet basis

14 Egenverdier S. 32

14.1 Definition 14.2 Løs Egenverdiproblemet 14.3 Egenrum

15 Diagonalisering S. 33

15.1 Kan en matrix diagonaliseres? 15.2 Find Diagonalmatrix 15.3 Find invertibel matrix 15.4 Koordinater med hensyn til egenvektor, når kun egenverdi er kendt 15.5 Find Diagonalmatrix fra egenvektor matrix 15.6 Andet

16 Systemer af lineære ODE'er S. 36

16.1 Lineær førsteordens ODE 16.2 Er differentiaalligningen lineær? 16.3 Find førstegradspolynomium 16.4 Løs matrix ODE 16.5 Løs for betingelsesværdier 16.6 Løs Lineære anden-ordens ODE'er

Bilag S. 39

Differentiering Integration Enhedscirklen Arctan-tabel

1 Algebra

1.1 – Kvadratsætningerne

$$\begin{aligned}(a + b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2 \\ (a - b)^2 &= a^2 - 2ab + b^2 \\ (a - b)(a + b) &= a^2 - b^2\end{aligned}$$

1.2 – Andengradsligninger

Diskriminant af andengradsligning

$$D = b^2 - 4ac$$

Rødder af andengradsligning

En andengradsligning på formen $ax^2 + bx + c = 0$ har rødderne

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Særligfælde $c = 0$

$$x = 0 \vee x = -\frac{b}{a}$$

Vendepunkt (vertex)

En andengradsligning på formen $y = ax^2 + bx + c$ har vendepunktet

$$\left(-\frac{b}{2a}; c - \frac{b^2}{4a}\right)$$

Retning af andengradsligning

Hvis $a > 0$ vender parablen opad, og hvis $a < 0$ vender parablen nedad.

Værdimængden af en funktion

For en andengradsligning på formen $y = ax^2 + bx + c$:

- Hvis $a > 0$: $[y_{\min}, \infty[$
- Hvis $a < 0$: $] -\infty, y_{\max}]$

hvor $y_{\min}$ og $y_{\max}$ er y-værdien af vendepunktet.

2 Udsagnslogik

2.1 – Tautologier

$$P \wedge (Q \wedge R) \iff (P \wedge Q) \wedge R \quad \text{S1.3.1 - 1.5}$$

$$P \vee (Q \vee R) \iff (P \vee Q) \vee R \quad \text{S1.3.1 - 1.6}$$

$$P \wedge (Q \vee R) \iff (P \wedge Q) \vee (P \wedge R) \quad \text{S1.3.1 - 1.7}$$

$$P \vee (Q \wedge R) \iff (P \vee Q) \wedge (P \vee R) \quad \text{S1.3.1 - 1.8}$$

$$\neg(P \vee Q) \iff \neg P \wedge \neg Q \quad \text{S1.3.2 - 1.12}$$

$$\neg(P \wedge Q) \iff \neg P \vee \neg Q \quad \text{S1.3.2 - 1.13}$$

$$P \Rightarrow Q \iff \neg P \vee Q \quad \text{S1.3.4 - 1.20}$$

$$P \Rightarrow Q \iff \neg Q \Rightarrow \neg P \quad \text{S1.3.4 - 1.21}$$

2.2 – Logiske symboler

Symbol	Alment navn	Navn	Eksempel
$\wedge$	og	Konjunktion	$P \wedge Q$
$\vee$	eller	Disjunktion	$P \vee Q$
$\neq$	ikke lig med	Ulighed	$x \neq y$
$\neg P$	ikke P	Negation af P	$\neg P$
$\implies$	medfører	Implikation	$P \implies Q$
$\iff$	hvis og kun hvis	Biimplikation	$P \iff Q$
T	sandt	Tautologi	$(P \vee \neg P) \implies T$
F	falsk	Modstrid	$(P \wedge \neg P) \implies F$

Bemærk: $F \implies T$ er sandt.

Sandhedstabel

Det er næsten altid en god idé at lave en sandhedstabel for at undersøge logiske udsagn.

P	Q	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$\neg P$	$P \implies Q$	$P \iff Q$	$(P \vee Q) \implies \neg P$
T	T	T	T	F	T	T	F
T	F	F	T	F	F	F	F
F	T	F	T	T	T	F	T
F	F	F	F	T	T	T	T

3 Mængder

Mængder tæller ikke samme element flere gange. $\{1, 1, 0, 1, 1\} = \{1, 0\}$

Legemerne og $\emptyset$		
Symbol	Navn	Beskrivelse
$\mathbb{N}$	Naturlige tal	$1, 2, 3, \dots$
$\mathbb{Z}$	Hele tal	$\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots$
$\mathbb{Q}$	Rationelle tal	$\mathbb{Z}$ og brøker
$\mathbb{R}$	Reelle tal	$\mathbb{Q}$ og irrationelle tal (f.eks. $\sqrt{2}, \pi$)
$\mathbb{C}$	Komplekse tal	$a + bi$, hvor $a, b \in \mathbb{R}$ og $i = \sqrt{-1}$
$\emptyset$	Tomme mængde	Mængde uden elementer

3.1 – Delmængde

$$A \subseteq B \iff \forall a \in A (a \in A \implies a \in B)$$

$$A \subsetneq B \iff (A \subseteq B) \wedge (A \neq B)$$

$$A = B \iff (A \subseteq B) \wedge (B \subseteq A)$$

Lemma 2.1.1

Mængdeoperationer			
Symbol	Alment navn	Navn	Eksempel
$A \cup B$	Foreningsmængde	Union	$\{x \mid x \in A \vee x \in B\}$
$A \cap B$	Fællesmængde	Snit	$\{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$
$A \setminus B$	Mængdedifferens	Differens	$\{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$
$A \times B$	Kartesisk produkt	Produkt	$\{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}$
A^c	-	Komplement	$U - A$

Kartesisk produkt med flere set

$$A \times B \times C = \{(a, b, c) \mid a \in A, b \in B, c \in C\}$$

$$A \times \dots \times A = A^n = \{(a_1, \dots, a_n) \mid a_1, \dots, a_n \in A\}$$

Ligning 2.3

3.2 – Tautologier

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup C$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

Sætning 2.1.2

4 Funktioner

$$f : A \rightarrow B$$

$$a \mapsto f(a)$$

	Navn	Notation	Elementer
Definitionsmænde		A	$a \in A$
Dispositionsmængde		B	$b \in B$
Værdimængde		$Vm(f)$	$\{f(a) a \in A\}$

Værdimængden er et underrum af dispositionsmængden.

Alle værdier i definitionsmængden *skal* have en og kun en afbildning i dispositionsmængden. Ellers er det ikke en funktion.

Sammensatte funktioner

Givet $f : A \rightarrow B$ og $g : B \rightarrow C$, kan de sammensættes til $g \circ f : A \rightarrow C$, hvor $(g \circ f)(a) = g(f(a))$.

$$f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h$$

Lemma 2.2.1

4.1 – Funktions-egenskaber

Injektiv

Der er ikke to forskellige $a \in A$ som begge adbildes til samme $b \in B$.

Surjektiv

For alle $b \in B$ er der mindst ét $a \in A$, så $f(a) = b$. Her er $Vm(f) = B$.

Bijektiv

Funktionen er både injektiv og surjektiv.

Hvis og kun hvis en funktion er bijektiv har den en invers funktion

$f^{-1} : B \rightarrow A$, hvor $f^{-1}(f(a)) = a$ for alle $a \in A$ og $f(f^{-1}(b)) = b$ for alle $b \in B$.

Lemma 2.2.2

Identitetsfunktionen

Identitetsfunktionen $id_A : A \rightarrow A$ er defineret som $id_A(a) = a$ for alle $a \in A$.

Hvis du ønsker at vise at en funktion $g(x)$ er invers til $f(x)$, skal du vise at både $f(g(x)) = x$ og $g(f(x)) = x$.

5 Rekursion og Induktion

Bemærk: $0! = 1$

Eksempel: Rekursiv funktion af Fibonacci tallene

$$F(n) = \begin{cases} 1 & \text{hvis } n = 1 \\ 1 & \text{hvis } n = 2 \\ F(n-1) + F(n-2) & \text{hvis } n > 2 \end{cases}$$

Eksempel: Summen af talene $z_1, z_2, \dots, z_n$ kan defineres rekursivt som:

$$\sum_{k=1}^n (z_k) = \begin{cases} z_1 & \text{hvis } n = 1 \\ \sum_{k=1}^{n-1} (z_k) + z_n & \text{hvis } n > 1 \end{cases}$$

5.1 – Induktion

En påstand $P(n)$ kan bevises sand for alle n over en startværdi med induktion.

Basistrin

Vælg en basisværdi b som er den mindste værdi påstanden du vil vise gælder for. Vis at påstanden er sand for værdien b ved at bevise det specifikke tilfælde.

Induktionstrin

Vi antager at $P(n)$ er sandt for en vilkårlig n .

Vi skriver vores påstand med værdien $n+1$, $P(n+1)$

Nu kan vi bruge vores antagelse om $P(n)$ til at vise, at hvis $P(n)$ er sandt, må også $P(n+1)$ være sandt. Hermed er påstanden bevist med induktion for $\forall n \geq b$

Hyppigt brugte ligheder

$$\sum_{i=1}^n (i) = \frac{n(n+1)}{2} \quad \sum_{i=x}^n (i) + (n+1) = \sum_{i=x}^{n+1} (i) \quad x^n \cdot x = x^{n+1} \quad n! = n \cdot (n-1)!$$

6 Komplekse tal

$$\sqrt{-1} = i \quad \sqrt{-n} = i \cdot \sqrt{n} \quad z = a + bi \quad \Re(z) = a \quad \Im(z) = b$$

$$a, b \in \mathbb{R}, z \in \mathbb{C}, n \in \mathbb{R}^+$$


$z = a + bi$ er rektangulær form.

$z = |z| \cdot e^{i \cdot \arg(z)}$ er polær form.

6.1 – Fra rektangulær til polær form

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\operatorname{Arg}(z) = \begin{cases} \arctan\left(\frac{b}{a}\right) & a > 0 \\ \frac{\pi}{2} & a = 0, b > 0 \\ \arctan\left(\frac{b}{a}\right) + \pi & a < 0, b \geq 0 \\ -\frac{\pi}{2} & a = 0, b < 0 \\ \arctan\left(\frac{b}{a}\right) - \pi & a < 0, b < 0 \end{cases}$$



Sætning 4.3.1

Hovedargument Et argument $\theta + 2k\pi$ for $k \in \mathbb{Z}$ vil være samme argument.

Argumentet i intervallet $]-\pi, \pi]$ kaldes hovedargumentet og skrives $\operatorname{Arg}(z)$.

6.2 – Fra polær til rektangulær form

$$z = |z| \cdot (\cos(\arg(z)) + \sin(\arg(z)) \cdot i)$$

Ligning 4.5

$$e^{it} = \cos(t) + i \sin(t)$$

Euler's formel

Medfører:

$$\cos(t) = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2}$$

$$\sin(t) = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i}$$

Ligning 4.9

Lad $n \in \mathbb{N}$, da gælder

$$\cos(nt) = \Re((\cos(t) + \sin(t)i)^n)$$

$$\sin(nt) = \Im((\cos(t) + \sin(t)i)^n)$$

Sætning 4.5.1 - DeMoivres Formler

6.3 – Aritmetik

Rektangulær form

$z_1 = a + bi$ og $z_2 = c + di$ hvor $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ og konstant $k \in \mathbb{R}$

$$z_1 + z_2 = (a + c) + (b + d)i$$

$$z_1 - z_2 = (a - c) + (b - d)i$$

$$z_1 \cdot k = (a \cdot k) + (b \cdot k)i$$

$$z_1 \cdot z_2 = (a \cdot c - b \cdot d) + (a \cdot d + b \cdot c)i$$

$$z_1 \cdot \overline{z_1} = a^2 + b^2$$

Lemma 4.2.1

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{(a \cdot c + b \cdot d) + (b \cdot c - a \cdot d)i}{c^2 + d^2}$$

$$\frac{1}{z_1} = \frac{a}{a^2 + b^2} - \frac{b}{a^2 + b^2}i$$

Ligning 4.3

Modulus og argument

Lad $z_1, z_2 \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, så gælder:

$$|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$$

$$\arg(z_1 \cdot z_2) = \arg(z_1) + \arg(z_2)$$

$$|z_1/z_2| = |z_1|/|z_2|$$

$$\arg(z_1/z_2) = \arg(z_1) - \arg(z_2)$$

$$|z^n| = |z|^n \quad n \in \mathbb{Z}$$

$$\arg(z^n) = n \cdot \arg(z) \quad n \in \mathbb{Z}$$

Sætning 4.6.2

$$\Re(z) = |z| \cdot \cos(\arg(z))$$

Ligning 4.4

$$\Im(z) = |z| \cdot \sin(\arg(z))$$

Ligning 4.4

$$|z| = \sqrt{\Re(z)^2 + \Im(z)^2}$$

Ligning 4.6

$$z_3 \cdot z_4 = |z_3 \cdot z_4| \cdot e^{i \cdot (\arg(z_3) + \arg(z_4))}$$

$$|e^z| = e^{\Re(z)} \quad \arg(e^z) = \Im(z)$$

Ligning 4.10

6.4 – Find kompleks fra e opløftet i kompleks

Givet $e^z = w$ hvor $w, z \in \mathbb{C}$ gælder:

$$z = \ln(|w|) + (\text{Arg}(w) + p2\pi)i \quad p \in \mathbb{Z}$$

Lemma 4.6.1

Bemærk: Hvis $w = 0$ er der ingen løsning

6.5 – Den komplekse eksponentialfunktion

$$e^z = e^{a+bi} = e^a \cdot e^{bi} = e^a \cdot (\cos(b) + \sin(b) \cdot i)$$

Definition 4.4.1

Den komplekse eksponentialfunktion betegnes ofte som $\exp(t) = e^t$

6.6 – Yderligere

$$(\cos(\alpha_1) + \sin(\alpha_1)i) \cdot (\cos(\alpha_2) + \sin(\alpha_2)i) = \cos(\alpha_1 + \alpha_2) + \sin(\alpha_1 + \alpha_2)i$$

Lemma 4.4.1

$$e^z \neq 0 \quad \frac{1}{e^z} = e^{-z} \quad e^{z_1} \cdot e^{z_2} = e^{z_1+z_2} \quad e^{z_1}/e^{z_2} = e^{z_1-z_2} \quad (e^z)^n = e^{n \cdot z}$$

For $n \in \mathbb{Z}$

Sætning 4.4.2

6.7 – Kompleks Konjugering

Det komplekst konjugerede af $z = a + bi$ er $\bar{z} = a - bi$.

For $n \in \mathbb{Z}$, $a \in \mathbb{R}$ og $z, z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ gælder:

$$\overline{\bar{z}} = z \quad \overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2 \quad \overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2 \quad \overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \frac{1}{\bar{z}} \quad \overline{z^n} = (\bar{z})^n$$

Lemma 5.3.1

$$\overline{e^z} = e^{\bar{z}} \quad \overline{e^{ia}} = e^{-ia} \quad \bar{z} = |z| \cdot e^{-i \cdot \arg(z)}$$

Lemma 5.3.2

$$(z) \cdot (\bar{z}) = \Re(z)^2 + \Im(z)^2$$

Lemma 4.2.1

7 Polynomier

Polynomier er på formen:
 $n \in \mathbb{N}$, $a_i \in \mathbb{R}$, Z en variabel

$$p(Z) = a_0 + a_1 Z + a_2 Z^2 + \cdots + a_n Z^n$$

Polynomiets grad er det største i hvor $a_i \neq 0$.
 Polynomiets ledende koefficient er det tilsvarende a_i .

Nulpolynomiet har grad $-\infty$.

$$\begin{aligned}\deg(p(Z) \cdot q(Z)) &= \deg(p(Z)) + \deg(q(Z)) \\ \deg(p(Z) + q(Z)) &= \max(\deg(p(Z)), \deg(q(Z)))\end{aligned}$$

7.1 – Rødder

$$\begin{aligned}p(\lambda) = 0 &\iff \lambda \text{ er en rod i } p \\ \lambda \text{ er en rod} &\iff \lambda \text{ deler } p \text{ så } p(Z) = (Z - \lambda)q(Z) \\ \deg(p(Z)) = n &\iff p(Z) \text{ har } n \text{ rødder, målt med multiplicitet}\end{aligned}$$

For komplekse λ i polynomier med reelle koefficienter er $\bar{\lambda}$ også en rod.

Lemma 5.3.3

Hvis $p(Z) = p_1(Z) \cdot p_2(Z)$ er rødderne af $p(Z)$ rødderne af $p_1(Z)$ og $p_2(Z)$

Lemma 5.5.1

Rødder af andengradslikninger

$$aZ^2 + bZ + c = 0 \qquad Z = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Hvis diskriminanten $D = b^2 - 4ac$ for andengradslikningen er:

- $D > 0$: To forskellige reelle rødder $Z = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$
- $D = 0$: Én reel rod $Z = \frac{-b}{2a}$
- $D < 0$: To komplekse rødder - λ og $\bar{\lambda}$

7.2 – Multiplikteter og faktorisering

Polynomie $p(Z) \in \mathbb{R}[Z]$ med reelle koefficienter kan faktorerises som produktet af 1. og 2. grads polynomier med reelle koefficienter.

Sætning 5.6.3

Polynomie $p(Z) \in \mathbb{C}[Z]$ med komplekse koefficienter kan faktorerises som produktet af 1. grads polynomier med komplekse koefficienter.

Korollar 5.6.4

7.3 – Binomier

Binomier er på formen $z^n = w$ for et $n \in \mathbb{N}$ og et $w \in \{\mathbb{C} \setminus 0\}$ og har n løsninger.

Polær løsning

$$z = \sqrt[n]{|w|} \cdot e^{i\left(\frac{\arg(w)}{n} + p \cdot \frac{2\pi}{n}\right)} \quad \text{for } p = 0, 1, \dots, n-1$$

Rektangulær løsning

$$z = \sqrt[n]{|w|} \left(\cos\left(\frac{\arg(w)}{n} + p \cdot \frac{2\pi}{n}\right) + i \sin\left(\frac{\arg(w)}{n} + p \cdot \frac{2\pi}{n}\right) \right) \quad \text{for } p = 0, 1, \dots, n-1$$

Sætrilfælde ved 4. grads binomier

For et binomie på formen $Z^4 - w$ kan de resterende rødder findes hvis du kender en af rødderne ved:

$$z_2 = iz_1, \quad z_3 = -z_1, \quad z_4 = -iz_1$$

Eksempel 5.4.1

Mere generelt kan resterende rødder i et n 'te grads binomie findes ved at bruge en kendt rod z_1 i formelen:

$$z_k = z_1 \cdot e^{i \cdot (k-1) \cdot \frac{2\pi}{n}} \quad \text{for } k = 1, 2, \dots, n$$

Ikke i bogen

7.4 – Divisions-Algorithmen

Eksempel: Del $2Z^4 - 6Z^3 + 8Z^2 - 12Z + 8$ med $Z^2 - 3Z + 2$.

$$\begin{array}{r}
 Z^2 - 3Z + 2 \quad 2Z^4 - 6Z^3 + 8Z^2 - 12Z + 8 \quad (2Z^2 + 4 \\
 \underline{2Z^4 - 6Z^3 + 4Z^2} \\
 4Z^2 - 12Z + 8 \\
 \underline{4Z^2 - 12Z + 8} \\
 0
 \end{array}$$

Vi får kvotienten $2Z^2 + 4$ og resten 0.

Divisions-algoritmen virker ved at man tager sin divisor, og finder hvad den skal ganges med for at udeligne det højeste grad led i dividenden. Dette gøres gentagne gange indtil graden af resten er mindre end graden af divisoren.

8 Lineære Ligningssystemer

LLS	Lineært lignings-system
Hom.LLS	Homogent lineært ligningssystem
Inhom.LLS	Inhomogent lineært ligningssystem

8.1 – Rækkeoperationer

Rækkeoperationer ændrer ikke løsningen. For $k \in \mathbb{F}$:

Byt to rækker om	$R_i \leftrightarrow R_j$
Gange en række med en skalar	$R_i = R_i \cdot k$
Læg en række til en anden række	$R_i = R_i + k \cdot R_j$

8.2 – Har Lineært ligningssystem en løsning?

Hvis $\rho(A) = \rho([A|b])$, har det mindst en løsning.

Korollar 6.4.3

8.3 – Løs LLS

Bemærk: Hvis $\rho(A) < \rho([A|b])$, har LLS'et ingen løsning.

Dette virker for både Hom.LLS og InHom.LLS.

Eksempel: Opstil totalmatricen for LLS'et på reduceret trappeform.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 6 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

Omskriv det til et LS og isoler pivoterne:

$$\begin{cases} x_1 + 6x_3 = 3 \\ x_2 + 4x_3 = 4 \\ x_4 = 5 \end{cases} \implies \begin{cases} x_1 = 3 - 6x_3 \\ x_2 = 4 - 4x_3 \\ x_4 = 5 \end{cases}$$

x_3 er nu fri variabel. Vi giver den en parameter $t \in \mathbb{F}$:

$$\begin{cases} x_1 = 3 - 6 \cdot t \\ x_2 = 4 - 4 \cdot t \\ x_3 = t \\ x_4 = 5 \end{cases} \implies \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix} + t \cdot \begin{bmatrix} -6 \\ -4 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad t \in \mathbb{F}$$

Sættes alle parametre til 0 findes en partikulær løsning til LLS'et.

Fjernes vektoren der ikke ganges med en parameter, fås den generelle løsning til det tilsvarende Hom.LLS.

8.4 – Har Hom.LLS en løsning?

Alle har nul-løsningen. Hvis koefficientmatricen har en rang mindre end antallet af variable, har systemet også andre løsninger.

Korollar 6.4.5

Tilsvarende homogent lineært ligningssystem

Man tager et InHom.LLS og ændrer sidste søjle (b søjlen) til 0

Alle løsninger til et inhomogent lineært ligningssystem

Givet en partikulær løsning v_p til et InHom.LLS og en løsning v_h til det tilsvarende Hom.LLS, er samtlige løsninger til det InHom.LLS givet ved:

$$v = v_p + c \cdot v_h$$

For $c \in \mathbb{F}$

9 Vektorer og Matricer

$$\mathbb{F}^{3 \times 1} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} \mid a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{F}$$

$$\mathbb{F}^{1 \times 3} = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \end{bmatrix} \mid a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{F}$$

9.1 – Addition og Subtraktion med matrix

Kun defineret hvis begge matricer har samme størrelse.

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} w & x \\ y & z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+w & b+x \\ c+y & d+z \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} w & x \\ y & z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a-w & b-x \\ c-y & d-z \end{bmatrix}$$

9.2 – Multiplikation af vektor og skalar, matrix og skalar

$$k \cdot \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k \cdot a_1 \\ k \cdot a_2 \\ k \cdot a_3 \end{bmatrix}$$

$$k \cdot \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ka & kb & kc \\ kd & ke & kf \\ kg & kh & ki \end{bmatrix}$$

9.3 – Multiplikation af matrix og vektor

Kun defineret hvis antallet af kolonner i matricen er lig med antallet af rækker i vektoren. Resultatet bliver en vektor med samme antal rækker som matricen.

$$\begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax + by + cz \\ dx + ey + fz \end{bmatrix}$$

9.4 – Multiplikation af matrix og matrix

Kun defineret hvis antallet af søjler i den første matrix er lig med antallet af rækker i den anden matrix. Resultatet bliver en matrix med antal rækker fra den første matrix og antal kolonner fra den anden matrix.

$$\begin{bmatrix} w & x \\ y & z \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (wa + xd) & (wb + xe) & (wc + xf) \\ (ya + zd) & (yb + ze) & (yc + zf) \end{bmatrix}$$

Bemærk: $A \cdot B \neq B \cdot A$

9.5 – Algebra

Vektorer

$$(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$$

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$$

$$c \cdot (d \cdot \mathbf{u}) = (c \cdot d) \cdot \mathbf{u}$$

$$c \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{v}) = c \cdot \mathbf{u} + c \cdot \mathbf{v}$$

$$(c + d) \cdot \mathbf{u} = c \cdot \mathbf{u} + d \cdot \mathbf{u}$$

Sætning 7.1.1

Matricer

$$\mathbf{A}_1 + \mathbf{A}_2 = \mathbf{A}_2 + \mathbf{A}_1$$

$$(\mathbf{A}_1 + \mathbf{A}_2) + \mathbf{A}_3 = \mathbf{A}_1 + (\mathbf{A}_2 + \mathbf{A}_3)$$

$$\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \cdot \mathbf{C}) = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C}$$

$$\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B}_1 + \mathbf{B}_2) = \mathbf{A} \cdot \mathbf{B}_1 + \mathbf{A} \cdot \mathbf{B}_2$$

$$(\mathbf{A}_1 + \mathbf{A}_2) \cdot \mathbf{B} = \mathbf{A}_1 \cdot \mathbf{B} + \mathbf{A}_2 \cdot \mathbf{B}$$

Sætning 7.2.1

9.6 – Transponering

$$\begin{bmatrix} a & b & c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}^T$$

$$\begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{bmatrix}$$

- $(\mathbf{A}^T)^T = \mathbf{A}$
- $(\mathbf{A}_1 + \mathbf{A}_2)^T = \mathbf{A}_1^T + \mathbf{A}_2^T$
- $(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})^T = \mathbf{B}^T \cdot \mathbf{A}^T$

Bemærk: Rækkefølgen vendes

Sætning 7.2.2

9.7 – Inverse matricer

- Kun defineret for kvadratiske matricer.
- A har en invers $\iff \rho(A) = \text{antallet af rækker i } A$.
- $A \cdot A^{-1} = I_n$
- A har en invers $\iff \det(A) \neq 0$

Lemma 7.3.1

Korollar 7.3.4

Korollar 8.2.4

Invers ved rækkeoperationer

For en kvadratisk matrix A kan A^{-1} findes ved at bruge rækkeoperationer:

$$[A \mid I] \xrightarrow{\text{rækkeoperationer}} [I \mid A^{-1}].$$

Kun hvis venstre side ender som identitetsmatricen, eksisterer A^{-1} .

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} a & b & 1 & 0 \\ c & d & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{rref}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & x & y \\ 0 & 1 & z & w \end{bmatrix} \Rightarrow \mathbf{A}^{-1} = \begin{bmatrix} x & y \\ z & w \end{bmatrix}$$

Sætning 7.3.2

Invers ved determinant

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

Sætning 8.1.1

9.8 – Lineær afhængighed

Hvis en eller flere vektorer i et sæt kan skrives som en lineær kombination af de andre vektorer i sættet, er vektorerne lineært afhængige. Ellers er de lineært uafhængige.

Determinant

Hvis $\det(A) = 0$ er søjlerne i $\mathbf{A}$ lineært afhængige. Ellers uafhængige.

Korollar 8.2.5

Samme rang som vektorer

Hvis matricen skabt af vektorerne som søjler har samme rang som antallet af vektorer, er de lineært uafhængige. Ellers er de lineært afhængige.

Sætning 7.1.3

10 Determinanter

Kun defineret for kvadratiske matricer.

10.1 – Determinant af 2×2 og 3×3 matrix

$$\begin{aligned} \det [a] &= a \\ \det \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} &= ad - bc \\ \det \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} &= aei + bfg + cdh - ceg - bdi - afh \end{aligned}$$

Sarrus' regel

10.2 – Determinant af større matricer (Laplace udvikling)

$$\det \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} = a \cdot \det \begin{bmatrix} e & f \\ h & i \end{bmatrix} - b \cdot \det \begin{bmatrix} d & f \\ g & i \end{bmatrix} + c \cdot \det \begin{bmatrix} d & e \\ g & h \end{bmatrix}$$

General formel for en valgfri i 'te række:

$$\det(\mathbf{A}) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} \cdot a_{ij} \cdot \det(\mathbf{A}(i; j))$$

Generel formel for en valgfri j 'te kolonne:

$$\det(\mathbf{A}) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} \cdot a_{ij} \cdot \det(\mathbf{A}(i; j))$$

Sætning 8.2.1

Bemærk: $\mathbf{A}(i; j)$ er matricen dannet ved at fjerne den i 'te række og j 'te kolonne fra matrix $\mathbf{A}$.

Enhver række eller kolonne kan vælges - Brugbart hvis en række eller kolonne indeholder mange nuller.

Man tager altså hvert element i den valgte række eller kolonne, ganger det med determinanten af minoren dannet ved at fjerne den række og kolonne, som elementet befinder sig i, og ganger med $(-1)^{i+j}$ for at tage højde for fortegnet.

Fortegns skema for en $n \times n$ matrix

$+a_{11}$	$-a_{12}$	$+a_{13}$	$\cdots$
$-a_{21}$	$+a_{22}$	$-a_{23}$	$\cdots$
$+a_{31}$	$-a_{32}$	$+a_{33}$	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

10.3 – Egenskaber ved determinanter

Hvis der er en nul-række, er determinanten 0.

Lemma 8.1.4

Hvis to rækker er ens, er determinanten 0.

Proposition 8.3.5

Hvis to rækker byttes om, skifter determinanten fortegn.

Sætning 8.3.6

Hvis en række eller søjle ganges med en skalar k , ganges determinanten med k .

Korollar 8.3.2

Hvis en række lægges til en anden række, ændres determinanten ikke.

Sætning 8.3.7

$\det(A) \neq 0 \iff$ det tilsvarende lineære ligningssystem's eneste løsning er nulvektoren.

Korollar 8.2.6

$$\det(\mathbf{A}^{-1}) = \frac{1}{\det(\mathbf{A})}$$

Sætning 8.1.1

$$\text{For diagonalmatricer: } \det(\mathbf{D}) = \prod_{i=1}^n d_{ii}$$

Proposition 8.1.2

$$\text{For trekantsmatricer: } \det(\mathbf{T}) = \prod_{i=1}^n t_{ii}$$

Sætning 8.1.(3/5)

$$\det(A^T) = \det(A)$$

Korollar 8.2.2

$$\det(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) = \det(\mathbf{A}) \cdot \det(\mathbf{B})$$

Sætning 8.2.3

11 Udspænding af vektorer

En udspænding af vektorer er mængden af alle vektorer der kan dannes ved linearkombinationer af et givent sæt vektorer. (hvor vektorer ganges med $c \in \mathbb{F}$ og lægges sammen)

Hvis en af vektorerne kan skrives som en linearkombination af de andre vektorer, er vektorene lineært afhængige, og denne vektor kan fjernes uden at ændre udspændingen. Ellers er vektorene lineært uafhængige.

11.1 – Ordnet basis for udspænding af vektorer

Alle vektorer i en ordnet basis er lineært uafhængige.

Korollar 9.2.2

Find ordnet basis for udspænding

Lav en matrix ud af vektorene

$$\begin{bmatrix} | & | & \cdots & | \\ v_1 & v_2 & \cdots & v_n \\ | & | & \cdots & | \end{bmatrix}$$

Brug rækkeoperationer til at få matrixen på trappeform. For alle søjler med et pivot-element skal den **originale vektor** på den position med i den ordnede basis.

Sætning 9.2.1

11.2 – Er vektor i udspænding?

Determinant

Hvis determinanten af matrixen skabt ved at tilføje den nye vektor som en ekstra søjle er 0, så er vektoren indeholdt i spandet.

Rækkeoperationer

Lav en matrix med vektorerne i spanet og den nye vektor som ekstra søjle:

$$\begin{bmatrix} | & | & \cdots & | & | \\ v_1 & v_2 & \cdots & v_n & v_x \\ | & | & \cdots & | & | \end{bmatrix}$$

Få matrixen på reduceret rækkeform. Hvis den ekstra søjle **ikke** indeholder et pivot-element, er vektoren indeholdt i udspændingen.

I så fald kan vektorens linearkombinationen aflæses fra søjlen v_x

Eksempel:

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 7 \\ 2 & 3 & 8 \\ 1 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & 6 \end{bmatrix} \xrightarrow{rref} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Her kan aflæses at $v_x = 1 \cdot v_1 + 2 \cdot v_2$

11.3 – Vektor med ubekendt i udspænding

Lav en matrix med vektorerne og den nye vektor som ekstra søjle:

$$\begin{bmatrix} | & | & \cdots & | & | \\ v_1 & v_2 & \cdots & v_n & v_x \\ | & | & \cdots & | & | \end{bmatrix}$$

Brug rækkeoperationer til at få matrixen på trappeform. Løs for den ubekendte så den ekstra søjle **ikke** indeholder et pivot-element, så er vektoren indeholdt i udspændingen.

11.4 – Dimensionssætningen

For en matrix $\mathbf{A}^{m \times n}$ (n søjler) gælder det at:

$$\rho(\mathbf{A}) + \dim(\ker(\mathbf{A})) = n$$

Sætning 9.4.2

$$\rho(A) = \dim(\text{colsp}(\mathbf{A})) = \text{antal pivoter}$$

$$\dim(\ker(\mathbf{A})) = \text{null}(A)$$

Dimensionen er antallet af vektorer i en ordnet basis for rummet.

Difference mellem vektorer

Hvis $\mathbf{A} \cdot v_1 = \mathbf{A} \cdot v_2$ er $c \cdot (v_1 - v_2)$ i $\ker(\mathbf{A})$

Logik

11.5 – Søjle-rum

Mængden af alle linearkombinationer af søjlerne i en matrix.

$$\text{colsp}(\mathbf{A}) = \{\mathbf{A} \cdot \mathbf{v} \mid \mathbf{v} \in \mathbb{F}^n\}$$

Ordnnet basis for søjlerummet kan findes som beskrevet i sektion 11.1.

11.6 – Kernen / Nulrummet af en matrix

$$\ker(\mathbf{A}) = \{\mathbf{v} \in \mathbb{F} \mid \mathbf{A} \cdot \mathbf{v} = 0\}$$

Kernen for matrix $\mathbf{A}$ findes ved at løse det homogene lineære ligningssystem dannet ved at tilføje en 0-søjle.

Korollar 9.2.3

Eksempel:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -i & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 2 & 0 \\ i & -1 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Første linje giver os

$$-i \cdot x_1 + x_2 = 0 \implies x_2 = i \cdot x_1$$

Nu kan vi finde x_3 med anden linje, hvor vi udskifter x_2 med $i \cdot x_1$:

$$\begin{aligned} 2 \cdot x_1 - 2 \cdot (i \cdot x_1) + 2 \cdot x_3 &= 0 \\ \implies 2 \cdot x_1 - 2i \cdot x_1 &= -2 \cdot x_3 \\ \implies x_1 - i \cdot x_1 &= -x_3 \\ \implies (1 - i) \cdot x_1 &= -x_3 \\ \implies (i - 1) \cdot x_1 &= x_3 \end{aligned}$$

Vi har nu både x_2 og x_3 udtrykt ved x_1 , så vi kan skrive løsningen som:

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ i \cdot x_1 \\ (i - 1) \cdot x_1 \end{bmatrix} = x_1 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ i \\ i - 1 \end{bmatrix}$$

Kernen er derfor

$$\text{Span} \left(\begin{bmatrix} 1 \\ i \\ i - 1 \end{bmatrix} \right)$$

Ordnet basis for kernen / nulrummet

Ovenstående metode giver en ordnet basis for kernen.

Givet vektorer i uordnet kerne kan ordnet basis findes som i sektion 11.1.

Er vektor i kernen af en matrix?

v er i kernen af matrix $\mathbf{A}$ hvis:

$$\mathbf{A} \cdot v = 0$$

v er lineært afhængig med vektorerne i kernen af A (se sektion 11.2)

11.7 – Koordinater med hensyn til ordnet basis

Opstil en matrix med basisvektorerne som søjler og vektoren som ekstra søjle:

$$\left[\begin{array}{c|c|c|c|c} | & | & \cdots & | & | \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n & v \\ | & | & \cdots & | & | \end{array} \right]$$

Omskriv til trappeform ved rækkeoperationer og løs for skalarerne $c_1, c_2, \dots, c_n$.

Eksempel:

Givet $v = \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\beta = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$, findes $[v]_\beta$ ved at løse LLS'et:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 5 \\ 1 & 1 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right] \Rightarrow [v]_\beta = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Find vektor ud fra koordinater med hensyn til base

Givet $[v]_\beta = (c_1, c_2, \dots, c_n)^T$, og $\beta = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$, findes v ved:

$$v = c_1 \cdot b_1 + c_2 \cdot b_2 + \dots + c_n \cdot b_n$$

12 Vektorrum

Alle vektorrum skal opfylde aksiomerne:

- $\mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = (\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w}$
- $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$
- Der findes en nulvektor $\mathbf{0}$ sådan at $\mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{u}$
- For hver vektor $\mathbf{u}$ findes en modsat vektor $-\mathbf{u}$ sådan at $\mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = \mathbf{0}$
- $c \cdot (d \cdot \mathbf{u}) = (c \cdot d) \cdot \mathbf{u}$
- $1 \cdot \mathbf{u} = \mathbf{u}$
- $c \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{v}) = c \cdot \mathbf{u} + c \cdot \mathbf{v}$
- $(c + d) \cdot \mathbf{u} = c \cdot \mathbf{u} + d \cdot \mathbf{u}$

Definition 10.1.1

12.1 – Standardbasisvektoren

Standardbasisvektorerne er de lineært uafhængige vektorer i et vektorrum, som har et 1 i en position og 0 i alle andre positioner. I $\mathbb{R}^3$ er standardbasisvektorerne:

$$\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{e}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

12.2 – Find Beta-koordinater for en vektor ved række-reduktion

Givet vektor $\mathbf{v}$ og basis $\beta = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n\}$ for vektorrum V , kan vi finde $[\mathbf{v}]_\beta$ ved at række-reducere $[\mathbf{b}|\mathbf{v}]$ matricen til reduceret trappeform.

$$\left[\begin{array}{c|ccc} | & & | & | \\ \mathbf{b}_1 & \cdots & \mathbf{b}_n & \mathbf{v} \\ | & & | & | \end{array} \right] \xrightarrow{\text{Række-operationer}} \left[\begin{array}{c|ccc} 1 & \cdots & 0 & | \\ \vdots & 1 & \vdots & \mathbf{v}_\beta \\ 0 & \cdots & 1 & | \end{array} \right]$$

12.3 – Om beta-koordinater

$$[\mathbf{v} + \mathbf{u}]_\beta = [\mathbf{v}]_\beta + [\mathbf{u}]_\beta$$

$$[c \cdot \mathbf{v}]_\beta = c \cdot [\mathbf{v}]_\beta$$

Lemma 10.2.3

$$c_1 \cdot \mathbf{v}_1 + c_2 \cdot \mathbf{v}_2 + \cdots + c_n \cdot \mathbf{v}_n = \mathbf{0} \iff c_1 \cdot [\mathbf{v}_1]_\beta + c_2 \cdot [\mathbf{v}_2]_\beta + \cdots + c_n \cdot [\mathbf{v}_n]_\beta = \mathbf{0}$$

Sætning 10.2.4

12.4 – Ordnet basis af vektorrum

For vektorrum $V = \text{Span}(v_1, v_2, \dots, v_n)$ kan den ordnede basis findes som beskrevet i sektion 11.1

Er givent sæt vektorer en ordnet basis?

1. Der skal være lige så mange vektorer som dimensionen af vektorrummet.
2. Vektorerne skal være lineært uafhængige.

Sætning 10.2.7

De er lineært uafhængige hvis matricen dannet af vektorerne har pivot i alle søjler efter række-reduktion til trappeform.

12.5 – Bestem basisskiftematrix

Ved individuelle søjler

Givet to basiser $\gamma = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_n\}$ og $\beta = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ for vektorrum V , kan vi bestemme basisskiftematrixen ${}_{\beta}M_{\gamma}$ (Fra γ til β) ved at finde koordinaterne for hver eneste basisvektor i γ i forhold til basisen β som i sektion 12.2

De resulterende koordinatvektorer udgør søjlerne i basisskiftematrixen:

$${}_{\beta}M_{\gamma} = \begin{bmatrix} [\mathbf{w}_1]_{\beta} & [\mathbf{w}_2]_{\beta} & \cdots & [\mathbf{w}_n]_{\beta} \end{bmatrix}$$

Sætning 10.3.1

Basisskiftematricer skifter basis

$${}_{\gamma}M_{\beta} \cdot [\mathbf{v}]_{\beta} = [\mathbf{v}]_{\gamma}$$

Sætning 10.3.1

Sætilfælde: Fra den ordnede standardbasis

Enhver basisskiftematix ${}_{\beta}M_{\epsilon}$ (Fra standardbasis til β) kan findes ved at danne en matrix med basisvektorerne i β som søjler:

$${}_{\beta}M_{\epsilon} = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 & \mathbf{v}_2 & \cdots & \mathbf{v}_n \end{bmatrix}$$

Det er altså bare at skrive basisvektorerne ved siden af hinanden som søjler i en matrix.

Hvis du kender den modsatte basisskiftematix

Hvis du kender basisskiftematrixen ${}_{\beta}M_{\gamma}$ (Fra γ til β), kan du finde den modsatte basisskiftematix ${}_{\gamma}M_{\beta}$ (Fra β til γ) ved at tage den inverse af ${}_{\beta}M_{\gamma}$:

$${}_{\gamma}M_{\beta} = ({}_{\beta}M_{\gamma})^{-1}$$

Lemma 10.3.2

Kombination af basisikftematricer

Hvis du kender basisskiftematricerne ${}_{\beta}M_{\gamma}$ (Fra γ til β) og ${}_{\gamma}M_{\delta}$ (Fra δ til γ), kan du finde basisskiftematricen ${}_{\beta}M_{\delta}$ (Fra δ til β) ved at multiplicere de to matricer:

$${}_{\beta}M_{\delta} = {}_{\beta}M_{\gamma} \cdot {}_{\gamma}M_{\delta}$$

Lemma 10.3.2

Bemærk: Rækkefølgen af multiplikationen er vigtig

12.6 – Underrum

For underrum W af vektorrum V gælder $\dim(W) \leq \dim(V)$

Lemma 10.4.1

For 2 vektorer $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in W$ gælder $\mathbf{u} + c \cdot \mathbf{v} \in W$ for alle skalarer $c \in \mathbb{F}$.

Lemma 10.4.2

Eksempel: er mængden $\{a + bz \mid a, b \in \mathbb{C}\}$ et underrum af vektorrummet af alle komplekse polynomier $\mathbb{C}[z]$?

$$(a + bz) + c \cdot (k + jz) = a + ck + bz + c jz = (a + ck) + (b + cj)z$$

Det er sandt, da det kunne omskrives til at være et polynomium af samme form.

Find dimensionen

Dimensionen af et underrum er antallet af variabler der kan vælges frit.

Eksempel:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{bmatrix}$$

Dimensionen af alle $\mathbb{R}^{3 \times 3}$ øvre-trekantsmatricer er $3 + 2 + 1 = \frac{3 \cdot (3+1)}{2} = 6$

12.7 – Ordnet basis for underrum

Vektorer er en ordnet basis for et underrum hvis de er:

Lineært uafhængige, i underrummet, og der er samme antal vektorer som dimensionen af underrummet.

Se sektion 11.1 for ordnede baser.

13 Lineære Afbildninger

Lineære afbildninger tager en vektor fra et vektorrum og afbilder den til en anden vektor i et andet (eller samme) vektorrum.

En afbildning er lineær $\iff L(u + c \cdot v) = L(u) + c \cdot L(v)$

Definition 11.0.1

Et hurtigt *modbevis* for at en afbildning er lineær er hvis $L(0) \neq 0$.

13.1 – Matricer som lineære afbildninger

Givet en matrix $\mathbf{A} \in \mathbb{F}^{m \times n}$, kan vi definere en lineær afbildning $L_{\mathbf{A}} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ved:

$$L_{\mathbf{A}}(v) = \mathbf{A} \cdot v$$

Definition 11.1.1

Eksempel:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad v = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix} \quad L_{\mathbf{A}}(v) = \mathbf{A} \cdot v = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 17 \\ 39 \end{bmatrix}$$

Bemærk: Alle lineære afbildninger mellem endelig-dimensionelle vektorrum kan repræsenteres som matrix-multiplikationer.

Billedet af lineær afbildning

Givet en afbildnings-matrice $\mathbf{A}$, er billedet af den lineære afbildning $L_{\mathbf{A}}$ givet ved $\text{colsp}(\mathbf{A})$. Se sektion 11.5 for at finde søjlerummet.

Lemma 11.1.2

Kerne af lineær afbildning

Givet en afbildnings-matrice $\mathbf{A}$, er $\ker(L_{\mathbf{A}}) = \ker(\mathbf{A})$. Se sektion 11.6 for at finde kernen.

Definition 11.1.2

Givet en generel lineær afbildning $L : V \rightarrow W$, er kernen af L mængden af alle vektorer i V , der afbildes til nulvektoren i W :

$$\ker(L) = \{v \in V \mid L(v) = 0\}$$

Definition 11.2.1

Dimensionssætningen for lineære afbildninger

For $L : V_1 \rightarrow V_2$

$$\dim(\ker(L)) + \dim(\text{image}(L)) = \dim(V_1)$$

Korollar 11.4.3

13.2 – Find afbildnings-matrix

For lineær afbildning $L : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$ kan afbildnings-matricen $[L]$ findes ved at anvende L på standardbasens vektorer $e_1, e_2, \dots, e_n$ og sætte resultaterne som søjler i en matrix:

$$A = \begin{bmatrix} L(e_1) & L(e_2) & \dots & L(e_n) \end{bmatrix}$$

Lemma 11.3.2

Find afbildningsmatrix af afbildet en vektor

Eksempel: Givet vektor $\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ og lineær afbildning $L : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$L \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x_1 + x_2 \\ -x_2 + 3x_3 \end{bmatrix}$$

tag den ordnede standardbasis for $\mathbb{R}^3$: $e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $e_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $e_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

Vi afbilder nu hver af basisvektorene med L :

$$L \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 1 + 0 \\ -0 + 3 \cdot 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad L \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 0 + 1 \\ -1 + 3 \cdot 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$L \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 0 + 0 \\ -0 + 3 \cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Vi har nu afbildningsmatricen: $[L] = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix}$

Og vi kan nu finde afbildningen af vores vektor ved at multiplicere afbildningsmatricen med vektoren:

$$L \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 3 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 \\ 0 \cdot 3 + (-1) \cdot 2 + 3 \cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 1 \end{bmatrix}$$

13.3 – Afbildningsmatrice med hensyn til basis

Givet lineær afbildning $L : V \rightarrow W$ med ordnede baser $\beta = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ for V og $\gamma = \{w_1, w_2, \dots, w_m\}$ for W , kan afbildningsmatricen ${}_{\gamma}[L]_{\beta}$ findes ved at afbilde hver basisvektor i V og udtrykke resultatet i basis γ :

$${}_{\gamma}[L]_{\beta} = \begin{bmatrix} [L(v_1)]_{\gamma} & [L(v_2)]_{\gamma} & \dots & [L(v_n)]_{\gamma} \end{bmatrix}$$

Lemma 11.3.3

Dvs., for hver basisvektor v_i i V :

1. beregn $L(v_i)$
2. skriv $L(v_i)$ med hensyn til basis γ for at få $[L(v_i)]_{\gamma}$. Se sektion 12.2
3. Du har nu søjle i i afbildningsmatricen. ${}_{\gamma}[L]_{\beta}$

Om afbildningsmatricer med hensyn til baser

$$\begin{aligned} [L(v)]_{\gamma} &= {}_{\gamma}[L]_{\beta} \cdot [v]_{\beta} \\ {}_{\delta}[M \circ L]_{\beta} &= {}_{\delta}[M]_{\gamma} \cdot {}_{\gamma}[L]_{\beta} \end{aligned}$$

Sætning 11.3.4

Afbildningsmatrix på samme vektorrum

Giver lineær afbildning $L : V \rightarrow V$ med ordnet basis $\beta = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ og ordnet basis $\gamma = \{w_1, w_2, \dots, w_n\}$:

$${}_{\gamma}[id_V]_{\beta} = \begin{bmatrix} [v_1]_{\gamma} & [v_2]_{\gamma} & \dots & [v_n]_{\gamma} \end{bmatrix}$$

Lemma 11.3.5

Om afbildning på samme vektorrum Det er bare en anden måde at skrive en basisskift-matrice.

$$\begin{aligned} {}_{\delta}[id_V]_{\gamma} \cdot {}_{\gamma}[id_V]_{\beta} &= {}_{\delta}[id_V]_{\beta} \\ {}_{\beta}[id_V]_{\beta} &= I_n \\ ({}_{\gamma}[id_V]_{\beta})^{-1} &= {}_{\beta}[id_V]_{\gamma} \end{aligned}$$

Lemma 11.3.6

13.4 – Sammensætning

Hvis $L_1 : U \rightarrow V$ og $L_2 : V \rightarrow W$ er lineære afbildninger, så er sammensætningen $L_2 \circ L_1 : U \rightarrow W$ også en lineær afbildning.

Sætning 11.2.1

Hvis α, β, γ er baser for henholdsvis U, V, W , så gælder:

$${}_{\gamma}[L_2 \circ L_1]_{\alpha} = {}_{\gamma}[L_2]_{\beta} \cdot {}_{\beta}[L_1]_{\alpha}$$

13.5 – Basisskift som lineær afbildning

Givet vektorrum V og $\beta = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ er funktionen $L_\beta : V \rightarrow \mathbb{R}^n$ defineret ved $L_\beta(v) \mapsto [v]_\beta$ En lineær afbildning.

Funktionen $\mathbb{R}^n \rightarrow V$ defineret ved $(c_1, c_2, \dots, c_n) \mapsto c_1v_1 + c_2v_2 + \dots + c_nv_n$ er også en lineær afbildning, og er den inverse af L_β .

Lemma 11.3.1

13.6 – Find vektor der afbildes til en given vektor

Givet lineær afbildning $L : V \rightarrow W$ og vektor $w \in W$, kan $v \in V$ findes så $L(v) = w$, ved at løse ligningen:

$${}_\gamma[L]_\beta \cdot [v]_\beta = [w]_\gamma$$

For vektoren $[v]_\beta$ indsættes blot $(x, y, z, \dots)$ og løses som et almindeligt ligningssystem.

Når en løsning er fundet vil alle vektorer der afbildes til w være givet ved:

$$v = v_p + v_{ker}$$

hvor v_p er den fundne løsning og v_{ker} er en vilkårlig vektor i kernen af L .

13.7 – Eksempler på lineære afbildninger

- Sporet af en matrix; en funktion der lægger alle diagonalerne sammen.

Eksempel 11.2.2

- Vektor til lavere dimension: $\begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \end{bmatrix}$

13.8 – Find all vektorer der afbildes til w ved ordnet basis

Givet lineær afbildning $L : V_1 \rightarrow V_2$ med ordnet basis β for V_1 og γ for V_2 , og vektor $w \in V_2$.

Det er muligt at finde alle vektorer $v \in V_1$, så $L(v) = w$, ved at løse ligningen:

$${}_\gamma[L]_\beta \cdot [v]_\beta = [w]_\gamma$$

For vektoren $[v]_\beta$ indsættes blot $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ og løses som et almindeligt ligningssystem.

Da er det v som er løsningen til $L(v) = w$.

Kerne ved samme metode

På samme måde kan kernen for L findes ved at løse ligningen:

$${}_\gamma[L]_\beta \cdot [v]_\beta = 0$$

Igen er det her v som er løsningen til $L(v) = 0$.

14 Egenverdier

14.1 – Definition

Givet vektorrum V på $\mathbb{F}$ og lineær afbildning $L : V \rightarrow V$ er en skalar $\lambda \in \mathbb{F}$ en **egenverdi** for L , hvis der findes en vektor $\mathbf{v} \in V$, $\mathbf{v} \neq 0$, sådan at

$$L(\mathbf{v}) = \lambda \cdot \mathbf{v}.$$

Vektoren $\mathbf{v}$ er en **egenvektor** tilhørende egenverdien λ .

Bemærk: λ må godt være 0

Definition 12.1.1

Matricers egenverdier

Givet matrix $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ og vektor $\mathbf{v} \in \mathbb{F}^n \setminus 0$, er skalar $\lambda \in \mathbb{F}$ en **egenverdi** for A , hvis

$$A\mathbf{v} = \lambda \cdot \mathbf{v}.$$

Vektoren $\mathbf{v}$ er en **egenvektor** tilhørende egenverdien λ .

Bemærk: Gælder kun for kvadratiske matricer

Definition 12.1.2

14.2 – Løs Egenverdiproblemet

For matrix $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$, vil skalar $\lambda \in \mathbb{F}$ være en egenverdi for $A \iff$

$$\det(A - \lambda \cdot \mathbf{I}_n) = 0.$$

Dette er det **karakteristiske polynomium** for A og betegnes $p_A(\lambda)$.

Med andre ord, rødderne i følgende polynomie er egenverdierne for A .

$$\det \left(\begin{bmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - \lambda \end{bmatrix} \right) = 0$$

Dette vil give et polynomie af grad n , som løses for den ubekendte λ .

Sætning 12.1.1

Egenverdi for Lineære afbildninger

For en lineær afbildning $L : V \rightarrow V$ og en basis β for V , vil en skalar $\lambda \in \mathbb{F}$ være en egenverdi for L hvis og kun hvis

$$\det({}_{\beta}[L]_{\beta} - \lambda \cdot \mathbf{I}_n) = 0.$$

Sætning 12.1.2

Om egenverdier af lineære afbildninger

Den valgte basis er ligegyldig.

$$p_{\beta[L]_{\beta}}(\lambda) = p_{\gamma[L]_{\gamma}}(\lambda)$$

Sætning 12.1.4

$$\det(\beta[L]_{\beta}) = \det(\gamma[L]_{\gamma})$$

Korollar 12.1.5

Det karakteristiske polynomium for en lineær afbildning $L : V \rightarrow V$ betegnes med valgfri basis:

$$p_L(\lambda) = \det(\beta[L]_{\beta} - \lambda \cdot \mathbf{I}_n)$$

Definition 12.1.3

14.3 – Egenrum

Egenrummet for en egenverdi λ og matrix $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ betegnes E_{λ} og defineres som mængden af alle egenvektorer tilhørende λ samt *nulvektoren*. Det kan findes ved at finde kernen af matricen:

$$\begin{bmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - \lambda \end{bmatrix}$$

Lemma 12.2.3

Se evt. sektion 11.6 om hvordan kernen findes.

Egenrum er underrum

$$E_{\lambda} = \{\mathbf{v} \in V | L(\mathbf{v}) = \lambda \cdot \mathbf{v}\}$$

Sætning 12.2.1

$$A_{\lambda} = \{\mathbf{v} \in V | A \cdot \mathbf{v} = \lambda \cdot \mathbf{v}\}$$

Sætning 12.2.1

Disse er underrum i hhv. V og A .

15 Diagonalisering

15.1 – Kan en matrix diagonaliseres?

Lineær afbildning $L : V \rightarrow V$ eller matrix $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ er diagonaliserbar $\iff$ der findes en basis for V bestående af egenvektorer tilhørende L .

Det skal gælde for alle egenverdier at $\text{gm}(\lambda) = \text{am}(\lambda)$.

Det er det samme som at det karakteristiske polynomium for L kan skrives som

$$p_L(Z) = (-1)^n \cdot (Z - \lambda_1)^{m_1} \cdots (Z - \lambda_r)^{m_r}$$

Sætning 12.3.3

Når en afbildning kan diagonaliseres kan man finde en diagonalmatrix D og en invertibel matrix Q så

$$L = Q \cdot D \cdot Q^{-1}$$

Lemma 12.4.2

Se sektion 15.2 og 15.3.

15.2 – Find Diagonalmatrix

Hvis $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ kan diagonaliseres, kan diagonalmatricen findes ved at indsætte egenverdierne for A på diagonalen i en $n \times n$ matrix D .

$$D = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix}$$

Bemærk: Hvis en egenverdi har algebraisk multiplicitet n , skal den optræde n gange efter hinanden på diagonalen i D .

15.3 – Find invertibel matrix

Diagonalmatrix D kan skrives som $D = Q^{-1} \cdot A \cdot Q$, hvor Q er en invertibel matrix bestående af egenvektorerne for egenverdierne i D som søjler.

$$Q = \begin{bmatrix} | & | & \cdots & | \\ \mathbf{v}_1 & \mathbf{v}_2 & \cdots & \mathbf{v}_n \\ | & | & \cdots & | \end{bmatrix}$$

Bemærk: Rækkefølgen af egenvektorerne i Q skal svare til rækkefølgen af egenverdierne i D .

Algebraisk multiplicitet

$am(\lambda)$ er antallet af gange egenverdi λ optræder i roden af $p_A(\lambda)$.

Eksempel: $\lambda^{10} \cdot (\lambda - 5)^6 \cdot (\lambda + 8)^{10} = 0 \implies am(-8) = 10, am(0) = 10, am(5) = 6$.

Geometrisk multiplicitet

$$gm(\lambda) = \dim(E_\lambda)$$

Eksempel: Givet $E_{-3} = \text{Span} \left\{ s \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$ er $gm(-3) = 2$.

Generel sammenhæng

$$1 \leq gm(\lambda) \leq am(\lambda) \leq \dim(V)$$

Sætning 12.2.4

15.4 – Koordinater med hensyn til egenvektor, når kun egenværdi er kendt

Hvis der gives to vektorer $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in V$ og en lineær afbildning $f : V \rightarrow V$, og det angives at $\mathbf{v}_1$ er en egenvektor tilhørende egenværdien λ_1 og $\mathbf{v}_2$ er en egenvektor tilhørende egenværdien λ_2 , kan koordinaterne for $f(2 \cdot v_1 - 4 \cdot v_2)$ med hensyn til basis $\beta = \{v_1, v_2\}$ findes som følger:

$$(2 \cdot \lambda_1, \quad -4 \cdot \lambda_2)$$

15.5 – Find Diagonalmatrix fra egenvektor matrix

Gives en matrix $A \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ og en invertibel matrix $Q \begin{bmatrix} w & x \\ y & z \end{bmatrix}$ bestående af egenvektorerne til A som søjler, kan diagonalmatrix D findes ved at gange hver af søjlerne i Q med A , og se hvilket multiplum af søjlen man får.

15.6 – Andet

For en 2×2 matrix med kendt determinant og en egenværdi er den anden egenværdi givet ved

$$\lambda_2 = \frac{\det(A)}{\lambda_1}.$$

Med x forskellige egenværdier er der mindst x lineært uafhængige egenvektorer.

Egenværdierne for A^{-1} er givet ved $\frac{1}{\lambda_i}$ hvor λ_i er egenværdierne for A .

2 lineært uafhængige egenvektorum har kun én fælles vektor, nemlig nulvektoren.

16 Systemer af lineære ODE'er

En ordinær differentiaalligning er en ligning på formen

$$F(f^{(n)}(t), \dots, f'(t), f(t), t) = 0$$

Definition 13.0.1

Notationen betyder at F er en funktion der tager $n + 2$ variabler, og de variabler er så de forskellige afledede af funktionen $f(t)$ samt t selv.

En løsning er en funktion $f(t)$, som opfylder ligningen for alle $t \in \mathbb{R}$.

16.1 – Lineær førsteordens ODE

$$f'(t) = a(t)f(t) + q(t)$$

hvor $a(t), q(t)$ er funktioner i t og $q(t)$ er en *forcing function* er den generelle form for en lineær førsteordens ODE.

Hvis $q(t) = 0$, er ODE'en homogen.

16.2 – Er differentiaalligningen lineær?

En differentiaalligning med $f(t)$ er lineær hvis:

1. Ikke indeholder funktioner som $\sin(f(t))$, $e^{f(t)}$, $f(t)^2$, $f(t) \cdot f'(t)$ osv.
2. Hver afledede af $f(t)$ optræder kun i første potens.
3. mm.

Eksempel: Følgende er lineære.

$$\begin{aligned}f'(t) + 2f(t) &= 0 \\f'(t) + (t+1) \cdot f(t) + 4 &= t^3 - 2t \\f'(t) + t^2 \cdot (f(t) + 4) &= 0\end{aligned}$$

16.3 – Find førstegradspolynomium

Givet en lineær førsteordens ODE og viden at løsningen er et polynomium af første grad, $f(t) = c_1 t + c_0$, kan man finde konstanterne c_1 og c_0 ved at indsætte $f(t)$ i ODE'en og løse for konstanterne.

$f'(t) = c_1$, så indsætter vi i ODE'en og får en ligning i t . Vi kan så sammenligne koefficienterne for hver potens af t på begge sider af ligningen for at finde c_1 og c_0 .

16.4 – Løs matrix ODE

Givet en matrix A og en ODE på formen

$$\begin{bmatrix} f_1'(t) \\ f_2'(t) \end{bmatrix} = \mathbf{A} \cdot \begin{bmatrix} f_1(t) \\ f_2(t) \end{bmatrix}$$

Kan løsningen findes ved at finde egenværdierne og egenvektorerne for matrixen A . Da kan løsningen skrives som

$$c_1 e^{\lambda_1 t} v_1 + c_2 e^{\lambda_2 t} v_2$$

16.5 – Løs for betingelsesværdier

Givet den generelle løsning til en ODE med konstanter $c_1, c_2, \dots, c_n$ og begyndelsesværdier

$$\begin{bmatrix} f_1(t) \\ f_2(t) \end{bmatrix} = c_1 \cdot \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} \cdot e^{\lambda_1 t} + c_2 \cdot \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix} \cdot e^{\lambda_2 t}$$

Kan c_1, c_2 findes ved at udregne LLS'et med indsatte begyndelsesværdier.

Eksempel: Egenværdier 2, 4 med egenvektorer $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$

Den generelle løsning:

$$\begin{bmatrix} f_1(t) \\ f_2(t) \end{bmatrix} = c_1 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot e^{2t} + c_2 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \cdot e^{4t}$$

Med begyndelseværdier $\begin{bmatrix} f_1(0) \\ f_2(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \end{bmatrix}$ vil værdierne indsættes og give

$$\begin{bmatrix} 6 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 \cdot e^0 + c_2 \cdot e^0 \\ c_1 \cdot e^0 - c_2 \cdot e^0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{Siden } e^0=1} \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 + c_2 \\ c_1 - c_2 \end{bmatrix}$$

Som LLS er det:

$$\begin{cases} 6 = c_1 + c_2 \\ 0 = c_1 - c_2 \end{cases}$$

Her er det tydeligt at $c_1 = c_2$, og at $c_1 + c_2 = 6$, derfor $c_1 = c_2 = 3$.

$$\begin{bmatrix} f_1(t) \\ f_2(t) \end{bmatrix} = 3 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot e^{2t} + 3 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \cdot e^{4t}$$

16.6 – Løs Lineære anden-ordens ODE'er

Homogen

En homogen lineær anden-ordens ODE er på formen

$$f''(t) + a_1(t)f'(t) + a_0(t)f(t) = 0$$

Karakteristisk Polynomium

Det karakteristiske polynomium for en homogen lineær anden-ordens ODE med konstante koefficienter er:

$$Z^2 + a_1Z + a_0 = 0$$

Find determinanten af det karakteristiske polynomium:

$$D = a_1^2 - 4a_0$$

$D > 0$

Her vil rødderne være:

$$\lambda_1 = \frac{-a_1 + \sqrt{D}}{2} \quad \lambda_2 = \frac{-a_1 - \sqrt{D}}{2}$$

Den generelle løsning er da:

$$f(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t}$$

$D = 0$

Her vil rødderne være:

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \frac{-a_1}{2}$$

Den generelle løsning er da:

$$c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 t e^{\lambda_2 t}$$

$D < 0$

Her vil rødderne være:

$$\lambda_1 = \frac{-a_1 + i\sqrt{|D|}}{2} \quad \lambda_2 = \frac{-a_1 - i\sqrt{|D|}}{2}$$

Den generelle (reelle) løsning er da:

$$f(t) = c_1 e^{\frac{-a_1}{2}t} \cos\left(\frac{\sqrt{|D|}}{2}t\right) + c_2 e^{\frac{-a_1}{2}t} \sin\left(\frac{\sqrt{|D|}}{2}t\right)$$


c er en konstant, x er en variabel, og $f(x)$ og $g(x)$ er funktioner af x .

$$\sec a = \frac{1}{\cos a} \quad \csc a = \frac{1}{\sin a} \quad \cot a = \frac{1}{\tan a}$$

Funktion	Værdier	Funktioner
Konstant	$(c)' = 0$	
Linear	$(x)' = 1$	$(f(x))' = f'(x)$
Konstantled	$(cx)' = c$	$(c \cdot f(x))' = c \cdot f'(x)$
Sum		$(f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x)$
Difference		$(f(x) - g(x))' = f'(x) - g'(x)$
Produkt		$(f(x) \cdot g(x))' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$
Kvotient		$\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{(g(x))^2}$
Sammensat		$f(g(x))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$
Exponent	$(x^n)' = nx^{n-1}$	$((f(x))^n)' = n(f(x))^{n-1} \cdot f'(x)$
Sinus	$(\sin x)' = \cos x$	$(\sin f(x))' = \cos(f(x)) \cdot f'(x)$
Cosinus	$(\cos x)' = -\sin x$	$(\cos f(x))' = -\sin(f(x)) \cdot f'(x)$
Tangens	$(\tan x)' = \sec^2 x$	$(\tan f(x))' = \sec^2(f(x)) \cdot f'(x)$
Secans	$(\sec x)' = \sec x \tan x$	$(\sec f(x))' = \sec(f(x)) \tan(f(x)) \cdot f'(x)$
Cosecans	$(\csc x)' = -\csc x \cot x$	$(\csc f(x))' = -\csc(f(x)) \cot(f(x)) \cdot f'(x)$
Cotangens	$(\cot x)' = -\csc^2 x$	$(\cot f(x))' = -\csc^2(f(x)) \cdot f'(x)$
Euler	$(e^{cx})' = c \cdot e^{cx}$	$(e^{f(x)})' = e^{f(x)} \cdot f'(x)$
Exponent	$(a^x)' = a^x \ln a$	$(a^{f(x)})' = a^{f(x)} \ln a \cdot f'(x)$
ln	$(\ln x)' = \frac{1}{x}$	$(\ln f(x))' = \frac{f'(x)}{f(x)}$
log _a	$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$	$(\log_a f(x))' = \frac{f'(x)}{f(x) \ln a}$

Funktion	Integrering
Konstant	$\int a \, dx = ax + C$
Lineær	$\int ax \, dx = \frac{ax^2}{2} + C$
Sammensat	$\int f(x) + g(x) \, dx = \int f(x) \, dx + \int g(x) \, dx$
Eksponent $n \neq -1$	$\int x^n \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$
Eksponent $n = -1$	$\int \frac{1}{x} \, dx = \ln x + C$
Sinus	$\int \sin(ax) \, dx = -\frac{1}{a} \cos(ax) + C$
Cosinus	$\int \cos(ax) \, dx = \frac{1}{a} \sin(ax) + C$
Tangens	$\int \tan(ax) \, dx = \frac{1}{a} \ln \sec(ax) + C$
Secans	$\int \sec(ax) \, dx = \frac{1}{a} \ln \sec(ax) + \tan(ax) + C$
Cosecans	$\int \csc(ax) \, dx = -\frac{1}{a} \ln \csc(ax) + \cot(ax) + C$
Cotangens	$\int \cot(ax) \, dx = \frac{1}{a} \ln \sin(ax) + C$
Secans ²	$\int \sec^2(ax) \, dx = \frac{1}{a} \tan(ax) + C$
Cosecans ²	$\int \csc^2(ax) \, dx = -\frac{1}{a} \cot(ax) + C$
Euler	$\int e^{ax} \, dx = \frac{1}{a} \cdot e^{ax} + C$
Eksponent	$\int a^x \, dx = \frac{a^x}{\ln(a)} + C$
Ln	$\int \ln(ax) \, dx = x \ln(ax) - x + C$
Log _b	$\int \log_b(ax) \, dx = \frac{x \cdot \ln(ax) - x}{\ln(b)} + C$

Enhedscirklen



Sammenhæng mellem positive og negative radianer:

0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{3}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{6}$	2π
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
-2π	$-\frac{11\pi}{6}$	$-\frac{7\pi}{4}$	$-\frac{5\pi}{3}$	$-\frac{3\pi}{2}$	$-\frac{4\pi}{3}$	$-\frac{5\pi}{4}$	$-\frac{7\pi}{6}$	$-\pi$	$-\frac{5\pi}{6}$	$-\frac{3\pi}{4}$	$-\frac{2\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{6}$	0

Tangens-tabel

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	$-\frac{5\pi}{6}$	$-\frac{3\pi}{4}$	$-\frac{2\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{6}$
$\tan(x)$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	-	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	-	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$

$$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$