

# Kombinatorische Gruppentheorie

Vorlesung im Sommersemester 2022

Benjamin Sambale  
Leibniz Universität Hannover

22. August 2026

$$M_{11} = \langle x, y, z \mid x^{11} = y^5 = z^4 = (xz)^3 = 1, \, xyx^{-1} = x^4, \, zyz^{-1} = y^2 \rangle$$

| $x$ | $x^{-1}$ | $y$ | $y^{-1}$ | $z$ | $z^{-1}$ |
|-----|----------|-----|----------|-----|----------|
| 2   | 3        | 1   | 1        | 4   | 4        |
| 5   | 1        | 6   | 7        | 8   | 9        |
| 1   | 10       | 11  | 12       | 11  | 13       |
| 14  | 15       | 4   | 4        | 1   | 1        |
| 6   | 2        | 13  | 11       | 5   | 5        |
| 7   | 5        | 10  | 2        | 16  | 16       |
| 17  | 6        | 2   | 17       | 14  | 18       |
| 19  | 9        | 9   | 18       | 10  | 2        |
| 8   | 16       | 14  | 8        | 2   | 10       |
| 3   | 11       | 17  | 6        | 9   | 8        |
| 10  | 12       | 5   | 3        | 12  | 3        |
| 11  | 13       | 3   | 13       | 13  | 11       |
| 12  | 17       | 12  | 5        | 3   | 12       |
| 20  | 4        | 16  | 9        | 17  | 7        |
| 4   | 18       | 21  | 22       | 21  | 19       |
| 9   | 20       | 18  | 14       | 6   | 6        |
| 13  | 7        | 7   | 10       | 18  | 14       |
| 15  | 21       | 8   | 16       | 7   | 17       |
| 22  | 8        | 22  | 20       | 15  | 22       |
| 16  | 14       | 19  | 21       | 20  | 20       |
| 18  | 22       | 20  | 15       | 22  | 15       |
| 21  | 19       | 15  | 19       | 19  | 21       |

# Inhaltsverzeichnis

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Vorwort                                    | 2   |
| 1 Freie Gruppen                            | 3   |
| 2 Untergruppen freier Gruppen              | 11  |
| 3 Automorphismen freier Gruppen            | 18  |
| 4 Gruppen-Erweiterungen                    | 21  |
| 5 Zentrale Erweiterungen                   | 32  |
| 6 Erweiterungen der alternierenden Gruppen | 47  |
| 7 Symplektische Gruppen                    | 53  |
| 8 Unitäre Gruppen                          | 59  |
| 9 Orthogonale Gruppen                      | 68  |
| 10 Sporadische Gruppen                     | 72  |
| 11 Coxetergruppen                          | 83  |
| 12 Freie Produkte und Amalgame             | 102 |
| 13 Das Burnside-Problem                    | 108 |
| 14 Gruppenklassen und Varietäten           | 121 |
| 15 $p$ -Gruppen                            | 127 |
| 16 Entscheidbarkeitsprobleme               | 135 |
| Aufgaben                                   | 137 |
| Stichwortverzeichnis                       | 143 |

## Vorwort

In der kombinatorischen Gruppentheorie werden Gruppen hauptsächlich mittels Erzeuger und Relationen studiert. Naturgemäß muss man sich daher größtenteils mit unendlichen Objekten auseinandersetzen. Eine der wichtigsten Motivationen ist das *Burnside-Problem*: Ist jede endlich erzeugte Gruppe mit endlichem Exponenten endlich? Da gelegentlich geometrische Argumente zum Einsatz kommen (zum Beispiel bei Coxetergruppen), spricht man alternativ auch von *geometrischer Gruppentheorie*.

Dieses Skript entstand im Rahmen einer 3 + 1 Vorlesung im Sommersemester 2022 an der Leibniz Universität Hannover. Die Vorlesung schließt an meine Gruppentheorie-Vorlesung im Wintersemester

2020/21 an und setzt entsprechende Kenntnisse voraus (Verweise sind mit GT gekennzeichnet). An einigen Stellen gibt es Doppelungen in beiden Vorlesungen. Die Gründe dafür sind:

- Kenntnisse ins Gedächtnis zurückrufen.
- Alternative Beweismethoden vorstellen.
- Themen, die zwar im Gruppentheorie-Skript stehen, aber dort aus Zeitgründen nicht behandelt wurden (Beispiel: Schur-Erweiterungen).

Die Kapitel 3, 5, 8 und 11–15 wurden nicht behandelt (darin sind also mehr Fehler zu erwarten). Um das Rechnen mit (realistischen) Beispielen praktikabel zu gestalten, geben wir an vielen Stellen Befehle für das kostenlose Computeralgebrasystem GAP an. An dieser Stelle vielen Dank an Thomas Breuer für nützliche Ratschläge. Ich bedanke mich ebenso bei Annika Bartelt, Luca Blaas, Adrian Homma, Scheima Obeidi, Claude Opus und Tim Wittenberg für einige Fehlerhinweise.

Literatur:

- T. Camps, V. Rebel, G. Rosenberger, *Einführung in die kombinatorische und die geometrische Gruppentheorie*, Heldermann Verlag, Lemgo, 2008<sup>1</sup>
- M. Hall, *The Theory of Groups*, 4th printing, The Macmillan Company, New York, 1963<sup>2</sup>
- D. J. S. Robinson, *A Course in the Theory of Groups*, 2nd edition, Springer, New York, 1996<sup>3</sup>
- W. Magnus, A. Karrass, D. Solitar, *Combinatorial Group Theory*, 2nd edition, Dover, Mineola, 2004<sup>4</sup>
- R. C. Lyndon, P. E. Schupp, *Combinatorial Group Theory*, Springer, Berlin, 1977
- J. E. Humphreys, *Reflection groups and Coxeter groups*, Cambridge University Press, Cambridge, 1994
- D. L. Johnson, *Presentations of Groups*, 2nd edition, Cambridge University Press, Cambridge, 1997
- H. S. M. Coxeter, W. O. J. Moser, *Generators and Relations for Discrete Groups*, 4th edition, Springer, Berlin, 1980
- The GAP Group, *GAP – Groups, Algorithms, and Programming, Version 4.11.1*; 2021, (<https://www.gap-system.org>).

## 1 Freie Gruppen

**Bemerkung 1.1.** Eine Basis  $B$  eines Vektorraums  $V$  lässt sich durch folgende Eigenschaft charakterisieren: Für jeden Vektorraum  $W$  besitzt jede Abbildung  $B \rightarrow W$  genau eine lineare Fortsetzung  $V \rightarrow W$ . Auf diese Weise kann man Basen für beliebige (nicht-abelsche) Gruppen definieren. Im Gegensatz zu Vektorräumen besitzen die meisten Gruppen aber keine Basen.

---

<sup>1</sup>Fokus auf den geometrischen Aspekt.

<sup>2</sup>Behandelt endliche und unendliche Gruppen gleichberechtigt. Trotz seines Alters gut zu lesen.

<sup>3</sup>Etwas moderner und umfangreicher als Hall.

<sup>4</sup>Unveränderter Neudruck der 1975 erschienenen Ausgabe. Kleine Schrift, viel Fließtext, schwer zu lesen.

**Definition 1.2** (Universelle Eigenschaft). Eine Gruppe  $F$  heißt *frei* bzgl. einer Teilmenge  $X \subseteq F$ , falls für jede Gruppe  $G$  und jede Abbildung  $\sigma: X \rightarrow G$  genau ein Homomorphismus  $\hat{\sigma}: F \rightarrow G$  mit  $\hat{\sigma}(x) = \sigma(x)$  für alle  $x \in X$  existiert (d. h.  $\hat{\sigma}$  ist eine Fortsetzung von  $\sigma$ ).

**Beispiel 1.3.**

- (i) Die triviale Gruppe  $F = 1$  ist die einzige freie Gruppe bzgl.  $X = \emptyset$ , denn jede nicht-triviale Gruppe  $F$  besitzt mindestens zwei Endomorphismen.
- (ii) Die Gruppe  $\mathbb{Z}$  ist frei bzgl.  $X = \{1\}$ , denn jede Abbildung  $\sigma: X \rightarrow G$  besitzt die eindeutige Fortsetzung  $\mathbb{Z} \rightarrow G$ ,  $n \mapsto \sigma(1)^n$ .

**Definition 1.4.** Sei  $X$  eine Menge, die wir *Alphabet* nennen. Die Elemente von  $X$  heißen *Buchstaben*. Sei  $W$  die Menge aller *Worte* der Form  $w = x_1^{\epsilon_1} \dots x_n^{\epsilon_n}$  mit  $n \in \mathbb{N}_0$ ,  $x_1, \dots, x_n \in X$  und  $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n \in \{\pm 1\}$ . Dabei heißt  $|w| := n$  die *Länge* von  $w$ . Für  $n = 0$  erhält man das *leere* Wort  $w = 1$ . Gilt  $x_i \neq x_{i+1}$  oder  $\epsilon_i = \epsilon_{i+1}$  für  $i = 1, \dots, n-1$ , so heißt  $w$  *reduziert*. Offenbar kann man jedes Wort  $w$  in ein reduziertes Wort überführen, indem man Teile der Form  $xx^{-1}$  oder  $x^{-1}x$  sukzessiv streicht. Zwei Worte  $v, w \in W$  heißen *äquivalent*, wenn man sie in das gleiche reduzierte Wort überführen kann. Dies ist eine Äquivalenzrelation auf  $W$ . Die Menge der Äquivalenzklassen  $F_X := \{[w] : w \in W\}$  bildet dann eine Gruppe bzgl. Konkatenation, d. h.

$$[w][v] := [wv] \quad [w], [v] \in F_X.$$

Das neutrale Element ist die Äquivalenzklasse des leeren Worts  $[1]$ . Das Inverse von  $[x_1^{\epsilon_1} \dots x_n^{\epsilon_n}]$  ist  $[x_n^{-\epsilon_n} \dots x_1^{-\epsilon_1}]$ . Indem man  $x \in X$  mit  $[x] \in F_X$  identifiziert, kann man  $X \subseteq F_X$  annehmen.

**Satz 1.5.**

- (i)  $F_X$  ist frei bzgl.  $X$ .
- (ii) Jede freie Gruppe bzgl.  $X$  ist zu  $F_X$  isomorph.
- (iii) Es gilt  $F_X \cong F_Y$  genau dann, wenn  $X$  und  $Y$  gleichmächtig sind.

*Beweis.*

- (i) Sei  $G$  eine Gruppe und  $\sigma: X \rightarrow G$ . Für  $w = x_1^{\epsilon_1} \dots x_n^{\epsilon_n} \in W$  definieren wir

$$\hat{\sigma}(w) := \sigma(x_1)^{\epsilon_1} \dots \sigma(x_n)^{\epsilon_n} \in G.$$

Für äquivalente Wörter  $v, w \in W$  gilt offenbar  $\hat{\sigma}(v) = \hat{\sigma}(w)$ . Somit induziert  $\hat{\sigma}$  eine wohldefinierte Abbildung  $F_X \rightarrow G$ , die wir ebenfalls mit  $\hat{\sigma}$  bezeichnen. Wegen  $\hat{\sigma}(wv) = \hat{\sigma}(w)\hat{\sigma}(v)$  für  $w, v \in W$  ist  $\hat{\sigma}$  ein Homomorphismus. Wegen  $F_X = \langle X \rangle$  ist  $\hat{\sigma}$  eindeutig durch  $\sigma$  bestimmt.

- (iii) Sei  $\sigma: X \rightarrow Y$  eine Bijektion. Dann existieren Homomorphismen  $\alpha: F_X \rightarrow F_Y$  und  $\beta: F_Y \rightarrow F_X$  mit  $\alpha|_X = \sigma$  und  $\beta|_Y = \sigma^{-1}$ . Also ist  $\alpha\beta: F_Y \rightarrow F_Y$  eine Fortsetzung von  $\text{id}_Y$ . Aus der universellen Eigenschaft folgt  $\alpha\beta = \text{id}_{F_Y}$ . Analog zeigt man  $\beta\alpha = \text{id}_{F_X}$ . Also ist  $\alpha$  ein Isomorphismus zwischen  $F_X$  und  $F_Y$ .

Sei umgekehrt ein Isomorphismus  $\alpha: F_X \rightarrow F_Y$  gegeben. Wir betrachten

$$N_X := \langle g^2, [g, h] : g, h \in F_X \rangle \trianglelefteq F_X$$

und  $\overline{F_X} := F_X/N_X$ . Wegen  $\alpha(N_X) = \langle \alpha(g), [\alpha(g), \alpha(h)] : g, h \in F_X \rangle = N_Y$  ist  $\overline{F_X} \cong \overline{F_Y}$ . Nach Konstruktion ist  $\overline{F_X}$  eine abelsche Gruppe mit  $\overline{g}^2 = 1$  für alle  $\overline{g} \in \overline{F_X}$ . Durch die Skalarmultiplikation  $\lambda \overline{g} := \overline{g}^\lambda$  für  $\lambda \in \mathbb{F}_2$  wird  $\overline{F_X}$  ein  $\mathbb{F}_2$ -Vektorraum (eine unendliche Version der elementarabelschen Gruppen aus GT). Die Elemente  $\overline{x} := xN_X$  mit  $x \in X$  bilden ein Erzeugendensystem von  $\overline{F_X}$ . Nehmen wir an es gibt paarweise verschiedene  $x_1, \dots, x_n \in X$  mit  $x_1 \dots x_n \in N_X$ . Sei  $\sigma: X \rightarrow \mathbb{F}_2$  mit  $\sigma(x_1) = 1$  und  $\sigma(x_i) = 0$  für  $i = 2, \dots, n$ . Sei  $\hat{\sigma}: F_X \rightarrow \mathbb{F}_2$  die Fortsetzung von  $\sigma$ . Wegen  $\hat{\sigma}(g^2) = 2\hat{\sigma}(g) = 0$  und  $\hat{\sigma}([g, h]) = \hat{\sigma}(g) + \hat{\sigma}(h) - \hat{\sigma}(g) - \hat{\sigma}(h) = 0$  ist  $x_1 \dots x_n \in N_X \subseteq \text{Ker}(\hat{\sigma})$ . Dies widerspricht  $\hat{\sigma}(x_1 \dots x_n) = \sigma(x_1) = 1$ . Also ist  $x_1 \dots x_n \notin N_X$ . Dies zeigt, dass  $\{\overline{x} : x \in X\}$  eine Basis von  $\overline{F_X}$  ist. Also folgt  $|X| = \dim \overline{F_X} = \dim \overline{F_Y} = |Y|$ .<sup>5</sup>

(ii) Folgt wie in (iii) (es wird nur die universelle Eigenschaft benutzt).  $\square$

**Definition 1.6.** Ist  $F$  frei bzgl.  $X$ , so nennt man  $\text{rk } F := |X|$  den *Rang* von  $F$ . Nach Satz 1.5 gibt es bis auf Isomorphie nur eine freie Gruppe vom Rang  $r \in \mathbb{N}$ . Diese bezeichnen wir mit  $F_r$ .

**Lemma 1.7** (vgl. GT-Aufgabe 60). *Jedes Wort  $w \in W$  ist zu genau einem reduzierten Wort  $\tilde{w} \in W$  äquivalent.*

*Beweis* (VAN DER WAERDEN). Wir wissen bereits, dass  $w$  zu mindestens einem reduzierten Wort äquivalent ist. Für die Eindeutigkeit sei  $R \subseteq W$  die Menge aller reduzierten Wörter. Für  $r = x_1^{\epsilon_1} \dots x_n^{\epsilon_n} \in R$  und  $x \in X$  sei

$$x_r := \begin{cases} xx_1^{\epsilon_1} \dots x_n^{\epsilon_n} & \text{falls } x \neq x_1^{-\epsilon_1}, \\ x_2^{\epsilon_2} \dots x_n^{\epsilon_n} & \text{falls } x = x_1^{-\epsilon_1}. \end{cases}$$

Offenbar induziert  $x$  eine Permutation  $\sigma(x) \in \text{Sym}(R)$  mit Umkehrabbildung  $\sigma(x^{-1})$ . Nach der universellen Eigenschaft setzt sich  $\sigma$  zu einer Operation  $F_X \rightarrow \text{Sym}(R)$  fort. Für äquivalente reduzierte Wörter  $v, w \in R$  gilt

$$v = [v]_1 = [w]_1 = w. \quad \square$$

**Bemerkung 1.8.**

- (i) Für  $r \geq 2$  ist  $F_r$  nicht-abelsch, denn  $xyx^{-1}y^{-1} \neq 1$  ist reduziert für  $x \neq y$ .
- (ii) Sei  $w = x_1^{\epsilon_1} \dots x_n^{\epsilon_n} \in W$  reduziert mit endlicher Ordnung  $k$  in  $F_X$ . Indem man notfalls mit  $x_1^{-\epsilon_1}$  konjugiert, kann man  $x_1^{\epsilon_1} \neq x_n^{-\epsilon_n}$  annehmen. Dann ist auch  $w^k$  reduziert und es folgt  $w = 1$ . Also ist  $F_r$  torsionsfrei.

**Folgerung 1.9.** *Ist  $F$  frei bzgl.  $X \subseteq F$ , so lässt sich jedes Element von  $F$  eindeutig in der Form  $x_1^{a_1} \dots x_n^{a_n}$  schreiben, wobei  $n \in \mathbb{N}_0$ ,  $x_1, \dots, x_n \in X$  mit  $x_i \neq x_{i+1}$  für  $i = 1, \dots, n-1$  und  $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ . Insbesondere ist  $F = \langle X \rangle$ .*

*Beweis.* O.B.d.A. sei  $F = F_X$ . Jedes Element lässt sich nach Lemma 1.7 eindeutig in reduzierter Form schreiben. Indem man gleiche Buchstaben zusammenfasst, erhält man eine Darstellung in der gewünschten Form.  $\square$

**Bemerkung 1.10.** Nach Cayley ist jede Gruppe zu einer Untergruppe einer symmetrischen Gruppe isomorph. Die freien Gruppen besitzen eine duale Eigenschaft.

---

<sup>5</sup>benötigt das Auswahlaxiom, falls  $|X| = \infty$

**Satz 1.11.** Jede Gruppe  $G$  ist zu einer Faktorgruppe einer freien Gruppe  $F$  isomorph. Lässt sich  $G$  durch  $n$  Elemente erzeugen, so kann man  $\text{rk } F = n$  wählen.

*Beweis.* Sei  $X$  ein Erzeugendensystem von  $G$  (notfalls  $X = G$ ). Dann lässt sich die Inklusion  $X \rightarrow G$  zu einem Epimorphismus  $F_X \rightarrow G$  fortsetzen. Die Behauptung folgt aus dem Homomorphiesatz.  $\square$

**Beispiel 1.12.** Sei

$$a := \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad b := \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Wir zeigen, dass  $G := \langle a, b \rangle \leq \text{GL}(2, \mathbb{Q})$  frei bzgl.  $\{a, b\}$  ist. Sei dafür  $X = \{x, y\}$  und  $\varphi: F_X \rightarrow G$  der Epimorphismus mit  $\varphi(x) = a$  und  $\varphi(y) = b$ . Angenommen es gibt ein nicht-triviales reduziertes Wort  $w := z_1^{k_1} \dots z_n^{k_n} \in \text{Ker}(\varphi)$  mit  $z_1, \dots, z_n \in X$  und  $k_1, \dots, k_n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ . Nach Konjugation können wir  $z_n = x$  und  $k_n > 0$  annehmen. Dann gilt  $1 = \varphi(w) = \dots a^{k_{n-2}} b^{k_{n-1}} a^{k_n}$ . Für  $k \in \mathbb{Z}$  gilt

$$a^k := \begin{pmatrix} 1 & 2k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad b^k := \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2k & 1 \end{pmatrix}$$

(Induktion nach  $k$ ). Sei

$$V_{>} := \{(s, t) \in \mathbb{Q}^2 : |s| > |t|\}, \quad V_{<} := \{(s, t) \in \mathbb{Q}^2 : |s| < |t|\}.$$

Für  $v := (1, 1) \in \mathbb{Q}^2$  gilt  $a^{k_n} v = (2k_n + 1, 1) \in V_{>}$  wegen  $k_n > 0$ . Für  $v = (s, t) \in V_{>}$  gilt  $b^{k_{n-1}} v = (s, 2k_{n-1}s + t) \in V_{<}$ , denn  $|2k_{n-1}s + t| \geq 2|k_{n-1}||s| - |t| > |s|$  (Dreiecksungleichung) wegen  $k_{n-1} \neq 0$ . Analog gilt  $a^{k_{n-2}} v \in V_{>}$  für  $v \in V_{<}$  usw.<sup>6</sup> Dies ergibt den Widerspruch

$$(1, 1) = \varphi(w)(1, 1) = \dots a^{k_{n-2}} b^{k_{n-1}} a^{k_n}(1, 1) \in V_{>} \cup V_{<}.$$

Also ist  $\varphi$  injektiv und  $G \cong F_X \cong F_2$ .

**Bemerkung 1.13.**

- (i) Sei  $X$  ein Erzeugendensystem für  $G$  und  $\sigma: F_X \rightarrow G$  mit  $\sigma(x) = x$  wie in Satz 1.11. Die Elemente in  $\text{Ker}(\sigma)$  nennt man *Relatoren* für  $G$  bzgl.  $X$ . Für  $x_1^{\epsilon_1} \dots x_n^{\epsilon_n} \in \text{Ker}(\sigma)$  gilt also  $x_1^{\epsilon_1} \dots x_n^{\epsilon_n} = 1$  in  $G$ . Eine Gleichung dieser Form heißt *Relation* für  $G$  bzgl.  $X$ .
- (ii) Sei umgekehrt  $R \subseteq F_X$ . Sei  $N := \langle R \rangle^{F_X} := \langle gRg^{-1} : g \in F_X \rangle \trianglelefteq F_X$  der normale Abschluss von  $R$  in  $F_X$ . Wir setzen

$$G := \langle X \mid R \rangle = \langle X \mid \{r = 1 : r \in R\} \rangle := F_X / N.$$

Man identifiziert Buchstaben  $x \in X$  oft mit ihren Nebenklassen  $xN \in G$  (im Allgemeinen nicht injektiv!). Ist  $|X| + |R| < \infty$ , so nennt man  $G$  *endlich präsentiert*. Auf diese Weise lässt sich jede Gruppe durch Erzeuger und Relationen beschreiben (dies entspricht der Aussage, dass jeder Vektorraum die Lösungsmenge eines linearen Gleichungssystems ist). Im Allgemeinen ist es jedoch schwierig die Eigenschaften von  $G$  aus  $X$  und  $R$  abzulesen.

**Beispiel 1.14.**

- (i)  $\langle X \mid \emptyset \rangle \cong F_X$ .

---

<sup>6</sup>Das Argument nennt sich *Ping-Pong-Lemma*.

(ii)  $\langle x \mid x^n \rangle = \langle x \mid x^n = 1 \rangle \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong C_n$ .

(iii) Jede endliche Gruppe  $G$  ist endlich präsentiert: Sei  $X := \{x_g : g \in G\}$ ,  $R := \{x_g x_h x_{gh}^{-1} : g, h \in G\}$  und  $N := \langle R \rangle^{F_X}$ . Dann existiert ein Epimorphismus  $\varphi: F_X \rightarrow G$  mit  $\varphi(x_g) = g$  und  $R \subseteq \text{Ker}(\varphi)$ . Wegen  $\text{Ker}(\varphi) \trianglelefteq F_X$  ist auch  $N \subseteq \text{Ker}(\varphi)$ . Sei umgekehrt  $w := x_{g_1}^{\epsilon_1} \dots x_{g_n}^{\epsilon_n} \in \text{Ker}(\varphi)$ . Wegen  $x_1 = x_1 x_1 x_1^{-1} \in R$  und  $x_g x_{g^{-1}} x_1^{-1} \in R$  ist  $x_g x_{g^{-1}} \in \langle R \rangle$  und  $x_g^{-1} \equiv x_{g^{-1}} \pmod{N}$ . Es folgt

$$w \equiv x_{g_1}^{\epsilon_1} \dots x_{g_n}^{\epsilon_n} \equiv x_{g_1}^{\epsilon_1} x_{g_2}^{\epsilon_2} x_{g_3}^{\epsilon_3} \dots \equiv x_{g_1}^{\epsilon_1} \dots x_{g_n}^{\epsilon_n} \equiv x_1 \equiv 1 \pmod{N}.$$

Also ist  $\text{Ker}(\varphi) \subseteq N$  und  $G = \langle X \mid R \rangle$ .

**Satz 1.15** (VON DYCK). Seien  $G = \langle x_i : i \in I \rangle$  und  $H = \langle y_i : i \in I \rangle$  Gruppen, sodass für jede Relation  $x_{i_1}^{\epsilon_1} \dots x_{i_n}^{\epsilon_n} = 1$  in  $G$  auch die Relation  $y_{i_1}^{\epsilon_1} \dots y_{i_n}^{\epsilon_n} = 1$  in  $H$  gilt. Dann existiert ein Epimorphismus  $G \rightarrow H$  mit  $f(x_i) = y_i$  für  $i \in I$ .

*Beweis.* Nach der universellen Eigenschaft existieren Epimorphismen  $f_G: F_I \rightarrow G$  und  $f_H: F_I \rightarrow H$  mit  $f_G(i) = x_i$  und  $f_H(i) = y_i$  für  $i \in I$ . Nach Voraussetzung gilt  $\text{Ker}(f_G) \leq \text{Ker}(f_H)$ . Also ist

$$G \cong F_I / \text{Ker}(f_G) \rightarrow (F_I / \text{Ker}(f_G)) / (\text{Ker}(f_H) / \text{Ker}(f_G)) \cong F_I / \text{Ker}(f_H) \cong H$$

der gesuchte Epimorphismus. □

**Bemerkung 1.16.** Man kann den Satz von von-Dyck benutzen, um undurchsichtige Gruppenpräsentationen durch bekannte Gruppen zu approximieren.

**Beispiel 1.17.**

- (i) Sei  $G := \langle x_1, \dots, x_n \mid [x_i, x_j] = 1 \ \forall i, j \rangle$ . Offenbar ist  $G$  abelsch und jedes Element in  $G$  hat die Form  $x_1^{a_1} \dots x_n^{a_n}$  mit  $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$ . Sei nun  $H := \langle y_1 \rangle \oplus \dots \oplus \langle y_n \rangle \cong C_\infty^n$ . Nach Satz 1.15 existiert ein Epimorphismus  $f: G \rightarrow H$  mit  $f(x_i) = y_i$  für  $i = 1, \dots, n$ . Offenbar ist  $f$  auch injektiv und  $G \cong H \cong C_\infty^n$ . Dies zeigt auch  $F_n / F'_n \cong C_\infty^n$ .
- (ii) Sei  $G = \langle x, y \rangle$  mit  $x \neq y$  und  $|\langle x \rangle| = |\langle y \rangle| = 2$ . Dann besteht  $G$  aus den Elementen der Form  $xyxy \dots$  und  $yxxy \dots$ . Ist  $G$  endlich, so gilt  $n := |\langle xy \rangle| \in \mathbb{N}$  und jedes Element hat die Form  $x^i (xy)^j$  mit  $0 \leq i \leq 1$  und  $0 \leq j \leq n-1$ . Dann folgt

$$G \cong D_{2n} := \langle \sigma, \tau \mid \sigma^n = \tau^2 = 1, \tau \sigma \tau = \sigma^{-1} \rangle,$$

wobei  $D_4 = C_2^2$ .

**Bemerkung 1.18** (GAP).

```
F:=FreeGroup("x","y");; #das doppelte Semikolon überdrückt die Ausgabe
AssignGeneratorVariables(F);;
G:=F/[x^2,y^3,(x*y)^5]; #endlich präsentierte Gruppe
Size(G);
H:=Image(IsomorphismPermGroup(G)); #isomorphe Permutationsgruppe (effizienter)
StructureDescription(H);

#Der umgekehrte Weg:
G:=Image(IsomorphismFpGroup(H));; #isomorphe endlich präsentierte Gruppe
RelatorsOfFpGroup(G); #neue Relationen
```

```

#Rechnen in der freien Gruppe:
x:=(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11);; y:=(3,7,11,8)(4,10,5,6);; #Permutationen von S11
G:=Group(x,y);;
epi:=GroupHomomorphismByImages(F,G,GeneratorsOfGroup(F),[x,y]);
z:=Random(G);
PreImagesRepresentative(epi,z); #Darstellung von z als Wort in x,y

```

**Satz 1.19** (NEUMANN). *Sei  $G$  endlich präsentiert und  $X$  ein beliebiges Erzeugendensystem von  $G$ . Dann existiert eine endliche Präsentation  $G = \langle X_0 \mid R \rangle$  mit  $X_0 \subseteq X$ .*

*Beweis.* Sei  $G = \langle y_1, \dots, y_n \mid s_1, \dots, s_m \rangle$  eine endliche Präsentation. Jedes  $y_i$  lässt sich durch endlich viele  $x \in X$  ausdrücken, sagen wir  $y_i = w_i(x)$ . Daher existiert eine endliche Teilmenge  $X_0 = \{x_1, \dots, x_k\} \subseteq X$  mit  $G = \langle X_0 \rangle$ . Umgekehrt lassen sich die  $x_i$  durch  $y_j$  ausdrücken, sagen wir  $x_i = v_i(y)$ . Man erhält folgende Relationen in  $X_0$ :

$$s_i(w_1(x), \dots, w_n(x)) = 1, \quad x_i = v_i(w_1(x), \dots, w_n(x)).$$

Sei  $R$  die Menge dieser Relatoren und  $H := \langle X_0 \mid R \rangle$ . Nach von-Dyck existiert ein Epimorphismus  $\varphi: H \rightarrow G$  mit  $\varphi(x_i) = x_i$  für  $i = 1, \dots, k$ . Man kann nun  $y_i := w_i(x)$  in  $H$  definieren. Wegen  $x_i = v_i(y_1, \dots, y_n)$  ist dann  $H = \langle y_1, \dots, y_n \rangle$ . Da die Relationen in  $s_i$  auch in  $H$  gelten, existiert ein Epimorphismus  $\psi: G \rightarrow H$  mit  $\psi(y_i) = y_i$  für  $i = 1, \dots, n$ . Wegen

$$\begin{aligned} \psi(\varphi(x_i)) &= \psi(x_i) = \psi(v_i(y)) = v_i(y) = x_i, \\ \varphi(\psi(y_i)) &= \varphi(y_i) = \varphi(w_i(x)) = w_i(x) = y_i \end{aligned}$$

sind  $\varphi$  und  $\psi$  zueinander inverse Isomorphismen. □

**Satz 1.20** (HALL). *Sei  $N \trianglelefteq G$ . Sind  $N$  und  $G/N$  endlich präsentiert, so auch  $G$ .*

*Beweis.* Sei  $N = \langle x_1, \dots, x_n \mid r_1, \dots, r_m \rangle$  und  $G/N = \langle y_1N, \dots, y_kN \mid s_1, \dots, s_l \rangle$ . Sicher ist  $G = \langle x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_k \rangle$ . Wegen  $s_i(y) \in N$  gelten Relationen  $s_i(y) = t_i(x)$ . Die Normalteiler-Eigenschaft lässt sich durch Relationen  $y_i x_j y_i^{-1} = u_{ij}(x)$  und  $y_i^{-1} x_j y_i = v_{ij}(x)$  ausdrücken. Wir definieren

$$H := \langle x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_k \mid \forall i, j : r_i, s_i(y) t_i(x)^{-1}, u_{ij}(x) y_i x_j^{-1} y_i^{-1}, v_{ij}(x) y_i^{-1} x_j^{-1} y_i \rangle.$$

Dann existiert ein Epimorphismus  $\varphi: H \rightarrow G$  mit  $\varphi(x_i) = x_i$  und  $\varphi(y_j) = y_j$ . Sei  $\tilde{N} := \langle x_1, \dots, x_n \rangle \leq H$ . Die Relationen  $u_{ij}$  und  $v_{ij}$  zeigen  $\tilde{N} \trianglelefteq H$ . Für  $h \in \tilde{N} \cap \text{Ker}(\varphi)$  gilt  $h \in \langle r_1, \dots, r_m \rangle^{F_X}$ . Dies zeigt  $h = 1$  und  $\tilde{N} \cap \text{Ker}(\varphi) = 1$ . Offenbar induziert  $\varphi$  einen Epimorphismus  $\bar{\varphi}: H/\tilde{N} \rightarrow G/N$  mit  $\bar{\varphi}(y_i \tilde{N}) = y_i N$ . Die Relationen  $r_i$ ,  $t_i$ ,  $u_{ij}$  und  $v_{ij}$  werden in  $H/\tilde{N}$  trivial. Also erfüllen  $H/\tilde{N}$  und  $G/N$  die gleichen Relationen ( $s_i(y) = 1$ ) und  $\bar{\varphi}$  ist ein Isomorphismus. Für  $h \in \text{Ker}(\varphi)$  gilt  $h \tilde{N} \in \text{Ker}(\bar{\varphi}) = 1$ , also  $h \in \tilde{N} \cap \text{Ker}(\varphi) = 1$ . Also ist  $\varphi$  ein Isomorphismus. □

**Satz 1.21.** *Sei  $G = \langle X \mid R \rangle$  mit  $X = \{x_1, \dots, x_n\}$  und  $R = \{r_1, \dots, r_k\}$ . Für  $i = 1, \dots, n$  sei  $r_i \equiv x_1^{a_{i1}} \dots x_n^{a_{in}} \pmod{F'_X}$ . Seien  $d_1 \mid \dots \mid d_l$  die Elementarteiler von  $A = (a_{ij}) \in \mathbb{Z}^{n \times k}$ , wobei  $l := \min\{n, k\}$ . Dann ist  $G/G' \cong \mathbb{Z}/d_1\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}/d_l\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^{n-l}$ . Insbesondere ist  $|G| = |G/G'| = \infty$ , falls  $k < n$ .*

*Beweis.* Sei  $F := F_X$ . Nach Beispiel 1.17 ist  $F/F'$  eine freie abelsche Gruppe vom Rang  $n$ . Für  $N := \langle rF' : r \in R \rangle \leq F/F'$  gilt nun  $G/G' \cong (F/F')/N \cong \mathbb{Z}/d_1\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}/d_s\mathbb{Z}$  (siehe Algebra-Skript). □



**Bemerkung 1.22.**

- (i) Nach Satz 1.21 kann man algorithmisch entscheiden, ob eine Gruppe endlich präsentierte Gruppe perfekt ist (dennoch weiß man nicht, ob die Gruppe trivial ist).
- (ii) Es sind nur wenige *endliche* Gruppen  $G = \langle X \mid R \rangle$  mit  $|X| = |R|$  bekannt (zum Beispiel  $Q_{2^n}$  nach Aufgabe 2).<sup>7</sup> Man vermutet sogar, dass sich jede solche Gruppe mit drei Elementen erzeugen lässt. Dies wurde für  $p$ -Gruppen bewiesen (vgl. Satz 5.25 und Aufgabe 22).

**Beispiel 1.23.** Sei  $G = \langle x, y \mid x^2 = y^3 = (xy)^7 = 1 \rangle$ . Dann erhält man die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \\ 7 & 7 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Also ist  $G = G'$  perfekt. Man kann nachrechnen, dass die Matrizen

$$x = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

in  $GL(3, 2)$  die Relationen erfüllen. Also gilt  $G \neq 1$ . Wir werden in Satz 11.50 zeigen, dass  $G$  unendlich ist.

**Lemma 1.24.** Sei  $N$  der normale Abschluss von  $Y \subseteq X$  in  $F_X$ . Dann ist  $F_X/N$  frei bzgl.  $X \setminus Y$ .

*Beweis.* O.B.d.A. sei  $\emptyset \neq Y \subset X$ . Jedes Element von  $N$  ist ein Produkt von Elementen der Form  $gwg^{-1}$  mit  $w \in \langle Y \rangle$  und  $g \in F_X$ . Die Summe der Exponenten eines Buchstaben  $x \in X \setminus Y$  in  $gwg^{-1}$  ist 0, denn  $x$  kann nur in  $g$  und  $g^{-1}$  auftreten. Dies zeigt, dass die Abbildung  $\sigma: X \setminus Y \rightarrow F/N$ ,  $x \mapsto xN$  injektiv ist. Wir zeigen, dass  $F_X/N$  frei bezüglich  $\sigma(X \setminus Y)$  ist. Sei  $G$  eine beliebige Gruppe und  $\alpha: X \setminus Y \rightarrow G$  eine Funktion. Setzt man

$$\bar{\alpha}(x) := \begin{cases} 1 & \text{falls } x \in Y \\ \alpha(x) & \text{falls } x \notin Y \end{cases}$$

für  $x \in X$ , so erhält man eine Fortsetzung  $\bar{\alpha}: X \rightarrow G$  von  $\alpha$ . Da  $F$  frei bzgl.  $X$  ist, gibt es einen Homomorphismus  $\bar{\beta}: F \rightarrow G$  mit  $\bar{\beta}(x) = \bar{\alpha}(x)$  für alle  $x \in X$ . Offenbar ist dann  $N \leq \text{Ker}(\bar{\beta})$ . Daher gibt es einen Homomorphismus  $\beta: F/N \rightarrow (F/N)/(\text{Ker}(\bar{\beta})/N) \rightarrow F/\text{Ker}(\bar{\beta}) \rightarrow G$  mit  $\beta(\sigma(x)) = \alpha(x)$  für alle  $x \in X \setminus Y$ . Sei nun  $\beta': F/N \rightarrow G$  ein weiterer Homomorphismus mit  $\beta'(\sigma(x)) = \alpha(x)$  für alle  $x \in X \setminus Y$ . Wegen

$$F/N = \langle xN : x \in X \rangle = \langle xN : x \in X \setminus Y \rangle = \langle \sigma(x) : x \in X \setminus Y \rangle$$

folgt dann sofort  $\beta = \beta'$ . □

**Bemerkung 1.25.**


- (i) Der *Cayley-Graph*  $\Omega(G, X)$  einer endlich erzeugten Gruppe  $G = \langle X \mid R \rangle$  ist ein Graph mit Eckenmenge  $G$ , sodass  $g, h \in G$  genau dann eine Kante bilden, wenn  $g^{-1}h \in X \cup X^{-1}$  (durch  $g^{-1}h \in X$  erhält man einen gerichteten Graphen). Offenbar hängt  $\Omega(G, X)$  von  $X$  ab. Um Schleifen zu vermeiden, setzen wir  $1 \notin X$  voraus. In jeden Fall ist  $\Omega(G, X)$  zusammenhängend und regulär (d. h. alle Ecken haben die gleiche Anzahl an Kanten).

<sup>7</sup>Man spricht von einer *balancierten* Präsentation.

- (ii) Ein Kreis in  $\Omega(G, X)$  entspricht einem reduzierten Wort  $x_1^{\epsilon_1} \dots x_n^{\epsilon_n} = 1$ . Daher ist  $\Omega(G, X)$  genau dann ein Baum (d. h. kreisfrei), wenn  $G$  bzgl.  $X$  frei ist.
- (iii) Die Gruppe  $G$  permutiert durch Linksmultiplikation die Ecken und Kanten von  $\Omega(G, X)$ . Daher ist  $G$  eine Untergruppe von  $\text{Aut}(\Omega(G, X))$ . Auf dieser Grundlage lässt sich zeigen, dass jede endliche Gruppe die Automorphismengruppe eines Graphen ist (Satz von FRUCHT<sup>8</sup>).
- (iv) Nach dem Satz von Euler-Hierholzer, ist  $\Omega(G, X)$  genau dann eulersch, wenn  $|X \cup X^{-1}|$  gerade ist. Das bedeutet es gibt einen geschlossenen Weg, der jede Kante von  $\Omega(G, X)$  genau einmal besucht. Die offene Lovász-Vermutung besagt, dass  $\Omega(G, X)$  für  $2 < |G| < \infty$  hamiltonsch ist. Das bedeutet es gibt einen geschlossenen Weg, der jede Ecke von  $\Omega(G, X)$  genau einmal besucht.
- (v) Ist  $G$  endlich, so lassen sich die Eigenwerte der Adjazenzmatrix von  $\Omega(G, X)$  untersuchen. Man kann zeigen, dass sie in enger Verbindung zu den Werten der komplexen irreduziblen Charaktere von  $G$  stehen.

### Beispiel 1.26.

- (i) Der Cayley-Graph von  $G = \langle x \mid x^n \rangle$  bzgl.  $X = \{x\}$  ist ein  $n$ -Eck. Wählt man  $X = G$ , so erhält man den vollständigen Graphen mit  $n$  Ecken.
- (ii) Sei  $G = D_{2n}$  erzeugt von zwei Spiegelungen  $X = \{x, y\}$ . Dann ist  $\Omega(G, X)$  eine  $2n$ -Eck genau wie für  $C_{2n}$ . Der Cayley-Graph bestimmt also nicht, ob  $G$  abelsch ist. Wählt man hingegen  $X = \{x, z\}$  mit einer Drehung  $z$  um  $360^\circ/n$ , so erhält man (mit  $n = 10$ ):




Die beiden Kreise entsprechen den Nebenklassen  $\langle z \rangle$  und  $x\langle z \rangle$ .

---

<sup>8</sup>Siehe Algebra-Skript

(iii) Der Cayley-Graph von  $F_2$  lässt sich (näherungsweise) als Fraktal zeichnen:



Interaktive Beispiele findet man unter <https://juliapoo.github.io/Cayley-Graph-Plotting/>.

(iv) Sei  $G = \langle X \rangle$  die Gruppe des  $3 \times 3 \times 3$ -Zauberwürfel (Rubik's Cube) und  $X$  die Menge der  $90^\circ$ - und  $180^\circ$ -Drehungen der sechs Seitenflächen. Dann ist *God's Number* (20) der Durchmesser von  $\Omega(G, X)$ , also die maximale Länge eines kreisfreien Wegs (siehe Weihnachtsvorlesung Gruppentheorie).

**Bemerkung 1.27** (GAP).

```
LoadPackage("grape",false);
G:=AlternatingGroup(5);;
Y:=[(1,2,3),(3,4,5)];; #X ist schreibgeschützt
C:=CayleyGraph(G,Y); #ersetzt Y durch Y ∪ Y-1
Diameter(C);
```

```
LoadPackage("hap",false); #lädt weitere Pakete
G:=DihedralGroup(22);;
Y:=GeneratorsOfGroup(G);
CayleyGraphOfGroupDisplay(G,Y,"chromium"); #im Browser chromium ausgeben, benötigt GraphViz
```

## 2 Untergruppen freier Gruppen

**Bemerkung 2.1.** Wir wissen bereits, dass jede Gruppe eine Untergruppe (bzw. Faktorgruppe) einer symmetrischen (bzw. freien) Gruppe ist. Die Faktorgruppen einer endlichen symmetrischen Gruppe sind selbst symmetrisch (da  $A_n$  für  $n \geq 5$  einfach ist). Wir zeigen dual dazu, dass die Untergruppen einer freien Gruppe selbst frei sind. Wir starten mit einer Variation der universellen Eigenschaft.

**Lemma 2.2** (STEINBERG). *Eine Gruppe  $F$  ist genau dann frei bzgl.  $X \subseteq F$ , falls für jede nicht-leere Menge  $\Omega$  und jede Abbildung  $\sigma: X \rightarrow \text{Sym}(\Omega)$  genau eine Operation  $F \rightarrow \text{Sym}(\Omega)$  mit  ${}^x\omega = \sigma(x)(\omega)$  für alle  $x \in X$  und  $\omega \in \Omega$  existiert.*

*Beweis.* Ist  $F$  frei bzgl.  $X$ , so lässt sich  $\sigma$  nach der universellen Eigenschaft zu einer Operation mit der angegebenen Eigenschaft fortsetzen. Für die Umkehrung zeigen wir zunächst  $F = \langle X \rangle$ . Die Abbildung  $\sigma: X \rightarrow \text{Sym}(\langle X \rangle)$  durch Linksmultiplikation (d. h.  $\sigma(x)(y) = xy$ ) lässt sich zu einer Operation  $\rho: F \rightarrow \text{Sym}(\langle X \rangle)$  fortsetzen. Man kann aber auch  $\sigma: X \rightarrow \text{Sym}(F)$  betrachten und erhält wegen der Eindeutigkeit genau die gleiche Fortsetzung  $\rho: F \rightarrow \text{Sym}(F)$ . Da die Operation durch Linksmultiplikation transitiv ist, gilt  $\langle X \rangle = F$ .

Seien nun eine Gruppe  $G$  und eine Abbildung  $\sigma: X \rightarrow G$  gegeben. Sei  $\tau: G \rightarrow \text{Sym}(G)$  der Monomorphismus aus dem Satz von Cayley. Nach Voraussetzung existiert genau eine Operation  $\rho: F \rightarrow \text{Sym}(G)$  mit  $\rho(x) = \tau(\sigma(x))$  für alle  $x \in X$ . Dabei gilt  $\rho(F) = \rho(\langle X \rangle) \leq \tau(G)$ . Offenbar ist  $\tau^{-1}\rho: F \rightarrow G$  ein Homomorphismus, der  $\sigma$  fortsetzt. Ist auch  $\gamma: F \rightarrow G$  eine Fortsetzung von  $\sigma$ , so ist  $\tau\gamma = \rho$  nach Voraussetzung. Dies zeigt  $\gamma = \tau^{-1}\rho$ .  $\square$

**Definition 2.3.** Sei  $F$  frei bzgl.  $X \subseteq F$  und  $G \leq F$ . Eine *Schreier-Transversale* für  $G$  ist ein Repräsentantensystem  $S$  für  $F/G$  mit folgender Eigenschaft: Ist  $x^\epsilon s \in S$  reduziert mit  $x \in X$  und  $\epsilon = \pm 1$ , so ist auch  $s \in S$ . Insbesondere ist  $1 \in S$ .

**Lemma 2.4.** *Jede Untergruppe einer freien Gruppe besitzt eine Schreier-Transversale.*

*Beweis.* Sei  $F$  frei bzgl.  $X \subseteq F$  und  $G \leq F$ . Die *Länge* einer Nebenklasse  $aG$  sei die minimale Länge eines reduzierten Worts in  $aG$ . Wir konstruieren eine Schreier-Transversale  $S$  von  $G$  durch Induktion nach der Länge der Nebenklassen. Offenbar ist  $1G$  die einzige Nebenklasse mit Länge 0. Sei also  $1 \in S$ . Sei nun  $aG$  mit Länge  $l \geq 1$ . Dabei habe  $a$  Länge  $l$ . Sei  $a = x^\epsilon b$  reduziert mit  $x \in X$  und  $\epsilon = \pm 1$ . Nach Induktion existiert  $s \in S$  mit  $sG = bG$ . Wir wählen  $x^\epsilon s \in S$  als Repräsentanten von  $aG$ . Offenbar entsteht auf diese Weise eine Schreier-Transversale.  $\square$

**Satz 2.5** (NIELSEN-SCHREIER). *Untergruppen von freien Gruppen sind frei.*

*Beweis.* Sei  $F$  frei bzgl.  $X \subseteq F$  und  $G \leq F$ . Sei  $T$  eine Schreier-Transversale von  $G$ . Für  $a \in F$  sei  $\bar{a} \in T$  mit  $aG = \bar{a}G$ . Wir zeigen mit Lemma 2.2, dass  $G$  frei bzgl.

$$Y := \{(\overline{xt})^{-1}xt : (x, t) \in X \times T, xt \neq \overline{xt}\} \subseteq G$$

ist. Sei dafür  $\sigma: Y \rightarrow \text{Sym}(\Omega)$  eine beliebige Abbildung. Wir erweitern  $\sigma$  durch die Vorschrift  $\sigma(1) := \text{id}_\Omega$ . Für  $x \in X$  sind  $T \rightarrow T$ ,  $t \mapsto \overline{xt}$  (mit Umkehrabbildung  $t \mapsto \overline{x^{-1}t}$ ) und  $\sigma((\overline{xt})^{-1}xt)$  Bijektionen. Die Abbildung  $f: X \rightarrow \text{Sym}(\Omega \times T)$  mit

$$f(x)(\omega, t) = (\sigma((\overline{xt})^{-1}xt)(\omega), \overline{xt})$$

setzt sich zu einer Operation  $\hat{f}: F \rightarrow \text{Sym}(\Omega \times T)$  fort. Wir zeigen, dass durch  $\hat{f}(g)(\omega, 1) = (\hat{\sigma}(g)(\omega), 1)$  die einzige homomorphe Fortsetzung  $\hat{\sigma}: G \rightarrow \text{Sym}(\Omega)$  von  $\sigma$  gegeben ist. Für die Wohldefiniertheit müssen wir  $\hat{f}(g)(\Omega \times \{1\}) = \Omega \times \{1\}$  für alle  $g \in G$  nachweisen. Nach Konstruktion bildet  $f(x)$  die Menge  $\Omega \times \{t\}$  bijektiv auf  $\Omega \times \{\overline{xt}\}$  ab. Wegen  $\overline{xx^{-1}t} = t$  bildet daher  $\hat{f}(x^{-1}) = f(x)^{-1}$  die Menge  $\Omega \times \{t\}$  bijektiv auf  $\Omega \times \{\overline{x^{-1}t}\}$  ab. Für  $a = x^\epsilon b \in F$  reduziert mit  $x \in X$  und  $\epsilon = \pm 1$  gilt  $x^\epsilon \bar{b} = \overline{x^\epsilon b} = \bar{a}$ . Durch Induktion nach der Länge von  $a$  folgt daher

$$\hat{f}(a)(\Omega \times \{1\}) = \hat{f}(x^\epsilon)(\Omega \times \{\bar{b}\}) = \Omega \times \{\bar{a}\}.$$

Für  $g \in G$  gilt  $\bar{g} = 1$  und daher  $\hat{f}(g)(\Omega \times \{1\}) = \Omega \times \{1\}$  wie gewünscht. Da  $\hat{f}$  ein Homomorphismus ist, ist auch  $\hat{\sigma}$  ein Homomorphismus.

Wir zeigen nun  ${}^t(\omega, 1) = (\omega, t)$  für alle  $t \in T$ . Dies ist klar für  $t = 1$ . Sei also  $t = x^\epsilon s$  reduziert mit  $x \in X$ ,  $\epsilon = \pm 1$ . Da  $T$  eine Schreier-Transversale ist, gilt  $s \in T$ . Durch Induktion nach der Länge von  $t$  können wir  ${}^s(\omega, 1) = (\omega, s)$  annehmen. Im Fall  $\epsilon = 1$  folgt

$${}^t(\omega, 1) = {}^x(\omega, s) = (\sigma((\overline{xs})^{-1}xs)(\omega), t) = (\sigma(1)(\omega), t) = (\omega, t).$$

Sei nun  $\epsilon = -1$ . Wegen  $xt = s \in T$  gilt  ${}^x(\omega, t) = (\sigma((\overline{xt})^{-1}xt)(\omega), \overline{xt}) = (\omega, s)$  und

$${}^t(\omega, 1) = {}^{x^{-1}s}(\omega, 1) = {}^{x^{-1}}(\omega, s) = (\omega, t).$$

Sei nun  $y := (\overline{xt})^{-1}xt \in Y$  beliebig. Dann gilt

$${}^{xt}(\omega, 1) = {}^x(\omega, t) = (\sigma(y)(\omega), \overline{xt}) = \overline{xt}(\sigma(y)(\omega), 1)$$

und  $\widehat{\sigma}(y) = \sigma(y)$ . Also ist  $\widehat{\sigma}$  eine Fortsetzung von  $\sigma$ . Sei auch  $\tau: G \rightarrow \text{Sym}(\Omega)$  eine Fortsetzung. Dann ist  $\rho: F \rightarrow \text{Sym}(\Omega \times T)$  mit  $\rho(a)(\omega, t) := (\tau((\overline{at})^{-1}at)(\omega), \overline{at})$  eine Operation, denn für  $a, b \in F$  und  $t \in T$  gilt

$$\begin{aligned} (\rho(a)\rho(b))(\omega, t) &= \rho(a)(\tau((\overline{bt})^{-1}bt)(\omega), \overline{bt}) = (\tau((\overline{abt})^{-1}abt)(\tau((\overline{bt})^{-1}bt)(\omega)), \overline{abt}) \\ &= (\tau((\overline{abt})^{-1}abt)(\omega), \overline{abt}) = \rho(ab)(\omega, t). \end{aligned}$$

Für  $x \in X$  ist

$$\rho(x)(\omega, t) = (\tau((\overline{xt})^{-1}xt)(\omega), \overline{xt}) = (\sigma((\overline{xt})^{-1}xt)(\omega), \overline{xt}) = {}^x(\omega, t).$$

Wegen  $F = \langle X \rangle$  stimmt  $\rho$  also mit der oben definierten Operation überein. Insbesondere ist  $\tau = \widehat{\sigma}$ .  $\square$

**Bemerkung 2.6.** Für Vektorräume (oder freie abelsche Gruppen)  $U \leq V$  gilt bekanntlich  $\dim U \leq \dim V$ . Für freie Gruppen ist dies völlig falsch.

**Satz 2.7** (SCHREIERS Formel). *Ist  $F$  frei und  $G \leq F$  mit  $|F : G| < \infty$ , so gilt*

$$\boxed{\text{rk}(G) = |F : G|(\text{rk}(F) - 1) + 1.}$$

*Beweis.* Es genügt die Mächtigkeit der Menge  $Y$  in Satz 2.5 zu bestimmen. Seien  $s, t \in T$  und  $x, y \in X$  mit

$$(\overline{xt})^{-1}xt = (\overline{ys})^{-1}ys \neq 1.$$

Dann ist  $xt, ys \notin T$ . Da  $T$  eine Schreier-Transversale ist, müssen  $xt$  und  $ys$  reduziert sein. Angenommen  $\overline{xt} = xt'$  ist reduziert. Dann folgt  $t' \in T$  mit

$$t'G = x^{-1}xt'G = x^{-1}\overline{xt}G = x^{-1}xtG = tG,$$

also  $t = t'$ . Dies widerspricht der Wahl von  $x$  und  $t$ . Daher beginnt  $\overline{xt}$  nicht mit  $x$ . Folglich kann sich  $x$  nicht aus  $(\overline{xt})^{-1}xt$  kürzen. Analog kürzt sich  $y$  nicht aus  $(\overline{ys})^{-1}ys$ . Da  $xt$  und  $ys$  reduziert sind, muss  $xt$  am Ende von  $ys$  vorkommen (oder  $ys$  am Ende von  $xt$ ). Wäre  $xt$  tatsächlich kürzer als  $ys$ , so würde  $xt$  bereits in  $s$  vorkommen und man erhält den Widerspruch  $xt \in T$ . Also ist  $xt = ys$  und es folgt  $(x, t) = (y, s)$ . Die aufgezählten Elemente von  $Y$  sind also paarweise verschieden.

Sei nun  $t \in T \setminus \{1\}$ . Sei  $t = x^\epsilon s$  in reduzierter Form mit  $x \in X$  und  $\epsilon = \pm 1$ . Da  $T$  eine Schreier-Transversale ist, gilt  $s \in T$ . Im Fall  $\epsilon = 1$  ist  $xs \in T$  und anderenfalls ist  $xt \in T$ . Daher bestimmt jedes  $t \neq 1$  genau ein Paar  $(x', t') \in X \times T$  mit  $x't' \in T$ . Umgekehrt entsteht jedes solche Paar auf diese Weise. Dies liefert

$$|Y| = |X \times T| - |T \setminus \{1\}| = |T|(|X| - 1) + 1 = |F : G|(\text{rk}(F) - 1) + 1. \quad \square$$

**Beispiel 2.8.** Sei  $F_2 = \langle x, y \rangle$  und sei  $N$  der normale Abschluss von  $\{x^2, y^2, (xy)^2\}$  in  $F_2$ . Nach Beispiel 1.17 ist  $F_2/N$  die Kleinsche Vierergruppe. Nach Schreiers Formel ist  $\text{rk } N = 4(2 - 1) + 1 = 5$ . Wir wählen die Schreier-Transversale  $\{1, x, y, xy\}$  von  $N$  in  $F_2$  und berechnen

$$\begin{aligned} (\overline{xx})^{-1}xx &= x^2, & (\overline{xy})^{-1}xy &= y^{-1}x^2y, & (\overline{yy})^{-1}yy &= y^2, \\ (\overline{yx})^{-1}yx &= y^{-1}x^{-1}yx, & (\overline{yxy})^{-1}yxy &= x^{-1}yxy \end{aligned}$$

Also ist  $N$  frei bzgl.  $\{x^2, y^2, y^{-1}x^2y, y^{-1}x^{-1}yx, x^{-1}yxy\}$ .

**Folgerung 2.9.** Die Gruppe  $F_2$  besitzt (freie) Untergruppen von jedem endlichen oder abzählbaren Rang. Für jede abzählbare Gruppe  $G$  existieren  $N \trianglelefteq H \leq F_2$  mit  $G \cong H/N$  (vgl. Satz 12.25).

*Beweis.* Sei  $F_2 = \langle x, y \rangle$ . Dann ist  $G := \langle x \rangle \leq F_2$  mit  $\text{rk } G = 1$  (Schreiers Formel gilt hier nicht wegen  $|F : G| = \infty$ ). Für  $n \in \mathbb{N}$  existiert  $N \trianglelefteq F$  mit  $F/N \cong C_n$  nach Satz 1.11. Schreiers Formel zeigt  $\text{rk } N = n + 1$ . Sei schließlich  $N := F' = [F, F]$ . Nach Beispiel 1.17 ist  $F/N \cong \mathbb{Z}^2$ . Daher bilden die Elemente  $x^a y^b$  mit  $a, b \in \mathbb{Z}$  eine Schreier-Transversale von  $N$  in  $F$ . Die im Beweis von Satz 2.5 konstruierte Menge  $Y$  umfasst die paarweise verschiedenen reduzierten Wörter  $(\overline{yxy^b})^{-1}yxy^b = y^{-b-1}x^{-1}yxy^b$  mit  $b \in \mathbb{Z}$ . Daher ist  $\text{rk } N = \infty$ . Die zweite Aussage folgt aus Satz 1.11.  $\square$

**Bemerkung 2.10.**

- (i) Der Beweis von Folgerung 2.9 zeigt, dass nicht jede Untergruppe einer endlich erzeugten Gruppe endlich erzeugt sein muss ( $\text{rk}(F'_2) = \infty$ ).

(ii) 

```
F:=FreeGroup("x","y");
AssignGeneratorVariables(F);
H:=Subgroup(F,[x^2,y^3,(x*y)^5]);
IsFreeGroup(H);
Rank(H); #= 3
FreeGeneratorsOfGroup(H);
Index(F,H); #= ∞
N:=NormalClosure(F,H);
Index(F,N); #= 60
GeneratorsOfGroup(N); #Zwischenberechnung
Rank(N);
```

**Satz 2.11.** Ist  $G$  endlich erzeugt und  $H \leq G$  mit  $|G : H| < \infty$ , so ist auch  $H$  endlich erzeugt.

*Beweis.* Sei  $X = X^{-1}$  ein endliches Erzeugendensystem von  $G$  und  $R$  ein Repräsentantensystem für  $G/H$  mit  $1 \in R$ . Für  $x \in X$  und  $r \in R$  existieren  $\alpha(x, r) \in H$  und  $\gamma(x, r) \in R$  mit  $xr = \gamma(x, r)\alpha(x, r)$ . Jedes Element in  $H$  hat die Form  $h = x_1 \dots x_n$  mit  $x_1, \dots, x_n \in X$ . Dabei gilt

$$\begin{aligned} h &= x_1 \dots x_n 1 = x_1 \dots x_{n-1} \gamma(x_n, 1) \alpha(x_n, 1) = x_1 \dots x_{n-2} \gamma(x_{n-1}, \gamma(x_n, 1)) \alpha(x_{n-1}, \gamma(x_n, 1)) \alpha(x_n, 1) \\ &= \dots = \gamma(x_1, \dots) \alpha(x_1, \dots) \dots \alpha(x_n, 1). \end{aligned}$$

Wegen  $h \in H$  gilt dabei  $\gamma(x_1, \dots) = 1$ . Es folgt  $H = \langle \alpha(x, r) : x \in X, r \in R \rangle$ .  $\square$

**Bemerkung 2.12.** Der Beweis von Satz 2.11 zeigt, dass man  $H$  mit  $|G : H||X|$  Elementen erzeugen kann. Der nächste Satz gibt eine optimale Abschätzung.

**Satz 2.13** (REIDEMEISTER-SCHREIER). *Sei  $G = \langle X \mid R \rangle$  eine Gruppe und  $H \leq G$ . Dann lässt sich eine Präsentation  $H = \langle Y \mid S \rangle$  aus  $X$  und  $R$  ableiten. Im Fall  $|G : H| < \infty$  gilt  $|Y| \leq |G : H|(|X| - 1) + 1$  und  $|S| \leq |G : H||R|$ .*

*Beweis.* Sei  $F := F_X$  und  $N := \langle R \rangle^F \trianglelefteq F$ . Sei  $\varphi : F \rightarrow G$  der Epimorphismus mit  $\text{Ker}(\varphi) = N$ . Sei  $\tilde{H} = \varphi^{-1}(H) \leq F$ . Dann ist  $|F : \tilde{H}| = |F/N : \tilde{H}/N| = |G : H|$ . Sei  $T$  eine Schreier-Transversale von  $\tilde{H}$  in  $F$ . Wie im Beweis von Satz 2.5 ist  $\tilde{H}$  frei bzgl.

$$Y := \{(\overline{xt})^{-1}xt : (x, t) \in X \times T, xt \neq \overline{xt}\} \subseteq \tilde{H}.$$

Insbesondere ist  $\langle \varphi(Y) \rangle = \varphi(\tilde{H}) = H$ . Für  $(x, t) \in X \times T$  ist

$$(\overline{x^{-1}t})^{-1}x^{-1}t = (t^{-1}x\overline{x^{-1}t})^{-1} = ((\overline{xs})^{-1}xs)^{-1} \in Y^{-1} \cup \{1\}$$

mit  $s := \overline{x^{-1}t}$ , denn  $\overline{xs} = t$ . Wir definieren  $\psi : F \rightarrow \tilde{H}$  rekursiv durch  $\psi(1) := 1$  und

$$\psi(w) := (\overline{x^\epsilon \bar{z}})^{-1}x^\epsilon \bar{z} \cdot \psi(z)$$

für reduziertes  $w = x^\epsilon z$  mit  $x \in X$  und  $\epsilon = \pm 1$ . Nach dem eben Gezeigten ist  $\psi(w)$  ein Produkt von Elementen aus  $Y \cup Y^{-1}$ . Sei  $S := \{\psi(t^{-1}rt) : t \in T, r \in R\}$ . Wir zeigen  $H \cong \langle Y \mid S \rangle$ . Sei dafür  $M := \langle S \rangle^{\tilde{H}} \trianglelefteq \tilde{H}$ . Zunächst verifizieren wir  $\psi(w) = \bar{w}^{-1}w$  für  $w \in F$  durch Induktion nach  $|w|$ . Dies ist klar für  $w = 1$ . Für reduziertes  $w = x^\epsilon z$  folgt

$$\psi(w) = (\overline{x^\epsilon \bar{z}})^{-1}x^\epsilon \bar{z} \cdot \bar{z}^{-1}z = \bar{w}^{-1}w.$$

Für  $h \in \tilde{H}$  folgt  $\psi(h) = (\bar{h})^{-1}h = h$ . Insbesondere ist  $\psi(t^{-1}rt) = t^{-1}rt \in N$  für  $r \in R$  und  $t \in T$ . Also gilt  $S \subseteq N$  und  $M \subseteq N$  wegen  $N \trianglelefteq \tilde{H}$ . Für die umgekehrte Inklusion genügt es  $g^{-1}rg \in M$  für  $g \in F$  und  $r \in R$  zu zeigen. Sei  $g = th$  mit  $t \in T$  und  $h \in \tilde{H}$ . Dann ist

$$g^{-1}rg = h^{-1}t^{-1}rth = h^{-1}\psi(t^{-1}rt)h \in M.$$

Also ist  $H \cong \tilde{H}/N = \tilde{H}/M = \langle Y \mid S \rangle$ .

Die zweite Behauptung folgt aus Schreiers Formel und der Konstruktion von  $S$ . □

**Bemerkung 2.14** (GAP).

```
G:=SymmetricGroup(6);;
FG:=Image(IsomorphismFpGroup(G));;
FH:=DerivedSubgroup(FG);; #= A6
P:=PresentationSubgroup(FG,FH,"y"); #Präsentation mit Erzeugern y_i
TzPrintPresentation(P); #Statistik über Erzeuger und Relationen
```

**Satz 2.15** (COXETER-TODD-Algorithmus). *Sei  $G = \langle X \mid R \rangle$  endlich präsentiert und  $H \leq G$  mit  $|G : H| < \infty$ . Dann existiert ein Algorithmus, der die Operation von  $G$  auf  $G/H$  bestimmt. Insbesondere lässt sich  $|G : H|$  aus einem Erzeugendensystem von  $H$  berechnen.*

*Beweisskizze.* Nach Reidemeister-Schreier existiert ein endliches Erzeugendensystem  $Y$  von  $H$ . Sei  $G/H = \{H = H_1, \dots, H_n\}$ . Für  $y = x_1^{\epsilon_1} \dots x_k^{\epsilon_k} \in Y$  sei  $t_y := (t_1, \dots, t_k)$  mit  $x_i^{\epsilon_i} \dots x_k^{\epsilon_k} H = H_{t_i}$  für  $i = 1, \dots, k$ . Wegen  $y \in H$  ist  $t_1 = 1$ . Für  $r = x_1^{\epsilon_1} \dots x_l^{\epsilon_l} \in R$  sei  $T_r = (t_{ij}) \in \mathbb{N}^{n \times l}$  mit  $x_m^{\epsilon_m} \dots x_l^{\epsilon_l} H_i = H_{t_{im}}$  für  $m = 1, \dots, l$ . Wegen  $r = 1$  in  $G$  ist  $t_{i1} = i$  für  $i = 1, \dots, n$ . Wir füllen die Vektoren  $t_y$  ( $y \in Y$ ) und Matrizen  $T_r$  ( $r \in R$ ) von links nach rechts und von oben nach unten, indem

wir neue Nebenklassen zuweisen und alle logischen Folgerungen dabei berücksichtigen. Für jede neue Nebenklasse wird eine neue Zeile in  $T_r$  angefügt. Wegen  $|G : H| < \infty$  sind irgendwann alle Einträge in  $t_y$  und  $T_r$  gefüllt. Außerdem kommt jedes  $x \in X$  in einem  $r \in R$  oder in einem Erzeuger von  $H$  vor. Auf diese Weise kann man die Operation von  $G$  auf  $G/H$  ablesen. Da  $G$  transitiv operiert, tauchen wirklich alle Nebenklassen in den Tabellen auf, d. h. man kann  $n = |G : H|$  ablesen.  $\square$

**Beispiel 2.16.** Sei  $G = \langle x, y \mid x^3 = y^5 = (xy)^2 = 1 \rangle$  und  $H := \langle y \rangle$ . Der Vektor  $t_y = (1)$  enthält hier keinerlei Information. Die erste Zeile von  $T_{y^5}$  ist  $(1, 1, 1, 1, 1)$ . Die Festlegung  $H_2 := x^{-1}H_1 = x^2H$  ergibt folgende Einträge in  $T_{x^3}$ ,  $T_{y^5}$  und  $T_{(xy)^2}$ :

| $x$ | $x$ | $x$ | $y$ | $y$ | $y$ | $y$ | $y$ | $y$ | $x$ | $y$ | $x$ | $y$ |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | 2   |     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     | 1   | 2   |     | 1   |
| 2   |     |     | 2   |     |     |     |     |     | 2   |     |     |     |

Sei nun  $H_3 := x^{-1}H_2 = xH$ . Dann ist  $x^{-1}H_3 = H_1$  und  $y^4H_2 = y^{-1}x^{-1}H = xyH = H_3$ .

| $x$ | $x$ | $x$ | $y$ | $y$ | $y$ | $y$ | $y$ | $y$ | $x$ | $y$ | $x$ | $y$ |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | 2   | 3   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     | 1   | 2   | 3   | 1   |
| 2   | 3   | 1   | 2   | 3   |     |     |     |     | 2   | 3   |     |     |
| 3   | 1   | 2   | 3   |     |     |     |     |     | 3   | 1   | 1   | 2   |

Wir definieren weiter  $H_4 := y^{-1}H_3$ ,  $H_5 := x^{-1}H_4$ ,  $H_6 := y^{-1}H_4$ ,  $H_7 := x^{-1}H_5$  usw.

| $x$ | $x$ | $x$ | $y$ | $y$ | $y$ | $y$ | $y$ | $y$ | $x$ | $y$ | $x$ | $y$ |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | 2   | 3   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     | 1   | 2   | 3   | 1   |
| 4   | 5   | 7   | 2   | 3   | 4   | 6   | 5   |     | 2   | 3   | 4   | 5   |
| 6   | 9   | 8   | 7   | 8   | 10  | 11  | 9   |     | 5   | 7   | 8   | 6   |
| 10  | 11  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  |     | 6   | 9   | 7   | 4   |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     | 9   | 8   | 10  | 11  |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     | 11  | 12  | 12  | 10  |

(redundante Zeilen wurden gestrichen). Man kann nun ablesen  $|G| = |G : H||H| = 12|H| \leq 60$ . In der Tat erfüllen die Permutationen  $x = (1, 2, 3)$  und  $y := (1, 4, 3, 5, 2)$  in  $A_5$  die Relationen. Nach von-Dyck ist  $G \cong \langle (1, 2, 3), (1, 4, 3, 5, 2) \rangle = A_5$ .

**Bemerkung 2.17** (GAP).

```
F:=FreeGroup(2);;
G:=F/[F.1^3,F.2^5,(F.1*F.2)^2];; #F.n ist der n-te Erzeuger
H:=Subgroup(G,[G.2]);;
CT:=CosetTable(G,H);;
Display(TransposedMat(CT)); #nur Spalten F.1^±1 und F.2^±1
f:=FactorCosetAction(G,H); #Operation auf G/H
StructureDescription(Image(f)); #entsprechende Permutationsgruppe
```

```
G:=F/[F.1^2,F.2^3,(F.1*F.2)^7];;
CT:=CosetTable(G,TrivialSubgroup(G));; #bricht nach 4096000 Nebenklassen ab (|G|=∞)
```

Für kompliziertere Beispiele und bessere grafische Umsetzung kann man die Pakete ACE bzw. ICT (benötigt xgap) benutzen. Auf dem Cover ist die Tabelle für  $A_6 \leq M_{11}$  angegeben.

**Satz 2.18** (MOORE). Für  $n \geq 2$  gilt

$$S_n \cong \langle x_1, \dots, x_{n-1} \mid 1 = x_i^2 = (x_j x_{j+1})^3 = (x_k x_l)^2 \text{ für } k < l - 1 \rangle.$$



*Beweis.* Sei  $G$  die Gruppe auf der rechten Seite. Für  $n = 2$  gilt  $G \cong C_2 \cong S_2$ . Sei also  $n > 2$  und  $H := \langle x_1, \dots, x_{n-2} \rangle \leq G$ . Nach Induktion ist  $H$  eine Faktorgruppe von  $S_{n-1}$ . Insbesondere ist  $|H| \leq (n-1)!$ . Wir zeigen, dass  $G$  folgende Nebenklassen permutiert:

$$H, x_{n-1}H, x_{n-2}x_{n-1}H, \dots, x_1 \dots x_{n-1}H.$$

Sicher ist

$$\begin{aligned} x_i(x_i x_{i+1} \dots x_{n-1} H) &= x_{i+1} \dots x_{n-1} H, \\ x_{i-1}(x_i x_{i+1} \dots x_{n-1} H) &= x_{i-1} x_i \dots x_{n-1} H. \end{aligned}$$

Für  $j < i - 1$  gilt  $x_i x_j = (x_i x_j)^{-1} = x_j x_i$  und

$$x_j(x_i x_{i+1} \dots x_{n-1} H) = x_i x_{i+1} \dots x_{n-1} x_j H = x_i x_{i+1} \dots x_{n-1} H.$$

Sei nun  $j > i$ . Wegen  $(x_{j-1} x_j)^3 = 1$  gilt  $x_{j-1} x_j x_{j-1} = x_j x_{j-1} x_j$ . Es folgt

$$\begin{aligned} x_j(x_i x_{i+1} \dots x_{n-1} H) &= x_i \dots x_{j-2} (x_j x_{j-1} x_j) x_{j+1} \dots x_{n-1} H = x_i \dots x_{j-2} (x_{j-1} x_j x_{j-1}) x_{j+1} \dots x_{n-1} H \\ &= x_i \dots x_{n-1} x_{j-1} H = x_i \dots x_{n-1} H. \end{aligned}$$

Da  $G$  im Allgemeinen transitiv auf  $G/H$  operiert, ist  $|G : H| \leq n$  und  $|G| \leq n!$ .

Umgekehrt erfüllen die Transpositionen  $x'_i := (i, i+1) \in S_n$  für  $i = 1, \dots, n-1$  die gleichen Relationen und wegen  $S_n = \langle x'_1, \dots, x'_{n-1} \rangle$  folgt die Behauptung.  $\square$

**Satz 2.19** (MOORE). *Für  $n \geq 2$  gilt*

$$A_n \cong \langle x_1, \dots, x_{n-2} \mid 1 = x_1^3 = x_2^2 = \dots = x_{n-2}^2 = (x_i x_{i+1})^3 = (x_k x_l)^2 \text{ für } k < l - 1 \rangle.$$

*Beweis.* Sei wieder  $G$  die rechte Seite. Für  $n \leq 3$  stimmt die Behauptung. Sei  $n \geq 4$  und  $H := \langle x_1, \dots, x_{n-3} \rangle \leq G$ . Nach Induktion ist  $|H| \leq \frac{1}{2}(n-1)!$ . Wir zeigen, dass  $G$  die folgenden  $n$  Nebenklassen permutiert

$$H, x_{n-2}H, x_{n-3}x_{n-2}H, \dots, x_1 \dots x_{n-2}H, x_1^2 x_2 \dots x_{n-2}H.$$

Solange kein  $x_1$  involviert ist, geht dies wie in Satz 2.18. Für  $i \geq 3$  gilt  $x_1 x_i = x_i x_1^{-1}$  und

$$\begin{aligned} x_1 x_i \dots x_{n-2} H &= x_i \dots x_{n-2} x_1^{\pm 1} H = x_i \dots x_{n-2} H, \\ x_i x_1^{\pm 1} x_2 \dots x_{n-2} H &= x_1^{\mp 1} x_i x_2 \dots x_{n-2} H = x_1^{\mp 1} x_2 \dots x_{n-2} H. \end{aligned}$$

Aus  $(x_1 x_2)^3 = 1$  folgt  $x_2 x_1 x_2 = x_1^{-1} x_2 x_1^{-1}$  und

$$x_2 x_1^{\pm 1} \dots x_{n-2} H = x_1^{\mp 1} x_2 x_1^{\mp 1} x_3 \dots x_{n-2} H = x_1^{\mp 1} x_2 \dots x_{n-2} H.$$

Wie in Satz 2.18 erhält man  $|G| \leq n|H| \leq |A_n|$ . Umgekehrt erfüllen die Elemente  $x_1 = (1, 2, 3)$ ,  $x_i = (1, 2)(i+1, i+2)$  ( $i = 2, \dots, n-2$ ) von  $A_n$  die angegebenen Relationen.  $\square$

**Bemerkung 2.20.** GURALNICK-KANTOR-KASSABOV-LUBOTZKY haben gezeigt, dass man alle symmetrischen und alternierenden Gruppen mit zwei Erzeugern und acht Relationen präsentieren kann (oder drei Erzeuger und sieben Relationen<sup>9</sup>).

<sup>9</sup>Die Präsentation war fehlerhaft und wurde von HUXFORD korrigiert.

**Definition 2.21.** Ein reduziertes Wort  $x_1^{\epsilon_1} \dots x_n^{\epsilon_n}$  einer freien Gruppe heißt *zyklisch reduziert*, falls  $x_1^{\epsilon_1} \neq x_n^{-\epsilon_n}$ .

**Bemerkung 2.22.** Für eine Gruppe  $\langle X \mid r \rangle$  mit nur einer Relation kann man nach Konjugation stets annehmen, dass  $r$  zyklisch reduziert ist. Es gilt nun die folgende Verallgemeinerung von Lemma 1.24.

**Satz 2.23** (MAGNUS' Freiheitssatz). *Sei  $G = \langle X \mid r \rangle$ , wobei  $r$  zyklisch reduziert sei. Kommt  $x \in X$  in  $r$  vor, so ist  $\langle X \setminus \{x\} \rangle \leq G$  frei bzgl.  $X \setminus \{x\}$ .*

*Beweis.* Siehe Satz 7.1 in [Camps et al., *Einführung in die kombinatorische und geometrische Gruppentheorie*, Heldermann Verlag, Lemgo, 2008]  $\square$

### 3 Automorphismen freier Gruppen

**Definition 3.1.** Seien  $X \subseteq X'$  Alphabete und  $R \subseteq F_X$  mit normalem Abschluss  $N \trianglelefteq F$ . Die Transformationen

- $(X, R) \rightarrow (X, R \cup \{r\})$  mit  $r \in N \setminus R$ ,
- $(X, R) \rightarrow (X \cup \{x\}, R \cup \{x^{-1}w\})$  mit  $x \in X' \setminus X$  und  $w \in F_X$

und ihre Umkehrabbildungen werden *Tietze-Transformationen* genannt.

**Satz 3.2.** *Zwei endlich präsentierte Gruppen  $\langle X_1 \mid R_1 \rangle$  und  $\langle X_2 \mid R_2 \rangle$  sind genau dann isomorph, wenn man  $(X_1, R_1)$  durch endlich viele Tietze-Transformationen in  $(X_2, R_2)$  überführen kann.*

*Beweis.* O.B.d.A. sei  $X_1 \cap X_2 = \emptyset$ . Sei  $F_i := F_{X_i}$  und  $N_i := \langle R_i \rangle^{F_i} \trianglelefteq F_i$ . Für  $r \in N_i$  gilt sicher  $\langle R_i \cup \{r\} \rangle^{F_i} = N_i$  und  $G_i := \langle X_i \mid R_i \rangle \cong \langle X_i \mid R_i \cup \{r\} \rangle$ . Sei nun  $x \in X' \setminus X_i$  und  $w \in F_i$ . Dann existiert ein Epimorphismus  $\varphi: F_{X_i \cup \{x\}} \rightarrow G_i$  mit  $\varphi(x_i) = x_i N_i$  für  $x_i \in X_i$  und  $\varphi(x) = w N_i$ . Offenbar ist

$$N'_i := \langle R_i \cup \{x^{-1}w\} \rangle^{F_{X_i \cup \{x\}}} \subseteq \text{Ker}(\varphi).$$

Sei umgekehrt  $y := y_1^{\epsilon_1} \dots y_n^{\epsilon_n} \in \text{Ker}(\varphi)$  mit  $y_1, \dots, y_n \in X_i \cup \{x\}$ . Sei  $k := |\{1 \leq j \leq n : y_j = x\}|$ . Gilt  $k = 0$ , so ist  $y \in \text{Ker}(\varphi) \cap F_i = N_i \subseteq N'_i$ . Sei jetzt  $k > 0$ . Um  $y \in N'_i$  zu zeigen, können wir  $y_n^{\epsilon_n} = x$  nach Konjugation annehmen. Es genügt dann  $yx^{-1}w \in N'_i$  zu zeigen, aber das folgt mit Induktion nach  $k$ . Also ist  $\text{Ker}(\varphi) = N'_i$  und  $G_i \cong \langle X_i \cup \{x\} \mid R_i \cup \{x^{-1}w\} \rangle$ . Wenn man  $(X_1 \mid R_1)$  durch Tietze-Transformationen nach  $(X_2 \mid R_2)$  überführen kann, so sind also  $G_1$  und  $G_2$  isomorph (dafür braucht man keine endliche Präsentation).

Sei nun umgekehrt  $G := G_1 \cong G_2$ . Dann existieren Epimorphismen  $\varphi_i: F_i \rightarrow G$  mit Kern  $N_i$  für  $i = 1, 2$ . Sei  $X := X_1 \cup X_2$  und  $F := F_X$ . Dann existiert ein Homomorphismus  $\varphi: F \rightarrow G$ , der  $\varphi_1$  und  $\varphi_2$  fortsetzt. Für  $x \in X_1$  wählen wir  $w_x \in F_2$  mit  $\varphi(x) = \varphi_2(w_x) = \varphi(w_x)$ . Sei  $S_1 := \{s_x := x^{-1}w_x : x \in X_1\} \subseteq F$ . Analog definieren wir  $S_2$ . Durch eine offensichtliche (endliche) Folge von Tietze-Transformationen überführen wir  $(X_1, R_1)$  in  $(X, R_1 \cup S_2)$ . Sicher ist  $N := \langle R_1 \cup S_2 \rangle^F \subseteq \text{Ker}(\varphi)$ . Wie oben zeigt man  $\text{Ker}(\varphi) \subseteq N$ . Insbesondere ist  $R_2 \cup S_1 \subseteq N$ . Man kann also durch Tietze-Transformationen von  $(X, R_1 \cup S_2)$  nach  $(X, R_1 \cup R_2 \cup S_1 \cup S_2)$  übergehen. Die Situation ist nun symmetrisch. Man kann daher auch von  $(X_2, R_2)$  nach  $(X, R_1 \cup R_2 \cup S_1 \cup S_2)$  übergehen. Die umgekehrten Tietze-Transformationen überführen schließlich  $(X_1, R_1)$  nach  $(X_2, R_2)$ .  $\square$

**Bemerkung 3.3.** Die Befehle

`SimplifyPresentation (= TzGo), SimplifiedFpGroup, IsomorphismSimplifiedFpGroup`

führen stillschweigend Tietze-Transformationen durch, um eine endliche Präsentation  $\langle X \mid R \rangle$  zu vereinfachen, d. h.  $|X|$ ,  $|R|$ , und  $\sum_{r \in R} l(r)$  werden minimiert. Man kann die Transformationen aber auch gezielt anwenden.

```
G:=PerfectGroup(768000,10); #perfekte Gruppe aus Datenbank
H:=Image(IsomorphismFpGroup(G));
P:=PresentationFpGroup(H,2); #Präsentation, print level=2, also mehr Ausgabe
TzGoGo(P); #iteriert Vereinfachungen mit Tietze-Transformation
TzPrintPresentation(P); #5 Erzeuger, 33 Relationen, Gesamtlänge 224
gen:=SmallGeneratingSet(G); #geht auch mit 2 Erzeugern
H:=Image(IsomorphismFpGroupByGenerators(G,gen)); #benutze diese
P:=PresentationFpGroup(H,2);
TzGoGo(P);
TzPrintPresentation(P); #2 Erzeuger, 59 Relationen, Gesamtlänge 3220

gen:=GeneratorsOfPresentation(P);
TzSubstitute(P,gen[1]^2*gen[2]); #führe zweite Tietze-Transformation mit w = x^2y durch
```

**Definition 3.4.** Sei  $F = F_X$  und  $x, y \in X$  mit  $x \neq y$ . Die Automorphismen

$$\alpha_x: F \rightarrow F, \quad z \mapsto \begin{cases} x^{-1} & \text{falls } z = x \\ z & \text{falls } z \neq x \end{cases},$$

$$\beta_{xy}: F \rightarrow F, \quad z \mapsto \begin{cases} xy & \text{falls } z = x \\ z & \text{falls } z \neq x \end{cases}$$

(wobei  $z \in X$ ) heißen *Nielsen-Transformationen* (man beachte die Analogie zum Gauß-Algorithmus). Sei  $\text{Aut}_N(F) := \langle \alpha_x, \beta_{xy} : x, y \in X, x \neq y \rangle \leq \text{Aut}(F)$ .

**Bemerkung 3.5.** Für verschiedene  $x, y \in X$  gilt

$$\alpha_x \beta_{xy}^{-1} \alpha_x^{-1}(x) = \alpha_x \beta_{xy}^{-1}(x^{-1}) = \alpha_x(yx^{-1}) = yx.$$

Angewendet auf das Paar  $(x, y)$  gilt

$$\begin{aligned} \alpha_y \beta_{xy} \alpha_x \beta_{yx} \alpha_y \beta_{xy}(x, y) &= \alpha_y \beta_{xy} \alpha_x \beta_{yx} \alpha_y(xy, y) = \alpha_y \beta_{xy} \alpha_x \beta_{yx}(xy^{-1}, y^{-1}) \\ &= \alpha_y \beta_{xy} \alpha_x(y^{-1}, x^{-1}y^{-1}) = \alpha_y \beta_{xy}(y^{-1}, xy^{-1}) = \alpha_y(y^{-1}, x) = (y, x). \end{aligned}$$

Also lässt sich jede Permutation auf  $X$  durch Nielsen-Transformationen realisieren.

**Satz 3.6.** Seien  $w_1, \dots, w_n \in F = F_X$  und  $\gamma \in \text{Aut}(F)$ . Dann existiert ein  $\delta \in \text{Aut}_N(F)$  mit  $\delta(w_i) = \gamma(w_i)$  für  $i = 1, \dots, n$ . Insbesondere ist  $\text{Aut}(F) = \text{Aut}_N(F)$ , falls  $|X| < \infty$ .

*Beweis.* Sei  $Y \subseteq X$  mit  $|Y| < \infty$  und  $w_1, \dots, w_n \in F_Y$ . Es genügt ein  $\delta \in \text{Aut}_N(F)$  mit  $\gamma(y) = \delta(y)$  für alle  $y \in Y$  zu konstruieren (die gegebenen  $w_1, \dots, w_n$  seien ab jetzt bedeutungslos). Wegen  $\langle \gamma^{-1}(X) \rangle = F$  existiert eine endliche Teilmenge  $Z \subseteq X$  mit  $Y \subseteq \langle \gamma^{-1}(Z) \rangle$ . Wir können  $Y \subseteq Z = \{x_1, \dots, x_m\}$  annehmen. Sei  $w_i := \gamma^{-1}(x_i)$  reduziert für  $i = 1, \dots, m$ . Angenommen es existieren  $1 \leq i, j \leq m$  mit  $|w_i w_j| < |w_i|$ . Offenbar ist dann  $i \neq j$ . Indem wir  $\gamma$  durch  $\beta_{x_i x_j}^{-1} \gamma$  ersetzen, wird  $w_i$  durch  $w_i w_j$

ersetzt, während sich  $w_k$  für  $k \neq i$  nicht verändert. Auf diese Weise wird  $\sum_{i=1}^m |w_i|$  kleiner. Im Fall  $|w_i w_j| < |w_j|$  kann man nach Bemerkung 3.5 analog die Transformation  $w_j \mapsto w_i w_j$  durchführen. Wir können also

$$|w_i w_j| \geq \max\{|w_i|, |w_j|\}$$

für  $1 \leq i, j \leq m$  annehmen. Dies bedeutet, dass sich höchstens die Hälfte von  $w_i$  und  $w_j$  im Produkt  $w_i w_j$  kürzen kann. Nehmen wir nun an, dass  $i, j, k$  existieren mit  $|w_i w_j w_k| \leq |w_i| - |w_j| + |w_k|$ . Sei dabei  $w_i = as^{-1}$ ,  $w_j = sbt^{-1}$  und  $w_k = tc$ , sodass  $w_i w_j = abt^{-1}$  und  $w_j w_k = sbc$  reduziert sind (beachte, dass sich jeweils nur die Hälfte von  $w_j$  links und rechts kürzen kann). Es gilt

$$|a| + |b| + |c| = |w_i w_j w_k| \leq |w_i| - |w_j| + |w_k| = |a| - |b| + |c|,$$

d. h.  $b = 1$  und  $|s| = \frac{1}{2}|w_j| = |t|$ . Wegen  $|w_i| = |a| + |s| = |w_i w_j| \geq |w_j| = 2|s|$  gilt  $|s| \leq \frac{1}{2}|w_i|$  und analog  $|s| \leq \frac{1}{2}|w_k|$ . Wir können also  $w_i$  durch  $w_i w_j$  oder  $w_k$  durch  $w_j w_k$  ersetzen, ohne dass sich  $\sum_{i=1}^m |w_i|$  ändert. Für  $w \in F_Z$  sei  $L(w)$  das linke Teilwort von  $w$  der Länge  $\lfloor (|w| + 1)/2 \rfloor$ . Sei  $\leq$  die lexikographische (Wohl-)Ordnung auf  $F_Z$  mit

$$1 < x_m^{-1} < x_{m-1}^{-1} < \dots < x_1^{-1} < x_1 < x_2 < \dots < x_m < x_m^{-2} < x_m^{-1} x_{m-1}^{-1} < \dots$$

Wir schreiben  $w \prec v$ , falls  $\min\{L(w), L(w^{-1})\} < \min\{L(v), L(v^{-1})\}$  oder  $(\min\{L(w), L(w^{-1})\} = \min\{L(v), L(v^{-1})\} \text{ und } \max\{L(w), L(w^{-1})\} < \max\{L(v), L(v^{-1})\})$ , wobei das Minimum/Maximum bzgl.  $\leq$  zu bilden ist. Gilt in der obigen Situation  $s < t$ , so ist  $w_j w_k = sc \prec tc = w_k$ , denn  $L(c^{-1} s^{-1}) = L(c^{-1}) = L(c^{-1} t^{-1})$ . Ist  $t < s$ , so folgt  $w_i w_j = at^{-1} \prec as^{-1} = w_i$ . Der Fall  $s = t$  ist wegen  $w_j = st^{-1} \neq 1$  ausgeschlossen. Durch geeignete Nielsen-Transformationen können wir also erreichen, dass die  $w_i$  möglichst klein bzgl.  $\prec$  sind (da  $\leq$  eine Wohlordnung ist, können die  $w_i$  nicht beliebig klein werden). Die Eigenschaft  $|w_i w_j| \geq \max\{|w_i|, |w_j|\}$  bleibt dabei erhalten. Am Ende ist

$$|w_i w_j w_k| > |w_i| - |w_j| + |w_k|$$

für  $1 \leq i, j, k \leq m$ , d. h.  $w_j$  kürzt sich nicht vollständig in  $w_i w_j w_k$ . Das gleiche Verfahren lässt sich allgemeiner mit den Elementen  $w_i^{\pm 1}$  durchführen.

Wegen  $Y \subseteq \langle \gamma^{-1}(Z) \rangle$  lässt sich jedes  $x_i \in Y$  als Produkt der  $w_j$  darstellen, sagen wir  $x_i = w_{j_1}^{\epsilon_1} \dots w_{j_k}^{\epsilon_k}$ . Nach Konstruktion gilt aber  $1 = |x_i| = |w_{j_1}^{\epsilon_1} \dots w_{j_k}^{\epsilon_k}| \geq k$ , d. h.  $x_i = w_{j_1}^{\epsilon_1}$ . Nach weiteren Nielsen-Transformationen wie in Bemerkung 3.5 erreicht man schließlich  $w_i = x_i$  für alle  $x_i \in Y$ .  $\square$

### Bemerkung 3.7.

- (i) NIELSEN hat eine endliche Präsentation von  $\text{Aut}(F_n)$  bzgl. der Nielsen-Transformationen angegeben. NEWMAN hat gezeigt, dass man  $\text{Aut}(F_n)$  mit nur zwei Automorphismen (unendlicher Ordnung) erzeugen kann.
- (ii) In GAP kann man Nielsen-Transformationen wie folgt konstruieren:

```
F:=FreeGroup("x","y");;
AssignGeneratorVariables(F);;
FreeGroupAutomorphismsGeneratorO(F); #Nielsen-Transformation  $\alpha_x$ 
FreeGroupAutomorphismsGeneratorU(F); # $\beta_{xy}$ 
FreeGroupAutomorphismsGeneratorP(F); #(x,y)  $\mapsto$  (y,x)
A:=AutomorphismGroup(F);; #Aut(F)
iso:=IsomorphismFpGroup(A);; #Isomorphismus von A zu einer endlich präsentierten
Gruppe
a:=GroupHomomorphismByImages(F,F,[x,y],[x~y,x*y]); #a  $\in$  A
a^iso; #a als Wort in  $\alpha_x, \beta_{xy}$  und (x,y)  $\mapsto$  (y,x)
```

**Satz 3.8.** Sei  $\Phi: \text{Aut}(F_n) \rightarrow \text{GL}(n, \mathbb{Z})$ , wobei  $\Phi(\alpha)_{ij}$  die Exponentensumme von  $x_j$  in  $\alpha(x_i)$  ist. Dann ist  $\Phi$  ein Epimorphismus.

*Beweis.* Die Abbildung  $\Phi$  entsteht aus der Einschränkung

$$\text{Aut}(F_n) \rightarrow \text{Aut}(F_n/F'_n) \cong \text{Aut}(\mathbb{Z}^n) \cong \text{GL}(n, \mathbb{Z})$$

und ist daher ein wohldefinierter Homomorphismus. Für die Surjektivität genügt es zu zeigen, dass jede Matrix  $A \in \text{GL}(n, \mathbb{Z})$  ein Produkt von  $\Phi(\alpha_x)$  und  $\Phi(\beta_{xy})$  ist. Linksmultiplikation (bzw. Rechtsmultiplikation) mit  $\Phi(\alpha_x)$  bewirkt, dass eine Zeile (bzw. Spalte) von  $A$  mit  $-1$  multipliziert wird. Durch  $\Phi(\beta_{xy})$  kann man eine Zeile (bzw. Spalte) von  $A$  zu einer anderen Zeile (bzw. Spalte) addieren. Wie in Bemerkung 3.5 kann man Zeilen und Spalten von  $A$  auch vertauschen. Mit diesen Operationen lässt sich  $A$  auf die Smith-Normalform bringen. Wegen  $\det A = \pm 1$  sind alle Elementarteiler 1, d. h.  $A$  lässt sich zur Einheitsmatrix überführen.  $\square$

## 4 Gruppen-Erweiterungen

**Bemerkung 4.1.** Nach dem Satz von Jordan-Hölder sind alle endlichen Gruppen (oder solche die eine Kompositionsreihe besitzen) aus einfachen Gruppen aufgebaut. Die endlichen einfachen Gruppen sind bekanntlich vollständig klassifiziert. Es bleibt zu untersuchen, wie sich eine Gruppe aus Normalteilern und Faktorgruppen zusammensetzt.

**Definition 4.2.**

- Eine (*Gruppen-*)*Erweiterung* von  $H$  mit  $N$  ist eine kurze exakte Folge von Gruppen

$$1 \rightarrow N \xrightarrow{\nu} G \xrightarrow{\pi} H \rightarrow 1,$$

d. h.  $N \cong \nu(N) \trianglelefteq G$  und  $G/\nu(N) \cong \pi(G) = H$ .<sup>10</sup>

- Wir nennen  $G$  eine *zerfallende* Erweiterung, falls ein Homomorphismus  $\rho: H \rightarrow G$  mit  $\pi \circ \rho = \text{id}_H$  existiert. Gegebenenfalls ist  $\rho(H)$  ein Komplement von  $\nu(N)$  in  $G$  und  $G \cong N \rtimes H$ . Umgekehrt ist jedes semidirekte Produkt eine zerfallende Erweiterung.
- Zwei Gruppen-Erweiterungen  $G_1, G_2$  von  $H$  mit  $N$  heißen *äquivalent*, falls ein Homomorphismus  $\gamma: G_1 \rightarrow G_2$  mit  $\gamma \circ \nu_1 = \nu_2$  und  $\pi_2 \circ \gamma = \pi_1$  existiert. Das heißt, das folgende Diagramm kommutiert:

$$\begin{array}{ccccc} & & G_1 & & \\ & \nearrow \nu_1 & \downarrow \gamma & \nwarrow \pi_1 & \\ N & & & & H \\ & \searrow \nu_2 & \downarrow & \nearrow \pi_2 & \\ & & G_2 & & \end{array}$$

**Bemerkung 4.3.**

- Jede Gruppe  $G$  mit Normalteiler  $N$  ist eine Erweiterung von  $H = G/N$  mit  $N$ , indem man für  $\nu$  die Inklusion und für  $\pi$  den kanonischen Epimorphismus wählt.

<sup>10</sup>Achtung: Dieser Sprachgebrauch ist in der Literatur nicht einheitlich.

(ii) Seien  $G_1$  und  $G_2$  äquivalente Erweiterungen mittels  $\gamma: G_1 \rightarrow G_2$ . Sei  $x \in \text{Ker}(\gamma)$ . Wegen  $\pi_1(x) = \pi_2(\gamma(x)) = 1$  ist  $x \in \nu_1(N)$ , sagen wir  $x = \nu_1(y)$ . Aus  $\nu_2(y) = \gamma(\nu_1(y)) = \gamma(x) = 1$  folgt  $y = 1 = x$ . Daher ist  $\gamma$  injektiv. Für  $g \in G_2$  existiert  $x \in G_1$  mit  $\pi_2(\gamma(x)) = \pi_1(x) = \pi_2(g)$ . Also existiert  $y \in N$  mit  $g^{-1}\gamma(x) = \nu_2(y) = \gamma(\nu_1(y))$ . Dies zeigt  $g \in \gamma(G_1)$  und  $\gamma$  ist surjektiv. Insgesamt gilt  $G_1 \cong G_2$ . Die Äquivalenz von Gruppen ist daher eine Äquivalenzrelation.

(iii) Isomorphe Erweiterungen müssen allerdings nicht äquivalent sein: Sei

$$G_1 = G_2 = \langle x, y \mid x^4 = y^2 = 1, yxy = x^{-1} \rangle \cong D_8,$$

$N = \langle x^2, y \rangle \cong C_2^2$  und  $H = \langle xy \rangle$ . Sei  $\nu_1$  die Inklusion,  $\nu_2(x^2) = y$  und  $\nu_2(y) = x^2$ . Seien  $\pi_1$  und  $\pi_2$  die kanonischen Epimorphismen. Wegen  $Z(G_i) = \langle x^2 \rangle$  kann es kein  $\gamma \in \text{Aut}(G_i)$  mit  $\gamma(x^2) = \gamma(\nu_1(x^2)) = \nu_2(x^2) = y$  geben. Dennoch ist es nützlich Erweiterungen bis auf Äquivalenz bestimmen zu können.

(iv) Seien  $G_1$  und  $G_2$  äquivalente Erweiterungen von  $H$  mit  $N$  bzgl.  $\gamma: G_1 \rightarrow G_2$ . Angenommen  $G_1$  zerfällt mit  $\rho_1: H \rightarrow G_1$  und  $\pi_1\rho_1 = \text{id}_H$ . Für  $\rho_2 := \gamma\rho_1: H \rightarrow G_2$  gilt  $\pi_2\rho_2 = \pi_2\gamma\rho_1 = \pi_1\rho_1 = \text{id}_H$ . Also zerfällt auch  $G_2$ .

(v) Ohne die im Folgenden beschriebenen Methoden kann man Erweiterungen in GAP mit dem `grpconst`-Paket konstruieren:

```
LoadPackage("grpconst",false);
G:=AlternatingGroup(6);; #das Paket erwartet eine Permutationsgruppe
up:=UpwardsExtensions(G,2)[2]; #Erweiterungen von G mit C2
List(up,IdGroup);
P:=DihedralGroup(IsPermGroup,32);;
up:=CyclicExtensions(P,2);; #ist schneller, aber reduziert nicht bis auf Isomorphie
Size(up)=Size(Set(up,IdGroup)); #false, also Liste redundant
UpwardsExtensionsNoCentre(G,2); #funktioniert nur für G = G' und Z(G) = 1
```

**Definition 4.4.** Seien  $H$  und  $N$  Gruppen. Für  $x \in N$  sei  $c_x \in \text{Inn}(N)$  der innere Automorphismus (d. h.  $c_x(y) = xyx^{-1}$ ). Ein Paar von Abbildungen

$$\alpha: H \rightarrow \text{Aut}(N), \quad x \mapsto \alpha_x, \quad \kappa: H \times H \rightarrow N$$

heißt *Parametersystem* von  $H$  mit  $N$ , falls für alle  $x, y, z \in H$  gilt:

- $\boxed{\alpha_x \alpha_y = c_{\kappa(x,y)} \alpha_{xy}},$
- $\boxed{\kappa(x,y) \kappa(xy,z) = \alpha_x(\kappa(y,z)) \kappa(x,yz)}.$

Ggf. nennt man  $\alpha$  *Automorphismensystem* und  $\kappa$  *Faktorensystem*. Ein Parametersystem (oder Faktorensystem) heißt *normalisiert*, falls  $\kappa(x,1) = \kappa(1,x) = 1$  für alle  $x \in H$  gilt (ggf. ist  $\alpha_1 = \text{id}_N$ ). Schließlich heißt  $\kappa$  *trivial*, falls  $\kappa(x,y) = 1$  für alle  $x, y \in G$  (ggf. ist  $\alpha$  ein Homomorphismus).

**Lemma 4.5.** Jede Erweiterung von  $H$  mit  $N$  bestimmt ein (normalisiertes) Parametersystem.

*Beweis.* Sei  $N \xrightarrow{\nu} G \xrightarrow{\pi} H$  eine Erweiterung. Für  $x \in H$  wählen wir  $\tilde{x} \in G$  mit  $\pi(\tilde{x}) = x$  und  $\tilde{1} = 1$ . Dann ist  $\alpha_x: N \rightarrow N, y \mapsto \nu^{-1}(\tilde{x}\nu(y)\tilde{x}^{-1})$  ein Automorphismus (beachte:  $\nu$  ist injektiv) und  $\alpha_1 = \text{id}_N$ .

Für  $x, y \in H$  ist  $\pi(\widetilde{xy}) = xy = \pi(\tilde{x})\pi(\tilde{y}) = \pi(\tilde{x}\tilde{y})$ . Daher existiert  $\kappa(x, y) \in N$  mit  $\tilde{x}\tilde{y} = \nu(\kappa(x, y))\widetilde{xy}$ . Dabei gilt  $\kappa(x, 1) = \kappa(1, x) = 1$ . Für  $g \in N$  gilt

$$\begin{aligned} (\alpha_x \alpha_y)(g) &= \alpha_x(\nu^{-1}(\tilde{y}\nu(g)\tilde{y}^{-1})) = \nu^{-1}(\tilde{x}\tilde{y}\nu(g)\tilde{y}^{-1}\tilde{x}^{-1}) = \nu^{-1}(\nu(\kappa(x, y))\widetilde{xy}\nu(g)\widetilde{xy}^{-1}\nu(\kappa(x, y)^{-1})) \\ &= \kappa(x, y)\nu^{-1}(\widetilde{xy}\nu(g)\widetilde{xy}^{-1})\kappa(x, y)^{-1} = c_{\kappa(x, y)}\alpha_{xy}(g). \end{aligned}$$

Für  $x, y, z \in H$  gilt

$$\begin{aligned} \nu(\kappa(x, y))\nu(\kappa(xy, z))\widetilde{xyz} &= \nu(\kappa(x, y))\widetilde{xy}\tilde{z} = (\tilde{x}\tilde{y})\tilde{z} = \tilde{x}(\tilde{y}\tilde{z}) = \tilde{x}\nu(\kappa(y, z))\widetilde{yz} \\ &= \nu(\alpha_x(\kappa(y, z)))\widetilde{xyz} = \nu(\alpha_x(\kappa(y, z)))\nu(\kappa(x, yz))\widetilde{xyz}. \end{aligned}$$

Da  $\nu$  injektiv ist, folgt die Behauptung.  $\square$

#### Beispiel 4.6.

- (i) Ist  $G = N \rtimes H$ , so kann man  $\tilde{x} \in H$  im obigen Beweis wählen. Man erhält dann das triviale Faktorensystem und für  $\alpha: H \rightarrow \text{Aut}(N)$  die Konjugationsoperation.
- (ii) Ist  $x \in H$  mit  $x^2 \neq 1$ , so kann man  $\widetilde{x^{-1}} = \tilde{x}^{-1}$  im obigen Beweis wählen. Man erhält dann  $\kappa(x, x^{-1}) = 1$ .
- (iii) Sei  $G = \langle x, y \rangle = Q_8$ ,  $N = \langle x \rangle \cong C_4$ ,  $\nu$  die Inklusion und  $H = \langle z \rangle \cong C_2$ . Wir können  $\tilde{z} = y$  wählen. Man erhält  $\kappa(z, z) = \tilde{z}^2(\tilde{z}^2)^{-1} = y^2 \neq 1$ .
- (iv) Sei  $n \in \mathbb{N}$  und  $H = \langle x \rangle \cong C_n \cong \langle a \rangle = N$ . Für  $i, j \in \mathbb{Z}$  sei  $\alpha_{x^i} := \text{id}_N$  und  $\kappa(x^i, x^j) := a^{ij}$  (wohldefiniert!). Dann gilt

$$\kappa(x^i, x^j)\kappa(x^i x^j, x^k) = x^{ij+(i+j)k} = x^{jk+i(j+k)} = \kappa(x^j, x^k)\kappa(x^i, x^j x^k).$$

Daher ist  $(\alpha, \kappa)$  ein normalisiertes Parametersystem.

**Lemma 4.7.** *Jedes normalisierte Parametersystem von  $H$  mit  $N$  bestimmt eine Erweiterung.*

*Beweis.* Sei  $(\alpha, \kappa)$  ein normalisiertes Parametersystem von  $H$  mit  $N$ . Wir betrachten die Menge  $G = N \times H$  mit der Verknüpfung

$$(a, x)(b, y) := (a\alpha_x(b)\kappa(x, y), xy).$$

Dann gilt

$$\begin{aligned} ((a, x)(b, y))(c, z) &= (a\alpha_x(b)\kappa(x, y), xy)(c, z) = (a\alpha_x(b)\kappa(x, y)\alpha_{xy}(c)\kappa(xy, z), xyz) \\ &= (a\alpha_x(b)\kappa(x, y)\alpha_{xy}(c)\kappa(x, y)^{-1}\kappa(x, y)\kappa(xy, z), xyz) \\ &= (a\alpha_x(b)\alpha_x(\alpha_y(c))\alpha_x(\kappa(y, z))\kappa(x, yz), xyz) \\ &= (a\alpha_x(b\alpha_y(c)\kappa(y, z))\kappa(x, yz), xyz) \\ &= (a, x)(b\alpha_y(c)\kappa(y, z), yz) = (a, x)((b, y)(c, z)). \end{aligned}$$

Die Verknüpfung ist daher assoziativ. Da  $\kappa$  normalisiert ist, ist  $(1, 1)$  ein neutrales Element. Inverse Elemente erhält man durch

$$(\kappa(y^{-1}, y)^{-1}\alpha_{y^{-1}}(b)^{-1}, y^{-1})(b, y) = (\kappa(y^{-1}, y)^{-1}\alpha_{y^{-1}}(b)^{-1}\alpha_{y^{-1}}(b)\kappa(y^{-1}, y), y^{-1}y) = (1, 1).$$

Also ist  $G$  eine Gruppe. Offenbar ist  $\nu: N \rightarrow G$ ,  $a \mapsto (a, 1)$  ein Monomorphismus und  $\pi: G \rightarrow H$ ,  $(a, x) \mapsto x$  ein Epimorphismus mit  $\nu(N) = N \times 1 = \text{Ker}(\pi)$ .  $\square$

**Bemerkung 4.8.**

- (i) Für das triviale Faktorensystem ergibt sich im obigen Beweis das semidirekte Produkt  $N \rtimes H$ .
- (ii) Sei  $(\alpha, \kappa)$  ein normalisiertes Parametersystem mit  $\alpha_x = \text{id}_N$  für alle  $x \in H$  (wir schreiben dafür  $\alpha = 1$ ). Wegen  $c_{\kappa(x,y)} = c_{\kappa(x,y)}\alpha_{xy} = \alpha_x\alpha_y = \text{id}_N$  ist  $\kappa(H \times H) \leq Z(N)$ . Sei  $G$  die entsprechende Erweiterung und  $K := \langle (1, x) : x \in H \rangle$ . Wegen

$$\begin{aligned} (a, x)(1, y)(a, x)^{-1} &= (a\kappa(x, y), xy)(\kappa(x^{-1}, x)^{-1}a^{-1}, x^{-1}) \\ &= (a\kappa(x, y)\kappa(x^{-1}, x)^{-1}a^{-1}\kappa(xy, x^{-1}), xyx^{-1}) = (1, x)(1, y)(1, x)^{-1} \in K \end{aligned}$$

ist  $K \trianglelefteq G$  und  $N \cap K \leq \kappa(H \times H) \leq Z(G)$ . Also ist  $G = N * K$  ein Zentralprodukt.

**Definition 4.9.** Zwei Parametersysteme  $(\alpha, \kappa), (\alpha', \kappa')$  heißen *äquivalent*, falls eine Abbildung  $\varphi: H \rightarrow N$  mit

- $\alpha'_x = c_{\varphi(x)}\alpha_x,$
- $\kappa'(x, y) = \varphi(x)\alpha_x(\varphi(y))\kappa(x, y)\varphi(xy)^{-1}$

für alle  $x, y \in H$  existiert. Ggf. schreiben wir  $(\alpha, \kappa) \sim (\alpha', \kappa')$ .

**Bemerkung 4.10.** Die Abbildungen  $H \rightarrow N$  bilden eine Gruppe  $C^1(H, N)$  bzgl.  $(\varphi\psi)(x) := \varphi(x)\psi(x)$  ( $x \in H$ ), die zu  $\times_{h \in H} N$  isomorph ist. Wir zeigen, dass  $\varphi(\alpha, \kappa) := (\alpha', \kappa')$  wie in Definition 4.9 eine Operation von  $C^1(H, N)$  auf der Menge der Parametersysteme definiert. Zunächst muss gezeigt werden, dass  $(\alpha', \kappa')$  ein Parametersystem ist:

$$\begin{aligned} \alpha'_x\alpha'_y &= c_{\varphi(x)}\alpha_x c_{\varphi(y)}\alpha_y = c_{\varphi(x)}\alpha_x c_{\varphi(y)}\alpha_x^{-1}\alpha_x\alpha_y = c_{\varphi(x)}c_{\alpha_x(\varphi(y))}c_{\kappa(x,y)}\alpha_{xy} = c_{\kappa'(x,y)}\alpha'_{xy} \\ \kappa'(x, y)\kappa'(xy, z) &= \varphi(x)\alpha_x(\varphi(y))\kappa(x, y)\alpha_{xy}(\varphi(z))\kappa(xy, z)\varphi(xyz)^{-1} \\ &= \varphi(x)\alpha_x(\varphi(y))(c_{\kappa(x,y)}\alpha_{xy})(\varphi(z))\kappa(x, y)\kappa(xy, z)\varphi(xyz)^{-1} \\ &= \varphi(x)\alpha_x(\varphi(y))(\alpha_x\alpha_y)(\varphi(z))\alpha_x(\kappa(y, z))\kappa(x, yz)\varphi(xyz)^{-1} \\ &= \varphi(x)\alpha_x(\varphi(y)\alpha_y(\varphi(z))\kappa(y, z))\kappa(x, yz)\varphi(xyz)^{-1} \\ &= (c_{\varphi(x)}\alpha_x)(\kappa'(y, z))\varphi(x)\alpha_x(\varphi(yz))\kappa(x, yz)\varphi(xyz)^{-1} \\ &= \alpha'_x(\kappa'(y, z))\kappa'(x, yz). \end{aligned}$$

Sicher ist  $1(\alpha, \kappa) = (\alpha, \kappa)$ . Sei  $\varphi, \psi \in C^1(H, N)$  mit  $\psi(\alpha, \kappa) = (\alpha', \kappa')$ . Dann gilt

$$\begin{aligned} c_{\varphi(x)}\alpha'_x &= c_{\varphi(x)}c_{\psi(x)}\alpha_x = c_{\varphi(x)\psi(x)}\alpha_x = c_{(\varphi\psi)(x)}\alpha_x, \\ \varphi(x)\alpha'_x(\varphi(y))\kappa'(x, y)\varphi(xy)^{-1} &= \varphi(x)\psi(x)\alpha_x(\varphi(y))\alpha_x(\psi(y))\kappa(x, y)\psi(xy)^{-1}\varphi(xy)^{-1} \\ &= (\varphi\psi)(x)\alpha_x((\varphi\psi)(y))\kappa(x, y)(\varphi\psi)(xy)^{-1}. \end{aligned}$$

Dies zeigt  $\varphi(\psi(\alpha, \kappa)) = \varphi\psi(\alpha, \kappa)$ . Die Äquivalenzklassen von Parametersystemen sind also die Bahnen unter  $C^1(H, N)$ . Insbesondere ist  $\sim$  eine Äquivalenzrelation. Die Anzahl der Äquivalenzklassen könnte man mit Burnsides Lemma bestimmen.

**Lemma 4.11.** Jedes Parametersystem ist zu einem normalisierten Parametersystem äquivalent.



*Beweis.* Sei  $(\alpha, \kappa)$  ein beliebiges Parametersystem und  $\zeta := \kappa(1, 1) \in N$ . Wegen  $\alpha_1 \alpha_1 = c_\zeta \alpha_1$  ist  $\alpha_1 = c_\zeta$ . Aus

$$\zeta \kappa(1 \cdot 1, x) = \alpha_1(\kappa(1, x)) \kappa(1, 1x) = \zeta \kappa(1, x) \zeta^{-1} \kappa(1, x)$$

folgt  $\kappa(1, x) = \zeta$  für alle  $x \in H$ . Mit  $\kappa(x, 1) \kappa(x, 1) = \alpha_x(\zeta) \kappa(x, 1 \cdot 1)$  ist  $\kappa(x, 1) = \alpha_x(\zeta)$ .

Definiere nun  $\varphi(1) := \zeta^{-1}$  und  $\varphi(y) := 1$  für  $y \in H \setminus \{1\}$ . Dann gilt

$$\begin{aligned} \varphi(x) \alpha_x(\varphi(1)) \kappa(x, 1) \varphi(x)^{-1} &= \varphi(x) \alpha_x(\zeta)^{-1} \alpha_x(\zeta) \varphi(x)^{-1} = 1, \\ \varphi(1) \alpha_1(\varphi(x)) \kappa(1, x) \varphi(x)^{-1} &= \zeta^{-1} \zeta \varphi(x) \zeta^{-1} \zeta \varphi(x)^{-1} = 1 \end{aligned}$$

für alle  $x \in H$ . Auf diese Weise erhält man ein äquivalentes normalisiertes Parametersystem.  $\square$

**Lemma 4.12.** *Äquivalente Erweiterungen definieren äquivalente Parametersysteme.*

*Beweis.* Seien  $N \xrightarrow{\nu_1} G_1 \xrightarrow{\pi_1} H$  und  $N \xrightarrow{\nu_2} G_2 \xrightarrow{\pi_2} H$  äquivalente Erweiterungen mittels  $\gamma: G_1 \rightarrow G_2$ . Für  $x \in H$  sei  $\tilde{x} \in G_1$  und  $\bar{x} \in G_2$  mit  $\pi_1(\tilde{x}) = x = \pi_2(\bar{x})$ . Wie im Beweis von Lemma 4.5 erhält man Parametersysteme  $(\alpha, \kappa)$  und  $(\alpha', \kappa')$  mit

$$\begin{aligned} \alpha_x(g) &= \nu_1^{-1}(\tilde{x} \nu_1(g) \tilde{x}^{-1}), & \kappa(x, y) &= \nu_1^{-1}(\tilde{x} \tilde{y} \tilde{x} \tilde{y}^{-1}), \\ \alpha'_x(g) &= \nu_2^{-1}(\bar{x} \nu_2(g) \bar{x}^{-1}), & \kappa'(x, y) &= \nu_2^{-1}(\bar{x} \bar{y} \bar{x} \bar{y}^{-1}) \end{aligned}$$

für  $x, y \in H$  und  $g \in N$ . Wegen  $\pi_2(\gamma(\tilde{x})) = \pi_1(\tilde{x}) = x = \pi_2(\bar{x})$  können wir

$$\varphi(x) := \nu_2^{-1}(\bar{x} \gamma(\tilde{x})^{-1}) \in N$$

für  $x \in H$  definieren. Wegen  $\gamma \nu_1 = \nu_2$  ist  $\varphi(x) = \nu_1^{-1}(\gamma^{-1}(\bar{x}) \tilde{x}^{-1})$ . Es folgt

$$\begin{aligned} (c_{\varphi(x)} \alpha_x)(g) &= \nu_1^{-1}(\gamma^{-1}(\bar{x}) \tilde{x}^{-1}) \nu_1^{-1}(\tilde{x} \nu_1(g) \tilde{x}^{-1}) \nu_1^{-1}(\tilde{x} \gamma^{-1}(\bar{x})^{-1}) = \nu_1^{-1}(\gamma^{-1}(\bar{x}) \nu_1(g) \gamma^{-1}(\bar{x})^{-1}) \\ &= \nu_1^{-1}(\gamma^{-1}(\bar{x} \nu_2(g) \bar{x}^{-1})) = \nu_2^{-1}(\bar{x} \nu_2(g) \bar{x}^{-1}) = \alpha'_x(g) \end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned} \varphi(x) \alpha_x(\varphi(y)) \kappa(x, y) \varphi(xy)^{-1} &= \nu_1^{-1}(\gamma^{-1}(\bar{x}) \tilde{x}^{-1}) \nu_1^{-1}(\tilde{x} \nu_1(\varphi(y)) \tilde{x}^{-1}) \nu_1^{-1}(\tilde{x} \tilde{y} \tilde{x} \tilde{y}^{-1}) \nu_1^{-1}(\tilde{x} \tilde{y} \gamma^{-1}(\bar{xy})^{-1}) \\ &= \nu_1^{-1}(\gamma^{-1}(\bar{x}) \nu_1(\varphi(y)) \tilde{y} \gamma^{-1}(\bar{xy})^{-1}) \\ &= \nu_1^{-1}(\gamma^{-1}(\bar{x}) \gamma^{-1}(\bar{y}) \gamma^{-1}(\bar{xy})^{-1}) = \nu_2^{-1}(\bar{x} \bar{y} \bar{x} \bar{y}^{-1}) = \kappa'(x, y). \end{aligned}$$

Daher sind  $(\alpha, \kappa)$  und  $(\alpha', \kappa')$  äquivalent.  $\square$

**Lemma 4.13.** *Äquivalente (normalisierte) Parametersysteme definieren äquivalente Erweiterungen.*

*Beweis.* Seien  $(\alpha, \kappa)$  und  $(\alpha', \kappa')$  äquivalente Parametersysteme mittels  $\varphi: H \rightarrow N$ . Nach Lemma 4.11 können wir annehmen, dass beide Parametersysteme normalisiert sind. Dann gilt

$$1 = \kappa'(1, x) = \varphi(1) \alpha_1(\varphi(x)) \kappa(1, x) \varphi(x)^{-1} = \varphi(1).$$

Wir konstruieren  $(G_1, \cdot)$  und  $(G_2, *)$  wie im Beweis von Lemma 4.7. Da  $G_1$  und  $G_2$  als Mengen gleich sind, können wir  $\gamma: G_1 \rightarrow G_2$ ,  $(a, x) \mapsto (a \varphi(x)^{-1}, x)$  definieren. Für  $(a, x), (b, y) \in G_1$  gilt

$$\begin{aligned} \gamma(a, x) * \gamma(b, y) &= (a \varphi(x)^{-1}, x) * (b \varphi(y)^{-1}, y) = (a \varphi(x)^{-1} \alpha'_x(b \varphi(y)^{-1}) \kappa'(x, y), xy) \\ &= (a \alpha_x(b \varphi(y)^{-1}) \alpha_x(\varphi(y)) \kappa(x, y) \varphi(xy)^{-1}, xy) = (a \alpha_x(b) \kappa(x, y) \varphi(xy)^{-1}, xy) \\ &= \gamma(a \alpha_x(b) \kappa(x, y), xy) = \gamma((a, x) \cdot (b, y)), \end{aligned}$$

d. h.  $\gamma$  ist ein Homomorphismus. Außerdem gilt

$$\begin{aligned}(\gamma\nu_1)(a) &= \gamma(a, 1) = (a\varphi(1)^{-1}, 1) = (a, 1) = \nu_2(a), \\(\pi_2\gamma)(a, x) &= \pi_2(a\varphi(x)^{-1}, x) = x = \pi_1(a, x).\end{aligned}$$

Also sind  $G_1$  und  $G_2$  äquivalent.  $\square$

**Satz 4.14** (SCHREIER). *Es gibt eine Bijektion zwischen der Menge der Äquivalenzklassen von Erweiterungen von  $H$  mit  $N$  und der Menge der Äquivalenzklassen von (normalisierten) Parametersystemen von  $H$  mit  $N$ .*

*Beweis.* Nach Lemma 4.12 und Lemma 4.13 gibt es wohldefinierte Abbildungen zwischen den Mengen von Äquivalenzklassen. Wir zeigen, dass sie zueinander invers sind.

Die Erweiterung  $N \xrightarrow{\nu_1} G_1 \xrightarrow{\pi_1} H$  definiere das normalisierte Parametersystem  $(\alpha, \kappa)$  mit den Elementen  $\tilde{x} \in G_1$  wie in Lemma 4.5. Aus  $(\alpha, \kappa)$  konstruieren wir die Erweiterung  $N \xrightarrow{\nu_2} G_2 \xrightarrow{\pi_2} H$  wie in Lemma 4.7. Jedes Element in  $G_1$  lässt sich eindeutig in der Form  $\nu_1(a)\tilde{x}$  mit  $a \in N$  und  $x \in H$  schreiben. Wir definieren  $\gamma: G_1 \rightarrow G_2$ ,  $\nu_1(a)\tilde{x} \mapsto (a, x)$ . Für  $\nu_1(a)\tilde{x}, \nu_1(b)\tilde{y} \in G_1$  gilt

$$\begin{aligned}\gamma(\nu_1(a)\tilde{x} \cdot \nu_1(b)\tilde{y}) &= \gamma(\nu_1(a)\tilde{x}\nu_1(b)\tilde{x}^{-1} \cdot \tilde{x}\tilde{y}) = \gamma(\nu_1(a)\nu_1(\alpha_x(b)) \cdot \nu_1(\kappa(x, y))\widetilde{xy}) \\&= (a\alpha_x(b)\kappa(x, y), xy) = (a, x) * (b, y) = \gamma(\nu_1(a)\tilde{x}) * \gamma(\nu_1(b)\tilde{y}),\end{aligned}$$

d. h.  $\gamma$  ist ein Homomorphismus mit

$$\begin{aligned}(\gamma\nu_1)(a) &= \gamma(\nu_1(a)\tilde{1}) = (a, 1) = \nu_2(a), \\(\pi_2\gamma)(\nu_1(a)\tilde{x}) &= \pi_2(a, x) = x = \pi_1(\tilde{x}) = \pi_1(\nu_1(a)\tilde{x}).\end{aligned}$$

Also sind  $G_1$  und  $G_2$  äquivalent.

Umgekehrt sei zuerst  $(\alpha, \kappa)$  normalisiert gegeben. Wir konstruieren die Erweiterung  $G$  und daraus das Parametersystem  $(\alpha', \kappa')$  mittels der Elemente  $\tilde{x} = (1, x) \in G$  für  $x \in H$ . Zunächst gilt

$$\kappa(x, x^{-1}) = \kappa(x, x^{-1})\kappa(xx^{-1}, x) = \alpha_x(\kappa(x^{-1}, x))\kappa(x, x^{-1}x) = \alpha_x(\kappa(x^{-1}, x)) \quad (4.1)$$

für  $x \in H$ . Daraus folgt

$$\begin{aligned}\alpha'_x(g) &= \nu^{-1}(\tilde{x}\nu(g)\tilde{x}^{-1}) = \nu^{-1}((1, x)(g, 1)(1, x)^{-1}) = \nu^{-1}((\alpha_x(g), x)(\kappa(x^{-1}, x)^{-1}, x^{-1})) \\&= \nu^{-1}(\alpha_x(g)\alpha_x(\kappa(x^{-1}, x)^{-1})\kappa(x, x^{-1}), 1) = \alpha_x(g), \\ \kappa'(x, y) &= \nu^{-1}(\tilde{x}\widetilde{yxy}^{-1}) = \nu^{-1}((1, x)(1, y)(\kappa((xy)^{-1}, xy)^{-1}, (xy)^{-1})) \\&= \nu^{-1}((\kappa(x, y), xy)(\kappa((xy)^{-1}, xy)^{-1}, (xy)^{-1})) \\&= \nu^{-1}(\kappa(x, y)\alpha_{xy}(\kappa((xy)^{-1}, xy)^{-1})\kappa(xy, (xy)^{-1}), 1) \\&= \nu^{-1}(\kappa(x, y), 1) = \kappa(x, y)\end{aligned}$$

für  $x, y \in H$  und  $g \in N$ . Dies zeigt  $(\alpha, \kappa) = (\alpha', \kappa')$ .  $\square$

**Bemerkung 4.15.** Nach Bemerkung 4.3 entsprechen die zerfallenden Erweiterungen bis auf Äquivalenz genau den Parametersystemen mit trivialem Faktorensystem.

**Satz 4.16.** *Sei  $H = \langle x \rangle \cong C_n$  und  $\beta \in \text{Aut}(N)$ . Genau dann existiert ein Parametersystem  $(\alpha, \kappa)$  mit  $\alpha_x = \beta$ , wenn ein  $a \in N$  mit  $\beta(a) = a$  und  $\beta^n = c_a$  existiert.*

*Beweis.* Sei  $(\alpha, \kappa)$  ein Parametersystem mit  $\alpha_x = \beta$ . Im Fall  $n = 1$  gilt die Behauptung mit  $a := \kappa(1, 1)$ , denn

$$\begin{aligned}\alpha_1 \alpha_1 &= c_{\kappa(1,1)} \alpha_1, \\ \kappa(1, 1) \kappa(1, 1) &= \alpha_1(\kappa(1, 1)) \kappa(1, 1).\end{aligned}$$

Für  $n \geq 2$  dürfen wir zu einem normalisierten Parametersystem übergeben, ohne dass sich  $\alpha_x$  ändert (siehe Beweis von Lemma 4.11). Wir konstruieren die entsprechende Erweiterung  $G = N \times H$ . Für  $\tilde{x} := (1, x) \in G$  und  $b \in N$  gilt

$$\tilde{x} \nu(b) \tilde{x}^{-1} = (1, x)(b, 1)(1, x)^{-1} = (\alpha_x(b), x)(\kappa(x^{-1}, x)^{-1}, x^{-1}) \stackrel{(4.1)}{=} (\alpha_x(b), 1) = \nu(\beta(b)).$$

Also ist  $\beta = \nu^{-1} c_{\tilde{x}} \nu$ . Sei  $(a, 1) := \tilde{x}^n$ . Dann gilt  $\beta^n = \nu^{-1} c_{(a,1)} \nu = c_a$  und

$$\beta(a) = \nu^{-1}(\tilde{x} \nu(a) \tilde{x}^{-1}) = \nu^{-1}(\tilde{x} \tilde{x}^n \tilde{x}^{-1}) = \nu^{-1}(a, 1) = a.$$

Sei umgekehrt  $\beta^n = c_a$  und  $\beta(a) = a$  für ein  $a \in N$ . Wir definieren  $\alpha_{x^i} := \beta^i$  und

$$\kappa(x^i, x^j) := \begin{cases} 1 & \text{falls } i + j < n, \\ a & \text{falls } i + j \geq n \end{cases}$$

für  $0 \leq i, j \leq n - 1$ . Dann gilt

$$\alpha_{x^i} \alpha_{x^j} = \beta^{i+j} = \begin{cases} \alpha_{x^{i+j}} = c_{\kappa(x^i, x^j)} \alpha_{x^i x^j} & \text{falls } i + j < n, \\ c_a \beta^{i+j-n} = c_{\kappa(x^i, x^j)} \alpha_{x^i x^j} & \text{falls } i + j \geq n \end{cases}$$

und

$$\kappa(x^i, x^j) \kappa(x^{i+j}, x^k) = \begin{cases} 1 & \text{falls } i + j + k < n, \\ a & \text{falls } n \leq i + j + k < 2n, \\ a^2 & \text{falls } i + j + k \geq 2n. \end{cases}$$

Wegen  $\alpha_{x^i}(a) = \beta^i(a) = a$  gilt  $\kappa(x^i, x^j) \kappa(x^{i+j}, x^k) = \alpha_{x^i}(\kappa(x^j, x^k)) \kappa(x^i, x^{j+k})$  in allen Fällen. Somit ist  $(\alpha, \kappa)$  ein Parametersystem.  $\square$

#### Beispiel 4.17.

- (i) Ist  $\beta$  in der Situation von Satz 4.16 ein innerer Automorphismus, sagen wir  $\beta = c_b$  mit  $b \in N$ , so gelten die Voraussetzungen mit  $a = b^n$ . Es gibt also immer eine Erweiterung, sodass  $\beta$  von  $x$  induziert wird.
- (ii) Ist  $N$  abelsch, so reduzieren sich die Bedingungen zu  $\beta^n = 1$ . Für nicht-abelsche Gruppen ist das nicht ausreichend (Aufgabe 17).

**Bemerkung 4.18.** Sei  $N$  abelsch. Dann sind die Automorphismensysteme genau die Homomorphismen  $\alpha: H \rightarrow \text{Aut}(N)$ . Die entsprechenden Faktorensysteme bilden eine Untergruppe  $F_\alpha \leq C^2(H, N) := C^1(H \times H, N)$  (bei festem  $\alpha$ ). Aus  $(\alpha, \kappa) \sim (\alpha', \kappa')$  folgt außerdem  $\alpha = \alpha'$ . Man kann also die Äquivalenzklassen innerhalb  $F_\alpha$  untersuchen.

**Satz 4.19.** Sei  $N$  abelsch und  $\alpha: H \rightarrow \text{Aut}(N)$  ein Homomorphismus. Dann ist

$$P_\alpha := \{\kappa \in F_\alpha : (\alpha, \kappa) \sim (\alpha, 1)\} \leq F_\alpha.$$

Die Äquivalenzklassen von Parametersystemen mit Automorphismensystem  $\alpha$  entsprechen den Elementen von  $\overline{F_\alpha} := F_\alpha/P_\alpha$ .

*Beweis.* Für  $\kappa, \kappa' \in P_\alpha$  existieren  $\varphi, \psi \in C^1(H, N)$  mit  $\kappa(x, y) = \varphi(x)\alpha_x(\varphi(y))\varphi(xy)^{-1}$  und  $\kappa'(x, y) = \psi(x)\alpha_x(\psi(y))\psi(xy)^{-1}$  für  $x, y \in H$ . Da  $N$  abelsch ist, folgt

$$(\kappa\kappa')(x, y) = (\varphi\psi)(x)\alpha_x((\varphi\psi)(y))(\varphi\psi)(xy)^{-1}$$

und  $\kappa\kappa' \in P_\alpha$ . Man erhält leicht  $P_\alpha \leq F_\alpha$ . Da  $C^2(H, N) \cong \prod_{x \in H \times H} N$  abelsch ist, gilt  $P_\alpha \trianglelefteq F_\alpha$  und  $\overline{F_\alpha}$  ist wohldefiniert. Außerdem ist

$$\begin{aligned} (\alpha, \kappa) \sim (\alpha, \kappa') &\iff \exists \varphi \in C^1(H, N) \forall x, y \in H : \kappa'(x, y) = \varphi(x)\alpha_x(\varphi(y))\kappa(x, y)\varphi(xy)^{-1} \\ &\iff \exists \varphi \in C^1(H, N) : \kappa^{-1}\kappa' \in P_\alpha \iff \kappa P_\alpha = \kappa' P_\alpha. \end{aligned}$$

□

**Bemerkung 4.20.** Erweiterungen lassen sich auf dem Computer besonders effizient für *polyzyklische* Gruppen  $H$  berechnen. Dies bedeutet, dass  $H$  eine Subnormalreihe mit zyklischen Faktoren besitzt. Für endliche Gruppen ist polyzyklisch äquivalent zu auflösbar. Wir nehmen außerdem an, dass  $N$  eine elementarabelsche  $p$ -Gruppe ist. Durch den Homomorphismus  $\alpha: H \rightarrow \text{Aut}(N)$  wird  $N$  dann zu einem  $\mathbb{F}_p H$ -Modul.

```
H:=SymmetricGroup(4);; #Permutationsgruppe
H:=Image(IsomorphismPcGroup(H));; #isomorphe polyzyklische Gruppe
IrrM:=IrreducibleModules(H,GF(2),2); #einfache F2H-Moduln der Dimension ≤ 2
N:=IrrM[2][2];; #ein 2-dimensional einfacher F2H-Modul, also N ≅ C2^2
ext:=Extensions(H,N); #zwei Erweiterungen der Ordnung 96
List(ext,IdGroup); #Nummer in der small groups library
IdGroup(SplitExtension(H,N)); #zerfallende Erweiterung
Fa:=VectorSpace(GF(2),TwoCocycles(H,N));; #= Fα
Pa:=Subspace(Fa,TwoCoboundaries(H,N));; #= Pα
t:=Difference(Fa,Pa)[1];; #nicht-triviales Faktorensystem
G:=Extension(H,N,t);; #das sollte die nicht-zerfallende Erweiterung sein
IdGroup(G);
TwoCohomology(H,N); #mehr Info über Fα
```

Für nicht-polyzyklische Gruppen kann man das `cohomolo`-Paket (bisher nur unter Linux) einbinden. Es erwartet als Eingabe eine Permutationsgruppe und eine dazu isomorphe endlich präsentierte Gruppe.

```
LoadPackage("cohomolo",false); #false unterdrückt Banner
H:=GL(5,2);;
gen:=GeneratorsOfGroup(H);;
Hp:=Image(IsomorphismPermGroup(H));;
Hf:=Image(IsomorphismFpGroupByGenerators(H,gen));;
chr:=CHR(Hp,2,Hf,gen); #hier ist N = F2^5 und α: H → Aut(N) der natürliche Isomorphismus
SecondCohomologyDimension(chr); #=1 bedeutet Fα ≅ F2, d.h. es gibt zwei Erweiterungen
G:=NonsplitExtension(chr); #das ist die DEMPWOLFF-Gruppe
Size(G); #dauert ewig
```

**Satz 4.21.** Sei  $N$  abelsch,  $K \leq H$  endlich und  $\alpha: H \rightarrow \text{Aut}(N)$  ein Homomorphismus. Sei  $\alpha_K: K \rightarrow \text{Aut}(N)$  die Einschränkung von  $\alpha$ . Dann ist die Abbildung

$$\overline{F_\alpha} \rightarrow \overline{F_{\alpha_K}}, \quad \kappa P_\alpha \mapsto \kappa_{K \times K} P_{\alpha_K}$$

ein Homomorphismus. Aus  $\kappa_{K \times K} \in P_{\alpha_K}$  folgt  $\kappa^{|H:K|} \in P_\alpha$ . Insbesondere ist  $\exp(\overline{F_\alpha})$  ein Teiler von  $|H|$ .

*Beweis.* Für  $\kappa \in F_\alpha$  ist offensichtlich  $\kappa_{K \times K} \in F_{\alpha_K}$  und die Abbildung  $F_\alpha \rightarrow F_{\alpha_K}$ ,  $\kappa \mapsto \kappa_{K \times K}$  ist ein Homomorphismus. Aus  $\kappa \equiv \kappa' \pmod{P_\alpha}$  folgt  $\kappa_{K \times K} \equiv \kappa'_{K \times K} \pmod{F_{\alpha_K}}$ . Also ist  $\overline{F_\alpha} \rightarrow \overline{F_{\alpha_K}}$  ein wohldefinierter Homomorphismus.

Sei nun  $\kappa_{K \times K} \in P_{\alpha_K}$ . Sei  $G$  eine Erweiterung von  $H$  mit  $N$  bzgl.  $(\alpha, \kappa)$ . Dann existiert ein Homomorphismus  $\rho: K \rightarrow G$  mit  $\pi\rho = \text{id}_K$ . Sei  $R$  ein Repräsentantensystem für  $H/K$  mit  $1 \in R$ . Für  $r \in R$  sei  $\tilde{r} \in G$  mit  $\pi(\tilde{r}) = r$  und  $\tilde{1} = 1$ . Für  $x \in H$  sei  $r_x \in R$  mit  $r_x^{-1}x \in K$ . Wir definieren  $\tilde{x} := \tilde{r}_x \rho(r_x^{-1}x)$ . Dann gilt  $\pi(\tilde{x}) = r_x r_x^{-1}x = x$  und

$$\kappa'(x, y) := \nu^{-1}(\tilde{x}\tilde{y}\tilde{xy}^{-1})$$

definiert ein zu  $(\alpha, \kappa)$  äquivalentes normalisiertes Parametersystem. Für  $x, y \in H$  gilt  $r_{xy}K = xyK = xr_yK = r_{xr_y}K$  und  $r_{xy} = r_{xr_y}$ . Es folgt

$$\begin{aligned} \kappa'(x, y) &= \nu^{-1}(\tilde{x}\tilde{r}_y\rho(r_y^{-1}y)\tilde{xy}^{-1}) = \nu^{-1}(\tilde{x}\tilde{r}_y\tilde{xy}^{-1}\tilde{r}_y\rho(r_y^{-1}y)\tilde{xy}^{-1}) \\ &= \kappa'(x, r_y)\nu^{-1}(\tilde{xy}\rho(r_y^{-1}y)\tilde{xy}^{-1}) = \kappa'(x, r_y)\nu^{-1}(\tilde{r}_{xy}\rho(r_{xy}^{-1}x r_y)\rho(r_y^{-1}y)\tilde{xy}^{-1}) = \kappa'(x, r_y). \end{aligned}$$

Für  $r \in R$  folgt

$$\kappa'(x, y) = \alpha_x(\kappa'(y, r))\kappa'(x, yr)\kappa'(xy, r)^{-1} = \alpha_x(\kappa'(y, r))\kappa'(x, r_{yr})\kappa'(xy, r)^{-1}.$$

Mit  $r$  läuft auch  $r_{yr}$  durch alle Elemente in  $R$ . Sei  $\varphi(x) := \prod_{r \in R} \kappa'(x, r)$  für  $x \in H$ . Dann gilt

$$\kappa'(x, y)^{|H:K|} = \prod_{r \in R} \alpha_x(\kappa'(y, r))\kappa'(x, r_{yr})\kappa'(xy, r)^{-1} = \alpha_x(\varphi(y))\varphi(x)\varphi(xy)^{-1}.$$

Dies zeigt  $(\kappa')^{|H:K|} \in P_\alpha$ . Wegen  $(\alpha, \kappa) \sim (\alpha, \kappa')$  ist auch  $\kappa^{|H:K|} \in P_\alpha$  nach Satz 4.19.

Die zweite Aussage folgt, indem man  $K = 1$  wählt. □

**Bemerkung 4.22.** Die folgenden beiden Sätze wurden nachträglich im Gruppentheorie-Skript mit alternativen Beweisen hinzugefügt.

**Satz 4.23** (GASCHÜTZ). Sei  $G$  eine endliche Gruppe mit abelschem Normalteiler  $N$ . Sei  $N \leq H \leq G$  mit  $\text{ggT}(|N|, |G : H|) = 1$ , sodass  $N$  ein Komplement in  $H$  besitzt. Dann besitzt  $N$  ein Komplement in  $G$ .

*Beweis.* Bekanntlich ist  $G$  eine Erweiterung von  $G/N$  mit  $N$ . Sei  $(\alpha, \kappa)$  das entsprechende Parametersystem. Nach Voraussetzung zerfällt die Erweiterung von  $K := H/N$  mit  $N$ . Daher ist  $\kappa_{K \times K} \in P_{\alpha_K}$ . Aus Satz 4.21 folgt  $\kappa^{|G:H|} \in P_\alpha$ . Wegen  $F_\alpha \leq C^2(G/N, N)$  ist auch  $\kappa^{|N|} \in P_\alpha$ . Aus  $\text{ggT}(|G : H|, |N|) = 1$  ergibt sich  $\kappa \in P_\alpha$ , d. h.  $G$  zerfällt. □

**Satz 4.24** (GASCHÜTZ). Sei  $G$  eine endliche Gruppe mit abelschem Normalteiler  $N$ . Genau dann besitzt  $N$  ein Komplement in  $G$ , wenn  $N$  ein Komplement in  $P$  besitzt für jede Sylowgruppe  $P/N$  von  $G/N$ .

*Beweis.* Ist  $K$  ein Komplement von  $N$  in  $G$ , so ist  $K \cap P$  ein Komplement von  $N$  in  $P$  für  $N \leq P \leq G$ , denn  $N(K \cap P) = NK \cap P = P$  und  $N \cap (K \cap P) \leq N \cap K = 1$ .

Nehmen wir nun umgekehrt an, dass  $N$  ein Komplement in  $P$  besitzt für alle Sylowgruppen  $P/N$  von  $G/N$ . Sei  $(\alpha, \kappa)$  das Parametersystem der Erweiterung  $G$ . Nach Satz 4.21 gilt  $\kappa^{|G:P|} \in P_\alpha$ . Dies zeigt  $\kappa^{|G/N|_{p'}} \in P_\alpha$  für alle Primteiler  $p$  von  $|G/N|$ . Da die Zahlen  $|G/N|_{p'}$  teilerfremd sind (wobei  $p$  über alle Primteiler von  $|G|$  läuft), folgt  $\kappa \in P_\alpha$ , d. h.  $G$  zerfällt.  $\square$

**Definition 4.25.** Sei nun  $N$  beliebig und  $(\alpha, \kappa)$  ein Parametersystem.

- Die Abbildung  $\omega: H \rightarrow \text{Out}(N)$ ,  $x \mapsto \alpha_x \text{Inn}(N)$  ist ein Homomorphismus, den man die *Paarung* von  $(\alpha, \kappa)$  nennt. Sei  $\text{Par}(\omega)$  die Menge der Parametersysteme mit Paarung  $\omega$ . Äquivalente Parametersysteme definieren die gleiche Paarung. Sei  $\overline{\text{Par}(\omega)}$  die entsprechende Menge der Äquivalenzklassen.
- Sei  $Z := Z(N)$ . Jeder Homomorphismus  $\omega: H \rightarrow \text{Out}(N)$ ,  $x \mapsto \omega_x \text{Inn}(N)$  definiert einen wohldefinierten Homomorphismus  $\omega_Z: H \rightarrow \text{Aut}(Z)$ ,  $x \mapsto (\omega_x)|_Z$ .

**Bemerkung 4.26.** Nicht zu jedem Homomorphismus  $\omega: H \rightarrow \text{Out}(N)$  muss ein entsprechendes Parametersystem existieren (Aufgabe 17).

**Satz 4.27.** Sei  $\omega: H \rightarrow \text{Out}(N)$  ein Homomorphismus mit  $\text{Par}(\omega) \neq \emptyset$ . Sei  $Z := Z(N)$  und  $\beta := \omega_Z$ . Dann operiert  $\overline{F_\beta}$  regulär auf  $\overline{\text{Par}(\omega)}$ . Insbesondere sind  $\overline{\text{Par}(\omega)}$  und  $\overline{F_\beta}$  gleichmächtig.

*Beweis.* Sei  $\lambda \in F_\beta$  und  $(\alpha, \kappa) \in \text{Par}(\omega)$ . Wegen  $\lambda(H \times H) \leq Z$  gilt

$$\begin{aligned} \alpha_x \alpha_y &= c_{\kappa(x,y)} \alpha_{xy} = c_{(\lambda\kappa)(x,y)} \alpha_{xy}, \\ (\lambda\kappa)(x, y)(\lambda\kappa)(xy, z) &= \alpha_x(\kappa(y, z))\beta_x(\lambda(y, z))(\lambda\kappa)(x, yz) = \alpha_x((\lambda\kappa)(y, z))(\lambda\kappa)(x, yz) \end{aligned}$$

für  $x, y, z \in H$ . Daher ist  $(\alpha, \lambda\kappa) \in \text{Par}(\omega)$ . Man sieht leicht, dass  ${}^\lambda(\alpha, \kappa) := (\alpha, \lambda\kappa)$  eine Operation von  $F_\beta$  auf  $\text{Par}(\omega)$  definiert. Sei  $(\alpha', \kappa') \sim (\alpha, \kappa)$ . Dann existiert  $\varphi \in C^1(H, N)$  mit

$$\begin{aligned} \alpha'_x &= c_{\varphi(x)} \alpha_x, \\ (\lambda\kappa')(x, y) &= \varphi(x) \alpha_x(\varphi(y)) (\lambda\kappa)(x, y) \varphi(xy)^{-1}. \end{aligned}$$

Also ist  ${}^\lambda(\alpha, \kappa) \sim {}^\lambda(\alpha', \kappa')$  und  $F_\beta$  operiert auf  $\overline{\text{Par}(\omega)}$ . Sei  $\lambda \in F_\beta$ , also  $\lambda(x, y) = \delta(x) \beta_x(\delta(y)) \delta(xy)^{-1}$  für ein  $\delta \in C^1(H, Z)$ . Dann ist

$$(\lambda\kappa)(x, y) = \delta(x) \alpha_x(\delta(y)) \kappa(x, y) \delta(xy)^{-1},$$

d. h.  ${}^\lambda(\alpha, \kappa) \sim (\alpha, \kappa)$ . Somit operiert  $P_\beta$  trivial auf  $\overline{\text{Par}(\omega)}$  und man erhält eine wohldefinierte Operation von  $\overline{F_\beta}$  auf  $\overline{\text{Par}(\omega)}$ . Sei  $\lambda \in F_\beta$  mit  ${}^\lambda(\alpha, \kappa) \sim (\alpha, \kappa)$ . Dann existiert  $\varphi \in C^1(H, N)$  mit

$$\begin{aligned} \alpha_x &= c_{\varphi(x)} \alpha_x, \\ (\lambda\kappa)(x, y) &= \varphi(x) \alpha_x(\varphi(y)) \kappa(x, y) \varphi(xy)^{-1} \end{aligned}$$

für  $x, y \in H$ . Es folgt  $\varphi(H) \leq Z$  und  $\lambda(x, y) = \varphi(x) \beta_x(\varphi(y)) \varphi(xy)^{-1}$ . Dies zeigt  $\lambda \in P_\beta$ . Daher operiert  $\overline{F_\beta}$  fixpunktfrei auf  $\overline{\text{Par}(\omega)}$ . Für die Transitivität seien  $(\alpha, \kappa), (\alpha', \kappa') \in \text{Par}(\omega)$ . Wegen  $\alpha_x \text{Inn}(N) = \omega(x) = \alpha'_x \text{Inn}(N)$  für  $x \in H$  existiert  $\varphi \in C^1(H, N)$  mit  $\alpha_x = c_{\varphi(x)} \alpha'_x$  für  $x \in H$ . Wir können also  $(\alpha', \kappa')$  durch ein äquivalentes Parametersystem der Form  $(\alpha, \kappa')$  ersetzen. Nun gilt

$$c_{\kappa(x,y)} \alpha_{xy} = \alpha_x \alpha_y = c_{\kappa'(x,y)} \alpha_{xy}$$

und  $\lambda := \kappa^{-1}\kappa': H \times H \rightarrow Z$ . Wegen

$$\begin{aligned}\lambda(x, y)\lambda(xy, z) &= \kappa(xy, z)^{-1}\lambda(x, y)\kappa'(xy, z) = \kappa(xy, z)^{-1}\kappa(x, y)^{-1}\kappa'(x, y)\kappa'(xy, z) \\ &= (\alpha_x(\kappa(y, z))\kappa(x, yz))^{-1}\alpha_x(\kappa'(y, z))\kappa'(x, yz) \\ &= \kappa(x, yz)^{-1}\alpha_x(\kappa(y, z)^{-1}\kappa'(y, z))\kappa'(x, yz) = \kappa(x, yz)^{-1}\beta_x(\lambda(y, z))\kappa'(x, yz) \\ &= \beta_x(\lambda(y, z))\kappa(x, yz)^{-1}\kappa'(x, yz) = \beta_x(\lambda(y, z))\lambda(x, yz)\end{aligned}$$

für  $x, y \in H$  gilt  $\lambda \in F_\beta$  und  ${}^\lambda(\alpha, \kappa) = (\alpha, \kappa\lambda) = (\alpha, \kappa')$ . Also operiert  $\overline{F_\beta}$  regulär auf  $\overline{\text{Par}(\omega)}$ .  $\square$

**Folgerung 4.28.** Sei  $Z(N) = 1$ . Dann gilt:

- (i) Für jeden Homomorphismus  $\omega: H \rightarrow \text{Out}(N)$  gilt  $|\overline{\text{Par}(\omega)}| = 1$ .
- (ii) Besitzt  $\text{Inn}(N) \cong N$  ein Komplement in  $\text{Aut}(N)$ , so zerfällt jede Erweiterung mit  $N$ .

*Beweis.*

- (i) Sei  $\omega(x) = \alpha_x \text{Inn}(N)$  für  $x \in H$ . Wegen  $\alpha_{xy} \text{Inn}(N) = \omega(xy) = \omega(x)\omega(y) = \alpha_x \alpha_y \text{Inn}(N)$  existieren  $\kappa(x, y) \in N$  mit  $\alpha_x \alpha_y = c_{\kappa(x, y)} \alpha_{xy}$  für alle  $x, y \in H$ . Dabei gilt

$$\begin{aligned}c_{\kappa(x, y)\kappa(xy, z)} \alpha_{xyz} &= c_{\kappa(x, y)} \alpha_{xy} \alpha_z = \alpha_x \alpha_y \alpha_z = \alpha_x c_{\kappa(y, z)} \alpha_{yz} \\ &= c_{\alpha_x(\kappa(y, z))} \alpha_x \alpha_{yz} = c_{\alpha_x(\kappa(y, z))\kappa(x, yz)} \alpha_{xyz}.\end{aligned}$$

Aus  $\text{Inn}(N) \cong N/Z(N) \cong N$  folgt  $\kappa(x, y)\kappa(xy, z) = \alpha_x(\kappa(y, z))\kappa(x, yz)$ . Dies zeigt  $(\alpha, \kappa) \in \text{Par}(\omega) \neq \emptyset$  und  $|\overline{\text{Par}(\omega)}| = 1$  nach Satz 4.27.

- (ii) Nach Voraussetzung existiert ein Homomorphismus  $\tau: \text{Out}(N) \rightarrow \text{Aut}(N)$  mit  $\tau(\gamma) \text{Inn}(N) = \gamma$  für alle  $\gamma \in \text{Out}(N)$ . Jeder Homomorphismus  $\omega: H \rightarrow \text{Out}(N)$  lässt sich also zu einem Homomorphismus  $\alpha := \tau\omega: H \rightarrow \text{Aut}(N)$  liften (d. h.  $\omega(x) = \alpha_x \text{Inn}(N)$  für alle  $x \in H$ ). Nach (i) ist die zerfallende Erweiterung bzgl.  $(\alpha, 1)$  die einzige Erweiterung mit Paarung  $\omega$ .  $\square$

**Beispiel 4.29.** Ist  $N$  vollständig, d. h.  $Z(N) = 1 = \text{Out}(N)$ , so gibt es nur die Erweiterungen  $N \times H$ . Dies wurde bereits in GT-Aufgabe 26 gezeigt.

**Bemerkung 4.30.** Die Anzahl der Erweiterungen mit einer nicht-abelschen Gruppe  $N$  zu einer Paarung  $\omega: K \rightarrow \text{Out}(N)$  lässt sich mit dem `hap`-Paket bestimmen:

```
LoadPackage("hap", false); #lädt weitere Pakete
N:=QuaternionGroup(8);
H:=AutomorphismGroup(N);
NH:=SemidirectProduct(H, N);
omega:=GOuterGroup(NH, Image(Embedding(NH, 2))); #definiert Paarung H -> Out(N)
beta:=Center(omega); #zugehöriges Faktorensystem H -> Aut(Z(N))
A:=ActingGroup(beta); #Urbild von beta
R:=ResolutionFiniteGroup(A, 3); #drei Glieder einer Auflösung
C:=HomToGModule(R, alpha); #zugehöriger Kettenkomplex
Cohomology(C, 2); #Ordnungen der zyklischen Faktoren von F_beta
```

**Satz 4.31** (JOHNSON-ZASSENHAUS). Zwei Erweiterungen  $N \xrightarrow{\nu_i} G_i \xrightarrow{\pi_i} H$  ( $i = 1, 2$ ) sind genau dann äquivalent, wenn für jede Sylowgruppe  $P$  von  $H$  die Erweiterungen  $\pi_1^{-1}(P)$  und  $\pi_2^{-1}(P)$  von  $P$  mit  $N$  äquivalent sind.

*Beweis.* Seien  $G_1$  und  $G_2$  äquivalent mittels  $\gamma: G_1 \rightarrow G_2$ . Für eine Primzahl  $p$  und  $P \in \text{Syl}_p(H)$  sei  $P_i := \pi_i^{-1}(P) \leq G_i$  und  $\delta := \gamma_{P_1}$ . Dann gilt

$$\delta(P_1) = \gamma(\pi_1^{-1}(P)) = \gamma(\gamma^{-1}(\pi_2^{-1}(P))) = P_2,$$

$\delta\nu_1 = \nu_2$  und  $(\pi_2)_{|P_2}\delta = (\pi_1)_{|P_1}$ . Also sind  $P_1$  und  $P_2$  äquivalent.

Nehmen wir nun an, dass  $P_1$  und  $P_2$  für alle Sylowgruppen  $P$  von  $H$  äquivalent sind. Seien  $(\alpha, \kappa)$  und  $(\alpha', \kappa')$  die Parametersysteme von  $G_1$  bzw.  $G_2$ . Dann sind  $(\alpha_P, \kappa_{P \times P})$  und  $(\alpha'_P, \kappa'_{P \times P})$  äquivalent und es folgt  $\alpha_x \text{Inn}(N) = \alpha'_x \text{Inn}(N)$  für alle  $x \in P$ . Da  $H$  von seinen Sylowgruppen erzeugt wird, besitzen  $(\alpha, \kappa)$  und  $(\alpha', \kappa')$  die gleiche Paarung  $\omega$ . Sei  $Z := Z(N)$  und  $\beta := \omega_Z$ . Nach Satz 4.27 existiert  $\lambda \in F_\beta$  mit  $(\alpha', \kappa') \sim (\alpha, \lambda\kappa)$ . Nach Voraussetzung gilt  $\lambda_P \in P_{\beta_P}$  für jede Sylowgruppe  $P$  von  $H$ , d. h. die Erweiterung von  $P$  mit  $Z$  zerfällt. Mit Satz 4.24 zerfällt nun auch die Erweiterung von  $H$  mit  $Z$ , d. h.  $\lambda \in P_\beta$ . Dies zeigt  $(\alpha', \kappa') \sim (\alpha, \lambda\kappa) \sim (\alpha, \kappa)$ .  $\square$

**Bemerkung 4.32.** Satz 4.31 eignet sich nicht, um den Satz 4.24 von Gaschütz für nicht-abelsches  $N$  zu beweisen, denn nicht zu jedem Homomorphismus  $\omega: H \rightarrow \text{Out}(N)$  existiert eine zerfallende Erweiterung, mit der man vergleichen könnte (Aufgabe 17). Selbst wenn eine solche zerfallende Erweiterung von  $H$  mit  $N$  existiert, so muss die eingeschränkte Erweiterung von  $H$  mit  $Z(N)$  nicht unbedingt zerfallen. Zum Beispiel ist  $G = D_8 * C_4$  eine zerfallende Erweiterung von  $H = C_2$  mit  $N = D_8$ , aber die eingeschränkte Erweiterung  $C_G(N) = C_4$  von  $H$  mit  $Z(N) \cong C_2$  zerfällt nicht. Ein ähnliches Beispiel zeigt, dass Satz 4.24 für nicht-abelsche Gruppen  $N$  im Allgemeinen falsch ist (Aufgabe 15).

## 5 Zentrale Erweiterungen

**Definition 5.1.** Ist  $N$  abelsch und  $\alpha: H \rightarrow \text{Aut}(N)$  trivial, so ist

$$\begin{aligned} Z^2(H, N) &:= F_\alpha = \{\kappa \in C^2(H, N) : \kappa(x, y)\kappa(xy, z) = \kappa(y, z)\kappa(x, yz)\}, \\ B^2(H, N) &:= P_\alpha = \{\kappa \in Z^2(H, N) : \exists \varphi \in C^1(H, N) : \kappa(x, y) = \varphi(x)\varphi(y)\varphi(xy)^{-1}\}, \\ H^2(H, N) &:= \overline{F_\alpha} = F_\alpha / P_\alpha. \end{aligned}$$

Die Elemente von  $Z^2(H, N)$  nennt man (2-)Kozyklen. Für  $\varphi \in C^1(H, N)$  sei  $\partial\varphi \in B^2(H, N)$  mit  $\partial\varphi(x, y) := \varphi(x)\varphi(y)\varphi(xy)^{-1}$  für  $x, y \in H$ . Man nennt  $H^2(H, N)$  die zweite Kohomologiegruppe von  $H$  mit Werten in  $N$ . Ist  $G$  eine entsprechende Erweiterung, so gilt  $\nu(N) \leq Z(G)$  (vgl. Bemerkung 4.8). Man spricht daher von *zentralen* Erweiterungen.

**Bemerkung 5.2.**

- (i) Im Folgenden sei  $A$  stets eine abelsche Gruppe.
- (ii) Sei  $H$  abelsch und  $G$  die zentrale Erweiterung auf  $A \times H$  mittels  $\kappa \in Z^2(H, A)$ , d. h.

$$(a, x)(b, y) = (ab\kappa(x, y), xy)$$

für alle  $(a, x), (b, y) \in G$ . Genau dann ist  $G$  abelsch, wenn  $\kappa$  symmetrisch ist, d. h.  $\kappa(x, y) = \kappa(y, x)$  für alle  $x, y \in H$ . Da  $H$  abelsch ist, sind die Kozyklen in  $B^2(H, A)$  symmetrisch.

**Definition 5.3.** Für abelsche Gruppen  $H$  sei

$$Z_s^2(H, A) := \{\kappa \in Z^2(H, A) : \forall x, y \in H : \kappa(x, y) = \kappa(y, x)\}$$

und  $H_s^2(H, A) := Z_s^2(H, A) / B^2(H, A)$ .



**Satz 5.4.** Für  $n \in \mathbb{N}$  gilt  $H^2(C_n, A) = H_s^2(C_n, A) \cong A/\langle a^n : a \in A \rangle$ .

*Beweis.* Sei  $G$  eine zentrale Erweiterung von  $H = \langle x \rangle \cong C_n$  mit  $A$ . Wegen  $A \leq Z(G)$  ist  $G/Z(G)$  zyklisch und  $G$  abelsch. Dies zeigt  $H^2(H, A) = H_s^2(H, A)$ . Für  $a \in A$  haben wir im Beweis von Satz 4.16 einen Kozyklus  $\kappa_a \in Z^2(H, A)$  mit

$$\kappa_a(x^i, x^j) = \begin{cases} 1 & \text{falls } i + j < n, \\ a & \text{falls } i + j \geq n \end{cases}$$

konstruiert. Die Abbildung  $F: A \rightarrow H^2(H, A)$ ,  $a \mapsto \kappa_a$  ist offenbar ein Homomorphismus. Sei  $\varphi: H \rightarrow A$ ,  $x^i \mapsto a^i$  für  $i = 0, \dots, n-1$ . Dann gilt

$$\partial\varphi(x^i, x^j) = \begin{cases} 1 & \text{falls } i + j < n, \\ a^n & \text{falls } i + j \geq n. \end{cases}$$

Dies zeigt  $a^n \in \text{Ker}(F)$ . Für  $a \in \text{Ker}(F)$  existiert ein  $\varphi \in C^1(H, A)$  mit  $\kappa_a = \partial\varphi$ . Es gilt

$$\begin{aligned} \varphi(1) &= \partial\varphi(1, 1) = \kappa_a(1, 1) = 1, \\ \varphi(x)^2 &= \kappa_a(x, x)\varphi(x^2) = \varphi(x^2), \\ \varphi(x)^3 &= \kappa_a(x^2, x)\varphi(x^3) = \varphi(x^3), \\ &\vdots \\ \varphi(x)^n &= \kappa_a(x^{n-1}, x)\varphi(1) = a. \end{aligned}$$

Daher ist  $a \in \langle b^n : b \in A \rangle$  und  $\text{Ker}(F) = \langle a^n : a \in A \rangle$ .

Für die Surjektivität von  $F$  sei  $A \rightarrow G \xrightarrow{\pi} H$  eine Erweiterung von  $H$  mit  $A$ . Sei  $\tilde{x} \in G$  mit  $\pi(\tilde{x}) = x$ . Für  $i = 0, \dots, n-1$  können wir  $\tilde{x}^i := \tilde{x}^i$  als Urbild von  $x^i$  wählen. Für den Kozyklus  $\kappa$  gilt dann

$$\kappa(x^i, x^j) = \begin{cases} \tilde{x}^i \tilde{x}^j \widetilde{x^{i+j}}^{-1} = 1 & \text{falls } i + j < n, \\ \tilde{x}^i \tilde{x}^j \widetilde{x^{i+j-n}}^{-1} = \tilde{x}^n & \text{falls } i + j \geq n. \end{cases}$$

Mit  $a := \tilde{x}^n \in A$  gilt also  $\kappa = \kappa_a$ . Daher ist  $F$  surjektiv.  $\square$

**Satz 5.5.** Für alle abelschen Gruppen  $G$  und  $H$  gilt  $H_s^2(G \times H, A) \cong H_s^2(G, A) \times H_s^2(H, A)$ .

*Beweis.* Wir orientieren uns am Beweis der Künneth-Formel aus der Gruppentheorie. Wir fassen  $G$  und  $H$  als Untergruppen von  $G \times H$  auf. Für  $\kappa \in Z_s^2(G \times H, A)$  sei  $\kappa_G \in Z_s^2(G, A)$  die Einschränkung von  $\kappa$  auf  $G \times G$  und analog  $\kappa_H \in Z_s^2(H, A)$ . Dann ist

$$F: Z^2(G \times H, A) \rightarrow Z^2(G, A) \times Z^2(H, A), \quad \kappa \mapsto (\kappa_G, \kappa_H)$$

ein Homomorphismus. Für  $\varphi \in C^1(G \times H, A)$  ist sicher  $(\partial\varphi)_G = \partial\varphi_G \in B^2(G, A)$  und  $(\partial\varphi)_H \in B^2(H, A)$ . Somit induziert  $F$  einen Homomorphismus  $\overline{F}: H_s^2(G \times H, A) \rightarrow H_s^2(G, A) \times H_s^2(H, A)$ .

Für die Surjektivität von  $\overline{F}$  seien  $\kappa_1 \in Z_s^2(G, A)$  und  $\kappa_2 \in Z_s^2(H, A)$  normalisiert. Für  $x_i \in G$  und  $y_i \in H$  sei  $\kappa(x_1 y_1, x_2 y_2) := \kappa_1(x_1, x_2) \kappa_2(y_1, y_2)$ . Dann ist

$$\begin{aligned} \kappa(x_1 y_1, x_2 y_2) \kappa(x_1 x_2 y_1 y_2, x_3 y_3) &= \kappa_1(x_1, x_2) \kappa_2(y_1, y_2) \kappa_1(x_1 x_2, x_3) \kappa_2(y_1 y_2, y_3) \\ &= \kappa_1(x_2, x_3) \kappa_1(x_1, x_2 x_3) \kappa_2(y_2, y_3) \kappa_2(y_1, y_2 y_3) \\ &= \kappa(x_2 y_2, x_3 y_3) \kappa(x_1 y_1, x_2 y_2 x_3 y_3). \end{aligned}$$

Dies zeigt  $\kappa \in Z_s^2(G \times H, A)$  mit  $\kappa_G = \kappa_1$  und  $\kappa_H = \kappa_2$ . Also ist  $\bar{F}$  surjektiv.

Für die Injektivität sei  $F(\kappa) = (\partial\varphi_1, \partial\varphi_2)$  mit  $\varphi_1 \in C^1(G, A)$  und  $\varphi_2 \in C^1(H, A)$ . Sei  $\varphi \in C^1(G \times H, A)$  mit  $\varphi(xy) := \varphi_1(x)\varphi_2(y)\kappa(x, y)^{-1}$  für  $x \in G$  und  $y \in H$ . Dann gilt

$$\begin{aligned} \partial\varphi(x_1y_1, x_2y_2) &= \varphi(x_1y_1)\varphi(x_2y_2)\varphi(x_1x_2y_1y_2)^{-1} \\ &= \varphi_1(x_1)\varphi_2(y_1)\kappa(x_1, y_1)^{-1}\varphi_1(x_2)\varphi_2(y_2)\kappa(x_2, y_2)^{-1}\varphi_1(x_1x_2)^{-1}\varphi_2(y_1y_2)^{-1}\kappa(x_1x_2, y_1y_2) \\ &= \kappa(x_1, x_2)\kappa(y_1, y_2)\kappa(x_1, y_1)^{-1}\kappa(x_2, y_2)^{-1}\kappa(x_1x_2, y_1y_2) \\ &= \kappa(x_2, y_1)\kappa(x_1, x_2y_1)\kappa(x_1x_2, y_1)^{-1}\kappa(y_1, y_2)\kappa(x_1, y_1)^{-1}\kappa(x_2, y_2)^{-1}\kappa(x_1x_2, y_1y_2) \\ &= \kappa(x_1y_1, x_2)\kappa(x_1x_2y_1, y_2)\kappa(x_2, y_2)^{-1} = \kappa(x_1y_1, x_2y_2) \end{aligned}$$

für  $x_i \in G$  und  $y_i \in H$ . Also ist  $\kappa = \partial\varphi \in B^2(G \times H, A)$  und  $\bar{F}$  ist ein Isomorphismus.  $\square$

**Folgerung 5.6.** Für jede endliche abelsche Gruppe  $A$  gilt  $H_s^2(A, \mathbb{C}^\times) = 1$ .

*Beweis.* Da jede komplexe Zahl eine  $n$ -te Wurzel besitzt, gilt  $\langle z^n : z \in \mathbb{C}^\times \rangle = \mathbb{C}^\times$ . Die Behauptung folgt aus Satz 5.5 und Satz 5.4.  $\square$

**Folgerung 5.7.** Für endliche abelsche Gruppen  $G \cong C_{d_1} \times \dots \times C_{d_k}$  und  $A \cong C_{e_1} \times \dots \times C_{e_l}$  gilt

$$H_s^2(G, A) \cong \text{Hom}(G, A) \cong \bigtimes_{\substack{1 \leq i \leq k \\ 1 \leq j \leq l}} C_{\text{ggT}(d_i, e_j)}.$$

*Beweis.* Für  $d \in \mathbb{N}$  gilt  $H^2(C_d, A) \cong A/\langle a^d : a \in A \rangle \cong \bigtimes_{i=1}^l C_{\text{ggT}(d, e_i)}$  nach Satz 5.4. Aus Satz 5.5 folgt  $H_s^2(G, A) \cong \bigtimes_{i,j} C_{\text{ggT}(d_i, e_j)}$ . Sei  $G = \langle x_1 \rangle \times \dots \times \langle x_k \rangle \cong C_{d_1} \times \dots \times C_{d_k}$ . Dann ist  $f \in \text{Hom}(G, A)$  durch

$$f(x_i) \in \langle a \in A : a^{d_i} = 1 \rangle \cong \bigtimes_{j=1}^l C_{\text{ggT}(d_i, e_j)} \quad (i = 1, \dots, k)$$

eindeutig bestimmt und jede Wahl definiert einen Homomorphismus  $G \rightarrow A$ . Offenbar ist die Abbildung  $\text{Hom}(G, A) \rightarrow \bigtimes_{i,j} C_{\text{ggT}(d_i, e_j)}$ ,  $f \mapsto (f(x_1), \dots, f(x_k))$  ein Isomorphismus. Daraus folgt die Behauptung.  $\square$

**Beispiel 5.8.** Nach Folgerung 5.7 gibt es vier Äquivalenzklassen abelscher Erweiterungen von  $C_4$  mit  $C_4$ . Allerdings gibt es nur zwei Isomorphietypen solcher Gruppen:  $C_4^2$  und  $C_{16}$ . In Satz 5.19 bestimmen wir die Struktur von  $H^2(G, A)$  für jede endliche Gruppe  $G$ .

**Bemerkung 5.9.** Für teilerfremde  $d_1, d_2 \in \mathbb{N}$  und  $e \in \mathbb{N}$  gilt  $\text{ggT}(d_1d_2, e) = \text{ggT}(d_1, e)\text{ggT}(d_2, e)$ . Daher hängt die rechte Seite in Folgerung 5.7 nicht von der Zerlegung von  $G$  und  $A$  ab. Da der Ausdruck symmetrisch ist, gilt  $H_s^2(A, B) \cong H_s^2(B, A)$  und  $\text{Hom}(A, B) \cong \text{Hom}(B, A)$  für alle endlichen abelschen Gruppen  $A$  und  $B$ .

**Definition 5.10.** Eine Erweiterung  $G$  von  $H$  mit  $Z$  heißt *Schur-Erweiterung*, falls  $Z \leq Z(G) \cap G'$  gilt. Der *Schur-Multiplikator* von  $H$  ist  $M(H) := H^2(H, \mathbb{C}^\times)$ .

**Beispiel 5.11.**

- (i) Sei  $G$  eine nicht-abelsche endliche nilpotente Gruppe. Nach GT-Satz 3.14 gilt  $G' \cap Z(G) \neq 1$ . Daher ist  $G$  eine Schur-Erweiterung einer kleineren Gruppe. Insbesondere sind  $D_8$  und  $Q_8$  Schur-Erweiterungen von  $C_2^2$ . Außerdem ist  $G/G^{[3]}$  eine Schur-Erweiterung von  $G/G'$ .
- (ii) Jede quasia einfache Gruppe ist eine Schur-Erweiterung einer einfachen Gruppe.

**Bemerkung 5.12.**

- (i) Im Folgenden studieren wir die möglichen Schur-Erweiterungen einer festen Gruppe  $H$ , die wir zu diesem Zweck in  $G$  umbenennen.
- (ii) Sei  $\widehat{G}$  eine Schur-Erweiterung von  $G$  mit  $1 \neq Z \leq \widehat{G}' \cap Z(\widehat{G})$  und  $\widehat{G}/Z \cong G$ . Besitzt  $Z$  ein Komplement  $K$  in  $\widehat{G}$ , so wäre  $\widehat{G} = Z \times K$  und  $Z \not\leq 1 \times K' = \widehat{G}'$ . Echte Schur-Erweiterungen sind daher nicht zerfallend.
- (iii) Ist  $n := |G| < \infty$ , so gilt  $\exp(M(G)) \mid n$  nach Satz 4.21. Die Werte von  $\kappa \in M(G)$  sind also  $n$ -te Einheitswurzeln. Dies zeigt  $|M(G)| \leq |Z^2(G, \mathbb{C}^\times)| \leq n^{n^2} < \infty$ . Im Folgenden sei  $G$  stets endlich und  $A$  abelsch.
- (iv) Nach Satz 5.4 ist  $M(C_n) = 1$  für alle  $n \in \mathbb{N}$ .
- (v) Nach GT-Lemma 11.14 gilt  $A^* := \text{Hom}(A, \mathbb{C}^\times) \cong A$ , falls  $|A| < \infty$ .

**Lemma 5.13.** *Die Abbildung*

$$\Phi: H_s^2(G/G', A) \rightarrow H^2(G, A), \quad \kappa B^2(G/G', A) \mapsto \Phi_\kappa B^2(G, A)$$

mit  $\Phi_\kappa(x, y) = \kappa(xG', yG')$  für  $x, y \in G$  ist ein Monomorphismus.

*Beweis.* Offenbar ist  $Z^2(G/G', A) \rightarrow Z^2(G, A)$ ,  $\kappa \mapsto \Phi_\kappa$  ein Homomorphismus. Für  $\varphi \in C^1(G/G', A)$  ist  $\Phi_{\partial\varphi} \in B^2(G, A)$ . Daher ist  $\Phi$  auf  $H^2(G/G', A)$  wohldefiniert. Sei  $\kappa \in Z_s^2(G/G', A)$  und  $\varphi \in C^1(G, A)$  mit  $\Phi_\kappa = \partial\varphi$ . Sei  $R \subseteq G$  ein Repräsentantensystem für  $G/G'$ . Für  $x \in G$  sei  $r_x \in R$  mit  $xG' = r_xG'$ . Sei  $\bar{\varphi} \in C^1(G/G', A)$  mit  $\bar{\varphi}(xG') := \varphi(r_x)$  für  $x \in G$ . Dann gilt

$$\kappa(xG', yG') = \kappa(r_xG', r_yG') = \Phi_\kappa(r_x, r_y) = \partial\varphi(r_x, r_y) = \partial\bar{\varphi}(xG', yG')$$

für  $x, y \in G$ . Daher ist  $\Phi$  injektiv. □

**Lemma 5.14.** *Die Abbildung*

$$\Psi: H^2(G, A) \rightarrow \text{Hom}(A^*, M(G)), \quad \kappa B^2(G, A) \mapsto \Psi_\kappa$$

mit  $\Psi_\kappa(\lambda) = (\lambda \circ \kappa)B^2(G, \mathbb{C}^\times)$  ist ein Homomorphismus.

*Beweis.* Für  $\lambda, \mu \in A^*$  ist offenbar  $\lambda \circ \kappa \in Z^2(G, \mathbb{C}^\times)$  und  $(\lambda\mu) \circ \kappa = (\lambda \circ \kappa)(\mu \circ \kappa)$ . Also ist  $\Psi_\kappa \in \text{Hom}(A^*, M(G))$ . Für  $\varphi \in C^1(G, A)$  und  $\lambda \in A^*$  gilt

$$\Psi_{\partial\varphi}(\lambda) = (\lambda \circ \partial\varphi)B^2(G, \mathbb{C}^\times) = \partial(\lambda \circ \varphi)B^2(G, \mathbb{C}^\times) = 1.$$

Also ist  $\Psi$  wohldefiniert. Wegen  $\lambda \circ (\kappa_1\kappa_2) = (\lambda \circ \kappa_1)(\lambda \circ \kappa_2)$  ist  $\Psi$  ein Homomorphismus. □

**Satz 5.15** (SCHUR). *Sei  $\widehat{G}$  eine Schur-Erweiterung von  $G$  mit  $\widehat{G}/Z \cong G$ . Dann ist  $Z$  zu einer Untergruppe von  $M(G)$  isomorph. Insbesondere ist  $|\widehat{G}| \leq |G||M(G)|$  und  $G$  besitzt nur endlich viele Schur-Erweiterungen bis auf Isomorphie.*

*Beweis.* Für  $x \in G$  sei  $\widehat{x} \in \widehat{G}$  mit  $\widehat{x}Z = x$  und  $\widehat{1} = 1$ . Sei  $\kappa \in Z^2(G, Z)$  das dazugehörige normalisierte Faktorensystem von  $\widehat{G}$  (Lemma 4.5). Es gilt  $\kappa(x, y) = \widehat{xy}\widehat{xy}^{-1}$  für  $x, y \in G$ . Wegen  $Z^* \cong Z$  genügt es zu zeigen, dass die Abbildung  $\Psi_\kappa$  aus Lemma 5.14 injektiv ist. Sei also  $\lambda \in Z^*$  mit  $\lambda \circ \kappa = \partial\varphi$  für ein  $\varphi \in C^1(G, \mathbb{C}^\times)$ . Dann ist

$$\varphi(1) = \varphi(1)\varphi(1)\varphi(1)^{-1} = \partial\varphi(1) = \lambda(\kappa(1, 1)) = \lambda(1) = 1.$$

Sei  $\widehat{\lambda}: \widehat{G} \rightarrow \mathbb{C}^\times$  mit  $\widehat{\lambda}(\widehat{xa}) := \varphi(x)\lambda(a)$  für  $x \in G$  und  $a \in Z$ . Wegen  $\widehat{\lambda}(a) = \widehat{\lambda}(\widehat{1a}) = \lambda(a)$  ist  $\widehat{\lambda}$  eine Fortsetzung von  $\lambda$ . Für  $x, y \in G$  und  $a, b \in Z$  gilt

$$\begin{aligned} \widehat{\lambda}(\widehat{xa} \cdot \widehat{yb}) &= \widehat{\lambda}(\widehat{xyab}) = \widehat{\lambda}(\kappa(x, y)\widehat{xyab}) = \lambda(\kappa(x, y))\varphi(xy)\lambda(a)\lambda(b) \\ &= \varphi(x)\varphi(y)\varphi(xy)^{-1}\varphi(xy)\lambda(a)\lambda(b) = \varphi(x)\lambda(a)\varphi(y)\lambda(b) = \widehat{\lambda}(\widehat{xa})\widehat{\lambda}(\widehat{yb}). \end{aligned}$$

Also ist  $\widehat{\lambda}$  ein Homomorphismus mit  $\widehat{G}/\text{Ker}(\widehat{\lambda}) \leq \mathbb{C}^\times$ . Es folgt  $Z \leq \widehat{G}' \leq \text{Ker}(\widehat{\lambda})$ . Dies zeigt  $\lambda = 1$ .  $\square$

**Definition 5.16.** Eine Schur-Erweiterung  $\widehat{G}$  von  $G$  heißt *maximal*, falls  $|\widehat{G}| = |G||M(G)|$ .

**Satz 5.17** (SCHUR). *Jede endliche Gruppe  $G$  besitzt eine maximale Schur-Erweiterung.*

*Beweis.* Nach Bemerkung 5.12 ist  $M(G) = \langle \overline{\kappa_1} \rangle \oplus \dots \oplus \langle \overline{\kappa_n} \rangle$  endlich. Sei  $d_i := |\langle \overline{\kappa_i} \rangle|$  und  $A_i \leq \mathbb{C}^\times$  mit  $|A_i| = d_i$  für  $i = 1, \dots, n$ . Sei  $\kappa_i \in Z^2(G, \mathbb{C}^\times)$  mit  $\kappa_i B^2(G, \mathbb{C}^\times) = \overline{\kappa_i}$ . Dann ist  $\kappa_i^{d_i} = \partial\gamma_i$  für ein  $\gamma_i \in C^1(G, \mathbb{C}^\times)$ . Sei  $\delta_i(x) \in \mathbb{C}^\times$  mit  $\delta_i(x)^{d_i} = \gamma_i(x)^{-1}$  für  $x \in G$ . Nachdem wir  $\kappa_i$  durch  $\kappa_i \partial\delta_i$  ersetzt haben, gilt  $\kappa_i^{d_i} = 1$  für  $i = 1, \dots, n$ . Insbesondere ist  $\kappa_i \in Z^2(G, A_i)$  für  $i = 1, \dots, n$ . Nach Lemma 4.11 dürfen wir auch  $\kappa_i(x, 1) = \kappa_i(1, x) = 1$  für  $x \in G$  annehmen. Sei  $A := A_1 \times \dots \times A_n \cong M(G)$  und  $\kappa \in C^2(G, A)$  mit  $\kappa(x, y) = (\kappa_1(x, y), \dots, \kappa_n(x, y))$  für  $x, y \in G$ . Offenbar ist dann  $\kappa \in Z^2(G, A)$  mit  $\kappa(1, x) = \kappa(x, 1) = 1$  für  $x \in G$ .

Sei  $\widehat{G} = A \times G$  die zentrale Erweiterung von  $A$  mit  $G$  bzgl.  $\kappa$ . Durch  $a \mapsto (a, 1)$  fassen  $A$  als Untergruppe von  $\widehat{G}$  auf. Wir wählen Urbilder  $\widehat{x} \in \widehat{G}$  von  $x \in G$ , sodass  $\kappa(x, y) = \widehat{xy}\widehat{xy}^{-1}$  für alle  $x, y \in G$  gilt. Sei  $\pi_i: A \rightarrow A_i \leq \mathbb{C}^\times$  die  $i$ -te Projektion. Mit der Abbildung  $\Psi_\kappa$  aus Lemma 5.14 gilt dann

$$\Psi_\kappa(\pi_i) = (\pi_i \circ \kappa)B^2(G, \mathbb{C}^\times) = \overline{\kappa_i}$$

für  $i = 1, \dots, n$ . Wegen  $M(G) = \langle \overline{\kappa_1}, \dots, \overline{\kappa_n} \rangle$  ist  $\Psi_\kappa$  surjektiv. Nach Bemerkung 5.12 ist  $A^* \cong A \cong M(G)$ . Daher ist  $\Psi_\kappa$  auch injektiv. Nach dem Hauptsatz über endliche abelsche Gruppen (angewendet auf  $\widehat{G}/\widehat{G}'$ ) existieren Normalteiler  $N_1, \dots, N_s \trianglelefteq \widehat{G}$  mit  $\widehat{G}' = N_1 \cap \dots \cap N_s$ , sodass  $\widehat{G}/N_i$  zyklisch ist für  $i = 1, \dots, s$ .

Nehmen wir  $A \not\leq \widehat{G}'$  an. Dann existiert ein  $i$  mit  $A \not\leq N_i$ . Indem man  $\widehat{G}/N_i$  in  $\mathbb{C}^\times$  einbettet, erhält man einen Homomorphismus  $\lambda: \widehat{G} \rightarrow \widehat{G}/N_i \rightarrow \mathbb{C}^\times$  mit  $\lambda(A) \neq 1$ . Die Einschränkung  $\lambda_A$  ist also ein nicht-triviales Element in  $A^*$ . Für  $x \in G$  setzen wir  $\varphi(x) := \lambda(\widehat{x})$ . Dann gilt

$$\Psi_\kappa(\lambda_A)(x, y) = \lambda(\kappa(x, y)) = \lambda(\widehat{xy}\widehat{xy}^{-1}) = \varphi(x)\varphi(y)\varphi(xy)^{-1} = \partial\varphi(x, y)$$

für  $x, y \in G$ . Dies liefert  $\Psi_\kappa(\lambda_A) = 1$  im Widerspruch zur Injektivität von  $\Psi_\kappa$ . Also ist  $A \leq \widehat{G}'$  und  $\widehat{G}$  ist eine Schur-Erweiterung von  $G$ .  $\square$

**Bemerkung 5.18.** In GAP gibt es mehrere Möglichkeiten den Schur-Multiplikator und eine maximale Schur-Erweiterung zu bestimmen:

```
G:=AlternatingGroup(7);;
AbelianInvariantsMultipliert(G); #Ordnungen der zyklischen Faktoren von M(G)
S:=SchurCover(G); #maximale Schur-Erweiterung
S:=Image(IsomorphismPermGroup(S));; #effizientere Darstellung als Permutationsgruppe
NrMovedPoints(S); #Grad der Permutationsgruppe
S:=Image(SmallerDegreePermutationRepresentation(S));; #noch effizientere Darstellung
NrMovedPoints(S);
StructureDescription(S); #= C6.A7

epi:=EpimorphismSchurCover(G,[3]); #Epimorphismus  $\widehat{G} \rightarrow G$  mit Kern  $O_3(M(G))$ 
S:=Source(epi); #nicht maximale Schur-Erweiterung  $\widehat{G}$ 
M:=Kernel(epi); # $O_3(M(G))$ 

P:=SmallGroup(256,111);;
SchurCovers(P); #alle maximalen Schur-Erweiterungen, nur für p-Gruppen

LoadPackage("cohomolo",false);
G:=PSL(3,4);;
for p in PrimeDivisors(Size(G)) do
  chr:=CHR(G,p);;
  Print(SchurMultipliert(chr)); #=  $O_p(M(G))$  schneller als AbelianInvariantsMultipliert
od; #insgesamt folgt  $M(G) = O_2(M(G)) \oplus O_3(M(G)) \cong C_{12} \times C_4$ 

LoadPackage("hap",false); #lädt weitere Pakete
GroupHomology(G,2); # $M(G) \cong H_2(G, \mathbb{Z})$ 
```

Der Befehl `SchurExtension` berechnet hingegen die unendliche zentrale Erweiterung  $F/[F, N]$  aus Satz 5.24.

**Satz 5.19** (Universeller Koeffizientensatz<sup>11</sup>). Für jede endliche abelsche Gruppe  $A$  ist

$$1 \longrightarrow H_s^2(G/G', A) \xrightarrow{\Phi} H^2(G, A) \xrightarrow{\Psi} \text{Hom}(A^*, M(G)) \longrightarrow 1.$$

eine exakte zerfallende Folge. Insbesondere gilt

$$H^2(G, A) \cong \text{Hom}(G/G' \times M(G), A).$$

*Beweis.* Die Abbildungen  $\Phi$  und  $\Psi$  wurden in Lemma 5.13 und Lemma 5.14 definiert. Da  $\Phi$  injektiv ist, ist die Folge am ersten Glied exakt. Für  $\kappa \in Z_s^2(G/G', A)$  und  $\lambda \in A^*$  ist  $\lambda \circ \kappa \in Z_s^2(G/G', \mathbb{C}^\times) = B_s^2(G/G', \mathbb{C}^\times)$  nach Folgerung 5.6. Dies zeigt  $\Psi_{\Phi\kappa} = 1$  und  $\Phi(H_s^2(G/G', A)) \leq \text{Ker}(\Psi)$ . Sei umgekehrt  $\kappa \in Z^2(G, A)$  mit  $\Psi_\kappa = 1$ . Sei  $\widehat{G} := A \times G$  die Erweiterung bzgl.  $\kappa$ . Durch  $a \mapsto (a, 1)$  fassen wir  $A$  als Untergruppe von  $\widehat{G}$  auf. Für  $\lambda \in A^*$  existiert ein  $\varphi \in C^1(G, \mathbb{C}^\times)$  mit  $\lambda \circ \kappa = \partial\varphi$ . Wir definieren  $\widehat{\lambda}: \widehat{G} \rightarrow \mathbb{C}^\times$ ,  $(a, x) \mapsto \lambda(a)\varphi(x)$ . Für  $(a, x), (b, y) \in \widehat{G}$  gilt dann

$$\widehat{\lambda}((a, x)(b, y)) = \widehat{\lambda}(ab\kappa(x, y), xy) = \lambda(ab)\partial\varphi(x, y)\varphi(xy) = \lambda(a)\varphi(x)\lambda(b)\varphi(y) = \widehat{\lambda}(a, x)\widehat{\lambda}(b, y).$$

Dies zeigt  $\widehat{\lambda} \in \widehat{G}^*$  und  $\widehat{G}' \cap A \leq \text{Ker}(\widehat{\lambda})$ . Bekanntlich existiert für jedes  $a \in A \setminus \{1\}$  ein  $\lambda \in A^*$  mit  $\lambda(a) \neq 1$ . Daraus folgt  $\widehat{G}' \cap A = 1$ . Also ist  $\widehat{G}/\widehat{G}'$  eine Erweiterung von

$$\widehat{G}/\widehat{G}'A \cong (\widehat{G}/A)/(\widehat{G}'A/A) \cong G/G'$$

<sup>11</sup>Die Bezeichnung beschreibt den Sachverhalt, dass man den Wertebereich  $A$  der Kozyklen durch den *universellen* Wertebereich  $\mathbb{C}^\times$  ersetzen kann.

mit  $A\widehat{G}'/\widehat{G}' \cong A/(A \cap \widehat{G}') \cong A$ . Sei  $\pi: \widehat{G} \rightarrow G$ ,  $(a, x) \mapsto x$  die Projektion und  $\bar{\pi}: \widehat{G}/\widehat{G}' \rightarrow G/G'$ ,  $x\widehat{G}' \mapsto \pi(x)G'$ . Wegen  $\widehat{G}' \cong \widehat{G}'A/A \cong G'$  ist die Einschränkung von  $\pi$  auf  $\widehat{G}'$  injektiv. Für  $s \in G'$  sei  $\widehat{s} := \pi^{-1}(s) \in \widehat{G}'$ . Sei  $R \subseteq G$  ein Repräsentantensystem für  $G/G'$ . Für  $x \in G$  sei  $r_x \in R$  mit  $xG' = r_xG'$ . Für  $r \in R$  sei  $\widehat{r} \in \widehat{G}$  ein beliebiges Urbild unter  $\pi$ . Für jedes  $x \in G$  existiert genau ein  $s_x \in G'$  mit  $x = r_x s_x$ . Nun ist  $\widehat{x} := \widehat{r}_x \widehat{s}_x$  ein Urbild von  $x$  unter  $\pi$ . Daher ist  $\kappa$  äquivalent zu  $\kappa' \in Z^2(G, A)$  mit  $\kappa'(x, y) = \widehat{x}\widehat{y}\widehat{xy}^{-1}$ . Offenbar ist  $\widehat{x}\widehat{G}'$  ein Urbild von  $xG'$  unter  $\bar{\pi}$ , das nicht von der Wahl des Repräsentanten der Nebenklasse  $xG'$  abhängt. Somit existiert ein Kozyklus  $\bar{\kappa} \in Z^2(G/G', A)$  mit

$$\bar{\kappa}(xG', yG') = \widehat{x}\widehat{y}\widehat{xy}^{-1}\widehat{G}' = \kappa'(x, y)\widehat{G}'.$$

Dies zeigt  $\kappa B^2(G, A) = \kappa' B^2(G, A) = \Phi_{\bar{\kappa}} B^2(G, A)$ , indem man  $A$  mit  $A\widehat{G}'/\widehat{G}'$  identifiziert. Da  $\widehat{G}/\widehat{G}'$  abelsch ist, gilt  $\bar{\kappa} \in Z_s^2(G/G', A)$  und  $\Phi(H_s^2(G/G', A)) = \text{Ker}(\Psi)$ . Also ist die Folge auch am zweiten Glied exakt.

Wir konstruieren jetzt einen Homomorphismus  $\Gamma: \text{Hom}(A^*, M(G)) \rightarrow H^2(G, A)$  mit  $\Psi \circ \Gamma = \text{id}$ . Daraus erhält man sowohl die Surjektivität von  $\Psi$  (Exaktheit am dritten Glied) als auch das Zerfallen der Folge. Sei  $Z := M(G)$  und  $\kappa \in Z^2(G, Z)$  der Kozyklus einer maximalen Schur-Erweiterung. Im Beweis von Satz 5.17 haben wir gesehen, dass die Abbildung  $Z^* \rightarrow Z$ ,  $\lambda \mapsto (\lambda \circ \kappa)B^2(G, \mathbb{C}^\times)$  ein Isomorphismus ist. Sei  $f \in \text{Hom}(A^*, Z)$ . Für  $\mu \in A^*$  existiert genau ein  $\lambda_\mu \in Z^*$  mit  $f(\mu) = (\lambda_\mu \circ \kappa)B^2(G, \mathbb{C}^\times)$ . Für  $x, y \in G$  definieren wir  $\alpha_f(x, y): A^* \rightarrow \mathbb{C}^\times$ ,  $\mu \mapsto \lambda_\mu(\kappa(x, y))$ . Aus

$$(\lambda_{\mu_1 \mu_2} \circ \kappa)B^2(G, \mathbb{C}^\times) = f(\mu_1 \mu_2) = f(\mu_1)f(\mu_2) = (\lambda_{\mu_1} \circ \kappa)(\lambda_{\mu_2} \circ \kappa)B^2(G, \mathbb{C}^\times) = (\lambda_{\mu_1} \lambda_{\mu_2} \circ \kappa)B^2(G, \mathbb{C}^\times)$$

folgt  $\lambda_{\mu_1 \mu_2} = \lambda_{\mu_1} \lambda_{\mu_2}$ . Dies zeigt  $\alpha_f(x, y) \in (A^*)^*$ . Wegen  $|A| < \infty$  ist  $A \rightarrow (A^*)^*$ ,  $a \mapsto (\mu \mapsto \mu(a))$  ein Isomorphismus (GT-Aufgabe 79). Daher existiert genau ein  $\Gamma_f(x, y) \in A$  mit  $\alpha_f(x, y)(\mu) = \mu(\Gamma_f(x, y))$  für alle  $\mu \in A^*$ . Für  $x, y, z \in G$  und  $\mu \in A^*$  gilt

$$\begin{aligned} \mu(\Gamma_f(x, y)\Gamma_f(xy, z)) &= \alpha_f(x, y)(\mu)\alpha_f(xy, z)(\mu) = \lambda_\mu(\kappa(x, y)\kappa(xy, z)) \\ &= \lambda_\mu(\kappa(y, z)\kappa(x, yz)) = \mu(\Gamma_f(y, z)\Gamma_f(x, yz)). \end{aligned}$$

Dies zeigt  $\Gamma_f \in Z^2(G, A)$ . Für  $f' \in \text{Hom}(A^*, Z)$  und  $\mu \in A^*$  sei  $\lambda'_\mu \in Z^*$  mit  $f'(\mu) = (\lambda'_\mu \circ \kappa)B^2(G, \mathbb{C}^\times)$ . Dann gilt  $(ff')(\mu) = (\lambda_\mu \lambda'_\mu \circ \kappa)B^2(G, \mathbb{C}^\times)$  und

$$\mu(\Gamma_{ff'}(x, y)) = \alpha_{ff'}(x, y)(\mu) = (\lambda_\mu \lambda'_\mu)(\kappa(x, y)) = \alpha_f(x, y)(\mu)\alpha_{f'}(x, y)(\mu) = \mu(\Gamma_f(x, y)\Gamma_{f'}(x, y)).$$

Also ist  $\Gamma: \text{Hom}(A^*, M(G)) \rightarrow H^2(G, A)$ ,  $f \mapsto \Gamma_f B^2(G, A)$  ein Homomorphismus. Aus

$$\Psi_{\Gamma_f}(\mu)(x, y) = (\mu \circ \Gamma_f)(x, y) = \alpha_f(x, y)(\mu) = \lambda_\mu(\kappa(x, y)) = f(\mu)(x, y)$$

folgt  $\Psi \circ \Gamma = \text{id}$ .

Für die zweite Behauptung benutzen wir Bemerkung 5.9 und  $A^* \cong A$ :

$$H^2(G, A) \cong H_s^2(G/G', A) \times \text{Hom}(A^*, Z) \cong \text{Hom}(G/G', A) \times \text{Hom}(Z, A) \cong \text{Hom}(G/G' \times Z, A). \quad \square$$

**Satz 5.20.** Sei  $G/G' \cong C_{d_1} \times \cdots \times C_{d_k}$  und  $M(G) \cong C_{e_1} \times \cdots \times C_{e_l}$ . Dann besitzt  $G$  höchstens

$$\prod_{\substack{1 \leq i \leq k \\ 1 \leq j \leq l}} \text{ggT}(d_i, e_j)$$

maximale Schur-Erweiterungen bis auf Isomorphie.

*Beweis.* Sei  $\widehat{G} := Z \times G$  eine maximale Schur-Erweiterung von  $G$  bzgl.  $\kappa \in Z^2(G, Z)$  mit  $Z \cong M(G)$ . Wie im Beweis von Satz 5.17 ist  $\Psi_\kappa: Z^* \rightarrow M(G)$  ein Isomorphismus. Wir zeigen, dass der Isomorphietyp von  $\widehat{G}$  nicht von  $\Psi_\kappa$  abhängt. Sei dafür  $f \in \text{Aut}(Z)$  und  $\kappa' \in Z^2(G, Z)$  mit  $\kappa'(x, y) = f(\kappa(x, y))$  für alle  $x, y \in G$ . Sei  $\widehat{H} := Z \times G$  die Erweiterung von  $G$  mit  $Z$  bzgl.  $\kappa'$ . Dann ist

$$F: \widehat{G} \rightarrow \widehat{H}, \quad (a, x) \mapsto (f(a), x)$$

ein Isomorphismus, denn

$$\begin{aligned} F((a, x)(b, y)) &= F(ab\kappa(x, y), xy) = (f(ab\kappa(x, y)), xy) \\ &= (f(a)f(b)\kappa'(x, y), xy) = (f(a), x)(f(b), y) = F(a, x)F(b, y) \end{aligned}$$

für  $(a, x), (b, y) \in \widehat{G}$ . Sei  $f^* \in \text{Aut}(Z^*)$ ,  $\lambda \mapsto \lambda \circ f$  die zu  $f$  duale Abbildung. Dann gilt  $\Psi_{\kappa'} = \Psi_\kappa \circ f^*$ . Auf diese Weise lässt sich jeder Isomorphismus  $Z^* \rightarrow M(G)$  realisieren. Für jede weitere maximale Schur-Erweiterung von  $G$  bzgl. eines  $\alpha \in Z^2(G, Z)$  kann man also  $\Psi_\alpha = \Psi_\kappa$  annehmen. Die Anzahl der maximalen Schur-Erweiterungen ist somit beschränkt durch  $|\Psi^{-1}(\Psi_\kappa)| = |\text{Ker}(\Psi)| = |H_s^2(G/G', Z)|$  nach Satz 5.19. Folgerung 5.7 liefert die Behauptung.  $\square$

### Beispiel 5.21.

- (i) Sei  $p$  eine Primzahl und  $G \cong C_p^n$  elementarabelsch. Nach GT-Beispiel 11.38 ist  $M(G) \cong C_p^{\binom{n}{2}}$ . Also besitzt  $G$  höchstens  $p^{\binom{n}{2}}$  maximale Schur-Erweiterungen bis auf Isomorphie. Dies lässt sich auch direkt beweisen: Sei  $\widehat{G}$  eine maximale Schur-Erweiterung und  $Z \leq \widehat{G}' \cap Z(\widehat{G})$  mit  $\widehat{G}/Z \cong G$ . Wegen  $Z \leq \Phi(\widehat{G})$  lässt sich  $G$  mit  $n$  Elementen  $x_1, \dots, x_n$  erzeugen. Dann ist  $\{[x_i, x_j] : 1 \leq i < j \leq n\}$  eine Basis von  $Z \cong M(G)$ . Für  $i = 1, \dots, n$  existieren  $0 \leq e_{ijk} < p$  mit

$$x_i^p = \prod_{j < k} [x_j, x_k]^{e_{ijk}}.$$

Wegen  $Z \leq Z(\widehat{G})$  ist  $\widehat{G}$  durch die  $n\binom{n}{2}$  Parameter  $e_{ijk}$  eindeutig bestimmt. Offensichtlich führen viele Parameterwerte zu isomorphen Gruppen (zum Beispiel durch Permutation der  $x_i$ ). In Bemerkung 13.38 konstruieren wir die maximale Schur-Erweiterung mit  $p > 2$  und  $e_{ijk} = 0$  für alle  $i, j, k$ . Für  $n = 2$  sind die beiden nicht-abelschen Gruppen der Ordnung  $p^3$  die einzigen maximalen Schur-Erweiterungen. Für  $p^n \in \{2^3, 2^4, 3^3, 5^3\}$  gibt es 10, 989, 16 bzw. 20 maximale Schur-Erweiterungen von  $G$ . Im Allgemeinen ist die Anzahl unbekannt.

- (ii) Die minimal nicht-abelsche 2-Gruppe  $Q(2, 1)$  aus Aufgabe 6 besitzt genau sieben maximale Schur-Erweiterungen:

```
G:=SmallGroup(16,3);; #=Q(2,1)
ab:=AbelianInvariants(G); #=[2,4]
mG:=AbelianInvariantsMultiplier(G); #=[2,2]
ProductX(ab,mG,{d,e}->Gcd(d,e)); #=16
Size(SchurCovers(G)); #=7
```

### Bemerkung 5.22.

- (i) Ist  $G$  perfekt (oder allgemeiner  $\text{ggT}(|G/G'|, |M(G)|) = 1$ ), so besitzt  $G$  nur eine maximale Schur-Erweiterung  $\widehat{G}$  bis auf Isomorphie. Man nennt  $\widehat{G}$  die *universelle* Schur-Erweiterung von  $G$ , denn nach Satz 5.24 ist jede Schur-Erweiterung von  $G$  ein Quotient von  $\widehat{G}$ .
- (ii) Für vollständige Gruppen  $G$  gilt Gleichheit in Satz 5.20 (ohne Beweis).

**Satz 5.23.** Sei  $G$  eine beliebige Gruppe mit  $|G : Z(G)| < \infty$ . Dann ist  $|G'| < \infty$ .

*Beweis (Rosenlicht).* Sei  $Z := Z(G)$  und  $n := |G : Z| < \infty$ . Sei  $R$  ein Repräsentantensystem für  $G/Z$ . Für  $\Gamma := \{[r, s] : r, s \in R\}$  gilt  $|\Gamma| \leq |R|^2 = |G/Z|^2 = n^2$ . Für  $r, s \in R$  und  $z \in Z$  gilt  $[rz, s] = [r, s] = [r, sz]$ . Jedes Element  $g \in G'$  hat also die Form  $g = c_1 \dots c_m$  mit  $c_1, \dots, c_m \in \Gamma$ . Es genügt zu zeigen, dass man dabei  $m \leq n^3$  wählen kann (dann folgt  $|G'| \leq n^{2n^3} < \infty$ ). Nehmen wir  $m > n^3$  an. Dann existiert ein  $\gamma \in \Gamma$  mit  $|\{i \in \{1, \dots, m\} : c_i = \gamma\}| > n$ . Wegen  $c_i c_{i+1} = c_{i+1} (c_{i+1}^{-1} c_i c_{i+1}) = c_{i+1} \delta$  mit  $\delta \in \Gamma$  können wir  $c_1 = \dots = c_{n+1} = \gamma$  annehmen. Im Widerspruch zur Minimalität von  $m$  werden wir zeigen, dass  $\gamma^{n+1}$  ein Produkt von  $n$  Kommutatoren ist. Sei dafür  $\gamma = [r, s]$  mit  $r, s \in R$ . Wegen  $\gamma^n = \gamma^{|G:Z|} \in Z$  ist

$$\gamma^{n+1} = \gamma \gamma^n = \gamma s \gamma^n s^{-1} = \gamma s \gamma s^{-1} (s \gamma s^{-1})^{n-1} = [r, s] s [r, s] s^{-1} [s r s^{-1}, s]^{n-1} = [r, s^2] [s r s^{-1}, s]^{n-1}. \quad \square$$

**Satz 5.24.** Sei  $G = F/N$  eine endliche Gruppe mit  $F = F_n$ . Dann gilt:

- (i)  $N/[F, N]$  ist eine endlich erzeugte abelsche Gruppe mit freiem Teil vom Rang  $n$  und Torsionsteil  $(F' \cap N)/[F, N]$ .
- (ii) Für  $N/[F, N] = (F' \cap N)/[F, N] \oplus K/[F, N]$  ist  $F/K$  eine maximale Schur-Erweiterung von  $G$ .
- (iii) Für jede Schur-Erweiterung  $\hat{G}$  von  $G$  existiert ein  $L \trianglelefteq F$  mit  $N = (F' \cap N)L$  und  $\hat{G} \cong F/L$ . Insbesondere ist  $\hat{G}$  eine Faktorgruppe einer maximalen Schur-Erweiterung.
- (iv)  $M(G) \cong (F' \cap N)/[F, N]$  (Hopf-Formel).

*Beweis.*

- (i) Nach Satz 2.11 ist  $N$  endlich erzeugt. Mit  $N \trianglelefteq F$  ist  $[F, N] \trianglelefteq F$  und  $[F, N] \leq F' \cap N$ . Wegen  $N/[F, N] \leq Z(F/[F, N])$  hat  $Z(F/[F, N])$  endlichen Index in  $F/[F, N]$ . Nach Satz 5.23 ist  $F'/[F, N]$  endlich. Daher ist auch  $(F' \cap N)/[F, N]$  endlich. Wegen  $N' \leq [F, N]$  ist  $N/[F, N]$  abelsch. Weiter ist

$$(N/[F, N]) / ((F' \cap N)/[F, N]) \cong N/(F' \cap N) \cong NF'/F' \leq F/F'.$$

Nach Beispiel 1.17 ist  $F/F'$  eine freie abelsche Gruppe vom Rang  $n$ . Wegen  $|F/N| = |G| < \infty$  muss auch  $NF'/F'$  eine freie abelsche Gruppe vom Rang  $n$  sein. Daher ist  $(F' \cap N)/[F, N]$  der Torsionsteil von  $N/[F, N]$ .

- (ii) Wegen  $K/[F, N] \leq N/[F, N] \leq Z(F/[F, N])$  ist  $K \trianglelefteq F$ . Sei  $\hat{G} := F/K$  und  $Z := N/K$ . Dann gilt  $\hat{G}/Z \cong F/N \cong G$  und  $Z \leq Z(\hat{G})$  wegen  $[F, N] \leq K$ . Aus  $N/[F, N] \leq F'K/[F, N]$  folgt

$$Z = N/K \leq F'K/K = (F/K)' = \hat{G}'.$$

Also ist  $\hat{G}$  eine Schur-Erweiterung mit  $Z \cong (F' \cap N)/[F, N]$ . Aus Satz 5.15 folgt  $|M(G)| \geq |(F' \cap N)/[F, N]|$ . Für die umgekehrte Ungleichung zeigen wir erst (iii).

- (iii) Seien  $\alpha: F \rightarrow G$  und  $\beta: \hat{G} \rightarrow G$  die kanonischen Epimorphismen mit  $N = \text{Ker}(\alpha)$  und  $Z := \text{Ker}(\beta)$ . Da  $F$  frei ist, existiert ein Homomorphismus  $\rho: F \rightarrow \hat{G}$  mit  $\beta\rho = \alpha$ . Es gilt dann  $\hat{G} = \rho(F)Z$  und  $Z \leq \hat{G}' \leq \rho(F)' \leq \rho(F)$ , also  $\rho(F) = \hat{G}$ . Offenbar ist  $L := \text{Ker}(\rho) \leq \text{Ker}(\alpha) = N$ . Wegen  $\beta\rho(N) = \alpha(N) = 1$  ist  $\rho(N) \leq \text{Ker}(\beta) = Z$ . Dies zeigt  $\rho([F, N]) \leq [\hat{G}, Z] = 1$  und  $[F, N] \leq L$ . Aus  $\rho(N) = Z \leq \hat{G}' = \rho(F')$  folgt außerdem  $N \leq F'L$  und  $(F' \cap N)L = F'L \cap N = N$  nach Dedekind. Nun gilt

$$|Z| = \frac{|\hat{G}|}{|G|} = |N : L| = |(F' \cap N)L : L| = |F' \cap N : F' \cap L| \leq |(F' \cap N)/[F, N]|.$$



Daher ist die in (ii) konstruierte Schur-Erweiterung tatsächlich maximal.

Nach (i) und dem Hauptsatz über endlich erzeugte abelsche Gruppen gilt

$$L/[F, N] = (L \cap F')/[F, N] \oplus M/[F, N],$$

wobei  $(L \cap F')/[F, N]$  der Torsionsteil ist. Wegen  $|N : L| = |F' \cap N : F' \cap L|$  ist  $M/[F, N]$  der torsionsfreie Teil von  $N/[F, N]$ . Nach (ii) ist  $F/M$  eine maximale Schur-Erweiterung und  $\widehat{G} \cong F/L \cong (F/M)/(L/M)$ .

(iv) Folgt aus dem Beweis von (ii). □

**Satz 5.25.** *Sei  $G = \langle x_1, \dots, x_n \mid r_1, \dots, r_k \rangle$  endlich. Dann lässt sich  $M(G)$  mit  $k - n$  Elementen erzeugen. Insbesondere ist  $M(G) = 1$  falls  $n = k$ .*

*Beweis.* Nach Satz 1.21 ist  $n \leq k$ . Sei  $F$  die freie Gruppe bzgl.  $x_1, \dots, x_n$  und  $N := \langle r_1, \dots, r_k \rangle^F$ . Wegen  $N/[F, N] \leq Z(F/[F, N])$  ist  $N/[F, N] = \langle \bar{r}_1, \dots, \bar{r}_k \rangle$ , wobei  $\bar{r}_i := r_i[F, N]$ . Nach Satz 5.24 hat der freie Teil von  $N/[F, N]$  Rang  $n$  und der Torsionsteil ist zu  $M(G)$  isomorph. Also lässt sich  $M(G)$  mit  $k - n$  Elementen erzeugen. □

**Beispiel 5.26.** Nach Satz 5.25 und Aufgabe 2 ist  $M(Q_{2^n}) = 1$  für  $n \geq 3$  (vgl. GT-Beispiel 11.38). Für unendliche Gruppen ist Satz 5.25 falsch: Zum Beispiel ist  $F_2/F_2^{[3]}$  eine Schur-Erweiterung von  $F_2/F_2' \cong \langle x, y \mid [x, y] = 1 \rangle \cong C_\infty^2$ .

**Satz 5.27.** *Seien  $\widehat{G}_1, \widehat{G}_2$  maximale Schur-Erweiterungen von  $G$  mit  $\widehat{G}_1/Z_1 \cong G \cong \widehat{G}_2/Z_2$ . Dann gilt*

(i) (SCHUR)  $\widehat{G}'_1 \cong \widehat{G}'_2$  und  $\widehat{G}_1/\widehat{G}'_1 \cong G/G' \cong \widehat{G}_2/\widehat{G}'_2$ .

(ii) (GASCHÜTZ)  $\widehat{G}_1/Z(\widehat{G}_1) \cong \widehat{G}_2/Z(\widehat{G}_2)$ .

(iii) (READ)  $Z(\widehat{G}_1)/Z_1 \cong Z(\widehat{G}_2)/Z_2$ .

*Beweis.* Sei  $G = F/N$ ,  $K_i \trianglelefteq F$  und  $\widehat{G}_i \cong F/K_i$  wie in Satz 5.24. Wir zeigen, dass die angegebenen Gruppen nicht von  $i$  abhängen.

(i) Es gilt

$$\begin{aligned} \widehat{G}'_i &\cong F'K_i/K_i \cong F'/(F' \cap K_i) = F'/(F' \cap N \cap K_i) = F'/[F, N], \\ \widehat{G}_i/\widehat{G}'_i &\cong (\widehat{G}_i/Z_i)/(\widehat{G}'_i/Z_i) \cong G/G'. \end{aligned}$$

(ii) Für  $L/[F, N] := Z(F/[F, N])$  gilt  $[F, L] \leq [F, N] \leq K_i$  und  $L/K_i \leq Z(F/K_i)$ . Sei umgekehrt  $xK_i \in Z(F/K_i)$ . Dann ist  $[x, F] \leq K_i \cap F' = K_i \cap F' \cap N = [F, N]$  und es folgt  $x[F, N] \in Z(F/[F, N]) = L/[F, N]$ . Dies zeigt

$$\widehat{G}_i/Z(\widehat{G}_i) \cong (F/K_i)/Z(F/K_i) = (F/K_i)/(L/K_i) \cong F/L.$$

(iii) Mit den Bezeichnungen aus (ii) gilt

$$Z(\widehat{G}_i)/Z_i \cong (L/K_i)/(N/K_i) \cong L/N. \quad \square$$

**Bemerkung 5.28.**

- (i) Im Allgemeinen ist  $Z(\widehat{G}_1) \not\cong Z(\widehat{G}_2)$  in der Situation von Satz 5.27. Zum Beispiel sind die minimal nicht-abelschen Gruppen

$$\begin{aligned}\widehat{G}_1 &= \langle x, y \mid x^8 = y^2 = 1, yxy^{-1} = x^5 \rangle, \\ \widehat{G}_2 &= \langle x, y \mid x^4 = y^2 = [x, y]^2 = [x, x, y] = [y, x, y] = 1 \rangle\end{aligned}$$

der Ordnung 16 aus Aufgabe 4 und Aufgabe 6 maximale Schur-Erweiterungen von  $G = C_4 \times C_2$  mit  $Z(\widehat{G}_1) = \langle x^2 \rangle \cong C_4$  und  $Z(\widehat{G}_2) = \langle x^2, [x, y] \rangle \cong C_2^2$  (aus GT-Satz 11.37 folgt  $M(G) \cong C_2$ ).

- (ii) Schur-Multiplikatoren kommen auch in der Darstellungstheorie endlicher Gruppen vor: Sei  $N \trianglelefteq G$  und  $\Delta: N \rightarrow \text{GL}(d, \mathbb{C})$  eine irreduzible Darstellung von  $N$ . Für  $g \in G$  ist auch  ${}^g\Delta: N \rightarrow \text{GL}(d, \mathbb{C})$ ,  $x \mapsto \Delta(g^{-1}xg)$  eine Darstellung. Nehmen wir an, dass  $\Delta$  und  ${}^g\Delta$  für alle  $g \in G$  äquivalent sind, d. h. für  $g \in G$  existiert  $T_g \in \text{GL}(d, \mathbb{C})$  mit  ${}^g\Delta(x) = T_g \Delta(x) T_g^{-1}$  für alle  $x \in N$ . Sei  $g_1, \dots, g_k \in G$  ein Repräsentantensystem für  $G/N$  und  $T_i := T_{g_i}$ . Für  $x \in N$  definieren wir

$$\Gamma: G \rightarrow \text{GL}(d, \mathbb{C}), \quad g_i x \mapsto \Delta(x^{-1}) T_i.$$

Für  $y \in N$  gilt

$$\Gamma(g_i x) \Delta(y) \Gamma(g_i x)^{-1} = \Delta(x^{-1}) T_i \Delta(y) T_i^{-1} \Delta(x) = \Delta(x^{-1} g_i^{-1} y g_i x) = {}^{g_i x} \Delta(y).$$

Dies zeigt

$$\Gamma(gh) \Delta(y) \Gamma(gh)^{-1} = {}^{gh} \Delta(y) = {}^g ({}^h \Delta)(y) = \Gamma(g) \Gamma(h) \Delta(y) \Gamma(h)^{-1} \Gamma(g)^{-1}$$

für  $g, h \in G$  und alle  $y \in N$ . Aus Schurs Lemma<sup>12</sup> folgt  $\Gamma(gh) = \kappa(g, h) \Gamma(g) \Gamma(h)$  für ein  $\kappa(g, h) \in \mathbb{C}^\times$ . Man nennt  $\Gamma$  eine *projektive Darstellung* von  $G$ , denn  $G \rightarrow \text{PGL}(d, \mathbb{C})$ ,  $g \mapsto \Gamma(g) \mathbb{C}^\times$  ist ein Homomorphismus. Wegen

$$\begin{aligned}\kappa(x, yz) \kappa(y, z) \Gamma(x) \Gamma(y) \Gamma(z) &= \kappa(x, yz) \Gamma(x) \Gamma(yz) = \Gamma(x(yz)) = \Gamma((xy)z) \\ &= \kappa(xy, z) \Gamma(xy) \Gamma(z) = \kappa(xy, z) \kappa(x, y) \Gamma(x) \Gamma(y) \Gamma(z)\end{aligned}$$

ist  $\kappa \in Z^2(G, \mathbb{C}^\times)$ . Tatsächlich hängt  $\kappa$  nur  $G/N$  ab, d. h.  $\kappa \in Z^2(G/N, \mathbb{C}^\times)$ . Andere Wahlen der  $T_i$  liefern äquivalente  $\kappa$ . Im Fall  $M(G/N) = 1$  kann man  $\kappa = 1$  erreichen. Dann ist  $\Gamma$  eine gewöhnliche Darstellung, die  $\Delta$  fortsetzt.

- (iii) Wir beschäftigen uns nun mit der Frage, welche Gruppen die Form  $G/Z(G)$  haben. Dabei lassen wir wieder unendliche Gruppen  $G$  zu.

**Definition 5.29.** Man nennt  $G$  *zentral erweiterbar* (engl. *capable*), falls eine Gruppe  $H$  mit  $H/Z(H) \cong G$  existiert. Sei  $Z^*(G)$  der Durchschnitt aller Normalteiler  $N$ , sodass  $G/N$  zentral erweiterbar ist. Man nennt  $Z^*(G)$  das *Epizentrum* von  $G$ .

**Bemerkung 5.30.**

- (i) Zentral erweiterbare Gruppen sind innere Automorphismengruppen wegen  $H/Z(H) \cong \text{Inn}(H)$ .  
(ii) Da  $G/Z(G)$  zentral erweiterbar ist, gilt  $Z^*(G) \leq Z(G)$ . Offenbar ist  $Z^*(G)$  charakteristisch in  $G$ .

<sup>12</sup>siehe Lemma 1.9 in Charaktertheorie-Skript

**Beispiel 5.31.** Gruppen mit trivialem Zentrum sind zentral erweiterbar. Wegen  $D_{4n}/Z(D_{4n}) \cong D_{2n}$  sind alle Diedergruppen zentral erweiterbar. Nicht-triviale zyklische Gruppen sind nicht zentral erweiterbar.

**Lemma 5.32.** Für jede Gruppe  $G$  ist  $G/Z^*(G)$  zentral erweiterbar.

*Beweis.* Sei  $\{N_i : i \in I\}$  die Menge der Normalteiler von  $G$ , sodass  $G/N_i$  zentral erweiterbar ist. Dann existieren Gruppen  $\{H_i : i \in I\}$  und Epimorphismen  $\varphi_i : H_i \rightarrow G/N_i$  mit  $\text{Ker}(\varphi_i) = Z(H_i)$ . Sei  $H := \times_{i \in I} H_i$  und

$$L := \{(h_i)_i \in H : \exists g \in G : \forall i \in I : \varphi_i(h_i) = gN_i\} \leq H.$$

Sicher ist  $Z(H) = \times Z(H_i) \leq Z(L)$ . Da die Projektion von  $L$  nach  $H_i$  für jedes  $i$  surjektiv ist, gilt  $Z(H) = Z(L)$ . Für jedes  $g \in G$  existiert genau ein Tupel  $(h_i)_i \in L/Z(L)$  mit  $\varphi_i(h_i) = gN_i$  für alle  $i \in I$ . Man sieht leicht, dass die Abbildung  $G \rightarrow L/Z(L)$ ,  $g \mapsto (h_i)_i \in L/Z(L)$  ein Epimorphismus mit Kern  $Z^*(G) = \bigcap_{i \in I} N_i$  ist. Also ist  $G/Z^*(G) \cong L/Z(L)$  zentral erweiterbar.  $\square$

**Folgerung 5.33.** Genau dann ist  $G$  zentral erweiterbar, wenn  $Z^*(G) = 1$  gilt.

**Lemma 5.34.** Für jede Gruppe  $G$  ist  $Z^*(G)$  der Durchschnitt aller Untergruppen der Form  $\pi(Z(H))$ , wobei  $Z \rightarrow H \xrightarrow{\pi} G$  eine zentrale Erweiterung von  $G$  ist.

*Beweis.* Sei  $D \leq G$  der Durchschnitt über  $\pi(Z(H))$  wie angegeben. Für jede zentrale Erweiterung  $\pi : H \rightarrow G$  gilt  $\pi(Z(H)) \trianglelefteq \pi(H) = G$  und

$$G/\pi(Z(H)) \cong (H/\text{Ker}(\pi))/(\pi(Z(H))/\text{Ker}(\pi)) \cong H/Z(H).$$

Also ist  $G/\pi(Z(H))$  zentral erweiterbar und  $Z^*(G) \leq D$ .

Sei umgekehrt  $G/N$  zentral erweiterbar für ein  $N \trianglelefteq G$ . Dann existiert ein Epimorphismus  $\alpha : H \rightarrow G/N$  mit  $\text{Ker}(\alpha) = Z(H)$ . Sei

$$L := \{(x, y) \in G \times H : \alpha(y) = xN\} \leq G \times H.$$

Die Projektion  $\rho : L \rightarrow G$ ,  $(x, y) \mapsto x$  ist surjektiv mit  $\text{Ker}(\rho) = 1 \times \text{Ker}(\alpha) \leq Z(L)$ . Also ist  $\rho$  eine zentrale Erweiterung von  $G$ . Es folgt  $D \leq \rho(Z(L))$ . Da die Projektion von  $L$  nach  $H$  surjektiv ist, gilt  $Z(L) \leq G \times Z(H)$ . Wegen  $Z(H) = \text{Ker}(\alpha)$  ist  $Z(L) \leq N \times Z(H)$  und  $D \leq \rho(Z(L)) \leq N$ . Dies zeigt  $D \leq Z^*(G)$ .  $\square$

**Bemerkung 5.35.** Wir zeigen, dass man in Lemma 5.34 (für endliche Gruppen) nur eine einzige zentrale Erweiterung betrachten muss.

**Satz 5.36** (BEYL-FELGNER-SCHMID). Sei  $\hat{G}$  eine maximale Schur-Erweiterung einer endlichen Gruppe  $G$  und  $\gamma : \hat{G} \rightarrow G$  der entsprechende Epimorphismus. Dann gilt  $Z^*(G) = \gamma(Z(\hat{G}))$ .

*Beweis.* Da jede Schur-Erweiterung zentral ist, gilt  $Z^*(G) \leq \gamma(Z(\widehat{G}))$  nach Lemma 5.34. Sei umgekehrt  $\alpha: H \rightarrow G$  eine zentrale Erweiterung. Wir müssen  $\gamma(Z(\widehat{G})) \leq \alpha(Z(H))$  zeigen. Sei  $F$  eine freie Gruppe und  $\pi: F \rightarrow G$  ein Epimorphismus mit Kern  $N$ . Dann existiert ein Homomorphismus  $\varphi: F \rightarrow H$  mit  $\alpha\varphi = \pi$ . Wegen  $\alpha(\varphi(N)) = \pi(N) = 1$  ist  $\varphi(N) \leq \text{Ker}(\alpha) \leq Z(H)$ . Es folgt  $\varphi([F, N]) \leq [H, Z(H)] = 1$ . Da  $\pi$  surjektiv ist, gilt  $H = \text{Ker}(\alpha)\varphi(F) = Z(H)\varphi(F)$ .

Nach Satz 5.24 können wir  $\widehat{G} = F/K$  annehmen, wobei  $N/[F, N] = (F' \cap N)/[F, N] \oplus K/[F, N]$ . Außerdem sei  $\gamma(xK) = \pi(x)$  für alle  $x \in F$ . Sei  $W/K := Z(\widehat{G})$ . Dann gilt

$$[\varphi(W), \varphi(F)] = \varphi([W, F]) \leq \varphi(F' \cap K) = \varphi(F' \cap N \cap K) = \varphi([F, N]) = 1.$$

Es folgt  $\varphi(W) \leq Z(H)$  und  $\gamma(Z(\widehat{G})) = \pi(W) \leq \alpha(Z(H))$ . □

**Folgerung 5.37.** Sei  $G$  endlich mit  $M(G) = 1$ . Genau dann ist  $G$  zentral erweiterbar, wenn  $Z(G) = 1$  gilt.

**Beispiel 5.38.** Für  $n \geq 3$  ist  $Q_{2^n}$  nicht zentral erweiterbar, denn  $M(Q_{2^n}) = 1$  (Beispiel 5.26) und  $Z(Q_{2^n}) \neq 1$ .

**Satz 5.39** (BAER). Sei  $A = C_{d_1} \times \dots \times C_{d_k}$  eine endliche abelsche Gruppe mit  $1 \neq d_1 \mid d_2 \mid \dots \mid d_k$ . Genau dann ist  $A$  zentral erweiterbar, wenn  $k \geq 2$  und  $d_{k-1} = d_k$  gilt.

*Beweis.* Für  $k = 1$  ist  $A \neq 1$  zyklisch und daher nicht zentral erweiterbar. Sei nun  $k \geq 2$ . Sei  $A = \langle a_1 \rangle \times \dots \times \langle a_k \rangle$  mit  $|\langle a_i \rangle| = d_i$  für  $i = 1, \dots, k$ . Nehmen wir zuerst an, dass  $A$  zentral erweiterbar ist. Sei  $\gamma: H \rightarrow A$  ein Epimorphismus mit  $\text{Ker}(\gamma) = Z(H)$ . Sei  $H_i := \gamma^{-1}(\langle a_i a_k \rangle)$  für  $i = 1, \dots, k-1$  und  $H_k := \gamma^{-1}(\langle a_k \rangle)$ . Da  $H_i/Z(H)$  zyklisch ist, ist  $H_i$  abelsch für  $i = 1, \dots, k$ . Wegen  $A = \langle a_1 a_k, \dots, a_{k-1} a_k, a_k \rangle$  gilt  $H = \langle H_1, \dots, H_k \rangle$  und  $\bigcap_{i=1}^k H_i = Z(H)$ . Wegen  $(a_i a_k)^{d_{k-1}} = a_k^{d_{k-1}}$  für  $i = 1, \dots, k-1$  ist  $\gamma^{-1}(a_k^{d_{k-1}}) \subseteq Z(H) = \text{Ker}(\gamma)$ , d. h.  $d_k = |\langle a_k \rangle| = d_{k-1}$ .

Sei nun  $Z := Z^*(A) \neq 1$ . Sei  $F$  eine freie Gruppe und  $N, L \trianglelefteq F$  mit  $F/N \cong A$  und  $F/L \cong (F/N)/(L/N) \cong A/Z$ . Sei  $\widehat{A} := F/K$  eine maximale Schur-Erweiterung von  $A$  mit  $N/[F, N] = (F' \cap N)/[F, N] \oplus K/[F, N]$ . Nach Satz 5.36 gilt  $Z(\widehat{A}) = L/K$  und  $[F, L] \leq F' \cap K \leq [F, N]$ . Daher ist die Abbildung

$$M(A) = (F' \cap N)/[F, N] \rightarrow (F' \cap L)/[F, L] = M(A/Z), \quad x[F, N] \mapsto x[F, L]$$

injektiv. Insbesondere ist  $|M(A)| \leq |M(A/Z)|$ . Nach GT-Beispiel-11.38 gilt  $|M(A)| = d_1^{k-1} d_2^{k-2} \dots d_{k-1}$ . Andererseits existieren  $e_i \mid d_i$  mit  $|M(A/Z)| = e_1^{k-1} \dots e_{k-1}$ . Aus  $|M(A)| \leq |M(A/Z)|$  folgt nun leicht  $d_{k-1} < d_k$ . □

**Definition 5.40.** Gruppen  $G$  und  $H$  heißen *isoklin*<sup>13</sup>, falls es Isomorphismen

$$\varphi: G' \rightarrow H', \quad \psi: G/Z(G) \rightarrow H/Z(H), \quad xZ(G) \mapsto \tilde{x}Z(H)$$

mit  $\varphi([x, y]) = [\tilde{x}, \tilde{y}]$  für alle  $x, y \in G$  gibt. Ggf. heißt  $\psi$  ein *Isoklinismus* und wir schreiben  $G \approx H$ .

**Bemerkung 5.41.**

- (i) Die Eigenschaft  $\varphi([x, y]) = [\tilde{x}, \tilde{y}]$  hängt nicht von der Wahl der Repräsentanten  $\tilde{x}$  ab. Außerdem gilt  $\varphi(g)Z(H) = \psi(gZ(G))$  für alle  $g \in G'$ .

<sup>13</sup>Hall führte den Begriff im englischen Original als *isoclinic* ein und schlug als deutsche Übersetzung *gleich schief* vor.

- (ii) Offenbar ist Isoklinismus eine Äquivalenzrelation und isomorphe Gruppen sind isoklin.
- (iii) Die Abbildung  $\varphi: G' \rightarrow H'$  ist durch einen Isoklinismus eindeutig bestimmt.
- (iv) Für  $G \approx H$  gilt  $G' \cong H'$  und

$$G/Z(G)G' \cong (G/Z(G))/(G/Z(G))' \cong (H/Z(H))/(H/Z(H))' \cong H/Z(H)H'.$$

Daher unterscheiden sich  $|G|$  und  $|H|$  nur durch den sogenannten *Verzweigungsfaktor*

$$Z(G)G'/G' \cong Z(G)/(Z(G) \cap G').$$

Für  $x \in G' \cap Z(G)$  gilt  $\varphi(x)Z(H) = \psi(xZ(G)) = 1$ , d. h.  $\varphi(x) \in Z(H)$ . Die Einschränkung von  $\varphi$  liefert also einen Isomorphismus  $G' \cap Z(G) \cong H' \cap Z(H)$ .

- (v) Für  $G \approx H$  gilt nach Voraussetzung  $\varphi(G') = H'$ . Nehmen wir  $\varphi(G^{[k]}) = H^{[k]}$  für ein  $k \geq 2$  an. Für  $y \in G^{[k]}$  gilt  $\tilde{y} \in \varphi(y)Z(H) \subseteq H^{[k]}Z(H)$ . Für  $x \in G$  folgt  $\varphi([x, y]) = [\tilde{x}, \tilde{y}] \in H^{[k+1]}$ . Dies zeigt  $\varphi(G^{[k+1]}) \subseteq H^{[k+1]}$ . Aus Symmetriegründen muss Gleichheit gelten. Insbesondere ist  $G^{[k]} \cong H^{[k]}$  für alle  $k \geq 2$ . Außerdem gilt  $G/Z_k(G) \cong H/Z_k(H)$  für  $k \geq 1$ . Insbesondere haben  $G$  und  $H$  die gleiche Nilpotenzklasse (falls nilpotent) und Auflösbarkeitsstufe (falls auflösbar).
- (vi) Aus  $G/Z(G) \cong H/Z(H)$  und  $G' \cong H'$  folgt nicht  $G \approx H$  (siehe Beispiel 5.48).

#### Beispiel 5.42.

- (i) Alle abelschen Gruppen sind zueinander isoklin. Für jede abelsche Gruppe  $A$  gilt allgemeiner  $G \approx G \times A$ .
- (ii) Seien  $\widehat{G}_1$  und  $\widehat{G}_2$  maximale Schur-Erweiterungen von  $G$ . Wie im Beweis von Satz 5.27 sei  $G = F/N$  und  $\widehat{G}_i = F/K_i$  für eine freie Gruppe  $F$ . Für  $L/[F, N] = Z(F/[F, N])$  ist

$$\psi: \widehat{G}_1/Z(\widehat{G}_1) \cong F/L \cong \widehat{G}_2/Z(\widehat{G}_2), \quad xK_1Z(\widehat{G}_1) \mapsto xK_2Z(\widehat{G}_2)$$

ein kanonischer Isomorphismus. Da auch der Isomorphismus  $\widehat{G}_1' \cong F'/[F, N] \cong \widehat{G}_2'$  kanonisch ist, ist  $\psi$  ein Isoklinismus. Umgekehrt ist nicht jede zu  $\widehat{G}_1$  isokline Gruppe (der gleichen Ordnung) eine (maximale) Schur-Erweiterung von  $G$ . Zum Beispiel ist  $Q_8$  nach Beispiel 5.26 eine maximale Schur-Erweiterung von sich selbst, aber  $Q_8 \approx D_8$ .

- (iii) Sei  $H \leq G$  mit  $G = HZ(G)$ . Dann ist  $Z(H) = H \cap Z(G)$ ,  $H' = G'$  und die Abbildung  $H/Z(H) \rightarrow G/Z(G)$ ,  $hZ(H) \mapsto hZ(G)$  ist ein Isoklinismus. Also gilt  $G \approx H$ .
- (iv) Sei  $G$  endlich. Ist  $Z(G) \not\leq \Phi(G)$ , so existiert eine maximale Untergruppe  $M < G$  mit  $G = MZ(G)$ . Nach (iii) gilt  $G \approx M$ . Wiederholt man das Argument mit  $M$ , so erhält man schließlich eine Untergruppe  $H \leq G$  mit  $G \approx H$  und  $Z(H) \leq \Phi(H)$ .
- (v) Sei  $N \trianglelefteq G$  mit  $N \cap G' = 1$ . Wegen  $[G, N] \leq N \cap G' = 1$  ist  $N \leq Z(G)$ . Offenbar ist  $G' \rightarrow G'N/N \cong (G/N)'$ ,  $x \mapsto xN$  ein Isomorphismus. Für  $xN \in Z(G/N)$  gilt  $[x, G] \leq G' \cap N = 1$  und  $x \in Z(G)$ . Dies zeigt  $Z(G/N) = Z(G)/N$ . Daher ist  $G/Z(G) \cong (G/N)/Z(G/N)$ ,  $xZ(G) \mapsto xNZ(G/N)$  ein Isoklinismus. Es folgt  $G \approx G/N$ .
- (vi) Ist  $H$  eine maximale Schur-Erweiterung von  $G/Z(G)$ , so gilt  $H/Z(H) \cong G/Z(G)$  nach Satz 5.36. Im Allgemeinen sind  $G$  und  $H$  aber nicht isoklin (betrachte  $G = A_4$  und  $H = \text{SL}(2, 3)$ ). Der folgende Satz zeigt, dass  $G$  dennoch zu einer Schur-Erweiterung von  $G/Z(G)$  isoklin ist.

**Definition 5.43.** Man nennt  $G$  eine *Stammgruppe*, falls  $Z(G) \leq G'$ .

**Satz 5.44** (HALL). *Jede Gruppe ist zu einer Stammgruppe isoklin.*

*Beweis.* Sei  $\{g_i : i \in I\}$  ein Erzeugendensystem von  $G$  und  $A = \bigoplus_{i \in I} \langle a_i \rangle \cong \bigoplus_{i \in I} C_\infty$ . Wir betrachten

$$H := \langle (g_i, a_i) : i \in I \rangle \leq G \times A.$$

Wegen  $1 \times A \leq Z(G \times A)$  ist  $HA = G \times A$  und  $G \approx G \times A \approx H$  nach Beispiel 5.42. Wegen

$$[(g_i, a_i), (g_j, a_j)] = ([g_i, g_j], 1)$$

ist  $H' = G' \times 1$ . In  $H/H'$  erzeugen die Nebenklassen von  $(g_i, a_i)$  eine freie abelsche Gruppe, d. h.  $H/H' \cong A$ . Daher ist auch  $\bar{Z} := Z(H)/(Z(H) \cap H') \cong Z(H)H'/H'$  eine freie abelsche Gruppe.<sup>14</sup> Nach der universellen Eigenschaft von freien (abelschen) Gruppen existiert ein Homomorphismus  $\alpha: \bar{Z} \rightarrow Z(H)$  mit  $Z(H) = \alpha(\bar{Z}) \oplus (Z(H) \cap H')$ . Für  $K := \alpha(\bar{Z})$  gilt  $H \approx H/K$ , denn  $K \cap H' = 1$  (Beispiel 5.42). Wegen

$$Z(H/K) = Z(H)/K = (Z(H) \cap H')K/K \leq H'K/K = (H/K)'$$

ist  $H/K$  eine zu  $G$  isokline Stammgruppe. □

**Bemerkung 5.45.** Die Stammgruppen in einer Äquivalenzklasse isokliner Gruppen sind genau die Vertreter minimaler Ordnung, denn der Verzweigungsfaktor ist trivial.

**Definition 5.46.** Für  $n \in \mathbb{N}$  sei  $k_n(G)$  die Anzahl der Konjugationsklassen von  $G$  der Länge  $n$ .

**Satz 5.47.** *Für endliche Gruppen  $G \approx H$  und  $n \in \mathbb{N}$  gilt  $k_n(G)|Z(H)| = k_n(H)|Z(G)|$ .*

*Beweis.* Sei  $\psi: G/Z(G) \rightarrow H/Z(H)$ ,  $xZ(G) \mapsto \tilde{x}Z(H)$  ein Isoklinismus. Für  $g, x \in G$  gilt

$$g \in C_G(x) \iff [g, x] = 1 \iff \varphi([g, x]) = 1 \iff [\tilde{g}, \tilde{x}] = 1 \iff \tilde{g} \in C_H(\tilde{x}).$$

Dies zeigt

$$|{}^Gx| = |G : C_G(x)| = \frac{|G/Z(G)|}{|C_G(x)/Z(G)|} = \frac{|H/Z(H)|}{|C_H(\tilde{x})/Z(H)|} = |H : C_H(\tilde{x})| = |{}^H\tilde{x}|.$$

Alle Elemente in  $xZ(G)$  liegen in Konjugationsklassen der gleichen Länge. Für  $n \in \mathbb{N}$  folgt

$$|Z(H)|k_n(G)n = |Z(H)| \left| \bigcup_{\substack{x \in G \\ |{}^Gx|=n}} xZ(G) \right| = |Z(H)| \sum_{\substack{xZ(G) \in G/Z(G) \\ |{}^Gx|=n}} |Z(G)| = |Z(G)| \sum_{\substack{\tilde{x}Z(H) \in H/Z(H) \\ |{}^H\tilde{x}|=n}} |Z(H)| = |Z(G)|k_n(H)n. \quad \square$$

**Beispiel 5.48.** Der folgende Code liefert nicht-isokline Gruppen  $G$  und  $H$  der Ordnung 64 mit  $G' \cong H'$  und  $G/Z(G) \cong H/Z(H)$ :

```
G:=SmallGroup(64,128);;
H:=SmallGroup(64,149);;
IdGroup(DerivedSubgroup(G))=IdGroup(DerivedSubgroup(H));
IdGroup(G/Center(G))=IdGroup(H/Center(H));
Number(ConjugacyClasses(G),K->Size(K)=2)=Number(ConjugacyClasses(H),K->Size(K)=2);
```

---

<sup>14</sup>Siehe Anhang im Algebra-Skript

## 6 Erweiterungen der alternierenden Gruppen

**Bemerkung 6.1.** Aus der Gruppentheorie wissen wir, dass die alternierenden Gruppen  $A_n$  für  $n \geq 5$  einfach sind. Wir bestimmen in diesem Kapitel Erweiterungen von  $A_n$  und mit  $A_n$ .

**Lemma 6.2.** Für  $n \geq 4$  gilt  $C_{S_n}(A_n) = 1$ . Insbesondere ist  $Z(S_n) = Z(A_n) = 1$ .

*Beweis.* Sei  $\sigma \in C_{S_n}(A_n)$  und  $\tau := (a, b, c) \in A_n$  ein 3-Zyklus. Aus  $\sigma\tau = \tau\sigma$  folgt  ${}^\sigma\{a, b, c\} = \{a, b, c\}$ . Nun ist  $\{a\}$  der Durchschnitt aller 3-elementigen Mengen  $\Delta \subseteq \{1, \dots, n\}$ , die  $a$  enthalten (beachte:  $n \geq 4$ ). Dies zeigt  $\sigma(a) = a$  für  $a = 1, \dots, n$ .  $\square$

**Bemerkung 6.3.** Zu jedem Homomorphismus  $\omega: H \rightarrow \text{Out}(A_n)$  ( $n \geq 4$ ) gibt es nach Folgerung 4.28 also genau eine Erweiterung von  $A_n$  mit  $H$  zur Paarung  $\omega$ . Wir müssen daher  $\text{Out}(A_n)$  bestimmen.

**Lemma 6.4** (GT-Aufgabe 39). Für  $n \geq 3$  ist  $A_n = \langle (1, 2, 3), \dots, (1, 2, n) \rangle$ .

*Beweis.* Wir argumentieren durch Induktion nach  $n$ . Der Fall  $n = 3$  ist klar. Sei nun  $n \geq 4$ . Es genügt zu zeigen, dass  $A_n = \langle A_{n-1}, (1, 2, n) \rangle =: H$  gilt. Sei indirekt  $\sigma \in A_n \setminus H$ . Dann existiert ein  $k \neq n$  mit  ${}^\sigma k = n$ . Wähle  $\tau \in A_{n-1}$  mit  ${}^\tau 1 = k$ . Dann ist  $\sigma\tau(1, 2, n) \in A_{n-1}$  und wir erhalten den Widerspruch  $\sigma \in H$ .  $\square$

**Lemma 6.5.** Sei  $\Omega$  eine Menge und  $G \leq \text{Sym}(\Omega)$  mit genau einem minimalen Normalteiler. Dann existiert eine Bahn  $\Delta \subseteq \Omega$ , sodass  $G$  treu auf  $\Delta$  operiert.

*Beweis.* Seien  $\Delta_1, \dots, \Delta_s$  die Bahnen von  $G$ . Sei  $N \trianglelefteq G$  der einzige minimale Normalteiler und  $x \in N \setminus \{1\}$ . Dann existiert ein  $1 \leq i \leq s$ , sodass  $x$  nicht-trivial auf  $\Delta_i$  operiert. Für den Kern  $K$  der eingeschränkten Operation  $G \rightarrow \text{Sym}(\Delta_i)$  gilt also  $K \cap N = 1$ . Dies zeigt  $K = 1$  und  $G$  operiert treu auf  $\Delta_i$ .  $\square$

**Bemerkung 6.6.**

- (i) Nach GT-Satz 6.21 und GT-Satz 6.39 gilt die Voraussetzung von Lemma 6.5 für alle symmetrischen und alternierenden Gruppen.
- (ii) Für einen  $k$ -Zyklus  $(a_1, \dots, a_k) \in S_n$  und eine beliebige Permutation  $\sigma \in S_n$  gilt

$$\sigma(a_1, \dots, a_k)\sigma^{-1} = (\sigma(a_1), \dots, \sigma(a_k)).$$

Dies zeigt, dass alle  $k$ -Zyklen in  $S_n$  konjugiert sind. Durch Zerlegen in disjunkte Zyklen erhält man, dass zwei beliebige Permutationen  $\sigma, \tau \in S_n$  genau dann konjugiert sind, wenn sie den gleichen Zyklentyp haben. Für  $\sigma \in A_n$  ist  ${}^{S_n}\sigma \subseteq A_n$  eine Vereinigung von Konjugationsklassen von  $A_n$ . Wegen

$$|A_n : C_{A_n}(\sigma)| = |A_n : A_n \cap C_{S_n}(\sigma)| = |A_n C_{S_n}(\sigma) : C_{S_n}(\sigma)|$$

gilt  ${}^{S_n}\sigma = {}^{A_n}\sigma$  genau dann, wenn  $C_{S_n}(\sigma) \not\subseteq A_n$ . Sei  $\sigma = \sigma_1 \dots \sigma_l$  mit disjunkten Zyklen  $\sigma_i$  der Länge  $\lambda_i$  (inklusive Einerzyklen). Ist  $\lambda_i$  gerade, so ist  $\sigma_i \in C_{S_n}(\sigma) \setminus A_n$ . Nehmen wir nun an, dass  $\lambda_1, \dots, \lambda_l$  ungerade sind. Angenommen es existieren  $i \neq j$  mit  $\lambda_i = \lambda_j$ . Für  $\sigma_i = (a_1, \dots, a_{\lambda_i})$  und  $\sigma_j = (b_1, \dots, b_{\lambda_i})$  ist  $(a_1, b_1) \dots (a_{\lambda_i}, b_{\lambda_i}) \in C_{S_n}(\sigma) \setminus A_n$ .

Im Fall  ${}^{S_n}\sigma \neq {}^{A_n}\sigma$  müssen  $\lambda_1, \dots, \lambda_l$  also ungerade und paarweise verschieden sein. Man kann zeigen, dass die Umkehrung ebenfalls gilt.

**Lemma 6.7.** *Sei  $n \geq 4$  und  $A_{n-1} \cong H \leq A_n$ . Dann ist  $H = \text{Alt}(\{1, \dots, n\} \setminus \{i\})$  für ein  $i \in \{1, \dots, n\}$  oder  $n = 6$ .*

*Beweis.* O.B.d.A. sei  $n \geq 5$ . Nach Lemma 6.5 operiert  $H$  treu auf einer Bahn  $\Delta \subseteq \{1, \dots, n\}$ . Wegen  $|H| = (n-1)!/2$  ist  $|\Delta| \geq n-1$ . Wir können also annehmen, dass  $H$  transitiv auf  $\{1, \dots, n\}$  operiert. Insbesondere ist  $n \mid |H| \mid (n-1)!$ . Daher dürfen wir  $n \geq 8$  voraussetzen.

Sei  $f: A_{n-1} \rightarrow H$  ein Isomorphismus und sei  $\sigma \in A_{n-1}$  ein 3-Zyklus. Offenbar ist  $A_{n-4}$  zu einer Untergruppe von  $C_{A_{n-1}}(\sigma)$  isomorph. Insbesondere besitzt auch  $C_H(f(\sigma))$  eine Untergruppe  $C \cong A_{n-4}$ . Sei  $f(\sigma)$  das disjunkte Produkt von  $k$  vielen 3-Zyklen. Offenbar permutiert  $C$  die Bahnen von  $f(\sigma)$  (einschließlich trivialer Bahnen). Der Kern dieser Operation ist eine 3-Gruppe und damit trivial. Es gibt also einen Monomorphismus  $F: C \rightarrow S_{n-2k}$ . Wegen  $|C| = (n-4)!/2$  folgt  $k \leq 2$ . Im Fall  $k = 2$  ist  $F$  transitiv und man erhält den Widerspruch  $n = 3k = 6$ . Also ist auch  $f(\sigma)$  ein 3-Zyklus.

Sei  $f((1, 2, 3)) = (\alpha, \beta, \gamma)$  und  $f((1, 2, 4)) = (\delta, \epsilon, \varphi)$ . Im Fall  $\{\alpha, \beta, \gamma\} \cap \{\delta, \epsilon, \varphi\} = \emptyset$  wäre

$$A_4 \cong \langle (1, 2, 3), (1, 2, 4) \rangle \cong \langle f((1, 2, 3)), f((1, 2, 4)) \rangle$$

abelsch. Im Fall  $|\{\alpha, \beta, \gamma\} \cap \{\delta, \epsilon, \varphi\}| = 1$  würde  $\langle f((1, 2, 3)), f((1, 2, 4)) \rangle$  transitiv auf der 5-elementigen Menge  $\{\alpha, \beta, \gamma\} \cup \{\delta, \epsilon, \varphi\}$  operieren. Also ist  $|\{\alpha, \beta, \gamma\} \cap \{\delta, \epsilon, \varphi\}| = 2$  und  $\langle f((1, 2, 3)), f((1, 2, 4)) \rangle$  kann nur vier Ziffern bewegen. Durch Induktion nach  $k$  sieht man, dass  $\langle f((1, 2, 3)), \dots, f((1, 2, k)) \rangle$  höchstens  $k$  Ziffern bewegen kann. Also ist  $H = f(A_{n-1}) = \langle f((1, 2, 3)), \dots, f((1, 2, n-1)) \rangle$  (Lemma 6.4) intransitiv. Dies war aber bereits ausgeschlossen.  $\square$

**Satz 6.8** (HÖLDER). *Es gilt  $\text{Aut}(A_6) \cong S_6 \rtimes C_2$  und  $\text{Aut}(A_n) \cong S_n$  für  $4 \leq n \neq 6$ .*

*Beweis.* Offenbar operiert  $S_n$  durch Konjugation auf  $A_n$  mit Kern  $C_{S_n}(A_n) = 1$  (Lemma 6.2). Dies liefert einen Monomorphismus  $\Psi: S_n \rightarrow \text{Aut}(A_n)$ . Sei  $H_i := \text{Alt}(\{1, \dots, n\} \setminus \{i\})$  für  $i = 1, \dots, n$ . Sei zunächst  $n \neq 6$ . Nach Lemma 6.7 operiert dann  $\text{Aut}(A_n)$  auf  $\{H_1, \dots, H_n\}$ . Dies liefert einen Homomorphismus  $\Gamma: \text{Aut}(A_n) \rightarrow S_n$ . Sei  $f \in \text{Ker}(\Gamma)$  und  $\sigma \in A_n$ . Dann ist

$$H_{f(\sigma)_i} = f(\sigma)H_i f(\sigma)^{-1} = f(\sigma)f(H_i)f(\sigma)^{-1} = f(\sigma H_i \sigma^{-1}) = f(H_{\sigma_i}) = H_{\sigma_i}$$

und  $f(\sigma) = \sigma$ . Also ist  $\Gamma$  injektiv. Damit sind  $\Psi$  und  $\Gamma$  sogar Isomorphismen. Sei nun  $n = 6$ .

**Schritt 1:**  $\Psi(S_6) < \text{Aut}(A_6)$ .

Offenbar operiert  $A_5$  treu und transitiv auf  $\text{Syl}_5(A_5)$  durch Konjugation. Dies liefert einen Monomorphismus  $f: A_5 \rightarrow \text{Sym}(\text{Syl}_5(A_5)) \cong S_6$ . Im Fall  $f(A_5) \not\leq A_6$  wäre  $1 \neq f(A_5) \cap A_6 \triangleleft f(A_5)$  im Widerspruch zur Einfachheit von  $f(A_5) \cong A_5$ . Also ist  $f(A_5) \leq A_6$ . Da  $f$  transitiv ist, gilt  $f(A_5) \neq H_i$  für  $i = 1, \dots, 6$ . Die Operation von  $A_6$  auf den Nebenklassen  $A_6/f(A_5)$  liefert einen Monomorphismus  $\varphi: A_6 \rightarrow S_6$ . Wie eben ist  $\varphi(A_6) = A_6$ , d.h.  $\varphi \in \text{Aut}(A_6)$ . Da  $f(A_5)$  der Stabilisator der trivialen Nebenklasse ist, muss  $\varphi(f(A_5)) = H_i$  für ein  $i \in \{1, \dots, 6\}$  gelten. Insbesondere ist  $\varphi \notin \Psi(S_6)$ .

**Schritt 2:**  $|\text{Out}(A_6)| = 4$ .

Seien  $\varphi, \psi \in \text{Aut}(A_6) \setminus \Psi(S_6)$ . Offenbar bildet jeder Automorphismus Konjugationsklassen auf Konjugationsklassen ab. Nach Bemerkung 6.6 ist die Menge der 3-Zyklen eine Konjugationsklasse  $C$  von  $A_6$ . Gilt  $\varphi(C) = C$ , so sieht man wie im Beweis von Lemma 6.7, dass  $\varphi$  die Untergruppen  $H_i$  permutiert. Dann wäre aber  $\varphi \in \Psi(S_6)$ . Also muss  $\varphi(C) = \psi(C)$  die Konjugationsklasse der Elemente vom Zyklentyp  $(3, 3)$  sein, denn dies sind die einzigen weiteren Elemente der Ordnung 3. Es folgt  $(\varphi\psi)(C) = C$  und  $\varphi\psi \in \Psi(S_6)$ . Dies impliziert die Behauptung.

**Schritt 3:**  $\text{Aut}(A_6) \cong S_6 \rtimes C_2$ .

Als Untergruppe vom Index 2 ist  $\Psi(S_6) \trianglelefteq \text{Aut}(A_6)$ . Es genügt also ein Element  $\varphi \in \text{Aut}(A_6) \setminus \Psi(S_6)$



der Ordnung 2 zu finden. Sei zunächst  $\varphi \in \text{Aut}(A_6) \setminus \Psi(S_6)$  beliebig und sei  $x := (1, 2, 3, 4, 5) \in A_6$ . Dann ist auch  $\varphi(x)$  ein 5-Zyklus und daher in  $S_6$  zu  $x$  konjugiert (Bemerkung 6.6). Ersetzt man also  $\varphi$  durch ein geeignetes Element aus der Nebenklasse  $\varphi\Psi(S_6)$ , so kann man  $\varphi(x) = x$  annehmen. Also existiert ein  $y \in C_{S_6}(x)$  mit  $\varphi^2 = \Psi(y)$ . Da  $S_6$  genau  $6 \cdot 4!$  Zyklen der Länge 5 besitzt, ist  $|C_{S_6}(x)| \leq 5$  und damit  $y \in C_{S_6}(x) = \langle x \rangle$ . Dies zeigt  $|\langle \varphi \rangle| \in \{2, 10\}$ . Also hat  $\varphi^5 \in \text{Aut}(A_6) \setminus \Psi(S_6)$  die Ordnung 2.  $\square$

**Satz 6.9.** Für  $4 \leq n \neq 6$  zerfällt jede Erweiterung mit  $A_n$ .

*Beweis.* Nach Satz 6.8 besitzt  $\text{Inn}(A_n) \cong A_n$  ein Komplement in  $\text{Aut}(A_n) \cong S_n$ . Die Behauptung folgt aus Lemma 6.2 und Folgerung 4.28.  $\square$

**Bemerkung 6.10.** Nach Satz 6.8 ist  $\text{Out}(A_6) \cong C_2^2$ . Der nächste Satz zeigt, dass Satz 6.9 für  $n = 6$  falsch ist.

**Satz 6.11.** Die Erweiterung  $\text{Aut}(A_6)$  von  $\text{Inn}(A_6) \cong A_6$  zerfällt nicht.

*Beweis.* Angenommen  $A \leq \text{Aut}(A_6)$  ist ein Komplement von  $\text{Inn}(A_6)$ . Sei  $\Psi(S_6) \leq \text{Aut}(A_6)$  wie im Beweis von Satz 6.8. Dann gilt  $|\Psi(S_6) \cap A| = 2$ . Sei  $\sigma \in S_6$  eine Involution mit  $\alpha := \Psi(\sigma) \in A$ . Wegen  $\text{Inn}(A_6) \cap A = 1$  hat  $\sigma$  Zyklentyp (2) oder (2, 2, 2). O. B. d. A. sei  $\sigma \in \{(1, 2), (1, 2)(3, 4)(5, 6)\}$ . Sei  $\beta \in A \setminus \Psi(S_6)$ . Wie im Beweis von Satz 6.8 vertauscht  $\beta$  die 3-Zyklen mit den Permutationen vom Zyklentyp (3, 3). Wegen  $|A| = 4$  ist  $A$  abelsch.

**Fall 1:**  $\sigma = (1, 2)$ .

Es gilt

$$\beta((3, 4, 5)) = (\beta\alpha)((3, 4, 5)) = (\alpha\beta)((3, 4, 5)) = (1, 2)\beta((3, 4, 5))(1, 2),$$

aber (1, 2) kann keine Permutation vom Zyklentyp (3, 3) zentralisieren. Widerspruch.

**Fall 2:**  $\sigma = (1, 2)(3, 4)(5, 6)$ .

Offenbar wird (1, 3, 5)(2, 4, 6) von  $\sigma$  zentralisiert. Die gleiche Rechnung wie in Fall 1 mit (1, 3, 5)(2, 4, 6) anstelle von (3, 4, 5) zeigt, dass  $\sigma$  einen 3-Zyklus zentralisiert. Dies ist ebenfalls unmöglich.  $\square$

**Bemerkung 6.12.** Das außergewöhnliche Verhalten von  $\text{Aut}(A_6)$  lässt sich durch den (ebenfalls außergewöhnlichen) Isomorphismus  $A_6 \cong \text{PSL}(2, 9)$  erklären (Aufgabe 18).

```
G:=AlternatingGroup(6);;
A:=AutomorphismGroup(G);;
sub:=SubgroupsOfIndexTwo(A);;
List(sub, IdGroup);
IdGroup(SymmetricGroup(6));
IdGroup(PGL(2,9));
IdGroup(MathieuGroup(10));
```

**Lemma 6.13.** Für  $n \in \mathbb{N}$  gilt  $|M(S_n)| \leq 2$ .

*Beweis.* Wir benutzen die Präsentation

$$S_n = \langle x_1, \dots, x_{n-1} \mid x_i^2 = (x_i x_{i+1})^3 = [x_i, x_j] = 1 \text{ für } i < j - 1 \rangle$$

aus Satz 2.18. Seien  $F$  und  $N$  wie in Satz 5.24. Sei  $\overline{F} := F/[F, N]$  und  $\overline{x_i} := x_i[F, N] \in \overline{F}$  für  $i = 1, \dots, n-1$ . Seien  $a_i := \overline{x_i}^2$ ,  $b_i := (\overline{x_i x_{i+1}})^3$  und  $c_{ij} := [\overline{x_i}, \overline{x_j}]$  Elemente in  $\overline{N}$ . Wegen  $\overline{N} \leq Z(\overline{F})$  sind dies Erzeuger von  $\overline{N}$  (man braucht nicht den normalen Abschluss). Da man  $x_i$  durch die Transposition  $(i, i+1)$  realisieren kann, existieren  $g \in F$ ,  $y, z \in N$  mit  $\overline{g x_i g^{-1}} = \overline{x_1 y}$  und  $\overline{g x_j g^{-1}} = \overline{x_3 z}$  (beachte:  $i < j - 1$ ). Wegen  $\overline{N} \leq Z(\overline{F})$  folgt

$$c_{ij} = \overline{g x_i g^{-1}} \overline{g x_j g^{-1}} = [\overline{g x_i g^{-1}}, \overline{g x_j g^{-1}}] = [\overline{x_1 y}, \overline{x_3 z}] = \overline{[x_1, x_3]} = c_{13}.$$

Außerdem gilt

$$c_{13}^2 a_3 = (c_{13} \overline{x_3})^2 = (\overline{x_1 x_3 x_1^{-1}})^2 = a_3$$

und somit  $c_{13}^2 = 1$ . Eine ähnliche Rechnung zeigt

$$b_i^2 a_i^{-1} a_{i+1}^{-2} = (b_i (\overline{x_{i+1} x_i x_{i+1}})^{-1})^2 = (\overline{x_i x_{i+1} x_i})^2 = a_i^2 a_{i+1}$$

und es folgt  $b_i^2 = (a_i a_{i+1})^3$ . Wir setzen  $d_1 := a_1$  und  $d_{i+1} := b_i (a_i a_{i+1})^{-1}$ . Dann gilt  $d_{i+1}^2 = a_i a_{i+1}$  und

$$\overline{N} = \langle d_1, \dots, d_{n-1}, c_{13} \rangle$$

mit  $c_{13}^2 = 1$ . Nach Satz 5.24 hat der freie Teil von  $\overline{N}$  Rang  $n - 1$ . Daher müssen  $d_1, \dots, d_{n-1}$  unendliche Ordnung haben. Der Torsionsteil ist somit  $\langle c_{13} \rangle$ . Die Behauptung folgt nun aus Satz 5.24.  $\square$

**Lemma 6.14.** Für  $n \in \mathbb{N} \setminus \{6, 7\}$  gilt  $|M(A_n)| \leq 2$  und  $|M(A_6)|, |M(A_7)| \leq 6$ .

*Beweis.* Die Fälle  $n \leq 7$  können mit GAP oder GT-Folgerung 11.19 behandelt werden. Sei also  $n \geq 8$  und

$$A_n \cong \langle x_1, \dots, x_{n-2} \mid x_1^3 = x_2^2 = \dots = x_{n-2}^2 = (x_i x_{i+1})^3 = (x_i x_j)^2 = 1 \text{ für } |j - i| > 1 \rangle$$

wie in Satz 2.19. Wir benutzen die Bezeichnungen aus Lemma 6.13 mit  $a_1 := \overline{x_1}^3$ ,  $a_i := \overline{x_i}^2$  ( $i \geq 2$ ),  $b_i := (\overline{x_i x_{i+1}})^3$ ,  $c_i := (\overline{x_1 x_i})^2$  ( $i \geq 3$ ) und  $c_{ij} := [\overline{x_i}, \overline{x_j}]$  für  $2 \leq i < j - 1$ . Wie in Lemma 6.13 folgt dann  $c := c_{24} = c_{ij}$ ,  $c^2 = 1$  und  $b_i^2 = (a_i a_{i+1})^3$  für  $i \geq 2$ . Für  $z_{i+1} := b_i (a_i a_{i+1})^{-1}$  gilt also  $\langle b_i, a_i a_{i+1} \rangle = \langle z_{i+1} \rangle$  für  $i = 2, \dots, n - 3$ . Für  $i \geq 3$  ist

$$a_1 = (\overline{x_i^{-1} x_1 x_i})^3 = (a_i^{-1} \overline{x_1}^{-1} c_i)^3 = a_1^{-1} (a_i^{-1} c_i)^3$$

und  $\boxed{(c_i a_i^{-1})^3 = a_1^2}$ . Wir setzen  $z_1 := a_1 (c_3 a_3^{-1})^{-1}$  und erhalten  $\langle a_1, c_3 a_3^{-1} \rangle = \langle z_1 \rangle$ .

Aus  $c_4 = \overline{x_1}^{-1} (\overline{x_1 x_4})^2 \overline{x_1} = (\overline{x_4 x_1})^2$  und  $c = a_2 a_4 [\overline{x_2}^{-1}, \overline{x_4}^{-1}] a_2^{-1} a_4^{-1} = [\overline{x_2}^{-1}, \overline{x_4}^{-1}]$  folgt

$$\overline{x_4 x_1 x_2 x_4^{-1}} = \overline{c_4 x_1^{-1} x_4^{-1} x_2 x_4 a_4^{-1}} = \overline{c_4 x_1^{-1} x_2 c a_4^{-1}} = \overline{x_2 (x_1 x_2)^{-1} x_2^{-1} a_2 c_4 c a_4^{-1}}.$$

Die dritte Potenz ergibt

$$b_1 = b_1^{-1} a_2^3 c_4^3 c a_4^{-3}.$$

Wegen  $(c_4 a_4^{-1})^3 = a_1^2$  erhält man  $b_1^2 = a_1^2 a_2^3 c$ . Mit  $z_2 := b_1 a_1^{-1} a_2^{-1} c$  gilt  $z_2^2 = a_2 c$  und  $z_2^3 = a_1^{-1} b_1$ .

Für  $i \geq 5$  gilt

$$\overline{x_3 x_1 x_i x_3^{-1}} = \overline{c_3 x_1^{-1} x_3^{-1} x_i x_3 a_3^{-1}} = \overline{c_3 x_1^{-1} x_i c_{3i} a_3^{-1}}$$

und  $c_i = (c_3 a_3^{-1})^2 (\overline{x_1^{-1} x_i})^2$  nach quadrieren. Wegen  $\overline{x_1^{-1} x_i} = a_i \overline{x_i}^{-1} (\overline{x_1 x_i})^{-1} \overline{x_i}$  folgt  $(c_i a_i^{-1})^2 = (c_3 a_3^{-1})^2$ . Andererseits gilt auch  $(c_i a_i^{-1})^3 = a_1^2 = (c_3 a_3^{-1})^3$ . Dies zeigt  $c_i a_i^{-1} = c_3 a_3^{-1}$  für  $i \geq 5$ . Die gleiche Rechnung mit Index 4 anstatt 3 liefert  $c_4 a_4^{-1} = c_6 a_6^{-1}$ . Daher ist  $\langle z_1 \rangle = \langle a_1, c_i a_i^{-1} \rangle$  für  $i = 3, \dots, n-2$ .

Insgesamt gilt

$$\overline{N} = \langle a_i, b_i, c_i, c \rangle = \langle z_1, \dots, z_{n-2}, c \rangle$$

und es folgt  $|M(A_n)| \leq 2$ . □

**Satz 6.15.** *Es gilt*

$$M(S_n) = \begin{cases} 1 & \text{falls } n \leq 3, \\ C_2 & \text{falls } n \geq 4. \end{cases}$$

*Beweis.* O.B.d.A. sei  $n \geq 4$ . Nach Lemma 6.13 genügt es eine echte Schur-Erweiterung von  $S_n$  zu konstruieren. Sei

$$\widehat{S}_n := \langle x_1, \dots, x_{n-1}, z \mid z^2 = 1, x_i^2 = (x_i x_{i+1})^3 = [x_i, x_j] = z \text{ für } i < j-1 \rangle.$$

Nach von-Dyck gibt es einen Epimorphismus  $\widehat{S}_n \rightarrow S_n$  mit Kern  $\langle z \rangle$ . Wegen  $x_i^2 = [x_i, x_j] = z$  ist  $z \in Z(\widehat{S}_n) \cap \widehat{S}'_n$ . Allerdings könnte  $z = 1$  gelten. Wir definieren Matrizen in  $\text{GL}(2^n, \mathbb{C})$  als iterierte Kronecker-Produkte von  $2 \times 2$ -Matrizen:

$$\begin{aligned} A &:= \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}, & B &:= \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, & C &:= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \\ I &:= 1_{2^n}, & M_{2k-1} &:= C^{\otimes(n-k)} \otimes A \otimes 1_2^{\otimes(k-1)}, & M_{2k} &:= C^{\otimes(n-k)} \otimes B \otimes 1_2^{\otimes(k-1)} \end{aligned}$$

für  $k = 1, \dots, n$ . Sei zusätzlich  $M_0 := 0_{2^n}$ . Wegen  $A^2 = B^2 = -C^2 = [A, B] = [A, C] = [B, C] = -1_2$  gilt  $M_k^2 = [M_k, M_l] = -I$  für  $k \neq l$ . Wir setzen nun

$$X_k := \frac{1}{\sqrt{2k}} (\sqrt{k+1} M_k - \sqrt{k-1} M_{k-1})$$

für  $k = 1, \dots, n-1$ . Es folgt

$$\begin{aligned} X_k^2 &= -\frac{1}{2k} ((k+1)I + (k-1)I) = -I \quad (\implies X_k \in \text{GL}(2^n, \mathbb{C})), \\ X_k X_l &= -X_l X_k \quad (k < l-1), \\ X_{k+1} X_k &= \frac{1}{2\sqrt{k^2+k}} \left( \sqrt{(k+2)(k+1)} M_{k+1} M_k - \sqrt{(k+2)(k-1)} M_{k+1} M_{k-1} \right. \\ &\quad \left. + \sqrt{k^2+k} I + \sqrt{k(k-1)} M_k M_{k-1} \right) \\ &= I - X_k X_{k+1}, \\ X_k X_{k+1} X_k &= X_k (I - X_k X_{k+1}) = X_k + X_{k+1} = (I - X_k X_{k+1}) X_{k+1} = X_{k+1} X_k X_{k+1} \\ (X_k X_{k+1})^3 &= X_k (X_{k+1} X_k X_{k+1}) X_k X_{k+1} = X_k X_k X_{k+1} X_k X_k X_{k+1} = (-I)^3 = -I. \end{aligned}$$

Nach von-Dyck existiert ein Epimorphismus  $\Gamma: \widehat{S}_n \rightarrow \langle X_1, \dots, X_{n-1} \rangle$  mit  $\Gamma(z) = -I$ . Also ist  $z \neq 1$  in  $\widehat{S}_n$ . □

**Bemerkung 6.16.** Nach Satz 5.19 besitzt  $S_n$  höchstens  $\text{ggT}(|S_n/S'_n|, |M(S_n)|) = 2$  maximale Schur-Erweiterungen. Neben  $\widehat{S}_n$  gibt es noch die Schur-Erweiterung

$$\widetilde{S}_n := \langle x_1, \dots, x_{n-1}, z \mid z^2 = 1, x_i^2 = (x_i x_{i+1})^3 = 1, [x_i, x_j] = z \text{ für } i < j - 1 \rangle.$$

Man zeigt leicht  $\widetilde{S}_4 \cong \text{GL}(2, 3)$ . Sei allgemeiner  $q$  eine ungerade Primzahlpotenz,  $\mathbb{F}_q^\times = \langle \zeta \rangle$  und  $x := \begin{pmatrix} 0 & \zeta \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \in \text{GL}(2, q)$ . Dann induziert  $x$  durch Konjugation einen äußeren Automorphismus  $\alpha$  von  $\text{SL}(2, q)$  der Ordnung 2. Es gilt  $\text{SL}(2, 5) \rtimes \langle \alpha \rangle \cong \widetilde{S}_5$ . Durch eine ähnliche Konstruktion gelangt man zu  $\widetilde{S}_6 \cong \text{SL}(2, 9) \rtimes C_2$  (vgl. Aufgabe 18). Sei nun  $\zeta \in \mathbb{F}_{q^2}^\times$  der Ordnung  $2(q-1)$  und  $x := \text{diag}(\zeta, \zeta^{-1}) \in \text{SL}(2, q^2)$ . Dann ist  $K(q) := \text{SL}(2, q)\langle x \rangle \leq \text{SL}(2, q^2)$  eine nicht-zerfallende Erweiterung mit  $K(3) \cong \widehat{S}_4$  und  $K(5) \cong \widehat{S}_5$  (ohne Beweis). Ein äußerer Automorphismus von  $S_6$  liefert einen Isomorphismus  $\widehat{S}_6 \cong \widetilde{S}_6$ . Für  $n \neq 6$  gilt hingegen  $\widehat{S}_n \not\cong \widetilde{S}_n$  (Aufgabe 21 und Bemerkung 5.22). Für größere  $n$  sind die Schur-Erweiterungen von  $S_n$  keine „bekannten“ Gruppen.

```
S1:=SchurCoverOfSymmetricGroup(5,3,1); # $\widehat{S}_5$  als Matrixgruppe über  $\mathbb{F}_3$ 
S2:=SchurCoverOfSymmetricGroup(5,3,-1); # $\widetilde{S}_5$ 
IdGroup(S1); IdGroup(S2);
IsomorphismGroups(SchurCoverOfSymmetricGroup(4,3,-1),GL(2,3));
```

**Satz 6.17.** Es gilt

$$M(A_n) = \begin{cases} C_6 & \text{falls } n \in \{6, 7\}, \\ C_2 & \text{falls } n = 4, 5, 8, 9, \dots \end{cases}$$

*Beweis.* Man prüft leicht, dass  $\text{SL}(2, 3)$  eine Schur-Erweiterung von  $A_4$  ist (vgl. Aufgabe 15). Daher gilt  $M(A_4) \cong C_2$ . Sei nun  $n \geq 5$ ,  $\widehat{A}_n := \widehat{S}_n$  und  $Z := Z(\widehat{S}_n) \leq Z(\widehat{A}_n)$ . Dann ist

$$\begin{aligned} \widehat{A}_n/Z &\cong (\widehat{S}_n/Z)' \cong S'_n \cong A_n, \\ \widehat{A}'_n Z/Z &= (\widehat{A}_n/Z)' \cong A'_n \cong A_n. \end{aligned}$$

Es folgt  $|\widehat{S}_n/\widehat{A}'_n| = |\widehat{S}_n/\widehat{A}_n| |\widehat{A}_n/\widehat{A}'_n| \leq 4$  und  $Z \leq \widehat{S}'_n \leq \widehat{A}'_n$ . Also ist  $\widehat{A}_n$  eine Schur-Erweiterung von  $A_n$  und  $2 \mid |M(A_n)|$  für  $n \geq 5$ . Für  $n \notin \{6, 7\}$  ist  $\widehat{A}_n$  die universelle Schur-Erweiterung von  $A_n$  nach Bemerkung 5.22.

Es genügt daher Schur-Erweiterungen  $\widehat{A}_6$  und  $\widehat{A}_7$  mit  $Z(\widehat{A}_6) \cong Z(\widehat{A}_7) \cong C_3$  zu konstruieren. Wir erzeugen  $\widehat{A}_6$  durch monomiale Matrizen in  $\text{GL}(6, 4)$ . Sei  $\mathbb{F}_4^\times = \langle \zeta \rangle$ ,  $\bar{\zeta} := \zeta^{-1}$  und  $(a_1, \dots, a_6; \sigma) := (a_i \delta_{i\sigma(j)})_{ij} \in \text{GL}(6, 4)$  für  $a_1, \dots, a_6 \in \mathbb{F}_4$  und  $\sigma \in S_6$ . Wir definieren

$$\begin{aligned} x_1 &:= (\bar{\zeta}, 1, \zeta, 1, \zeta, \bar{\zeta}; (145)(263)), \\ x_2 &:= (1, 1, 1, 1, \bar{\zeta}, \zeta; (13)(56)), \\ x_3 &:= (1, \zeta, \bar{\zeta}, \zeta, \bar{\zeta}, 1; (23)(45)), \\ x_4 &:= (\bar{\zeta}, 1, \zeta, 1, \zeta, \bar{\zeta}; (15)(36)). \end{aligned}$$

Sei  $G := \langle x_1, x_2, x_3, x_4 \rangle$ . Die beteiligten Permutationen erzeugen offenbar  $A_6$ . Eine Rechnung zeigt

$$x_1^3 = x_2^2 = x_3^2 = x_4^2 = (x_1 x_2)^3 = (x_2 x_3)^3 = (x_3 x_4)^3 = (x_1 x_4)^2 = (x_2 x_4)^2 = 1$$

und  $z := (x_1x_3)^2 = \zeta 1_6 \in Z(G)$ . Außerdem ist  $z = x_1x_3x_1x_3 = x_1x_3x_4x_1^{-1}x_4x_3 = [x_1, x_3x_4] \in G'$ . Nach Moore ist  $G$  eine Schur-Erweiterung von  $A_6$  mit  $Z(G) = \langle z \rangle \cong C_3$ . Wir ergänzen nun

$$x_5 := \begin{pmatrix} 1 & \bar{\zeta} & 1 & \bar{\zeta} & 1 & . \\ \zeta & 1 & \zeta & . & \zeta & 1 \\ 1 & \bar{\zeta} & 1 & \bar{\zeta} & . & \bar{\zeta} \\ \zeta & . & \zeta & 1 & \zeta & 1 \\ 1 & \bar{\zeta} & . & \bar{\zeta} & 1 & \bar{\zeta} \\ . & 1 & \zeta & 1 & \zeta & 1 \end{pmatrix}.$$

Eine weitere Rechnung ergibt  $x_5^2 = (x_2x_5)^2 = (x_3x_5)^2 = (x_4x_5)^3 = 1$  und  $(x_1x_5)^2 = z$ . Daher ist  $\langle x_1, \dots, x_5 \rangle$  die gewünschte Schur-Erweiterung  $\hat{A}_7$ .  $\square$

### Bemerkung 6.18.

- (i) Die im Beweis konstruierte Schur-Erweiterung  $\hat{A}_6$  mit  $|Z(\hat{A}_6)| = 3$  lässt sich als imprimitive Permutationsgruppe vom Grad 18 in  $C_3 \wr A_6$  einbetten. Man nennt  $\hat{A}_6$  VALENTINER-Gruppe.
- (ii) Angenommen die (universelle) Schur-Erweiterung  $\hat{A}_7$  ist bereits konstruiert. Dann existiert eine Untergruppe  $Z \leq H \leq \hat{A}_7$  mit  $H/Z \cong A_6$ . Für  $P \in \text{Syl}_3(H)$  ist auch  $P \in \text{Syl}_3(\hat{A}_7)$ . Nach Taunt (GT-Satz 7.15) ist  $P$  nicht-abelsch und daher  $Z = [P, P] \leq H'$ . Also ist  $H$  eine Schur-Erweiterung von  $A_6$ . Es genügt also  $\hat{A}_7$  zu konstruieren. Das haben wir mit GAP in Bemerkung 5.18 bereits getan. Die Gruppe lässt sich auch auf andere Weisen konstruieren:

```
PerfectGroup(IsPermGroup,15120); #einzige perfekte Gruppe dieser Ordnung
LoadPackage("atlasrep",false);
AtlasGroup("6.A7"); #benötigt beim ersten Zugriff Internet
DoubleCoverOfAlternatingGroup(10,3); #A10 als Matrixgruppe über F3 mit Z(A10) ≅ C2
```

- (iii) Blackburn hat alle Erweiterungen von elementarabelschen Gruppen mit  $S_n$  und  $A_n$  konstruiert.

## 7 Symplektische Gruppen

**Bemerkung 7.1.** Die kompliziertesten einfachen Gruppen sind die Gruppen vom *Lie-Typ*. Dies sind gewisse Matrixgruppen über endlichen Körpern, von denen wir die projektiven speziellen linearen Gruppen  $\text{PSL}(n, q)$  bereits in der Gruppentheorie konstruiert haben. In diesem Kapitel werden die (projektiven) symplektischen Gruppen  $\text{PSp}(2n, q)$  eingeführt, die nur in gerader Dimension existieren. Für  $n = 1$  gilt  $\text{PSp}(2, q) = \text{PSL}(2, q)$ . Für  $n \geq 2$  erhält man „neue“ einfache Gruppen. Der Beweis benutzt Iwasawas Lemma. Im Unterschied zu  $\text{PSL}(n, q)$  versuchen wir diesmal „koordinatenfrei“ zu argumentieren.

**Definition 7.2.** Sei  $K$  ein Körper und  $V$  ein endlich-dimensionaler  $K$ -Vektorraum. Sei  $\beta: V \times V \rightarrow K$ ,  $(v, w) \mapsto [v, w]$  eine Bilinearform mit folgenden Eigenschaften:

- (nicht-ausgeartet) Für alle  $v \in V \setminus \{0\}$  existiert ein  $w \in V$  mit  $[v, w] \neq 0$ .
- (alternierend) Für alle  $v \in V$  gilt  $[v, v] = 0$ .

Bzgl.  $[\cdot, \cdot]$  nennt man  $V$  einen *symplektischen Raum*. Für  $v \in V$  und  $U \subseteq V$  sei  $v^\perp := \{w \in V : [v, w] = 0\} \leq V$  und  $U^\perp := \bigcap_{u \in U} u^\perp \leq V$ .

**Bemerkung 7.3.** Im Folgenden sei  $V$  stets ein symplektischer Raum. Aus  $[v, v] = 0$  folgt die *Antisymmetrie*  $[u, v] = [u + v, u + v] - [v, u] = -[v, u]$  für  $u, v \in V$ . Für  $\text{char } K \neq 2$  sind die Begriffe „alternierend“ und „antisymmetrisch“ äquivalent, denn  $[v, v] = -[v, v] = 0$ . Für  $\text{char } K = 2$  ist Symmetrie und Antisymmetrie identisch.

**Satz 7.4.** Für  $U \leq V$  gilt  $\dim V = \dim U + \dim U^\perp$  (aber nicht unbedingt  $U \cap U^\perp = 0$ ).

*Beweis.* Wir ergänzen eine Basis  $b_1, \dots, b_k$  von  $U$  zu einer Basis  $b_1, \dots, b_n$  von  $V$ . Bezüglich dieser Basis identifizieren wir  $V$  mit  $K^n$ . Für die Gram-Matrix  $B = ([b_i, b_j])$  von  $\beta$  gilt dann  $[v, w] = vBw^t$  für  $v, w \in V$ . Da  $\beta$  nicht-ausgeartet ist, ist  $B$  invertierbar (alternierend wird für den Beweis nicht benötigt). Die ersten  $k$  Zeilen von  $B$  bilden eine Matrix  $A$  vom Rang  $k = \dim U$ . Nun ist  $U^\perp$  der Lösungsraum des homogenen Gleichungssystems  $Ax = 0$ . Aus der linearen Algebra folgt  $\dim U^\perp = n - k = \dim V - \dim U$ .  $\square$

**Satz 7.5.** Es existiert eine Basis  $b_1, \dots, b_n, c_1, \dots, c_n$  von  $V$  mit  $[b_i, b_j] = 0 = [c_i, c_j]$  und  $[b_i, c_j] = \delta_{ij}$  für  $i, j = 1, \dots, n$ . Insbesondere ist  $\dim V = 2n$  gerade (vgl. GT-Aufgabe 70).

*Beweis.* Induktion nach  $\dim V$ . Sei  $b_1 \in V \setminus \{0\}$ . Da  $\beta$  nicht-ausgeartet ist, existiert  $c_1 \in V$  mit  $[b_1, c_1] \neq 0$ . Nach Skalierung gilt  $[b_1, c_1] = 1$ . Sei nun  $U := \langle b_1, c_1 \rangle$ . Offenbar ist  $U \cap U^\perp = 0$  und Satz 7.4 zeigt  $V = U \oplus U^\perp$ . Für  $u \in U^\perp$  existiert ein  $v \in V$  mit  $[u, v] \neq 0$ . Schreibt man  $v = v_1 + v_2$  mit  $v_1 \in U$  und  $v_2 \in U^\perp$ , so folgt  $[u, v_2] = [u, v] \neq 0$ . Daher ist auch die Einschränkung von  $\beta$  auf  $U^\perp$  nicht-ausgeartet und alternierend. Die Behauptung folgt nun mit Induktion.  $\square$

**Definition 7.6.**

- Man nennt  $(v, w) \in V^2$  mit  $[v, w] = 1$  ein *hyperbolisches Paar*. Eine Basis wie in Satz 7.5 nennt man *symplektisch*.
- Wir nennen

$$\begin{aligned} \text{Sp}(V) &:= \{f \in \text{GL}(V) : [f(v), f(w)] = [v, w]\} \leq \text{GL}(V), \\ \text{PSp}(V) &:= \text{Sp}(V)/\text{Z}(\text{Sp}(V)) \end{aligned}$$

die (projektive) *symplektische Gruppe* von  $V$ .

**Bemerkung 7.7.**

- Die Gram-Matrix von  $\beta$  bzgl. einer symplektischen Basis ist  $B = \begin{pmatrix} 0 & 1_n \\ -1_n & 0 \end{pmatrix}$ . Für  $v, w \in K^{2n}$  bzgl. dieser Basis gilt  $[v, w] = vBw^t$ . Dies zeigt

$$\text{Sp}(2n, K) := \{A \in \text{GL}(2n, K) : A^t B A = B\} \cong \text{Sp}(V).$$

Insbesondere hängt der Isomorphietyp von  $\text{Sp}(V)$  nicht von  $\beta$  ab. Für endliche Körper setzen wir  $\text{Sp}(2n, q) := \text{Sp}(2n, \mathbb{F}_q)$ .

- Für  $A = \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{pmatrix} \in \text{Sp}(2n, K)$  gilt

$$\begin{pmatrix} A_1^t & A_3^t \\ A_2^t & A_4^t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_3 & A_4 \\ -A_1 & -A_2 \end{pmatrix} = A^t B A = B = \begin{pmatrix} 0 & 1_n \\ -1_n & 0 \end{pmatrix},$$

also  $A_1^t A_3 = A_3^t A_1$ ,  $A_2^t A_4 = A_4^t A_2$  und  $A_1^t A_4 = 1_n + A_3^t A_2$ . Für  $n = 1$  sind die ersten beiden Gleichungen trivial und die dritte besagt  $\det(A) = 1$ . Dies zeigt  $\text{Sp}(2, K) = \text{SL}(2, K)$ . Für

beliebiges  $n$  ist  $\begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_1^{-t} \end{pmatrix} \in \mathrm{Sp}(2n, K)$  für alle  $A_1 \in \mathrm{GL}(n, K)$ . Daher ist  $\mathrm{GL}(n, K)$  zu einer Untergruppe von  $\mathrm{Sp}(2n, K)$  isomorph. Für symmetrische  $S \in K^{n \times n}$  gilt auch  $\begin{pmatrix} 1_n & S \\ 0 & 1_n \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1_n & 0 \\ S & 1_n \end{pmatrix} \in \mathrm{Sp}(2n, K)$ .

- (iii) Wir können die Gram-Matrix von  $\beta$  auch in der Form  $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \oplus \dots \oplus \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$  anordnen. Dann folgt  $\mathrm{Sp}(2k, K) \times \mathrm{Sp}(2(n-k), K) \leq \mathrm{Sp}(2n, K)$  für  $0 < k < n$ .

**Lemma 7.8.** Sei  $A \in K^{n \times n}$  mit  $AS = SA$  für alle symmetrischen Matrizen  $S \in K^{n \times n}$ . Dann ist  $A = \lambda 1_n$  für ein  $\lambda \in K$ .

*Beweis.* Für  $S = E_{ii}$  (1 an Position  $(i, i)$ , sonst nur Nullen) liefert  $AE_{ii} = E_{ii}A$ , dass die  $i$ -te Spalte und die  $i$ -te Zeile von  $A$  außerhalb der Diagonale verschwinden. Da dies für  $i = 1, \dots, n$  gilt, ist  $A$  eine Diagonalmatrix. Für  $S = E_{ij} + E_{ji}$  mit  $i \neq j$  folgt aus  $AS = SA$  nun  $A_{ii} = A_{jj}$ . Also ist  $A \in K 1_n$ .  $\square$

**Lemma 7.9.** Es gilt  $Z(\mathrm{Sp}(V)) = \mathrm{Sp}(V) \cap K^\times \mathrm{id} = \langle -\mathrm{id} \rangle$ .

*Beweis.* Wegen  $-\mathrm{id} \in \mathrm{Sp}(V) \cap K^\times \mathrm{id} \subseteq Z(\mathrm{Sp}(V))$  müssen wir nur  $Z(\mathrm{Sp}(2n, K)) \subseteq \langle -1_{2n} \rangle$  zeigen. Für  $n = 1$  ist  $Z(\mathrm{Sp}(2, K)) = Z(\mathrm{SL}(2, K)) = \langle -1_2 \rangle$  (im Fall  $\mathrm{char} K = 2$  ist  $-1_2 = 1_2$ ). Sei also  $n \geq 2$ . Wir schreiben  $A = \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{pmatrix} \in Z(\mathrm{Sp}(2n, K))$  wie in Bemerkung 7.7. Für symmetrische  $S \in K^{n \times n}$  liegen

$$U_S := \begin{pmatrix} 1_n & S \\ 0 & 1_n \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad L_S := \begin{pmatrix} 1_n & 0 \\ S & 1_n \end{pmatrix}$$

in  $\mathrm{Sp}(2n, K)$ . Aus  $AU_S = U_SA$  ergibt sich durch Vergleich der Blöcke  $SA_3 = 0$  und  $A_1S = SA_4$ . Analog liefert  $AL_S = L_SA$  die Gleichungen  $A_2S = 0$  und  $A_4S = SA_1$ . Für  $S = 1_n$  folgt  $A_2 = A_3 = 0$  sowie  $A_1 = A_4$ . Damit gilt  $A_1S = SA_1$  für alle symmetrischen  $S$ . Lemma 7.8 zeigt  $A_1 = A_4 = \lambda 1_n$  mit  $\lambda \in K^\times$ . Wegen  $A_2 = A_3 = 0$  liefert Bemerkung 7.7 schließlich  $1_n = A_1^\dagger A_4 = \lambda^2 1_n$ , also  $\lambda = \pm 1$  und  $A = \pm 1_{2n}$ .  $\square$

**Satz 7.10.** Es gilt

$$\begin{aligned} |\mathrm{Sp}(2n, q)| &= q^{n^2} \prod_{k=1}^n (q^{2k} - 1), \\ |\mathrm{PSp}(2n, q)| &= \frac{1}{\mathrm{ggT}(q-1, 2)} q^{n^2} \prod_{k=1}^n (q^{2k} - 1). \end{aligned}$$

*Beweis.* Nach Lemma 7.9 folgt die zweite Gleichung aus der ersten. Jedes  $f \in \mathrm{Sp}(V)$  bildet eine symplektische Basis auf eine symplektische Basis ab. Umgekehrt kann man dadurch genau ein  $f \in \mathrm{Sp}(V)$  definieren. Daher ist  $|\mathrm{Sp}(V)|$  die Anzahl der symplektischen Basen von  $V$ . Für  $b_1 \in V \setminus \{0\}$  gibt es  $q^{2n} - 1$  Möglichkeiten. Der Vektor  $c_1$  definiert genau eine Nebenklasse  $c_1 + b_1^\perp$ . Also gibt es  $|b_1^\perp| = q^{2n-1}$  Möglichkeiten für  $c_1$ . Im Fall  $n = 1$  ist daher  $|\mathrm{Sp}(2, q)| = q(q^2 - 1)$  wie behauptet. Sei nun  $n \geq 2$  und  $U := \langle b_1, c_1 \rangle$ . Wie in Satz 7.5 ist  $V = U \oplus U^\perp$  und  $b_2, \dots, b_n, c_2, \dots, c_n$  bilden eine symplektische Basis von  $U^\perp$ . Durch Induktion nach  $n$  folgt

$$|\mathrm{Sp}(2n, q)| = q^{2n-1} (q^{2n} - 1) |\mathrm{Sp}(2n-2, q)| = q^{2n-1+(n-1)^2} \prod_{k=1}^n (q^{2k} - 1) = q^{n^2} \prod_{k=1}^n (q^{2k} - 1). \quad \square$$

**Definition 7.11.** Für  $\lambda \in K$  und  $v \in V$  nennt man die lineare Abbildung

$$t_{\lambda,v}: V \rightarrow V, \quad x \mapsto x + \lambda[x, v]v$$

eine (*symplektische*) *Transvektion*.

**Bemerkung 7.12.** Für  $\lambda, \mu \in K$  und  $v, x \in V$  gilt

$$t_{\lambda,v}(t_{\mu,v}(x)) = t_{\lambda,v}(x + \mu[x, v]v) = x + \mu[x, v]v + \lambda[x + \mu[x, v]v, v]v = t_{\lambda+\mu,v}(x).$$

Insbesondere ist  $t_{\lambda,v}$  invertierbar mit  $t_{\lambda,v}^{-1} = t_{-\lambda,v}$ . Wegen

$$[t_{\lambda,v}(x), t_{\lambda,v}(y)] = [x, y] + \lambda[x, v][v, y] + \lambda[y, v][x, v] + \lambda^2[x, v][y, v][v, v] = [x, y]$$

ist  $t_{\lambda,v} \in \text{Sp}(V)$ . Offenbar ist  $v^\perp$  der Fixpunktraum (Eigenraum zum Eigenwert 1) von  $t_{\lambda,v}$ . Für ein hyperbolisches Paar  $(v, w)$  gilt  $t_{\lambda,v}(w) = w - \lambda v \in w + v^\perp$ . Dies zeigt  $\det(t_{\lambda,v}) = 1$ . Für  $g \in \text{Sp}(V)$  gilt

$$(gt_{\lambda,v}g^{-1})(x) = g(g^{-1}(x) + \lambda[g^{-1}(x), v]v) = x + \lambda[x, g(v)]g(v) = t_{\lambda,g(v)}(x).$$

Für  $\mu \in K$  ist

$$t_{\lambda,\mu v}(x) = x + \lambda[x, \mu v]\mu v = x + \lambda\mu^2[x, v]v = t_{\lambda\mu^2,v}(x).$$

**Lemma 7.13.** Die symplektischen Transvektionen erzeugen  $\text{Sp}(V)$ . Insbesondere ist  $\text{Sp}(V) \leq \text{SL}(V)$ .

*Beweis.* Nach Satz 7.10 genügt es zu zeigen, dass  $S := \langle t_{\lambda,v} : \lambda \in K, v \in V \rangle$  transitiv auf der Menge  $\Omega$  aller symplektischen Basen operiert. Seien  $v, w \in V \setminus \{0\}$ . Falls  $\lambda := [v, w] \neq 0$ , so ist

$$t_{\lambda^{-1},v-w}(v) = v + \lambda^{-1}[v, v-w](v-w) = v - (v-w) = w.$$

Anderenfalls wähle  $x \in V \setminus (v^\perp \cup w^\perp)$ . Man kann nun  $v \mapsto x \mapsto w$  durch zwei Transvektionen realisieren. Also ist  $S$  transitiv auf  $V \setminus \{0\}$ .

Seien nun  $u, v, w \in V$  mit  $[u, v] = [u, w] = 1$ . Dann ist  $v - w \in u^\perp$ . Im Fall  $\lambda := [v, w] \neq 0$  gilt  $t_{\lambda^{-1},v-w}(u, v) = (u, w)$ . Anderenfalls setze  $x := u + v$ . Dann ist  $[u, v] = [u, x] = [u, w] = 1$  und  $[v, x] \neq 0 \neq [x, w]$ . Man kann daher  $(u, v) \mapsto (u, x) \mapsto (u, w)$  durch zwei Transvektionen realisieren. Damit ist  $S$  transitiv auf der Menge der hyperbolischen Paare.

Seien schließlich  $b_1, \dots, b_n, c_1, \dots, c_n$  und  $b'_1, \dots, b'_n, c'_1, \dots, c'_n$  symplektische Basen von  $V$ . Nach dem bereits Gezeigten können wir  $(b'_1, c'_1) = (b_1, c_1)$  annehmen. Dann sind

$$b_2, \dots, b_n, c_2, \dots, c_n \quad \text{und} \quad b'_2, \dots, b'_n, c'_2, \dots, c'_n$$

symplektische Basen von  $\langle b_1, c_1 \rangle^\perp$ . Nach Induktion existiert ein Produkt von symplektischen Transvektionen auf  $\langle b_1, c_1 \rangle^\perp$ , dass  $(b_2, \dots, b_n, c_2, \dots, c_n)$  auf  $(b'_2, \dots, b'_n, c'_2, \dots, c'_n)$  abbildet. Für  $x \in \langle b_1, c_1 \rangle^\perp$  werden  $b_1$  und  $c_1$  von  $t_{\lambda,x}$  festgehalten. Die Transvektionen auf  $\langle b_1, c_1 \rangle^\perp$  lassen sich also nach  $V = \langle b_1, c_1 \rangle^\perp \oplus \langle b_1, c_1 \rangle$  fortsetzen, indem man trivial auf  $\langle b_1, c_1 \rangle$  operiert. Also kann man  $b_1, \dots, b_n, c_1, \dots, c_n$  auf  $b'_1, \dots, b'_n, c'_1, \dots, c'_n$  mittels  $S$  abbilden.  $\square$

**Satz 7.14.** Für jeden endlichen Körper  $K$  operiert  $\text{PSp}(V)$  treu und primitiv auf der Menge  $\Omega$  der 1-dimensionalen Unterräume von  $V$ .



*Beweis.* Für  $\mathrm{Sp}(2, K) = \mathrm{SL}(2, K)$  ist die Behauptung bekannt. Sei also  $n \geq 2$  und  $q := |K|$ . Nach GT-Lemma 10.7 operiert  $G := \mathrm{Sp}(V) \leq \mathrm{SL}(V)$  auf  $\Omega$  mit Kern  $\mathrm{Sp}(V) \cap K^\times \mathrm{id} = \langle -\mathrm{id} \rangle$ . Also operiert  $\overline{G} := \mathrm{PSp}(V)$  treu auf  $\Omega$ . Nach dem Beweis von Satz 7.10 operiert  $\overline{G}$  transitiv auf  $\Omega$ . Sei  $U := Ku \in \Omega$  und  $G_U$  der Stabilisator von  $U$  in  $G$ . Sei  $(u, u')$  ein hyperbolisches Paar. Wie im Beweis von Lemma 7.13 operiert  $G_u \subseteq G_U$  transitiv auf  $u' + u^\perp$ . Da jeder Vektor in  $u' + u^\perp$  einen anderen Unterraum aufspannt, hat  $G_U$  eine Bahn der Länge  $\geq q^{2n-1}$  auf  $\Omega$ . Seien  $v, w \in u^\perp \setminus U$ . Im Fall  $[v, w] \neq 0$  kann man wie im Beweis von Lemma 7.13  $(u, v)$  auf  $(u, w)$  abbilden. Sei nun  $[v, w] = 0$ . Wegen

$$(v^\perp)^\perp = \langle v \rangle \neq U = (u^\perp)^\perp \neq (w^\perp)^\perp$$

ist  $v^\perp \neq u^\perp \neq w^\perp$ . Sei  $x \in u^\perp \setminus v^\perp$  und  $y \in u^\perp \setminus w^\perp$ . Im Fall  $u^\perp \subseteq v^\perp \cup w^\perp$  ist  $x \in w^\perp, y \in v^\perp$  und man erhält den Widerspruch  $x + y \in u^\perp \setminus (v^\perp \cup w^\perp)$ . Dies zeigt  $u^\perp \not\subseteq v^\perp \cup w^\perp$ . Sei also  $x \in u^\perp \setminus (v^\perp \cup w^\perp)$ . Man kann nun mit zwei Transvektionen  $(u, v) \mapsto (u, x) \mapsto (u, w)$  realisieren. Also sind  $G_u$  und  $G_U$  transitiv auf  $u^\perp \setminus U$ . Dies liefert eine Bahn der Länge  $\frac{q^{2n-1}-q}{q-1} < q^{2n-1}$ . Wegen

$$|\Omega \setminus \{U\}| = \frac{q^{2n} - q}{q - 1} = \frac{q^{2n-1} - q}{q - 1} + q^{2n-1}$$

hat  $G_U$  zwei Bahnen auf  $\Omega \setminus \{U\}$  mit den Längen  $q^{2n-1}$  und  $\frac{q^{2n-1}-q}{q-1}$ .

Angenommen  $G$  ist imprimitiv auf  $\Omega$  mit Block  $\Delta \ni U$ . Dann muss eine der beiden nicht-trivialen Bahnen von  $G_U$  in  $\Delta$  liegen. Allerdings sind  $q^{2n-1} + 1$  und  $\frac{q^{2n-1}-q}{q-1} + 1 = \frac{q^{2n-1}-1}{q-1}$  keine Teiler von  $|\Omega| = \frac{q^{2n}-1}{q-1} = q^{2n-1} + q^{2n-2} + \dots + 1$ . Dieser Widerspruch zeigt, dass  $G$  und  $\overline{G}$  primitiv operieren.  $\square$

**Lemma 7.15.** Für  $n \geq 2$  und  $(n, q) \neq (2, 2)$  ist  $\mathrm{Sp}(2n, q)$  perfekt.

*Beweis.* Nach Lemma 7.13 genügt es zu zeigen, dass die Transvektionen Kommutatoren sind. Sei zunächst  $q \geq 4$ . Sei  $v \in V \setminus \{0\}$  und  $\lambda \in K^\times$ . Wähle  $\mu \in K^\times \setminus \{\pm 1\}$  und setze  $\alpha := \lambda(1 - \mu^2)^{-1}$ . Bekanntlich existiert  $g \in \mathrm{Sp}(V)$  mit  $g(v) = \mu v$ . Nach Bemerkung 7.12 gilt

$$\mathrm{Sp}(V)' \ni [t_{\alpha, v}, g] = t_{\alpha, v} g t_{-\alpha, v} g^{-1} = t_{\alpha, v} t_{-\alpha, g(v)} = t_{\alpha, v} t_{-\alpha \mu^2, v} = t_{\alpha(1-\mu^2), v} = t_{\lambda, v}.$$

Sei nun  $q = 3$  und  $b_1, \dots, b_n, c_1, \dots, c_n$  eine symplektische Basis von  $V$ . Wir definieren  $g, h \in \mathrm{Sp}(V)$  durch

$$\begin{aligned} g(b_1) &:= b_1 + b_2, & g(c_1) &:= c_2, & g(b_2) &:= b_1, & g(c_2) &:= c_1 - c_2, \\ h(b_1) &:= b_1 - c_1 + c_2, & h(c_1) &:= c_1, & h(b_2) &:= b_2 + c_1, & h(c_2) &:= c_2 \end{aligned}$$

und  $g(b_i) = h(b_i) = b_i$  sowie  $g(c_i) = h(c_i) = c_i$  für  $i \geq 3$ . Es gilt

$$\begin{aligned} [g, h](b_1) &= ghg^{-1}(b_1 + c_1 - c_2) = gh(b_2 + c_2) = g(b_2 + c_1 + c_2) = b_1 + c_1, \\ [g, h](c_1) &= ghg^{-1}(c_1) = gh(c_1 + c_2) = g(c_1 + c_2) = c_1, \\ [g, h](b_2) &= ghg^{-1}(b_2 - c_1) = gh(b_1 - b_2 - c_1 - c_2) = g(b_1 - b_2) = b_2, \\ [g, h](c_2) &= ghg^{-1}(c_2) = gh(c_1) = g(c_1) = c_2, \end{aligned}$$

d. h.  $t_{1, c_1} = [g, h] \in \mathrm{Sp}(V)'$  und  $t_{-1, c_1} = t_{1, c_1}^{-1} \in \mathrm{Sp}(V)'$ . Da  $c_1$  beliebig ist, folgt die Behauptung.

Schließlich sei  $q = 2$  und  $n \geq 3$ . Diesmal definieren wir

$$\begin{aligned} g(b_1) &:= b_1 + b_3, & g(c_1) &:= c_3, & g(b_2) &:= b_1, & g(c_2) &:= c_1 + c_3, \\ g(b_3) &:= b_2, & g(c_3) &:= c_2, & h(b_1) &:= b_1 + c_2, & h(c_1) &:= c_1, \\ h(b_2) &:= b_2 + c_1 + c_2 + c_3, & h(c_2) &:= c_2, & h(b_3) &:= b_3 + c_2 + c_3, & h(c_3) &:= c_3 \end{aligned}$$

und  $g(b_i) = h(b_i) = b_i$  sowie  $g(c_i) = h(c_i) = c_i$  für  $i \geq 4$ . Es gilt

$$\begin{aligned} [g, h](b_1) &= ghg^{-1}(b_1 + c_2) = gh(b_2 + c_3) = g(b_2 + c_1 + c_2) = b_1 + c_1, \\ [g, h](c_1) &= ghg^{-1}(c_1) = gh(c_1 + c_2) = g(c_1 + c_2) = c_1, \\ [g, h](b_2) &= ghg^{-1}(b_2 + c_1 + c_2 + c_3) = gh(b_3 + c_2 + c_3) = g(b_3) = b_2, \\ [g, h](c_2) &= ghg^{-1}(c_2) = gh(c_3) = g(c_3) = c_2, \\ [g, h](b_3) &= ghg^{-1}(b_3 + c_2 + c_3) = gh(b_1 + b_2 + c_1 + c_3) = g(b_1 + b_2) = b_3, \\ [g, h](c_3) &= ghg^{-1}(c_3) = gh(c_1) = g(c_1) = c_3, \end{aligned}$$

d. h.  $t_{1, c_1} = [g, h] \in \mathrm{Sp}(V)'$ . Dies zeigt die Behauptung.  $\square$

**Satz 7.16.** *Es gilt  $\mathrm{Sp}(4, 2) \cong S_6$ . Insbesondere ist  $\mathrm{Sp}(4, 2) = \mathrm{PSp}(4, 2)$  nicht perfekt.*

*Beweis.* Sei  $V := \{x \in \mathbb{F}_2^6 : \sum_{i=1}^6 x_i = 0\} \leq \mathbb{F}_2^6$  und  $U := \langle (1, \dots, 1) \rangle \leq V$ . Die symmetrische Gruppe  $S_6$  operiert durch Permutation der Koordinaten treu auf  $V/U \cong \mathbb{F}_2^4$ . Das „Standardskalarprodukt“

$$[v + U, w + U] := \sum_{i=1}^6 v_i w_i$$

ist eine wohldefinierte alternierende Bilinearform auf  $V/U$ . Sei  $v + U \neq 0$ , o. B. d. A.  $v_1 = v_2 = 1$  und  $v_3 = 0$ . Dann ist  $w + U := (0, 1, 1, 0, 0, 0) + U \in V/U$  mit  $[v + U, w + U] \neq 0$ . Also ist die Bilinearform nicht-ausgeartet. Für  $\sigma \in S_6$  gilt schließlich  $[\sigma(v) + U, \sigma(w) + U] = [v + U, w + U]$ . Dies zeigt  $S_6 \leq \mathrm{Sp}(4, 2)$ . Nach Satz 7.10 ist andererseits  $|\mathrm{Sp}(4, 2)| = 2^4(2^2 - 1)(2^4 - 1) = 720 = |S_6|$ .  $\square$

**Satz 7.17.** *Für  $n \geq 2$  und  $(n, q) \neq (2, 2)$  ist  $\mathrm{PSp}(2n, q)$  einfach.*

*Beweis.* Nach den vorherigen Sätzen ist  $G := \mathrm{PSp}(2n, q)$  perfekt und primitiv auf der Menge der 1-dimensionalen Unterräume von  $V$ . Sei  $U := \langle u \rangle \leq V$  mit  $u \neq 0$  und  $A := \{\pm t_{\lambda, u} : \lambda \in K\} \leq G_U$ . Offenbar ist  $A$  abelsch und normal in  $G_U$ . Außerdem ist jede Transvektion in  $\mathrm{Sp}(V)$  zu  $t_{\lambda, u}$  mit einem  $\lambda \in K$  konjugiert. Aus Lemma 7.13 folgt  $\langle gAg^{-1} : g \in G \rangle = G$ . Nach Iwasawas Lemma aus der Gruppentheorie ist  $G$  einfach.  $\square$

**Bemerkung 7.18.** Eine weitere Familie von einfachen Gruppen vom Lie-Typ lässt sich durch Untergruppen von  $\mathrm{Sp}(4, q)$  mit  $q = 2^{2n+1}$  und  $n \in \mathbb{N}$  konstruieren: Sei  $e_1, e_2, e_3, e_4$  eine symplektische Basis auf  $V = \mathbb{F}_q^4$  mit  $[e_1, e_3] = 1 = [e_2, e_4]$ . Wir definieren eine kommutative Multiplikation auf  $V$  durch

$$e_i * e_j := \begin{cases} e_1 & \text{falls } \{i, j\} = \{2, 3\}, \\ e_2 & \text{falls } \{i, j\} = \{1, 2\}, \\ e_3 & \text{falls } \{i, j\} = \{1, 4\}, \\ e_4 & \text{falls } \{i, j\} = \{3, 4\}, \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

$$\left( \sum_{i=1}^4 \lambda_i e_i \right) * \left( \sum_{i=1}^4 \mu_i e_i \right) := \sum_{i,j=1}^4 (\lambda_i \mu_j)^{2^n} e_i * e_j$$

für  $\lambda_i, \mu_j \in \mathbb{F}_q$ . Sei  $U := \{(u, v) \in V^2 : [u, v] = 0\}$  und

$$\mathrm{Sz}(q) := \{f \in \mathrm{Sp}(V) : \forall (u, v) \in U : f(u) * f(v) = u * v\} \leq \mathrm{Sp}(V).$$

Man nennt  $Sz(q)$  die *Suzuki-Gruppe* über  $\mathbb{F}_q$ . Sie ist einfach mit Ordnung

$$|Sz(q)| = q^2(q^2 + 1)(q - 1) \equiv -1 \pmod{3}.$$

Die Suzuki-Gruppen sind die einzigen nicht-abelschen einfachen Gruppen, deren Ordnung nicht durch 3 teilbar ist. Wegen  $q^2 + 1 \equiv 16^n \cdot 4 + 1 \equiv 0 \pmod{5}$  ist die Ordnung jeder nicht-abelschen einfachen Gruppe durch 3 oder 5 teilbar (sogar durch 12 oder  $2^6 \cdot 5$  nach Feit-Thompson). Die Untergruppenstruktur und die Charaktertafel von  $Sz(q)$  ist ähnlich wie bei  $PSL(2, q)$  sehr übersichtlich (die Sylowgruppen zu ungeraden Primzahlen sind zyklisch, vgl. GT-Satz 10.13). Suzuki hat auch eine sporadische Gruppe der Ordnung 448.345.497.600 entdeckt.

## 8 Unitäre Gruppen

**Bemerkung 8.1.** Nach den linearen und symplektischen Gruppen behandeln wir in diesem Abschnitt eine dritte Familie von (einfachen) Gruppen vom Lie-Typ.

**Definition 8.2.** Sei  $q \neq 1$  eine Primzahlpotenz,  $K = \mathbb{F}_{q^2}$  und  $V$  ein endlich-dimensionaler  $K$ -Vektorraum. Sei  $\text{Gal}(K|\mathbb{F}_q) = \langle \alpha \rangle \cong C_2$  mit  $\bar{x} := \alpha(x) = x^q$  für  $x \in K$  (vgl. komplexe Konjugation). Sei  $V \times V \rightarrow K$ ,  $(v, w) \mapsto [v, w]$  eine nicht-ausgeartete Sesquilinearform, d. h. für  $u, v, w \in V$  und  $\lambda \in K$  gilt

$$\begin{aligned} \forall u \neq 0 \exists v : [u, v] &\neq 0, \\ [u + \lambda v, w] &= [u, w] + \lambda[v, w], \\ [u, v] &= \overline{[v, u]}. \end{aligned}$$

Bzgl.  $[\cdot, \cdot]$  nennt man  $V$  einen *unitären Raum*.

**Bemerkung 8.3.**

- (i) Im Folgenden sei  $V$  stets ein unitärer Raum.
- (ii) Für  $u, v, w \in V$  und  $\lambda \in K$  gilt

$$[u, v + \lambda w] = \overline{[v + \lambda w, u]} = \overline{[v, u]} + \overline{\lambda[w, u]} = [u, v] + \bar{\lambda}[u, w].$$

- (iii) Für  $K^\times = \langle \zeta \rangle$  gilt  $\zeta \bar{\zeta} = \zeta^{q+1} \in \mathbb{F}_q$ . Daher ist die *Norm*  $N: K \rightarrow \mathbb{F}_q$ ,  $x \mapsto x\bar{x}$  surjektiv. Sei  $x \in K$  im Kern der *Spur*  $S: K \rightarrow \mathbb{F}_q$ ,  $y \mapsto y + \bar{y}$ . Dann gilt  $x = -x^q$  und es folgt  $x = 0$  oder  $x^{q-1} = -1$ . Dies zeigt  $|\text{Ker}(S)| \leq q$ . Als lineare Abbildung muss  $S$  nach dem Homomorphiesatz ebenfalls surjektiv sein. Für  $v \in V$  gilt  $[v, v] = \overline{[v, v]} \in \mathbb{F}_q$ . Im Fall  $[v, v] \neq 0$  existiert ein  $\lambda \in K$  mit  $[\lambda v, \lambda v] = 1$ , d. h.  $v$  lässt sich *normieren*. Im Gegensatz zu  $K = \mathbb{C}$  gibt es Vektoren  $v \neq 0$  mit  $[v, v] = 0$  (siehe Lemma 8.10).
- (iv) Wie üblich definiert man  $v^\perp$  und  $S^\perp \leq V$  für  $v \in V$  und  $S \subseteq V$ . Wie in Satz 7.4 zeigt man  $\dim U + \dim U^\perp = \dim V$  für alle Unterräume  $U \leq V$ . Daraus folgen die üblichen Regeln:

$$(U^\perp)^\perp = U, \quad U \subseteq W \iff W^\perp \subseteq U^\perp, \quad (U + W)^\perp = U^\perp \cap W^\perp.$$

Gilt  $V = U \oplus U^\perp$ , so ist die Einschränkung von  $[\cdot, \cdot]$  auf  $U$  nicht-ausgeartet. Daher ist  $U$  ein unitärer Raum. Dies werden wir häufig für Induktion nach  $\dim V$  benutzen.

**Satz 8.4.** Jeder unitäre Raum  $V$  besitzt eine Orthonormalbasis  $b_1, \dots, b_n$ , d. h. es gilt  $[b_i, b_j] = \delta_{ij}$ .

*Beweis.* Sei  $v \in V \setminus \{0\}$ . Da  $[\cdot, \cdot]$  nicht-ausgeartet ist, existiert ein  $w \in V$  mit  $[v, w] \neq 0$ . Nach Skalierung können wir  $[v, w] + [w, v] \neq 0$  annehmen (für  $\text{char } K \neq 2$  kann man  $[v, w] = 1$  wählen). Im Fall  $[v, v] = 0 = [w, w]$  gilt  $[v + w, v + w] \neq 0$ . In jedem Fall findet man ein  $b_1 \in V$  mit  $[b_1, b_1] \neq 0$ . Nach Normierung ist  $[b_1, b_1] = 1$ . Im Fall  $n = 1$  sind wir fertig. Sei also  $n \geq 2$  und  $U := b_1^\perp$ . Offenbar gilt  $V = \langle b_1 \rangle \oplus U$ . Nach Bemerkung 8.3 ist  $U$  ein unitärer Raum der Dimension  $n - 1$ . Durch Induktion nach  $n$  können wir annehmen, dass  $U$  eine Orthonormalbasis  $b_2, \dots, b_n$  besitzt. Offenbar ist nun  $b_1, \dots, b_n$  eine Orthonormalbasis von  $V$ .  $\square$

**Beispiel 8.5.** Wie über  $\mathbb{C}$  sieht man, dass  $V = K^n$  bzgl. des Standardskalarprodukts

$$[v, w] := v_1 \overline{w_1} + \dots + v_n \overline{w_n} \quad (v, w \in V)$$

ein unitärer Raum ist. Die Standardbasis  $e_1, \dots, e_n$  ist eine Orthonormalbasis von  $V$ . Nach Satz 8.4 können wir uns im Folgenden oft auf diesen speziellen Raum beschränken.

**Definition 8.6.** Eine lineare Abbildung zwischen unitären Räumen  $f: V \rightarrow W$  heißt *Isometrie*, falls  $[f(u), f(v)]_W = [u, v]_V$  für alle  $u, v \in V$  gilt. Man definiert die Gruppen

$$\begin{aligned} \text{GU}(V) &:= \{f \in \text{GL}(V) : \forall v, w \in V : [f(v), f(w)] = [v, w]\} && (\text{allgemeine unitäre Gruppe}), \\ \text{SU}(V) &:= \text{GU}(V) \cap \text{SL}(V) && (\text{spezielle unitäre Gruppe}), \\ \text{PSU}(V) &:= \text{SU}(V)/\text{Z}(\text{SU}(V)) && (\text{projektive spezielle unitäre Gruppe}). \end{aligned}$$

**Bemerkung 8.7.** Da  $[\cdot, \cdot]$  nicht-ausgeartet ist, ist jede Isometrie injektiv. Sei  $f \in \text{GL}(V)$  mit Matrix  $A \in \text{GL}(n, K)$  bzgl. der Standardbasis. Für  $v, w \in V$  gilt  $[f(v), f(w)] = [Av, Aw] = v^t A^t \overline{A} w$ . Durch Einsetzen der Standardbasis sieht man

$$\forall v, w \in V : [f(v), f(w)] = [v, w] \iff A^t \overline{A} = 1_n.$$

Auf diese Weise erhält man die Matrixgruppen

$$\begin{aligned} \text{GU}(n, q) &:= \{A \in \text{GL}(n, q^2) : A^t \overline{A} = 1_n\},^{15} \\ \text{SU}(n, q) &:= \text{GU}(n, q) \cap \text{SL}(n, q^2), \\ \text{PSU}(n, q) &:= \text{SU}(n, q)/\text{Z}(\text{SU}(n, q)). \end{aligned}$$

**Beispiel 8.8.** Für jede Permutationsmatrix  $P \in \text{GL}(n, q^2)$  gilt  $P^t \overline{P} = P^{-1} P = 1_n$ , d. h.  $P \in \text{GU}(n, q)$ . Daher besitzt  $\text{GU}(n, q)$  (bzw.  $\text{SU}(n, q)$ ) eine zu  $S_n$  (bzw.  $A_n$ ) isomorphe Untergruppe.

**Lemma 8.9.** Es gilt  $\text{C}_{\text{GL}(V)}(\text{SU}(V)) = K^\times \text{id}_V$ .

*Beweis.* O. B. d. A. sei  $V = K^n$  mit  $n \geq 2$ . Sei  $K^\times = \langle \zeta \rangle$ . Wegen  $\zeta^{q-1} \overline{\zeta^{q-1}} = \zeta^{q-1+q^2-q} = \zeta^{q^2-1} = 1$  ist  $D := \text{diag}(\zeta^{q-1}, \zeta^{1-q}, 1, \dots, 1) \in \text{SU}(n, q) \setminus \{1_n\}$  (auch für  $q = 2$ ). Es folgt

$$\text{C}_{\text{GL}(V)}(\text{SU}(V)) \subseteq \text{C}_{\text{GL}(V)}(D) = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & A \end{pmatrix} : a, b \in K^\times, A \in \text{GL}(n-2, K) \right\}.$$

<sup>15</sup>Achtung: GAP benutzt standardmäßig eine andere Basis. Man muss explizit die hermitesche Form angeben:  $\text{GU}(n, q, \text{IdentityMat}(n) * \text{Z}(q)^0)$ .

Durch Permutation der Koordinaten erhält man, dass  $C_{GL(V)}(SU(V))$  aus Diagonalmatrizen besteht. Wegen

$$\begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & (-1)^{n-1} \\ 1 & \ddots & & 0 \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & 1 & 0 \end{pmatrix} \in SU(n, q)$$

können nur Skalarmatrizen  $SU(V)$  zentralisieren. Umgekehrt gilt natürlich  $K^\times \text{id}_V \leq Z(GL(V))$ .  $\square$

**Lemma 8.10.** Für  $\lambda \in \mathbb{F}_q$  sei  $V_\lambda := \{v \in V : [v, v] = \lambda\}$ . Dann gilt

$$\begin{aligned} z_n &:= |V_0| = q^{2n-1} + (-1)^n q^{n-1}(q-1), \\ w_n &:= |V_1| = q^{n-1}(q^n - (-1)^n). \end{aligned}$$

*Beweis.* O.B.d.A. sei  $V = K^n$  bzgl. des Standardskalarprodukts.

- (i) Für  $n = 1$  ist  $V_0 = \{0\}$  und  $z_1 = 1 = q - (q-1)$  wie behauptet. Sei  $n \geq 1$  und  $v = (v', v_n) \in K^{n+1}$  mit  $v' \in K^n$  und  $[v, v] = 0$ . Im Fall  $[v', v'] = 0$  ist auch  $v_n = 0$ . Dafür gibt es  $z_n$  Möglichkeiten. Sei nun  $[v', v'] \neq 0$  und  $K^\times = \langle \zeta \rangle$ . Sei  $a \in \mathbb{Z}$  mit  $-[v', v'] = \zeta^{a(q+1)}$ . Aus

$$v_n^{q+1} = v_n \overline{v_n} = [v, v] - [v', v'] = -[v', v']$$

folgt  $v_n \in \zeta^a \langle \zeta^{q-1} \rangle$ . Es existieren genau  $|\langle \zeta^{q-1} \rangle| = q+1$  Elemente mit dieser Eigenschaft. Dies zeigt

$$z_{n+1} = z_n + (q^{2n} - z_n)(q+1) = q^{2n+1} + q^{2n} - qz_n.$$

Die Behauptung folgt mit Induktion.

- (ii) Für  $\lambda \neq 0$  ist  $V_\lambda \rightarrow V_{\lambda\zeta^{q+1}}$ ,  $v \mapsto \zeta v$  eine Bijektion. Mit (i) folgt

$$w_n = |V_1| = \frac{q^{2n} - z_n}{q-1} = q^{2n-1} - (-1)^n q^{n-1} = q^{n-1}(q^n - (-1)^n). \quad \square$$

**Satz 8.11.** Es gilt

$$\begin{aligned} |GU(n, q)| &= q^{n(n-1)/2} \prod_{k=1}^n (q^k - (-1)^k), \\ |SU(n, q)| &= q^{n(n-1)/2} \prod_{k=2}^n (q^k - (-1)^k), \\ |PSU(n, q)| &= \frac{q^{n(n-1)/2}}{\text{ggT}(n, q+1)} \prod_{k=2}^n (q^k - (-1)^k). \end{aligned}$$

*Beweis.* Genau dann gilt  $A \in GU(n, q)$ , wenn die Zeilen von  $A$  eine Orthonormalbasis von  $V$  bzgl.  $[\cdot, \cdot]$  bilden. Für die erste Zeile  $a_1$  von  $A$  gibt es nach Lemma 8.10 genau  $w_n$  Möglichkeiten. Die zweite Zeile  $a_2$  liegt in  $U := a_1^\perp$ . Wegen  $V = \langle a_1 \rangle \oplus U$  ist  $U$  ein unitärer Raum der Dimension  $n-1$ . Daher gibt es  $w_{n-1}$  Möglichkeiten für  $a_2$  usw. Dies zeigt

$$|GU(n, q)| = w_1 \dots w_n = \prod_{k=1}^n q^{k-1} (q^k - (-1)^k) = q^{n(n-1)/2} \prod_{k=1}^n (q^k - (-1)^k).$$

Für  $A \in \text{GU}(n, q)$  gilt  $\det(A)^{q+1} = \det(A)\overline{\det(A)} = \det(A^t \bar{A}) = 1$ . Wegen  $\text{diag}(\zeta^{q-1}, 1, \dots, 1) \in \text{GU}(n, q)$  ist  $\det: \text{GU}(n, q) \rightarrow \langle \zeta^{q-1} \rangle$  surjektiv mit Kern  $\text{SU}(n, q)$ . Daraus folgt die Formel für  $|\text{SU}(n, q)|$ . Nach Lemma 8.9 ist

$$\text{Z}(\text{SU}(n, q)) = \text{SU}(n, q) \cap K^\times 1_n = \text{SU}(n, q) \cap \langle \zeta^{q-1} \rangle.$$

Für  $\zeta^{a(q-1)} 1_n \in \text{Z}(\text{SU}(n, q))$  mit  $0 \leq a \leq q$  gilt  $\zeta^{a(q-1)n} = 1$ . Also ist  $a \equiv 0 \pmod{(q+1)/\text{ggT}(n, q+1)}$  und  $|\text{Z}(\text{SU}(n, q))| = \text{ggT}(n, q+1)$ . Daraus folgt die Formel für  $|\text{PSU}(n, q)|$ .  $\square$

**Lemma 8.12.** *Es gilt  $\text{SU}(2, q) \cong \text{SL}(2, q)$  und  $\text{PSU}(2, q) \cong \text{PSL}(2, q)$ .*

*Beweis.* Wir konstruieren zunächst eine Basis  $\{u, v\} \subseteq V_0$  von  $V = K^2$  mit  $[u, v] = -[v, u]$ . Sei dafür  $\mu \in K \setminus \{1\}$  mit  $\mu^{q+1} = \mu\bar{\mu} = -1$ . Für  $2 \nmid q$  setzen wir  $u := (1, \mu)$ ,  $v := (\mu, 1)$  und für  $2 \mid q$  sei  $u := (1, 1)$ ,  $v := (1, \mu)$ . In beiden Fällen sind  $u$  und  $v$  linear unabhängig mit  $[u, u] = [v, v] = 0$ . Nach Bemerkung 8.3 folgt  $[u, v] \neq 0$ . Nach Normierung von  $v$  erhält man  $[u, v] = 1$ . Für  $2 \mid q$  ist dann  $[u, v] = [\bar{v}, \bar{u}] = [v, u] = -[v, u]$ . Für  $2 \nmid q$  existiert  $\tau \in K$  mit  $\tau^{q-1} = -1$ , d. h.  $\bar{\tau} = -\tau$ . Indem wir  $u$  durch  $\tau u$  ersetzen, erhalten wir  $[u, v] = -[v, u]$  wie gewünscht.

Sei  $A \in \text{SU}(2, q)$  und  $Au = au + cv$ ,  $Av = bu + dv$  mit  $a, b, c, d \in K$ . Dann gilt

$$\begin{aligned} a\bar{c} - \bar{a}c &= \frac{[Au, Au]}{[u, v]} = 0 = \frac{[Av, Av]}{[u, v]} = b\bar{d} - \bar{b}d, \\ a\bar{d} - \bar{c}b &= \frac{[Au, Av]}{[u, v]} = 1 = d\bar{a} - b\bar{c}, \\ ad - bc &= \det A = 1. \end{aligned}$$

Es folgt

$$\begin{aligned} \bar{c} + bc\bar{c} &= (1 + bc)\bar{c} = a\bar{d}c = d\bar{a}c = (1 + b\bar{c})c = c + bc\bar{c}, \\ b + b\bar{b}c &= b(1 + \bar{c}b) = ba\bar{d} = ad\bar{b} = (1 + bc)\bar{b} = \bar{b} + b\bar{b}c \end{aligned}$$

und  $b, c \in \mathbb{F}_q$ . Im Fall  $b \neq 0$  ergibt sich  $d = \bar{d} \in \mathbb{F}_q$ . Anderenfalls ist  $a \neq 0$  und  $ad = 1 = a\bar{d}$ . Wieder gilt  $d \in \mathbb{F}_q$ . Analog erhält man  $a \in \mathbb{F}_q$ . Die Basistransformation  $\{(1, 0), (0, 1)\} \mapsto \{u, v\}$  liefert also einen Monomorphismus  $\varphi: \text{SU}(2, q) \rightarrow \text{SL}(2, q)$ . Nach Satz 8.11 ist  $|\text{SU}(2, q)| = q(q^2 - 1) = |\text{SL}(2, q)|$ . Also ist  $\varphi$  ein Isomorphismus.  $\square$

**Beispiel 8.13.** Offensichtlich ist  $\text{GU}(1, q) \cong C_{q+1}$  und  $\text{SU}(1, q) = 1$ . Nach Lemma 8.12 gilt  $\text{PSU}(2, 2) \cong \text{SU}(2, 2) \cong \text{SL}(2, 2) \cong S_3$  und  $\text{PSU}(2, 3) \cong \text{PSL}(2, 3) \cong A_4$ . Nach Satz 8.11 gilt

$$\begin{aligned} |\text{GU}(3, 2)| &= 2^3(2+1)(2^2-1)(2^3+1) = 8 \cdot 81 = 648, \\ |\text{SU}(3, 2)| &= 216, \\ |\text{PSU}(3, 2)| &= 72. \end{aligned}$$

Insbesondere sind diese Gruppen auflösbar. Genauer gilt  $\text{PSU}(3, 2) \cong M_9 \cong C_3^2 \rtimes Q_8$  (Aufgabe 28). Der folgende GAP-Code zeigt  $\text{PSU}(4, 2) \cong \text{SU}(4, 2) \cong \text{PSp}(4, 3)$ :

```
G:=SU(4,2);
H:=PSp(4,3);
IsomorphismGroups(G,H);
```

**Bemerkung 8.14.** Wie im Beweis von Lemma 8.12 zeigt man, dass jeder unitäre Raum  $V$  der Dimension  $\geq 2$  ein hyperbolisches Paar  $(u, v)$  besitzt, d. h.  $u, v \in V_0$  und  $[u, v] = 1$  (Definition 7.6).

**Satz 8.15** (WITT). *Sei  $V$  ein unitärer Raum,  $U \leq V$  und  $\sigma: U \rightarrow V$  eine Isometrie. Dann existiert ein  $\tau \in \text{GU}(V)$  mit  $\tau|_U = \sigma$ .*

*Beweis.* Induktion nach  $\dim U$ . O. B. d. A. sei  $U \neq 0$ . Sei  $W \leq U$  mit  $\dim(U/W) = 1$ . Nach Induktion existiert ein  $\tau \in \text{GU}(V)$  mit  $\tau|_W = \sigma|_W$ . Indem wir  $\sigma$  durch  $\tau|_U^{-1}\sigma$  ersetzen, können wir  $\sigma|_W = \text{id}_W$  annehmen. O. B. d. A. sei  $\sigma \neq \text{id}_U$ . Dann ist  $R := (\sigma - \text{id}_U)(U) \leq V$  1-dimensional. Für  $u, v \in U$  gilt

$$[\sigma(u), \sigma(v) - v] = [\sigma(u), \sigma(v)] - [\sigma(u), v] = [u, v] - [\sigma(u), v] = [u - \sigma(u), v]. \quad (8.1)$$

Dies zeigt  $W \subseteq R^\perp$ .

**Fall 1:**  $U \not\subseteq R^\perp$ .

Sei  $R^\perp = W \oplus Y$ . Aus Dimensionsgründen gilt  $V = U + R^\perp = U + W + Y = U \oplus Y$ . Für  $u \in U$  und  $y \in Y$  ist  $[\sigma(u) - u, y] = 0$ , d. h.  $[\sigma(u), y] = [u, y]$ . Daraus folgt leicht, dass die Abbildung  $V \rightarrow V$ ,  $u + y \mapsto \sigma(u) + y$  eine unitäre Fortsetzung von  $\sigma$  ist.

**Fall 2:**  $U \subseteq R^\perp$ .

Aus (8.1) folgt  $\sigma(U) \subseteq R^\perp$ . Angenommen  $\sigma(U) \neq U$ . Dann ist  $W = \sigma(W) = U \cap \sigma(U)$ . Wähle  $u \in U \setminus W$  und  $v \in \sigma(U) \setminus W$ . Für  $U_0 := \langle u + v \rangle$  gilt

$$U + \sigma(U) = U \oplus U_0 = \sigma(U) \oplus U_0.$$

Sei  $R^\perp = (U + \sigma(U)) \oplus Y$  und  $S := U_0 + Y$ . Dann gilt  $R^\perp = U \oplus S = \sigma(U) \oplus S$ . Im Fall  $\sigma(U) = U$  kann man ein beliebiges Komplement  $S$  von  $U$  in  $R^\perp$  wählen. In beiden Fällen zeigt (8.1), dass

$$R^\perp \rightarrow R^\perp, \quad u + s \mapsto \sigma(u) + s$$

für  $u \in U$  und  $s \in S$  eine Isometrie ist. Wir können daher  $U = R^\perp = \sigma(U)$  annehmen. Sei  $R = \langle x \rangle \subseteq U$ . Dann gilt  $[x, x] = 0$ . Sei  $v \in V \setminus R^\perp$ . Dann ist  $T := \langle x, v \rangle$  ein unitärer Raum. Wir können  $v$  durch ein geeignetes Element in  $T$  ersetzen, sodass  $(x, v)$  ein hyperbolisches Paar ist (Bemerkung 8.14). Wegen  $T^\perp \subseteq x^\perp = R^\perp = U$  ist

$$U = \langle x \rangle \oplus T^\perp = \langle \sigma(x) \rangle \oplus \sigma(T^\perp).$$

Es folgt  $\dim(\langle v \rangle + \sigma(T^\perp)) = \dim(V) - 1$ . Wähle  $w \in V$  mit  $\langle v \rangle + \sigma(T^\perp) = w^\perp$ . Wegen  $\langle v \rangle + \langle \sigma(x) \rangle + \sigma(T^\perp) = \langle v \rangle + U = V$  ist  $\sigma(x) \notin w^\perp$ . Daraus ergibt sich  $w \notin U$ , denn  $U = \sigma(U) = \sigma(x^\perp) = \sigma(x)^\perp$ . Da  $\langle \sigma(x), w \rangle$  ein unitärer Raum ist, können wir  $w$  abändern, sodass  $(\sigma(x), w)$  ein hyperbolisches Paar ist. Anschließend gilt weiterhin  $\sigma(T^\perp) \subseteq \langle \sigma(x), w \rangle^\perp$ .

Wir definieren die lineare Abbildung  $\tau: V \rightarrow V$ ,  $u + \lambda v \mapsto \sigma(u) + \lambda w$  für  $u \in U$  und  $\lambda \in K$ . Wegen

$$[x, v] = 1 = [\sigma(x), w], \quad [y, v] = 0 = [\sigma(y), w], \quad [v, v] = 0 = [w, w]$$

für alle  $y \in T^\perp$  ist  $\tau \in \text{GU}(V)$  eine Fortsetzung von  $\sigma$ . □

**Lemma 8.16.** *Sei  $V$  ein unitärer Raum und  $v, w \in V$  linear unabhängig mit  $[v, v] = [w, w] = 1$ . Genau dann gilt  $V = \langle v, w \rangle \oplus \langle v, w \rangle^\perp$ , wenn  $[v, w][w, v] \neq 1$ .*

*Beweis.* Sei  $\lambda := [v, w]$ . Seien  $a, b \in K$  mit  $u := av + bw \in \langle v, w \rangle^\perp$ . Dann gilt  $0 = [u, v] = a + b\bar{\lambda}$  und  $0 = [u, w] = a\lambda + b$ . Es folgt  $a = -b\bar{\lambda} = a\lambda\bar{\lambda}$ . Dies zeigt  $u = 0$  oder  $\lambda\bar{\lambda} = 1$ . Gilt umgekehrt  $\lambda\bar{\lambda} = 1$ , so ist  $v - \lambda w \in \langle v, w \rangle^\perp$ . □

**Definition 8.17.** Sei  $v \in V_0$  und  $\lambda \in K$  mit  $\lambda + \bar{\lambda} = 0$ . Man nennt die lineare Abbildung

$$t_{\lambda,v}: V \rightarrow V, \quad x \mapsto x + \lambda[x, v]v$$

eine (*unitäre*) *Transvektion*.

**Bemerkung 8.18.** Für  $v, x \in V$  und  $\lambda, \mu \in K$  gilt

$$t_{\lambda,v}(t_{\mu,v}(x)) = t_{\lambda,v}(x + \mu[x, v]v) = x + \mu[x, v]v + \lambda[x + \mu[x, v]v, v]v = t_{\lambda+\mu,v}(x).$$

Insbesondere ist  $t_{\lambda,v}$  invertierbar mit  $t_{\lambda,v}^{-1} = t_{-\lambda,v}$ . Für  $p := \text{char } K$  ist außerdem  $t_{\lambda,v}^p = t_{p\lambda,v} = t_{0,v} = \text{id}_V$ . Aus  $\lambda + \bar{\lambda} = 0$  folgt

$$[t_{\lambda,v}(x), t_{\lambda,v}(y)] = [x, y] + \lambda[x, v][v, y] + \bar{\lambda}[y, v][x, v] = [x, y]$$

und  $t_{\lambda,v} \in \text{GU}(V)$ . Wie im Beweis von Satz 8.11 ist  $\det(t_{\lambda,v})^{q+1} = 1$ . Andererseits ist  $\det(t_{\lambda,v})^p = \det(t_{\lambda,v}^p) = \det(\text{id}_V) = 1$ . Dies zeigt  $t_{\lambda,v} \in \text{SU}(V)$ . Für  $g \in \text{GU}(V)$  gilt  $gt_{\lambda,v}g^{-1} = t_{\lambda,g(v)}$  wie in Bemerkung 7.12. Für  $\mu \in K^\times$  ist

$$t_{\lambda,\mu v}(x) = x + \lambda[x, \mu v]\mu v = x + \lambda\mu\bar{\mu}[x, v]v = t_{\lambda\mu\bar{\mu},v}(x)$$

mit  $\lambda\mu\bar{\mu} + \bar{\lambda}\bar{\mu}\mu = 0$ .

**Lemma 8.19.** Sei  $n \geq 2$  und  $(n, q) \neq (3, 2)$ . Dann wird  $\text{SU}(n, q)$  von allen Transvektionen erzeugt.

*Beweis.* Sei  $V := K^n$ .

**Fall 1:**  $n = 2$ .

Nach dem Beweis von Lemma 8.12 existiert eine Basis  $\{v, w\}$  von  $V$ , sodass  $\text{SU}(V)$  aus den Matrizen in  $\text{SL}(2, q)$  besteht. Nach GT-Lemma 10.8 wird  $\text{SL}(2, q)$  von den Elementarmatrizen der Form  $1_2 + \lambda E_{ij}$  mit  $\lambda \in \mathbb{F}_q$  und  $i \neq j$  erzeugt. Es genügt zu zeigen, dass diese Matrizen unitären Transvektionen entsprechen. O. B. d. A. sei  $(i, j) = (1, 2)$ . Sei  $\mu := [w, v] = -[v, w] \in K$  (siehe Beweis von Lemma 8.12). Es gilt  $\mu^{-1} = -\bar{\mu}^{-1} = -\mu^{-q} = -\mu^{-1}$  und  $\lambda\mu^{-1} + \lambda\bar{\mu}^{-1} = \lambda(\mu^{-1} + \bar{\mu}^{-1}) = 0$ . Daher ist  $t := t_{\lambda\mu^{-1},v}$  eine Transvektion mit

$$t(v) = v, \quad t(w) = w + \lambda\mu^{-1}[w, v]v = w + \lambda v.$$

Also entspricht  $t$  der Matrix  $1_2 + \lambda E_{12}$ .

Für die Induktion nach  $n$  benötigen wir zusätzlich, dass  $\text{SU}(V)$  transitiv auf  $V_1$  operiert. Für  $u, v \in V_1$  existiert nach Witt ein  $\alpha \in \text{GU}(V)$  mit  $\alpha(u) = v$ . Sei  $d := \det(\alpha)$  und  $u^\perp = \langle w \rangle$ . Wir definieren  $\beta \in \text{GU}(V)$  durch  $\beta(u) = u$  und  $\beta(w) = d^{-1}w$ . Dann ist  $\alpha\beta \in \text{SU}(V)$  mit  $\alpha\beta(u) = v$ .

**Fall 2:**  $n \geq 3$ .

Nach Beispiel 8.13 und Satz 7.17 ist  $\text{SU}(4, 2) \cong \text{PSp}(4, 3)$  einfach. Nach Bemerkung 8.18 erzeugen die Transvektionen einen (nicht-trivialen) Normalteiler. Wir können daher  $(n, q) \neq (4, 2)$  annehmen (das erlaubt den Induktionsschritt auf  $n - 1$ ). Sei  $e_1, \dots, e_n$  die Standardbasis von  $V$ . Sei  $\alpha \in \text{SU}(V)$ . Dann ist  $v := \alpha(e_1)$  ein normierter Vektor.

**Schritt 1:** Es existiert ein Produkt  $\tau$  von Transvektionen mit  $\tau(e_1) = v$ .

Sind  $e_1$  und  $v$  linear abhängig, so existiert nach dem ersten Teil des Beweises ein Produkt  $\tau'$  von Transvektionen in  $\langle e_1, e_2 \rangle$  mit  $\tau'(e_1) = v$ . Nach Lemma 8.16 lässt sich  $\tau'$  zu einem Produkt von Transvektionen auf  $V$  fortsetzen. Wir können daher annehmen, dass  $e_1$  und  $v$  linear unabhängig sind.

Nehmen wir nun an, dass  $U := \langle e_1, v \rangle^\perp$  einen Vektor  $u$  mit  $[u, u] \neq 0$  besitzt. Nach Normierung ist  $[u, u] = 1$ . Nach Lemma 8.16 existieren Produkte von Transvektionen  $\tau' \in \text{SU}(\langle e_1, u \rangle)$  und  $\tau'' \in$



$SU(\langle u, v \rangle)$  mit  $\tau'(e_1) = u$  und  $\tau''(u) = v$ . Wieder kann man  $\tau'$  und  $\tau''$  nach  $V$  fortsetzen. Dann hat  $\tau = \tau''\tau'$  die gewünschte Eigenschaft.

Wir dürfen daher  $[u, u] = 0$  für alle  $u \in U$  voraussetzen. Wegen  $e_1 \in U^\perp \setminus U$  ist dann  $U \subsetneq U^\perp$ . Aus  $n - 2 = \dim U < \dim U^\perp = 2$  folgt  $n = 3$ . Nach Voraussetzung ist  $q \geq 3$ . Gilt  $v_i \bar{v}_i = [v, e_i][e_i, v] \neq 1$  für ein  $i \in \{1, 2, 3\}$ , so kann man wie zuvor  $e_1$  auf  $e_i$  und  $e_i$  auf  $v$  mittels Transvektionen abbilden. Wir können also  $v_i \bar{v}_i = 1$  für  $i = 1, 2, 3$  annehmen. Wegen  $1 = [v, v] = 1 + 1 + 1$  ist nun  $q$  gerade. Es existieren  $\lambda, \mu \in \mathbb{F}_q^\times$  mit  $\lambda^2 + \mu^2 = (\lambda + \mu)^2 = 1$ . Für  $u := (0, \lambda, \mu) \in V_1$  gilt

$$[u, v][v, u] = (\lambda \bar{v}_2 + \mu \bar{v}_3)(\lambda v_2 + \mu v_3) = \lambda^2 + \mu^2 + \lambda \mu (v_2 \bar{v}_3 + \bar{v}_2 v_3) = 1 + \lambda \mu (v_2 \bar{v}_3 + \bar{v}_2 v_3).$$

Angenommen es gilt  $v_2 \bar{v}_3 + \bar{v}_2 v_3 = 0$ . Wegen  $2 \mid q$  ist  $v_2^2 = v_2^2 v_3 \bar{v}_3 = v_2 \bar{v}_2 v_3^2 = v_3^2$  und  $v_2 = v_3$ . Da wir  $v$  auf  $w := \alpha(e_2)$  mittels Transvektionen abbilden können, dürfen wir die Bedingungen an  $v$  auch auf  $w$  übertragen. Es gilt also auch  $w_2 = w_3$ . Nun wäre aber  $[v, w] = v_1 \bar{w}_1 \neq 0$ . Dieser Widerspruch zeigt  $[u, v][v, u] \neq 1$ . Man kann also  $e_1$  auf  $u$  und  $u$  auf  $v$  mittels Transvektionen abbilden.

**Schritt 2:**  $\alpha$  ist ein Produkt von Transvektionen.

Für  $\beta := \tau^{-1}\alpha \in SU(V)$  gilt  $\beta(e_1) = e_1$ . Daher operiert  $\beta$  auf  $U := \langle e_2, \dots, e_n \rangle = e_1^\perp$ . Wegen  $(n, q) \neq (4, 2)$  ist  $(n-1, q) \neq (3, 2)$ , sodass  $\beta_U$  durch Induktion nach  $n$  ein Produkt von Transvektionen ist, die man nach  $V$  fortsetzen kann. Daher ist auch  $\alpha$  ein Produkt von Transvektionen.  $\square$

**Beispiel 8.20.** Jede Transvektion in  $SU(3, 2)$  hat Ordnung  $q = 2$  nach Bemerkung 8.18. Nach Aufgabe 28 erzeugen die Transvektionen in  $SU(3, 2)$  eine echte Untergruppe der Ordnung 54.

**Lemma 8.21.** Für  $n \geq 2$  operiert  $PSU(n, q)$  treu und primitiv auf  $\Omega := \{\langle v \rangle : v \in V_0 \setminus \{0\}\}$ .

*Beweis.* Sei  $V := K^n$ . Offenbar operiert  $SU(V)$  durch  ${}^A\langle v \rangle = \langle Av \rangle$  auf  $\Omega$ . Nach Lemma 8.9 liegt  $Z(SU(V))$  im Kern der Operation. Sei umgekehrt  $A$  im Kern. Wie im Beweis von Lemma 8.12 konstruiert man  $u, v \in V_0$  mit  $[u, v] = -[v, u]$ . Sei  $Au = \lambda_1 u$  und  $Av = \lambda_2 v$ . Wegen  $u + v \in V_0$  gilt

$$\lambda_1 u + \lambda_2 v = A(u + v) \in \langle u + v \rangle.$$

Dies zeigt  $\lambda := \lambda_1 = \lambda_2$ . Sei  $U := \langle u, v \rangle^\perp$ . Wegen  $V = U \oplus U^\perp$  ist  $U$  ein unitärer Raum. Für  $n = 2$  ist  $U = 0$  und  $A = \lambda 1_2$ . Sei nun  $n \geq 3$ . Durch Induktion nach  $n$  existiert  $\mu \in K$  mit  $A|_U = \mu \text{id}_U$ . Wähle  $z \in U$  mit  $\gamma := [z, z] \neq 0$ . Nach Bemerkung 8.3 existiert ein  $\delta \in K$  mit  $\delta + \bar{\delta} = \gamma$ . Für  $\beta := \delta/[u, v]$  gilt  $(\bar{\beta} - \beta)[u, v] = -(\delta + \bar{\delta}) = -\gamma$  wegen  $[u, v] = [v, u] = -[u, v]$ . Für  $w := u + \beta v + z$  ist somit

$$[w, w] = (\bar{\beta} - \beta)[u, v] + [z, z] = 0,$$

also  $w \in V_0$ . Aus  $Aw = \lambda u + \lambda \beta v + \mu z \in \langle w \rangle$  folgt  $\lambda = \mu$  und  $A = \lambda 1_n \in Z(SU(V))$ . Also operiert  $PSU(V)$  treu auf  $\Omega$ .

Sei  $v \in V_0 \setminus \{0\}$  mit o. B. d. A.  $v_1 v_2 \neq 0$ . Bekanntlich existieren  $q + 1$  Elemente  $\lambda \in K$  mit  $\lambda^{q+1} = \lambda \bar{\lambda} = -1$ . Insbesondere existiert ein solches  $\lambda$  mit  $v_1 + \lambda v_2 \neq 0$ . Dann ist  $u := (1, \bar{\lambda}, 0, \dots, 0) \in V_0$  und  $[v, u] \neq 0$ . Durch Skalierung von  $v$  erreicht man  $[u, v] = -[v, u]$ . Nun ist  $U := \langle u, v \rangle$  ein unitärer Raum mit  $SU(U) \cong SL(2, q)$  (Lemma 8.12). Es existiert ein  $A \in SU(U)$  mit  $\langle Av \rangle = \langle u \rangle$ . Wegen  $V = U \oplus U^\perp$  kann man  $A$  nach  $SU(V)$  fortsetzen, indem man trivial auf  $U^\perp$  operiert. Sei  $\mu \neq \lambda$  mit  $\mu \bar{\mu} = -1$ . Dann ist  $w := (1, \bar{\mu}) \in V_0$  mit  $[u, w] = 1 + \bar{\lambda} \mu \neq 0$ . Also existiert ein  $B \in SU(\langle u, w \rangle)$  mit  $\langle Bu \rangle = \langle w \rangle$ . Wieder lässt sich  $B$  nach  $V$  fortsetzen. Dies zeigt, dass  $PSU(V)$  transitiv auf  $\Omega$  operiert.

Zum Nachweis der Primitivität sei zunächst  $n = 2$  und  $V = \langle u, v \rangle$  mit  $u, v \in V_0$  und  $[u, v] = -[v, u]$ . Jedes Element in  $\Omega \setminus \langle v \rangle$  wird erzeugt von einem Vektor  $w := u + \lambda v \in V_0$  mit  $\lambda \in K$ . Dann gilt

$$0 = [w, w] = \lambda[v, u] + \bar{\lambda}[u, v] = (\lambda - \bar{\lambda})[v, u],$$

d. h.  $\lambda = \bar{\lambda} \in \mathbb{F}_q$ . Also besteht  $\Omega$  genau aus den 1-dimensionalen Unterräumen von  $\mathbb{F}_q u + \mathbb{F}_q v$ . Mittels des Isomorphismus  $\mathrm{SU}(V) \cong \mathrm{SL}(2, q)$  operiert  $\mathrm{SU}(V)$  sogar 2-transitiv auf  $\Omega$  (GT-Lemma 10.7). Sei nun  $n \geq 3$ . Angenommen es existiert ein Block  $\Delta \subseteq \Omega$ . Seien  $\langle u \rangle, \langle v \rangle \in \Delta$  verschieden.

**Fall 1:**  $[u, v] \neq 0$ .

Sei auch  $w \in V_0$  mit  $[u, w] \neq 0$ . Nach Skalierung können wir  $[u, v] = [u, w]$  annehmen. Dann existiert eine Isometrie  $\alpha: \langle u, v \rangle \rightarrow \langle u, w \rangle$  mit  $\alpha(u) = u$  und  $\alpha(v) = w$ . Nach Witt lässt sich  $\alpha$  zu  $\alpha \in \mathrm{GU}(V)$  fortsetzen. Für  $d := \det(\alpha)$  gilt  $d^{q+1} = d\bar{d} = 1$ , d. h.  $d = \zeta^{(q-1)a}$  für ein  $a \in \mathbb{Z}$ . Wir definieren  $U := \langle u, v \rangle$  und  $\beta \in \mathrm{GL}(U)$  mit  $\beta(u) = \zeta^{-qa}u$  und  $\beta(v) = \zeta^a v$ . Wegen

$$[\beta(u), \beta(v)] = \zeta^{-qa+qa}[u, v] = [u, v]$$

ist  $\beta \in \mathrm{GU}(U)$  mit  $\det(\beta) = \zeta^{-qa+a} = d^{-1}$ . Wegen  $V = U \oplus U^\perp$  können wir  $\beta$  als  $\beta + \mathrm{id}_{U^\perp}$  nach  $\mathrm{GU}(V)$  fortsetzen. Dann ist  $\alpha\beta \in \mathrm{SU}(V)$  mit  $\alpha\beta(u) \in \langle u \rangle$  und  $\alpha\beta(v) \in \langle w \rangle$ . Daher enthält  $\Delta$  alle  $\langle v \rangle$  mit  $[u, v] \neq 0$ .

Sei nun  $\langle w \rangle \in \Omega$  mit  $w \in u^\perp$ . Da  $V$  nicht die Vereinigung zweier echter Unterräume ist, existiert ein  $x \in V \setminus (u^\perp \cup w^\perp)$ . Nach Skalierung sei  $[x, u] = 1$ . Da die Spur surjektiv ist, existiert ein  $\lambda \in K$  mit  $\lambda + \bar{\lambda} = -[x, x]$  ( $\in \mathbb{F}_q$ ). Für  $x' := x + \lambda u$  gilt

$$[x', x'] = [x, x] + (\lambda + \bar{\lambda})[u, x] = 0,$$

d. h.  $x' \in V_0$ . Wegen  $u \in w^\perp$  gilt  $x' \notin u^\perp \cup w^\perp$ . Aus  $x' \notin u^\perp$  folgt  $\langle x' \rangle \in \Delta$ . Aus  $w \notin (x')^\perp$  ergibt sich  $\langle w \rangle \in \Delta$ . Dies liefert den Widerspruch  $\Delta = \Omega$ .

**Fall 2:**  $[u, v] = 0$ .

Sei  $x \in u^\perp \setminus v^\perp$  mit  $[x, v] = 1$ . Sei  $\lambda \in K$  mit  $\lambda + \bar{\lambda} = -[x, x]$ . Für  $x' := x + \lambda v \in u^\perp \setminus v^\perp$  gilt  $[x', x'] = 0$  wie in Fall 1. Nun ist  $U := \langle x', v \rangle$  ein unitärer Raum. Es existiert ein  $\alpha \in \mathrm{SU}(V)$  mit  $\alpha(U) = U$ ,  $\alpha(v) \in \langle x' \rangle$  und  $\alpha|_{U^\perp} = \mathrm{id}_{U^\perp}$ . Wegen  $u \in U^\perp$  ist  $\langle u \rangle = \langle \alpha(u) \rangle \in \Delta \cap \alpha(\Delta) = \Delta$ . Dies zeigt  $\langle x' \rangle = \langle \alpha(v) \rangle \in \Delta$ . Aus Fall 1 erhält man den Widerspruch  $\Delta = \Omega$ .  $\square$

**Bemerkung 8.22.** Nach Lemma 8.10 gilt  $z_3 = q^5 - q^2(q-1) = (q^2-1)(q^3+1) + 1$ . Daher ist  $G := \mathrm{PSU}(3, q)$  eine primitive Gruppe vom Grad  $|\Omega| = \frac{z_3-1}{|K^\times|} = q^3 + 1$ .

**Lemma 8.23.** Für  $n \geq 3$  und  $(n, q) \neq (3, 2)$  ist  $\mathrm{SU}(n, q)$  perfekt.

*Beweis.* Nach Lemma 8.19 genügt es zu zeigen, dass jede unitäre Transvektion  $t := t_{\lambda, u}$  ein Produkt von Kommutatoren ist. Sei  $v \in V \setminus u^\perp$ , sodass  $(u, v)$  ein hyperbolisches Paar ist. Dann ist  $U := \langle u, v \rangle$  ein unitärer Raum und  $t|_{U^\perp} = \mathrm{id}_{U^\perp}$  wegen  $U^\perp \subseteq u^\perp$ . Nach Lemma 8.12 ist  $t|_U \in \mathrm{SU}(U) \cong \mathrm{SL}(2, q)$ .

Sei zunächst  $q \geq 4$ . Nach GT-Lemma 10.9 ist  $\mathrm{SL}(2, q)$  perfekt. Also ist  $t|_U$  ein Produkt von Kommutatoren  $[x, y] \in \mathrm{SU}(U)$ . Wie üblich kann man  $x$  und  $y$  nach  $V$  fortsetzen, indem man trivial auf  $U^\perp$  operiert. Daher ist  $[x, y]$  die Einschränkung eines Kommutators  $c \in \mathrm{SU}(V)$  mit  $c|_{U^\perp} = \mathrm{id}_{U^\perp}$ . Also ist  $t$  ein Produkt von Kommutatoren.

Sei nun  $q = 3$ . Mit  $U$  ist auch  $U^\perp$  ein unitärer Raum. Daher existiert ein  $w \in U^\perp$  mit  $[w, w] = 1$ . Sei  $W := \langle u, v, w \rangle$ . Wie im ersten Teils des Beweises genügt es zu zeigen, dass  $t|_W \in \mathrm{SU}(W)$  ein Produkt von Kommutatoren ist. Sei  $\mu \in K$  mit  $\mu\bar{\mu} = -1$ . Bzgl. der Basis  $\{u, v, w\}$  ist  $d := \mathrm{diag}(\mu, -\mu, -\mu^{-2}) \in \mathrm{SU}(W)$ . Es gilt

$$t|_W = \begin{pmatrix} 1 & \lambda & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \lambda/2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} d \begin{pmatrix} 1 & \lambda/2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} d^{-1} = [t_{\lambda/2, u}, d] \in \mathrm{SU}(W)'.$$

Sei schließlich  $q = 2$  und  $n \geq 4$ . Wir wählen ein hyperbolisches Paar  $(u', v')$  mit  $u', v' \in U^\perp$ . O.B.d.A. sei  $V = U \oplus \langle u', v' \rangle$ .<sup>16</sup> Aus  $\lambda + \bar{\lambda} = 0$  folgt  $\lambda = \bar{\lambda} \in \mathbb{F}_2$ . Im Fall  $\lambda = 0$  ist  $t = \text{id}_V$  ein Kommutator. Sei also  $\lambda = 1$ . Sei  $K^\times = \langle \zeta \rangle$  und  $x, y \in \text{GL}(V)$  mit

$$\begin{aligned} x(u) &:= u, & x(u') &:= u', & x(v) &:= v + \zeta^2 u', & x(v') &:= \zeta u + v', \\ y(u) &:= u, & y(u') &:= \zeta^2 u + u', & y(v) &:= v + \zeta v', & y(v') &:= v' \end{aligned}$$

Wegen  $\zeta + \zeta^2 = 1$  ist  $x, y \in \text{SU}(V)$  und  $x^2 = 1, y^2 = 1$ . Für  $z := [x, y]$  gilt

$$\begin{aligned} z(u) &= u, \\ z(u') &= xy(\zeta^2 u + u') = \zeta^2 u + \zeta^2 u + u' = u', \\ z(v) &= xyx(v + \zeta v') = xy(v + \zeta^2 u' + \zeta^2 u + \zeta v') = x(v + \zeta v' + \zeta u + \zeta^2 u' + \zeta^2 u + \zeta v') \\ &= x(u + v + \zeta^2 u') = u + v, \\ z(v') &= xy(\zeta u + v') = \zeta u + \zeta u + v' = v'. \end{aligned}$$

Dies zeigt  $t = z \in \text{SU}(V)'$ . □

**Satz 8.24.** Für  $n \geq 3$  und  $(n, q) \neq (3, 2)$  ist  $\text{PSU}(n, q)$  einfach.

*Beweis.* Sei  $V = K^n$ . Wir identifizieren die Elemente in  $\text{SU}(V)$  mit ihren Nebenklassen in  $G := \text{PSU}(V)$ . Nach Lemma 8.21 ist  $G$  eine primitive Permutationsgruppe auf  $\Omega = \{\langle v \rangle : v \in V_0 \setminus \{0\}\}$ . Nach Lemma 8.23 ist  $G$  perfekt. Sei  $v \in V_0$  und

$$K_0 := \{\lambda \in K : \lambda + \bar{\lambda} = 0\} \cong \mathbb{F}_q$$

der Kern der Spur. Nach Bemerkung 8.18 ist  $A := \{t_{\lambda, v} : \lambda \in K_0\} \leq G$  eine elementarabelsche  $p$ -Gruppe, wobei  $p := \text{char } K$ . Für  $g \in G_{\langle v \rangle}$  existiert ein  $\mu \in K$  mit  $g(v) = \mu v$ . Nach Bemerkung 8.18 gilt

$$gt_{\lambda, v}g^{-1} = t_{\lambda, g(v)} = t_{\lambda, \mu v} = t_{\lambda\mu\bar{\mu}, v} \in A.$$

Dies zeigt  $A \trianglelefteq G_{\langle v \rangle}$ . Sei  $w \in V_0 \setminus \{0\}$  beliebig. Da  $G$  transitiv auf  $\Omega$  operiert, existiert ein  $g \in G$  mit  $g(v) \in \langle w \rangle$ . Daher enthält  $A^G := \langle gAg^{-1} : g \in G \rangle$  alle unitären Transvektionen. Aus Lemma 8.19 folgt  $A^G = G$ . Nach Iwasawas Lemma aus der Gruppentheorie ist  $G$  einfach. □

**Beispiel 8.25.** Die kleinste einfache Gruppe, die wir bislang noch nicht kannten, ist  $\text{SU}(3, 3) = \text{PSU}(3, 3)$  mit Ordnung  $3^3(3^2 - 1)(3^3 + 1) = 2^5 \cdot 3^3 \cdot 7 = 6048$ .

**Bemerkung 8.26.** Wall hat gezeigt, dass eine Matrix  $A \in \text{GL}(n, q^2)$  genau dann zu einem Element aus  $\text{GU}(n, q)$  konjugiert ist, wenn  $A$  und  $\bar{A}^{-1}$  ähnlich sind (also in  $\text{GL}(n, q^2)$  konjugiert). Außerdem sind Matrizen aus  $\text{GU}(n, q)$  genau dann in  $\text{GU}(n, q)$  konjugiert, wenn sie ähnlich sind.

**Beispiel 8.27.**

- (i) Sei  $A \in \text{GL}(n, q)$  eine obere Dreiecksmatrix mit Einsen auf der Hauptdiagonale. Wegen  $A^{q^n} - 1_n = (A - 1_n)^{q^n} = 0$  sind alle Eigenwerte von  $A$  gleich 1. Nach der Jordanschen Normalform ist die Ähnlichkeitsklasse von  $A$  durch  $\text{rk}((A - 1_n)^k)$  für  $k = 1, \dots, n$  eindeutig bestimmt. Wir zeigen  $\text{Ker}((A - 1_n)^k) = \text{Ker}((A^{-1} - 1_n)^k)$  für  $k = 1, \dots, n$ . Für  $k = 1$  gilt

$$x \in \text{Ker}(A - 1_n) \iff Ax = x \iff A^{-1}x = x \iff x \in \text{Ker}(A^{-1} - 1_n).$$

<sup>16</sup>Man könnte nun  $\text{PSU}(4, 2) \cong \text{PSp}(4, 3)$  und Lemma 7.15 benutzen.

Sei nun die Behauptung für  $k$  bereits bewiesen. Für  $x \in \text{Ker}((A - 1_n)^{k+1})$  gilt induktiv

$$\begin{aligned}(A - 1_n)^k(A - 1_n)x = 0 &\implies (A^{-1} - 1_n)^k(A - 1_n)x = 0 \implies (A - 1_n)(A^{-1} - 1_n)^kx = 0 \\ &\implies (A^{-1} - 1_n)(A^{-1} - 1_n)^kx = 0 \implies x \in \text{Ker}((A^{-1} - 1_n)^{k+1}).\end{aligned}$$

Also besitzen  $A$  und  $A^{-1} = \overline{A}^{-1}$  die gleiche Jordansche Normalform. Nach Wall ist  $A$  zu einer unitären Matrix ähnlich.

- (ii) Bekanntlich bilden die oberen Dreiecksmatrizen mit Einsen auf der Hauptdiagonale eine  $p$ -Sylowgruppe  $P$  von  $\text{GL}(n, q)$ , wobei  $p \mid q$ . Für eine  $p$ -Sylowgruppe  $Q$  von  $\text{GU}(n, q)$  gilt  $|Q| = |P|$  nach Satz 8.11. Obwohl nach (i) jedes Element aus  $P$  zu einem Element aus  $Q$  konjugiert ist, sind  $P$  und  $Q$  im Allgemeinen nicht isomorph. Für  $(n, q) = (3, 2)$  ist  $P \cong D_8$  und  $Q \cong Q_8$  nach Aufgabe 28.

## 9 Orthogonale Gruppen

**Bemerkung 9.1.** Zu den sogenannten *klassischen* Gruppen vom Lie-Typ fehlt uns nur noch die Familie der orthogonalen Gruppen. In diesem Abschnitt stellen wir die benötigten Konstruktionen bereit, aber verzichten auf viele Beweisdetails.

**Definition 9.2.** Sei  $q \neq 1$  eine Primzahlpotenz,  $K := \mathbb{F}_q$  und  $V$  ein  $n$ -dimensionaler  $K$ -Vektorraum. Eine Abbildung  $\rho: V \rightarrow K$  heißt *quadratischen Form*, falls

- $\rho(\lambda v) = \lambda^2 \rho(v)$  für alle  $\lambda \in K$  und  $v \in V$ ,
- Die Abbildung

$$\beta: V \times V \rightarrow \mathbb{F}_q, \quad (u, v) \mapsto \rho(u + v) - \rho(u) - \rho(v)$$

ist eine (symmetrische) Bilinearform.

Wir setzen voraus, dass  $\rho$  *nicht-ausgeartet* ist, d. h. für alle  $v \in V \setminus \{0\}$  mit  $\rho(v) = 0$  existiert ein  $w \in V$  mit  $\beta(v, w) \neq 0$ . Man nennt  $(V, \rho)$  einen *orthogonalen Raum*. Im Gegensatz zu den symplektischen und unitären Gruppen hängt der Isomorphietyp der *allgemeinen orthogonalen Gruppe*

$$\text{GO}(V, \rho) := \{f \in \text{GL}(V) : \forall v \in V : \rho(f(v)) = \rho(v)\}$$

von  $\rho$  ab. Die entsprechende Matrixgruppe sei  $\text{GO}(n, q, \rho)$ .

**Bemerkung 9.3.** Im Folgenden sei  $V$  stets ein orthogonaler Raum. Für ungerades  $q$  ist  $\rho$  durch  $\beta$  eindeutig bestimmt, denn

$$\rho(v) = \frac{1}{2} \left( 4\rho(v) - \rho(v) - \rho(v) \right) = \frac{1}{2} \left( \rho(v + v) - \rho(v) - \rho(v) \right) = \frac{1}{2} \beta(v, v).$$

In diesem Fall ist  $K^\times \rightarrow K^\times, x \mapsto x^2$  ein Homomorphismus mit Kern  $\langle -1 \rangle$ . Mit  $K^\times = \langle \zeta \rangle$  gilt  $K^\times = \langle \zeta^2 \rangle \dot{\cup} \langle \zeta \rangle$  (disjunkte Vereinigung der Quadrate und Nicht-Quadrate). Das folgende Lemma ist eine Variante von Sylvesters Trägheitssatz.

**Lemma 9.4.** Sei  $q$  ungerade. Dann existiert eine Orthogonalbasis  $b_1, \dots, b_n \in V$  bzgl.  $\beta$  mit  $\rho(b_i) = 1$  für  $i = 1, \dots, n-1$  und  $\rho(b_n) \in \{1, \zeta\}$ . Insbesondere ist  $\beta$  nicht-ausartet.

*Beweis.* Für  $v \in V^\perp$  (bzgl.  $\beta$ ) gilt  $\rho(v) = \frac{1}{2}\beta(v, v) = 0$ . Da  $q$  nicht-ausgeartet ist, folgt  $v = 0$ . Also ist  $\beta$  nicht-ausgeartet. Die Existenz von  $b_1, \dots, b_n$  zeigen wir durch Induktion nach  $n$ . Sei  $n = 1$ ,  $V = \langle v \rangle$  und  $\lambda := \rho(v)$ . Da  $\beta$  nicht ausgeartet ist, gilt  $\lambda \neq 0$ . Nach Bemerkung 9.3 existiert ein  $\mu \in K^\times$  mit  $\lambda \in \{\mu^2, \zeta\mu^2\}$ . Nun erfüllt  $b_1 := \mu^{-1}v$  die Behauptung.

Sei  $n \geq 2$ . Wie im Beweis von Satz 8.4 findet man ein  $u \in V$  mit  $\rho(u) = \frac{1}{2}\beta(u, u) \neq 0$ . Wie üblich gilt  $V = \langle u \rangle \oplus u^\perp$ . Sei  $v \in u^\perp$  mit  $\rho(v) \neq 0$ . Die Mengen

$$\{\lambda^2 \rho(u) : \lambda \in K\}, \quad \{1 - \mu^2 \rho(v) : \mu \in K\}$$

haben jeweils  $(q+1)/2$  Elemente. Sie können also nicht disjunkt sein. Daher existieren  $\lambda, \mu \in K$  (nicht beide 0) mit

$$\rho(\lambda u + \mu v) = \lambda^2 \rho(u) + \mu^2 \rho(v) = 1.$$

Wir können somit  $b_1 := \lambda u + \mu v$  setzen. Die Behauptung folgt nun durch Induktion, indem man  $\rho$  auf  $b_1^\perp$  einschränkt.  $\square$

**Bemerkung 9.5.** Sei  $q$  ungerade.

- (i) Lemma 9.4 zeigt, dass es höchstens zwei nicht-äquivalente quadratische Formen  $\rho_+$  und  $\rho_-$  gibt. Dabei sei  $\rho_+(b_n) = 1$  und  $\rho_-(b_n) = \zeta$ . Sei  $B_\zeta = \text{diag}(1, \dots, 1, \zeta)$  die Gram-Matrix von  $\rho_-$ . Jede zu  $\rho_-$  äquivalente Form hat Gram-Matrix  $B' := SB_\zeta S^t$  mit  $S \in \text{GL}(n, q)$ . Wegen  $\det(B') = \det(S)^2 \zeta \notin \langle \zeta^2 \rangle$  können  $\rho_+$  und  $\rho_-$  nicht äquivalent sein.

- (ii) Offenbar ist

$$\text{GO}(n, q, \rho_+) = \{A \in \text{GL}(n, q) : A^t A = 1_n\}$$

die Menge der orthogonalen Matrizen und

$$\text{GO}(n, q, \rho_-) = \{A \in \text{GL}(n, q) : A^t B_\zeta A = B_\zeta\}.$$

Ist  $n = 2k + 1$  ungerade, so sind  $\rho_+$  und  $\zeta\rho_-$  nach (i) äquivalent. Da die Skalierung mit  $\zeta$  den Isomorphietyp der orthogonalen Gruppe nicht verändert, setzt man

$$\text{GO}(2k + 1, q) := \text{GO}(2k + 1, q, \rho_+).$$

- (iii) Für gerades  $n = 2k$  definiert man

$$\text{GO}^\pm(2k, q) := \text{GO}(n, q, \rho_{\pm\epsilon}), \quad \epsilon \equiv q^k \pmod{4}.$$

Diese beiden Gruppen unterscheiden sich bereits durch ihre Ordnung (Satz 9.7 und Bemerkung 9.10).

**Definition 9.6.** Sei  $q$  ungerade.

- (i) Nach Bemerkung 9.5(ii) ist  $\det(f) = \pm 1$  für alle  $f \in \text{GO}(V, \rho)$ . Daher hat die *spezielle orthogonale Gruppe*  $\text{SO}(V, \rho)$  Index 2 in  $\text{GO}(V, \rho)$ . Wie in Lemma 7.9 zeigt man, dass  $Z(\text{GO}(V, \rho))$  nur aus Skalarmatrizen besteht. Für  $\lambda \text{id}_V \in \text{GO}(V, \rho)$  ist  $\rho(b_1) = \rho(\lambda b_1) = \lambda^2 \rho(b_1) \neq 0$  und  $\lambda^2 = 1$ . Daher gilt  $Z(\text{GO}(V, \rho)) = \langle -\text{id}_V \rangle$  (und  $Z(\text{SO}(2k + 1, q, \rho)) = 1$  für  $k \geq 1$ ). Wie üblich sei

$$\text{PSO}(V, \rho) := \text{SO}(V, \rho) / Z(\text{SO}(V, \rho))$$

die *projektive spezielle orthogonale Gruppe*. Im Gegensatz zu  $\text{PSL}$ ,  $\text{PSp}$  und  $\text{PSU}$  sind diese Gruppen in der Regel nicht einfach.

(ii) Für  $v \in V$  mit  $\rho(v) \neq 0$  definiert man die *Spiegelung* (eine Involution)  $\sigma_v \in \text{GO}(V, \rho)$  durch

$$\sigma_v(x) := x - \frac{\beta(x, v)}{\rho(v)}v \quad (v \in V).$$

Jedes  $f \in \text{GO}(V, \rho)$  lässt sich als Produkt von Spiegelungen  $f = \sigma_{v_1} \dots \sigma_{v_r}$  schreiben. Die Abbildung

$$\text{GO}(V, \rho) \rightarrow K^\times / (K^\times)^2, \quad f \mapsto \rho(v_1) \dots \rho(v_r) (K^\times)^2$$

ist ein wohldefinierter Homomorphismus, den man *Spinornorm* nennt. Seinen Kern bezeichnet man mit  $\Omega(V, \rho)$ . Die entsprechenden Quotienten  $\text{P}\Omega(2k-1, q)$  bzw.  $\text{P}\Omega^\epsilon(2k, q)$  haben Index 2 bzw.  $\frac{1}{2} \text{ggT}(4, q^k - \epsilon) \leq 2$  in  $\text{PSO}(n, q, \rho)$ . Abgesehen von  $\text{P}\Omega^+(4, q)$  sind dies einfache Gruppen für  $k \geq 2$ . Insbesondere ist dann  $\text{P}\Omega = \text{PSO}'$ .

**Satz 9.7.** Für ungerade  $q$  gilt  $\text{GO}^\pm(2, q) \cong D_{2(q \mp 1)}$ .

*Beweis.* Nach Bemerkung 9.5 ist  $\text{GO}^\epsilon(2, q) = \{A \in \text{GL}(2, q) : A^t B A = B\}$  mit  $B = \text{diag}(1, \gamma)$  und  $\gamma \in \{1, \zeta\}$ . Es gilt  $\gamma = 1$  genau dann, wenn  $q \equiv \epsilon \pmod{4}$ . Für  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$  ist  $\delta := \det(A) = \pm 1$  nach Definition 9.6, und die Bedingung  $A^t B = B A^{-1}$  ist äquivalent zu

$$\begin{pmatrix} a & \gamma c \\ b & \gamma d \end{pmatrix} = \delta \begin{pmatrix} d & -b \\ -\gamma c & \gamma a \end{pmatrix},$$

d. h.  $d = \delta a$  und  $b = -\delta \gamma c$ . Offenbar ist  $\text{diag}(1, -1) \in \text{GO}^\epsilon(2, q)$  mit  $\delta = -1$ . Andererseits besteht  $\text{SO}^\epsilon(2, q)$  aus den Matrizen  $M(a, b) := \begin{pmatrix} a & -\gamma b \\ b & a \end{pmatrix}$  mit  $a^2 + \gamma b^2 = 1$ . Offenbar invertiert  $\text{diag}(1, -1)$  diese Matrizen durch Konjugation. Wir müssen also  $\text{SO}^\epsilon(2, q) \cong C_{q-\epsilon}$  zeigen. Es gilt

$$M(a, b) M(a', b') = M(aa' - \gamma bb', ab' + a'b).$$

Es existiert ein  $\tau \in \mathbb{F}_{q^2}$  mit  $\tau^2 = -\gamma$ . Dann ist

$$\Gamma: \text{SO}^\epsilon(2, q) \rightarrow \mathbb{F}_{q^2}^\times, \quad M(a, b) \mapsto a + \tau b$$

ein Homomorphismus.

**Fall 1:**  $\epsilon = 1$ .

Für  $q \equiv 1 \pmod{4}$  ist  $-1$  ein Quadrat und anderenfalls ist  $-\zeta$  als Produkt von zwei Nicht-Quadraten ein Quadrat. In jedem Fall ist  $-\gamma$  ein Quadrat und  $\tau \in K$ . Für  $x \in K^\times$  sei  $a := \frac{x+x^{-1}}{2}$  und  $b := \frac{x-x^{-1}}{2\tau}$ . Wegen

$$a^2 + \gamma b^2 = \frac{x^2 + x^{-2} + 2}{4} - \frac{x^2 + x^{-2} - 2}{4} = 1$$

ist  $M(a, b) \in \text{SO}^+(2, q)$ . Dies liefert eine Abbildung

$$\Delta: \mathbb{F}_q^\times \rightarrow \text{SO}^+(2, q), \quad x \mapsto M(a, b).$$

mit  $\Gamma \circ \Delta = \text{id}$ . Wegen  $(a + \tau b)(a - \tau b) = a^2 + \gamma b^2 = 1$  ist auch  $\Delta \circ \Gamma = \text{id}$ . Also ist  $\text{SO}^+(2, q) \cong C_{q-1}$ .

**Fall 2:**  $\epsilon = -1$ .

Hier ist  $-\gamma$  kein Quadrat und  $\tau \notin \mathbb{F}_q$ . Da  $\{1, \tau\}$  linear unabhängig über  $\mathbb{F}_q$  ist, ist  $\Gamma$  injektiv. Sei  $N: \mathbb{F}_{q^2}^\times \rightarrow \mathbb{F}_q^\times$ ,  $x \mapsto x^{q+1}$  die Norm aus Bemerkung 8.3. Wegen  $\tau^q = \tau(-\gamma)^{(q-1)/2} = -\tau$  ist

$$N(a + \tau b) = (a + \tau b)(a + \tau^q b) = (a + \tau b)(a - \tau b) = a^2 + \gamma b^2 = 1$$

für alle  $a, b \in K$ . Daher bildet  $\Gamma$  auf  $\text{Ker}(N) \cong C_{q+1}$  ab. Für jedes  $a + \tau b \in \text{Ker}(N)$  ist umgekehrt  $M(a, b) \in \text{SO}^-(2, q)$ . Dies zeigt  $\text{SO}^-(2, q) \cong C_{q+1}$ .  $\square$

**Beispiel 9.8.** Wir konstruieren eine Familie von *exzeptionellen* Gruppen vom Lie-Typ als Untergruppe von  $\mathrm{GO}(7, q)$  für ungerade  $q$ . Sei dafür  $V$  ein  $K$ -Vektorraum mit Basis  $b_0, \dots, b_7$ . Auf  $\{b_0, \dots, b_7\}$  definiert man eine (nicht-assoziative) Multiplikation  $*$  mit Einselement  $1 := b_0$  und Verknüpfungstabelle

| $*$   | $b_1$  | $b_2$  | $b_3$  | $b_4$  | $b_5$  | $b_6$  | $b_7$  |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $b_1$ | $-1$   | $b_3$  | $-b_2$ | $b_5$  | $-b_4$ | $b_7$  | $-b_6$ |
| $b_2$ | $-b_3$ | $-1$   | $b_1$  | $b_6$  | $b_7$  | $-b_4$ | $-b_5$ |
| $b_3$ | $b_2$  | $-b_1$ | $-1$   | $b_7$  | $-b_6$ | $b_5$  | $-b_4$ |
| $b_4$ | $-b_5$ | $-b_6$ | $-b_7$ | $-1$   | $b_1$  | $b_2$  | $b_3$  |
| $b_5$ | $b_4$  | $-b_7$ | $b_6$  | $-b_1$ | $-1$   | $-b_3$ | $b_2$  |
| $b_6$ | $-b_7$ | $b_4$  | $-b_5$ | $-b_2$ | $b_3$  | $-1$   | $b_1$  |
| $b_7$ | $b_6$  | $b_5$  | $b_4$  | $-b_3$ | $-b_2$ | $-b_1$ | $-1$   |

Man beachte  $\langle b_1, b_2 \rangle = \{\pm 1, \pm b_1, \pm b_2, \pm b_3\} \cong Q_8$ . Indem man  $*$  distributiv nach  $V$  fortsetzt, erhält man die *Oktonionen*  $\mathbb{O} = (V, +, *)$  (auch *CAYLEY-Algebra* genannt, obwohl es formal nicht mal ein Ring ist). Nun ist

$$\mathrm{G}_2(q) := \{f \in \mathrm{GL}(V) : \forall v, w \in V : f(v * w) = f(v) * f(w)\}$$

ein einfache Gruppe. Wie üblich zeigt man, dass  $1$  das einzige Einselement in  $\mathbb{O}$  ist. Insbesondere gilt  $f(1) = 1$  für  $f \in \mathrm{G}_2(q)$ . Sei  $U := \langle b_1, \dots, b_7 \rangle \leq V$  und  $i \geq 1$ . Sei  $f(b_i) = \lambda 1 + u$  mit  $\lambda \in K$  und  $u \in U$ . Dann gilt

$$-1 = f(-1) = f(b_i * b_i) = f(b_i) * f(b_i) = \lambda^2 1 + 2\lambda u + u * u.$$

Wegen  $b_i * b_j = -b_j * b_i$  für  $1 \leq i < j \leq 7$  gilt  $u * u \in K1$ . Ein Koeffizientenvergleich zeigt  $\lambda = 0$  oder  $u = 0$ . Im zweiten Fall wäre  $f$  wegen  $f(b_i) = f(\lambda 1)$  nicht injektiv. Also ist  $f(b_i) = u \in U$  und  $f(U) = U$ . Offenbar definiert  $\rho(u) = -u * u = \lambda_1^2 + \dots + \lambda_7^2$  für  $u = \sum \lambda_i b_i$  eine quadratische Form auf  $U$ . Die entsprechende Bilinearform  $(u, v) \mapsto \frac{1}{2}(\rho(u+v) - \rho(u) - \rho(v))$  ist das Standardskalarprodukt bzgl.  $b_1, \dots, b_7$ , und daher nicht-ausgeartet. Wegen

$$\rho(f(u)) = -f(u) * f(u) = f(-u * u) = f(\rho(u)) = \rho(u)$$

gilt nun  $f|_U \in \mathrm{GO}(U)$ . Auf diese Weise kann man  $\mathrm{G}_2(q)$  als Untergruppe von  $\mathrm{GO}(7, q)$  auffassen. Die kleinste Gruppe dieser Art ist  $\mathrm{G}_2(3)$  der Ordnung 4.245.696. Für gerade  $q$  lässt sich  $\mathrm{G}_2(q)$  anders konstruieren, wobei  $\mathrm{G}_2(2)' \cong \mathrm{SU}(3, 3)$  Index 2 in  $\mathrm{G}_2(2)$  hat.

**Bemerkung 9.9.** Sei schließlich  $q$  gerade. Hier ist  $\beta$  offensichtlich alternierend.

- (i) Sei zunächst  $n = 2k + 1$  ungerade. Nach Satz 7.5 ist  $\beta$  ausgeartet, d. h.  $V^\perp \neq 0$ . Seien  $u, v \in V^\perp \setminus \{0\}$ . Nach Skalierung können wir  $\rho(u) = \rho(v)$  annehmen, da Quadrieren ein Automorphismus auf  $K$  ist. Aus  $\rho(u+v) = \beta(u, v) + \rho(u) + \rho(v) = 0$  folgt  $u = v$ , da  $\rho$  nicht-ausgeartet ist. Das heißt,  $V^\perp = \langle v \rangle$  und  $\bar{V} := V/V^\perp$  ist ein symplektischer Raum der Dimension  $2k$ . Für  $f \in \mathrm{GO}(V, \rho)$  und  $w \in V$  ist  $\beta(f(v), f(w)) = \beta(v, w) = 0$ . Also ist  $V^\perp$   $f$ -invariant. Nehmen wir an, dass  $f$  auf  $\bar{V}$  die Identität ist. Für alle  $w \in V$  existiert dann ein  $\lambda \in K$  mit  $f(w) = w + \lambda v$ . Wegen

$$\rho(w) = \rho(f(w)) = \rho(w + \lambda v) = \beta(w, \lambda v) + \rho(w) + \rho(\lambda v) = \rho(w) + \lambda^2 \rho(v)$$

ist  $\lambda^2 \rho(v) = 0$  und damit  $\lambda = 0$ . Dies zeigt  $f = \mathrm{id}_V$ . Es stellt sich heraus, dass der entsprechende Monomorphismus

$$\Gamma: \mathrm{GO}(2k + 1, q) \rightarrow \mathrm{Sp}(\bar{V}) \cong \mathrm{Sp}(2k, q)$$

sogar ein Isomorphismus ist. Daher ist  $\mathrm{GO}(2k + 1, q) \cong \mathrm{Sp}(2k, q)$  für  $(k, q) \neq (1, 2)$  nach Lemma 7.9 und Satz 7.17 einfach.

- (ii) Sei schließlich  $n = 2k$  gerade. Nach Satz 7.5 existiert eine symplektische Basis  $b_1, \dots, b_n$  bzgl.  $\beta$ . Allerdings gibt es zwei nicht-äquivalente quadratische Formen  $\rho$  mit der gleichen Bilinearform:

$$\begin{aligned}\rho_+(\sum \lambda_i b_i) &:= \sum_{i=1}^k \lambda_{2i-1} \lambda_{2i}, \\ \rho_-(\sum \lambda_i b_i) &:= \sum_{i=1}^k \lambda_{2i-1} \lambda_{2i} + \lambda_{2k-1}^2 + \zeta \lambda_{2k}^2,\end{aligned}$$

wobei  $\zeta \in K$  so gewählt ist, dass  $X^2 + X + \zeta \in K[X]$  irreduzibel ist. Für ungerade  $k$  kann man  $\zeta = 1$  wählen. Man definiert

$$\mathrm{GO}^\pm(2k, q) := \mathrm{GO}(2k, q, \rho_\pm)$$

(im Gegensatz zu Bemerkung 9.5 hängt das Vorzeichen hier nicht von  $k$  und  $q$  ab).

- (iii) Die Rechnungen aus Definition 9.6 ergeben  $\mathrm{GO}(V, \rho) = \mathrm{SO}(V, \rho) \cong \mathrm{PSO}(V, \rho)$ . Für  $f \in \mathrm{GO}(V)$  sei  $\mathrm{Fix}(f) := \{v \in V : f(v) = v\} \leq V$ . Man zeigt, dass die sogenannte *Quasideterminante* (oder *Dickson-Invariante*)

$$\mathrm{GO}(V, \rho) \rightarrow \{\pm 1\}, \quad f \mapsto (-1)^{\dim \mathrm{Fix}(f)}$$

ein Homomorphismus ist. Der Kern  $\Omega(n, q, \rho) \leq \mathrm{GO}(n, q, \rho)$  ist abgesehen von kleinen Ausnahmen einfach (siehe Bemerkung 9.10). Für  $n = 2k$  gilt  $|\mathrm{GO}^\pm(2k, q) : \Omega^\pm(2k, q)| = 2$ . Insbesondere ist  $\Omega = \mathrm{GO}'$ .

**Bemerkung 9.10.** Für alle  $q$  gelten folgende Ordnungsformeln:

$$\begin{aligned}|\Omega(2k+1, q)| &= \frac{q^{k^2}}{\mathrm{ggT}(2, q-1)} \prod_{i=1}^k (q^{2i} - 1), \\ |\Omega^\pm(2k, q)| &= \frac{q^{k(k-1)}(q^k \mp 1)}{\mathrm{ggT}(4, q \mp 1)} \prod_{i=1}^{k-1} (q^{2i} - 1).\end{aligned}$$

Diese Gruppen liefern erst für  $n \geq 7$  „neue“ Familien von einfachen Gruppen, denn

$$\begin{array}{lll} \mathrm{P}\Omega(3, q) \cong \mathrm{PSL}(2, q), & \mathrm{P}\Omega^+(4, q) \cong \mathrm{PSL}(2, q)^2, & \mathrm{P}\Omega^-(4, q) \cong \mathrm{PSL}(2, q^2), \\ \mathrm{P}\Omega(5, q) \cong \mathrm{PSp}(4, q), & \mathrm{P}\Omega^+(6, q) \cong \mathrm{PSL}(4, q), & \mathrm{P}\Omega^-(6, q) \cong \mathrm{PSU}(4, q). \end{array}$$

Die kleinsten Gruppen dieser Art sind  $\mathrm{P}\Omega^+(8, 2)$ ,  $\mathrm{P}\Omega^-(8, 2)$  und  $\mathrm{P}\Omega(7, 3)$  mit den Ordnungen 174.182.400, 197.406.720 und 4.585.351.680.

## 10 Sporadische Gruppen

**Bemerkung 10.1.** Nach der Klassifikation der endlichen einfachen Gruppen (CFSG) gibt es neben  $C_p$ ,  $A_n$  und den Gruppen vom Lie-Typ noch 26 *sporadische* Gruppen, die zu keiner der Familien gehören. Wir konstruieren in diesem Kapitel fünf sporadischen Gruppen, die gleichzeitig interessante mehrfach-transitive Gruppen sind. Wir wählen zuerst einen möglichst direkten Weg mit einem „maßgeschneiderten“ Lemma von Witt. Anschließend beschreiben wir einen kombinatorischen Ansatz, mit dem auch andere sporadische Gruppen konstruiert werden können.



**Definition 10.2.** Eine  $k$ -transitive Operation  $G \rightarrow \text{Sym}(\Omega)$  heißt *scharf  $k$ -transitiv*, wenn für zwei  $k$ -Tupel  $(\alpha_1, \dots, \alpha_k)$  und  $(\beta_1, \dots, \beta_k)$  mit paarweise verschiedenen Elementen *genau* ein  $g \in G$  mit  ${}^g\alpha_i = \beta_i$  für  $i = 1, \dots, k$  existiert.

**Bemerkung 10.3.** Jede scharf  $k$ -transitive Operation ist treu. Die scharf 1-transitiven Operationen sind genau die regulären Operationen. Sei  $G \rightarrow \text{Sym}(\Omega)$  transitiv,  $\omega \in \Omega$  und  $k \geq 2$ . Wie in GT-Lemma 6.33 zeigt man, dass  $G$  genau dann scharf  $k$ -transitiv auf  $\Omega$  operiert, wenn  $G_\omega$  scharf  $(k-1)$ -transitiv auf  $\Omega \setminus \{\omega\}$  operiert. Induktiv erhält man, dass eine  $k$ -transitive Operation vom Grad  $n$  genau dann scharf  $k$ -transitiv ist, wenn  $|G| = n(n-1) \dots (n-k+1)$  gilt (vgl. GT-Lemma 6.34).

**Beispiel 10.4.**

- (i) Die natürliche Operation der  $S_n$  auf  $\{1, \dots, n\}$  ist scharf  $n$ -transitiv und scharf  $(n-1)$ -transitiv, falls  $n \geq 2$ .
- (ii) Die natürliche Operation von  $A_n$  ist scharf  $(n-2)$ -transitiv, falls  $n \geq 2$  (siehe GT-Beispiel 6.32).
- (iii) Sei  $n \in \mathbb{N}$ ,  $p$  eine Primzahl und  $S \leq \text{GL}(n, p)$  ein Singer-Zyklus (GT-Beispiel 6.23). Dann ist  $\mathbb{F}_p^n \rtimes S \leq \text{AGL}(n, p)$  eine scharf 2-transitive Permutationsgruppe auf  $\mathbb{F}_p^n$ .
- (iv) Nach GT-Aufgabe 49 operiert  $\text{SL}(2, 2^n)$  3-transitiv auf der Menge  $\Omega$  aller 1-dimensionalen Unterräume von  $\mathbb{F}_{2^n}^2$ . Wegen  $|\Omega| = 2^n + 1$  und  $|\text{SL}(2, 2^n)| = (2^{2n} - 1)2^n = (2^n + 1)2^n(2^n - 1)$  ist diese Operation scharf 3-transitiv.

**Lemma 10.5.** Sei  $\alpha, \beta \in \Omega$ ,  $H \leq G \leq \text{Sym}(\Omega)$  und  $a, x \in G$  mit folgenden Eigenschaften:

- $\alpha \neq \beta$ ,  ${}^a\alpha \neq \alpha$  und  ${}^x\beta \neq \beta$ ,
- $x \in H$  und  $G = \langle H, a \rangle$ ,
- $aH_\beta a = H_\beta$ ,
- $H$  operiert  $k$ -transitiv auf  $\Omega \setminus \{\alpha\}$  mit  $k \geq 2$ ,
- $a^2 = x^2 = (ax)^3 = 1$ .

Dann operiert  $G$   $(k+1)$ -transitiv auf  $\Omega$  und  $G_\alpha = H$ .

*Beweis.* Wegen  $H \subseteq G_\alpha$  ist  $G_\alpha$   $k$ -transitiv auf  $\Omega \setminus \{\alpha\}$ . Wegen  ${}^a\alpha \neq \alpha$  ist  $G$  offenbar auch transitiv auf  $\Omega$ . Aus GT-Lemma 6.33 folgt, dass  $G$   $(k+1)$ -transitiv operiert. Es bleibt zu zeigen:  $G_\alpha \subseteq H$ .

Für  $K := H \cup HaH$  ist  $K^{-1} := \{g^{-1} : g \in K\} = K$  wegen  $a^{-1} = a$ . Sei  $z \in H \setminus H_\beta$ . Wegen  $k \geq 2$  operiert  $H_\beta$  transitiv auf  $\Omega \setminus \{\alpha, \beta\}$ . Also existiert ein  $h \in H_\beta$  mit  ${}^{hz}\beta = {}^x\beta$ . Es folgt  $x^{-1}hz \in H_\beta$  und  $z \in H_\beta x H_\beta$ . Dies zeigt  $H = H_\beta \cup H_\beta x H_\beta$ . Die Relationen  $a^2 = x^2 = (ax)^3 = 1$  implizieren  $axa = xax$ . Nach Voraussetzung erhalten wir

$$\begin{aligned} aHa &= aH_\beta a \cup aH_\beta x H_\beta a = H_\beta \cup H_\beta axa H_\beta \\ &= H_\beta \cup H_\beta xax H_\beta \subseteq H \cup HaH = K. \end{aligned}$$

Für  $g, g' \in HaH$  ist also  $gg' \in HaHaH \subseteq HKH \subseteq K$ . Dies zeigt  $K \leq G$ . Wegen  $a \in K$  ist sogar  $G = \langle H, a \rangle = K$ . Für jedes  $g \in G \setminus H \subseteq HaH$  ist also  ${}^g\alpha \neq \alpha$ . Dies zeigt die Behauptung.  $\square$

**Lemma 10.6** (WITT). *Sei  $H$  eine 2-transitive Permutationsgruppe auf  $\Delta := \{4, \dots, n\} \ni \omega$  und sei  $x \in H \setminus H_\omega$  eine Involution. Seien  $a, b, c \in N_{S_n}(H_\omega)$  Involutionen mit*

$$a = (1, \omega)(2)(3) \dots, \quad b = (1, 2)(3)(\omega) \dots, \quad c = (2, 3)(1)(\omega) \dots$$

und

$$(ax)^3 = (ba)^3 = (cb)^3 = 1, \quad (xb)^2 = (xc)^2 = (ac)^2 = 1.$$

Dann ist  $G := \langle H, a, b, c \rangle$  5-transitiv auf  $\{1, \dots, n\}$  und  $G_1 \cap G_2 \cap G_3 = H$ .

*Beweis.* Nach Lemma 10.5 mit  $(\alpha, \beta) = (1, \omega)$  ist  $K := \langle H, a \rangle$  3-transitiv auf  $\Delta \cup \{1\}$  und  $K_1 = H$ . Nach GT-Satz 6.35 operiert  $H$  primitiv auf  $\Delta$ . Insbesondere ist  $H_\omega < H$  maximal und  $H = \langle H_\omega, x \rangle$ . Aus  $x^2 = (xb)^2 = b^2 = 1$  folgt  $xb = bx$ . Daher ist

$$bK_1b = bHb = \langle bH_\omega b, x \rangle = \langle H_\omega, x \rangle = H = K_1.$$

Eine weitere Anwendung von Lemma 10.5 mit  $(b, a, 2, 1)$  anstelle von  $(a, x, \alpha, \beta)$  zeigt, dass  $L := \langle K, b \rangle$  4-transitiv auf  $\Delta \cup \{1, 2\}$  operiert mit  $L_2 = K$ . Aus den Relationen folgt nun wieder  $ac = ca$  und  $xc = cx$ . Also ist

$$cL_2c = cKc = \langle cHc, a \rangle = \langle cH_\omega c, x, a \rangle = \langle H_\omega, x, a \rangle = K = L_2.$$

Eine dritte Anwendung von Lemma 10.5 mit  $(c, b, 3, 2)$  anstelle von  $(a, x, \alpha, \beta)$  ergibt schließlich, dass  $G = \langle L, c \rangle$  5-transitiv auf  $\{1, \dots, n\}$  operiert mit  $G_3 = L$ . Damit ist auch  $G_1 \cap G_2 \cap G_3 = G_1 \cap L_2 = G_1 \cap K = K_1 = H$ .  $\square$

**Satz 10.7** (MATHIEU). *Sei*

$$\begin{aligned} a &= (1, 4)(7, 8)(9, 11)(10, 12), & b &= (1, 2)(7, 10)(8, 11)(9, 12), \\ c &= (2, 3)(7, 12)(8, 10)(9, 11), & d &= (4, 5, 6)(7, 8, 9)(10, 11, 12), \\ e &= (4, 7, 10)(5, 8, 11)(6, 9, 12), & f &= (5, 7, 6, 10)(8, 9, 12, 11), \\ g &= (5, 8, 6, 12)(7, 11, 10, 9). \end{aligned}$$

Dann ist  $M_{12} := \langle a, b, c, d, e, f, g \rangle \leq S_{12}$  scharf 5-transitiv vom Grad 12 und  $M_{11} := \langle a, b, d, e, f, g \rangle$  ist scharf 4-transitiv vom Grad 11.

*Beweis.* Da  $d$  die drei Zyklen von  $e$  permutiert, ist  $E := \langle d, e \rangle$  elementarabelsch der Ordnung 9. Außerdem operiert  $E$  regulär auf  $\Delta := \{4, \dots, 12\}$ . Offenbar ist  $f^2 = g^2$  eine Involution und  $fgf^{-1} = g^{-1}$ . Für  $Q := \langle f, g \rangle$  gilt also  $\langle g \rangle \trianglelefteq Q$  und  $|Q : \langle g \rangle| = 2$ . Also ist  $|Q| = 8$  ( $Q$  ist eine Quaternionengruppe). Eine Rechnung zeigt

$$\begin{aligned} fdf^{-1} &= e, & gdg^{-1} &= (4, 8, 12)(11, 6, 7)(9, 10, 5) = de, \\ fef^{-1} &= d^{-1}, & geg^{-1} &= (4, 11, 9)(8, 6, 10)(12, 7, 5) = de^{-1}. \end{aligned}$$

Also ist  $Q \subseteq N_{S_{12}}(E)$  und  $H := EQ \leq S_{12}$ . Aus Ordnungsgründen ist  $E \cap Q = 1$  und somit  $|H| = |E||Q| = 9 \cdot 8$ . Da  $E$  regulär auf  $\Delta$  operiert, ist  $H_4 = E_4Q = Q$ . Man sieht leicht, dass  $Q$  transitiv auf  $\Delta \setminus \{4\}$  operiert. Also ist  $H$  2-transitiv auf  $\Delta$  nach GT-Lemma 6.33. Wegen  $|H| = 9 \cdot 8$  und  $|\Omega| = 9$  ist die Operation sogar scharf 2-transitiv. Wir wollen nun Witts Lemma mit  $\omega = 4$  und

$$x := df^2d^{-1} = d(5, 6)(7, 10)(8, 12)(9, 11)d^{-1} = (4, 6)(7, 12)(8, 11)(9, 10) \in H \setminus H_4$$

anwenden. Dafür müssen wir zunächst  $a, b, c \in N_{S_{12}}(H_4) = N_{S_{12}}(Q)$  zeigen:

$$\begin{aligned}afa^{-1} &= g, & aga^{-1} &= a^2fa^{-2} = f, \\ bfb^{-1} &= f^{-1}, & bgb^{-1} &= (5, 11, 6, 9)(7, 12, 10, 8) = gf, \\ cfc^{-1} &= g^{-1}, & cgc^{-1} &= c^2f^{-1}c^{-2} = f^{-1}.\end{aligned}$$

Die Relationen aus Lemma 10.6 überprüft man wie folgt:

$$\begin{aligned}ax &= (1, 4, 6)(7, 10, 11)(8, 9, 12), & ba &= (1, 4, 2)(7, 11, 12)(8, 10, 9), \\ cb &= (1, 3, 2)(7, 8, 9)(10, 12, 11), & xb &= (1, 2)(4, 6)(7, 9)(10, 12), \\ xc &= (2, 3)(4, 6)(8, 9)(10, 11), & ac &= (1, 4)(2, 3)(7, 10)(8, 12).\end{aligned}$$

Also ist  $G := \langle H, a, b, c \rangle = M_{12}$  5-transitiv auf  $\Omega = \{1, \dots, 12\}$  und  $G_1 \cap G_2 \cap G_3 = H$ . Da  $H$  scharf 2-transitiv auf  $\Omega$  operiert, ist  $G_1 \cap G_2 \cap G_3 \cap G_4 \cap G_5 = H_4 \cap H_5 = 1$ . Dies zeigt, dass  $G$  sogar scharf 5-transitiv ist. Im Beweis von Lemma 10.6 ergab sich  $G_3 = M_{11}$ . Nach Bemerkung 10.3 ist  $M_{11}$  also scharf 4-transitiv vom Grad 11.  $\square$

**Bemerkung 10.8.** In der Gruppentheorie haben wir gezeigt, dass die einfache Gruppe  $H = \text{PSL}(3, 4)$  der Ordnung

$$|H| = \frac{(4^3 - 1)(4^3 - 4)(4^3 - 4^2)}{(4 - 1) \text{ggT}(3, 4 - 1)} = 2^6 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 = 20.160$$

2-transitiv auf der Menge  $\Delta$  der 21 1-dimensionalen Unterräume von  $\mathbb{F}_4^3$  operiert (Beweis von GT-Lemma 10.7). Um Vektoren von Permutationen zu unterscheiden, schreiben wir die Elemente von  $\mathbb{F}_4^3$  in der Form  $[r, s, t]$  mit  $r, s, t \in \mathbb{F}_4$ . Sei außerdem  $\mathbb{F}_4^\times = \langle \zeta \rangle$  und  $[[r, s, t]] = \mathbb{F}_4[r, s, t] \in \Delta$ .

**Lemma 10.9.** *Mit den Bezeichnungen aus Bemerkung 10.8 sind folgende Abbildungen Involutionen in  $\text{Sym}(\Delta)$ :*

$$\alpha[[r, s, t]] := [[r^2 + st, s^2, t^2]], \quad \beta[[r, s, t]] := [[r^2, s^2, t^2\zeta]], \quad \gamma[[r, s, t]] := [[r^2, s^2, t^2]]$$

für  $r, s, t \in \mathbb{F}_4$ .

*Beweis.* Da die Werte von  $\alpha$ ,  $\beta$  und  $\gamma$  homogene Polynome vom Grad 2 in  $r, s, t$  sind, hängen die Bilder von  $[[r, s, t]] = \mathbb{F}_4[r, s, t]$  nicht von der Wahl des Repräsentanten  $[r, s, t]$  ab (d. h.  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  sind wohldefiniert). Bekanntlich ist  $\mathbb{F}_4 \rightarrow \mathbb{F}_4$ ,  $x \mapsto x^2$  der Frobenius-Automorphismus (der Ordnung 2). Daher gilt

$$\begin{aligned}\alpha^2[[r, s, t]] &= \alpha[[r^2 + st, s^2, t^2]] = [[r + s^2t^2 + s^2t^2, s, t]] = [[r, s, t]], \\ \beta^2[[r, s, t]] &= \beta[[r^2, s^2, t^2\zeta]] = [[r, s, t\zeta^2\zeta]] = [[r, s, t]], \\ \gamma^2[[r, s, t]] &= [[r, s, t]].\end{aligned}$$

Folglich sind  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  invertierbar und haben Ordnung 2.  $\square$

**Satz 10.10** (MATHIEU). *Sei  $\text{PSL}(3, 4) \cong H \leq \text{Sym}(\Delta)$  wie in Bemerkung 10.8 und  $\Omega = \Delta \cup \{1, 2, 3\}$ . Mit den Bezeichnungen aus Lemma 10.9 sei  $a := (1, [[1, 0, 0]])\alpha$ ,  $b := (1, 2)\beta$  und  $c := (2, 3)\gamma$ . Dann gilt:*

- (i)  $M_{22} := \langle H, a \rangle$  ist 3-transitiv auf  $\Delta \cup \{1\}$ .
- (ii)  $M_{23} := \langle H, a, b \rangle$  ist 4-transitiv auf  $\Omega \setminus \{3\}$ .

(iii)  $M_{24} := \langle H, a, b, c \rangle$  ist 5-transitiv auf  $\Omega$ .

*Beweis.* Wir benutzen Witts Lemma mit  $\omega = [[1, 0, 0]] \in \Delta$  und

$$x := \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \mathbb{F}_4^\times \in \text{PSL}(3, 4).$$

Nach Lemma 10.9 sind  $a, b, c, x$  Involutionen. Offenbar ist  ${}^b\omega = {}^c\omega = \omega$ . Sei  $F$  der Frobenius-Automorphismus auf  $H$  (bzw.  $\text{SL}(3, 4)$ ). Für  $h \in H$  und  $[[r, s, t]] \in \Delta$  gilt  ${}^{hc}[[r, s, t]] = {}^c[h[r^2, s^2, t^2]] = [F(h)[r, s, t]]$ . Dies zeigt  $cHc^{-1} = H$  und  $c \in N_{24}(H_\omega)$ . Sei  $y := \text{diag}(1, 1, \zeta) \in \text{GL}(3, 4)$ . Dann gilt

$${}^{bhb}[[r, s, t]] = {}^b[h[r^2, s^2, t^2\zeta]] = [yF(h)y^{-1}[r, s, t]].$$

Wegen  $yF(h)y^{-1} \in H$  ist auch  $b \in \S_{24}(H_\omega)$ . Außerdem gilt  ${}^{aha}\omega = {}^{ah}1 = {}^a1 = \omega$ . Ein Element  $h \in H_\omega$  hat die Form  ${}^h[[r, s, t]] = [[r + \sigma s + \tau t, \rho_1 s + \rho_2 t, \rho_3 s + \rho_4 t]]$  mit  $\rho_1 \rho_4 + \rho_2 \rho_3 = \det(h) = 1$ . Eine Rechnung zeigt

$$\begin{aligned} {}^{aha}[[r, s, t]] &= {}^{ah}[[r^2 + st, s^2, t^2]] = {}^a[[r^2 + st + \sigma s^2 + \tau t^2, \rho_1 s^2 + \rho_2 t^2, \rho_3 s^2 + \rho_4 t^2]] \\ &= [[r + s^2 t^2 + \sigma^2 s + \tau^2 t + (\rho_1 s^2 + \rho_2 t^2)(\rho_3 s^2 + \rho_4 t^2), \rho_1^2 s + \rho_2^2 t, \rho_3^2 s + \rho_4^2 t]] \\ &= [[r + (\sigma^2 + \rho_1 \rho_3)s + (\tau^2 + \rho_2 \rho_4)t, \rho_1^2 s + \rho_2^2 t, \rho_3^2 s + \rho_4^2 t]]. \end{aligned}$$

Also entspricht  $aha$  der Matrix

$$\begin{pmatrix} 1 & \sigma^2 + \rho_1 \rho_3 & \tau^2 + \rho_2 \rho_4 \\ 0 & \rho_1^2 & \rho_2^2 \\ 0 & \rho_3^2 & \rho_4^2 \end{pmatrix} \in H_\omega,$$

denn  $\det(aha) = \rho_1^2 \rho_4^2 + \rho_2^2 \rho_3^2 = \det(h)^2 = 1$ . Wieder folgt  $c \in N_{S_{24}}(H_\omega)$ .

Offenbar gilt  $xb = bx$ ,  $xc = cx$  und  $ac = ca$ . Dies zeigt  $(xb)^2 = (xc)^2 = (ac)^2 = 1$ . Es verbleibt zu zeigen:  $(ax)^3 = (ba)^3 = (cb)^3 = 1$ . Dies ergibt aus den folgenden Rechnungen:

$$\begin{aligned} {}^{cbc}[[r, s, t]] &= {}^c[[r, s, t\zeta]] = [[r^2, s^2, t^2\zeta^2]] = {}^b[[r, s, t\zeta^2]] = {}^{bcb}[[r, s, t]], \\ {}^{bab}[[r, s, t]] &= {}^b[[r + s^2 t^2 \zeta, s, t\zeta^2]] = [[r^2 + st\zeta^2, s^2, t^2\zeta^2]]^{1+\zeta=\zeta^2} {}^a[[r + s^2 t^2, s, t\zeta]] = {}^{aba}[[r, s, t]], \\ {}^{axa}1 &= {}^a[[0, 1, 0]] = [[0, 1, 0]] = {}^{xax}1, \\ {}^{axa}[[1, 0, 0]] &= [[1, 0, 0]] = {}^{xax}[[1, 0, 0]], \\ {}^{axa}[[0, 1, 0]] &= 1 = {}^{xax}[[1, 0, 0]], \\ {}^{axa}[[r, s, t]] &= {}^a[[s^2, r^2 + st, t^2]] = [[s + r^2 t^2 + st^3, r + s^2 t^2, t]] \\ &= \left\{ \begin{array}{l} [[r^2, s^2 + rt, t^2]] \text{ falls } t \neq 0, \\ [[s, r, 0]] \text{ falls } t = 0 \neq rs \end{array} \right\} = {}^x[[s^2 + rt, r^2, t^2]] = {}^{xax}[[r, s, t]]. \end{aligned}$$

Witts Lemma zeigt nun, dass  $M_{24}$  5-transitiv auf  $\Omega$  operiert. Aus den Beweis von Witts Lemma erhält man  $(M_{24})_3 = M_{23}$  und  $M_{22} = (M_{23})_2$ . Damit folgen die restlichen Aussagen.  $\square$

**Definition 10.11.** Man nennt  $M_{11}$ ,  $M_{12}$ ,  $M_{22}$ ,  $M_{23}$  und  $M_{24}$  die *Mathieugruppen* vom Grad 11, 12, 22, 23 bzw. 24. Aus Bemerkung 10.3 ergibt sich

$$\begin{aligned} |M_{11}| &= 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 = 7.920 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 11, \\ |M_{12}| &= 12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 = 95.040 = 2^6 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 11, \\ |M_{22}| &= 22|\text{PSL}(3, 4)| = 443.520 = 2^7 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11, \\ |M_{23}| &= 23|M_{22}| = 10.200.960 = 2^7 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 23, \\ |M_{24}| &= 24|M_{23}| = 244.823.040 = 2^{10} \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 23. \end{aligned}$$

**Lemma 10.12.** Sei  $G \leq \text{Sym}(\Omega)$  3-transitiv vom Grad  $d = |\Omega| \geq 5$ . Ist  $G_\omega$  einfach für ein  $\omega \in \Omega$ , so ist  $G$  einfach oder  $d$  ist eine 2-Potenz.

*Beweis.* Der Beweis funktioniert wie bei der Einfachheit der alternierenden Gruppen. Sei  $1 \neq N \trianglelefteq G$ . Nach GT-Satz 6.20 operiert  $N$  transitiv. Das Frattini-Argument liefert  $G = G_\omega N$ . Wir können indirekt  $G_\omega \not\leq N$  annehmen. Aus der Einfachheit von  $G_\omega$  folgt  $N_\omega = G_\omega \cap N = 1$ . Also ist  $N$  ein regulärer Normalteiler und  $|N| = d \geq 5$ . Nach GT-Lemma 6.19 operiert  $G_\omega$  2-transitiv auf  $N \setminus \{1\}$  durch Konjugation. Aus GT-Satz 6.36 folgt  $d = |N| = 2^k$  für ein  $k \in \mathbb{N}$ .  $\square$

**Beispiel 10.13.** Sei  $d = 2^n \geq 8$  und  $\Omega := \mathbb{F}_2^n$ . Nach linearer Algebra operiert die einfache Gruppe  $\text{GL}(n, 2)$  2-transitiv auf  $\Omega \setminus \{0\}$ . Daher operiert die nicht-einfache Gruppe  $\text{AGL}(n, 2) = \mathbb{F}_2^n \rtimes \text{GL}(n, 2)$  3-transitiv auf  $\Omega$  mit Stabilisator  $G_0 = \text{GL}(n, 2)$  (GT-Beispiel 6.23).

**Satz 10.14.** Die Mathieugruppen  $M_{11}$ ,  $M_{12}$ ,  $M_{22}$ ,  $M_{23}$  und  $M_{24}$  sind einfach.

*Beweis* (CHAPMAN). Sei zunächst  $G = M_{11}$  und  $P \in \text{Syl}_{11}(G)$ . In  $S_{11}$  gibt es  $10!$  Elemente der Ordnung 11, die sich auf  $9!$  Sylowgruppen verteilen. Also ist  $|\text{N}_{S_{11}}(P)| = 11 \cdot 10$  und  $|\text{N}_G(P) : P|$  teilt 10. Nach Sylow ist

$$5 \equiv 10 \cdot 9 \cdot 8 = \frac{|G|}{11} = |G : \text{N}_G(P)| |\text{N}_G(P) : P| \equiv |\text{N}_G(P) : P| \pmod{11}$$

und somit  $|\text{N}_G(P) : P| = 5$  und  $|G : \text{N}_G(P)| = 16 \cdot 9$ . Sei nun  $1 \neq N \trianglelefteq G$ . Dann ist  $N$  transitiv und alle 11-Sylowgruppen von  $G$  liegen in  $N$ . Insbesondere ist  $|N : \text{N}_N(P)| = 16 \cdot 9$ . Dies zeigt  $|G : N| \leq 5$ . Nehmen wir  $|G : N| = 5$  an. Dann besitzt  $N$  genau  $16 \cdot 9 \cdot 10$  Elemente der Ordnung 11. Die übrigen  $|N|/11$  Elemente müssen dann den Stabilisator  $N_1$  bilden. Insbesondere ist  $N_1 = \dots = N_{11}$ . Dann kann  $N$  aber nicht treu operieren. Also ist  $G = N$  und  $G$  ist einfach.

Die Einfachheit von  $M_{12}$  folgt nun aus Lemma 10.12, da  $M_{11}$  ein Stabilisator von  $M_{12}$  ist. Da  $\text{PSL}(3, 4)$  einfach ist, kann man mit Lemma 10.12 auch die Einfachheit von  $M_{22}$ ,  $M_{23}$  und  $M_{24}$  zeigen.  $\square$

**Bemerkung 10.15.**

- (i) Gelegentlich definiert man die Mathieugruppen  $M_9$ ,  $M_{10}$ ,  $M_{20}$  und  $M_{21} \cong \text{PSL}(3, 4)$  als geeignete Stabilisatoren der größeren Mathieugruppen. Sie sind jedoch keine sporadisch einfachen Gruppen. Im Beweis von Satz 10.7 haben wir  $M_9 \cong C_3^2 \rtimes Q_8$  als scharf 2-transitive Gruppe vom Grad 9 konstruiert. Insbesondere ist  $M_9$  eine Frobeniusgruppe.

- (ii) Man kann (elementar) zeigen, dass  $S_k, S_{k+1}, A_{k+2}, M_{11}$  und  $M_{12}$  die einzigen scharf  $k$ -transitiven Permutationsgruppen mit  $k \geq 4$  sind.<sup>17</sup> Mit der CFSG konnte man zeigen, dass  $S_n, A_n, M_{11}, M_{12}, M_{23}$  und  $M_{24}$  die einzigen 4-transitiven Permutationsgruppen sind.
- (iii) Man kann die Mathieugruppen auch jeweils mit nur zwei Permutationen erzeugen, aber dann ist es schwierig die Struktur (geschweige denn die Ordnung) zu bestimmen. Tatsächlich stieß Mathieus Arbeit von 1861 lange Zeit auf Unverständnis. So behauptete MILLER 1898  $M_{24}$  würde nicht existieren. Nach der CFSG weiß man, dass sich jede endliche einfache Gruppe mit einer Involution und einem weiteren Element mit Primzahlordnung erzeugen lässt.
- (iv) Die nachfolgende Definition lässt sich folgendermaßen motivieren: Wie viele Lotto-Scheine muss man kaufen, wenn man garantiert vier „Richtige“ haben will? Im besten Fall kommt jede 4er Kombination nur auf einem Tippschein vor (ob das möglich ist, sehen wir in Beispiel 10.19).

**Definition 10.16.** Ein  $((t, k, v)$ -*Steinersystem* ist ein Paar  $S = (\Omega, \mathcal{B})$  mit folgenden Eigenschaften:

- $\Omega$  ist eine  $v$ -elementige Menge von „Punkten“ (engl. vertices).
- $\mathcal{B}$  ist eine Menge von  $k$ -elementigen Teilmengen von  $\Omega$ , die „Blöcke“ genannt werden.<sup>18</sup>
- Jede  $t$ -elementige Teilmenge von  $\Omega$  liegt in genau einem Block von  $\mathcal{B}$ .

Man nennt

$$\text{Aut}(S) := \{\sigma \in \text{Sym}(\Omega) : \forall B \in \mathcal{B} : \sigma(B) \in \mathcal{B}\} \leq \text{Sym}(\Omega)$$

die *Automorphismengruppe* von  $S$ .

**Beispiel 10.17.**

- (i)  $(t, k, v)$ -Steinersysteme können offensichtlich nur für  $t \leq k \leq v$  existieren. Im Fall  $t = k$  ist  $\mathcal{B}$  die Menge aller  $k$ -elementigen Teilmengen von  $\Omega$  und  $\text{Aut}(S) = \text{Sym}(\Omega)$ . Im Fall  $k = v$  ist  $\mathcal{B} = \{\Omega\}$  und  $\text{Aut}(S) = \text{Sym}(\Omega)$ . Diese Steinersysteme nennt man *trivial*. Wir können also  $t < k < v$  annehmen.
- (ii) Im Fall  $t = 1$  ist  $\mathcal{B}$  eine Partition von  $\Omega$  und es folgt  $k \mid v$ . Die Anzahl dieser Steinersysteme ist die Stirling-Zahl<sup>19</sup> der zweiten Art  $\left\{ \begin{smallmatrix} v \\ k \end{smallmatrix} \right\}$ . Wir sehen in Lemma 10.18, dass es im Allgemeinen starke Einschränkungen an  $t, k, v$  gibt.
- (iii) Sei  $q$  eine Primzahlpotenz,  $n \geq 2$ ,  $\Omega = \mathbb{F}_q^n$  und

$$\mathcal{B} = \{\mathbb{F}_q v + w : v, w \in \Omega, v \neq 0\}$$

die Menge der „Geraden“ auf  $\Omega$  (man ersetze gedanklich  $\mathbb{F}_q$  durch  $\mathbb{R}$ ). Da je zwei verschiedene Punkte auf genau einer Geraden liegen, ist  $S = (\Omega, \mathcal{B})$  ein  $(2, q, q^n)$ -Steinersystem. Man nennt  $S$  *affine Ebene* über  $\mathbb{F}_q$ .<sup>20</sup>


<sup>17</sup>Siehe Skript zu Permutationsgruppen.

<sup>18</sup>Dies hat nichts mit den Blöcken einer imprimitiven Operation zu tun.

<sup>19</sup>Siehe Skript zur Diskreten Mathematik.

<sup>20</sup>Siehe Skript zur synthetischen Geometrie.

- (iv) Sei  $n \geq 3$ ,  $\Omega = \{\mathbb{F}_q v : v \in \mathbb{F}_q^n \setminus \{0\}\}$  die Menge der 1-dimensionalen Unterräume von  $\mathbb{F}_q^n$  und  $\mathcal{B}$  die Menge der 2-dimensionalen Unterräume von  $\mathbb{F}_q^n$  (formal: jeder Block besteht aus den 1-dimensionalen Unterräumen eines 2-dimensionalen Raums). Da je zwei linear unabhängige Vektoren einen 2-dimensionalen Unterraum aufspannen, ist  $S = (\Omega, \mathcal{B})$  ein  $(2, q+1, \frac{q^n-1}{q-1})$ -Steinersystem. Man nennt  $S$  *projektive Ebene* über  $\mathbb{F}_q$ . Für  $(q, n) = (2, 3)$  erhält man die *Fano-Ebene*:



Für  $(q, n) = (2, 4)$  erhält man eine Lösung von KIRKMANS *Schulmädchenproblem*: 15 Mädchen sollen an sieben aufeinanderfolgenden Tagen in Dreiergruppen gehen, sodass je zwei Mädchen nur einmal in der gleichen Dreiergruppe sind.

**Lemma 10.18.** Sei  $S = (\Omega, \mathcal{B})$  ein  $(t, k, v)$ -Steinersystem und  $0 \leq s \leq t$ . Dann gilt:

- (i) Die Anzahl der Blöcke, die eine gegebene  $s$ -elementige Teilmenge von  $\Omega$  enthalten, ist

$$\gamma_s := \frac{(v-s)(v-s-1)\dots(v-t+1)}{(k-s)(k-s-1)\dots(k-t+1)}.$$

- (ii)  $|\mathcal{B}| = \gamma_0 = \frac{v\gamma_1}{k}$ .

- (iii) (FISHERs Ungleichung)  $v \leq |\mathcal{B}|$  und  $k \leq \gamma_1$ .

*Beweis.*

- (i) Jede  $s$ -elementige Teilmenge liegt in genau  $\binom{v-s}{t-s}$   $t$ -elementigen Teilmengen von  $\Omega$ . Jede  $t$ -elementige Teilmenge liegt nach Definition in genau einem Block. Jeder Block enthält genau  $\binom{k-s}{t-s}$   $s$ -elementige Teilmengen. Dies zeigt

$$\gamma_s = \frac{\binom{v-s}{t-s}}{\binom{k-s}{t-s}} = \frac{(v-s)(v-s-1)\dots(v-t+1)}{(k-s)(k-s-1)\dots(k-t+1)}.$$

- (ii) Folgt aus (i).

- (iii) Sei  $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_v\}$  und  $\mathcal{B} = \{B_1, \dots, B_r\}$ . Sei  $M := (m_{ij}) \in \mathbb{Z}^{v \times r}$  die Inzidenzmatrix von  $S$ , d. h.  $m_{ij} = 1$  falls  $\omega_i \in B_j$  und  $m_{ij} = 0$  sonst. Dann gilt

$$MM^t = \left( \sum_{l=1}^r m_{il} m_{jl} \right)_{ij} = \begin{pmatrix} \gamma_1 & \gamma_2 & \cdots & \gamma_2 \\ \gamma_2 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \gamma_2 \\ \gamma_2 & \cdots & \gamma_2 & \gamma_1 \end{pmatrix} = (\gamma_1 - \gamma_2)1_v + \gamma_2 J,$$

wobei  $J = (1) \in \mathbb{Z}^{v \times v}$  die Matrix aus lauter Einsen ist. Nach (i) ist  $\gamma_1 = \frac{v-1}{k-1}\gamma_2 > \gamma_2$ . Die Eigenwerte von  $J$  sind bekanntlich 0 mit Vielfachheit  $v-1$  und  $v$  mit Vielfachheit 1. Daher sind

$\gamma_1 - \gamma_2 > 0$  und  $\gamma_1 - \gamma_2 + \gamma_2 v$  die Eigenwerte von  $MM^t$ . Insbesondere ist  $MM^t$  invertierbar. Dies zeigt

$$v = \text{rk}(MM^t) \leq \text{rk}(M) \leq r = |\mathcal{B}|.$$

Aus (ii) ergibt sich  $k = \frac{v\gamma_1}{r} \leq \gamma_1$ . □

**Beispiel 10.19.** Für die optimale Lösung des Lotto-Problems aus Bemerkung 10.15 benötigt man ein  $(4, 6, 49)$ -Steinersystem. Wegen  $\gamma_3 = \frac{46}{3} \notin \mathbb{N}$  gibt es dies nicht. In jeden Fall benötigt man mindestens

$$\gamma_0 = \frac{49 \cdot 48 \cdot 47 \cdot 46}{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3} > 14.125$$

Tippscheine.<sup>21</sup>

**Bemerkung 10.20.**

- (i) Zur (alternativen) Konstruktion der Mathieugruppen startet man mit der affinen Ebene  $S$  über  $\mathbb{F}_3^2$  als  $(2, 3, 9)$ -Steinersystem. Nun erweitert man  $S$  durch Hinzunahme von drei Punkten zu einem  $(5, 6, 12)$ -Steinersystem  $\hat{S}$  (die Details sind äußerst aufwendig<sup>22</sup>). Anschließend definiert man  $M_{12} := \text{Aut}(\hat{S})$ . Auch die größeren Mathieugruppen lassen sich auf diese Weise gewinnen. Allgemein hat MENDELSON bewiesen, dass jede endliche Gruppe die Automorphismengruppe eines  $(2, 3, v)$ -Steinersystems und eines  $(3, 4, v)$ -Steinersystems ist.
- (ii) Für  $M_{22}$  benutzt man ein  $(3, 6, 22)$ -Steinersystem  $S = (\Omega, \mathcal{B})$  (es gilt  $\text{Aut}(S) \cong M_{22} \rtimes C_2$ ). Nach Lemma 10.18 ist

$$|\mathcal{B}| = \frac{22 \cdot 21 \cdot 20}{6 \cdot 5 \cdot 4} = 77.$$

Sei  $\Gamma$  ein Graph mit Eckenmenge  $\Gamma_E := \Omega \cup \mathcal{B} \cup \{\zeta\}$ , also  $|\Gamma_E| = 22 + 77 + 1 = 100$ . Die Ecke  $\zeta$  sei zu allen  $\omega \in \Omega$  benachbart. Zwei Blöcke sind genau dann benachbart in  $\Gamma$ , wenn sie disjunkt sind. Alle anderen Kanten haben die Form  $(\omega, B) \in \Omega \times \mathcal{B}$  mit  $\omega \in B$ . Nach Aufgabe 33 ist  $\Gamma$  ein 22-regulärer Graph. Man nennt ihn *Higman-Sims-Graph*. Es gilt  $\text{Aut}(\Gamma) = HS \rtimes C_2$ , wobei  $HS$  die sporadisch einfache *Higman-Sims-Gruppe* der Ordnung 44.352.000 ist.

- (iii) Die Mathieugruppen lassen sich auch mit Methoden der Codierungstheorie konstruieren. Der (erweiterte binäre) *Golay-Code* ist der von den Zeilen der Matrix

$$\begin{pmatrix} 1 & . & 1 & . & 1 & 1 & . & . & . & 1 & 1 & . & . & . & . & . & . & . & . & 1 \\ . & 1 & . & 1 & . & 1 & 1 & . & . & . & 1 & 1 & . & . & . & . & . & . & . & 1 \\ . & . & 1 & . & 1 & . & 1 & 1 & . & . & . & 1 & 1 & . & . & . & . & . & . & 1 \\ . & . & . & 1 & . & 1 & . & 1 & 1 & . & . & . & 1 & 1 & . & . & . & . & . & 1 \\ . & . & . & . & 1 & . & 1 & . & 1 & 1 & . & . & . & 1 & 1 & . & . & . & . & 1 \\ . & . & . & . & . & 1 & . & 1 & . & 1 & 1 & . & . & . & 1 & 1 & . & . & . & 1 \\ . & . & . & . & . & . & 1 & . & 1 & . & 1 & 1 & . & . & . & 1 & 1 & . & . & 1 \\ . & . & . & . & . & . & . & 1 & . & 1 & . & 1 & 1 & . & . & . & 1 & 1 & . & 1 \\ . & . & . & . & . & . & . & . & 1 & . & 1 & . & 1 & 1 & . & . & . & 1 & 1 & . & 1 \\ . & . & . & . & . & . & . & . & . & 1 & . & 1 & . & 1 & 1 & . & . & . & 1 & 1 & . & 1 \\ . & . & . & . & . & . & . & . & . & . & 1 & . & 1 & . & 1 & 1 & 1 & . & . & . & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

aufgespannte 12-dimensionale Unterraum  $C \leq \mathbb{F}_2^{24}$ . Man kann zeigen, dass

$$\text{Aut}(C) := \{\sigma \in S_{24} : \forall (c_i) \in C : (c_{\sigma(i)}) \in C\}$$

<sup>21</sup>Man kann zeigen, dass mindestens 14.749 Tipp-Scheine nötig sind. Ob das tatsächlich ausreicht, ist allerdings offen. Siehe [https://l.jcr.dmgordon.org/show\\_cover.php?v=49&k=6&t=4](https://l.jcr.dmgordon.org/show_cover.php?v=49&k=6&t=4).

<sup>22</sup>Siehe [Dixon-Mortimer, *Permutation Groups*, Springer, New York, 1996]. Im Errata wird erwähnt, dass der Beweis von Theorem 6.3B unvollständig ist.



zu  $M_{24}$  isomorph ist. Die Vektoren (*Codewörter*) mit genau acht Einsen in  $C$  entsprechen den Blöcken eines  $(5, 8, 24)$ -Steinersystems (die Positionen der Einsen sind die Blöcke). Der Golay-Code wurde zur Datenübertragung der Voyager-Raumsonden benutzt.

- (iv) Die Automorphismengruppen und Schur-Multiplikatoren sind

| $G$             | $M_{11}$ | $M_{12}$ | $M_{22}$ | $M_{23}$ | $M_{24}$ |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| $\text{Out}(G)$ | 1        | $C_2$    | $C_2$    | 1        | 1        |
| $M(G)$          | 1        | $C_2$    | $C_{12}$ | 1        | 1        |

(ohne Beweis). Für alle sporadisch einfachen Gruppen  $S$  gilt  $|\text{Out}(S)| \leq 2$ . Für die korrekte Berechnung von  $M(M_{22})$  hat man drei Anläufe benötigt. „Schlimmer“ ist nur  $M(M_{21}) = M(\text{PSL}(3, 4)) \cong C_{12} \times C_4$ . In GAP kann man zum Beispiel folgendes anstellen:

```
G:=MathieuGroup(24);;
AllPrimitiveGroups(NrMovedPoints,24,Transitivity,5); #gibt nur eine
PrimitiveIdentification(G); #G=PrimitiveGroup(24,1)
IsSimple(G);
H:=Stabilizer(G,24); #= $M_{23}$ 

LoadPackage("guava",false); #Paket für Codes
C:=ExtendedBinaryGolayCode();
Display(GeneratorMat(C));
A:=AutomorphismGroup(C);
Transitivity(A); #5-transitiv
c:=Positions(Basis(C)[1],Z(2)^0); #Codewort mit genau acht Einsen
B:=Orbit(A,c,OnSets);; #Blöcke des (5,8,24)-Steinersystems
Size(B); #759 =  $(24 \cdot 23 \cdot 22 \cdot 21 \cdot 20)/(8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4)$ 
```

- (v) Eng verwandt mit dem Golay-Code ist das *Leech-Gitter*  $L \leq \mathbb{Z}^{24}$ , welches aus den ganzzahligen Linearkombinationen der Zeilen folgender Matrix besteht:

[illegible]

Sei  $A := \text{Aut}(L) := \{f \in \text{O}(\mathbb{R}^{24}) : f(L) = L\}$ , wobei  $\text{O}(\mathbb{R}^n)$  die orthogonale Gruppe ist (Matrizen  $x$  mit  $xx^t = 1_n$ ). Nach Aufgabe 35 ist  $A$  endlich. Es gilt  $Z(A) = \langle -1_{24} \rangle$  und man nennt  $Co_1 :=$

$A/Z(A)$  die erste *Conway-Gruppe* ( $A$  ist eine Schur-Erweiterung von  $Co_1$ ). Folgende Vektoren liegen in  $L$ :

$$\begin{aligned} u &:= (4, 4, 0, \dots, 0), \\ v &:= (4, -4, 0, \dots, 0), \\ w &:= (5, 1, \dots, 1). \end{aligned}$$

Man nennt  $Co_2 := C_A(u)$  bzw.  $Co_3 := C_A(w)$  die zweite bzw. dritte Conway-Gruppe. Außerdem ist  $McL := C_A(u, w)$  die *McLaughlin-Gruppe* und  $C_A(v, w) \cong HS$ . Alle sind sporadisch einfache Gruppen mit Ordnungen

$$\begin{aligned} |Co_1| &= 2^{21} \cdot 3^9 \cdot 5^4 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 23 = 4.157.776.806.543.360.000, \\ |Co_2| &= 2^{18} \cdot 3^6 \cdot 5^3 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 23 = 42.305.421.312.000, \\ |Co_3| &= 2^{10} \cdot 3^7 \cdot 5^3 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 23 = 495.766.656.000, \\ |McL| &= 2^7 \cdot 3^6 \cdot 5^3 \cdot 7 \cdot 11 = 898.128.000. \end{aligned}$$

- (vi) Erst über 100 Jahre nach Mathieus Arbeit entdeckte JANKO die nächste sporadisch einfache Gruppe  $J_1$ . Sie lässt sich am einfachsten durch eine  $\mathbb{F}_{11}$ -Darstellung definieren:

$$J_1 := \left\langle \begin{pmatrix} . & 1 & . & . & . & . & . \\ . & . & 1 & . & . & . & . \\ . & . & . & 1 & . & . & . \\ . & . & . & . & 1 & . & . \\ . & . & . & . & . & 1 & . \\ . & . & . & . & . & . & 1 \\ 1 & . & . & . & . & . & . \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 & 2 & -1 & -1 & -3 & -1 & -3 \\ -2 & 1 & 1 & 3 & 1 & 3 & 3 \\ -1 & -1 & -3 & -1 & -3 & -3 & 2 \\ -1 & -3 & -1 & -3 & -3 & 2 & -1 \\ -3 & -1 & -3 & -3 & 2 & -1 & -1 \\ 1 & 3 & 3 & -2 & 1 & 1 & 3 \\ 3 & 3 & -2 & 1 & 1 & 3 & 1 \end{pmatrix} \right\rangle \leq \text{GL}(7, 11).$$

Es gilt  $|J_1| = 2^3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 19 = 175.560$ .

- (vii) Die zweite Janko-Gruppe  $J_2$  (auch *Hall-Janko-Gruppe*  $HJ$  genannt) der Ordnung 604.800 wird ähnlich wie  $HS$  als Permutationsgruppe vom Grad  $100 = 63 + 36 + 1$  konstruiert. Sei  $C$  die Menge der Involutionen und  $\mathcal{U}$  die Menge der Untergruppen der Ordnung 168 von  $G = \text{SU}(3, 3)$  (beides sind Konjugationsklassen). Es gilt  $|C| = 63$  und  $|\mathcal{U}| = |G : U| = 36$  sowie  $U \cong \text{GL}(3, 2)$  für  $U \in \mathcal{U}$ . Sei  $\Gamma$  ein Graph mit Eckenmenge  $\Gamma_E := C \cup \mathcal{U} \cup \{\gamma\}$ , wobei  $\gamma$  zu jedem  $U \in \mathcal{U}$  benachbart ist. Zwei Involutionen  $x, y \in C$  sind genau dann benachbart, wenn  $|\langle xy \rangle| = 4$  (d. h.  $\langle x, y \rangle \cong D_8$ ). Zwei Untergruppen  $U_1, U_2 \in \mathcal{U}$  sind genau dann benachbart, wenn  $|U_1 \cap U_2| = 24$ . Schließlich bilden  $(x, U) \in C \times \mathcal{U}$  genau dann eine Kante, wenn  $x \in U$  gilt. Nun ist  $\text{Aut}(\Gamma) \cong J_2 \rtimes C_2$  (siehe Aufgabe 34). Wir haben damit alle einfachen Gruppen der Ordnung  $\leq 10^7$  „konstruiert“ (siehe GT-Anhang). Nach Janko sind auch die sporadischen Gruppen  $J_3$  und  $J_4$  benannt, wobei  $J_4$  die zuletzt konstruierte einfache Gruppe überhaupt ist (Konstruktion 1977 durch NORTON).
- (viii) Präsentationen, Permutations- und Matrixdarstellungen sämtlicher sporadischer Gruppen kann man unter <https://brauer.maths.qmul.ac.uk/Atlas/v3/> nachschlagen oder direkt mit GAP beziehen:

```
LoadPackage("atlasrep");
DisplayAtlasInfo("M24"); #Übersicht Darstellungen, braucht Internet
AtlasGroup("M24", Dimension, 11, Ring, GF(2));
prog:=AtlasProgram("M24", "presentation");;
slp:=StraightLineProgramFromStraightLineDecision(prog.program);;
F:=FreeGroup(2);;
rels:=ResultOfStraightLineProgram(slp, GeneratorsOfGroup(F));;
G:=F/rels;;
PresentationFpGroup(G);
```

```

ct:=CharacterTable("M"); #Charaktertafel des Monsters
PrintFactorsInt(Size(ct)); #Primfaktorisierung der Ordnung
NrConjugacyClasses(ct);
SizesConjugacyClasses(ct);
OrdersClassRepresentatives(ct); #Ordnungen der Elemente bis auf Konjugation

```

- (ix) Erst 2014 konnte KEEVASH zeigen, dass es nicht-triviale  $(t, k, v)$ -Steinersysteme mit  $t \geq 6$  gibt. Tatsächlich sind die Teilbarkeitsbedingungen aus Lemma 10.18 in den „meisten“ Fällen hinreichend für die Existenz eines entsprechenden Steinersystems. Der Beweis ist probabilistisch und nicht konstruktiv.<sup>23</sup> Die Anzahl der  $(2, 3, v)$ -Steinersysteme für  $v \leq 19$  kann man unter OEIS nachschlagen.

## 11 Coxetergruppen

**Bemerkung 11.1.** Die Gruppen, die sich von zwei Involutionen erzeugen lassen, sind bekanntlich genau die Diedergruppen. Wir untersuchen in diesem Abschnitt Gruppen, die sich von endlich vielen Involutionen erzeugen lassen. Diese treten als Symmetriegruppen höher-dimensionaler Räume auf und führen zur Klassifikation der (endlichen) Spiegelungsgruppen.

**Definition 11.2.** Eine Gruppe der Form

$$G = \langle x_1, \dots, x_n \mid (x_i x_j)^{m_{ij}} = 1, 1 \leq i < j \leq n \rangle$$

mit  $2 \leq m_{ij} \leq \infty$  für  $i < j$  und  $m_{ii} = 1$  für  $i = 1, \dots, n$  heißt *Coxetergruppe* vom Rang  $n$ .

**Bemerkung 11.3.**

- (i) Im Folgenden sei  $G = \langle x_1, \dots, x_n \rangle$  stets eine Coxetergruppe (wir identifizieren die Erzeuger  $x_1, \dots, x_n$  der freien Gruppe mit entsprechenden Nebenklassen in  $G$ ). Die Relationen der Form  $(x_i x_j)^\infty = 1$  haben keine Bedeutung und können ignoriert werden. Aus  $m_{ii} = 1$  folgt  $x_i^2 = 1$  für  $i = 1, \dots, n$ . Wegen  $(x_j x_i)^{m_{ij}} = (x_i x_j)^{-m_{ij}} = 1$  definieren wir  $m_{ji} := m_{ij}$  für  $i < j$ . Nach von-Dyck existiert ein Homomorphismus  $f: G \rightarrow \{\pm 1\}$  mit  $f(x_i) = -1$  für  $i = 1, \dots, n$ . Also sind  $x_1, \dots, x_n$  Involutionen in  $G$ . Die Gleichung  $m_{ij} = 2$  besagt, dass  $x_i$  und  $x_j$  vertauschbar sind.
- (ii) Die Relation  $(x_i x_j)^{m_{ij}} = 1$  ist äquivalent zu  $x_i x_j x_i \dots = x_j x_i x_j \dots$ , wobei auf beiden Seiten genau  $m_{ij}$  Faktoren stehen. Sei  $(x_i x_j)_n := x_i x_j x_i \dots$  ein alternierendes Produkt von  $n$  Faktoren. Verzichtet man in der Definition der Coxetergruppen auf die Bedingung  $m_{ii} = 1$ , so erhält man *Artingruppen*:

$$\langle x_1, \dots, x_n \mid (x_i x_j)_{m_{ij}} = (x_j x_i)_{m_{ij}}, 1 \leq i, j \leq n \rangle$$

mit  $2 \leq m_{ij} \leq \infty$ . Die Wahl  $m_{ij} = \infty$  für alle  $i, j$  ergibt die freie Gruppe  $F_n$ . Nach von-Dyck ist jede Coxetergruppe eine Faktorgruppe einer Artingruppe. Im Spezialfall  $m_{ij} = 3$  für  $|i - j| = 1$  und  $m_{ij} = 2$  für  $|i - j| > 1$  spricht man von einer *Zopfgruppe*. Im Gegensatz zu  $S_n$  (Satz 2.18) gilt  $m_{ii} = \infty$  anstatt  $m_{ii} = 1$ . Man kann die Elemente der Zopfgruppe durch „Zöpfe“ mit  $n$  „Strängen“ realisieren. Die Verknüpfung ist das „Verkleben“ der Stränge an deren Enden:

$$x_1 : \begin{array}{c} \text{---} \end{array} \quad x_2 : \begin{array}{c} \text{---} \end{array} \quad x_1^2 : \begin{array}{c} \text{---} \end{array}$$

<sup>23</sup>Dazu ein populärwissenschaftlicher Artikel: [wired.com](http://wired.com)

$$x_1 x_2 x_1 = \text{diagram 1} = \text{diagram 2} = x_2 x_1 x_2$$

Auf diese Gruppen werden wir allerdings nicht weiter eingehen.

### Beispiel 11.4.

- (i)  $G = \langle x, y \mid x^2 = y^2 = (xy)^m = 1 \rangle \cong D_{2m}$  ist eine Coxetergruppe.
- (ii)  $G = \langle x_1, \dots, x_n \mid x_i^2 = (x_i x_j)^2 = 1, i < j \rangle \cong C_2^m$  ist eine Coxetergruppe.
- (iii) Nach Satz 2.18 sind die symmetrischen Gruppen Coxetergruppen mit  $x_i = (i, i+1)$  für  $i = 1, \dots, n-1$ .
- (iv) Im Fall  $m_{ij} = \infty$  für alle  $i < j$  nennt man  $G$  die *universelle* Coxetergruppe vom Rang  $n$ . Für  $n = 2$  erhält man  $D_\infty$ . Jede Coxetergruppe ist eine Faktorgruppe einer universellen Coxetergruppe.
- (v) Eine *Spiegelung*  $\sigma \in \text{GL}(\mathbb{R}^d)$  ist eine Abbildung der Form  $\sigma_b(v) := v - 2[v, b]b$  für einen normierten Vektor  $b \in \mathbb{R}^d$  (hierbei ist  $[v, b]$  das Standardskalarprodukt). Eine *Spiegelungsgruppe* ist eine endliche Untergruppe  $S \leq \text{GL}(\mathbb{R}^d)$ , die von Spiegelungen  $\sigma_1, \dots, \sigma_n$  erzeugt wird. Nach von Dyck ist  $S$  eine Faktorgruppe einer Coxetergruppe. Wir werden in Satz 11.41 zeigen, dass  $S$  tatsächlich zu einer Coxetergruppe isomorph ist (d.h. alle weiteren Relationen in  $S$  folgen aus den Relationen  $(\sigma_i \sigma_j)^{m_{ij}} = 1$ ).
- (vi) Sei  $S$  eine endliche, nicht-abelsche einfache Gruppe. Nach Feit-Thompson besitzt  $S$  eine Involution  $s$ . Offenbar wird  $S$  von allen Konjugierten von  $s$  erzeugt. Also ist  $S$  zu einer Faktorgruppe einer (möglicherweise unendlichen) Coxetergruppe.

**Definition 11.5.** Jedes  $g \in G$  lässt sich in der Form  $g = x_{i_1} \dots x_{i_k}$  schreiben. Ist  $k$  dabei so klein wie möglich, so nennt man diese Darstellung *reduziert* (im Gegensatz zu freien Gruppen sind reduzierte Darstellungen nicht unbedingt eindeutig). Außerdem sei  $l(g) := k$  die *Länge* von  $g$ .

**Lemma 11.6.** Für  $g, h \in G$  und  $1 \leq i \leq n$  gilt

- (i)  $l(gh) \leq l(g) + l(h)$ .
- (ii)  $l(g^{-1}) = l(g)$ .
- (iii)  $l(gx_i) = l(g) \pm 1$ .

*Beweis.* Die ersten beiden Aussagen sind trivial. Sie zeigen

$$l(g) - 1 = l(gx_i x_i) - l(x_i) \leq l(gx_i) \leq l(g) + l(x_i) = l(g) + 1.$$

Der Homomorphismus  $f: G \rightarrow \{\pm 1\}$  aus Bemerkung 11.3 liefert

$$(-1)^{l(gx_i)} = f(gx_i) = -f(g) = -(-1)^{l(g)}$$

und  $l(gx_i) \neq l(g)$ .

**Bemerkung 11.7.** Der Kern des Homomorphismus  $f: G \rightarrow \{\pm 1\}$  ist die Menge der Elemente gerader Länge. Man nennt ihn die *alternierende Untergruppe*. In  $S_n$  gilt  $\text{sgn}(g) = (-1)^{l(g)}$  für  $g \in S_n$ .

**Definition 11.8.** Sei  $V$  ein  $\mathbb{R}$ -Vektorraum mit Basis  $b_1, \dots, b_n$ .

- Wir definieren eine symmetrische Bilinearform auf  $V$  durch

$$[b_i, b_j]_G := [b_i, b_j] = -\cos \frac{\pi}{m_{ij}},$$

wobei  $-\cos \frac{\pi}{\infty} = -1$  gesetzt wird.

- Für  $i = 1, \dots, n$  sei

$$\sigma_i: V \rightarrow V, \quad v \mapsto v - 2[v, b_i]b_i.$$

**Satz 11.9.** Es existiert genau ein Homomorphismus  $\sigma: G \rightarrow \text{GL}(V)$  mit  $\sigma(x_i) = \sigma_i$  für  $i = 1, \dots, n$ . Dabei hat  $\sigma_i \sigma_j$  die Ordnung  $m_{ij}$  für  $1 \leq i, j \leq n$ . Mit der Bezeichnung  ${}^g v := \sigma(g)(v)$  gilt  $[v, w]_G = [{}^g v, {}^g w]_G$ .

*Beweis.* Für  $i = 1, \dots, n$  gilt  $[b_i, b_i] = 1$ . Daher ist  $V_i := b_i^\perp := \text{Ker}(v \mapsto [v, b_i]) \leq V$  eine Hyperebene und  $V = V_i \oplus \mathbb{R}b_i$ . Es gilt  $\sigma_i(b_i) = -b_i$  und  $\sigma_i(v) = v$  für  $v \in V_i$ . Also ist  $\sigma_i$  eine „Spiegelung“ an  $V_i$  (im Gegensatz zum euklidischen Raum ist  $[\cdot, \cdot]_G$  nicht unbedingt positiv definit). Insbesondere hat  $\sigma_i$  Ordnung 2. Sei nun  $i < j$  und  $W := \langle b_i, b_j \rangle$ . Die Definition von  $\sigma_i$  zeigt, dass  $\langle \sigma_i, \sigma_j \rangle$  auf  $W$  operiert.

Sei zunächst  $m_{ij} = \infty$ . Dann gilt

$$(\sigma_i \sigma_j)^k(b_i) = (\sigma_i \sigma_j)^{k-1}(\sigma_i(b_i + 2b_j)) = (\sigma_i \sigma_j)^{k-1}(3b_i + 2b_j) = \dots = (2k+1)b_i + 2kb_j$$

für  $k \geq 1$ . Insbesondere hat  $\sigma_i \sigma_j$  unendliche Ordnung.


Jetzt sei  $m_{ij} < \infty$  und  $\varphi := \pi/m_{ij}$ . Für  $v = \lambda b_i + \mu b_j \in W$  gilt

$$[v, v] = \lambda^2 - 2\lambda\mu \cos \varphi + \mu^2 = (\lambda - \mu \cos \varphi)^2 + \mu^2 \sin^2(\varphi) > 0.$$

Also ist  $[\cdot, \cdot]_G$  auf  $W$  positiv definit und stimmt daher bis auf Basiswahl mit dem Standardskalarprodukt überein. Außerdem ist

$$[b_i, b_j] = -\cos \varphi = \cos(\pi - \varphi),$$

d. h. der „Winkel“ zwischen  $b_i$  und  $b_j$  beträgt  $\pi - \varphi$ . Daher ist  $(\sigma_i \sigma_j)|_W$  eine „Drehung“ um  $2\varphi$  (da die Abbildung linear ist, genügt es die Bilder der beiden linear unabhängigen Spiegelachsen zu betrachten):



Insbesondere hat  $(\sigma_i \sigma_j)|_W$  Ordnung  $m_{ij}$ . Da  $[\cdot, \cdot]_G$  auf  $W$  positiv definit ist, gilt  $V = W \oplus W^\perp = W \oplus (V_i \cap V_j)$ . Da  $\sigma_i \sigma_j$  trivial auf  $V_i \cap V_j$  operiert, hat  $\sigma_i \sigma_j$  auch auf  $V$  Ordnung  $m_{ij}$ . Nach von-Dyck ist  $\sigma$  nun ein Homomorphismus. Für die letzte Aussage berechnen wir

$$\begin{aligned} [\sigma_i(v), \sigma_i(w)] &= [v - 2[v, b_i]b_i, w - 2[w, b_i]b_i] \\ &= [v, w] - 2[v, b_i][b_i, w] - 2[w, b_i][v, b_i] + 4[v, b_i][w, b_i] = [v, w]. \end{aligned} \quad \square$$

**Definition 11.10.**

- Man nennt

$$\Phi := \{^g b_i : 1 \leq i \leq n, g \in G\} \subseteq V$$

das *Wurzelsystem* von  $G$  und seine Elemente heißen *Wurzeln*.

- Eine Wurzel  $v$  lässt sich eindeutig in der Form  $v = \sum_{i=1}^n v_i b_i$  schreiben. Man nennt  $v$  *positiv* (bzw. *negativ*), falls  $v_1, \dots, v_n \geq 0$  (bzw.  $v_1, \dots, v_n \leq 0$ ). Ggf. schreibt man  $v > 0$  (bzw.  $v < 0$ ; der Fall  $v = 0$  ist ausgeschlossen). Die Menge der positiven Wurzeln sei  $\Pi$ .
- Für  $v \in \Phi$  sei

$$\sigma_v : V \rightarrow V, \quad w \mapsto w - 2[w, v]v.$$

**Bemerkung 11.11.**

- Nach Satz 11.9 sind alle Wurzeln von  $G$  normiert bzgl.  $[\cdot, \cdot]_G$ . Insbesondere ist  $\sigma_v(v) = -v$ , d. h.  $\sigma_v$  ist die Spiegelung an der Hyperebene  $v^\perp$ .
- Wegen  $\sigma_i(b_i) = -b_i$  ist  $-\Phi = \Phi$  und  $\sigma_v = \sigma_{-v}$ . Sei  $g \in G$  und  $1 \leq i \leq n$  mit  $v = g(b_i)$ . Dann gilt

$$gx_i g^{-1} w = g(g^{-1} w - 2[g^{-1} w, b_i]b_i) = w - 2[w, ^g b_i]^g b_i = w - 2[w, v]v.$$

Dies zeigt  $\sigma(gx_i g^{-1}) = \sigma_v$ . Wir werden auch  $x_v := gx_i g^{-1}$  als Spiegelung bezeichnen.

**Beispiel 11.12.**

- Sei  $G = \langle x, y \rangle \cong D_{2m}$ ,  $\varphi = \pi - \frac{\pi}{m}$ ,  $b_1 = (1, 0)$  und  $b_2 = (\cos \varphi, \sin \varphi)$ . Dann ist  $[\cdot, \cdot]_G$  das Standardskalarprodukt auf  $\mathbb{R}^2$  bzgl.  $b_1, b_2$  und  $\sigma : G \rightarrow \text{GL}(\mathbb{R}^2)$  ist die bekannte Darstellung als Symmetriegruppe des regelmäßigen  $m$ -Ecks. Die  $2m$  Wurzeln entsprechen den  $m$  Spiegelachsen. Die positiven Wurzeln liegen geometrisch „zwischen“  $b_1$  und  $b_2$ . Insbesondere ist  $\Phi = \Pi \cup (-\Pi)$ .
- Sei  $G = \langle x_1, \dots, x_{n-1} \rangle \cong S_n$ . Sei  $e_1, \dots, e_n$  die Standardbasis von  $\mathbb{R}^n$  und  $b_i := \frac{1}{\sqrt{2}}(e_i - e_{i+1})$  für  $i = 1, \dots, n-1$ . Man rechnet leicht nach, dass  $[\cdot, \cdot]_G$  das Standardskalarprodukt auf  $V := \langle b_1, \dots, b_{n-1} \rangle$  bzgl.  $b_1, \dots, b_{n-1}$  ist. Der Homomorphismus  $\sigma : G \rightarrow \text{GL}(V)$  entsteht durch die Permutationsoperation von  $S_n$  auf den  $n$  Koordinaten, denn

$$\begin{aligned} x_i b_i &= \sigma_i(b_i) = -b_i = \frac{1}{\sqrt{2}}(e_{i+1} - e_i) = \frac{1}{\sqrt{2}}(e_{x_i(i)} - e_{x_i(i+1)}), \\ x_i b_{i+1} &= b_{i+1} - 2[b_{i+1}, b_i]b_i = b_{i+1} + b_i = \frac{1}{\sqrt{2}}(e_i - e_{i+2}) = \frac{1}{\sqrt{2}}(e_{x_i(i+1)} - e_{x_i(i+2)}), \\ x_i b_j &= b_j = \frac{1}{\sqrt{2}}(e_{x_i(j)} - e_{x_i(j+1)}) \quad (|j - i| > 1). \end{aligned}$$

Offenbar ist  $\Phi = \{\frac{1}{\sqrt{2}}(e_i - e_j) : i \neq j\}$  und  $\Pi = \{\frac{1}{\sqrt{2}}(e_i - e_j) : i < j\}$ , denn  $\frac{1}{\sqrt{2}}(e_i - e_j) = b_i + b_{i+1} + \dots + b_{j-1}$ . Insbesondere gilt  $|\Phi| = n(n-1)$  und  $|\Pi| = n(n-1)/2$ .

**Lemma 11.13.** Für  $g \in G$  und  $1 \leq i \leq n$  gilt  $^g b_i > 0$  falls  $l(gx_i) > l(g)$  und  $^g b_i < 0$  falls  $l(gx_i) < l(g)$ . Insbesondere ist jede Wurzel positiv oder negativ, d. h.  $\Phi = \Pi \cup (-\Pi)$ .

*Beweis.* Wegen  $g = gx_i x_i$  und  ${}^{gx_i}b_i = -{}^g b_i$  genügt es den Fall  $l(gx_i) > l(g)$  zu betrachten. Wir beweisen die erste Aussage durch Induktion nach  $l(g)$ . Im Fall  $l(g) = 0$  ist  $g = 1$ ,  $l(x_i) = 1$  und  $b_i > 0$ . Sei nun  $g \neq 1$  und  $1 \leq j \leq n$  mit  $l(gx_j) = l(g) - 1$  (der letzte Faktor einer reduzierten Darstellung von  $g$ ). Nach Voraussetzung ist  $x_j \neq x_i$ . Wir betrachten die Diedergruppe  $H := \langle x_i, x_j \rangle \leq G$ . Sei  $l_H: H \rightarrow \mathbb{N}_0$  die Längenfunktion bzgl. der Erzeuger  $x_i, x_j$  von  $H$ .<sup>24</sup> Sei

$$A := \{y \in gH : l(y) + l_H(y^{-1}g) = l(g)\}.$$

Wegen  $g \in A$  ist  $A \neq \emptyset$ . Wähle  $y \in A$  mit  $l(y)$  minimal. Wegen  $l(gx_j) + l_H(x_j) = l(g) - 1 + 1 = l(g)$  ist  $gx_j \in A$ . Die Wahl von  $y$  zeigt  $l(y) \leq l(gx_j) < l(g)$ .

Nehmen wir  $l(yx_i) = l(y) - 1$  an. Dann gilt

$$l(g) \leq l(yx_i) + l_H(x_i y^{-1}g) \leq l(y) - 1 + l_H(y^{-1}g) + 1 = l(y) + l_H(y^{-1}g) = l(g)$$

und  $l(g) = l(yx_i) + l_H(x_i y^{-1}g)$ . Dies zeigt  $yx_i \in A$  im Widerspruch zu  $l(yx_i) < l(y)$ . Also gilt  $l(yx_i) > l(y)$  und völlig analog  $l(yx_j) > l(y)$ . Induktion zeigt  ${}^y b_i, {}^y b_j > 0$ . Sei  $h := y^{-1}g \in H$ . Wegen  $g = yh$  genügt es zu zeigen, dass  ${}^h b_i$  eine nicht-negative Linearkombination von  $b_i$  und  $b_j$  ist.

Angenommen es gilt  $l_H(hx_i) < l_H(h)$ . Dann wäre

$$l(gx_i) = l(yhx_i) \leq l(y) + l_H(hx_i) < l(y) + l_H(h) = l(g).$$

Also muss jede reduzierte Darstellung von  $h$  bzgl.  $x_i, x_j$  in  $x_j$  enden. Im Fall  $m_{ij} = \infty$  ist  ${}^{x_j}b_i = b_i + 2b_j$ ,  ${}^{x_i x_j}b_i = {}^{x_i}(b_i + 2b_j) = 3b_i + 2b_j$  usw. (vgl. Beweis von Satz 11.9). Wir können also  $m := m_{ij} < \infty$  annehmen. Dann bilden  $b_i$  und  $b_j$  den Winkel  $\pi - \frac{\pi}{m}$  und  $x_i x_j$  ist eine „Drehung“ um  $\frac{2\pi}{m}$ . Ist  $l_H(h) = m$ , so gilt  $h = (x_i x_j)^{m/2}$  falls  $m$  gerade und  $h = x_j (x_i x_j)^{(m-1)/2}$  falls  $m$  ungerade. In beiden Fällen gäbe es eine reduzierte Darstellung, die mit  $x_i$  endet (nämlich  $h = (x_j x_i)^{m/2}$  bzw.  $x_i (x_j x_i)^{(m-1)/2}$ ). Also ist  $l_H(h) < m$  und  $h \in \{(x_i x_j)^k, x_j (x_i x_j)^k\}$  mit  $k < m/2$ . Im Fall  $k = (m-1)/2$  ist  $h = (x_i x_j)^k$  und  ${}^h b_i = b_j$ . In allen anderen Fällen ist  $(x_i x_j)^k$  eine Drehung um weniger als  $\frac{(m-1)\pi}{m}$ , d. h.  $(x_i x_j)^k b_i$  liegt echt „zwischen“  $b_i$  und  $b_j$ . Eine weitere Anwendung von  $x_j$  ändert daran nichts. Also ist  ${}^h b_i$  eine nicht-negative Linearkombination von  $b_i$  und  $b_j$ .  $\square$

**Satz 11.14.** *Der Homomorphismus  $\sigma: G \rightarrow \text{GL}(V)$  aus Satz 11.9 ist injektiv.*

*Beweis.* Sei  $g \in \text{Ker}(\sigma) \setminus \{1\}$ . Dann existiert  $1 \leq i \leq n$  mit  $l(gx_i) < l(g)$ . Lemma 11.13 liefert den Widerspruch  $b_i = {}^g b_i < 0$ .  $\square$

**Definition 11.15.** Für  $I \subseteq \{1, \dots, n\}$  nennt man  $G_I := \langle x_i : i \in I \rangle \leq G$  eine *parabolische Untergruppe* von  $G$ .

**Satz 11.16.** *Für  $I \subseteq \{1, \dots, n\}$  ist*

$$G_I \cong \langle \{y_i : i \in I\} \mid \{(y_i y_j)^{m_{ij}} : i, j \in I\} \rangle,$$

*d. h.  $G_I$  ist selbst eine Coxetergruppe.*

*Beweis.* Wendet man die Konstruktion von  $\sigma$  auf die Coxetergruppe auf der rechten Seite an, so erhält man genau  $\sigma(G_I) \cong G_I$ .  $\square$

<sup>24</sup>Nach Lemma 11.17 ist  $l_H$  die Einschränkung von  $l$  auf  $H$ . Das wird hier aber nicht benutzt.

**Lemma 11.17.** Sei  $g = x_{i_1} \dots x_{i_k} \in G_I$  reduziert in  $G$ . Dann gilt  $i_1, \dots, i_k \in I$ . Insbesondere ist  $\{x_1, \dots, x_n\} \cap G_I = \{x_i : i \in I\}$ .

*Beweis.* Induktion nach  $k$ . O.B.d.A. sei  $k \geq 1$ . Nach Lemma 11.13 gilt  ${}^g b_{i_k} < 0$ . Sei außerdem  $g = x_{j_1} \dots x_{j_l}$  mit  $j_1, \dots, j_l \in I$ . Nach Definition der  $\sigma_i$  gilt

$${}^g b_{i_k} = b_{i_k} + \sum_{a=1}^l \lambda_a b_{j_a}$$

mit  $\lambda_a \in \mathbb{R}$ . Wegen  ${}^g b_{i_k} < 0$  muss  $i_k = j_s \in I$  für ein  $1 \leq s \leq l$  gelten. Insbesondere ist  $h := x_{i_1} \dots x_{i_{k-1}} = g x_{i_k} \in G_I$  reduziert. Die Behauptung folgt nun durch Induktion.  $\square$

**Folgerung 11.18.** Sind  $g = x_{i_1} \dots x_{i_k} = x_{j_1} \dots x_{j_k}$  zwei reduzierte Darstellungen von  $g \in G$ , so gilt  $\{i_1, \dots, i_k\} = \{j_1, \dots, j_k\}$ .

**Beispiel 11.19.** In der Situation von Folgerung 11.18 müssen  $\{i_1, \dots, i_k\}$  und  $\{j_1, \dots, j_k\}$  nicht als Multimengen übereinstimmen. In  $S_3$  sind beispielsweise  $x_1 x_2 x_1 = (1, 3) = x_2 x_1 x_2$  reduzierte Darstellungen.

**Satz 11.20.** Wir betrachten  $S_n$  als Coxetergruppe in den Erzeugern  $x_i := (i, i+1)$ . Für  $\sigma \in S_n$  existieren eindeutig bestimmte Zahlen  $l \geq 0$  und  $1 \leq a_1, \dots, a_l \leq n-1$  mit folgenden Eigenschaften:

- (i)  $\sigma = x_{a_1} \dots x_{a_l}$ .
  - (ii)  $a_i \neq a_{i-1} \leq a_i + 1$  für  $i = 2, \dots, l$ .
  - (iii) Die Folge  $(a_1, \dots, a_l)$  besitzt keinen Abschnitt der Form  $(a, a-1, \dots, a-r, a)$  mit  $r \geq 1$ .
- Ggf. ist  $\sigma = x_{a_1} \dots x_{a_l}$  ein reduziertes Wort, d. h.  $l = l(\sigma)$ .

*Beweis.* Wir wenden folgenden Algorithmus auf eine beliebige Darstellung  $\sigma = x_{a_1} \dots x_{a_k}$  an:

- (1) Ist  $a_i = a_{i+1}$  für ein  $i$ , so lösche  $x_{a_i} x_{a_{i+1}} = 1$  aus der Darstellung.
- (2) Ist  $a_{i-1} > a_i + 1$ , so tausche  $x_{a_{i-1}}$  und  $x_{a_i}$  und beginne wieder bei (1). Dies ist erlaubt, da  $x_{a_{i-1}}$  und  $x_{a_i}$  disjunkt sind.
- (3) Besitzt  $(a_1, \dots, a_k)$  einen Abschnitt der Form  $(a, a-1, \dots, a-r, a)$ , so ersetze diesen durch  $(a-1, a, a-1, \dots, a-r)$  und beginne wieder bei (1). Dies verändert  $\sigma$  nicht, denn

$$x_a x_{a-1} \dots x_{a-r} x_a = x_a x_{a-1} x_a x_{a-2} x_{a-3} \dots x_{a-r} = x_{a-1} x_a x_{a-1} x_{a-2} \dots x_{a-r}$$

nach der Zopfrelation.

Durch (1) und (3) wird  $\sum_{i=1}^k a_i$  reduziert, während (2) die lexikographische Ordnung der Folge  $(a_1, \dots, a_k)$  verringert. Daher muss der Algorithmus nach endlich vielen Schritten abbrechen. Am Ende sind die Bedingungen (i)–(iii) erfüllt.

Eine Folge  $(a_1, \dots, a_l)$ , die (ii) und (iii) erfüllt, nennen wir *regulär*. Für  $n = 2$  gibt es nur die regulären Folgen  $a = ()$  (mit  $l = 0$ ) und  $a = (1)$ . Induktiv nehmen wir an, dass es genau  $(n-1)!$  reguläre Folgen  $(a_1, \dots, a_l)$  gibt mit  $1 \leq a_1, \dots, a_l \leq n-2$ . Sei nun  $(a_1, \dots, a_l)$  mit  $a_k = n-1$ . Dann gilt  $(a_k, a_{k+1}, \dots, a_l) = (n-1, n-2, \dots, n-r)$  für ein  $r \geq 1$  wegen (ii) und (iii). Für  $(a_1, \dots, a_{k-1})$  gibt es induktiv genau  $(n-1)!$  Möglichkeiten, während es für  $r$  genau  $n-1$  Möglichkeiten gibt. Daher existieren  $(n-1)!(n-1)$  reguläre Folgen, die  $n-1$  enthalten. Zusammen mit den  $(n-1)!$  Folgen, die



$n - 1$  nicht enthalten, erhält man genau  $n! = |S_n|$  reguläre Folgen. Jede Permutation kann also nur durch eine reguläre Folge repräsentiert werden.

Wendet man obigen Algorithmus auf ein reduziertes Wort an, so kann die Länge  $l$  nicht kleiner werden. Es gilt also  $l = l(\sigma)$ .  $\square$

**Beispiel 11.21.** In  $S_5$  gilt

$$\begin{aligned} x_4 x_3 (x_2 x_1 x_2) x_3 x_4 &= x_4 x_3 (x_1 x_2 x_1) x_3 x_4 = x_1 x_4 (x_3 x_2 x_1 x_3) x_4 \\ &= x_1 x_4 (x_2 x_3 x_2 x_1) x_4 = x_1 x_2 (x_4 x_3 x_2 x_1 x_4) = x_1 x_2 x_3 x_4 x_3 x_2 x_1. \end{aligned}$$

Etwas schneller findet man eine reduzierte Darstellung, wenn man rekursiv vorgeht. Sei  $\sigma \in S_n$  und  $a := \sigma^{-1}(n)$ . Dann gilt  $\tau := \sigma x_a x_{a+1} \dots x_{n-1} \in S_{n-1}$ . Nach Induktion besitzt  $\tau$  eine Darstellung in der gewünschten Form. Daher hat auch  $\sigma = \tau t_{n-1} t_{n-2} \dots t_a$  diese Eigenschaft.

**Satz 11.22.** Die Abbildung  $I \mapsto G_I$  ist ein Isomorphismus von Verbänden, d. h. es gilt

- (i)  $I \subseteq J \iff G_I \leq G_J$ .
- (ii)  $G_{I \cup J} = \langle G_I, G_J \rangle$ .
- (iii)  $G_{I \cap J} = G_I \cap G_J$ .

*Beweis.*

- (i) Aus  $I \subseteq J$  folgt offensichtlich  $G_I \leq G_J$ . Ist  $G_I \leq G_J$ , so folgt

$$\{x_i : i \in I\} = \{x_1, \dots, x_n\} \cap G_I \subseteq \{x_1, \dots, x_n\} \cap G_J = \{x_j : j \in J\}$$

aus Lemma 11.17.

- (ii) Trivial.

- (iii) Offenbar ist  $G_{I \cap J} \leq G_I \cap G_J$ . Die umgekehrte Inklusion folgt aus Lemma 11.17.  $\square$

**Satz 11.23.** Für  $g \in G$  ist  $l(g)$  die Anzahl der positiven Wurzeln, die unter  $g$  auf negative Wurzeln abgebildet werden, d. h.  $l(g) = |\Pi \cap g^{-1}(-\Pi)| \leq |\Pi|$ . Insbesondere ist diese Zahl endlich.

*Beweis.* Induktion nach  $l(g)$ : O. B. d. A.  $g \neq 1$ . Sei zunächst  $g = x_i$  für ein  $1 \leq i \leq n$ . Wegen  ${}^g b_i = -b_i$  müssen wir  ${}^g v > 0$  für alle  $v \in \Pi \setminus \{b_i\}$  zeigen. Da alle Wurzeln normiert sind, ist  $v$  kein Vielfaches von  $b_i$ . Sei also  $v = \sum_{j=1}^n \lambda_j b_j$  mit  $\lambda_k > 0$  für mindestens ein  $k \neq i$ . In  ${}^g v = \sigma_i(v) = v - 2[v, b_i]b_i$  hat  $b_k$  immer noch den positiven Koeffizienten  $\lambda_k$ . Daher ist  ${}^g v > 0$ .

Sei nun  $l(g) \geq 2$  und  $1 \leq i \leq n$  mit  $l(gx_i) = l(g) - 1$ . Nach Lemma 11.13 ist  ${}^g b_i < 0$ , d. h.  $b_i \in \Pi \cap g^{-1}(-\Pi)$ . Mit dem eben Bewiesenen folgt

$$\Pi \cap (gx_i)^{-1}(-\Pi) = x_i(x_i(\Pi) \cap g^{-1}(-\Pi)) = x_i(\Pi \cap g^{-1}(-\Pi) \setminus \{b_i\}).$$

Induktion zeigt

$$|\Pi \cap g^{-1}(-\Pi)| = |\Pi \cap (gx_i)^{-1}(-\Pi)| + 1 = l(gx_i) + 1 = l(g). \quad \square$$

**Bemerkung 11.24.** Ist die Länge in  $G$  beschränkt, sagen wir durch  $m$ , so gilt  $|G| \leq \sum_{k=0}^m n^k < \infty$ . In unendlichen Coxetergruppen muss es daher unendlich viele (positive) Wurzeln geben. Insbesondere ist  $-\text{id}_V \notin \sigma(G)$  (anderenfalls hätte  $-\text{id}$  unendliche Länge).

**Folgerung 11.25.** Ist  $G$  endlich, so gibt es genau ein Element  $g \in G$  mit maximaler Länge.

*Beweis.* Angenommen  $g, h \in G$  haben maximale Länge  $l(g) = l(h)$ . Dann gilt  $l(gx_i) < l(g)$  und  ${}^g b_i < 0$  für  $i = 1, \dots, n$ . Da jede positive Wurzel eine nicht-negative Linearkombination der  $b_i$  ist, muss  $g$  (und  $h$ ) alle positiven Wurzeln auf negative Wurzeln abbilden, d. h.  $g(\Pi) = -\Pi$ . Damit ist  $g^2(\Pi) = \Pi = gh(\Pi)$  und  $l(g^2) = 0 = l(gh)$ . Dies zeigt  $h = g^{-1} = g$ .  $\square$

**Beispiel 11.26.**

(i) Für  $G = \langle x, y \rangle \cong D_{2m}$  ist  $z := xy \dots = yx \dots$  (je  $m$  Faktoren) das Element maximaler Länge (vgl. Beispiel 11.12). Ist  $m$  gerade, so ist  $\sigma(z) = -\text{id}$ , also die Drehung um  $\pi$ .

(ii) Für  $g \in G = S_n$  und  $i < j$  gilt

$${}^g \left( \frac{1}{\sqrt{2}}(e_i - e_j) \right) < 0 \iff \frac{1}{\sqrt{2}}(e_{g(i)} - e_{g(j)}) < 0 \iff g(i) > g(j)$$

(Beispiel 11.12). Daher ist  $l(g)$  die Anzahl der *Fehlstände* von  $g$ , also Paare  $i < j$  mit  ${}^g i > {}^g j$ . Das Element maximaler Länge ist daher

$$g = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ n & n-1 & \dots & 1 \end{pmatrix} = (1, n)(2, n-1) \dots = t_1 \dots t_{n-1}$$

mit  $t_i = (i+1, i) \dots (2, 1)$  und  $l(g) = 1 + \dots + n-1 = n(n-1)/2 = |\Pi|$ .

**Lemma 11.27** (TITS). Sei  $g \in G$  und  $v \in \Pi$ . Dann gilt  $l(gx_v) > l(g) \iff {}^g v > 0$ .

*Beweis.* Wie in Lemma 11.13 genügt es  $l(gx_v) > l(g) \Rightarrow {}^g v > 0$  zu zeigen. Induktion nach  $l(g)$ . Der Fall  $g = 1$  ist klar. Sei nun  $l(g) > 0$  und  $l(x_i g) < l(g)$ . Wegen

$$l(x_i g x_v) \geq l(gx_v) - 1 > l(g) - 1 = l(x_i g)$$

gilt  ${}^{x_i g} v > 0$  nach Induktionsvoraussetzung. Nehmen wir  ${}^g v < 0$  an. Nach Satz 11.23 gilt dann  ${}^g v = -b_i$ . Dies zeigt  $g^{-1} x_i g v = g^{-1} b_i = -v$  und  $g^{-1} x_i g = x_v$  nach Bemerkung 11.11. Dies widerspricht aber  $l(gx_v) > l(g) > l(x_i g) = l(gx_v)$ .  $\square$

**Bemerkung 11.28.** Im Folgenden benutzen wir die Schreibweise  $x_1 \dots \tilde{x}_i \dots x_k := x_1 \dots x_{i-1} x_{i+1} \dots x_k$ .

**Satz 11.29.**

(i) (Austauschbedingung) Sei  $g = x_{i_1} \dots x_{i_k} \in G$  und  $v \in \Phi$  mit  $l(gx_v) < l(g)$ . Dann existiert  $1 \leq s \leq k$  mit  $gx_v = x_{i_1} \dots \tilde{x}_{i_s} \dots x_{i_k}$ . Ist  $l(g) = k$ , so ist  $s$  eindeutig bestimmt.

(ii) (Löschbedingung) Sei  $g = x_{i_1} \dots x_{i_k} \in G$  mit  $l(g) < k$ . Dann existieren  $1 \leq s < t \leq k$  mit  $g = x_{i_1} \dots \tilde{x}_{i_s} \dots \tilde{x}_{i_t} \dots x_{i_k}$ .

*Beweis.*

(i) Wegen  $x_v = x_{-v}$  können wir  $v > 0$  annehmen. Aus Lemma 11.27 folgt  ${}^g v < 0$ . Wegen  $v > 0$  existiert ein  $s$  mit  ${}^{x_{i_{s+1}} \dots x_{i_k}} v > 0$  und  ${}^{x_{i_s} \dots x_{i_k}} v < 0$ . Aus Satz 11.23 folgt  ${}^{x_{i_{s+1}} \dots x_{i_k}} v = b_{i_s}$ . Dies zeigt  $(x_{i_{s+1}} \dots x_{i_k}) x_v (x_{i_{s+1}} \dots x_{i_k})^{-1} = x_{i_s}$ , also  $gx_v = x_{i_1} \dots \tilde{x}_{i_s} \dots x_{i_k}$ . Sei nun  $l(g) = k$ . Angenommen es existieren  $s < t$  mit  $x_{i_1} \dots \tilde{x}_{i_s} \dots x_{i_k} = gx_v = x_{i_1} \dots \tilde{x}_{i_t} \dots x_{i_k}$ . Dies liefert  $x_{i_{s+1}} \dots x_{i_t} = x_{i_s} \dots x_{i_{t-1}}$  und  $x_{i_s} \dots x_{i_t} = x_{i_{s+1}} \dots x_{i_{t-1}}$ . Dann wäre aber  $g = x_{i_1} \dots \tilde{x}_{i_s} \dots \tilde{x}_{i_t} \dots x_{i_k}$  und  $l(g) < k$ .

- (ii) Wegen  $l(g) < k$  existiert ein  $t$  mit  $l(x_{i_1} \dots x_{i_t}) < l(x_{i_1} \dots x_{i_{t-1}})$ . Aus (i) folgt  $x_{i_1} \dots x_{i_t} = x_{i_1} \dots \check{x}_{i_s} \dots x_{i_{t-1}}$  für ein  $s < t$ .  $\square$

**Bemerkung 11.30.**

- (i) Es gilt

$$l(x_v g) < l(g) \implies l(g^{-1} x_v) < l(g^{-1}) \implies g^{-1} x_v = x_{i_k} \dots \check{x}_{i_s} \dots x_{i_1} \implies x_v g = x_{i_1} \dots \check{x}_{i_s} \dots x_{i_k}.$$

- (ii) Man kann zeigen, dass jede Gruppe, die die Austauschbedingung (oder Löscheschbedingung) bzgl. eines Erzeugendensystems von Involutionen erfüllt, eine Coxetergruppe ist.
- (iii) Die Löscheschbedingung zeigt, dass man aus einer beliebigen Darstellung  $g = x_{i_1} \dots x_{i_k}$  durch suggestives Löschesch eine reduzierte Darstellung erhält.

**Definition 11.31.**

- Man nennt  $G$  *irreduzibel*, falls keine Partition  $\{1, \dots, n\} = I \dot{\cup} J$  mit  $G = G_I \times G_J$  existiert.
- Der *Coxetergraph*  $C(G)$  besteht aus den Ecken  $e_1, \dots, e_n$  und den Kanten  $(e_i, e_j)$  mit  $m_{ij} \geq 3$ . Im Fall  $m_{ij} > 3$  werden die Kanten mit  $m_{ij}$  beschriftet. Offenbar ist  $G$  durch  $C(G)$  bis auf Reihenfolge der  $x_i$  eindeutig bestimmt.

**Beispiel 11.32.** Es gilt  $C(S_n)$ :  $\bullet \text{---} \bullet \text{---} \bullet \text{---} \bullet$  und  $C(D_{2m})$ :  $\bullet \xrightarrow{m} \bullet$  nach Beispiel 11.4.

**Satz 11.33.** Genau dann ist  $G$  irreduzibel, falls  $C(G)$  zusammenhängend ist.

*Beweis.* Ist  $G = G_I \times G_J$ , so gilt  $m_{ij} = 2$  für  $i \in I$  und  $j \in J$ . Also gibt es keinen Weg zwischen  $e_i$  und  $e_j$  in  $C(G)$ . Ist umgekehrt  $C(G)$  unzusammenhängend, so existiert eine Partition  $\{1, \dots, n\} = I \dot{\cup} J$  mit  $[x_i, x_j] = 1$  (Kommutator) für alle  $i \in I$  und  $j \in J$ . Insbesondere ist  $[G_I, G_J] = 1$ . Nach Satz 11.22 ist  $G = G_{I \dot{\cup} J} = \langle G_I, G_J \rangle$  und  $G_I \cap G_J = G_{I \cap J} = 1$ . Dies zeigt  $G = G_I \times G_J$ .  $\square$

**Bemerkung 11.34.** Achtung: Der Isomorphietyp von  $G$  bestimmt nicht, ob  $G$  als Coxetergruppe irreduzibel ist. Zum Beispiel ist  $G = D_{12}$  irreduzibel mit zwei Erzeugern, aber auch reduzibel mit drei Erzeugern  $G \cong D_6 \times S_2$ .

**Lemma 11.35.** Sei  $G$  irreduzibel und  $V_0 := \{v \in V : [v, V]_G = 0\} \leq V$ . Dann operiert  $G$  trivial auf  $V_0$  und jeder echte  $G$ -invariante Unterraum von  $V$  liegt in  $V_0$ .

*Beweis.* Für  $v \in V_0$  gilt  $x_i v = \sigma_i(v) = v - 2[v, b_i]_G b_i = v$ . Da  $G$  von  $x_1, \dots, x_n$  erzeugt wird, operiert  $G$  trivial auf  $V_0$ .

Sei nun  $W < V$   $G$ -invariant. Angenommen es existiert  $v \in W \setminus V_0$ . Dann existiert ein  $i$  mit  $[v, b_i]_G \neq 0$ . Es folgt  $b_i = \frac{v - \sigma_i(v)}{2[v, b_i]_G} \in W$ . Für  $b_j$  mit  $m_{ij} \geq 3$  gilt  $[b_i, b_j]_G \neq 0$  und  $b_j = \frac{b_i - \sigma_j(b_i)}{2[b_i, b_j]_G} \in W$ . Da  $C(G)$  zusammenhängend ist, erhält man  $b_1, \dots, b_n \in W$  im Widerspruch zu  $W < V$ .  $\square$

**Satz 11.36.** Sei  $G$  eine endliche irreduzible Coxetergruppe und  $z \in G$  mit maximaler Länge. Dann gilt  $Z(G) \leq \langle z \rangle$ . Insbesondere ist  $|Z(G)| \leq 2$ .

*Beweis.* Sei  $g \in Z(G) \setminus \{1\}$ . Aus  $x_i({}^g b_i) = g x_i b_i = -g b_i$  folgt  ${}^g b_i = \pm b_i$  (Satz 11.23). Daher ist  $b_i \in E_1(\sigma(g)) \cup E_{-1}(\sigma(g))$  (Eigenräume zum Eigenwert 1 bzw.  $-1$ ). Wegen  $g \in Z(G)$  sind  $E_1(\sigma(g))$  und  $E_{-1}(\sigma(g))$   $G$ -invariant und  $E_1(\sigma(g)) < V$ , da  $g \neq 1$ . Im Fall  $E_{-1}(\sigma(g)) < V$  wäre  $b_i \in V_0$  nach Lemma 11.35. Allerdings ist  $[b_i, b_i]_G = 1$ . Dies zeigt  $\sigma(g) = -\text{id}$  und  ${}^g v < 0$  für alle  $v \in \Pi$ . Aus Satz 11.23 folgt  $g = z$ .  $\square$

**Lemma 11.37.** *Sei  $H \leq \text{GL}(n, \mathbb{R})$  endlich und irreduzibel als Matrixgruppe. Dann gilt:*

- (i) *Es existiert eine  $H$ -invariante positiv definite Bilinearform auf  $\mathbb{R}^n$ .*
- (ii) *Angenommen es existieren  $h \in H$  und  $\lambda \in \mathbb{R}$ , sodass der Eigenraum  $E_\lambda(h)$  ungerade Dimension hat. Dann ist  $C_{\text{GL}(n, \mathbb{R})}(H) = \mathbb{R}^\times 1_n$ .<sup>25</sup> Insbesondere gilt dies, falls  $n$  ungerade ist.*
- (iii) *Ist  $C_{\text{GL}(n, \mathbb{R})}(H) = \mathbb{R}^\times 1_n$ , so unterscheiden sich je zwei nicht-ausgeartete  $H$ -invariante Bilinearform auf  $\mathbb{R}^n$  nur durch eine Konstante.*

*Beweis.*

- (i) Für  $v, w \in \mathbb{R}^n$  definiert

$$[v, w]_H := \sum_{h \in H} [hv, hw]$$

eine  $H$ -invariante positiv definite Bilinearform, wobei  $[\cdot, \cdot]$  das Standardskalarprodukt ist.

- (ii) Sei  $f \in C_{\text{GL}(n, \mathbb{R})}(H)$ . Dann operiert  $f$  auf  $E_\lambda(h)$ . Da  $\dim E_\lambda(h)$  ungerade ist, besitzt  $f$  auf  $E_\lambda(h)$  einen reellen Eigenwert  $\mu$ . Nun ist  $0 \neq E_\mu(f) \leq \mathbb{R}^n$   $H$ -invariant und es folgt  $E_\mu(f) = \mathbb{R}^n$  sowie  $f = \mu 1_n$ , da  $H$  irreduzibel ist. Die zweite Aussage erhält man mit  $h = 1$ .
- (iii) Seien  $[\cdot, \cdot]_1$  und  $[\cdot, \cdot]_2$  zwei nicht-ausgeartete  $H$ -invariante Bilinearformen auf  $V := \mathbb{R}^n$ . Sei  $V^* := \text{Hom}(V, \mathbb{R})$  der Dualraum von  $V$ . Dann sind  $\varphi_i: V \rightarrow V^*$ ,  $v \mapsto [v, \cdot]_i$  für  $i = 1, 2$  Isomorphismen von Vektorräumen (beachte  $\dim V = \dim V^*$ ). Also ist  $f := \varphi_2^{-1} \circ \varphi_1: V \rightarrow V$  ein Isomorphismus mit  $[v, w]_1 = [f(v), w]_2$  für alle  $v, w \in V$ . Für  $h \in H$  folgt

$$[f(hv), hw]_2 = [hv, hw]_1 = [v, w]_1 = [f(v), w]_2 = [hf(v), hw]_2.$$

Dies zeigt  $fh = hf$ , d. h.  $f \in C_{\text{GL}(n, \mathbb{R})}(H) = \mathbb{R}^\times 1_n$ .  $\square$

**Bemerkung 11.38.** Wir betrachten den Dualraum  $V^* := \text{Hom}(V, \mathbb{R})$  mit der dualen Basis  $\beta_1, \dots, \beta_n$ , wobei  $\beta_i(b_j) = \delta_{ij}$ . Durch  ${}^g \varphi(v) := \varphi(g^{-1}v)$  für  $v \in V$ ,  $\varphi \in V^*$  und  $g \in G$  operiert  $G$  auf  $V^*$ . Die Abbildung  $\Gamma: V \rightarrow V^*$ ,  $v \mapsto [v, \cdot]_G$  vermittelt einen Isomorphismus zwischen den Operationen auf  $V$  und  $V^*$ , denn

$$({}^g \Gamma(v))(w) = \Gamma(v)({}^{g^{-1}} w) = [v, {}^{g^{-1}} w]_G = [{}^g v, w]_G = \Gamma({}^g v)(w)$$

für  $v, w \in V$  und  $g \in G$ . Sei  $\sigma^*: G \rightarrow \text{GL}(V^*)$  der entsprechende Monomorphismus. Wir definieren

$$C := \{\varphi \in V^* : \forall i : \varphi(b_i) > 0\} \subseteq V^*.$$

Bzgl. der dualen Basis ist  $C = \mathbb{R}_{>0}^n$  eine offene Menge im euklidischen Raum  $\mathbb{R}^n$ . Da die Determinante  $\mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}$  stetig ist, ist  $\text{GL}(V^*) = \det^{-1}(\mathbb{R} \setminus \{0\})$  offen in  $\mathbb{R}^{n \times n}$ .

**Satz 11.39.** *Das Bild  $\sigma^*(G)$  ist eine diskrete Untergruppe von  $\text{GL}(V^*)$ , d. h. für alle  $a \in \sigma^*(G)$  existiert eine offene Umgebung  $U(a) \subseteq \text{GL}(V^*)$  mit  $U(a) \cap \sigma^*(G) = \{a\}$ . Insbesondere ist  $\sigma^*(G)$  abgeschlossen.*

<sup>25</sup>Man sagt:  $H$  ist absolut irreduzibel.

*Beweis.* Wir identifizieren  $G$  mit  $\sigma^*(G)$ . Sei  $c \in C$  und  $F: \text{GL}(V^*) \rightarrow V^*$ ,  $a \mapsto {}^a c = a(c)$ . Da die Matrix-Vektormultiplikation stetig ist, ist  $F$  stetig und  $D := F^{-1}(C) \subseteq \text{GL}(V^*)$  ist eine offene Umgebung von  $1 \in \text{GL}(V^*)$ . Für  $g \in G \setminus \{1\}$  existiert  $x_i$  mit  $l(g^{-1}x_i) < l(g)$ . Aus Tits Lemma folgt  ${}^{g^{-1}}b_i < 0$  und  ${}^g c(b_i) = c({}^{g^{-1}}b_i) < 0$ . Dies zeigt  $D \cap G = \{1\}$ . Für ein beliebiges  $g \in G$  ist  $gD$  eine offene Umgebung um  $g$  mit  $gD \cap G = g(D \cap G) = \{g\}$ .

Sei nun  $(a_i) \subseteq G$  eine konvergente Folge. Dann existiert  $k \in \mathbb{N}$  mit  $a_i \in U(a_k) \cap G = \{a_k\}$  für alle  $i \geq k$ . Also wird die Folge konstant und der Grenzwert liegt in  $G$ . Dies zeigt, dass  $G$  abgeschlossen ist.  $\square$

**Satz 11.40.** *Genau dann ist  $G$  endlich, wenn  $[\cdot, \cdot]_G$  positiv definit auf  $V$  ist.*

*Beweis.* Sei  $G$  endlich. Wir argumentieren durch Induktion nach  $n$ . Im Fall  $n = 1$  ist  $[b_1, b_1]_G = 1$  und wir sind fertig. Sei  $n > 1$ . Nehmen wir an, dass  $G = G_I \times G_J$  reduzibel ist. Dann gilt  $V = V_I \oplus V_J$  mit  $V_I := \langle b_i : i \in I \rangle$  und analog  $V_J$ . Nach Induktion sind  $[\cdot, \cdot]_{G_I}$  und  $[\cdot, \cdot]_{G_J}$  positiv definit auf  $V_I$  bzw.  $V_J$ . Für  $i \in I$  und  $j \in J$  gilt  $[b_i, b_j]_G = -\cos \frac{\pi}{2} = 0$ . Für  $v = v_I + v_J \neq 0$  folgt

$$[v, v]_G = [v_I, v_I]_{G_I} + [v_J, v_J]_{G_J} > 0.$$

Also ist  $[\cdot, \cdot]_G$  positiv definit auf  $V$ .

Sie nun  $G$  irreduzibel und  $V_0 = \{v \in V : [v, V]_G = 0\} \leq V$ . Nach Maschke besitzt  $V_0$  ein  $G$ -invariantes Komplement  $W \leq V$ . Lemma 11.35 zeigt  $W = V$  und  $V_0 = 0$ , d. h.  $[\cdot, \cdot]_G$  ist nicht-ausgeartet. Das gleiche Argument zeigt auch, dass  $\sigma(G)$  als Matrixgruppe irreduzibel ist. Wegen  $\dim E_{-1}(\sigma(x_1)) = \dim E_{-1}(\sigma_1) = 1$  ist  $[\cdot, \cdot]_G$  bis auf eine Konstante eindeutig bestimmt nach Lemma 11.37. Lemma 11.37 besagt aber auch, dass eine  $G$ -invariante positiv definite Bilinearform existiert. Also ist  $[\cdot, \cdot]_G$  positiv definit.

Sei nun umgekehrt  $[\cdot, \cdot]_G$  positiv definit. Durch den Isomorphismus  $\Gamma: V \rightarrow V^*$ ,  $v \mapsto [v, \cdot]_G$  aus Bemerkung 11.38 erhält man eine  $G$ -invariante positiv definite Bilinearform auf  $V^*$  (nämlich  $[\varphi, \mu] := [\Gamma^{-1}(\varphi), \Gamma^{-1}(\mu)]_G$  für  $\varphi, \mu \in V^*$ ). Nach Sylvesters Trägheitssatz besitzt  $V^*$  eine Orthonormalbasis  $\Delta$  bzgl. dieser Bilinearform. Schreibt man  $g \in \sigma^*(G)$  als Matrix bzgl.  $\Delta$ , so haben die Spalten Norm 1. Da alle Normen auf dem  $\mathbb{R}^n$  äquivalent sind, ist  $\sigma^*(G)$  beschränkt (bzgl. der euklidischen Norm). Nach Satz 11.39 ist  $\sigma^*(G)$  zusätzlich abgeschlossen und daher kompakt. Für  $a \in \sigma^*(G)$  wählen wir gemäß Satz 11.39 eine offene Umgebung  $U(a) \subseteq \mathbb{R}^{n \times n}$  mit  $U(a) \cap \sigma^*(G) = \{a\}$ . Nach Heine-Borel überdeckt bereits eine endliche Auswahl dieser Umgebungen  $\sigma^*(G)$ . Daher muss  $\sigma^*(G) \cong G$  endlich sein.  $\square$

**Satz 11.41.** *Die endlichen Coxetergruppen sind genau die Spiegelungsgruppen.*

*Beweis.* Sei  $G$  eine endliche Coxetergruppe. Nach Satz 11.9 und Satz 11.14 ist  $G \cong \sigma(G) \leq \text{GL}(V)$  eine Spiegelungsgruppe.

Sei nun umgekehrt  $V := \mathbb{R}^n$  und  $S \leq \text{GL}(V)$  eine Spiegelungsgruppe. Sei  $\Phi \subseteq V$  die Menge der Einheitsvektoren  $b$ , sodass die Spiegelung  $\sigma_b$  an  $b^\perp$  in  $S$  liegt. Wir zeigen, dass  $\Phi$  die Eigenschaften eines Wurzelsystems hat. Aus  $|S| < \infty$  folgt  $|\Phi| < \infty$ . Wegen  $b^\perp = (-b)^\perp$  ist  $-\Phi = \Phi$ . Wir ordnen die  $b \in \Phi$  lexikografisch entsprechend der Koeffizienten bzgl. der Standardbasis von  $\mathbb{R}^n$ . Sei  $\Pi := \{b \in \Phi : b > 0\}$  die Menge der *positiven Wurzeln* ( $b > 0$  bedeutet, dass die erste von 0 verschiedene Komponente von  $b$  positiv ist). Dann gilt  $\Phi = \Pi \cup (-\Pi)$ . Sei  $\Delta \subseteq \Phi$  eine minimale Teilmenge, sodass für alle  $b \in \Pi$  Zahlen  $\lambda_s \geq 0$  mit  $b = \sum_{s \in \Delta} \lambda_s s$  existieren. Im Folgenden sei  $[\cdot, \cdot]$  das Standardskalarprodukt auf  $\mathbb{R}^n$ .

**Schritt 1:**  $[b, c] \leq 0$  für alle verschiedenen  $b, c \in \Delta$ .

Angenommen  $[b, c] > 0$ . Für  $\mu := 2[b, c] > 0$  gilt  $\sigma_b(c) = c - \mu b$ . Wegen  $\sigma_b \sigma_c \sigma_b = \sigma_{\sigma_b(c)} \in S$  gilt

$\sigma_b(c) \in \Phi$ . Sei zunächst  $\sigma_b(c) \in \Pi$ . Dann existieren  $\lambda_s \geq 0$  mit  $\sigma_b(c) = \sum_{s \in \Delta} \lambda_s s$ . Im Fall  $\lambda_c < 1$  erhält man

$$(1 - \lambda_c)c = \sigma_b(c) + \mu b - \lambda_c c = \mu b + \sum_{s \neq c} \lambda_s s.$$

Nun könnte man aber  $c$  aus  $\Delta$  entfernen im Widerspruch zur Minimalität von  $\Delta$ . Also gilt  $\lambda_c \geq 1$  und

$$(\lambda_c - 1)c + \mu b + \sum_{s \neq c} \lambda_s s = 0.$$

Wegen  $\mu > 0$  widerspricht dies aber der Definition von  $\Pi$ . Dies zeigt  $-\sigma_b(c) \in \Pi$ . Mit  $-\sigma_b(c) = \sum_{s \in \Delta} \lambda_s s$  folgt

$$(\mu - \lambda_b)b = -\sigma_b(c) + c - \lambda_b b = c + \sum_{s \neq b} \lambda_s s.$$

Im Fall  $\lambda_b < \mu$  könnte man  $b$  aus  $\Delta$  entfernen. Also ist  $\lambda_b \geq \mu$ . Dann wäre aber

$$(\lambda_b - \mu)b + c + \sum_{s \neq b} \lambda_s s = 0$$

ein Widerspruch zur Definition von  $\Pi$ . Insgesamt muss also  $[b, c] \leq 0$  gelten.

**Schritt 2:**  $\Delta$  ist linear unabhängig.

Sei  $\sum_{s \in \Delta} \lambda_s s = 0$  mit  $\lambda_s \in \mathbb{R}$  für  $s \in \Delta$ . Trennen der positiven und negativen Koeffizienten liefert  $b := \sum_{\lambda_s \geq 0} \lambda_s s = -\sum_{\lambda_t < 0} \lambda_t t$ . Aus Schritt 1 folgt

$$0 \leq [b, b] = \sum_{\lambda_s \geq 0} \sum_{\lambda_t < 0} \lambda_s (-\lambda_t) [s, t] \leq 0$$

und  $b = 0$ . Da  $b$  eine nicht-negative Linearkombination positiver Wurzeln ist, folgt  $\lambda_s = 0$  für alle  $s \in \Delta$ .

**Schritt 3:**  $S = \langle \sigma_b : b \in \Delta \rangle$ .

Nach Schritt 2 lässt sich jede Wurzel in  $\Phi$  eindeutig als Linearkombination von  $\Delta$  schreiben, wobei entweder alle Koeffizienten nicht-negativ oder alle Koeffizienten nicht-positiv sind. Sei  $T := \langle \sigma_b : b \in \Delta \rangle \leq S$  und  $b \in \Pi$ . Unter allen Elementen in der Bahn  ${}^T b$  wählen wir  $c = \sum_{s \in \Delta} \lambda_s s \in \Pi$ , sodass  $h(c) := \sum_{s \in \Delta} \lambda_s$  möglichst klein ist. Nehmen wir  $c \notin \Delta$  an. Wegen  $1 = [c, c] = \sum_{s \in \Delta} \lambda_s [c, s]$  existiert ein  $t \in \Delta$  mit  $[c, t] > 0$ . Es gilt  $\sigma_t(c) = c - 2[c, t]t$ . Wegen  $c \in \Pi \setminus \Delta$  ist  $c$  kein Vielfaches von  $t$ . Nach Schritt 2 ist die Darstellung von  $\sigma_t(c)$  bzgl.  $\Delta$  eindeutig. Wegen  $\Phi = \Pi \cup (-\Pi)$  kann es keine Koeffizienten mit verschiedenen Vorzeichen geben. Dies zeigt  $\lambda_t \geq 2[c, t]$  und man hat den Widerspruch  $h(\sigma_t(c)) < h(c)$  zur Wahl von  $c$ . Also ist  $c \in \Delta$  und es existiert  $t \in T$  mit  $b = t(c)$ . Wie bereits bemerkt folgt  $\sigma_b = t\sigma_c t^{-1} \in T$ . Also gilt  $S = \langle \sigma_b : b \in \Pi \rangle = T$ .

**Schritt 4:**  $S$  ist eine Coxetergruppe.

Sei  $\Delta = \{b_1, \dots, b_n\}$  und  $\sigma_i = \sigma_{b_i}$  für  $i = 1, \dots, n$ . Sei  $|\langle \sigma_i \sigma_j \rangle| = m_{ij}$  für  $1 \leq i, j \leq n$ . Nach Schritt 2 ist  $m_{ij} \geq 2$  für  $i \neq j$ . Ggf. ist  $\sigma_i \sigma_j$  eine Drehung um den Winkel  $\varphi := 2\pi/m_{ij} \leq \pi$  in der Ebene  $\langle b_i, b_j \rangle$ . Es folgt

$$\begin{aligned} \cos \varphi &= [b_j, \sigma_i \sigma_j(b_j)] = -[b_j, \sigma_i(b_j)] = -[b_j, b_j - 2[b_j, b_i]b_i] = -1 + 2[b_i, b_j]^2, \\ [b_i, b_j]^2 &= \frac{\cos \varphi + 1}{2} = \frac{\cos(\varphi/2)^2 - \sin(\varphi/2)^2 + 1}{2} = \cos(\varphi/2)^2. \end{aligned}$$

Aus Schritt 1 erhält man  $[b_i, b_j] = -\cos(\varphi/2) = -\cos(\pi/m_{ij})$ . Sei  $G = \langle x_1, \dots, x_n \rangle$  die Coxetergruppe mit den Parametern  $m_{ij}$ . Mit den Bezeichnungen aus Definition 11.8 ist nun  $[\cdot, \cdot]_G$  das Standardskalarprodukt und der Monomorphismus  $\sigma$  aus Satz 11.9 bildet  $G$  nach  $S$  ab. Wegen Schritt 3 ist  $\sigma$  surjektiv und  $S \cong G$  ist eine Coxetergruppe.  $\square$

**Bemerkung 11.42.**

- (i) Genau dann ist  $G$  endlich, wenn die Matrix  $(-\cos(\pi/m_{ij}))_{ij}$  positiv definit ist. Für  $G = S_n$  erhält man die Matrix

$$\begin{pmatrix} 1 & -1/2 & & 0 \\ -1/2 & \ddots & \ddots & \\ & \ddots & 1 & -1/2 \\ 0 & & -1/2 & 1 \end{pmatrix}.$$

- (ii) Im Folgenden nennen wir  $G$  *positiv semidefinit*, falls  $[\cdot, \cdot]_G$  positiv semidefinit ist. Insbesondere ist jede endliche Coxetergruppe positiv semidefinit.

**Lemma 11.43.** *Sei  $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$  symmetrisch, positiv semidefinit und unzerlegbar (d. h. zu jeder Partition  $\{1, \dots, n\} = I \dot{\cup} J$  existieren  $i \in I, j \in J$  mit  $a_{ij} \neq 0$ ). Für  $i \neq j$  sei außerdem  $a_{ij} \leq 0$ . Dann gilt*

- (i)  $\text{Ker}(A) = \{v \in \mathbb{R}^n : vAv^t = 0\}$  und  $\dim \text{Ker}(A) \leq 1$ .  
(ii) Der Eigenraum zum kleinsten Eigenwert von  $A$  wird von einem positiven Eigenvektor (d. h. alle Komponenten sind positiv) aufgespannt.

*Beweis.*

- (i) Sicher liegt  $\text{Ker}(A)$  in  $N := \{v \in \mathbb{R}^n : vAv^t = 0\}$ . Sei umgekehrt  $v \in N$ . Nach dem Spektralsatz existiert eine orthogonale Matrix  $S$  mit  $D := SAS^t = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$  und  $d_1, \dots, d_n \geq 0$ . Für  $w := vS^t$  folgt

$$\sum_{i=1}^n w_i^2 d_i = wDw^t = vAv^t = 0.$$

Also ist  $w_i = 0$  oder  $d_i = 0$  für alle  $i$ . Dies zeigt  $0 = S^t Dw^t = Av^t$  und  $N \subseteq \text{Ker}(A)$ .

Sei nun  $x \in N \setminus \{0\}$  und  $z = (|x_1|, \dots, |x_n|)$ . Wegen  $a_{ij} \leq 0$  für  $i \neq j$  gilt

$$0 \leq zAz^t = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}|x_i x_j| \leq \sum_{i,j=1}^n a_{ij}x_i x_j = xAx^t = 0,$$

also  $z \in N$ . Sei  $I := \{1 \leq i \leq n : z_i = 0\}$  und  $J = \{1, \dots, n\} \setminus I$ . Aus  $z \in \text{Ker}(A)$  folgt  $\sum_{j \in J} a_{ij}z_j = 0$  für  $i = 1, \dots, n$ . Wegen  $z_j > 0$  geht dies nur, falls  $a_{ij} = 0$  für alle  $i \in I$  und  $j \in J$ . Da  $A$  unzerlegbar ist, muss  $I = \emptyset$  gelten, d. h. alle Komponenten von  $z$  sind positiv und alle Komponenten von  $x$  sind ungleich 0. Da  $x \neq 0$  beliebig war, schließen wir  $\dim N \leq 1$  (anderenfalls könnte man aus zwei linear unabhängigen Vektoren eine Linearkombination mit 0-Komponente kombinieren).

- (ii) Sei  $d := \min\{d_1, \dots, d_n\} \geq 0$ . Dann erfüllt auch  $B := A - d1_n$  die Voraussetzungen des Satzes. Die Behauptung folgt nun aus dem Beweis von (i) für  $B$ .  $\square$


**Lemma 11.44.** *Sei  $G$  irreduzibel und positiv semidefinit. Wir konstruieren aus  $C(G)$  einen echten Teilgraphen  $D$ , indem wir Ecken oder Kanten entfernen oder Kantengewichte reduzieren. Dann ist die Coxetergruppe zu  $D$  endlich.*

*Beweis.* Wir nummerieren die Ecken von  $C(G)$ , sodass  $D$  aus den ersten  $k$  Ecken gebildet wird. Seien  $A = (a_{ij}) = ([b_i, b_j]_G) \in \mathbb{R}^{n \times n}$  und  $B = (b_{ij}) = (-\cos(\pi/m'_{ij})) \in \mathbb{R}^{k \times k}$  die entsprechenden Matrizen. Dann gilt  $b_{ij} \geq -\cos(\pi/m_{ij}) = a_{ij}$ . Angenommen  $B$  ist nicht positiv definit. Sei  $v \in \mathbb{R}^k \setminus \{0\}$  mit  $vBv^t \leq 0$  und  $w = (|v_1|, \dots, |v_k|, 0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^n$ . Da  $G$  positiv semidefinit ist, folgt

$$0 \leq wAw^t = \sum_{i,j=1}^k a_{ij}|v_i||v_j| \leq \sum_{i,j=1}^k b_{ij}|v_i||v_j| \leq \sum_{i,j=1}^k b_{ij}v_iv_j = vBv^t \leq 0$$


und  $wAw^t = 0$ . Nach Lemma 11.43 sind alle Komponenten von  $w$  positiv, d.h.  $k = n$  und  $v_i \neq 0$  für  $i = 1, \dots, k$ . Daraus ergibt sich  $a_{ij} = b_{ij}$ . Nun ist  $D$  aber kein *echter* Teilgraph mehr. Widerspruch.  $\square$


**Satz 11.45 (COXETER).** *Jede endliche irreduzible Coxetergruppe  $G$  gehört zu einer der folgenden Familien.<sup>26</sup>*


$(A_n)$   mit  $n \geq 1$ .


$(B_n)$   mit  $n \geq 2$ .

$(D_n)$   mit  $n \geq 4$ .


$(E_6)$  

$(E_7)$  

$(E_8)$  

$(F_4)$  

$(H_3)$  

$(H_4)$  

$(I_2(m))$   mit  $m \geq 5$ .

*Beweis.*

**Existenz:** Da die angegebenen Graphen zusammenhängend sind, sind die entsprechenden Gruppen irreduzibel (Satz 11.33). Wir zeigen, dass sie alle endlich sind. Alle Graphen sind Bäume. Entfernt man ein geeignetes Blatt, so erhält man einen Baum, der auch einen der angegebenen Typen besitzt. Wir können daher durch Induktion argumentieren und müssen nur zeigen, dass die Matrix  $M := 2([b_i, b_j])$  positive Determinante hat (Sylvester-Kriterium). Für  $n = 2$  erhält man

$$\det M = 4(1 - \cos(\pi/m)^2) = 4 \sin(\pi/m)^2 > 0$$

wegen  $m = m_{12} \geq 3$ . Sei nun  $n \geq 3$ . Wir nummerieren die Ecken  $e_1, \dots, e_n$ , sodass  $e_n$  ein Blatt ist und die dazugehörige Kante  $\{e_{n-1}, e_n\}$  Gewicht  $m = 3$  oder  $4$  hat. Laplace-Entwicklung nach der letzten Spalte zeigt

$$\det M = 2 \det M_{n-1} - 4 \cos(\pi/m)^2 \det M_{n-2} = 2 \det M_{n-1} - \lambda \det M_{n-2}$$

mit  $\lambda \in \{1, 2\}$ , denn  $\cos(\pi/3) = 1/2$  und  $\cos(\pi/4) = 1/\sqrt{2}$ . Unter Benutzung von  $\sin(\pi/5) =$

<sup>26</sup>Diese speziellen Graphen heißen *Dynkin-Diagramme*.



$\sqrt{10 - 2\sqrt{5}}/4$  berechnet man induktiv

$$(A_n): \det M = 2n - (n - 1) = n + 1,$$

$$(B_n): \det M = 2 \cdot 2 - 2 = 2,$$

$$(D_n): \det M = 2 \cdot 4 - 4 = 4,$$

$$(E_6): \det M = 2 \cdot 4 - 5 = 3,$$

$$(E_7): \det M = 2 \cdot 3 - 4 = 2,$$

$$(E_8): \det M = 2 \cdot 2 - 3 = 1,$$

$$(F_4): \det M = 2 \cdot 2 - 3 = 1,$$

$$(H_3): \det M = 2 \cdot 4 \sin(\pi/5)^2 - 2 = \frac{10 - 2\sqrt{5} - 4}{2} = 3 - \sqrt{5} > 0,$$

$$(H_4): \det M = 2(3 - \sqrt{5}) - 4 \sin(\pi/5)^2 = \frac{12 - 4\sqrt{5} - 5 + \sqrt{5}}{2} = \frac{7 - 3\sqrt{5}}{2} > 0.$$

**Hilfsgraphen:** Wir fügen an einige der Graphen eine weitere Ecke hinzu und erhalten die folgenden Coxetergraphen<sup>27</sup> (die Anzahl der Ecken ist nun  $n + 1$ ):

$$(\tilde{A}_1) \quad \circ \text{---} \infty \bullet$$

$$(\tilde{A}_n) \quad \begin{array}{c} \circ \\ \diagup \quad \diagdown \\ \bullet \text{---} \bullet \text{---} \dots \text{---} \bullet \end{array} \text{ mit } n \geq 2.$$

$$(\tilde{B}_n) \quad \begin{array}{c} \circ \\ | \\ \bullet \text{---} \bullet \text{---} \dots \text{---} \bullet \end{array} \text{ mit } n \geq 3.$$

$$(\tilde{C}_n) \quad \circ \text{---} \overset{4}{\bullet} \text{---} \bullet \text{---} \dots \text{---} \bullet \text{---} \overset{4}{\bullet} \text{ mit } n \geq 2.$$

$$(\tilde{D}_n) \quad \begin{array}{c} \circ \\ | \\ \bullet \text{---} \bullet \text{---} \dots \text{---} \bullet \end{array} \text{ mit } n \geq 4.$$

$$(\tilde{E}_6) \quad \begin{array}{c} \circ \\ | \\ \bullet \text{---} \bullet \text{---} \bullet \end{array}$$

$$(\tilde{E}_7) \quad \circ \text{---} \bullet \text{---} \bullet \text{---} \bullet \text{---} \bullet$$

$$(\tilde{E}_8) \quad \bullet \text{---} \bullet \text{---} \bullet \text{---} \bullet \text{---} \bullet \text{---} \circ$$

$$(\tilde{F}_4) \quad \circ \text{---} \bullet \text{---} \overset{4}{\bullet} \text{---} \bullet$$

$$(\tilde{G}_2) \quad \circ \text{---} \overset{6}{\bullet}$$

Wir zeigen, dass die entsprechende Bilinearform positiv semidefinit, aber nicht positiv definit ist. Für  $\tilde{A}_n$  sind die Zeilensummen von  $M$  alle  $2 - 1 - 1 = 0$ , d.h. 0 ist ein Eigenwert und  $\det M = 0$ . In allen anderen Fällen kann man obige Rekursionsformel anwenden (beachte  $\sin(\pi/6) = 1/2$ ):

$$(\tilde{B}_n): \det M = 2 \cdot 2 - 2 \cdot 2 = 0,$$

$$(\tilde{C}_n): \det M = 2 \cdot 2 - 2 \cdot 2 = 0,$$

$$(\tilde{D}_n): \det M = 2 \cdot 4 - 2 \cdot 4 = 0,$$

$$(\tilde{E}_6): \det M = 2 \cdot 3 - 6 = 0,$$

$$(\tilde{E}_7): \det M = 2 \cdot 2 - 4 = 0,$$

$$(\tilde{E}_8): \det M = 2 \cdot 1 - 2 = 0,$$

$$(\tilde{F}_4): \det M = 2 \cdot 1 - 2 = 0,$$

$$(\tilde{G}_2): \det M = 2 \cdot 1 - 2 = 0.$$

Fügt man eine Ecke zu  $H_3$  und  $H_4$  hinzu, so erhält man folgende Coxetergraphen:

$$(Z_4): \circ \text{---} \overset{5}{\bullet} \text{---} \bullet$$

$$(Z_5): \bullet \text{---} \overset{5}{\bullet} \text{---} \bullet \text{---} \bullet \text{---} \circ$$

<sup>27</sup>Die Bezeichnungen sind in der Literatur nicht einheitlich.

Wegen

$$(Z_4): \det M = 2(3 - \sqrt{5}) - 3 = 3 - 2\sqrt{5} < 0,$$

$$(Z_5): \det M = 7 - 3\sqrt{5} - (3 - \sqrt{5}) = 4 - 2\sqrt{5} < 0$$

sind die entsprechenden Bilinearformen nicht mehr positiv semidefinit.

**Eindeutigkeit:** Sei nun  $G$  eine endliche irreduzible Coxetergruppe vom Rang  $n$ . Sei  $m$  das größte Kantengewicht. Nehmen wir an, dass  $C(G)$  nicht zu den oben beschriebenen positiv (semi)definiten Graphen gehört.

- (1) Da alle zusammenhängenden Graphen mit  $n = 2$  bereits aufgelistet wurden, gilt  $n \geq 3$ .
- (2) Nach Lemma 11.44 ist  $\tilde{A}_1$  kein Teilgraph von  $C(G)$  und daher  $m < \infty$ .
- (3) Da  $\tilde{A}_k$  kein Teilgraph ist, muss  $C(G)$  ein Baum sein. Nehmen wir zunächst  $m = 3$  an.
- (4) Wegen  $C(G) \neq A_n$  besitzt  $C(G)$  einen Verzweigungspunkt.
- (5) Da  $\tilde{D}_k$  kein Teilgraph ist, gibt es genau einen Verzweigungspunkt  $e$ .
- (6) Da  $\tilde{D}_4$  kein Teilgraph ist, besitzt  $e$  genau drei Äste. Seien  $a \leq b \leq c$  die Anzahl der Ecken der drei Äste.
- (7) Da  $\tilde{E}_6$  kein Teilgraph ist, ist  $a = 1$ .
- (8) Da  $\tilde{E}_7$  kein Teilgraph ist, ist  $b \leq 2$ .
- (9) Wegen  $C(G) \neq D_n$  ist  $b = 2$ .
- (10) Da  $\tilde{E}_8$  kein Teilgraph ist, ist  $c \leq 4$ .
- (11) Da  $C(G)$  weder  $E_6$ ,  $E_7$  noch  $E_8$  ist, kann der Fall  $m = 3$  nicht eintreten. Sei also  $m \geq 4$ .
- (12) Da  $\tilde{C}_k$  kein Teilgraph ist, kann es nur eine Kante mit Gewicht  $> 3$  geben.
- (13) Da  $\tilde{B}_k$  kein Teilgraph ist, gibt es keine Verzweigungspunkte, d. h.  $C(G)$  ist eine Linie. Nehmen wir nun  $m = 4$  an.
- (14) Wegen  $C(G) \neq B_n$  haben die beiden äußeren Kanten Gewicht 3.
- (15) Da  $\tilde{F}_4$  kein Teilgraph ist, muss  $n = 4$  gelten.
- (16) Wegen  $C(G) \neq F_4$  kann  $m = 4$  nicht gelten. Sei also  $m \geq 5$ .
- (17) Da  $\tilde{G}_2$  kein Teilgraph ist, gilt  $m = 5$ .
- (18) Da  $Z_4$  kein Teilgraph ist, muss eine äußere Kante Gewicht  $m$  haben.
- (19) Da  $Z_5$  kein Teilgraph ist, muss  $n \leq 4$  gelten.
- (20) Nun wäre aber  $C(G)$  gleich  $H_3$  oder  $H_4$ . Widerspruch. □

**Satz 11.46.** *Für die Gruppen in Satz 11.45 gilt*

$$(A_n) \quad G \cong S_{n+1}$$

$$(E_6) \quad G \cong \text{Aut}(\text{SU}(4, 2)) \cong \text{SU}(4, 2) \rtimes C_2 \text{ mit } |G| = 51.840 = 2^7 3^4 5.$$

$$(B_n) \quad G \cong C_2 \wr S_n.$$

$$(E_7) \quad G \cong \text{Sp}(6, 2) \times C_2 \text{ mit } |G| = 2.903.040 = 2^{10} 3^4 5 \cdot 7.$$

$$(D_n) \quad G \cong C_2^{m-1} \rtimes S_n.$$

$$(E_8) \quad G = 2.\text{GO}^+(8, 2) \text{ mit } |G| = 696.729.600 = 2^{14} 3^5 5^2 7. \quad (H_3) \quad G \cong A_5 \times C_2.$$

$$(H_4) \quad |G| = 14.400 = 2^6 3^2 5^2.$$

$$(F_4) \quad G \cong (C_2^3 \rtimes S_4) \rtimes S_3.$$

$$(I_2(m)) \quad G \cong D_{2m}.$$

*Beweisskizze.* Für  $(A_n)$  und  $(I_2(m))$  ist die Behauptung aus Beispiel 11.32 bekannt. Da  $[\cdot, \cdot]_G$  positiv definit ist, stimmt  $[\cdot, \cdot]_G$  bis auf Basiswahl mit dem Standardskalarprodukt auf  $\mathbb{R}^n$  überein. Wir wählen konkrete Vektoren  $b_1, \dots, b_n$  mit den vorgegebenen Werten  $[b_i, b_j]$  und bestimmen  $\sigma(G)$  explizit. Sei  $e_1, \dots, e_n$  die Standardbasis von  $\mathbb{R}^n$ .

$(B_n)$  Definiere  $b_i := \frac{1}{\sqrt{2}}(e_i - e_{i+1})$  für  $i = 1, \dots, n-1$  und  $b_n = e_n$ . Es gilt  $[b_i, b_i] = 1$ ,  $[b_i, b_j] = 0$  für  $|j - i| > 1$ ,  $[b_i, b_{i+1}] = -1/2 = -\cos(\pi/3)$  für  $i = 1, \dots, n-2$  und  $[b_{n-1}, b_n] = -1/\sqrt{2} = -\cos(\pi/4)$  wie gewünscht. Es gilt  $b_i^\perp = \langle e_j, e_i + e_{i+1} : i \neq j \neq i+1 \rangle$ . Bezüglich  $e_1, \dots, e_n$  entspricht  $\sigma(x_i)$  der Permutationsmatrix zur Transposition  $(i, i+1)$  für  $i = 1, \dots, n-1$  und  $\sigma(x_n) = \text{diag}(1, \dots, 1, -1)$ . Daher ist  $\sigma(G)$  die Gruppe der vorzeichenbehafteten Permutationsmatrizen. Dies zeigt  $G \cong C_2 \wr S_n$ .

$(D_n)$  Definiere  $b_i := \frac{1}{\sqrt{2}}(e_i - e_{i+1})$  für  $i = 1, \dots, n-1$  und  $b_n = \frac{1}{\sqrt{2}}(e_{n-1} + e_n)$ . Es gilt  $[b_{n-2}, b_{n-1}] = [b_{n-2}, b_n] = -1/2$  und  $[b_{n-1}, b_n] = 0$ . Wieder sind  $\sigma(x_i)$  für  $i < n$  Permutationsmatrizen und

$$\sigma(x_n) = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & 0 & -1 \\ & & & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Daher besteht  $\sigma(G)$  aus den vorzeichenbehafteten Permutationsmatrizen mit einer geraden Anzahl von  $-1$ -Einträgen. Die entsprechenden Diagonalmatrizen bilden einen Normalteiler  $C_2^{n-1}$  mit Komplement  $S_n$  in  $G$ .

$(H_3)$  Für  $x := x_3 x_2$ ,  $y := x_2 x_1$  gilt  $|\langle x \rangle| = 3$ ,  $|\langle y \rangle| = 5$  und  $|\langle xy \rangle| = 2$ . Nach Beispiel 2.16 existiert ein Epimorphismus  $A_5 \rightarrow \langle x, y \rangle =: H$ . Da  $A_5$  einfach ist, folgt  $H \cong A_5$ . Aus  $\sigma(H) \leq \text{SL}(3, \mathbb{R})$  und  $\det(\sigma_1) = -1$  ergibt sich  $|G| = 2|H| = 120$ . Nach Bemerkung 6.3 gilt  $G \in \{S_5, A_5 \times C_2\}$ . Im Fall  $G \cong S_5$  wäre  $D_{10} \cong \langle x_1, x_2 \rangle \leq A_5$  im Widerspruch zu  $\det(x_1) = -1$ .

Die anderen Fällen sind recht aufwendig und können mit GAP behandelt werden:

```
for para in [{"E",6}, {"E",7}, {"E",8}, {"F",4}] do
  L:=SimpleLieAlgebra(para[1],para[2],Rationals);
  R:=RootSystem(L);;
  W:=WeylGroup(R);
  Print(para, " ", Order(W), "\n");
od;
F:=FreeGroup("a", "b", "c", "d");;
AssignGeneratorVariables(F);;
H4:=F/[a^2,b^2,c^2,d^2, (a*b)^5, (b*c)^3, (c*d)^3, Comm(a,c), Comm(a,d), Comm(b,d)];
#Comm(a,b)=[a,b]
Size(H4);
```

□

### Bemerkung 11.47.

- (i) Die Matrix  $-1_n$  liegt offenbar im Zentrum der Coxetergruppe  $G \cong C_2^n \rtimes S_n$  vom Typ  $(B_n)$  (Permutationsmatrizen mit Vorzeichen). Nach Satz 11.36 ist  $Z(G) = \langle -1_n \rangle$ . Wenn  $n$  ungerade ist, gilt

$G = Z(G) \times H$ , wobei  $H$  zur Coxetergruppe vom Typ  $(D_n)$  isomorph ist (Permutationsmatrizen mit einer geraden Anzahl an  $-1$ -Einträgen). Dennoch ist  $G$  irreduzibel. Für  $n = 3$  erhält man

$$G \cong C_2 \times (C_2^2 \rtimes S_3) \cong C_2 \times S_4.$$

Diese Gruppe permutiert die acht Eckpunkte des Würfels  $(\pm 1, \pm 1, \pm 1)$  und ist daher dessen Symmetriegruppe (und des Oktaeders mit Ecken  $(\pm 1, 0, 0)$ ,  $(0, \pm 1, 0)$ ,  $(0, 0, \pm 1)$ ). Für  $n \geq 4$  erhält man die Symmetriegruppe des  $n$ -dimensionalen Hyperwürfels. Die Coxetergruppe  $H \cong C_2^2 \rtimes S_3 \cong S_4$  vom Typ  $(D_3)$  permutiert die vier Eckpunkte  $(1, 1, 1)$ ,  $(1, -1, -1)$ ,  $(-1, 1, -1)$ ,  $(-1, -1, 1)$  des Tetraeders und ist daher dessen Symmetriegruppe. Bekanntlich ist  $S_4$  auch die Coxetergruppe vom Typ  $(A_3)$ .

- (ii) Man kann zeigen, dass die Coxetergruppe vom Typ  $(H_3)$  die Symmetriegruppe des Dodekaeders (bzw. des Ikosaeders) ist. Die Coxetergruppe vom Typ  $(F_4)$  ist eine Erweiterung der Gruppe vom Typ  $(D_4)$  mit  $S_3$ . Die Coxetergruppe vom Typ  $(E_8)$  ist eine Schur-Erweiterung der orthogonalen Gruppe  $GO^+(8, 2) \cong \Omega^+(8, 2).2$  mit Zentrum  $C_2$ .
- (iii) Eine (komplexe) *Lie-Algebra* ist ein endlich-dimensionaler  $\mathbb{C}$ -Vektorraum  $L$  mit einer alternierenden bilinearen Abbildung  $L \times L \rightarrow L$ ,  $(v, w) \mapsto [v, w]$ , die die *Jacobi-Identität*

$$[u, [v, w]] + [v, [w, u]] + [w, [u, v]] = 0$$

erfüllt. Zum Beispiel  $L = \mathbb{C}^{n \times n}$  mit  $[v, w] := vw - wv$ . Man nennt  $L$  *einfach*, falls  $[L, L] \neq 0$  und falls kein Unterraum  $0 < U < L$  mit  $[L, U] \subseteq U$  existiert. Die Klassifikation der einfachen Lie-Algebren führt auf die Diagramme  $A_n, B_n, C_n, D_n, E_6, E_7, E_8, F_4$  und  $G_2$ .<sup>28</sup> Diese entsprechen mehr oder weniger den einfachen Gruppen vom Lie-Typ (zum Beispiel entspricht  $A_n$  der Familie  $PSL(n+1, q)$  und  $C_n$  der Familie  $PSp(2n, q)$ ).

- (iv) Man nennt  $\sigma \in GL(\mathbb{C}^d)$  eine *komplexe Spiegelung*, falls  $|\langle \sigma \rangle| < \infty$  und  $\dim \text{Ker}(\sigma - \text{id}) = d - 1$ . Eine *komplexe Spiegelungsgruppe* ist eine endliche Untergruppe  $G \leq GL(\mathbb{C}^d)$ , die von komplexen Spiegelungen erzeugt wird. Jede Spiegelungsgruppe ist offenbar auch eine komplexe Spiegelungsgruppe. Shephard und Todd haben die irreduziblen komplexen Spiegelungsgruppen vollständig klassifiziert. Abgesehen von 34 Ausnahmen hat jede solche Gruppe die Form

$$G(m, d, n) := \langle (x_1, \dots, x_n; \sigma) \in C_m \wr S_n : (x_1 \dots x_n)^{m/d} = 1 \rangle,$$

wobei  $n, m, d \in \mathbb{N}$  und  $d \mid m$ . Offenbar ist  $G(m, 1, 1) \cong C_m$ ,  $G(1, 1, n) \cong S_n$ ,  $G(2, 1, n) \cong C_2 \wr S_n$  (Typ  $(B_n)$ ),  $G(2, 2, n)$  Typ  $(D_n)$  und  $G(m, m, 2) \cong D_{2m}$  (Typ  $(I_2(m))$ ). Die 34 Ausnahme-Gruppen sind leider nur in der alten GAP-Version 3 verfügbar.<sup>29</sup>

**Definition 11.48.** Für  $a, b, c \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$  nennt man

$$D(a, b, c) := \langle x, y \mid x^a = y^b = (xy)^c = 1 \rangle$$

eine *von-Dyck-Gruppe*.

**Lemma 11.49.**  $D(a, b, c)$  hängt nicht von der Reihenfolge und der Vorzeichen von  $a, b, c$  ab.

*Beweis.* Die Unabhängigkeit vom Vorzeichen ist offensichtlich. Sei also  $a, b, c \geq 1$ . Wegen  $(xy)^c = 1 \iff (yx)^c = 1$  kann man  $a$  und  $b$  vertauschen. Sei nun  $x' := xy$  und  $y' := y^{-1}$ . Dann ist  $x^a = y^b = (xy)^c = 1$  äquivalent zu  $(x')^c = (y')^b = (x'y')^a = 1$ . Also kann man auch  $a$  und  $c$  vertauschen.  $\square$

<sup>28</sup>Siehe Algebra-Skript

<sup>29</sup><https://github.com/jmichel17/gap3-jm>

**Satz 11.50.** Genau dann ist  $D(a, b, c)$  endlich, wenn  $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} > 1$ . Ggf. tritt einer der folgenden Fälle ein:

- (i)  $D(1, b, c) \cong C_{\text{ggT}(b, c)}$ .
- (ii)  $D(2, 2, c) \cong D_{2c}$ .
- (iii)  $D(2, 3, 3) \cong A_4$ .
- (iv)  $D(2, 3, 4) \cong S_4$ .
- (v)  $D(2, 3, 5) \cong A_5$ .

*Beweis.* Nach Lemma 11.49 können wir  $1 \leq a \leq b \leq c$  annehmen. Sei zunächst  $a = 1$ . Nach Euklid existieren  $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$  mit  $\text{ggT}(b, c) = \alpha b + \beta c$ . Also ist  $y^{\text{ggT}(b, c)} = (y^b)^\alpha (y^c)^\beta = 1$  in  $D(1, b, c)$ . Es folgt  $|D(1, b, c)| \leq \text{ggT}(b, c)$ . Umgekehrt erfüllt auch  $C_{\text{ggT}(b, c)}$  die Relationen von  $D(1, b, c)$ . Also gilt (i).

Im Fall  $a = b = 2$  folgt die Behauptung aus Beispiel 1.17. Der Fall  $(a, b, c) = (2, 3, 3)$  wurde in Aufgabe 2 behandelt.

Sei  $(a, b, c) = (2, 3, 4)$  und  $G := \langle x, y \mid x^4 = y^2 = (xy)^3 = 1 \rangle \cong D(2, 3, 4)$  und  $H := \langle x \rangle \leq G$ . Wir betrachten die Nebenklassen

$$H, yH, xyH, x^2yH, x^3yH, yx^2yH.$$

Wegen  $xyx = yx^{-1}y$  und  $xyx^2y = yx^{-1}yxy = yx^2xyxy = yx^2yx^{-1}$  werden die Nebenklassen durch Linksmultiplikation von  $x$  permutiert. Wegen  $xyy = x^{-1}yx^{-1} = x^3yx^3$  permutiert auch  $y$  diese Nebenklassen und wir sehen, dass jedes Element in  $G$  in einer dieser Nebenklassen enthalten ist. Also ist  $|G| \leq |G : H| |H| \leq 24$ . Andererseits sieht man, dass  $x' := (1, 2, 3, 4)$  und  $y' := (1, 2)$  in  $S_4$  auch die Relationen von  $G$  erfüllen. Dies liefert (iv). Der Fall  $(a, b, c) = (2, 3, 5)$  wurde bereits mehrfach behandelt (Bemerkung 1.18, Beispiel 2.16). Man sieht leicht, dass in allen anderen Fällen  $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \leq 1$  gilt.

Sei

$$H := \langle u, v, w \mid u^2 = v^2 = w^2 = (uv)^a = (vw)^b = (uw)^c = 1 \rangle$$

eine Coxetergruppe. Offenbar ist  $N := \langle uv, vw \rangle \leq H$  mit  $|H : N| = 2$ . Außerdem existiert ein Epimorphismus  $D(a, b, c) \rightarrow N$ . Es genügt also zu zeigen, dass  $H$  unendlich ist für  $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \leq 1$ . Im Fall  $a \geq 3$  ist  $C(H)$  ein Kreis und  $|H| = \infty$  nach Satz 11.45. Sei also  $a = 2$  und  $\frac{1}{b} + \frac{1}{c} \leq \frac{1}{2}$ . Dann ist  $b, c \geq 3$  und  $H$  ist irreduzibel. Für  $b = 3$  ist  $c \geq 6$  und die Behauptung folgt in jedem Fall aus Satz 11.45.  $\square$

**Bemerkung 11.51.** Eine endliche Gruppe  $G \neq 1$  heißt *Hurwitz-Gruppe*, falls  $G = \langle x, y \rangle$  mit  $x^2 = y^3 = (xy)^7 = 1$  gilt. Dies sind also genau die endlichen nicht-trivialen Faktorgruppen der unendlichen von-Dyck-Gruppe  $D(2, 3, 7)$ . Nach Aufgabe 37 sind alle Hurwitz-Gruppen perfekt und tatsächlich sind viele einfache Gruppen, u. a.  $A_n$  für  $n \geq 168$ ,  $\text{GL}(3, 2)$  und die sporadische *Monstergruppe* Hurwitz-Gruppen.

**Satz 11.52.** Für  $n \in \mathbb{N}$  gibt es unendlich viele Primzahlen  $p \equiv 1 \pmod{n}$ .<sup>30</sup>

<sup>30</sup>Dies ist ein Spezialfall des DIRICHLETSchen Primzahlsatz: Die Primzahlen verteilen sich gleichmäßig auf die primen Restklassen modulo  $n$ , d. h. für  $\text{ggT}(k, n) = 1$  beträgt der Anteil der Primzahlen in  $k + n\mathbb{Z}$  genau  $1/\varphi(n)$ .

*Beweis.* Seien  $p_1, \dots, p_s$  Primzahlen mit  $p_i \equiv 1 \pmod{n}$  für  $i = 1, \dots, s$  (der Fall  $s = 0$  ist zugelassen). Sei  $m := np_1 \dots p_s$ . Das Kreisteilungspolynom  $\Phi_m$  induziert als normiertes Polynom eine unbeschränkte Funktion  $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ . Daher existiert ein  $k \in \mathbb{N}$  mit  $\Phi_m(km) > 1$ . Sei  $p$  ein Primteiler von  $\Phi_m(km)$ . Wegen  $\Phi_m(km) \mid ((km)^m - 1)$  ist  $p \nmid m$  und die Ordnung  $r$  von  $mk + p\mathbb{Z} \in \mathbb{F}_p^\times$  teilt  $\text{ggT}(m, p-1)$ . Nehmen wir  $r < m$  an und setzen  $a := (mk)^r \equiv 1 \pmod{p}$ . Dann gilt

$$\frac{m}{r} \equiv 1 + a + \dots + a^{\frac{m}{r}-1} = \frac{a^{\frac{m}{r}} - 1}{a - 1} = \frac{(mk)^n - 1}{(mk)^r - 1} = \prod_{\substack{d \mid m \\ d \nmid r}} \Phi_d(mk) \equiv 0 \pmod{p}$$

im Widerspruch zu  $p \nmid m$ . Also gilt  $r = m$  ist  $m \mid p-1$ , d.h.  $p \equiv 1 \pmod{m}$ . Wegen  $n \mid m$  gilt auch  $p \equiv 1 \pmod{n}$ . Andererseits ist  $m = np_1 \dots p_s$  und  $p \notin \{p_1, \dots, p_s\}$ . Wir haben also eine neue Primzahl in der Restklasse  $1 + n\mathbb{Z}$  gefunden.  $\square$

**Satz 11.53** (MILLER). Für  $a, b, c \in \mathbb{N} \setminus \{1\}$  existiert eine endliche Gruppe  $G = \langle x, y \rangle$  mit  $|\langle x \rangle| = a$ ,  $|\langle y \rangle| = b$  und  $|\langle xy \rangle| = c$ .

*Beweis* (HOLT). Anstatt  $G$  als Quotienten einer von-Dyck-Gruppe zu konstruieren, geben wir einen unabhängigen Beweis. Satz 11.52 garantiert die Existenz einer Primzahl  $p \equiv 1 \pmod{2abc}$ . Seien  $\zeta_a, \zeta_b, \zeta_c \in \mathbb{F}_p^\times$  Elemente mit Ordnung  $2a, 2b$  bzw.  $2c$ . Sei  $\lambda \in \mathbb{F}_p$  zunächst beliebig. Dann haben

$$x := \begin{pmatrix} \zeta_a & 1 \\ 0 & \zeta_a^{-1} \end{pmatrix} \in \text{SL}(2, p), \quad y := \begin{pmatrix} \zeta_b & 0 \\ \lambda & \zeta_b^{-1} \end{pmatrix} \in \text{SL}(2, p)$$

die Eigenwerte  $\zeta_a \neq \zeta_a^{-1}$  bzw.  $\zeta_b \neq \zeta_b^{-1}$ . Insbesondere sind  $x, y$  diagonalisierbar und es folgt  $|\langle x \rangle| = 2a$  und  $|\langle y \rangle| = 2b$ . Wegen  $\text{tr}(xy) = \zeta_a \zeta_b + \zeta_a^{-1} \zeta_b^{-1} + \lambda$  kann man  $\lambda$  so wählen, dass  $\text{tr}(xy) = \zeta_c + \zeta_c^{-1}$  gilt. Für die Eigenwerte  $e, f$  von  $xy$  (in einem Zerfällungskörper) gilt  $e + f = \text{tr}(xy)$  und  $ef = \det(xy) = \det(x) \det(y) = 1$ . Dies zeigt  $\{e, f\} = \{\zeta_c, \zeta_c^{-1}\}$  und  $xy$  ist ebenfalls diagonalisierbar mit Ordnung  $2c$ . Da  $x^a, x^b$  und  $(xy)^c$  den doppelten Eigenwert  $-1$  haben, gilt  $x^a = y^b = (xy)^c = -1_2 \in Z := Z(\text{SL}(2, p))$ . Mit  $\bar{x} := xZ$  und  $\bar{y} := yZ$  erfüllt  $G = \langle \bar{x}, \bar{y} \rangle \leq \text{PSL}(2, p)$  die Behauptung.  $\square$

## 12 Freie Produkte und Amalgame

**Beispiel 12.1.** Das direkte Produkt  $G \times H$  von zwei Gruppen  $G$  und  $H$  ist die größte Gruppe  $D$  mit folgenden Eigenschaften:

- $G, H \leq D$  und  $D = \langle G, H \rangle$ ,
- $xy = yx$  für alle  $x \in G$  und  $y \in H$ .

Wir konstruieren die größte Gruppe, die nur die erste Eigenschaft erfüllt.

**Definition 12.2.** Sei  $G_I := \{G_i : i \in I\}$  eine nichtleere Familie von Gruppen. Ein *freies Produkt* von  $G_I$  ist eine Gruppe  $G$  mit Homomorphismen  $\lambda_i : G_i \rightarrow G$  ( $i \in I$ ) mit folgender universeller Eigenschaft: Für jede Gruppe  $H$  und Homomorphismen  $\rho_i : G_i \rightarrow H$  existiert genau ein Homomorphismus  $\varphi : G \rightarrow H$  mit  $\rho_i = \varphi \lambda_i$  für alle  $i \in I$ .

**Lemma 12.3.**

- (i) Die Homomorphismen  $\lambda_i$  sind injektiv und  $G = \langle \lambda_i(G_i) : i \in I \rangle$ .

(ii) Bis auf Isomorphie gibt es höchstens ein freies Produkt von  $G_I$ .

*Beweis.*

- (i) Sei  $H := G_i$ ,  $\rho_i := \text{id}_H$  und  $\rho_j := 1$  für  $j \neq i$ . Dann existiert ein  $\varphi: G \rightarrow H$  mit  $\text{id}_H = \rho_i = \varphi\lambda_i$ . Insbesondere ist  $\lambda_i$  injektiv. Sei nun  $H := \langle \lambda_i(G_i) : i \in I \rangle \leq G$  und  $\rho_i := \lambda_i: G_i \rightarrow H$ . Dann existiert genau ein  $\varphi: G \rightarrow H$  mit  $\lambda_i = \varphi\lambda_i$  für  $i \in I$ . Aus dem gleichen Grund existiert genau ein Homomorphismus  $\varphi': G \rightarrow G$  mit  $\lambda_i = \varphi'\lambda_i$ . Offensichtlich muss  $\varphi' = \text{id}_G$  gelten. Interpretiert man  $\varphi$  als Abbildung  $G \rightarrow G$ , so gilt auch  $\varphi = \varphi'$ . Dies zeigt  $G = H$ .
- (ii) Sei  $H$  ebenfalls ein freies Produkt von  $G_I$  mit Homomorphismen  $\mu_i: G_i \rightarrow H$ . Dann existieren Homomorphismen  $\varphi: G \rightarrow H$  und  $\psi: H \rightarrow G$  mit  $\mu_i = \varphi\lambda_i$  und  $\lambda_i = \psi\mu_i$  für  $i \in I$ . Es folgt  $\psi\varphi\lambda_i = \psi\mu_i = \lambda_i$  und  $\varphi\psi\mu_i = \varphi\lambda_i = \mu_i$ . Nun sind, wie in (i),  $\text{id}_G$  und  $\text{id}_H$  die einzigen Homomorphismen mit  $\text{id}_G\lambda_i = \lambda_i$  und  $\text{id}_H\mu_i = \mu_i$ . Dies zeigt  $\varphi\psi = \text{id}_H$  und  $\psi\varphi = \text{id}_G$ . Insbesondere ist  $\varphi: G \rightarrow H$  ein Isomorphismus.  $\square$

**Bemerkung 12.4.** Nach Lemma 12.3 kann man von dem freien Produkt von  $G_I$  sprechen ohne die Homomorphismen  $\lambda_i$  zu erwähnen. Man schreibt  $G = \text{Fr}_{i \in I} G_i$  oder  $G_1 * \dots * G_n$  falls  $I = \{1, \dots, n\}$ .<sup>31</sup> Da die  $\lambda_i$  injektiv sind, kann man  $G_i \leq G$  annehmen (dies entspricht dem formalen Unterschied zwischen direktem Produkt und direkter Summe).

**Satz 12.5.** Für jede nichtleere Familie von Gruppen  $G_I$  existiert  $\text{Fr}_{i \in I} G_i$ .

*Beweis.* Wir modifizieren Definition 12.2. O. B. d. A. sei  $G_i \cap G_j = \emptyset$  für  $i \neq j$ . Sei  $W$  die Menge aller formalen Worte der Form  $w = g_1 \dots g_n$  mit  $n \in \mathbb{N}_0$  und  $g_1, \dots, g_n \in \bigcup_{i \in I} G_i$ . Man nennt  $w$  *reduziert*, falls  $g_1, \dots, g_n \neq 1$  und  $\{g_i, g_{i+1}\} \not\subseteq G_j$  für  $i = 1, \dots, n-1$  und alle  $j \in I$ . Offenbar lässt sich  $w$  stets reduzieren. Wörter  $v, w \in W$  heißen *äquivalent*, falls sie sich zu dem gleichen Wort reduzieren lassen. Sei  $G = \{[w] : w \in W\}$  die Menge der Äquivalenzklassen dieser Relation. Offenbar ist  $G$  eine Gruppe bzgl. Konkatenation. Wir definieren  $\lambda_i: G_i \rightarrow G$  durch  $\lambda_i(g) := [g]$  für  $g \in G_i$ . Sei nun  $H$  eine weitere Gruppe und  $\rho_i: G_i \rightarrow H$  Homomorphismen für  $i \in I$ . Die Abbildung  $\varphi: G \rightarrow H$  mit  $[w] \mapsto \rho_{i_1}(g_1) \dots \rho_{i_n}(g_n)$  für  $g_j \in G_{i_j}$  ist ein wohldefinierter Homomorphismus mit  $\rho_i = \varphi\lambda_i$  für  $i \in I$ . Da  $G$  nach Konstruktion durch die Elemente  $[g]$  mit  $g \in \bigcup G_i$  erzeugt wird, ist  $\varphi$  durch  $\rho_i$  eindeutig bestimmt.  $\square$

**Lemma 12.6.** Jedes Element in  $\text{Fr}_{i \in I} G_i$  lässt sich eindeutig als reduziertes Wort schreiben.

*Beweis.* Wir gehen wie in Lemma 1.7 vor. Sei  $R$  die Menge der reduzierten Worte  $r = g_1 \dots g_n$  mit  $g_1, \dots, g_n \in \bigcup G_i$ . Für  $g \in G_j$  sei

$$g_r := \begin{cases} r & \text{falls } g = 1, \\ gg_1 \dots g_n & \text{falls } g_1 \notin G_j, \\ g_2 \dots g_n & \text{falls } g = g_1^{-1}, \\ (gg_1)g_2 \dots g_n & \text{sonst.} \end{cases}$$

Man sieht leicht, dass dies eine Operation  $G_j \rightarrow \text{Sym}(R)$  beschreibt. Nach der universellen Eigenschaft lässt sich die Operation zu  $G \rightarrow \text{Sym}(R)$  fortsetzen. Für  $v, w \in R$  mit  $[v] = [w]$  gilt nun  $v = [v]1 = [w]1 = w$ .  $\square$

<sup>31</sup>Achtung: Verwechslungsgefahr mit dem Zentralprodukt.

**Bemerkung 12.7.** Im Folgenden werden wir  $[w]$  durch  $w$  ersetzen. Jedes Element in  $\text{Fr } G_i$  lässt sich dann eindeutig in der reduzierten Form  $g_1 \dots g_n$  schreiben. Hat man umgekehrt  $H = \langle G_i : i \in I \rangle$ , sodass sich jedes Element in  $H$  eindeutig in reduzierter Form schreiben lässt, so folgt  $H \cong \text{Fr}_{i \in I} G_i$ , denn man kann die Inklusionen  $\sigma_i: G_i \hookrightarrow H$  zu einem Isomorphismus fortsetzen.

**Beispiel 12.8.**

- (a) Ein freies Produkt von freien Gruppen ist frei: Sei  $F_i = F_{X_i}$  mit  $X_i \cap X_j = \emptyset$  für  $i \neq j$ . Sei  $X := \bigcup_{i \in I} X_i$  und  $F := F_X$ . Seien  $\rho_i: F_i \rightarrow H$  Homomorphismen. Dann existiert genau ein Homomorphismus  $\varphi: F \rightarrow H$  mit  $\varphi(x) := \rho_i(x)$  für  $x \in X_i$ . Wegen  $F_i = \langle X_i \rangle$  ist  $\rho_i = \varphi|_{F_i}$ . Als Spezialfall erhält man  $F_n = \mathbb{Z} * \dots * \mathbb{Z}$ .
- (b) Sei  $G = \langle x \rangle * \langle y \rangle \cong C_2 * C_2$  und  $z := xy \in G$ . Wegen  $z^{-1} = yx$  lässt sich jedes Element in  $G$  eindeutig in der Form  $z^a x^b$  mit  $a \in \mathbb{Z}$  und  $b \in \{0, 1\}$  schreiben. Wegen  $xzx^{-1} = z^{-1}$  ist  $G = \langle z \rangle \rtimes \langle x \rangle \cong \mathbb{Z} \rtimes C_2 \cong D_\infty$ .

**Lemma 12.9.** Es gilt  $\text{PSL}(2, \mathbb{Z}) \cong C_2 * C_3$ .

*Beweis.* Seien  $A := \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$  und  $B := \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$  in  $\text{SL}(2, \mathbb{Z})$ . Wir zeigen zunächst  $\text{SL}(2, \mathbb{Z}) = \langle A, B \rangle$ . Sei indirekt  $C = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \text{SL}(2, \mathbb{Z}) \setminus \langle A, B \rangle$  mit  $|a| + |c|$  minimal. Nehmen wir  $a \neq 0 \neq c$  an. Dann ist

$$(AB)^s C = \begin{pmatrix} 1 & s \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + sc & b + sd \\ c & d \end{pmatrix} \notin \langle A, B \rangle,$$

$$(BA)^{-r} C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ r & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ ra + c & rb + d \end{pmatrix}.$$

Im Fall  $|a| \geq |c|$  kann man  $s$  so wählen, dass  $|a + sc| + |c| < |a| + |c|$  gilt. Anderenfalls kann man  $r$  so wählen, dass  $|a| + |ra + c| < |a| + |c|$  gilt. Widerspruch. Also ist  $a = 0$  oder  $c = 0$ . Im ersten Fall wäre

$$C = \begin{pmatrix} 0 & \pm 1 \\ \mp 1 & d \end{pmatrix} \in \{BA^2(AB)^{-d-1}, B(AB)^{d-1}\}$$

und im zweiten Fall wäre

$$C = \begin{pmatrix} \pm 1 & b \\ 0 & \pm 1 \end{pmatrix} \in \{(AB)^b, A^2(AB)^{-b}\}.$$

Dies zeigt  $\text{SL}(2, \mathbb{Z}) = \langle A, B \rangle$ .

Wegen  $A^2 = -1 = B^3$  haben  $\overline{A}, \overline{B} \in \text{PSL}(2, \mathbb{Z})$  Ordnung 2 bzw. 3 (beachte  $Z(\text{SL}(2, \mathbb{Z})) = \langle -1_2 \rangle$ ). Sei  $G := \langle x \rangle * \langle y \rangle \cong C_2 * C_3$ . Dann existiert ein Epimorphismus  $\varphi: G \rightarrow \text{PSL}(2, \mathbb{Z})$  mit  $\varphi(x) = \overline{A}$  und  $\varphi(y) = \overline{B}$ . Angenommen es existiert  $w \in \text{Ker}(\varphi) \setminus \{1\}$ . Dann ist  $w$  ein alternierendes Produkt von  $x$  und  $y^{\pm 1}$ . Nach Konjugation können wir  $w = xy^{\epsilon_1} \dots xy^{\epsilon_n}$  mit  $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n \in \{\pm 1\}$  annehmen. Die Matrizen  $AB$  und  $AB^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$  haben nicht-negative bzw. nicht-positive Einträge. Die gleiche Eigenschaft müsste auch für

$$\overline{AB^{\epsilon_1} \dots AB^{\epsilon_{n-1}} AB^{-\epsilon_n}} = \varphi(wy^{\epsilon_n}) = \varphi(w)\varphi(y^{\epsilon_n}) = \overline{B^{\epsilon_n}}$$

gelten. Tatsächlich hat  $B^{\epsilon_n}$  aber sowohl positive als auch negative Einträge. Also ist  $\varphi$  ein Isomorphismus.  $\square$

**Lemma 12.10.** Sei  $F := \text{Fr}_{i \in I} G_i$  mit  $G_i \neq 1$  für alle  $i \in I$ . Dann gilt:

- (i) Jedes Element  $g \in F$  endlicher Ordnung liegt bis auf Konjugation in einem  $G_i$ .



- (ii) Für  $g \in G_i \setminus \{1\}$  gilt  $C_F(g) = C_{G_i}(g)$ .  
 (iii) Für  $|I| \geq 2$  gilt  $|F| = \infty$  und  $Z(F) = 1$ .

*Beweis.*

- (i) Sei  $g = g_1 \dots g_n \in F$  reduziert mit  $n \geq 2$ . Nach Konjugation können wir annehmen, dass  $g_1$  und  $g_n$  in unterschiedlichen Faktoren  $G_i$  liegen. Offenbar ist dann  $g^k \neq 1$  für alle  $k \geq 1$ .  
 (ii) Angenommen es existiert ein  $x = x_1 \dots x_n \in C_F(g) \setminus G_i$  reduziert mit minimaler Länge. Im Fall  $x_1 = g^{-1}$  bzw.  $x_n = g$  wäre auch  $gx \in C_F(g) \setminus G_i$  bzw.  $xg^{-1} \in C_F(g) \setminus G_i$  mit kürzerer Länge. Anderenfalls wäre  $gxg^{-1}$  reduziert, aber ungleich  $x$ . Widerspruch.  
 (iii) Für  $g \in G_i \setminus \{1\}$  und  $h \in G_j \setminus \{1\}$  mit  $i \neq j$  ist  $gh$  reduziert mit unendlicher Ordnung. Außerdem ist  $Z(F) \leq C_F(g) \cap C_F(h) \leq G_i \cap G_j = 1$  nach (ii).  $\square$

**Satz 12.11.** Seien  $G = \text{Fr}_{i \in I} G_i$  und  $H = \text{Fr}_{i \in I} H_i$  freie Produkte über der gleichen Indexmenge  $I$ . Seien  $\sigma_i: G_i \rightarrow H_i$  Homomorphismen für  $i \in I$ . Dann gibt es genau einen Homomorphismus  $\varphi: G \rightarrow H$ , der alle  $\sigma_i$  fortsetzt. Außerdem ist  $\text{Ker}(\varphi)$  der normale Abschluss von  $\bigcup_{i \in I} \text{Ker}(\sigma_i)$  in  $G$ .

*Beweis.* Die Existenz und Eindeutigkeit von  $\varphi$  folgt aus der universellen Eigenschaft. Sei  $N \trianglelefteq G$  der normale Abschluss von  $\bigcup_{i \in I} \text{Ker}(\sigma_i)$  in  $G$ . Sicher ist  $N \subseteq \text{Ker}(\varphi)$ . Nehmen wir  $\text{Ker}(\varphi) \not\subseteq N$  an und wählen  $g = g_1 \dots g_n \in \text{Ker}(\varphi) \setminus N$  reduziert mit minimalem  $n$  und  $g_k \in G_{i_k}$  für  $k = 1, \dots, n$ . Gilt  $\sigma_{i_k}(g_k) \neq 1$  für  $k = 1, \dots, n$ , so wäre  $1 = \varphi(g) = \sigma_{i_1}(g_1) \dots \sigma_{i_n}(g_n)$  reduziert in  $H$ . Dieser Widerspruch zeigt  $\sigma_{i_k}(g_k) = 1$  für ein  $1 \leq k \leq n$ . Dann wäre aber  $g_1 \dots g_{k-1} g_{k+1} \dots g_n \in \text{Ker}(\varphi) \setminus N$  im Widerspruch zur Wahl von  $n$ .  $\square$

**Folgerung 12.12.** Seien  $G_i = \langle X_i \mid R_i \rangle$  Präsentationen für  $i \in I$ . Dann ist

$$\text{Fr}_{i \in I} G_i \cong \langle \bigcup_{i \in I} X_i \mid \bigcup_{i \in I} R_i \rangle.$$

*Beweis.* Sei  $F_i := F_{X_i}$  und  $F$  die freie Gruppe bzgl.  $\bigcup_{i \in I} X_i$ . Nach Beispiel 12.8 ist  $F = \text{Fr}_{i \in I} F_i$ . Sei  $\sigma_i: F_i \rightarrow G_i$  der kanonische Epimorphismus. Nach Satz 12.11 existiert ein Epimorphismus  $\varphi: F \rightarrow \text{Fr}_{i \in I} G_i$  mit  $\text{Ker}(\varphi) = \langle \bigcup \text{Ker}(\sigma_i) \rangle^F = \langle \bigcup R_i^{F_i} \rangle^F = \langle \bigcup R_i \rangle^F$ . Dies zeigt die Behauptung.  $\square$

**Bemerkung 12.13.**

- (i) KUROSCHE hat gezeigt, dass jede Untergruppe  $H$  von  $F := \text{Fr}_{i \in I} G_i$  die Form

$$F_0 * \text{Fr}_{i \in I} \text{Fr}_{HxG_i \in H \setminus F/G_i} (H \cap xG_i x^{-1})$$

hat, wobei  $F_0$  frei ist (hierbei ist  $H \setminus F/G_i$  die Menge der *Doppelnebenklassen* bzgl.  $H$  und  $G_i$ ).

- (ii) Aus direkten Produkten kann man Zentralprodukte machen, indem man zentrale Untergruppen heraufstellt. Wir konstruieren eine nicht-kommutative Variante.

**Definition 12.14.** Sei  $G_I = \{G_i : i \in I\}$  eine Familie von Gruppen. Sei  $H$  eine Gruppe und  $\sigma_i: H \rightarrow G_i$  Monomorphismen für  $i \in I$ . Sei  $N$  der normale Abschluss von  $\{\sigma_i(h)^{-1} \sigma_j(h) : h \in H, i, j \in I\}$  in  $F := \text{Fr}_{i \in I} G_i$ . Man nennt  $F/N$  das *Amalgam* von  $G_I$  bzgl.  $H$ .

**Bemerkung 12.15.** Wegen  $\sigma_i(h) \equiv \sigma_j(h) \pmod{N}$  gilt  $\sigma_i(H)N/N = \sigma_j(H)N/N \leq F/N$ . Man identifiziert also die isomorphen Kopien von  $H$  in  $G_i$ . Im Fall  $H = 1$  ist  $N = 1$  und man erhält das gewöhnliche freie Produkt. Im Gegensatz zum freien Produkt hängt  $F/N$  auch von der Wahl der Monomorphismen  $\sigma_i$  ab.

**Beispiel 12.16.** Wir hatten  $\text{PSL}(2, \mathbb{Z}) = \langle \bar{A}, \bar{B} \rangle \cong C_2 * C_3$  in Lemma 12.9 bewiesen. Man sieht leicht, dass  $\text{SL}(2, \mathbb{Z}) = \langle A, B \rangle$  ein Amalgam von  $\langle A \rangle = C_4$  und  $\langle B \rangle \cong C_6$  bzgl.  $\langle A^2 \rangle = \langle B^3 \rangle = \langle -1_2 \rangle = \text{Z}(\text{SL}(2, \mathbb{Z}))$  ist.

**Lemma 12.17.** *In der Situation von Definition 12.14 sei  $R_i$  ein Repräsentantensystem für die Nebenklassen von  $\sigma_i(H)$  in  $G_i$  mit  $1 \in R_i$ . Dann lässt sich jedes Element in  $F/N$  eindeutig in der reduzierten Form  $r_1 \dots r_n h N$  mit  $n \in \mathbb{N}_0$ ,  $r_k \in R_{i_k} \setminus \{1\}$ ,  $i_k \neq i_{k+1}$  und  $h \in \sigma_{i_n}(H)$  schreiben.*

*Beweis.* Sei  $g = g_1 \dots g_n N \in F/N$  mit  $g_k \in G_{i_k}$  beliebig. Dann existieren  $r_1 = \bar{g}_1 \in R_{i_1}$  und  $h_1 \in H$  mit  $g_1 = r_1 \sigma_{i_1}(h_1)$ . Wegen  $\sigma_{i_1}(h_1)N = \sigma_{i_2}(h_1)N$  existieren  $r_2 = \overline{\sigma_{i_2}(h_1)g_2} \in R_{i_2}$  und  $h_2 \in H$  mit  $g = r_1(\sigma_{i_2}(h_1)g_2)g_3 \dots g_n N = r_1 r_2 \sigma_{i_2}(h_2)g_3 \dots g_n N$  usw. Elemente  $r_i = 1$  kann man weglassen. Auf diese Weise lässt sich  $g$  auf die reduzierte Form bringen.

Sei nun  $R := \{r_1 \dots r_n \sigma_{i_n}(h) : r_i \in R_i, h \in H\} \subseteq F$  die Menge der reduzierten Wörter. Wir zeigen wie in Lemma 12.6, dass  $F$  auf  $R$  operiert. Es genügt zu zeigen, dass jedes  $G_j$  auf  $R$  operiert. Sei  $x = \bar{x} \sigma_j(h_1) \in G_j$  und  $r = r_1 \dots r_n \sigma_{i_n}(h) \in R$ . Wir nehmen zunächst  $j \neq i_1$  an und definieren

$${}^x r := \bar{x} \overline{\sigma_{i_1}(h_1)r_1} \overline{\sigma_{i_2}(h_2)r_2} \dots \overline{\sigma_{i_n}(h_n)r_n} \sigma_{i_n}(h_{n+1}h) \in R$$

mit  $\sigma_{i_k}(h_k)r_k = \overline{\sigma_{i_k}(h_k)r_k \sigma_{i_k}(h_{k+1})}$  für  $k = 1, \dots, n$  (im Fall  $x \in \sigma_j(H)$  muss man  $\bar{x}$  entfernen). Für  $y \in G_j$  folgt

$${}^y ({}^x r) = \bar{y} \bar{x} \overline{\sigma_{i_1}(h'_1 h_1)r_1} \dots \overline{\sigma_{i_n}(h'_n h_n)r_n} \sigma_{i_n}(h'_{n+1} h_{n+1} h)$$

mit  $y\bar{x} = \bar{y}\bar{x} \sigma_j(h'_1)$  und  $\sigma_{i_k}(h'_k) \sigma_{i_k}(h_k)r_k = \overline{\sigma_{i_k}(h'_k h_k)r_k \sigma_{i_k}(h'_{k+1})}$  für  $k = 1, \dots, n$ . Andererseits ist

$${}^{yx} r = \bar{y} \bar{x} \overline{\sigma_{i_1}(h''_1)r_1} \dots \overline{\sigma_{i_n}(h''_n)r_n} \sigma_{i_n}(h''_{n+1} h)$$

mit  $yx = \bar{y}\bar{x} \sigma_j(h''_1)$  und  $\sigma_{i_k}(h''_k)r_k = \overline{\sigma_{i_k}(h''_k)r_k \sigma_{i_k}(h''_{k+1})}$  für  $k = 1, \dots, n$ . Es folgt

$$\bar{y}\bar{x} \sigma_j(h''_1) = yx = y\bar{x} \sigma_j(h_1) = \bar{y}\bar{x} \sigma_j(h'_1 h_1)$$

und  $h''_1 = h'_1 h_1$ , da  $\sigma_j$  injektiv ist. Durch Induktion nach  $k$  ergibt sich

$$\begin{aligned} \overline{\sigma_{i_k}(h''_k)r_k \sigma_{i_k}(h''_{k+1})} &= \sigma_{i_k}(h''_k)r_k = \sigma_{i_k}(h'_k h_k)r_k = \sigma_{i_k}(h'_k) \overline{\sigma_{i_k}(h_k)r_k \sigma_{i_k}(h_{k+1})} \\ &= \overline{\sigma_{i_k}(h'_k h_k)r_k \sigma_{i_k}(h'_{k+1} h_{k+1})} = \overline{\sigma_{i_k}(h''_k)r_k \sigma_{i_k}(h'_{k+1} h_{k+1})}, \end{aligned}$$

d. h.  $h'_{k+1} h_{k+1} = h''_{k+1}$ . Der Fall  $j = i_1$  funktioniert analog. Damit ist  ${}^y ({}^x r) = {}^{yx} r$  bewiesen und  $F$  operiert auf  $R$  mit  ${}^x [r] \equiv [xr] \pmod{N}$ . Für  $h \in H$  hat  $\sigma_i(h)$  die gleiche Wirkung auf  $R$  wie  $\sigma_j(h)$  für  $i, j \in I$ . Also operiert  $N$  trivial und  $F/N$  operiert auf  $R$ . Für  $v, w \in R$  mit  $[v]N = [w]N$  gilt nun  $v = [v]^N 1 = [w]^N 1 = w$ .  $\square$

**Lemma 12.18.** *Sei  $G = F/N$  ein Amalgam von  $G_I$  bzgl.  $H$  und  $\sigma_i: H \rightarrow G_i$ . Dann existieren Untergruppen  $H \cong \bar{H} \leq G$  und  $G_i \cong \bar{G}_i \leq G$  mit  $G = \langle \bar{G}_i : i \in I \rangle$  und  $\bar{H} = \bar{G}_i \cap \langle \bar{G}_j : j \neq i \rangle$  für alle  $i \in I$ .*

*Beweis.* Sei  $\overline{G_i} := G_i N / N$  und  $\overline{H} := \sigma_i(H) N / N \leq G$  (hängt nicht von  $i$  ab). Aus Lemma 12.17 folgt  $\overline{G_i} \cong G_i / G_i \cap N \cong G_i$ . Wegen  $\overline{H} \leq \overline{G_i}$  ist auch  $\overline{H} \cong H$ . Aus  $F = \langle G_i : i \in I \rangle$  folgt  $G = \langle \overline{G_i} : i \in I \rangle$ . Schließlich folgt auch  $\overline{H} = \overline{G_i} \cap \langle \overline{G_j} : j \neq i \rangle$  aus Lemma 12.17.  $\square$

**Bemerkung 12.19.** Wir werden im Folgenden die Gruppen  $G_i$  und  $H$  als Untergruppen von  $G = F/N$  auffassen. Sei  $R_i$  ein Repräsentantensystem für  $G_i/H$  mit  $1 \in R_i$  für  $i \in I$ . Jedes Element in  $G$  lässt sich dann eindeutig in der reduzierten Form  $r_1 \dots r_n h$  mit  $r_k \in R_{i_k} \setminus \{1\}$ ,  $i_k \neq i_{k+1}$  und  $h \in H$  schreiben.

**Lemma 12.20.** *Sei  $G$  ein Amalgam von  $G_I$  bzgl.  $H$ . Dann gilt:*

- (i) *Jedes Element endlicher Ordnung von  $G$  liegt bis auf Konjugation in einem  $G_i$ .*
- (ii) *Existieren verschiedene  $i, j \in I$  mit  $G_i \neq H \neq G_j$ , so ist  $|G| = \infty$ .*

*Beweis.*

- (i) Sei  $g = r_1 \dots r_n h$  in reduzierter Form mit endlicher Ordnung. Nach Konjugation können wir  $i_1 \neq i_n$  annehmen (Achtung: es werden möglicherweise alle  $r_i$  verändert). Dann sind die Elemente  $g, g^2, \dots$  aber alle verschieden. Dieser Widerspruch zeigt  $n \leq 1$  und  $g \in G_{i_1}$ .
- (ii) Für  $g_1 \in G_i \setminus H$  und  $g_2 \in G_j \setminus H$  hat  $g_1 g_2$  unendliche Ordnung.  $\square$

**Satz 12.21.** *Jede endliche Gruppe  $G$  ist eine Untergruppe einer endlichen Gruppe  $\hat{G}$  mit folgender Eigenschaft: Sind  $H, K \leq G$  isomorphe Untergruppe und  $\varphi: H \rightarrow K$  ein Isomorphismus, so existiert ein  $x \in \hat{G}$  mit  $\varphi(h) = x h x^{-1}$  für alle  $h \in H$ . Insbesondere sind  $H$  und  $K$  in  $\hat{G}$  konjugiert.*

*Beweis.* Wir setzen  $\hat{G} := \text{Sym}(G)$  und betten  $G$  mittels der regulären Darstellung  $\sigma: G \rightarrow \hat{G}$ ,  $x \mapsto \sigma_x$  mit  $\sigma_x(y) = xy$  ein. Seien  $\{r_1, \dots, r_n\}$  und  $\{s_1, \dots, s_n\}$  Repräsentantensysteme für die Rechtsnebenklassen von  $H$  bzw.  $K$  in  $G$ .<sup>32</sup> Sei  $\hat{\varphi} \in \hat{G}$  mit  $\hat{\varphi}(h r_i) := \varphi(h) s_i$  für alle  $h \in H$  und  $1 \leq i \leq n$ . Für  $h \in H$ ,  $k \in K$  und  $1 \leq i \leq n$  gilt

$$(\hat{\varphi} \sigma_h \hat{\varphi}^{-1})(k s_i) = (\hat{\varphi} \sigma_h)(\varphi^{-1}(k) r_i) = \hat{\varphi}(h \varphi^{-1}(k) r_i) = \varphi(h) k s_i = \sigma_{\varphi(h)}(k s_i)$$

und  $\hat{\varphi} \sigma_h \hat{\varphi}^{-1} = \sigma_{\varphi(h)}$ .  $\square$

**Bemerkung 12.22.** Der Beweis von Satz 12.21 funktioniert nicht mehr für unendliche Gruppen. Beispielsweise lässt sich der kanonische Isomorphismus  $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow 2\mathbb{Z}$  nicht zu einer Bijektion  $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$  fortsetzen.

**Satz 12.23** (HIGMAN-NEUMANN-NEUMANN). *Sei  $G$  eine Gruppe,  $H, K \leq G$  und  $\varphi: H \rightarrow K$  ein Isomorphismus. Dann ist  $G$  eine Untergruppe einer Gruppe  $\hat{G}$ , sodass ein  $x \in \hat{G}$  mit  $\varphi(h) = x h x^{-1}$  für alle  $h \in H$  existiert. Insbesondere sind  $H$  und  $K$  in  $\hat{G}$  konjugiert.*

*Beweis.* Sei  $\langle a_i \rangle \cong \mathbb{Z}$  und  $G_i := G * \langle a_i \rangle$  für  $i = 1, 2$ . Nach der universellen Eigenschaft existieren Homomorphismen  $\sigma_1: G * H \rightarrow G_1$  und  $\sigma_2: G * H \rightarrow G_2$  mit  $(\sigma_i)|_G = \text{id}$  und  $\sigma_1(h) := a_1 h a_1^{-1}$  sowie  $\sigma_2(h) := a_2 \varphi(h) a_2^{-1}$  für  $h \in H$ . Nach Lemma 12.6 sind  $\sigma_1$  und  $\sigma_2$  injektiv. Sei  $\hat{G}$  das Amalgam von  $G_1$  und  $G_2$  bzgl.  $G * H$ . Nach Lemma 12.18 kann man  $G$  mit  $\sigma_1(G) = \sigma_2(G)$  in  $\hat{G}$  identifizieren. Für  $h \in H$  gilt  $a_1 h a_1^{-1} = \sigma_1(h) = \sigma_2(h) = a_2 \varphi(h) a_2^{-1}$  und die Behauptung folgt mit  $x := a_2^{-1} a_1 \in \hat{G}$ .  $\square$

<sup>32</sup>Mit Halls Heiratssatz kann man zeigen, dass ein *gemeinsames* Repräsentantensystem für diese Rechtsnebenklassen existiert. Das wird hier aber nicht benötigt.

**Bemerkung 12.24.** In der Situation von Satz 12.23 nennt man  $\langle G, x \rangle \leq \hat{G}$  eine HNN-Erweiterung von  $G$  bzgl.  $\varphi: H \rightarrow K$ . Ist  $G$  torsionsfrei, so auch jede HNN-Erweiterung nach Lemma 12.20.

**Satz 12.25.** Jede abzählbare Gruppe ist eine Untergruppe einer Gruppe mit zwei Erzeugern.

*Beweis.* Sei  $G = \{1 = g_0, g_1, \dots\}$  eine abzählbare Gruppe. Ist  $G$  endlich, so folgt die Behauptung aus  $G \leq \text{Sym}(G)$ . Sei also  $|G| = \infty$ . Sei  $F_2 = \langle x, y \rangle$ ,  $X := \{y^k x y^{-k} : k \geq 0\}$  und

$$Y := \{x^k y x^{-k} g_k : k \geq 0\} \subseteq G * F_2.$$

Aus Lemma 12.6 folgt leicht:  $\langle X \rangle \cong F_X \cong F_Y \cong \langle Y \rangle$ . Sei  $\varphi: \langle X \rangle \rightarrow \langle Y \rangle$ ,  $y^k x y^{-k} \mapsto x^k y x^{-k} g_k$  für  $k \geq 0$ . Sei  $\hat{G} := \langle G * F_2, s \rangle$  eine HNN-Erweiterung von  $G * F_2$  bzgl.  $\varphi$ . Dann gilt  $s y^k x y^{-k} s^{-1} = x^k y x^{-k} g_k$  für  $k \geq 0$ . Insbesondere ist  $y = s x s^{-1} \in \langle x, s \rangle$  und  $g_k = (x^k y x^{-k})^{-1} s y^k x y^{-k} s^{-1} \in \langle x, s \rangle$  für  $k \geq 1$ . Dies zeigt  $G \leq \hat{G} = \langle x, s \rangle$ .  $\square$

**Satz 12.26.** Es existiert eine unendliche Gruppe mit genau zwei Konjugationsklassen.

*Beweis.* Sei zunächst  $G = G_1 = \{1 = g_0, g_1, g_2, \dots\}$  eine beliebige abzählbare torsionsfreie Gruppe (zum Beispiel  $G = \mathbb{Z}$ ). Induktiv existiert eine torsionsfreie abzählbare HNN-Erweiterung  $G_{n+1}$  von  $G_n$ , sodass  $g_1$  und  $g_{n+1}$  in  $G_{n+1}$  konjugiert sind. In der torsionsfreien abzählbaren Gruppe  $G^* := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} G_n$  sind dann alle  $g_i$  konjugiert. Wir setzen nun  $H_1 := G$  und  $H_{n+1} := H_n^*$  für  $n \geq 1$ . Sei schließlich  $H := \bigcup_{n \geq 1} H_n$ . Für  $x, y \in H \setminus \{1\}$  existiert ein  $n \geq 1$  mit  $x, y \in H_n$ . Nach Konstruktion sind  $x$  und  $y$  in  $H_{n+1} \leq H$  konjugiert. Also besitzt  $H$  nur zwei Konjugationsklassen.  $\square$

**Bemerkung 12.27.** Sei  $G$  eine Torsionsgruppe mit Klassenzahl 2. Dann hat jedes nicht-triviale Element in  $G$  die gleiche Ordnung  $p$ . Sicher ist  $p$  eine Primzahl. Im Fall  $p > 2$  kann  $x \in G \setminus \{1\}$  nicht zu  $x^{-1}$  konjugiert sein. Also ist  $p = 2$  und  $G$  ist abelsch. Es folgt  $G \cong C_2$ .

## 13 Das Burnside-Problem

**Bemerkung 13.1.** BURNSIDE fragte 1902:

- (I) Ist jede endlich erzeugte Torsionsgruppe endlich?
- (II) Ist jede endlich erzeugte periodische Gruppe endlich?<sup>33</sup>
- (III) Gibt es für  $d, e \in \mathbb{N}$  höchstens endlich viele endliche Gruppen mit  $d$  Erzeugern und Exponenten  $e$ ?

Die erste Frage wurde 1964 von GOLOD negativ beantwortet (Satz 13.3). NOVIKOV und ADJAN beantworteten 1968 auch (II) negativ. ZELMANOV hingegen bewies 1990, dass (III) richtig ist (er bekam dafür die Fieldsmedaille).<sup>34</sup>

**Satz 13.2.** Jede endlich erzeugte auflösbare Torsionsgruppe ist endlich.

*Beweis.* Sei  $G$  eine endlich erzeugte auflösbare Torsionsgruppe. Nach dem Hauptsatz über endlich erzeugte abelsche Gruppen ist  $G/G'$  endlich. Nach Satz 2.11 ist  $G'$  endlich erzeugt. Durch Induktion nach der Auflösbarkeitslänge folgt, dass  $G$  endlich ist.  $\square$

<sup>33</sup>Erinnerung: Periodisch bedeutet, dass die Ordnung aller Elemente global beschränkt ist (also  $\exp(G) < \infty$ ).

<sup>34</sup>Der Beweis benutzt Schreiers Vermutung und basiert damit auf der CFSG.

**Satz 13.3** (GOLOD). Für jede Primzahl  $p > 2$  existiert eine unendliche  $p$ -Gruppe mit zwei Erzeugern.<sup>35</sup>

*Beweis* (GUPTA).

**Schritt 1:** Konstruktion von  $G$ .

Sei  $\langle a \rangle \cong \langle t \rangle \cong C_p$  und  $H = \langle a \rangle * \langle t \rangle$ . Sei  $a_i := t^i a t^{-i}$  und

$$A := \langle a \rangle^H = \langle a_0, a_1, \dots, a_{p-1} \rangle.$$

Da sich jedes Element aus  $A$  eindeutig in der Form  $a_{i_1}^{n_1} \dots a_{i_s}^{n_s}$  mit  $1 \leq n_1, \dots, n_s < p$  und  $i_k \neq i_{k+1}$  schreiben lässt, ist  $A \cong \langle a_0 \rangle * \dots * \langle a_{p-1} \rangle$  (Bemerkung 12.7). Außerdem gilt  $H = A \rtimes \langle t \rangle$ . Für  $0 \leq k < p$  sei  $\theta_k: A \rightarrow H$  der Homomorphismus mit  $\theta_k(a_k) := a$  und  $\theta_k(a_i) := t^{i-k}$  für  $i \neq k$ . Setze  $N_0 = 1$  und

$$N_{k+1} := \{x \in A : \forall i : \theta_i(x) \in N_k\}.$$

Offenbar ist  $1 = N_0 \leq N_1 \leq \dots$ . Wir zeigen  $N_k \trianglelefteq H$ . Dies ist klar für  $k = 0$ . Sei induktiv  $N_k \trianglelefteq H$ . Dann ist zunächst  $N_{k+1} \trianglelefteq A$ . Sei  $w = w(a_0, \dots, a_{p-1}) \in N_{k+1}$ . Wegen  $\theta_i(a_j) = \theta_{i-1}(a_{j-1})$  ist

$$\theta_i(twt^{-1}) = \theta_i(w(a_1, \dots, a_{p-1}, a_0)) = \theta_{i-1}(w(a_0, \dots, a_{p-1})) \in N_k$$

und  $twt^{-1} \in N_{k+1}$ . Dies zeigt  $N_{k+1} \trianglelefteq H$ . Also ist auch  $N := \bigcup_{k \geq 0} N_k \trianglelefteq H$ . Sei schließlich

$$G := H/N.$$

**Schritt 2:**  $G$  ist eine endlich erzeugte  $p$ -Gruppe.

Sicher ist  $G = \langle aN, tN \rangle$ . Für  $h = wt^i \in H$  mit  $w = a_{j_1}^{w_1} \dots a_{j_s}^{w_s} \in A$  reduziert und  $0 \leq i < p$  sei

$$l(h) := \begin{cases} 1 + s & \text{falls } i \neq 0, \\ s & \text{falls } i = 0. \end{cases}$$

Wir zeigen  $h^{p^{l(h)}} \in N_{l(h)}$  für alle  $h \in H$ . Dann ist  $G$  eine  $p$ -Gruppe. Für  $l(h) \leq 1$  ist  $h \in \langle t \rangle \cup \langle a_0 \rangle \cup \dots \cup \langle a_{p-1} \rangle$  und  $h^p = 1 \in N_0$ . Sei  $l(h) = n + 1$  und die Behauptung für  $n$  bereits bewiesen. Nehmen wir zunächst  $i \neq 0$  an. Dann ist  $l(w) = n$  und

$$h^p = (wt^i)^p = wt^i wt^{-i} t^{2i} wt^{-2i} \dots t^{(p-1)i} wt^{-(p-1)i}.$$

Für  $w = w(a_0, \dots, a_{p-1})$  gilt  $t^{ji} wt^{-ji} = w(a_{ji}, a_{ji+1}, \dots, a_{ji+p-1})$ , wobei die Indizes modulo  $p$  zu lesen sind. Sei  $d_k$  die Anzahl der Potenzen von  $a_k$  in  $w$ . Die Anzahl der Potenzen von  $a_k$  in  $h^p$  ist dann höchstens

$$\sum_{j=0}^{p-1} d_{k-ji} = \sum_{j=0}^{p-1} d_j \leq n$$

wegen  $p \nmid i$ . Die Anzahl der Potenzen von  $a$  in  $\theta_k(h^p)$  ist also ebenfalls  $\leq n$ . Wir zählen wie viele  $t$  in  $\theta_k(h^p)$  auftreten. Sei  $s_r$  die Summe der Exponenten aller  $a_r$  in  $w$ . Der Beitrag dieser Potenzen in der Exponentensumme von  $t$  in  $\theta_k(h^p)$  ist dann

$$\sum_{j=0}^{p-1} s_r(r + ij - k) \equiv s_r \left( p(r - k) + i \binom{p}{2} \right) \equiv 0 \pmod{p},$$

da  $p > 2$  (man beachte, dass für  $ij + r = k$  nichts gezählt wird). Wegen  $A \trianglelefteq H$  lassen sich alle  $t$  in  $\theta_k(h^p)$  nach rechts schieben, ohne dass sich die Exponentensumme ändert. Dies zeigt  $\theta_k(h^p) \in A$ . Durch das

<sup>35</sup>Gilt auch für  $p = 2$ , aber mit anderem Beweis.

Verschieben der  $t$  werden einige der  $a$  in  $a_j$  umgewandelt. Deren Anzahl ist aber nach wie vor  $\leq n$ , d. h.  $l(\theta_k(h^p)) \leq n$ . Nach Induktion ist  $\theta_k(h^{p^{n+1}}) = \theta_k(h^p)^{p^n} \in N_n$  für alle  $k$ , d. h.  $h^{p^{n+1}} \in N_{n+1}$ .

Sei nun  $i = 0$ , also  $h = w \in A$ . Nach Konjugation können wir annehmen, dass  $w$  nicht mit dem gleichen  $a_j$  beginnt und endet. Gilt bereits  $l(\theta_k(w)) \leq n$  für alle  $k$ , so ist  $\theta_k(w^{p^n}) \in N_n$  nach Induktion und es folgt  $w^{p^n} \in N_{n+1}$  sowie  $w^{p^{n+1}} \in N_{n+1}$ . Nehmen wir also  $l(\theta_k(w)) = n + 1$  für ein  $k$  an (man beachte, dass die Länge nicht größer werden kann). Enthält  $w$  zwei Potenzen von  $a_j$  mit  $j \neq k$ , so werden diese unter  $\theta_k$  in Potenzen von  $t$  überführt. Nachdem man alle  $t$  in  $\theta_k(w)$  nach rechts schiebt, erhält man den Widerspruch  $l(\theta_k(w)) \leq n$ . Also kann  $w$  höchstens eine Potenz von jedem  $a_j$  mit  $j \neq k$  enthalten. Andererseits beginnt und endet  $w$  mit verschiedenen  $a_j$ . Dies zeigt  $n = 1$  und nach Konjugation hat  $w$  die Form  $w = a_k^r a_j^s$  mit  $j \neq k$ . Es folgt  $\theta_k(w) = a^r t^{j-k}$ . Wie im Fall  $i \neq 0$  ergibt sich  $\theta_m(\theta_k(w)^p) \in A$  mit  $l(\theta_m(\theta_k(w)^p)) \leq 1$  für  $m = 0, \dots, p-1$  (an dieser Stelle hatten wir noch keine Induktion benutzt). Also ist  $\theta_m(\theta_k(w^{p^2})) = 1$  und  $\theta_k(w^{p^2}) \in N_1$ . Vertauscht man die Rollen von  $k$  und  $j$ , so erhält man  $\theta_j(w^{p^2}) \in N_1$ . Für  $m \notin \{k, j\}$  ist sogar  $\theta_m(w^p) = 1$ . Also ist  $w^{p^2} \in N_2$  wie behauptet.

**Schritt 3:**  $|G| = \infty$ .

Angenommen  $G$  ist endlich. Nach Reidemeister-Schreier ist dann  $N$  endlich erzeugt. Insbesondere ist  $N = N_n$  für ein  $n \in \mathbb{N}$ . Wir definieren  $v_0 := [a_1, a] \in A$  und  $v_{k+1} = [v_k, a] \in A$  für  $k \geq 0$ . Dann gilt  $\theta_0(v_0) = [t, a] = a_1 a^{-1}$  und  $\theta_0(v_1) = [a_1 a^{-1}, a] = v_0$ . Induktiv folgt  $\theta_0(v_{k+1}) = v_k$  für  $k \geq 0$ . Nach Lemma 12.10 haben alle  $v_i$  unendliche Ordnung, denn ihre reduzierte Form beginnt mit  $a_1$  und endet mit  $a^{-1}$ . Sei  $r \geq 0$  mit  $v_0^r \in N_2$ . Dann ist  $\theta_0(v_0^r) = (a_1 a^{-1})^r \in N_1$  und man erhält  $(ta^{-1})^r = \theta_0(a_1 a^{-1})^r = 1$ . Dies zeigt  $p \mid r$ . Es folgt

$$1 = ((ta^{-1})^p)^{r/p} = ((at^{-1})^p)^{-r/p} = (a_0 a_{p-1} \dots a_1)^{-r/p}$$

und  $r = 0$ . Wir haben damit  $\langle v_0 \rangle \cap N_2 = 1$  bewiesen. Sei nun induktiv  $\langle v_{k-1} \rangle \cap N_{k+1} = 1$  und  $v_k^r \in N_{k+2}$ . Dann ist  $v_{k-1}^r = \theta_0(v_k)^r \in N_{k+1}$  und  $r = 0$ . Somit gilt  $\langle v_k \rangle \cap N_{k+2} = 1$  für alle  $k \geq 0$ . Andererseits ist  $v_n^{p^{l(v_n)}} \in N = N_n = N_{n+2}$  nach Schritt 2. Widerspruch.  $\square$

**Definition 13.4.** Für  $d, e \in \mathbb{N}$  sei  $B(d, e) := F_d / \langle g^e : g \in F_d \rangle$  die *Burnside-Gruppe* mit  $d$  Erzeugern und Exponent  $e$ . Das Burnside-Problem (II) ist äquivalent zu  $|B(d, e)| < \infty$  für alle  $d, e \in \mathbb{N}$ .

**Satz 13.5.** Für  $d, e \in \mathbb{N}$  gilt

- (i)  $B(1, e) \cong C_e$ .
- (ii)  $B(d, 2) \cong C_2^d$ .
- (iii)  $|B(d, 3)| \leq 3^{3^{d-1}}$ .

*Beweis.*

- (i) Trivial.
- (ii) Jede Gruppe vom Exponent 2 ist abelsch. Nach Burnsidess Basissatz ist  $C_2^d$  die größte elementarabelsche Gruppe mit  $d$  Erzeugern.
- (iii) Induktion nach  $d$ : Der Fall  $d = 1$  folgt aus (i). Sei  $d \geq 2$  und  $G := B(d, 3) = \langle x_1, \dots, x_d \rangle$ . Nach Induktion hat  $H := \langle x_1, \dots, x_{d-1} \rangle$  Ordnung  $\leq 3^{3^{d-2}}$ . Jedes  $g \in G$  hat die Form  $g = h_1 x_d^{\epsilon_1} h_2 \dots x_d^{\epsilon_k} h_{k+1} \dots$  mit  $\epsilon_i \in \{\pm 1\}$  und  $h_i \in H$ . Wegen  $\exp(G) = 3$  gilt

$$x_d^{\pm 1} h x_d^{\pm 1} = h^{-1} x_d^{\mp 1} h^{-1} \quad x_d^{\pm 1} h x_d^{\mp 1} = h^{-1} x_d^{\mp 1} h^{-1} x_d^{\pm 1}$$

für alle  $h \in H$ . Mit der ersten Gleichung lassen sich zwei benachbarte Vorkommen von  $x_d$  in  $g$  eliminieren, wenn sie den gleichen Exponenten haben. Mit der zweiten Gleichung lassen sich zwei benachbarte  $x_d$  tauschen. Auf diese Weise erhält man eine Darstellung mit  $k \leq 2$ . Es folgt

$$G = Hx_dH \cup Hx_d^{-1}H \cup Hx_dHx_d^{-1}H,$$

$$|G| \leq 2|H|^2 + |H|^3 < 3|H|^3 \leq 3^{3^{d-1}+1}$$

(man beachte  $H \subseteq Hx_dHx_d^{-1}H$ ). Da  $G$  eine 3-Gruppe ist, gilt sogar  $|G| \leq 3^{3^{d-1}}$ .  $\square$

**Definition 13.6** (Wiederholung GT). Für  $x_1, \dots, x_n \in G$  sei  $[x_1, x_2] := x_1x_2x_1^{-1}x_2^{-1}$  und

$$[x_1, \dots, x_n] := [x_1, [x_2, \dots, x_n]]$$

für  $n \geq 3$ . Wir setzen  $G^{[1]} := G$  und  $G^{[k]} := [G, G^{[k-1]}]$  für  $k \geq 2$ .

**Lemma 13.7.** Für  $G = \langle X \rangle$  und  $k \geq 1$  gilt  $G^{[k]} = \langle [x_1, \dots, x_k] : x_1, \dots, x_k \in X \rangle G^{[k+1]}$ .

*Beweis.* Die Behauptung gilt für  $k = 1$ , wenn man  $[x] = x$  interpretiert. Sei nun die Behauptung für ein  $k \geq 1$  bereits bewiesen. Sei  $N := \langle [x_1, \dots, x_{k+1}] : x_1, \dots, x_{k+1} \in X \rangle G^{[k+2]} \leq G^{[k+1]}$ . Für  $g \in G$  und  $x_1, \dots, x_{k+1} \in X$  gilt

$$g[x_1, \dots, x_{k+1}]g^{-1} = [g, x_1, \dots, x_{k+1}][x_1, \dots, x_{k+1}] \in G^{[k+2]}N = N.$$

Daraus folgt  $N \trianglelefteq G$ . Modulo  $N$  ist jeder der Erzeuger  $x \in X$  von  $G$  mit den Erzeugern  $[x_1, \dots, x_k]$  und  $g \in G^{[k+1]}$  von  $G^{[k]}$  vertauschbar. Dies zeigt  $G^{[k+1]} = [G, G^{[k]}] \leq N$ .  $\square$

**Lemma 13.8** (LEVI). Sei  $G$  eine Gruppe vom Exponenten 3. Dann gilt

- (i)  $[x, x, y] = 1$  für  $x, y \in G$ .
- (ii)  $[x, y, z] = [y, z, x] = [x, z, y]^{-1}$  für  $x, y, z \in G$ .
- (iii)  $G$  ist nilpotent mit Klasse höchstens 3.

*Beweis.*

(i) Folgt aus

$$x \cdot yxy^{-1} = (xy)^2y^{-2} = (xy)^{-1}y = y^{-1}x^{-1}y = y^2(y^{-1}x)^{-1} = y^2(y^{-1}x)^2 = yxy^{-1} \cdot x.$$

(ii) Aus (i) folgt, dass je zwei Konjugierte von  $x$  vertauschbar sind. Also ist  $\langle x \rangle^G$  abelsch. Es folgt

$${}^x[y, z][x, z] = [xy, z] = {}^{xy}[xy, z] = {}^{xy}(\underbrace{[y, z][x, z]}_{\in \langle y \rangle^G}) = {}^x({}^x[y, z] \cdot {}^y[x, z]) = {}^{x^{-1}}[y, z] \cdot {}^y[x, z].$$

Konjugation mit  $x^{-1}$  liefert

$${}^x[y, z] \cdot {}^y[x, z] = \underbrace{[y, z]}_{\in \langle z \rangle^G} \underbrace{[x, z]}_{\in \langle z \rangle^G} = [x, z][y, z].$$

Nun ist

$$[x, y, z] = {}^x[y, z][z, y] = {}^y[z, x][x, z][y, z][z, y] = {}^y[z, x][x, z] = [y, z, x].$$

Wegen

$$[x, y^{-1}] = [x, yy] = [x, y] \cdot {}^y[x, y] = [x, y]^2 = [x, y]^{-1}$$

ist  $[x, y, z]^{-1} = [x, [y, z]^{-1}] = [x, z, y]$ .

(iii) Aus (ii) folgt  $[x, y, z, w] = [x, [y, z, w]] = [x, z, w, y]$  und

$$[x, y, z, w] = [x, y, [z, w]] = [x, [z, w], y]^{-1} = [y, x, [z, w]]^{-1} = [y, x, z, w]^{-1}.$$

Für  $\pi \in \langle (1, 2), (2, 3, 4) \rangle = S_4$  und  $x_1, \dots, x_4 \in G$  gilt also

$$[x_{\pi(1)}, x_{\pi(2)}, x_{\pi(3)}, x_{\pi(4)}] = [x_1, x_2, x_3, x_4]^{\text{sgn}(\pi)}.$$

Andererseits ist

$$\begin{aligned} [x, y, z, w] &= [x, y, [z, w]] = [[z, w], x, y] = [[z, w], [x, y]] = [[x, y], [z, w]]^{-1} \\ &= [[x, y], z, w]^{-1} = [z, w, [x, y]]^{-1} \stackrel{\pi=(1,3)(2,4)}{=} [x, y, z, w]^{-1}. \end{aligned}$$

Dies zeigt  $[x, y, z, w] = 1$  für alle  $x, y, z, w \in G$  und die Behauptung folgt.  $\square$

### Bemerkung 13.9.

- (i) Bekanntlich ist jede Gruppe vom Exponenten 2 abelsch, also nilpotent der Klasse höchstens 1. Für  $p$ -Gruppen mit Exponent  $p \geq 5$  gibt es hingegen keine absolute Schranke mehr für die Nilpotenzklasse (sofern die Gruppe nilpotent ist).
- (ii) Für  $p > 10^{75}$  bewies OLSCHANSKI die Existenz unendlicher  $p$ -Gruppen, sodass jede nicht-triviale echte Untergruppe Ordnung  $p$  hat. Man nennt diese Gruppen *Tarski-Monster* (wie das sporadische Monster sind sie einfache Gruppen).
- (iii) Der nächste Satz verbessert Satz 13.5.

**Satz 13.10** (LEVI, VAN DER WAERDEN). Für  $d \geq 1$  gilt  $|B(d, 3)| = 3^{d(d^2+5)/6}$ .

*Beweis.* Sei  $G := B(d, 3) = \langle x_1, \dots, x_d \rangle$ . Nach von-Dyck existiert ein Epimorphismus  $G \rightarrow C_3^d$ . Da  $G/G'$  von  $d$  Elementen erzeugt wird, folgt  $G/G' \cong C_3^d$ . Nach Lemma 13.7 wird die elementarabelsche Gruppe  $G'/G^{[3]}$  von den Elementen  $[x_i, x_j]G^{[3]}$  mit  $i < j$  erzeugt. Dies zeigt  $|G'/G^{[3]}| \leq 3^{\binom{d}{2}}$ . Nach Lemma 13.8 ist auch  $G^{[3]}$  elementarabelsch mit  $[x, y, z] = [y, z, x]$  sowie  $[x, y, z] = [x, z, y]^{-1}$ . Nach Lemma 13.7 wird  $G^{[3]}$  daher von den Elementen  $[x_i, x_j, x_k]$  mit  $i < j < k$  erzeugt. Somit ist  $|G^{[3]}| \leq 3^{\binom{d}{3}}$  und  $|G| \leq 3^k$  mit  $k = d + \binom{d}{2} + \binom{d}{3} = d(d^2 + 5)/6$ .

Jedes Element in  $G$  hat die Form

$$x_1^{a_1} \dots x_d^{a_d} [x_1, x_2]^{b_{12}} \dots [x_{d-1}, x_d]^{b_{d-1,d}} [x_1, x_2, x_3]^{c_{123}} \dots [x_{d-2}, x_{d-1}, x_d]^{c_{d-2,d-1,d}}$$

mit  $a_i, b_{ij}, c_{ijk} \in \{0, 1, 2\}$ . Nehmen wir an, dass ein Element  $g$  zwei verschiedene Faktorisierungen dieser Art besitzt. Diese Faktorisierungen müssen in  $G/G'$  gleich sein, denn  $|G/G'| = 3^d$ . Wir können also  $g \in G'$  annehmen. Wegen  $G'' \subseteq G^{[4]} = 1$  (GT-Lemma 3.11) ist  $G'$  abelsch. Durch Umstellen erhält man eine nicht-triviale Relation der Form

$$[x_1, x_2]^{b_{12}} \dots [x_{d-1}, x_d]^{b_{d-1,d}} [x_1, x_2, x_3]^{c_{123}} \dots [x_{d-2}, x_{d-1}, x_d]^{c_{d-2,d-1,d}} = 1.$$

Seien  $i < j < k$  mit  $b_{ij} \neq 0$  oder  $c_{i,j,k} \neq 0$ . Indem wir alle anderen  $x_l = 1$  setzen, erhalten wir eine nicht-triviale Relation in  $B(3, 3)$ . Wenn wir  $|B(3, 3)| = 3^{3(3^2+5)/6} = 3^7$  zeigen können, hätten wir den gewünschten Widerspruch. In GAP lässt sich  $B(3, 3) \cong \text{SmallGroup}(3^7, 4487)$  zeigen.<sup>36</sup> Wir geben dennoch ein theoretisches Argument.

<sup>36</sup>Zum Beispiel mit `OneGroup(3^7, RankPGroup, 3, Exponent, 3);`



Sei  $E_{ij} \in \mathbb{F}_3^{4 \times 4}$  mit  $E_{ij}E_{kl} = \delta_{jk}E_{il}$  wie üblich. Für die unteren Dreiecksmatrizen

$$Y := 1 + E_{31} - E_{42}, \quad Z := 1 - E_{21} - E_{43} \in \text{GL}(4, 3)$$

gilt

$$\begin{aligned} (Y - 1)^2 &= 0 = (Z - 1)^2, & (Y - 1)(Z - 1) &= E_{41} = -(Z - 1)(Y - 1), \\ E_{41}(Y - 1) &= 0 = (Y - 1)E_{41}, & E_{41}(Z - 1) &= 0 = (Z - 1)E_{41}. \end{aligned}$$

Dies zeigt

$$H := \langle Y, Z \rangle = \{1 + \alpha(Y - 1) + \beta(Z - 1) + \gamma E_{41} : \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{F}_3\}$$

und  $(h - 1)^2 = 0$  für alle  $h \in H$ . Insbesondere ist  $|H| = 27$  und  $h^3 = 1 + (h - 1)^3 = 1$ , d. h.  $\exp(H) = 3$ . Sei  $N := \mathbb{F}_3^4$  mit Standardbasis  $e_1, \dots, e_4$  und  $G := N \rtimes H$ , also  $|G| = 3^7$ . Wegen  $1 + h + h^2 = (h - 1)^2 = 0$  gilt für  $v \in N$  und  $h \in H$

$$(vh)^3 = ((1 + h + h^2)v)h^3 = h^3 = 1,$$

d. h.  $\exp(G) = 3$ . Aus  $[Y, e_1] = e_3$ ,  $[Z, e_1] = -e_2$  und  $[Y, e_2] = -e_4$  folgt  $G = \langle e_1, Y, Z \rangle$ . Also ist  $G \cong B(3, 3)$ .  $\square$

**Satz 13.11** (SANOV). Für  $d \geq 1$  gilt  $|B(d, 4)| < \infty$ .

*Beweis.* Sei  $G := B(d, 4)$ . O. B. d. A. sei  $d \geq 2$ . Nach Induktion ist  $H := \langle x_1, \dots, x_{d-1} \rangle$  endlich. Sei  $y := x_d^2$ . Wir zeigen zunächst, dass  $K := \langle y, H \rangle$  endlich ist. Die Behauptung folgt dann mit einem ähnlichen Argument für  $K$  und  $x_d$  anstelle von  $H$  und  $y$ . Jedes  $g \in K$  hat die Form  $g = h_1 y h_2 \dots y h_n$  mit  $h_1, \dots, h_n \in H$ . Sei dabei  $n$  so klein wie möglich. Nehmen wir  $n \geq 2|H| + 4$  an. Dann gibt es unter den Elementen  $h_2 h_3^{-1}$ ,  $h_2 h_4 h_6 (h_3 h_5)^{-1}$ ,  $h_2 h_4 (h_3 h_5 h_7)^{-1}, \dots$  zwei gleiche, sagen wir

$$h_2 h_4 \dots h_{2r} (h_3 h_5 \dots h_{2r+1})^{-1} = h_2 \dots h_{2s} (h_3 \dots h_{2s+1})^{-1}$$

mit  $r < s \leq (n - 2)/2$ . Also ist

$$h_{2r+2} h_{2r+4} \dots h_{2s} (h_{2r+3} h_{2r+5} \dots h_{2s+1})^{-1} = 1.$$

Wegen  $\exp(G) = 4$  und  $y^2 = 1$  ist

$$y h y = h^{-1} y^{-1} h^{-1} y^{-1} h^{-1} = h^{-1} y h^{-1} y h^{-1}$$

für  $h \in H$ . Wir wenden diese Regel auf  $h = h_{2s+1}$  in  $g$  an:

$$g = h_1 y h_2 \dots h_{2s} h_{2s+1}^{-1} y h'_{2s+1} y \dots y h_n.$$

Durch erneute Anwendung mit  $h = h_{2s} h_{2s+1}^{-1}$  wird  $h_{2s-1}$  durch  $h_{2s-1} (h_{2s} h_{2s+1}^{-1})^{-1} = h_{2s-1} h_{2s+1} h_{2s}^{-1}$  ersetzt. Danach wird  $h_{2s-2}$  durch  $h_{2s-2} h_{2s} (h_{2s-1} h_{2s+1})^{-1}$  ersetzt usw. Schließlich wird  $h_{2r+2}$  durch 1 ersetzt. Dies widerspricht der Minimalität von  $n$ . Folglich ist  $n \leq 2|H| + 2$  und man erhält  $|K| < \infty$ .  $\square$

**Beispiel 13.12.** Sei  $F := F_2$  und  $N := \langle x^2 : x \in F \rangle$ . Dann ist  $|F/N| = 4$  und Schreiers Formel zeigt  $N \cong F_5$ . Daher hat  $M := \langle x^2 : x \in N \rangle$  Index 32 in  $N$ . Da  $N$  charakteristisch in  $M$  ist, gilt  $M \trianglelefteq F$ . Nun hat  $G = F/M$  Ordnung  $2^7$ , Exponent 4 und zwei Erzeuger. Dies zeigt  $|B(2, 4)| \geq 2^7$ . Das gleiche Argument liefert  $|B(2, 8)| \geq 2^{7+2^7+1} = 2^{136}$  und  $|B(3, 4)| \geq 2^{3+17} = 2^{20}$ .

**Bemerkung 13.13.** Es gilt  $|B(2, 4)| = 2^{12}$ ,  $|B(3, 4)| = 2^{69}$ ,  $|B(4, 4)| = 2^{422}$  und  $|B(5, 4)| = 2^{2728}$ . Hall bewies

$$|B(d, 6)| = 2^{1+3^a(d-1)} 3^{b+\binom{b}{2}+\binom{b}{3}}$$

mit  $a = d + \binom{d}{2} + \binom{d}{3}$  und  $b = 1 + 2^d(d-1)$ . Man weiß  $|B(d, e)| = \infty$  für alle  $d \geq 2$  und  $e \geq 8000$  (und alle ungeraden  $e \geq 557$ ).<sup>3738</sup>

**Definition 13.14.**

- Sei  $M$  der Durchschnitt aller Normalteiler von  $B(d, e)$  mit endlichem Index und  $B_0(d, e) := B(d, e)/M$ . Das Burnside-Problem (III) ist äquivalent zu  $|B_0(d, e)| < \infty$  für alle  $d, e \in \mathbb{N}$ .
- Sei  $G$  eine endliche Gruppe und  $p$  eine Primzahl. Wir definieren  $N_0 := 1$  und

$$N_{2k-1}/N_{2k-2} := O_{p'}(G/N_{2k-2}), \quad N_{2k}/N_{2k-1} := O_p(G/N_{2k-1})$$

für  $k \geq 1$ . Existiert ein  $k \geq 0$  mit  $N_k = G$ , so nennt man  $G$  *p-auflösbar*. Ggf. nennt man die kleinste Zahl  $l := l_p(G) \geq 0$  mit  $N_{2l+1} = G$  die *p-Länge* von  $G$ .

**Bemerkung 13.15.**

- Ist  $G$  *p-auflösbar*, so kann man die Normalreihe  $N_0 < \dots < N_k$  zu einer Hauptreihe und einer Kompositionsreihe verfeinern. Daher sind alle Haupt- und Kompositionsfaktoren *p*-Gruppen oder *p'*-Gruppen. Insbesondere ist jeder minimale Normalteiler von  $G$  eine *p*-Gruppe oder eine *p'*-Gruppe.
- Offenbar ist jede auflösbare Gruppe *p*-auflösbar für jede Primzahl  $p$ .

**Lemma 13.16** (HALL-HIGMAN). *Sei  $G$  eine *p*-auflösbare Gruppe mit  $O_{p'}(G) = 1$ . Dann ist*

$$C_G(O_p(G)) \leq O_p(G).$$

*Beweis.* O. B. d. A.  $N := O_p(G)$ . Dann ist  $C_G(N)N/N \trianglelefteq G/N$ . Im Fall  $C_G(N) \not\subseteq N$  existiert ein minimaler Normalteiler  $M/N \trianglelefteq G/N$  mit  $M \leq C_G(N)N$ . Wegen  $O_p(G/N) = 1$  ist  $M/N$  eine *p'*-Gruppe (Bemerkung 13.15). Nach Schur-Zassenhaus ist  $M = N \rtimes H$ . Da  $C_G(N)N/C_G(N) \cong N/Z(N)$  eine *p*-Gruppe ist, gilt  $H \leq C_G(N)$  und  $M = N \times H$ . Dann wäre aber  $H \leq O_{p'}(M) \leq O_{p'}(G) = 1$ .  $\square$

**Satz 13.17.** *Sei  $G$  *p*-auflösbar und  $c$  die Nilpotenzklasse einer *p*-Sylowgruppe von  $G$ . Dann gilt  $l_p(G) \leq c$ .*

*Beweis.* Induktion nach  $c$ : Im Fall  $c = 0$  ist  $G = O_{p'}(G)$  und  $l_p(G) = 0$ . Sei nun  $c > 0$  und  $P \in \text{Syl}_p(G)$ . O. B. d. A. sei  $O_{p'}(G) = 1$  und  $N := O_p(G) > 1$ . Nach Hall-Higman ist  $Z(P) \leq C_G(P) \leq C_G(N) \leq N$ . Die *p*-Sylowgruppe

$$PN/N \cong P/P \cap N \cong (P/Z(P))/((N \cap P)/Z(P))$$

von  $G/N$  hat also Nilpotenzklasse  $\leq c - 1$ . Nach Induktion ist  $l_p(G) = l_p(G/N) + 1 \leq c$ .  $\square$

**Satz 13.18.** *Für  $d \geq 1$  gilt  $|B_0(d, 6)| \leq |B_0(d, 12)| < \infty$ .*

<sup>37</sup>Siehe <https://arxiv.org/abs/2303.15997v5>

<sup>38</sup>Magnus kommentierte die erste Arbeit dieser Art als "This paper is possibly the most difficult paper to read that has ever been written on mathematics."

*Beweis.* Da  $B_0(d, 6)$  eine Faktorgruppe von  $B_0(d, 12)$  ist, genügt es  $|B_0(d, 12)| < \infty$  zu zeigen. Sei  $G$  eine endliche Gruppe mit  $d$  Erzeugern und Exponent 12. Nach Burnside's  $p^a q^b$ -Satz ist  $G$  auflösbar. Eine 3-Sylowgruppe  $P$  von  $G$  hat Exponent  $\leq 3$  und Nilpotenzklasse  $\leq 3$  nach Lemma 13.8. Nach Satz 13.17 ist  $l_3(G) \leq 3$ . Sei also  $1 = N_0 \leq \dots \leq N_7 = G$  wie in Definition 13.14. Dann ist  $G/N_6$  eine 2-Gruppe mit  $d$  Erzeugern und Exponent  $\leq 4$ . Nach Satz 13.11 ist  $|G/N_6|$  durch eine Funktion in  $d$  beschränkt. Nach Reidemeister-Schreier ist die Anzahl der Erzeuger von  $N_6$  durch eine Funktion in  $d$  beschränkt. Außerdem hat  $N_6/N_5$  Exponent  $\leq 3$ . Nach Satz 13.10 ist auch  $|N_6/N_5|$  durch eine Funktion in  $d$  beschränkt. Führt man auf diese Weise fort, so erhält man eine obere Schranke für  $|G|$ .  $\square$

**Bemerkung 13.19.** Hall und Higman zeigten, dass man die  $p$ -Länge von  $G$  durch eine Funktion in dem Exponenten einer  $p$ -Sylowgruppe von  $G$  abschätzen kann. Mit Hilfe der CFSG kann man die Frage  $|B_0(d, n)| < \infty$  nun auf den Fall zurückführen, in dem  $n = p^k$  eine Primzahlpotenz ist. Zelmanov bewies schließlich  $|B_0(d, p^k)| < \infty$ .

**Definition 13.20.** Sei  $G = \langle x_1, \dots, x_n \rangle$ . Wir definieren rekursiv eine Menge von *Basiskommutatoren*  $c_1, c_2, \dots$  wie folgt:

- Für  $i = 1, \dots, n$  seien  $c_i := x_i$  die Basiskommutatoren mit *Gewicht*  $\omega(c_i) := 1$ .
- Die Basiskommutatoren  $c_1, \dots, c_k$  seien bereits definiert. Für  $1 \leq i < j \leq k$  ist  $c := [c_i, c_j]$  ein Basiskommutator, falls entweder  $\omega(c_j) = 1$  oder  $c_j = [c_s, c_t]$  mit  $i \geq s$  gilt. Ggf. sei  $\omega(c) := \omega(c_i) + \omega(c_j)$ .
- Die Basiskommutatoren werden aufsteigend nach Gewicht nummeriert, wobei die Reihenfolge der Kommutatoren mit dem gleichen Gewicht keine Rolle spielt.

Für  $k \in \mathbb{N}$  sei  $\delta_n(k)$  die (endliche) Anzahl der Basiskommutatoren mit Gewicht  $k$ . Hierbei gelten Basiskommutatoren als verschieden, selbst wenn sie die gleichen Gruppenelemente repräsentieren (z. B. wenn  $G$  abelsch ist). Wir zeigen in Bemerkung 13.33, dass in der freien Gruppe  $G = F_n$  Basiskommutatoren tatsächlich paarweise verschieden sind.

**Beispiel 13.21.** Offenbar gilt  $\delta_n(1) = n$  und  $\delta_n(2) = \binom{n}{2}$ . Für  $n = 3$  und  $(x_1, x_2, x_3) = (x, y, z)$  sind

$$x, y, z, [x, y], [x, z], [y, z], [x, x, y], [x, x, z], [y, x, y], [y, x, z], [y, y, z], [z, x, y], [z, x, z], [z, y, z]$$

die Basiskommutatoren mit Gewicht  $\leq 3$ . Es gilt also  $\delta_3(3) = 8$ .

**Satz 13.22.** Sei  $G = \langle x_1, \dots, x_n \rangle$  und  $k \in \mathbb{N}$ . Dann wird  $G^{[k]}/G^{[k+1]}$  von den Nebenklassen der Basiskommutatoren mit Gewicht  $k$  erzeugt.

*Beweis.* Für  $k = 1$  ist die Behauptung klar denn  $G^{[1]} = G$ . Sei die Aussage bereits für alle kleineren Werte von  $k$  bewiesen. Nach Definition wird  $G^{[k]}$  von den Kommutatoren  $[g, h]$  mit  $g \in G$  und  $h \in G^{[k-1]}$  erzeugt. Wegen  $G^{[k]}/G^{[k+1]} \leq Z(G/G^{[k+1]})$  gilt

$$\begin{aligned} [xy, h] &= {}^x[y, h][x, h] \equiv [x, h][y, h] \pmod{G^{[k+1]}}, \\ [x^{-1}, h] &\equiv {}^x[x^{-1}, h] = [h, x] = [x, h]^{-1} \pmod{G^{[k+1]}} \end{aligned}$$

für alle  $x, y \in G$ . Wir können daher  $g = x_i = c_i$  mit  $1 \leq i \leq n$  annehmen. Nach Induktion existieren Basiskommutatoren  $c_{j_1}, \dots, c_{j_l}$  mit Gewicht  $k - 1$  und  $h' \in G^{[k]}$  mit  $h = c_{j_1}^{\pm 1} \dots c_{j_l}^{\pm 1} h'$ . Es gilt nun analog

$$[g, h] \equiv [g, c_{j_1}]^{\pm 1} \dots [g, c_{j_l}]^{\pm 1} [g, h'] \equiv [g, c_{j_1}]^{\pm 1} \dots [g, c_{j_l}]^{\pm 1} \pmod{G^{[k+1]}}.$$

Wir können somit  $h = c_j$  annehmen. Wegen  $[c_j, c_i] = [c_i, c_j]^{-1}$  genügt es daher, die folgende Zusatzbehauptung zu zeigen:

Sind  $c_i, c_j$  Basiskommutatoren mit  $i < j$  und  $\omega(c_i) + \omega(c_j) = k$ , so ist  $[c_i, c_j]$  modulo  $G^{[k+1]}$  ein Produkt von Basiskommutatoren mit Gewicht  $k$  und deren Inversen.

Hierzu benutzen wir Induktion nach  $(\omega(c_j), -i)$  bezüglich der lexikographischen Ordnung (beachte:  $i$  durch eine Funktion in  $\omega(c_j)$  nach oben beschränkt). Im Fall  $\omega(c_j) = 1$  ist  $[c_i, c_j]$  ein Basiskommutator. Sei also  $c_j = [c_s, c_t]$  mit  $s < t$ . Im Fall  $i \geq s$  ist  $[c_i, c_j]$  wieder ein Basiskommutator. Sei daher  $i < s < t$ . Die Hall-Witt-Identität (GT-Lemma 3.6) vereinfacht sich zu

$$1 = {}^{c_s}[c_i, c_s^{-1}, c_t] \cdot {}^{c_t}[c_s, c_t^{-1}, c_i] \cdot {}^{c_i}[c_t, c_i^{-1}, c_s] \equiv [c_i, c_s^{-1}, c_t][c_s, c_t^{-1}, c_i][c_t, c_i^{-1}, c_s] \pmod{G^{[k+1]}}.$$

Es existiert ein  $z \in G^{[k]}$  mit  $[c_s^{-1}, c_t] = [c_s, c_t]^{-1}z$  und

$$[c_i, c_s^{-1}, c_t] \equiv [c_i, [c_s, c_t]^{-1}] \equiv [c_i, c_j]^{-1} \pmod{G^{[k+1]}}.$$

Wegen  $[G^{[a]}, G^{[b]}] \leq G^{[a+b]}$  (GT-Lemma 3.11) erhält man analog

$$[c_s, c_t^{-1}, c_i] \equiv [c_s, [c_t, c_i]^{-1}] \equiv [c_s, c_i, c_t] \pmod{G^{[k+1]}}$$

und  $[c_t, c_i^{-1}, c_s] \equiv [c_t, c_i, c_s]^{-1} \pmod{G^{[k+1]}}$ . Insgesamt ist

$$[c_i, c_j] \equiv [c_s, c_i, c_t][c_t, c_i, c_s]^{-1} \pmod{G^{[k+1]}}.$$

Wegen  $\omega(c_i) + \omega(c_t) < k$  und  $\omega(c_i) + \omega(c_s) < k$  sind  $[c_i, c_t]$  und  $[c_i, c_s]$  Produkte von Basiskommutatoren modulo  $G^{[\omega(c_i) + \omega(c_t) + 1]}$  bzw.  $G^{[\omega(c_i) + \omega(c_s) + 1]}$  (Induktion nach  $k$ ). Wie oben genügt es daher,  $[c_s, c_u]$  und  $[c_t, c_v]$  für Basiskommutatoren  $c_u, c_v$  mit  $\omega(c_u) = \omega(c_i) + \omega(c_t)$  und  $\omega(c_v) = \omega(c_i) + \omega(c_s)$  zu behandeln. Wegen  $\omega(c_u) > \omega(c_t) \geq \omega(c_s)$  ist  $s < u$ . Aus  $\omega(c_i) \leq \omega(c_s)$  folgt  $\omega(c_u) \leq \omega(c_j)$  und wegen  $i < s$  ist daher  $(\omega(c_u), -s) < (\omega(c_j), -i)$ . Man kann daher die zweite Induktion auf  $[c_s, c_u]$  anwenden.

Analog ist  $(\omega(c_v), -t) < (\omega(c_j), -i)$  wegen  $\omega(c_i) \leq \omega(c_t)$  und  $i < t$ . Im Fall  $t < v$  sind wir fertig. Im Fall  $t = v$  ist  $[c_t, c_v] = 1$  und im Fall  $v < t$  ist  $[c_t, c_v] = [c_v, c_t]^{-1}$  mit  $(\omega(c_t), -v) < (\omega(c_j), -i)$  wegen  $\omega(c_t) < \omega(c_j)$ . In allen Fällen sind  $[c_s, c_u]$  und  $[c_t, c_v]$  Produkte von Basiskommutatoren mit Gewicht  $k$  und deren Inversen modulo  $G^{[k+1]}$ .  $\square$

**Bemerkung 13.23.** Man kann zeigen, dass jedes Element in  $G^{[k]}$  ein Produkt von Basiskommutatoren vom Gewicht  $\geq k$  ist (das folgt nicht direkt aus Satz 13.22).

**Folgerung 13.24.** Jede nilpotente Gruppe, die von endlich vielen Elementen endlicher Ordnung erzeugt wird, ist endlich.

*Beweis.* Sei  $G = \langle x_1, \dots, x_n \rangle$  nilpotent mit Elementen  $x_1, \dots, x_n$  endlicher Ordnung. Dann ist  $|G/G'| < \infty$ . Induktiv können wir  $e := |G/G^{[k]}| < \infty$  annehmen. O. B. d. A. sei  $G^{[k+1]} = 1$ . Nach Satz 13.22 wird  $G^{[k]}$  von endlich vielen Kommutatoren erzeugt. Aus GT-Aufgabe 18 folgt

$$[x, y]^e = [x^e, y] \in G^{[k+1]} = 1$$

für alle  $[x, y] \in G^{[k]} \leq Z(G)$ . Also ist auch  $G^{[k]}$  endlich.  $\square$

**Bemerkung 13.25.** Der Beweis zeigt: Wird eine nilpotente Gruppe  $G$  von endlich vielen  $p$ -Elementen erzeugt, so ist  $G$  eine  $p$ -Gruppe. Für auflösbare Gruppe ist die Aussage nach Aufgabe 14 falsch (vgl. Satz 13.2).

**Lemma 13.26.** Seien  $c_1, c_2, \dots$  die Basiskommutatoren von  $G = \langle x_1, \dots, x_n \rangle$ . Für alle  $k \geq 1$  gibt es genau  $n^k$  Folgen  $(a_1, a_2, \dots) \in \mathbb{N}_0^\infty$  mit  $a_1 \geq a_2 \geq \dots$  und  $\sum_{a_i \geq 1} \omega(c_{a_i}) = k$ .

*Beweis.* Für  $s \in \mathbb{N}$  sei  $F_s$  die Menge aller Folgen  $(a_1, a_2, \dots) \in \mathbb{N}_0^\infty$ , sodass gilt:

- (i) Es existiert ein  $l \in \mathbb{N}_0$  mit  $a_1, \dots, a_{l-1} \geq s$ ,  $a_l > s$ ,  $s \geq a_{l+1} \geq a_{l+2} \geq \dots$
- (ii) Gilt  $c_{a_m} = [c_i, c_j]$  für ein  $m \leq l$ , so ist  $i < s$ .
- (iii)  $\sum_{a_i \geq 1} \omega(c_{a_i}) = k$ .

Wenn  $s$  groß genug ist, so gilt  $\omega(c_s) > k$ . Ggf. ist  $l = 0$  in (i) und (ii) liefert keine Einschränkungen. Daher besteht  $F_s$  genau aus den Folgen, die wir zählen wollen. Für  $s = 1$  gilt  $\omega(c_{a_i}) = 1$  für alle  $i \in \mathbb{N}$  mit  $a_i \geq 1$ . Nach (iii) ist dann  $a_k > 0 = a_{k+1} = a_{k+2} = \dots$ . Ansonsten gibt es keine weiteren Einschränkungen an die Folge. Wegen  $a_i \in \{1, \dots, n\}$  folgt  $|F_1| = n^k$ .

Für ein gegebenes  $s \geq 1$  genügt es eine Bijektion  $\varphi: F_s \rightarrow F_{s+1}$  zu konstruieren. Sei  $a := (a_i) \in F_s$  und  $l$  wie in (i). Wir durchlaufen die Folge von rechts nach links beginnend bei  $a_l$ . Treffen wir dabei auf ein Paar  $(a_i, a_{i+1}) = (s, t)$  mit  $t > s$ , so ist  $c_j := [c_s, c_t]$  nach (ii) ein Basiskommutator. Wir ersetzen ggf.  $(a_i, a_{i+1})$  durch  $j$ . Dadurch verändert sich (iii) nicht. Anschließend betrachten wir das Paar  $(a_{i-1}, j)$  und iterieren. Die so konstruierte Folge bezeichnen wir mit  $\varphi(a)$ . Nach Konstruktion gilt  $\varphi(a)_i \geq s+1$  für  $i = 1, \dots, l$ . Im Fall  $\varphi(a)_1 = \dots = \varphi(a)_l = s+1$ , gilt (i) mit  $l = 0$  bzgl.  $s+1$ . Anderenfalls gilt (i) mit  $l := \max\{i : \varphi(a)_i > s+1\}$ . Nach Konstruktion erfüllt  $\varphi(a)$  auch (ii). Daher gilt  $\varphi(a) \in F_{s+1}$ .

Sei nun umgekehrt  $(b_i)_i \in F_{s+1}$  mit  $l$  wie in (i) gegeben. Wir durchlaufen  $b$  von links nach rechts beginnend bei  $b_1$ . Gilt  $c_{b_i} = [c_s, c_t]$  für ein  $i \leq l$ , so ersetzen wir  $b_i$  durch das Paar  $(s, t)$ . Anschließend betrachten wir  $t$  bzw.  $c_t$ . Dieser Prozess muss wegen  $\sum_{b_j \geq 1} \omega(c_{b_j}) = k$  nach endlich vielen Schritten enden. Das Endergebnis bezeichnen wir mit  $\psi(b)$ . Offenbar gilt  $\psi(b) \in F_s$  und die Abbildungen  $\varphi$  und  $\psi$  sind zueinander inverse Bijektionen.  $\square$

**Lemma 13.27.** Für  $k \in \mathbb{N}$  gilt

$$\sum_{d|k} \delta_n(d) d = n^k.$$

*Beweis.* Sei  $S_k$  die Menge der Folgen  $(a_1, a_2, \dots) \in \mathbb{N}_0^\infty$  aus Lemma 13.26. Kommt ein Basiskommutator  $c_j$  genau  $t$ -mal in  $(a_i)_i \in S_k$  vor, so trägt er  $t\omega(c_j)$  zur Summe  $\sum_{a_i \geq 1} \omega(c_{a_i}) = k$  bei. Sei  $K_w$  die Menge der Basiskommutatoren mit Gewicht  $w$ . Aus Lemma 13.26 erhält man eine Identität von formalen Potenzreihen:

$$\begin{aligned} \prod_{w=1}^{\infty} (1 - X^w)^{-\delta_n(w)} &= \prod_{w=1}^{\infty} (1 + X^w + X^{2w} + \dots)^{\delta_n(w)} = \prod_{w=1}^{\infty} \prod_{c \in K_w} (1 + X^{\omega(c)} + X^{2\omega(c)} + \dots) \\ &= \prod_{i=1}^{\infty} (1 + X^{\omega(c_i)} + X^{2\omega(c_i)} + \dots) = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{(a_i) \in S_k} X^k = \sum_{k=0}^{\infty} n^k X^k = (1 - nX)^{-1}. \end{aligned}$$

Wir wenden auf beiden Seiten den formalen Logarithmus  $\log(1 - X) := -\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} X^k$  an.<sup>39</sup>

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{n^k}{k} X^k = -\log(1 - nX) = -\sum_{w=1}^{\infty} \delta_n(w) \log(1 - X^w) = \sum_{w=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\delta_n(w)}{k} X^{wk} = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{d|k} \frac{d\delta_n(d)}{k} X^k.$$

Ein Koeffizientenvergleich zeigt die Behauptung.  $\square$

<sup>39</sup>Siehe Kombinatorik-Skript

**Satz 13.28** (WITTS Formel). Sei  $G = \langle x_1, \dots, x_n \rangle$  und  $k \in \mathbb{N}$ . Dann wird  $G^{[k]}/G^{[k+1]}$  von

$$\delta_n(k) = \frac{1}{k} \sum_{d|k} \mu(d) n^{k/d}$$

Elementen erzeugt. Dabei ist  $\mu$  die Möbius-Funktion aus der Zahlentheorie.

*Beweis.* Nach Satz 13.22 wird  $G^{[k]}/G^{[k+1]}$  von den  $\delta_n(k)$  Basiskommutatoren mit Gewicht  $k$  erzeugt. Die Formel für  $\delta_n(k)$  folgt durch Möbius-Inversion aus Lemma 13.27.  $\square$

**Bemerkung 13.29.** Wir zeigen als Nächstes, dass die Abschätzung für die Anzahl der Erzeuger von  $G^{[k]}/G^{[k+1]}$  in Satz 13.28 für die freie Gruppe optimal ist.

**Definition 13.30.**

- Sei  $M := \langle X_1, \dots, X_n \rangle$  das Monoid aller Monome  $X_{i_1} \dots X_{i_k}$  mit  $k \geq 0$  und  $1 \leq i_1, \dots, i_k \leq n$  in den nicht-vertauschbaren Variablen  $X_1, \dots, X_n$  bzgl. Konkatenation (also die freie Gruppe ohne Inverse).
- Sei  $R$  ein kommutativer Ring und  $A := RM$  der freie  $R$ -Modul mit Basis  $M$ . Indem man die Konkatenation distributiv fortsetzt, wird  $A$  zu einem Ring. Zum Beispiel gilt

$$(1 + X_2 X_1^2)(X_1 + X_3 X_2) = X_1 + X_2 X_1^3 + X_3 X_2 + X_2 X_1^2 X_3 X_2.$$

Man nennt  $A$  die *freie Algebra* über  $X_1, \dots, X_n$ .

- Sei  $\deg(X_{i_1} \dots X_{i_k}) := k$  der *Grad* eines Monoms. Sei  $A_k$  der von den Monomen vom Grad  $k$  erzeugte freie  $R$ -Untermodule von  $A$ , d. h.  $A_k$  besteht aus allen *homogenen Polynomen* vom Grad  $k$  (und 0). Offenbar ist  $\text{rk}(A_k) = n^k$  und  $A = \bigoplus_{k \geq 0} A_k$ .
- Der *Kommutator* von  $a, b \in A$  ist  $[a, b] := ab - ba$ . Die Basiskommutatoren in  $A$  definiert man analog zu Definition 13.20. Anstatt  $c_i$  schreiben wir  $C_i$ . Für  $n = 2$  und  $(X_1, X_2) = (X, Y)$  ist zum Beispiel

$$C_4 = [C_1, C_3] = X[X, Y] - [X, Y]X = X(XY - YX) - (XY - YX)X = X^2Y - 2XYX + YX^2$$

(vgl. Beispiel 13.21).

**Lemma 13.31.** Für alle  $k \in \mathbb{N}$  ist

$$B_k := \left\{ C_{a_1} \dots C_{a_m} : m \in \mathbb{N}, a_1 \geq \dots \geq a_m, \sum_{i=1}^m \omega(c_{a_i}) = k \right\}$$

eine Basis von  $A_k$ . Insbesondere sind die Basiskommutatoren mit Gewicht  $k$  linear unabhängig über  $\mathbb{Z}$ .

*Beweis.* Man sieht leicht induktiv, dass ein Basiskommutator mit Gewicht  $k$  in  $A_k$  liegt. Daher gilt  $B_k \subseteq A_k$ . Wir betrachten  $B_k$  zunächst als Multimenge (im zweiten Teil des Beweises zeigt sich, dass die Elemente von  $B_k$  paarweise verschieden sind). Nach Lemma 13.26 ist  $|B_k| = n^k = \text{rk}(A_k)$ . Wir zeigen zunächst, dass  $B_k$  ein Erzeugendensystem von  $A_k$  ist. Dafür betrachten wir die Mengen  $F_s$  aus dem Beweis von Lemma 13.26. Wenn  $s$  groß genug ist, so besteht  $B_k$  genau aus den Produkten  $C_{a_1} \dots C_{a_m}$  mit  $a = (a_i)_i \in F_s$  (Nullen werden aus der Folge entfernt). Andererseits entspricht  $F_1$  genau den Monomen  $X_{i_1} \dots X_{i_k}$ . Es genügt daher zu zeigen, dass man  $C := C_{a_1} \dots C_{a_m}$  mit  $a \in F_s$  durch eine

Linearkombination von  $C_{b_1} \dots C_{b_{m'}}$  mit  $b \in F_{s+1}$  ausdrücken kann. Wie im Beweis von Lemma 13.26 durchlaufen wir die Folge  $a$  von rechts nach links. Gilt  $(a_i, a_{i+1}) = (s, t)$  mit  $t > s$ , ersetzen wir  $C_s C_t$  in  $C$  durch den gleichwertigen Ausdruck  $[C_s, C_t] + C_t C_s$ . Mit  $C_j = [C_s, C_t]$  gilt

$$C = C_{a_1} \dots C_{a_{i-1}} C_j C_{a_{i+2}} \dots C_{a_m} + C_{a_1} \dots C_{a_{i+1}} C_{a_i} \dots C_{a_m}.$$

Mit dem ersten Summanden verfahren wir wie zuvor. Im zweiten Summanden ist  $C_{a_i} = C_s$  nach rechts gerückt. Die entsprechende Folge liegt immer noch in  $F_s$  und kann wie die Ausgangsfolge behandelt werden. Nach endlich vielen Schritten erreicht man eine Linearkombination von  $C_{b_1} \dots C_{b_{m'}}$  mit  $b \in F_{s+1}$ .

Also ist  $B_k$  ein Erzeugendensystem von  $A_k$ .<sup>40</sup> Es gibt daher eine Matrix  $Q \in R^{n^k \times n^k}$ , sodass die Abbildung  $\varphi: R^{n^k} \rightarrow A_k \cong R^{n^k}$ ,  $v \mapsto Qv$  surjektiv ist. Für den  $i$ -ten Standardbasisvektor  $e_i \in R^{n^k}$  existiert ein  $x_i \in R^{n^k}$  mit  $Qx_i = e_i$ . Sei  $L \in R^{n^k \times n^k}$  die Matrix mit Spalten  $x_1, \dots, x_{n^k}$ . Dann gilt  $QL = 1_{n^k}$  und  $\det(Q) \in R^\times$ . Für die zu  $Q$  komplementäre Matrix  $Q^*$  erhält man  $\det(Q)^{-1} Q^* Q = 1_{n^k}$ . Dies zeigt, dass  $\varphi$  injektiv ist. Somit ist  $B_k$  linear unabhängig.  $\square$

**Definition 13.32.** Wie zuvor sei  $A := R\langle X_1, \dots, X_n \rangle$ . Für  $k \in \mathbb{N}_0$  sei  $A_{>k} := \sum_{l>k} A_l$  das von  $A_{k+1}$  erzeugte Ideal in  $A$ . Für ein festes  $k$  benutzen wir die Abkürzung  $I := A_{>k}$ ,  $\bar{A} := A/I$  und  $\mathcal{A} := \overline{1 + A_{>0}} \leq \bar{A}$ .

**Bemerkung 13.33.** Für  $a \in A_{>l}$  gilt

$$(1+a) \sum_{i=0}^k (-a)^i = 1 + (-1)^k a^{k+1} \in 1 + I.$$

Dies zeigt  $\overline{1 + A_{>l}} \leq \bar{A}^\times$ . Insbesondere ist  $\mathcal{A} \leq \bar{A}^\times$ .

**Satz 13.34.** Sei  $F$  die freie Gruppe vom Rang  $n$  und  $k \in \mathbb{N}$ . Dann ist  $F^{[k]}/F^{[k+1]}$  eine freie abelsche Gruppe vom Rang  $\delta_n(k)$ .

*Beweis.* Sei  $F$  frei bzgl.  $x_1, \dots, x_n$ . Wir betrachten  $A = \mathbb{Z}\langle X_1, \dots, X_n \rangle$  mit  $R = \mathbb{Z}$ . Nach der universellen Eigenschaft von  $F$  existiert ein Homomorphismus  $\varphi: F \rightarrow \mathcal{A}$  mit  $\varphi(x_i) = 1 + X_i + I$ . Für  $l \in \mathbb{N}_0$  sei  $D_l := \varphi^{-1}(\overline{1 + A_{>l}}) \leq F$  (Bemerkung 13.33). Seien  $r, s \in \mathbb{N}_0$ ,  $a = 1 + u \in \overline{1 + A_{>r}}$  und  $b = 1 + v \in \overline{1 + A_{>s}}$ . Wegen  $[a, b] = ab - ba = uv - vu \in \overline{A_{>r+s+1}}$  gilt

$$aba^{-1}b^{-1} = 1 + (ab - ba)a^{-1}b^{-1} = 1 + [a, b]a^{-1}b^{-1} \in \overline{1 + A_{>r+s+1}}$$

und daher  $[D_r, D_s] \leq D_{r+s+1}$ . Wegen  $\varphi(F) \subseteq \mathcal{A} = \overline{1 + A_{>0}}$  ist  $F = D_0$ . Induktiv folgt

$$F^{[l+1]} = [F, F^{[l]}] \leq [D_0, D_{l-1}] \leq D_l$$

für alle  $l \geq 1$ . Insbesondere ist  $F^{[k+1]} \leq D_k = \text{Ker}(\varphi)$ .

Wir zeigen als Nächstes

$$\varphi(c_i) \equiv 1 + C_i \pmod{\overline{A_{>\omega(c_i)}}}$$

für jeden Basiskommutator  $c_i$ . Dies ist klar für  $\omega(c_i) = 1$ . Sei also  $[c_i, c_j]$  ein Basiskommutator mit  $w_i := \omega(c_i)$  und  $w_j := \omega(c_j)$ . Nach Induktion existieren  $\epsilon_i \in \overline{A_{>w_i}}$  und  $\epsilon_j \in \overline{A_{>w_j}}$  mit  $a := \varphi(c_i) = 1 + C_i + \epsilon_i$  und  $b := \varphi(c_j) = 1 + C_j + \epsilon_j$ . Wie oben gilt

$$\varphi([c_i, c_j]) = 1 + [a, b]a^{-1}b^{-1} = 1 + [C_i + \epsilon_i, C_j + \epsilon_j]a^{-1}b^{-1} \equiv 1 + [C_i, C_j] \pmod{\overline{A_{>w_i+w_j}}}$$

<sup>40</sup>Da  $R$  im Allgemeinen kein Körper ist, folgt die lineare Unabhängigkeit nicht automatisch.

wie behauptet.

Seien  $c_{i_1}, \dots, c_{i_m}$  die Basiskommutatoren von  $F$  mit Gewicht  $k$ . Nach Satz 13.22 wird  $F^{[k]}/F^{[k+1]}$  von  $c_{i_1}F^{[k+1]}, \dots, c_{i_m}F^{[k+1]}$  erzeugt. Seien  $a_1, \dots, a_m \in \mathbb{Z}$  mit  $g := c_{i_1}^{a_1} \dots c_{i_m}^{a_m} \in F^{[k+1]}$ . Dann gilt

$$1 = \varphi(g) = (1 + C_{i_1})^{a_1} \dots (1 + C_{i_m})^{a_m} = 1 + a_1 C_{i_1} + \dots + a_m C_{i_m}.$$

Daher ist  $a_1 C_{i_1} + \dots + a_m C_{i_m} \in A_k \cap I = 0$ . Aus Lemma 13.31 folgt  $a_1 = \dots = a_m = 0$ . Also ist  $c_{i_1}F^{[k+1]}, \dots, c_{i_m}F^{[k+1]}$  eine Basis von  $F^{[k]}/F^{[k+1]}$ .  $\square$

**Bemerkung 13.35.** Nach Bemerkung 2.10 ist  $F'_2$  frei mit (abzählbar) unendlichem Rang. Daher ist  $F'_2/F''_2$  nicht endlich erzeugt.

**Folgerung 13.36.** Die freie nilpotente Gruppe  $F_n/F_n^{[k+1]}$  vom Rang  $n$  und Nilpotenzklasse  $k$  ist torsionsfrei.

**Satz 13.37.** Für jede Primzahlpotenz  $q = p^e$  und  $n \geq 2$  gilt:

- (i) Es existiert genau eine Gruppe  $P$  mit  $n$  Erzeugern, Exponent  $q$ , Nilpotenzklasse  $p - 1$  und  $P^{[k]}/P^{[k+1]} \cong C_q^{\delta_n(k)}$  für  $k = 1, \dots, p - 1$ .
- (ii) Es existiert eine Gruppe  $P$  mit  $n$  Erzeugern, Exponent  $q$  und Nilpotenzklasse  $q - 1$ , sodass  $P^{[k]}/P^{[k+1]}$  für  $k = 1, \dots, q - 1$  Rang  $\delta_n(k)$  besitzt.

*Beweis.* Sei  $F$  die freie Gruppe mit Erzeugern  $x_1, \dots, x_n$ . Sei  $N := \langle g^q : g \in F \rangle \trianglelefteq F$  und  $\overline{F} := F/N$ .

- (i) Wir betrachten  $A := R\langle X_1, \dots, X_n \rangle$  mit  $R = \mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$ . In der Definition von  $\mathcal{A}$  sei  $k < p$ . Für  $1 + a \in \mathcal{A}$  gilt dann

$$(1 + a)^q = 1 + qa + \binom{q}{2}a^2 + \dots + \binom{q}{p}a^p + \dots = 1.$$

Für die Abbildung  $\varphi: F \rightarrow \mathcal{A}$ ,  $x_i \mapsto 1 + X_i + I$  aus dem Beweis von Satz 13.34 gilt also  $\varphi(N) = 1$ . Die Nebenklassen der Basiskommutatoren  $c_{i_1}, \dots, c_{i_m} \in F$  mit Gewicht  $k$  bilden wie bisher ein Erzeugendensystem von  $\overline{F}^{[k]}/\overline{F}^{[k+1]}$ . Seien  $a_1, \dots, a_m \in R$  mit  $g := c_{i_1}^{a_1} \dots c_{i_m}^{a_m} \in NF^{[k+1]}$ . Dann gilt wie zuvor  $\varphi(g) = 1$  und  $a_1 = \dots = a_m = 0$ . Dies zeigt, dass  $\overline{F}^{[k]}/\overline{F}^{[k+1]} \cong F^{[k]}N/F^{[k+1]}N$  ein freier  $R$ -Modul mit Rang  $\delta_n(k)$  ist. Wegen  $n \geq 2$  ist  $\delta_n(k) > 0$ . Also hat  $P := \overline{F}/\overline{F}^{[p]} \cong F/NF^{[p]}$  die gewünschten Eigenschaften.

Sei umgekehrt  $Q$  eine Gruppe mit den angegebenen Eigenschaften. Dann existiert ein Epimorphismus  $\sigma: F \rightarrow Q$  mit  $NF^{[p]} \leq \text{Ker}(\sigma)$ . Insbesondere ist  $|P| \geq |Q|$ . Aus

$$|Q| = q^{\delta_n(1) + \dots + \delta_n(p-1)} = |P|$$

folgt  $Q \cong P$ .

- (ii) Diesmal betrachten wir  $A = \mathbb{F}_p\langle X_1, \dots, X_n \rangle$  und  $k < q$  in der Definition von  $\mathcal{A}$ . Für  $1 + a \in \mathcal{A}$  gilt nach wie vor

$$(1 + a)^q = \sum_{k=0}^q \binom{q}{k} a^k = 1$$

wegen  $\binom{q}{k} \equiv 0 \pmod{p}$  für  $k = 1, \dots, q - 1$ . Man erhält also wieder einen Homomorphismus  $\varphi: F \rightarrow \mathcal{A}$  mit  $\varphi(N) = 1$ . Da die Basiskommutatoren mit Gewicht  $k$  linear unabhängig über



$\mathbb{F}_p$  sind, hat  $\overline{F}^{[k]}/\overline{F}^{[k+1]}$  Rang  $\delta_n(k)$  (aber nicht unbedingt Exponent  $q$ ). Um zu zeigen, dass  $P := \overline{F}/\overline{F}^{[q]} \cong F/NF^{[q]}$  Exponent  $q$  hat, betrachten wir einen Epimorphismus  $\psi: F \rightarrow C_q^n$ . Wegen  $\psi(NF') = 1$  ist  $P/P' \cong F/F'N \cong C_q^n$ .  $\square$

### Bemerkung 13.38.

- (i) Satz 13.37 zeigt  $\lim_{p \rightarrow \infty} \log_p |B(n, p)| = \infty$  für  $n \geq 2$ . Für die Gruppe  $P$  aus Satz 13.37(i) gilt genauer

$$\log_q |P| = \sum_{k=1}^{p-1} \delta_n(k) = \sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{k} \sum_{d|k} \mu(d) n^{k/d} = \sum_{d=1}^{q-1} \frac{\mu(d)}{d} \sum_{s=1}^{\lfloor (p-1)/d \rfloor} \frac{n^s}{s}.$$

Für  $q \in \{3, 5\}$  erhält man  $|B(n, 3)| \geq 3^{n+\binom{n}{2}} = 3^{\binom{n+1}{2}}$  (vgl. Satz 13.10) und  $|B(2, 5)| \geq 5^{2+1+2+3} = 5^8$ . Tatsächlich gilt  $|B_0(2, 5)| = 5^{34}$  und  $|B_0(3, 5)| = 5^{2282}$  (ohne Beweis).

- (ii) Bekanntlich ist jede Gruppe mit Exponent 2 abelsch, d. h. die Nilpotenzklasse ist  $\leq 1$ . Gruppen vom Exponent 3 können nach Lemma 13.8 höchstens Nilpotenzklasse 3 haben (nach Satz 13.10 tritt dieser Fall auch ein). Die Gruppen  $B_0(2, 5)$  und  $B_0(3, 5)$  haben Nilpotenzklasse 12 bzw. 17. Für  $p \geq 5$  weißt man nicht, ob die Nilpotenzklasse einer Gruppe vom Exponenten  $p$  beschränkt ist.
- (iii) Sei  $p = q > 2$  und  $P$  die Gruppe aus Satz 13.37(i). Dann ist  $P/P^{[3]}$  eine maximale Schur-Erweiterung von  $C_p^n$  (Beispiel 5.21).
- (iv) In Satz 13.37(ii) hat  $P^{[k]}/P^{[k+1]}$  nicht unbedingt Exponent  $q$ . In der Tat gibt es keine Gruppe mit zwei Erzeugern, Ordnung  $2^6$ , Exponent 4 und Nilpotenzklasse 2:  
`OneGroup(2^6, RankPGroup, 2, Exponent, 4, NilpotencyClassOfGroup, 2);`
- (v) Eindeutig bestimmte Gruppen mit gewissen Eigenschaften wie in Satz 13.37 werden wir allgemeiner in Satz 14.29 konstruieren.

## 14 Gruppenklassen und Varietäten

**Definition 14.1.** Eine Klasse  $\mathcal{X}$  von Gruppen heißt *Gruppenklasse*, falls  $1 \in \mathcal{X}$  und  $G \cong H \in \mathcal{X} \Rightarrow G \in \mathcal{X}$ . Die Elemente von  $\mathcal{X}$  heißen  $\mathcal{X}$ -Gruppen oder Gruppen mit Eigenschaft  $\mathcal{X}$ . Eine Gruppe  $G$  heißt *residuale  $\mathcal{X}$ -Gruppe*, falls für alle  $g \in G \setminus \{1\}$  ein  $N \trianglelefteq G$  mit  $g \notin N$  und  $G/N \in \mathcal{X}$  existiert. Die residualen  $\mathcal{X}$ -Gruppen bilden die Gruppenklasse  $\mathcal{X}^r$ .

**Bemerkung 14.2.** Offenbar gilt  $G \in \mathcal{X}^r$  genau dann, wenn  $\bigcap_{\substack{N \trianglelefteq G \\ G/N \in \mathcal{X}}} N = 1$ . Ggf. ist  $G$  zu einer Untergruppe von  $\times_{\substack{N \trianglelefteq G \\ G/N \in \mathcal{X}}} G/N$  isomorph. Ist  $\{G_i : i \in I\}$  eine beliebige Familie von Gruppen, so nennt man  $H \leq \times_{i \in I} G_i$  ein *subdirektes Produkt*, falls die Projektion von  $H$  auf jedes  $G_i$  surjektiv ist.

**Satz 14.3.** Sei  $\mathcal{X}$  eine Gruppenklasse. Dann besteht  $\mathcal{X}^r$  genau aus den subdirekten Produkten von  $\mathcal{X}$ -Gruppen.

*Beweis.* Nach Bemerkung 14.2 ist jede residuale  $\mathcal{X}$ -Gruppe ein subdirektes Produkt von  $\mathcal{X}$ -Gruppen. Sei umgekehrt  $H \leq \times_{i \in I} G_i$  ein subdirektes Produkt von  $\mathcal{X}$ -Gruppen  $G_i$ . Sei  $\pi_i: H \rightarrow G_i$  die Projektion und  $K_i := \text{Ker}(\pi_i) \trianglelefteq H$ . Nach Voraussetzung ist  $H/K_i \cong G_i \in \mathcal{X}$  und  $\bigcap_{i \in I} K_i = 1$ .  $\square$

**Beispiel 14.4.** Ist  $\mathcal{X}$  die Gruppenklasse der abelschen Gruppen, so ist  $\mathcal{X}^r = \mathcal{X}$ .

**Satz 14.5** (IWASAWA). *Jede freie Gruppe ist eine residual endliche  $p$ -Gruppe für jede Primzahl  $p$ .*

*Beweis.* Sei  $a = x_1^{a_1} \dots x_n^{a_n} \in F_X \setminus \{1\}$  mit  $x_i \neq x_{i+1}$  und  $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$  wie in Folgerung 1.9. Sei  $q$  eine Potenz von  $p$ , die nicht  $a_1 \dots a_n$  teilt. Sei  $E_{st} \in \mathbb{Z}/q\mathbb{Z}^{(n+1) \times (n+1)}$  die Matrix mit einer 1 an Position  $(s, t)$  und sonst nur Nullen. Für  $x \in X$  sei

$$\sigma(x) := \prod_{\substack{1 \leq i \leq n \\ x_i = x}} (1_{n+1} + E_{i, i+1}) \in \mathrm{GL}(n+1, \mathbb{Z}/q\mathbb{Z}).$$

Offenbar besteht  $G := \langle \sigma(x) : x \in X \rangle$  aus oberen Dreiecksmatrizen mit Einsen auf der Hauptdiagonale. Daher ist  $G$  eine endliche  $p$ -Gruppe. Nach der universellen Eigenschaft setzt sich  $\sigma$  zu einem Homomorphismus  $\hat{\sigma}: F \rightarrow G$  fort. Wegen  $E_{st}E_{uv} = \delta_{tu}E_{sv}$  und  $x_i \neq x_{i+1}$  sind die Faktoren von  $\sigma(x)$  paarweise vertauschbar. Dies zeigt

$$\sigma(x_i)^{a_i} = \prod_{x_j = x_i} (1_{n+1} + E_{j, j+1})^{a_i} = \prod_{x_j = x_i} (1_{n+1} + a_i E_{j, j+1}) = 1_{n+1} + a_i \sum_{x_j = x_i} E_{j, j+1}.$$

Daraus folgt

$$\hat{\sigma}(a) = \sigma(x_1)^{a_1} \dots \sigma(x_n)^{a_n} = 1_{n+1} + a_1 \dots a_n E_{1, n+1} + \dots \neq 1_{n+1}. \quad \square$$

**Folgerung 14.6** (MAGNUS). *Jede freie Gruppe ist residual nilpotent.*

**Bemerkung 14.7.** Für jede nicht-abelsche freie Gruppe  $F$  gilt  $F^{[\infty]} = \bigcap_{k=1}^{\infty} F^{[k]} = 1$  und  $Z(F) = 1$ . Die auf- und absteigenden Zentralreihen verhalten sich also völlig verschieden.

**Lemma 14.8.** *Sei  $G$  eine endlich erzeugte Gruppe. Dann gilt:*

- (i) Für jedes  $n \in \mathbb{N}$  besitzt  $G$  nur endlich viele Untergruppen mit Index  $n$ .
- (ii) (HALL) Ist  $H \leq G$  mit  $|G : H| < \infty$ , so existiert eine charakteristische Untergruppe  $K \leq G$  mit  $K \leq H$  und  $|G : K| < \infty$ .

*Beweis.*

- (i) Jede Untergruppe  $H \leq G$  vom Index  $n$  induziert einen Homomorphismus  $G \rightarrow S_n$  mit Kern  $H_G$ . Da  $G$  endlich erzeugt ist, existieren nur endlich viele solche Homomorphismen. Wegen  $H_G \leq H$  gibt es mit  $H_G$  auch nur endlich viele Möglichkeiten für  $H$ .
- (ii) Nach (i) ist  $\{\alpha(H) : \alpha \in \mathrm{Aut}(G)\}$  endlich. Dann hat die charakteristische Untergruppe  $K := \bigcap_{\alpha \in \mathrm{Aut}(G)} \alpha(H)$  endlichen Index.  $\square$

**Satz 14.9** (BAUMSLAG). *Ist  $G$  endlich erzeugt und residual endlich, so ist auch  $\mathrm{Aut}(G)$  residual endlich.*

*Beweis.* Sei  $\alpha \in \mathrm{Aut}(G) \setminus \{1\}$  und  $g \in G$  mit  $\alpha(g) \neq g$ . Dann existiert  $N \trianglelefteq G$  mit  $|G : N| < \infty$  und  $\alpha(g)g^{-1} \notin N$ . Nach Lemma 14.8 hat die charakteristische Untergruppe  $M := \bigcap_{\beta \in \mathrm{Aut}(G)} \beta(N)$  endlichen Index in  $G$ . Für  $A := C_{\mathrm{Aut}(G)}(G/M) \trianglelefteq \mathrm{Aut}(G)$  gilt daher  $|\mathrm{Aut}(G)/A| \leq |\mathrm{Aut}(G/M)| < \infty$ . Offenbar ist  $\alpha \notin A$ .  $\square$

**Definition 14.10.** Eine Gruppe  $G$  heißt *hopfsch*, falls  $G$  zu keiner echten Faktorgruppe von  $G$  isomorph ist. Das bedeutet, dass jeder Epimorphismus  $G \rightarrow G$  ein Automorphismus ist.

**Beispiel 14.11.** Offenbar sind alle endlichen Gruppen und alle einfachen Gruppen hopfsch. Aus Dimensionsgründen sind auch alle endlich-dimensionalen Vektorräume hopfsch. Andererseits ist  $C_2^{\mathbb{N}}$  nicht hopfsch.

**Satz 14.12** (MAL'CEV). *Jede endlich erzeugte residual endliche Gruppe ist hopfsch.*

*Beweis.* Sei  $\varphi: G \rightarrow G$  ein nicht-injektiver Epimorphismus. Sei  $g \in \text{Ker}(\varphi) \setminus \{1\}$ . Da  $G$  residual endlich ist, existiert ein  $N \trianglelefteq G$  mit  $g \notin N$  und  $|G/N| < \infty$ . Da  $G$  endlich erzeugt ist, gibt es nur endlich viele Homomorphismen  $\gamma_1, \dots, \gamma_n: G \rightarrow G/N$ . Dabei sei  $\gamma_1$  der kanonische Epimorphismus. Aus der Surjektivität von  $\varphi$  folgt  $\{\gamma_1, \dots, \gamma_n\} = \{\gamma_1\varphi, \dots, \gamma_n\varphi\}$ . Sei also  $\gamma_1 = \gamma_k\varphi$ . Dann erhält man den Widerspruch  $1 \neq gN = \gamma_1(g) = \gamma_k(\varphi(g)) = \gamma_k(1) = 1$ .  $\square$

**Folgerung 14.13.** *Jede freie Gruppe mit endlichem Rang ist hopfsch.*

*Beweis.* Folgt aus Satz 14.5.  $\square$

**Folgerung 14.14.** *Sei  $F$  frei vom Rang  $n < \infty$  und sei  $F = \langle Y \rangle$  mit  $|Y| = n$ . Dann ist  $F$  frei bzgl.  $Y$ .*

*Beweis.* Sei  $F = F_X$ . Eine beliebige Bijektion  $X \rightarrow Y \subseteq F$  setzt sich zu einem Epimorphismus  $\sigma: F \rightarrow F$  fort. Nach Mal'cev ist  $\sigma \in \text{Aut}(F)$ . Sei  $G$  eine Gruppe und  $\tau: Y \rightarrow G$ . Dann setzt sich die Abbildung  $\tau\sigma|_X$  zu einem Homomorphismus  $\gamma: F \rightarrow G$  fort. Schließlich ist  $\gamma\sigma^{-1}: F \rightarrow G$  eine Fortsetzung von  $\tau$ . Wegen  $F = \langle Y \rangle$  ist dies die einzige Fortsetzung. Also erfüllt  $F$  die universelle Eigenschaft bzgl.  $Y$ .  $\square$

**Satz 14.15.** *Jede endlich erzeugte residual nilpotente Gruppe ist hopfsch.*

*Beweis.* Sei  $G$  endlich erzeugt und residual nilpotent. Nach Voraussetzung ist  $\bigcap_{k=1}^{\infty} G^{[k]} = 1$  und nach Lemma 13.7 sind die Faktoren  $G^{[k]}/G^{[k+1]}$  endlich erzeugte abelsche Gruppen. Nehmen wir  $G \cong G/N$  für ein  $1 \neq N \trianglelefteq G$  an. Sei  $k \in \mathbb{N}$  mit  $N \subseteq G^{[k]}$  und  $N \not\subseteq G^{[k+1]}$ . Dann ist

$$G^{[k]}/G^{[k+1]} \cong (G/N)^{[k]}/(G/N)^{[k+1]} \cong G^{[k]}/G^{[k+1]}N \cong (G^{[k]}/G^{[k+1]})/(G^{[k+1]}N/G^{[k+1]}).$$

Nach dem Hauptsatz über endlich erzeugte abelsche Gruppen ist  $G^{[k]}/G^{[k+1]}$  aber hopfsch. Widerspruch.  $\square$

**Satz 14.16** (HALL). *Es existiert eine endlich erzeugte auflösbare Gruppe, die nicht hopfsch ist.*

*Beweis.* Sei  $R$  der Ring aller Zahlen der Form  $a2^b$  mit  $a, b \in \mathbb{Z}$ . Sei  $E_{ij} \in R^{3 \times 3}$  die Matrix mit einer 1 an Position  $(i, j)$  und sonst nur Nullen. Für  $a, b, c \in R$  setzen wir

$$n(a, b, c) := 1_3 + aE_{12} + bE_{23} + cE_{13} = \begin{pmatrix} 1 & a & c \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Aus  $E_{ij}E_{kl} = \delta_{jk}E_{il}$  (vgl. GT-Kapitel 10) folgt

$$n(a_1, b_1, c_1) n(a_2, b_2, c_2) = n(a_1 + a_2, b_1 + b_2, c_1 + c_2 + a_1 b_2). \quad (14.1)$$

Insbesondere ist  $N := \{n(a, b, c) : a, b, c \in R\} \leq \text{GL}(3, R)$  die Gruppe der oberen Dreiecksmatrizen mit Einsen auf der Hauptdiagonale und es gilt  $n(a, b, c)^{-1} = n(-a, -b, ab - c)$ . Aus (14.1) erhält man außerdem

$$\begin{aligned} [n(a_1, b_1, c_1), n(a_2, b_2, c_2)] &= n(a_1 + a_2, b_1 + b_2, c_1 + c_2 + a_1 b_2) \\ &\quad \cdot n(-a_1 - a_2, -b_1 - b_2, a_1 b_1 - c_1 + a_2 b_2 - c_2 + a_1 b_2) \\ &= n(0, 0, a_1 b_1 + 2a_1 b_2 + a_2 b_2 - (a_1 + a_2)(b_1 + b_2)) = n(0, 0, a_1 b_2 - a_2 b_1). \end{aligned} \quad (14.2)$$

Wir setzen  $u := n(1, 0, 0)$ ,  $v := n(0, 1, 0)$ ,  $w := n(0, 0, 1)$ ,  $t := \text{diag}(1, 2, 1) \in \text{GL}(3, R)$  und  $H := \langle t, u, v \rangle$ .

Konjugation mit einer invertierbaren Diagonalmatrix  $\text{diag}(\delta_1, \delta_2, \delta_3)$  bildet  $E_{ij}$  auf  $\delta_i \delta_j^{-1} E_{ij}$  ab. Insbesondere gilt

$$t^d n(a, b, c) t^{-d} = n(a 2^{-d}, b 2^d, c) \quad (14.3)$$

für  $d \in \mathbb{Z}$ . Nach (14.1) und (14.3) ist  $w \in Z(H)$  und  $\langle w \rangle \trianglelefteq H$ . Wegen  $z^k = n(0, 0, k)$  für  $k \in \mathbb{Z}$  ist  $\langle w^2 \rangle < \langle w \rangle$ .

Sei nun  $s := \text{diag}(2, 2, 1) \in \text{GL}(3, R)$ . Konjugation mit  $s$  bildet  $E_{12}$ ,  $E_{23}$ ,  $E_{13}$  auf  $E_{12}$ ,  $2E_{23}$ ,  $2E_{13}$  ab. Für den Monomorphismus  $f: H \rightarrow \text{GL}(3, R)$ ,  $x \mapsto sxs^{-1}$  gilt daher  $f(t) = t$ ,  $f(u) = u$ ,  $f(v) = v^2$  und  $f(w) = w^2$ . Insbesondere ist  $f(H) \subseteq H$ . Wegen  $t^{-1}vt = n(0, 2^{-1}, 0)$  ist auch  $v = f(t^{-1}vt) \in f(H)$ . Also ist  $f$  ein Automorphismus von  $H$  mit  $f(\langle w \rangle) = \langle w^2 \rangle$ , d. h.  $f$  induziert einen Isomorphismus  $H/\langle w \rangle \cong H/\langle w^2 \rangle$ . Für  $G := H/\langle w^2 \rangle$  und  $K := \langle w \rangle/\langle w^2 \rangle \neq 1$  folgt

$$G/K \cong H/\langle w \rangle \cong H/\langle w^2 \rangle = G.$$

Also ist  $G$  nicht hopfsch. Mit  $H$  ist auch  $G$  endlich erzeugt. Nach (14.2) sind  $N' = \langle w \rangle$  und  $H/N = \langle tN \rangle$  abelsch. Daher sind  $H$  und  $G$  auflösbar.  $\square$

**Definition 14.17.** Sei  $w = w(x_1, \dots) \in W \subseteq F_X$ . Für eine Gruppe  $G$  und  $g_1, \dots \in G$  sei  $w(g_1, \dots) \in G$  das Element, welches entsteht, indem man  $x_i$  in  $w$  durch  $g_i$  ersetzt (nur endlich viele  $x_i$  tauchen in  $w$  auf). Man nennt

$$W(G) := \langle w(g_1, \dots) : w \in W, g_1, \dots \in G \rangle$$

die *verbale Untergruppe* bzgl.  $W$ .

**Beispiel 14.18.** Für  $W = \{[x, y]\}$  erhält man  $W(G) = G'$ .

**Bemerkung 14.19.** Für jeden Homomorphismus  $f: G \rightarrow H$  gilt  $f(W(G)) \leq W(H)$ , d. h. verbale Untergruppen sind vollinvariant.

**Satz 14.20** (NEUMANN). *Jede vollinvariante Untergruppe einer freien Gruppe ist verbal.*

*Beweis.* Sei  $F = F_X$  und  $H \leq F$  vollinvariant. Sei  $w = w(x_1, \dots) \in H$  und  $y_1, \dots \in F$  beliebig. Dann existiert ein Endomorphismus  $\alpha: F \rightarrow F$  mit  $\alpha(x_i) = y_i$ . Es gilt  $w(y_1, \dots) = \alpha(w) \in H$ . Für  $W := H$  ist daher  $H = W(F)$ .  $\square$

**Definition 14.21.** Sei wieder  $W \subseteq F = F_X$ . Ein Normalteiler  $N$  einer Gruppe  $G$  heißt *W-marginal*, falls

$$w(g_1, \dots, g_i a, g_{i+1}, \dots) = w(g_1, \dots)$$

für alle  $w \in W$ ,  $g_1, \dots \in G$ ,  $i \in \mathbb{N}$  und  $a \in N$  gilt. Dies ist äquivalent zu

$$w(g_1, \dots) = w(h_1, \dots)$$

für alle  $g_1, h_1, \dots \in G$  mit  $g_i \equiv h_i \pmod{N}$  für  $i \in \mathbb{N}$ . Das Erzeugnis aller  $W$ -marginalen Normalteiler nennt man die *W-marginale Untergruppe*  $W^*(G)$ .

**Bemerkung 14.22.** Offenbar ist  $W^*(G)$  selbst  $W$ -marginal. Für  $W = \{[x, y]\}$  gilt  $W^*(G) = Z(G)$ , denn

$$g \in W^*(G) \Rightarrow \forall h \in G : [g, h] = [1g, h] = [1, h] = 1 \Rightarrow g \in Z(G) \Rightarrow g \in W^*(G).$$

**Lemma 14.23.** Es gilt  $W(G) = 1$  genau dann, wenn  $W^*(G) = G$ .

*Beweis.* Aus  $W(G) = 1$  folgt sicher  $W^*(G) = G$ . Sei nun  $W^*(G) = G$  und  $g_1, \dots \in G$ . Aus  $g_i \equiv 1 \pmod{G}$  folgt  $w(g_1, \dots) = w(1, \dots) = 1$ . Dies zeigt  $W(G) = 1$ .  $\square$

**Definition 14.24.** Eine Gruppenklasse  $\mathcal{X}$  heißt *Varietät*, falls  $W \subseteq F_X$  existiert mit  $\mathcal{X} = \{G : W(G) = 1\}$ . Ggf. schreibt man  $\mathcal{X} = \mathcal{X}(W)$ .

**Beispiel 14.25.** Die abelschen Gruppen bilden die Varietät  $\mathcal{X}([x, y])$ . Die elementarabelschen  $p$ -Gruppen bilden die Varietät  $\mathcal{X}([x, y], x^p)$ . Die Gruppen, deren Exponent  $n$  teilt, bilden die Varietät  $\mathcal{X}(x^n)$  usw. Der nächste Satz impliziert, dass die auflösbaren Gruppen der Stufe  $\leq n$  eine Varietät bilden.

**Satz 14.26** (BIRKHOFF). Eine Gruppenklasse  $\mathcal{X}$  ist genau dann eine Varietät, wenn  $\mathcal{X}$  abgeschlossen ist unter Bildung von Faktorgruppen und subdirekten Produkten.

*Beweis.* Jede Varietät  $\mathcal{X}(W)$  ist abgeschlossen bzgl. Untergruppen, Faktorgruppen und (sub)direkten Produkten, denn für  $H \leq G$  gilt  $W(H) \leq W(G)$ , für  $N \trianglelefteq G$  gilt  $W(G/N) = W(G)N/N$  und für eine Familie  $\{G_i : i \in I\}$  gilt  $W(\times G_i) \leq \times W(G_i)$ . Sei nun  $\mathcal{X}$  eine Gruppenklasse, die bzgl. Faktorgruppen und subdirekten Produkten abgeschlossen ist. Sei  $X = \{x_1, x_2, \dots\}$  abzählbar und

$$W := \{w \in F_X : \forall G \in \mathcal{X} : w(G) = 1\}.$$

Dann ist  $\mathcal{X} \subseteq \mathcal{X}(W)$ . Sei umgekehrt  $G \in \mathcal{X}(W)$ . Für jedes  $w \in F_X \setminus W$  wählen wir  $H(w) \in \mathcal{X}$  mit  $w(h_1, \dots) \neq 1$  für gewisse  $h_1, \dots \in H(w)$ . Wir setzen

$$Y := X \cup G \cup \bigcup_{w \in F_X \setminus W} H(w).$$

Dann ist  $Y$  unendlich und mindestens so groß wie  $G$  und alle  $H(w)$ . Sei  $\varphi : F_Y \rightarrow G$  ein Epimorphismus mit  $N := \text{Ker}(\varphi)$ . Sei  $v \in F_Y \setminus N$ . In  $v$  kommen nur endlich viele Buchstaben  $y_1, \dots, y_n \in Y$  vor, d. h.  $v = w(y_1, \dots, y_n)$  für ein  $w = w(x_1, \dots, x_n) \in F_X$ . Wegen  $w(\varphi(y_1), \dots, \varphi(y_n)) = \varphi(v) \neq 1$  und  $G \in \mathcal{X}(W)$  ist  $w \notin W$ . Wegen  $|Y| \geq |H(w)|$  existiert ein Epimorphismus  $\psi_v : F_Y \rightarrow H(w)$  mit

$\psi_v(y_i) = h_i$  für  $i = 1, \dots, n$ . Für  $K(v) := \text{Ker}(\psi_v)$  gilt  $\psi_v(v) = w(h_1, \dots, h_n) \neq 1$ , also  $v \notin K(v)$ . Wir setzen

$$K := \bigcap_{v \in F_Y \setminus N} K(v) \trianglelefteq F_Y.$$

Dann ist  $F_Y/K$  ein subdirektes Produkt der  $\mathcal{X}$ -Gruppen  $F_Y/K(v) \cong H(w)$ . Nach Voraussetzung ist  $F_Y/K \in \mathcal{X}$ . Für  $v \in F_Y \setminus N$  gilt  $v \notin K(v)$ , insbesondere  $v \notin K$ . Also ist  $K \subseteq N$  und  $G \cong F_Y/N \cong (F_Y/K)/(N/K)$  ist Faktorgruppe einer  $\mathcal{X}$ -Gruppe und damit  $G \in \mathcal{X}$ . Dies zeigt, dass  $\mathcal{X} = \mathcal{X}(W)$  eine Varietät ist.  $\square$

**Folgerung 14.27.** *Ist eine Gruppenklasse abgeschlossen unter Bildung von Faktorgruppen und subdirekten Produkten, so auch unter Bildung von Untergruppen.*

**Definition 14.28.** Sei  $\mathcal{X}$  eine Varietät. Eine Gruppe  $F \in \mathcal{X}$  heißt  $\mathcal{X}$ -frei bzgl.  $X \subseteq F$ , falls für jede  $\mathcal{X}$ -Gruppe  $G$  und jede Abbildung  $\sigma: X \rightarrow G$  genau ein Homomorphismus  $\hat{\sigma}: F \rightarrow G$  mit  $\hat{\sigma}(x) = \sigma(x)$  für alle  $x \in X$  existiert.

**Satz 14.29.** *Sei  $F = F_X$  eine freie Gruppe und  $\mathcal{X} = \mathcal{X}(W)$  eine Varietät mit  $W \subseteq F$ . Dann ist  $\overline{F} := F/W(F)$   $\mathcal{X}$ -frei bzgl.  $\overline{X} := \{xW(F) : x \in X\}$  und jede  $\mathcal{X}$ -freie Gruppe bzgl.  $\overline{X}$  ist zu  $\overline{F}$  isomorph.*

*Beweis.* Wegen  $W(\overline{F}) = 1$  ist  $\overline{F} \in \mathcal{X}$ . Sei  $G$  eine  $\mathcal{X}$ -Gruppe und  $\sigma: \overline{X} \rightarrow G$ . Wir definieren  $\tau: X \rightarrow G$  durch  $\tau(x) := \sigma(xW(F))$  für  $x \in X$ . Dann existiert genau ein Homomorphismus  $\hat{\tau}: F \rightarrow G$  mit  $\hat{\tau}(x) = \tau(x)$  für  $x \in X$ . Wegen  $G \in \mathcal{X}$  gilt  $\hat{\tau}(w) = 1$  für alle  $w \in W(F)$ . Man erhält einen Homomorphismus  $\hat{\sigma}: \overline{F} \rightarrow G$  mit  $\hat{\sigma}(xW(F)) = \hat{\tau}(x) = \tau(x) = \sigma(xW(F))$  für  $x \in X$ . Wegen  $\overline{F} = \langle \overline{X} \rangle$  ist  $\hat{\sigma}$  durch die Bilder von  $\overline{X}$  eindeutig bestimmt.

Sei auch  $H$   $\mathcal{X}$ -frei bzgl.  $\overline{X}$ . Dann lässt sich  $\text{id}_{\overline{X}}$  zu Homomorphismen  $\varphi: \overline{F} \rightarrow H$  und  $\psi: H \rightarrow \overline{F}$  fortsetzen. Wie üblich folgt, dass  $\varphi$  ein Isomorphismus ist.  $\square$

**Bemerkung 14.30.** Im Gegensatz zu freien Gruppen gibt es nicht für jede Menge  $X$  eine  $\mathcal{X}$ -freie Gruppe bzgl.  $X$ . Für  $\mathcal{X} = \mathcal{X}(x) = \{1\}$  ist beispielsweise jede  $\mathcal{X}$ -freie Gruppe trivial.

**Satz 14.31.** *Sei  $\mathcal{X}$  eine Varietät. Dann ist jede  $\mathcal{X}$ -Gruppe zu einer Faktorgruppe einer  $\mathcal{X}$ -freien Gruppe isomorph.*

*Beweis.* Sei  $G \in \mathcal{X} = \mathcal{X}(W)$  mit Erzeugendensystem  $X$ . Sei  $F := F_X$  und  $\overline{X} := \{xW(F) : x \in X\}$  wie in Satz 14.29. Seien  $x, y \in X$  mit  $x \equiv y \pmod{W(F)}$ . Dann ist  $y^{-1}x \in W(F)$ . Aus  $W(G) = 1$  folgt  $x = y$ . Daher gilt  $|\overline{X}| = |X|$  und es existiert eine Bijektion  $\sigma: \overline{X} \rightarrow X \subseteq G$ , die sich zu einem Epimorphismus  $\overline{F} \rightarrow G$  fortsetzt. Die Behauptung folgt aus Satz 14.29.  $\square$

**Satz 14.32 (ENGEL).** *Seien  $x_1, \dots, x_k \in X$  mit  $x_{k-1} \neq x_k$ . Dann ist jede endliche Gruppe  $G \in \mathcal{X}([x_1, \dots, x_k])$  nilpotent.*

*Beweis.* Sei  $G$  ein minimales Gegenbeispiel. Dann ist jede echte Untergruppe/Faktorgruppe von  $G$  nilpotent. Nach Schmidt (GT-Satz 5.45) ist  $G = P \rtimes Q$  mit  $P \in \text{Syl}_p(G)$  und  $Q \in \text{Syl}_q(G)$ . Angenommen  $\Phi(P) \neq 1$ . Dann ist auch  $G/\Phi(P)$  nilpotent. Wegen  $\Phi(P) \leq \Phi(G)$  wären dann  $G/\Phi(G)$  und  $G$  nilpotent. Also ist  $\Phi(P) = 1$ , d. h.  $P$  ist elementarabelsch. Sei  $y \in Q \setminus \{1\}$ . Da  $P$  abelsch ist, existiert  $\alpha \in \text{End}(P)$  mit  $\alpha(g) = [y, g]$  für  $g \in P$ . Für  $x, g \in P$  gilt  $[y, xy] = [y, x] = \alpha(x)$  und

$$[xy, g] = {}^x[y, g][x, g] = [y, g] = \alpha(g).$$

Wir ersetzen in  $[x_1, \dots, x_k]$  jedes Vorkommen der Variablen  $x_k$  durch  $xy$  und alle übrigen Variablen durch  $y$ . Wegen  $x_{k-1} \neq x_k$  ist die innerste Klammer dann  $[y, xy] = \alpha(x)$ , während die äußeren Stellen mit  $y$  oder  $xy$  besetzt sind und daher jeweils  $\alpha$  anwenden. Induktiv liefert die Voraussetzung  $\alpha^{k-1}(x) = 1$ . Ist  $\beta \in \text{Aut}(P)$  die Konjugation mit  $y$ , so gilt  $\alpha = \beta - 1 \in \text{End}(P)$ . Sei  $m \in \mathbb{N}$  mit  $p^m \geq k$ . Da  $P$  elementarabelsch ist, folgt

$$0 = \alpha^{p^m} = \sum_{i=0}^{p^m} \binom{p^m}{i} (-1)^i \beta^{p^m-i} = \beta^{p^m} - 1$$

(für  $p = 2$  ist  $-1 = 1$ ). Also gilt  $y^{p^m} \in C_G(P)$  und  $y \in C_G(P)$  wegen  $p \neq q$ . Dann wäre aber  $G$  nilpotent.  $\square$

**Folgerung 14.33** (ZORN). Sei  $G$  eine endliche Gruppe und  $k \in \mathbb{N}$  mit  $\underbrace{[g, \dots, g]}_k, h] = 1$  für alle  $g, h \in G$ . Dann ist  $G$  nilpotent.

**Bemerkung 14.34.** Gilt sogar  $[g_1, \dots, g_k] = 1$  für alle  $g_1, \dots, g_k \in G$ , so ist  $G$  nilpotent mit Nilpotenzklasse  $\leq k - 1$  nach GT-Lemma 3.3 (vgl. Lemma 13.8).

## 15 $p$ -Gruppen

**Definition 15.1.** Sei  $X = \{x_1, \dots\}$  und  $\mathcal{X} = \mathcal{X}(x^{p^2}, [x, y]^p, [x, y, z] : x, y, z \in F_X)$ . Sei  $G_r$  die  $\mathcal{X}$ -freie Gruppe vom Rang  $r \geq 1$  aus Satz 14.29. Wie üblich identifizieren wir  $x_i$  mit der entsprechenden Nebenklasse in  $G_r$ .

**Lemma 15.2.** Eine endliche  $p$ -Gruppe  $G$  liegt genau dann in  $\mathcal{X}$ , wenn  $\Phi(G) \leq Z(G)$  und  $\Phi(\Phi(G)) = 1$ .

*Beweis.* Sei  $G$  eine  $p$ -Gruppe mit  $\Phi(G) \leq Z(G)$  und  $\Phi(\Phi(G)) = 1$ . Für  $x, y, z \in G$  gilt  $x^p \in \Phi(G)$  und  $x^{p^2} = 1$ . Außerdem ist  $[x, y] \in G' \leq \Phi(G)$  und  $[x, y]^p = 1$  folgt. Schließlich ist  $[y, z] \in \Phi(G) \leq Z(G)$  und daher  $[x, y, z] = [x, [y, z]] = 1$ .

Sei umgekehrt  $G \in \mathcal{X}$  und  $N := \langle x^p, [x, y] : x, y \in G \rangle$ . Dann ist  $G/N$  elementarabelsch und  $\Phi(G) \leq N$ . Wegen  $[x^p, y] = [x, y]^p = 1$  und  $[x, y, z] = 1$  ist  $N \leq Z(G)$  und  $N$  ist elementarabelsch, d. h.  $\Phi(\Phi(G)) \leq \Phi(N) = 1$ .  $\square$

**Lemma 15.3.** Es gilt:

- (i)  $\Phi(G_r)$  ist elementarabelsch vom Rang  $r(r+1)/2$ .
- (ii)  $G_r/\Phi(G_r)$  ist elementarabelsch vom Rang  $r$ .
- (iii) Operiert  $\alpha \in \text{Aut}(G_r)$  trivial auf  $G_r/\Phi(G_r)$ , so auch auf  $\Phi(G_r)$ .

*Beweis.*

- (i) Wegen  $[x_i, x_j x_k] = [x_i, x_j] \cdot {}^{x_j}[x_i, x_k] = [x_i, x_j][x_i, x_k]$  für  $1 \leq i, j, k \leq r$  ist  $G'_r = \langle [x_i, x_j] : 1 \leq i < j \leq r \rangle$  elementarabelsch vom Rang höchstens  $r(r-1)/2$ . Wegen  $(x_i x_j)^p \equiv x_i^p x_j^p \pmod{G'_r}$  ist  $G_r^p G'_r = \langle x_i^p, [x_i, x_j] \rangle$  elementarabelsch von Rang höchstens  $r(r-1)/2 + r = r(r+1)/2$ . Da auch  $G_r/G_r^p G'_r$  elementarabelsch vom Rang höchstens  $r$  ist, ist  $G_r$  eine endliche  $p$ -Gruppe und  $\Phi(G_r) = G_r^p G'_r \leq Z(G_r)$ .

Angenommen es gibt eine Relation der Form

$$g := \prod_{i=1}^r x_i^{pa_i} \prod_{1 \leq i < j \leq r} [x_i, x_j]^{b_{ij}} = 1$$

mit  $0 \leq a_i, b_{ij} \leq p-1$ . Für  $\langle h \rangle \cong C_{p^2}$  und  $1 \leq i \leq r$  existiert ein Homomorphismus  $\varphi: G_r \rightarrow \langle h \rangle$  mit  $\varphi(x_i) = h$  und  $\varphi(x_j) = 1$  für  $j \neq i$  (Definition der  $\mathcal{X}$ -freien Gruppe). Es folgt  $1 = \varphi(g) = h^{pa_i}$  und  $a_i = 0$  für  $i = 1, \dots, r$ . Für  $1 \leq i < j \leq r$  sei analog  $\langle h_i, h_j \rangle \cong p_+^{1+2}$ . Wieder existiert ein Homomorphismus  $\varphi: G_r \rightarrow \langle h_i, h_j \rangle$  mit  $\varphi(x_i) = h_i$ ,  $\varphi(x_j) = h_j$  und  $\varphi(x_k) = 1$  für  $i \neq k \neq j$ . Aus  $1 = \varphi(g) = [h_i, h_j]^{b_{ij}}$  folgt  $b_{ij} = 0$ . Dies zeigt, dass  $\Phi(G_r)$  Rang  $r(r+1)/2$  hat.

- (ii) Seien  $0 \leq a_1, \dots, a_r \leq p-1$  mit  $g = x_1^{a_1} \dots x_r^{a_r} \in \Phi(G_r)$ . Wie in (i) existiert ein Homomorphismus  $\varphi: G_r \rightarrow \langle h \rangle \cong C_{p^2}$  mit  $h^{a_i} = \varphi(g) \in \Phi(\langle h \rangle) = \langle h^p \rangle$ . Dies zeigt  $g = 1$  und die Behauptung folgt.
- (iii) Sei  $\alpha \in \text{Aut}(G_r)$  trivial auf  $G_r/\Phi(G_r)$ . Dann existieren  $h_1, \dots, h_r \in \Phi(G_r)$  mit  $\alpha(x_i) = x_i h_i$  für  $i = 1, \dots, r$ . Wegen (i) ist  $\alpha(x_i^p) = \alpha(x_i)^p = (x_i h_i)^p = x_i^p$  und  $\alpha([x_i, x_j]) = [x_i h_i, x_j h_j] = [x_i, x_j]$  für  $1 \leq i < j \leq r$ .  $\square$

**Lemma 15.4.** *Seien  $N, M \leq \Phi(G_r)$ . Genau dann gilt  $G_r/N \cong G_r/M$ , falls ein  $\alpha \in \text{Aut}(G_r)$  mit  $\alpha(N) = M$  existiert.*

*Beweis.* Jedes  $\alpha \in \text{Aut}(G_r)$  mit  $\alpha(N) = M$  induziert einen Isomorphismus  $G_r/N \cong G_r/M$ . Sei umgekehrt ein Isomorphismus  $\alpha': G_r/N \rightarrow G_r/M$  gegeben. Wähle  $y_1, \dots, y_r \in G_r$  mit  $\alpha'(x_i N) = y_i M$  für  $i = 1, \dots, r$ . Es existiert ein Homomorphismus  $\alpha: G_r \rightarrow G_r$  mit  $\alpha(x_i) = y_i$  für  $i = 1, \dots, r$ . Da  $G_r$  nach Lemma 15.3 eine endliche  $p$ -Gruppe ist, gilt

$$G_r = \langle y_1, \dots, y_r \rangle M = \langle y_1, \dots, y_r \rangle \Phi(G_r) = \langle y_1, \dots, y_r \rangle.$$

Daher ist  $\alpha$  surjektiv und ein Isomorphismus. Wegen  $\alpha(x_i)M = y_i M = \alpha'(x_i N)$  gilt  $\alpha(g)M = \alpha'(gN)$  für alle  $g \in G_r$ . Dabei ist

$$g \in N \iff \alpha'(gN) = 1 \iff \alpha(g)M = 1 \iff \alpha(g) \in M.$$

Dies zeigt  $\alpha(N) = M$ .  $\square$

**Lemma 15.5.** *Die Anzahl der  $d$ -dimensionalen Unterräume von  $\mathbb{F}_p^n$  ist*

$$\binom{n}{d}_p = \frac{(p^n - 1)(p^n - p) \dots (p^n - p^{d-1})}{(p^d - 1)(p^d - p) \dots (p^d - p^{d-1})}$$

und es gilt  $p^{d(n-d)} \leq \binom{n}{d}_p \leq p^{d(n-d+1)}$ .

*Beweis.* Die Formel ist aus Kombinatorik bekannt. Die untere Abschätzung folgt aus  $p^{n-d} \leq \frac{p^n - p^i}{p^d - p^i}$  für  $0 \leq i \leq d-1$ . Andererseits ist  $p^n + p^{n-d+i+1} \leq 2p^n \leq p^{n+1} + p^i$  und dies liefert  $\frac{p^n - p^i}{p^d - p^i} \leq p^{n-d+1}$ .  $\square$



**Lemma 15.6.** Sei  $r, s \in \mathbb{N}$  mit  $1 \leq s \leq r(r+1)/2$ . Dann existieren mindestens  $p^{rs(r+1)/2-r^2-s^2}$  nicht-isomorphe Gruppen der Ordnung  $p^{r+s}$ .

*Beweis.* Sei  $\mathcal{N}$  die Menge der  $N \leq \Phi(G_r)$  mit  $|\Phi(G_r) : N| = p^s$ . Nach Lemma 15.2 ist  $N \leq Z(G_r)$  und  $N \trianglelefteq G_r$ . Nach Lemma 15.3 und Lemma 15.5 gilt  $|\mathcal{N}| \geq p^{rs(r+1)/2-s^2}$ . Für  $N \in \mathcal{N}$  gilt  $|G_r/N| = p^{r+s}$ . Nach Lemma 15.4 genügt es die Anzahl der Bahnen von  $\text{Aut}(G_r)$  auf  $\mathcal{N}$  abzuschätzen. Sei  $\Gamma: \text{Aut}(G_r) \rightarrow \text{Aut}(G_r/\Phi(G_r))$  der kanonische Homomorphismus. Nach Lemma 15.3 operieren die Automorphismen in  $\text{Ker}(\Gamma)$  trivial auf  $\mathcal{N}$ . Andererseits ist

$$|\text{Aut}(G_r/\Phi(G_r))| = |\text{GL}(r, p)| = (p^r - 1)(p^{r-1} - p) \dots (p^r - p^{r-1}) \leq p^{r^2}.$$

Jede Bahn von  $\text{Aut}(G_r)$  auf  $\mathcal{N}$  hat also höchstens Länge  $p^{r^2}$ . Die Anzahl der Bahnen ist somit mindestens  $p^{rs(r+1)/2-r^2-s^2}$ .  $\square$

**Satz 15.7** (HIGMAN). Sei  $f(p^n)$  die Anzahl der nicht-isomorphen Gruppen der Ordnung  $p^n$  für eine Primzahl  $p$ . Dann gilt

$$\boxed{p^{\frac{2}{27}n^2(n-6)} \leq f(p^n) \leq p^{\frac{1}{6}(n^3-n)}}.$$

*Beweis.* Für die untere Abschätzung können wir  $n \geq 6$  annehmen. Sei

$$s := \begin{cases} n/3 & \text{falls } n \equiv 0 \pmod{3}, \\ (n+2)/3 & \text{falls } n \equiv 1 \pmod{3}, \\ (n+1)/3 & \text{falls } n \equiv 2 \pmod{3} \end{cases}$$

und  $r = n - s$ . Dann ist  $s \leq r \leq r(r+1)/2$  und

$$\begin{aligned} rs(r+1)/2 - r^2 - s^2 &= \begin{cases} \frac{1}{27}n^2(2n+3) - \frac{4}{9}n^2 - \frac{1}{9}n^2 & \text{falls } n \equiv 0 \pmod{3} \\ \frac{1}{27}(n+2)(n-1)(2n+1) - \frac{4}{9}(n-1)^2 - \frac{1}{9}(n+2)^2 & \text{falls } n \equiv 1 \pmod{3} \\ \frac{1}{27}(n+1)(2n-1)(n+1) - \frac{1}{9}(2n-1)^2 - \frac{1}{9}(n+1)^2 & \text{falls } n \equiv 2 \pmod{3} \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{2}{27}n^2(n-6) & \text{falls } n \equiv 0 \pmod{3} \\ \frac{2}{27}n^2(n-6) + \frac{1}{3}n - \frac{26}{27} & \text{falls } n \equiv 1 \pmod{3} \\ \frac{2}{27}n^2(n-6) + \frac{2}{9}n - \frac{7}{27} & \text{falls } n \equiv 2 \pmod{3} \end{cases} \\ &\geq \frac{2}{27}n^2(n-6). \end{aligned}$$

Nach Lemma 15.6 ist daher  $f(p^n) \geq p^{\frac{2}{27}n^2(n-6)}$ .

Für die obere Abschätzung sei  $G$  eine Gruppe der Ordnung  $p^n$  mit Hauptreihe  $G = H_0 > H_1 > \dots > H_n = 1$ . Wir wählen  $g_i \in H_{i-1} \setminus H_i$  für  $i = 1, \dots, n$ . Jedes Element in  $G$  lässt sich dann eindeutig in der Form  $g = g_1^{a_1} \dots g_n^{a_n}$  mit  $0 \leq a_1, \dots, a_n \leq p-1$  schreiben. Dabei gilt  $g \in H_i$  genau dann, wenn  $a_1 = \dots = a_i = 0$ . Seien  $0 \leq b_{ij} \leq p-1$  mit

$$g_i^p = g_{i+1}^{b_{i,i+1}} \dots g_n^{b_{i,n}}. \quad (15.1)$$

Wegen  $H_{j-1}/H_j \leq Z(G/H_j)$  gilt  $[g_i, g_j] \in H_j$  für  $1 \leq i < j \leq n$ . Daher existieren  $0 \leq c_{ijk} \leq p-1$  mit

$$[g_i, g_j] = g_{j+1}^{c_{i,j,j+1}} \dots g_n^{c_{i,j,n}} \quad (i < j). \quad (15.2)$$

Wir zeigen nun, dass  $G$  durch die Relationen (15.1) und (15.2) eindeutig bestimmt ist. Dafür muss man ein Produkt  $g_1^{a_1} \dots g_n^{a_n} g_1^{a'_1} \dots g_n^{a'_n}$  auf die Form  $g_1^{a''_1} \dots g_n^{a''_n}$  bringen. Dies ist klar für  $n = 1$ . Sei  $n \geq 2$ .

Mit (15.2) kann man  $g_1^{a'_1}$  nach links schieben, indem man Terme der Form  $g_j^{c_{1,j,j}}$  mit  $j \geq 2$  einfügt. Anschließend erhält man  $g_1^{a_1+a'_1}h$  mit  $h \in H_1$ . Mit (15.1) kann man  $a_1 + a'_1$  durch  $a'_1$  ersetzen, indem man weitere Terme der Form  $g_i^{b_{1i}}$  mit  $i \geq 2$  einfügt. Die Behauptung folgt nun durch Induktion. Die Anzahl der nicht-isomorphen Gruppen der Ordnung  $p^n$  ist also durch die Wahl der Parameter  $b_{ij}$  und  $c_{ijk}$  beschränkt. Für die Wahl der  $b_{ij}$  gibt es  $p^{n(n-1)/2}$  Möglichkeiten. Für die Wahl der  $c_{ijk}$  gibt es  $p^\alpha$  Möglichkeiten, wobei

$$\alpha = \sum_{i=1}^{n-2} \binom{n-i}{2} = \binom{n}{3} = \frac{n^3 - 3n^2 + 2n}{6}.$$

(Man zähle die Anzahl der 3-elementigen Teilmengen von  $\{1, \dots, n\}$  mit vorgegebenem Minimum.) Insgesamt ergeben sich höchstens  $p^{(n^3-n)/6}$  Gruppen der Ordnung  $p^n$ .  $\square$

**Bemerkung 15.8.** Sims-Newman-Seeley haben die stärkere Abschätzung  $f(p^n) \leq p^{\frac{2}{27}n^3 + O(n^{5/2})}$  bewiesen. Da wir zum Beweis der unteren Abschätzung nur Faktorgruppen von  $G_r$  benutzt haben, folgt: Fast alle  $p$ -Gruppen  $G$  besitzen einen Normalteiler  $N \leq Z(G)$ , sodass  $N$  und  $G/N$  elementarabelsch sind. Insbesondere haben fast alle  $p$ -Gruppen Nilpotenzklasse 2.

**Definition 15.9.** Für endliche Mengen  $A, B \subseteq \mathbb{N}$  sei  $A \prec B$ , falls  $|A| < |B|$  oder falls  $|A| = |B|$  und  $A$  lexikographisch kleiner als  $B$  ist (d. h.  $\min((A \cup B) \setminus (A \cap B)) \in A$ ).

**Bemerkung 15.10.** Offenbar ist  $\prec$  eine Totalordnung auf der Menge der endlichen Teilmengen von  $\mathbb{N}$ . Aus  $A \subsetneq B$  folgt  $A \prec B$ .

**Lemma 15.11** (HALLS Kollektor-Prozess). Sei  $X = \{x_1, \dots, x_n\} = X_1 \dot{\cup} \dots \dot{\cup} X_m$  und  $F := F_X$ . Für  $I \subseteq \{1, \dots, m\}$  sei

$$C_I := F^{[I]} \cap \bigcap_{i \in I} \langle X_i \rangle^F \cap \langle \bigcup_{i \in I} X_i \rangle \leq F.$$

Dann existieren  $c_I \in C_I$  mit

$$x_1 \dots x_n = \prod_{I \subseteq \{1, \dots, m\}} c_I,$$

wobei die Teilmengen  $I$  gemäß  $\prec$  durchlaufen werden.

*Beweis.* Für  $J \subseteq \{1, \dots, m\}$  zeigen wir

$$x_1 \dots x_n = \prod_{I \prec J} c_I \cdot y_1 \dots y_t$$

mit  $t \in \mathbb{N}_0$ , wobei jedes  $y_i$  in einem  $C_K$  mit  $J \prec K$  liegt. Die Behauptung folgt dann mit  $J = \{1, \dots, m\}$ , indem man  $c_J = y_1 \dots y_t$  setzt. Für  $J = \emptyset$  ist das Produkt über  $I \prec J$  leer. Für  $x_i \in X_j \leq \langle X_j \rangle = C_{\{j\}}$  kann man  $t = n$  und  $y_i = x_i$  wählen. Sei nun die Behauptung für  $J$  bereits bewiesen und sei  $J'$  der Nachfolger von  $J$  bzgl.  $\prec$ . Wir können annehmen, dass mindestens ein  $y_i$  in  $C_J$  liegt, denn anderenfalls ist  $y_i \in C_K$  mit  $J' \preceq K$  für alle  $i$ . Sei dabei  $i$  minimal. Im Fall  $i > 1$  schreiben wir  $y_{i-1}y_i = y_i y_{i-1}z$  mit  $z := [y_{i-1}^{-1}, y_i^{-1}]$  und  $y_{i-1} \in C_K \subseteq F^{[K]}$ , wobei  $J \prec K$ . Dann gilt

- $z \in [F^{[K]}, F^{[J]}] \leq F^{[K|+|J|]} \leq F^{[J \cup K]}$ .
- $z \in \langle X_j \rangle^F$  für alle  $j \in J \cup K$ .
- $z \in \langle \bigcup_{j \in J \cup K} X_j \rangle$ .

Dies zeigt  $z \in C_{J \cup K}$  mit  $J \prec J \cup K$ . Mit endlich vielen Schritten können wir auf diese Weise alle  $y_i \in C_J$  nach links schieben. Das Produkt dieser  $y_i$  nennen wir  $c_J$ . Für die verbleibenden Faktoren gilt nun  $y_j \in C_K$  mit  $J' \preceq K$  wie gewünscht.  $\square$

**Satz 15.12** (HALL-PETRESCU-Formel). *Für jede Gruppe  $G$  und  $x, y \in G$  existieren eindeutig bestimmte Elemente  $c_i \in G^{[i]}$ , sodass für alle  $n \in \mathbb{N}$  gilt*

$$x^n y^n = (xy)^n c_2^{\binom{n}{2}} c_3^{\binom{n}{3}} \dots c_n^{\binom{n}{n}}.$$

*Beweis.* O.B.d.A. sei  $G := \langle x, y \rangle$ . Die Eindeutigkeit der  $c_i$  folgt induktiv:

$$c_2 = (xy)^{-2} x^2 y^2, \quad c_n = c_{n-1}^{-\binom{n}{n-1}} \dots c_2^{-\binom{n}{2}} (xy)^{-n} x^n y^n.$$

Sei  $N \in \mathbb{N}$  beliebig. Wir zeigen, dass die Formel für alle  $n \leq N$  gilt. Wegen der Eindeutigkeit gilt sie dann für alle  $n \in \mathbb{N}$ . Sei  $X_i := \{x_i, x_{i+N}\}$  und  $X = X_1 \dot{\cup} \dots \dot{\cup} X_N = \{x_1, \dots, x_{2N}\}$ . Sei  $F := F_X$ . Für  $I \subseteq \{1, \dots, N\}$  sei  $\mu_I: F \rightarrow F$  der Endomorphismus mit

$$\mu_I(x_i) = \begin{cases} x_i & \text{falls } i \in I \vee i - N \in I, \\ 1 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Sei  $x_1 \dots x_{2N} = \prod c_I$  wie in Lemma 15.11. Für  $I \subseteq J$  gilt  $\mu_J(c_I) = c_I$ , denn  $C_I \subseteq \langle \bigcup_{i \in I} X_i \rangle$ . Für  $I \not\subseteq J$  gilt hingegen  $\mu_J(c_I) = 1$ , denn für  $i \in I \setminus J$  ist  $C_I \subseteq \langle X_i \rangle^F = \langle x_i, x_{i+N} \rangle^F \subseteq \text{Ker}(\mu_J)$ . Nach Lemma 15.11 gilt also

$$\prod_{j \in J} x_j \prod_{j \in J} x_{j+N} = \mu_J(x_1 \dots x_{2N}) = \prod_{I \subseteq J} c_I,$$

wobei die Mengen  $I$  bzgl.  $\prec$  angeordnet sind.

Sei  $\varphi: F \rightarrow G$  ein Homomorphismus mit  $\varphi(x_i) = x$  und  $\varphi(x_{i+N}) = y$  für  $i = 1, \dots, N$ . Für  $|J| = n$  erhalten wir

$$x^n y^n = \varphi(\mu_J(x_1 \dots x_{2N})) = \prod_{I \subseteq J} \varphi(c_I).$$

Wir behaupten, dass  $\varphi(c_I)$  nur von  $|I|$  abhängt. Dies ist klar für  $n = 0$  mit  $c_\emptyset = 1$ . Für  $n = 1$  erhält man  $\varphi(c_I) = xy$  für alle einelementigen Mengen  $I$ . Sei nun  $n := |J| = |J'|$  und

$$\left( \prod_{I \subsetneq J} \varphi(c_I) \right) \varphi(c_J) = \prod_{I \subseteq J} \varphi(c_I) = x^n y^n = \prod_{I' \subseteq J'} \varphi(c_{I'}) = \left( \prod_{I' \subsetneq J'} \varphi(c_{I'}) \right) \varphi(c_{J'}).$$

Auf beiden Seiten sind die  $I$  der Größe nach aufsteigend sortiert. Für  $l := |I| = |I'| < n$  gilt bereits  $\varphi(c_I) = \varphi(c_{I'})$  nach Induktion. Die Anzahl dieser Faktoren ist auf beiden Seiten  $\binom{n}{l}$ . Daher ist  $\varphi(c_J) = \varphi(c_{J'})$ .

Wir setzen  $c_l := \varphi(c_{\{1, \dots, l\}})$  für  $l = 1, \dots, N$ . Dann gilt  $c_l \in \varphi(F^{[l]}) \subseteq G^{[l]}$  und

$$x^n y^n = \prod_{l=1}^n c_l^{\binom{n}{l}} = c_1^n \prod_{l=2}^n c_l^{\binom{n}{l}} = (xy)^n \prod_{l=2}^n c_l^{\binom{n}{l}}. \quad \square$$

**Beispiel 15.13.** Es gilt  $c_2 = (xy)^{-2} x^2 y^2 = y^{-1} x^{-1} y^{-1} x y^2 = [y^{-1} x^{-1}, y^{-1}]$ . Im Fall  $\langle x, y \rangle^{[3]} = 1$  erhält man die aus GT-Aufgabe 18 bekannte Formel  $(xy)^n = x^n y^n [y, x]^{\binom{n}{2}}$ .

**Lemma 15.14.** Sei  $p$  eine Primzahl und  $G$  nilpotent mit Klasse  $k < p$ . Für alle  $x, y \in G$  und  $q = p^n$  gilt:

- (i) Es existiert ein  $z \in G'$  mit  $x^q y^q = (xy)^q z^q$ .
- (ii)  $x^q = y^q \iff (xy^{-1})^q = 1$ .
- (iii)  $\Omega_q(G) := \{x \in G : x^q = 1\} \trianglelefteq G$ .
- (iv)  $\mathcal{U}_q(G) := \{x^q : x \in G\} \trianglelefteq G$ .
- (v)  $|G| = |\Omega_q(G)| |\mathcal{U}_q(G)|$ .
- (vi)  $\mathcal{U}_q(G)' \leq \mathcal{U}_{q^2}(G')$ .

*Beweis.* Induktion nach  $k$ : Im Fall  $k \leq 1$  ist  $G$  abelsch und alle Aussagen folgen leicht. Sei  $k \geq 2$  und o. B. d. A.  $G = \langle x, y \rangle$  (wird in (v) nicht benutzt).

- (i) Nach Voraussetzung gilt  $G^{[p]} \leq G^{[k+1]} = 1$ . Nach der Hall-Petrescu-Formel existieren  $c_i \in G^{[i]} \leq G'$  mit

$$x^q y^q = (xy)^q c_2^{\binom{q}{2}} \dots c_{p-1}^{\binom{q}{p-1}}.$$

Man sieht leicht, dass  $\binom{q}{i}$  für  $0 < i < p$  durch  $q$  teilbar ist. Nach Induktion gilt (iv) für  $G'$ . Dies zeigt  $c_2^{\binom{q}{2}} \dots c_{p-1}^{\binom{q}{p-1}} \in \mathcal{U}_q(G')$ .

- (ii) Sei  $x^q = y^q$ . Dann gilt

$$x^q = yx^q y^{-1} = (yxy^{-1})^q.$$

Sei  $H := \langle x, yxy^{-1} \rangle \leq G$ . Wegen

$$[x, yxy^{-1}] = [x, yxy^{-1}x^{-1}] = [x, y, x] \in G^{[3]}$$

gilt  $H' = \langle [x, yxy^{-1}] \rangle^H \leq G^{[3]}$ . Daher hat  $H$  Nilpotenzklasse  $< k$ . Nach Induktion gilt  $[x, y]^q = (x(yxy^{-1})^{-1})^q = 1$ . Da auch  $G'$  Nilpotenzklasse  $< k$  hat, gilt

$$G' = \langle [x, y] \rangle^G = \langle g[x, y]g^{-1} : g \in G \rangle \leq \Omega_q(G') = G',$$

d. h.  $\exp(G') \leq q$ . Aus (i) folgt  $(xy^{-1})^q = x^q y^{-q} = 1$ .

Sei umgekehrt  $(xy^{-1})^q = 1$ . Dann ist auch  $(y^{-1}x)^q = x^{-1}(xy^{-1})^q x = 1$ . Nach dem ersten Teil der Äquivalenz ergibt sich  $[x, y^{-1}]^q = (xy^{-1}x^{-1}y)^q = 1$ . Wie zuvor erhält man  $\exp(G') \leq q$ . Nach (i) ist  $x^q y^{-q} = (xy^{-1})^q = 1$  und  $x^q = y^q$ .

- (iii) Für  $x, y \in \Omega_q(G)$  gilt  $x^q = 1 = y^q$  und  $(xy^{-1})^q = 1$  nach (ii). Dies zeigt  $xy^{-1} \in \Omega_q(G)$  und  $\Omega_q(G) \leq G$ . Offensichtlich ist  $\Omega_q(G)$  ein Normalteiler von  $G$ .
- (iv) Für  $x^q, y^q \in \mathcal{U}_q(G)$  existiert nach (i) ein  $z \in G'$  mit  $x^q y^{-q} = (xy^{-1})^q z^q$ . Für  $H := \langle xy^{-1}, z \rangle$  gilt  $[xy^{-1}, z] \in G^{[3]}$  und  $H' = \langle [xy^{-1}, z] \rangle^H \leq G^{[3]}$ . Insbesondere hat  $H$  Nilpotenzklasse  $< k$ . Nach Induktion gilt  $(xy^{-1})^q z^q \in \mathcal{U}_q(H) \leq \mathcal{U}_q(G)$  und  $\mathcal{U}_q(G) \leq G$ . Offensichtlich ist  $\mathcal{U}_q(G)$  normal in  $G$ .
- (v) Die Abbildung  $f: G \rightarrow \mathcal{U}_q(G)$ ,  $x \mapsto x^q$  ist surjektiv (aber im Allgemeinen kein Homomorphismus). Nach (ii) gilt  $f(x) = f(y)$  genau dann, wenn  $xy^{-1} \in \Omega_q(G)$ . Daher ist  $f^{-1}(x^q) = x\Omega_q(G)$  und  $|f^{-1}(x^q)| = |\Omega_q(G)|$  für alle  $x \in G$ . Ist  $\Omega_q(G)$  unendlich, so auch  $G$ . Anderenfalls ist  $|G : \Omega_q(G)| = |\mathcal{U}_q(G)|$ .

(vi) Seien  $x^q, y^q \in \mathcal{U}_q(G)$ . Wir wenden (ii) auf  $\overline{G} := G/\mathcal{U}_{q^2}(G')$  an:

$$[x^q, y^q] = x^q(y^q x y^{-q})^{-q} \in \mathcal{U}_{q^2}(G') \iff (x y^q x^{-1} y^{-q})^q \in \mathcal{U}_{q^2}(G') \iff \overline{[x, y^q]} \in \Omega_q(\overline{G}).$$

Nun wenden wir (ii) auf  $\overline{G}/\Omega_q(\overline{G})$  an:

$$\overline{[x, y^q]} = (\overline{xyx^{-1}})^q \overline{y}^{-q} \in \Omega_q(\overline{G}) \iff \overline{[x, y]}^q \in \Omega_q(\overline{G}) \iff [x, y]^{q^2} \in \mathcal{U}_{q^2}(G').$$

Die Aussage auf der rechten Seite ist offensichtlich wahr.  $\square$

**Beispiel 15.15.** Die Aussagen in Lemma 15.14 gelten im Allgemeinen nicht für Gruppen mit Nilpotenzklasse  $\geq p$ . Zum Beispiel kann  $\Omega_2(D_8)$  wegen  $|\Omega_2(D_8)| = 6$  keine Untergruppe von  $D_8$  sein. Für

$$G := \langle x, y \mid x^4 = y^4 = 1, yxy^{-1} = x^{-1} \rangle \cong C_4 \rtimes C_4$$

ist  $\mathcal{U}_2(G) = \{1, x^2, y^2\}$  keine Untergruppe von  $G$ .

**Bemerkung 15.16.** Der nächste Satz zeigt, dass sich  $p$ -Gruppen mit „kleiner“ Nilpotenzklasse annähernd wie abelsche Gruppen verhalten.

**Satz 15.17 (GROVES).** *Sei  $P$  eine  $p$ -Gruppe mit Nilpotenzklasse  $< p$ . Dann existiert eine Verknüpfung  $P \times P \rightarrow P$ ,  $(x, y) \mapsto x + y$  mit folgenden Eigenschaften:*

- (i)  $P_+ := (P, +)$  ist eine abelsche Gruppe.
- (ii) Die Ordnungen von  $x$  in  $P$  und  $P_+$  sind gleich.
- (iii) Für alle  $x, y \in P$  gilt  $x + y \in \langle x, y \rangle$ .
- (iv) Jeder Endomorphismus von  $P$  ist auch ein Endomorphismus von  $P_+$ .
- (v) Jede Untergruppe von  $P$  ist auch eine Untergruppe von  $P_+$ .

*Beweis.* Sei  $P$  von  $n$  Elementen erzeugt und  $F := F_n/F_n^{[p]}$  die freie nilpotente Gruppe mit Rang  $n$  und Nilpotenzklasse  $p - 1$ . Dann existiert ein Epimorphismus  $f: F \rightarrow P$ ,  $x \mapsto \overline{x}$ . Sei  $q = \exp(P')$ . Für alle  $x, y \in F$  existiert nach Lemma 15.14 (angewendet auf  $\langle x, y \rangle$ ) ein  $s = s(x, y) \in \langle x, y \rangle$  mit  $x^q y^q = s^q$ . Sei auch  $t \in F$  mit  $s^q = t^q$ . Dann folgt  $(st^{-1})^q = 1$  aus Lemma 15.14. Da  $F$  torsionsfrei ist (Folgerung 13.36), folgt  $s = t$ , d. h.  $s$  ist durch  $x, y$  eindeutig bestimmt. Wir betrachten  $s$  als Wort in  $x, y$  und definieren  $a + b := s(a, b)$  für  $a, b \in P$ .

- (i) Für  $x, y, z \in F$  gilt

$$s(s(x, y), z)^q = s(x, y)^q z^q = (x^q y^q) z^q = x^q (y^q z^q) = x^q s(y, z)^q = s(x, s(y, z))^q.$$

Wie oben folgt  $s(s(x, y), z) = s(x, s(y, z))$ . Dies zeigt, dass  $+$  auf  $P$  assoziativ ist. Wegen  $s(x, 1) = x = s(1, x)$  ist 1 neutral bzgl.  $+$ . Wegen  $s(x, x^{-1}) = 1$  ist  $x^{-1}$  invers zu  $x$  bzgl.  $+$ .

Nach Lemma 15.14 ist  $s(x, y)^q s(y, x)^{-q} = [x^q, y^q] \in \mathcal{U}_{q^2}(F')$  und  $(s(x, y) s(y, x)^{-1})^q \in \mathcal{U}_{q^2}(F')$ . Sei  $z \in F'$  mit  $(s(x, y) s(y, x)^{-1})^q = z^{q^2} = (z^q)^q$ . Aus Lemma 15.14 folgt  $(s(x, y) s(y, x)^{-1} z^{-q})^q = 1$ . Da  $F$  torsionsfrei ist, erhält man  $s(x, y) s(y, x)^{-1} = z^q \in \mathcal{U}_q(F')$ . Wegen  $\mathcal{U}_q(P') = 1$  folgt

$$a + b = s(a, b) = s(b, a) = b + a$$

für alle  $a, b \in P$ , d. h.  $P_+$  ist eine abelsche Gruppe.

- (ii) Offenbar ist  $a + a = s(a, a) = a^2$  und induktiv  $k \cdot a = a^k$  für alle  $a \in P$  und  $k \in \mathbb{N}$ .
- (iii) Folgt aus  $s(x, y) \in \langle x, y \rangle$ .
- (iv) Sei  $\alpha \in \text{End}(P)$ . Da  $a + b$  ein Wort in  $a$  und  $b$  ist, ist  $\alpha(a + b)$  das entsprechende Wort in  $\alpha(a)$  und  $\alpha(b)$ . Dies zeigt  $\alpha(a + b) = \alpha(a) + \alpha(b)$ .
- (v) Sei  $Q \leq P$ . Für  $a, b \in Q$  ist  $a - b = a + b^{-1}$  ein Wort in  $a$  und  $b$ . Dies zeigt  $a - b \in Q$  und  $Q \leq P_+$ .  $\square$

**Bemerkung 15.18.**

- (i) Der Isomorphietyp von  $P_+$  lässt sich leicht aus  $|\Omega_q(P)| = |\Omega_q(P_+)|$  für  $q = p, p^2, \dots$  bestimmen.
- (ii) Sei  $p > 2$  und  $P$  eine  $p$ -Gruppe mit Nilpotenzklasse 2. Sei  $q := \exp(P')$ . In der freien Gruppe mit Nilpotenzklasse 2 gilt

$$x^q y^q = (xy)^q [y, x]^{-\binom{q}{2}} = (xy[y, x]^{\frac{1-q}{2}})^q$$

nach Beispiel 15.13. Da die Abbildung  $P \rightarrow P$ ,  $x \mapsto x^2$  bijektiv ist, besitzt jedes  $x \in P$  genau eine „Wurzel“  $\sqrt{x} \in P$  mit  $\sqrt{x}^2 = x$ . Wie im Beweis von Satz 15.17 erhält man durch

$$x + y := xy[y, x]^{\frac{1-q}{2}} = xy\sqrt{[y, x]}$$

eine abelsche Gruppenstruktur auf  $P$ . Dieser Spezialfall wurde zuerst von Baer konstruiert.

- (iii) Für  $p$ -Gruppen mit Nilpotenzklasse  $3 < p$  lautet die Formel

$$x + y := xy\sqrt{[y^{-1}, x^{-1}]}^{12}\sqrt{[x, y, x]}^{12}\sqrt{[y, x, y]}$$

(ohne Beweis). Im Allgemeinen erhält man diese Terme aus der *Baker-Campbell-Hausdorff-Formel*.

- (iv) Satz 15.17 gilt bereits, wenn jede von drei Elementen erzeugte Untergruppe von  $P$  Nilpotenzklasse  $< p$  hat (drei Erzeuger sind notwendig, um das Assoziativgesetz zu beweisen).
- (v) Die *Lazard-Korrespondenz* liefert eine Lie-Ring-Struktur auf  $p$ -Gruppen mit Nilpotenzklasse  $< p$ . Dabei ist  $P_+$  die additive Gruppe dieses Lie-Rings.

**Beispiel 15.19.**

- (i) Alle  $p$ -Gruppen  $P$  mit  $|P| \leq p^p$  haben Nilpotenzklasse  $< p$  und erfüllen daher die Voraussetzung von Satz 15.17. Für  $P = \text{SmallGroup}(5^5, 21)$  gilt  $|\Omega_5(P)| = 5^3$  und  $|\Omega_{25}(P)| = 5^4$ . Daher ist  $P_+ \cong C_{5^3} \times C_5^2$ .
- (ii) Im Allgemeinen ist nicht jeder Endomorphismus von  $P_+$  ein Endomorphismus von  $P$ . Zum Beispiel ist das Zentrum von  $P := p_+^{1+2}$  charakteristisch (oder Ordnung  $p$ ), während  $P_+ \cong C_p^3$  charakteristisch einfach ist. Außerdem besitzt  $P$  nur  $p + 1$  maximale Untergruppen, während  $P_+$  nach Lemma 15.5

$$\binom{3}{2}_p = \frac{(p^3 - 1)(p^3 - p)}{(p^2 - 1)(p^2 - p)} = p^2 + p + 1$$

maximale Untergruppen besitzt.

## 16 Entscheidbarkeitsprobleme

**Bemerkung 16.1** (DEHNs Probleme).

- (i) Sei  $G$  eine Gruppe mit Erzeugendensystem  $X$ . In der „Praxis“ möchte man folgende Aufgaben algorithmisch lösen:
  - (Wortproblem) Wann repräsentiert ein Wort in  $X$  das neutrale Element in  $G$ ?
  - (Konjugationsproblem) Wann sind zwei Wörter in  $X$  als Elemente von  $G$  konjugiert?
  - (Isomorphieproblem) Wann ist  $G$  zu einer weiteren gegebenen Gruppe  $H$  isomorph?
- (ii) Eine Lösung des Wortproblems bedeutet (für abzählbares  $X$ ), dass man jedes Element in  $G$  auf eine „Normalform“ bringen kann. Nach Lemma 1.7 ist das Wortproblem daher für freie Gruppen lösbar (vorausgesetzt man weiß bereits, dass  $G$  frei ist).
- (iii) Ist das Konjugationsproblem für  $G$  lösbar, so auch das Wortproblem, denn  $g = 1$  genau dann, wenn  $g$  und  $1$  konjugiert sind.
- (iv) NOVIKOV und BOONE konstruierten eine endlich präsentierte Gruppe, für die das Wortproblem (und damit auch das Konjugationsproblem) unlösbar ist. ADJAN und RABIN zeigten die Unlösbarkeit des Isomorphieproblems für eine gewisse endlich präsentierte Gruppe. Das heißt, es gibt keinen Algorithmus, der eines der drei Probleme in endlicher Zeit für diese Gruppen löst. Selbst die Frage, ob eine gegebene Gruppe endlich oder trivial ist, lässt sich nicht entscheiden!
- (v) Im Allgemeinen hängt die Lösbarkeit der Probleme von der gewählten Darstellung ab. Für endlich erzeugte Gruppen ist die Situation besser.

**Satz 16.2.** *Sei  $G = \langle X \mid R \rangle$  endlich erzeugt. Ist das Wortproblem (bzw. Konjugationsproblem) bzgl. dieser Präsentation von  $G$  lösbar, so ist das Wortproblem (bzw. Konjugationsproblem) auch für jede andere endlich erzeugte Präsentation von  $G$  lösbar.*

*Beweis.* Sei  $F := F_X$  und  $\varphi: F \rightarrow G$  der kanonische Epimorphismus. Sei  $F_1 := F_{X_1}$  und  $\varphi_1: F_1 \rightarrow G$  eine weitere Präsentation mit  $|X_1| < \infty$ . Dann existiert eine Funktion  $\psi: X_1 \rightarrow F$  mit  $(\varphi\psi)(x) = \varphi_1(x)$  für alle  $x \in X_1$ . Nach der universellen Eigenschaft setzt sich  $\psi$  nach  $F_1$  fort. Diese Fortsetzung lässt sich explizit anhand der endlich vielen Werte  $\psi(x)$  mit  $x \in X_1$  berechnen. Sei nun  $w \in F_1$ . Ist das Wortproblem für  $\langle X \mid R \rangle$  lösbar, so lässt sich  $\varphi(\psi(w)) = 1$  entscheiden. Also lässt sich auch  $\varphi_1(w) = 1$  entscheiden, d. h. das Wortproblem für  $\langle X_1 \mid R_1 \rangle$  mit  $\text{Ker}(\varphi_1) = \langle R_1 \rangle^{F_1}$  ist lösbar. Analog für das Konjugationsproblem.  $\square$

**Satz 16.3.** *Das Konjugationsproblem ist für alle freien Gruppen lösbar.*

*Beweis.* Offenbar ist jedes  $g \in F_X$  zu einem zyklisch reduzierten Wort  $\hat{g}$  konjugiert. Unterscheiden sich  $\hat{g}$  und  $\hat{h}$  nur durch Shifts, so sind  $g$  und  $h$  in  $F_X$  konjugiert. Nehmen wir umgekehrt an, dass  $g$  und  $h$  konjugiert sind. Dann sind auch  $\hat{g}$  und  $\hat{h}$  konjugiert. Sei  $a \in F_X$  reduziert mit  $a\hat{g}a^{-1} = \hat{h}$ . Da  $\hat{h}$  zyklisch reduziert ist, muss sich  $a$  oder  $a^{-1}$  vollständig mit  $\hat{g}$  kürzen. Also ist  $\hat{g}$  ein Shift von  $\hat{h}$ . Auf diese Weise kann man entscheiden, ob  $g$  und  $h$  konjugiert sind.  $\square$

**Satz 16.4.** *Sei  $G$  endlich präsentiert und residual endlich. Dann ist das Wortproblem für  $G$  lösbar.*

*Beweis.* Sei  $G = \langle X \mid R \rangle$  eine endliche Präsentation und  $w$  ein Wort in  $X \subseteq F_X$ . Wir führen folgende Algorithmen parallel (oder im Wechsel) aus:

- Man konstruiere alle (abzählbar viele) Produkte von Elementen der Form  $gr^{\pm 1}g^{-1}$  mit  $r \in R$  und  $F_X \in G$  (zum Beispiel sortiert nach Länge und lexikographisch). Ist  $w = 1$  in  $G$ , so muss  $w$  irgendwann auftreten.
- Man konstruiere alle (abzählbar viele) endlichen Gruppen  $H$ . Da  $X$  endlich ist, gibt es nur endlich viele Abbildungen  $X \rightarrow H$ . Wegen  $|R| < \infty$  lässt sich prüfen, welche davon sich zu Homomorphismen  $\varphi: G \rightarrow H$  fortsetzen. Man prüfe  $\varphi(w) \neq 1$ . Ist  $w \neq 1$ , so existieren  $H$  und  $\varphi$  mit  $\varphi(w) \neq 1$ , da  $G$  residual endlich ist.  $\square$

**Satz 16.5.** *Das Wortproblem ist für Coxetergruppen lösbar.*

*Beweis.* Sei  $G = \langle x_1, \dots, x_n \rangle$  eine Coxetergruppe vom Rang  $n$  und  $w = x_{i_1} \dots x_{i_l} \in G$ . Sei  $\sigma: G \rightarrow \text{GL}(n, \mathbb{R})$  der Monomorphismus aus Satz 11.14. Dann lässt sich  $\sigma(w) = \sigma_{i_1} \dots \sigma_{i_l}$  allein aus den Zahlen  $m_{ij}$  berechnen. (Auf dem Computer könnte man die Matrixeinträge  $\cos(\pi/m_{ij})$  diskret in einem Kreisteilungskörper realisieren, anstatt mit rundungsanfälligen Fließkommazahlen zu arbeiten.) Es gilt  $w = 1$  genau dann, wenn  $\sigma(w) = 1$ .  $\square$

**Bemerkung 16.6.**

- (i) TITS hat einen Algorithmus für Satz 16.5 gegeben: Sei  $G = \langle x_1, \dots, x_n \rangle$  eine Coxetergruppe und  $\pi: F_X \rightarrow G$  der kanonische Epimorphismus mit  $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ . Für  $w = x_{i_1} \dots x_{i_k} \in F_X$  sei  $R(w) \subseteq F_X$  die Menge aller Wörter, die man aus  $w$  mittels der folgenden Operationen erhalten kann:

- Entferne ein Teilwort der Form  $x_i x_i$  in  $w$ .
- Ersetze ein Teilwort der Form  $x_i x_j x_i \dots$  ( $m_{ij} < \infty$  Buchstaben) durch  $x_j x_i x_j \dots$  ( $m_{ij}$  Buchstaben).

Da die Länge der Wörter in  $R(w)$  durch  $k$  beschränkt ist, ist  $R(w)$  endlich. Offenbar gilt  $\pi(r) = \pi(w)$  für alle  $r \in R(w)$ . Man kann zeigen, dass  $\pi(w) = 1$  genau dann gilt, wenn  $1 \in R(w)$  (ohne Beweis).

- (ii) Das Isomorphieproblem für Coxetergruppen wurde noch nicht vollständig gelöst.
- (iii) Die Schwierigkeit der Dehnschen Probleme nutzt man in der Kryptographie aus. Wir beschreiben beispielhaft das ANSHEL-ANSHEL-GOLDFELD-Protokoll zur Bestimmung eines gemeinsamen geheimen Schlüssels zwischen Personen  $A$  und  $B$ . Gegeben sei eine Gruppe  $G$  mit effizient berechenbarer Normalform. Der öffentliche Schlüssel von  $A$  bzw.  $B$  besteht aus zufälligen Elementen  $a_1, \dots, a_n$  bzw.  $b_1, \dots, b_n$  in  $G$ . Die privaten Schlüssel bestehen jeweils aus Wörtern  $w_A$  bzw.  $w_B$  in  $a_1, \dots, a_n$  bzw.  $b_1, \dots, b_n$ . Der Schlüsselaustausch basiert auf folgendem Prinzip:

- (1)  $A$  sendet das  $n$ -Tupel  $(w_A b_1 w_A^{-1}, \dots, w_A b_n w_A^{-1})$  (in Normalform) an  $B$ .
- (2)  $B$  sendet  $(w_B a_1 w_B^{-1}, \dots, w_B a_n w_B^{-1})$  an  $A$ .
- (3) Beide können nun

$$w_A w_A (w_B a_1 w_B^{-1}, \dots, w_B a_n w_B^{-1})^{-1} = [w_A, w_B] = w_B (w_A b_1 w_A^{-1}, \dots, w_A b_n w_A^{-1}) w_B^{-1}$$

berechnen und als gemeinsamen Schlüssel benutzen. Ein Angreifer kann aus  $a_i$ ,  $b_i$ ,  $w_A b_i w_A^{-1}$  und  $w_B a_i w_B^{-1}$  im Allgemeinen (ohne spezielle Gruppenstruktur) keine Rückschlüsse auf  $w_A$ ,  $w_B$  oder  $[w_A, w_B]$  ziehen.



Solche kryptographischen Verfahren werden interessant, wenn mit leistungsfähigen Quantencomputern bisherige Verfahren wie RSA unbrauchbar werden.

## Aufgaben

**Aufgabe 1.** Sei  $F$  eine freie Gruppe vom Rang  $> 1$ . Zeigen Sie  $Z(F) = 1$ .

**Aufgabe 2.** Zeigen Sie:

- (a)  $Q_{2^n} \cong \langle x, y \mid x^{2^{n-2}} = y^2, yxy^{-1} = x^{-1} \rangle$  für  $n \geq 3$  (siehe GT-Satz 8.15)
- (b)  $A_4 \cong \langle x, y \mid x^2 = y^3 = (xy)^3 = 1 \rangle$ .

**Aufgabe 3.** Eine Gruppe  $G$  heißt *metazyklisch*, falls ein zyklischer Normalteiler  $N$  mit zyklischer Faktorgruppe  $G/N$  existiert (Beispiel: GT-Satz 7.24). Sei  $P$  eine endliche metazyklische  $p$ -Gruppe. Zeigen Sie, dass  $a, b, c, k \geq 0$  mit  $k^{p^b} - 1 \equiv 0 \equiv p^c(k - 1) \pmod{p^a}$  und

$$P \cong \langle x, y \mid x^{p^a} = 1, y^{p^b} = x^{p^c}, yxy^{-1} = x^k \rangle$$

existieren.

*Bemerkung:* Verschiedene Parameter können zu isomorphen Gruppen gehören. Eine exakte Klassifikation wurde von Liedahl gegeben.

**Aufgabe 4.** Sei  $p$  eine Primzahl,  $a \geq 2$  und  $b \geq 1$ . Sei

$$P(a, b) := P = \langle x, y \mid x^{p^a} = y^{p^b} = 1, yxy^{-1} = x^{1+p^{a-1}} \rangle.$$

Zeigen Sie:

- (a)  $|P| = p^{a+b}$ .
- (b)  $P' = \langle x^{p^{a-1}} \rangle \cong C_p$ .
- (c)  $\Phi(P) = Z(P) = \langle x^p, y^p \rangle \cong C_{p^{a-1}} \times C_{p^{b-1}}$ .

**Aufgabe 5.** Eine nicht-abelsche Gruppe  $G$  heißt *minimal nicht-abelsch*, falls jede echte Untergruppe von  $G$  abelsch ist. Zeigen Sie, dass für eine endliche  $p$ -Gruppe  $P$  die folgenden Aussagen äquivalent sind:

- (a)  $P$  ist minimal nicht-abelsch.
- (b)  $|P : \Phi(P)| = |P : Z(P)| = p^2$ .
- (c)  $|P : \Phi(P)| = p^2$  und  $|P'| = p$ .

*Hinweis:* GT-Kapitel 4.

**Aufgabe 6.** Sei  $p$  eine Primzahl und  $a, b \in \mathbb{N}$ . Sei

$$Q(a, b) := Q = \langle x, y \mid x^{p^a} = y^{p^b} = [x, y]^p = [x, x, y] = [y, x, y] = 1 \rangle$$

(Erinnerung:  $[x, y, z] := [x, [y, z]]$ ). Zeigen Sie:

- (a)  $|Q| = p^{a+b+1}$ .
- (b)  $Q' = \langle [x, y] \rangle \cong C_p$ .
- (c)  $\Phi(Q) = Z(Q) = \langle x^p, y^p, [x, y] \rangle \cong C_{p^{a-1}} \times C_{p^{b-1}} \times C_p$ .

*Bemerkung:* Rédei hat gezeigt, dass jede minimal nicht-abelsche  $p$ -Gruppe zu  $P(a, b)$ ,  $Q(a, b)$  oder zu  $Q_8$  isomorph ist.

**Aufgabe 7.** Entscheiden Sie, ob der Petersen-Graph der Cayley-Graph einer Gruppe ist.

**Aufgabe 8.** Sei  $F$  die freie Gruppe über dem Alphabet  $\{x, y\}$  und  $G \leq F$  die Untergruppe aller Wörter mit gerader Länge. Zeigen Sie, dass  $G$  frei durch  $x^2$ ,  $y^2$  und  $xy$  erzeugt wird.

**Aufgabe 9.** Sei  $G = \langle X \mid R \rangle$  eine einfache Gruppe, wobei jeder Relator in  $R$  gerade Länge hat. Zeigen Sie:  $G \cong C_2$ .

**Aufgabe 10.** Sei  $F$  eine freie Gruppe und  $w \in F \setminus \{1\}$ . Zeigen Sie  $C_F(w) \cong C_\infty$ . Folgern Sie, dass  $F$  unzerlegbar ist.

**Aufgabe 11.** Zeigen Sie, dass eine Gruppe  $H$  genau dann frei ist, wenn jede Erweiterung von  $H$  zerfällt.

**Aufgabe 12.** Das *Koproduct*

$$A := \prod_{n \in \mathbb{Z}} C_2 \leq \prod_{n \in \mathbb{Z}} C_2$$

besteht aus allen Folgen  $(a_n)_{n \in \mathbb{Z}}$  mit  $|\{n \in \mathbb{Z} : a_n \neq 1\}| < \infty$ . Offenbar existiert  $\gamma \in \text{Aut}(A)$  mit  $\gamma((a_n)_n) := (a_{n+1})_n$  für alle  $(a_n)_n \in A$ . Sei  $G := A \rtimes \langle \gamma \rangle$ . Zeigen Sie, dass  $G$  endlich erzeugt und metabelsch ist, aber die Untergruppe  $A \leq G$  nicht endlich erzeugt ist.

**Aufgabe 13.** Bestimmen Sie alle Erweiterungen von  $C_2$  mit  $C_n$  bis auf Äquivalenz ( $n \in \mathbb{N}$ ).

**Aufgabe 14.** Sei

$$D_\infty := \langle x, y \mid x^2 = y^2 = 1 \rangle \cong C_\infty \rtimes C_2$$

(GT-Aufgabe 61(b)). Zeigen Sie, dass  $G := \langle x, y \mid x^2 = y^2 \rangle$  eine Erweiterung von  $D_\infty$  mit  $Z(G) \cong C_\infty$  ist. Folgern Sie, dass  $G$  überauflösbar und  $G'$  zyklisch ist.

**Aufgabe 15.** Sei  $A := \langle a \rangle \cong C_4$ ,  $S := \text{SL}(2, 3)$  und  $G := (S \times A) / \langle (-1_2, a^2) \rangle \cong S * A$  (Zentralprodukt). Zeigen Sie:

- (a)  $S \cong Q_8 \rtimes C_3$ .

- (b)  $Q_8 \trianglelefteq G$  besitzt ein Komplement in  $H := Q_8 * A \in \text{Syl}_2(G)$ .  
(c)  $Q_8$  besitzt kein Komplement in  $G$ .

*Bemerkung:* Für nicht-abelsche Gruppen  $N$  ist der Satz 4.23 von Gaschütz also falsch.

**Aufgabe 16.** Sei  $N := D_8$  und  $H \cong C_2$ .

- (a) Zeigen Sie  $\text{Aut}(N) \cong D_8$ .  
(b) Bestimmen Sie alle Erweiterungen von  $H$  mit  $N$  bis auf Äquivalenz. Welche davon sind isomorph?

**Aufgabe 17.** Sei  $N = \langle a, b \mid a^8 = b^2 = 1, bab^{-1} = a^{-1} \rangle \cong D_{16}$  und  $H = \langle x \rangle \cong C_2$ . Zeigen Sie:

- (a) Es existiert ein Automorphismus  $\beta \in \text{Aut}(N)$  mit  $\beta(a) = a^3$  und  $\beta(b) = ab$ .  
(b) Es existiert ein Homomorphismus  $\omega: H \rightarrow \text{Out}(N)$  mit  $\omega(x) = \beta \text{Inn}(N)$ .  
(c) Es gibt kein Parametersystem von  $H$  mit  $N$  zur Paarung  $\omega$ .

*Hinweis:* Satz 4.16.

**Aufgabe 18.** Wir betrachten die einfache Gruppe  $N := \text{PSL}(2, 9)$  der Ordnung 360. Wir identifizieren die Elemente in  $N$  mit ihren Urbildern in  $\text{SL}(2, 9)$  (beachte:  $Z(\text{SL}(2, 9)) = \langle -1_2 \rangle$ ). Sei  $\mathbb{F}_9^\times = \langle \zeta \rangle$  und  $d := \text{diag}(\zeta, 1) \in \text{GL}(2, 9)$ . Zeigen Sie:

- (a) Die Abbildung  $\sigma: N \rightarrow N, x \mapsto dxd^{-1}$  ist ein äußerer Automorphismus mit  $\sigma^2 \in \text{Inn}(N)$ .  
(b) Die Abbildung  $\tau: N \rightarrow N, (x_{ij}) \mapsto (x_{ij}^3)$  ist ein äußerer Automorphismus der Ordnung 2.  
(c) Sei  $H = \langle x \rangle \cong C_2$ . Nach Folgerung 4.28 gibt es je ein Parametersystem  $(\alpha, \kappa)$  von  $H$  mit  $N$  und  $\alpha_x \in \{1, \sigma, \tau, \sigma\tau\}$ . Untersuchen Sie, welche der Erweiterungen zerfallen und welche isomorph sind.

*Bemerkung:* Es gilt  $N \cong A_6$ .

**Aufgabe 19.** Sei  $N$  abelsch und  $\alpha: H \rightarrow \text{Aut}(N)$  ein Gruppenhomomorphismus. Eine Abbildung  $\delta: H \rightarrow N$  mit

$$\boxed{\delta(xy) = \delta(x)\alpha_x(\delta(y))}$$

für alle  $x, y \in H$  heißt *verschränkter Homomorphismus* bzgl.  $\alpha$ . Zeigen Sie:

- (a) Die verschränkten Homomorphismen bilden eine Gruppe  $\text{Hom}_\alpha(H, N) \leq C^1(H, N)$ .  
(b) Die Abbildung  $\Gamma: N \rightarrow \text{Hom}_\alpha(H, N), a \mapsto \delta_a$  mit  $\delta_a(x) := \alpha_x(a)a^{-1}$  ist ein Homomorphismus. Man setzt  $H_\alpha^1(H, N) := \text{Hom}_\alpha(H, N)/\Gamma(N)$ .  
(c) Sei  $K$  ein Komplement von  $N$  in  $G := N \rtimes_\alpha H$ . Für  $x \in H$  existiert genau ein  $y \in K$  mit  $\delta_K(x) := xy^{-1} \in N$ . Es gilt  $\delta_K \in \text{Hom}_\alpha(H, N)$ .  
(d) Jedes  $\delta \in \text{Hom}_\alpha(H, N)$  definiert ein Komplement  $K_\delta := \{\delta(x)^{-1}x : x \in H\}$  von  $N$  in  $G$  mit  $\delta_{K_\delta} = \delta$ .  
(e) Zwei Komplemente  $K_1, K_2$  von  $N$  in  $G$  sind genau dann konjugiert, wenn  $\delta_{K_1}\delta_{K_2}^{-1} \in \Gamma(N)$  gilt.  
(f) Die Abbildung  $K \rightarrow \delta_K$  induziert eine Bijektion zwischen den Konjugationsklassen von Komplementen von  $N$  in  $G$  und  $H_\alpha^1(H, N)$ .

**Aufgabe 20** (GASCHÜTZ). Sei  $N$  ein abelscher Normalteiler einer endlichen Gruppe  $G$  und  $N \leq H \leq G$  mit  $\text{ggT}(|N|, |G : H|) = 1$ . Zeigen Sie: Sind alle Komplemente von  $N$  in  $H$  konjugiert, so sind alle Komplemente von  $N$  in  $G$  konjugiert.

**Aufgabe 21.**

(a) Zeigen Sie  $\text{Aut}(S_n) \cong \text{Aut}(A_n)$  für  $n \geq 4$ .

(b) Zeigen Sie, dass  $\varphi \in \text{Aut}(S_6)$  mit

$$\begin{aligned}\varphi((1, 2)) &= (1, 5)(2, 3)(4, 6), & \varphi((1, 3)) &= (1, 4)(2, 6)(3, 5), \\ \varphi((1, 4)) &= (1, 3)(2, 4)(5, 6), & \varphi((1, 5)) &= (1, 2)(3, 6)(4, 5), \\ \varphi((1, 6)) &= (1, 6)(2, 5)(3, 4)\end{aligned}$$

ein äußerer Automorphismus der Ordnung 2 ist.

**Aufgabe 22.** Sei  $P = P(a, 1) = M_{p^{a+1}}$  die minimal nicht-abelsche Gruppe aus Aufgabe 4 (oder GT-Satz 8.15) mit  $a \geq 2$ . Im Fall  $p = 2$  sei  $a \geq 3$ . Zeigen Sie  $M(P) = 1$ .

*Hinweis:* Satz 5.25.

**Aufgabe 23.** Seien  $G_i \approx H_i$  isokline Gruppen für  $i = 1, 2$ . Zeigen Sie  $G_1 \times G_2 \approx H_1 \times H_2$ .

**Aufgabe 24.** Zeigen Sie, dass die einfache Gruppe  $\text{PSp}(4, 3)$  zu keiner alternierenden Gruppe und keiner projektiven speziellen linearen Gruppe isomorph ist.

*Bemerkung:* Nach Beispiel 8.13 gilt  $\text{PSp}(4, 3) \cong \text{PSU}(4, 2)$ . Mit Hilfe von *Zsigmondy-Primzahlen* kann man zeigen, dass  $\text{PSp}(2n, q)$  für  $n \geq 2$  zu keiner alternierenden Gruppe und keiner projektiven speziellen linearen Gruppe isomorph ist.

**Aufgabe 25.** Sei  $V$  ein unitärer Raum. Zeigen Sie, dass  $V$  eine Basis aus Elementen in  $V_0$  besitzt.

**Aufgabe 26.** Sei  $V$  ein unitärer Raum der Dimension  $n$  und  $U \leq V$  mit  $U \subseteq U^\perp$ . Zeigen Sie  $\dim U \leq \lfloor n/2 \rfloor$ . Geben Sie ein Beispiel, in dem Gleichheit gilt.

*Bemerkung:* Im Allgemeinen (d. h. für beliebige „Skalarprodukte“ auf  $V$ ) nennt man

$$\max\{\dim U : U \leq V, U \subseteq U^\perp\}$$

den *Witt-Index* von  $V$ .

**Aufgabe 27.** Zeigen Sie  $\text{Sp}(2n, q) \leq \text{SU}(2n, q)$  für alle  $n \in \mathbb{N}$  und Primzahlpotenzen  $q \neq 1$ .

**Aufgabe 28.** Beweisen Sie  $\text{PSU}(3, 2) \cong M_9$ .

*Hinweis:* GT-Satz 6.21.

**Aufgabe 29.** Wir betrachten die orthogonale Gruppe  $\text{GO}^\epsilon(2k, q)$  mit  $q$  ungerade. Zeigen Sie: Der Witt-Index ist  $k$  für  $\epsilon = 1$  und sonst  $k - 1$  für  $\epsilon = -1$  (siehe Aufgabe 26).

**Aufgabe 30.** Zeigen Sie, dass eine Operation von  $G$  auf  $\Omega$  genau dann 2-transitiv ist, wenn  $G = G_\omega \cup G_\omega x G_\omega$  für  $\omega \in \Omega$  und ein  $x \in G$  gilt.

**Aufgabe 31.** Zeigen Sie, dass man mindestens 82 Lotto-Scheine (6 aus 49) ausfüllen muss, um zwei „Richtige“ (auf einem Schein) zu haben.

**Aufgabe 32.** Sei  $S = (\Omega, \mathcal{B})$  ein  $(2, k, v)$ -Steinersystem. Zeigen, dass die folgenden Aussagen äquivalent sind:

- (1)  $v = k^2$ .
- (2)  $|\mathcal{B}| = k^2 + k$ .
- (3) Für  $B \in \mathcal{B}$  und  $\omega \in \Omega \setminus B$  existiert genau ein Block  $B' \in \mathcal{B}$  mit  $\omega \in B'$  und  $B \cap B' = \emptyset$ .

*Bemerkung:* In der affinen Ebene  $\mathbb{F}_q^2$  ist (3) das *Parallelenpostulat*: Zu jedem Punkt  $x$  und jeder Gerade  $g$  existiert genau eine Parallele von  $g$ , die durch  $x$  verläuft.

**Aufgabe 33.** Zeigen Sie, dass der Higman-Sims-Graph 22-regulär ist, d. h. jede Ecke ist zu genau 22 weiteren Ecken verbunden.

**Aufgabe 34.**

- (a) Zeigen Sie, dass  $SU(3, 3)$  genau 63 Involutionen besitzt.
- (b) Zeigen Sie mit GAP, dass der in Bemerkung 10.20(vii) für  $J_2$  definierte Graph  $\Gamma$  36-regulär ist.
- (c) Zeigen Sie  $\text{Aut}(\Gamma) \cong J_2 \rtimes C_2$  mit den Paketen `grape` und `atlasrep`.

**Aufgabe 35.** Ein *Gitter* ist eine freie abelsche Untergruppe von  $\mathbb{R}^n$  vom Rang  $n$ . Jedes Gitter hat also die Form  $L = \mathbb{Z}b_1 + \dots + \mathbb{Z}b_n$ , wobei  $b_1, \dots, b_n \in \mathbb{R}^n$  eine Basis von  $\mathbb{R}^n$  ist. Zeigen Sie, dass

$$\text{Aut}(L) = \{f \in O(\mathbb{R}^n) : f(L) = L\}$$

eine endliche Gruppe ist. Bestimmen Sie  $\text{Aut}(\mathbb{Z}^n)$ .

**Aufgabe 36.** Sei  $p > 2$  eine Primzahl und  $G := \langle x, y \mid x^p = y^p = (xy)^p = 1 \rangle$ . Zeigen Sie  $|G| = \infty$ .  
*Hinweis:* Realisieren Sie  $G$  als Untergruppe von  $\text{Sym}(\mathbb{Z})$ .

**Aufgabe 37.** Zeigen Sie:

- (a) Jede Hurwitz-Gruppe  $G$  ist perfekt und 84 teilt  $|G|$ .
- (b)  $GL(3, 2)$  ist eine Hurwitz-Gruppe.

**Aufgabe 38.** Sei  $G = \text{Fr}_{i \in I} G_i$  und  $H = \bigoplus_{i \in I} G_i$ .

- (a) Konstruieren Sie einen natürlichen Epimorphismus  $G \rightarrow H$  und beschreiben Sie seinen Kern.
- (b) Zeigen Sie  $G/G' \cong H/H'$ .

(c) Sei  $N_i \trianglelefteq G_i$  für  $i \in I$ . Sei  $N$  der normale Abschluss von  $\bigcup_{i \in I} N_i$  in  $G$ . Zeigen Sie  $G/N \cong \text{Fr}_{i \in I} G_i/N_i$ .

**Aufgabe 39.** Sei  $G$  ein Amalgam von  $G_I$  bzgl.  $H$  mit  $H < G_i$  für alle  $i \in I$ . Zeigen Sie:  $Z(G) = \bigcap_{i \in I} Z(G_i)$ .

**Aufgabe 40.** Zeigen Sie, dass jede endlich erzeugte periodische auflösbare Gruppe endlich ist.

**Aufgabe 41.** Schreiben Sie das Element  $c_3$  in der Hall-Petrescu-Formel in einer Form, die erkennen lässt, dass es in  $G^{[3]}$  liegt.

**Aufgabe 42.**

(a) Sei  $P$  eine  $p$ -Gruppe, sodass  $P^{[p-1]}$  zyklisch ist. Zeigen Sie, dass  $P$  die Aussagen von Lemma 15.14 erfüllt.

(b) Konstruieren Sie  $p$ -Gruppen mit  $p > 2$  wie in (a) mit beliebig großer Nilpotenzklasse.

# Stichwortverzeichnis

## Symbole

$A^*$ , 35  
 $B^2(H, N)$ , 32  
 $Co_1$ , 82  
 $Co_2$ , 82  
 $Co_3$ , 82  
 $\delta_n(k)$ , 115  
 $D_\infty$ , 138  
 $E_{ij}$ , 55  
 $\text{Fr}_{i \in I} G_i$ , 103  
 $G * H$ , 103  
 $G_2(q)$ , 71  
 $G \approx H$ , 44  
 $GO(V, \rho)$ , 68  
 $GU(V)$ , 60  
 $GU(n, q)$ , 60  
 $H^2(H, N)$ , 32  
 $H_s^2(H, A)$ , 32  
 $HJ$ , 82  
 $HS$ , 80  
 $J_1$ , 82  
 $J_2$ , 82  
 $k_n(G)$ , 46  
 $l(g)$ , 84  
 $M(G)$ , 34  
 $McL$ , 82  
 $M_d$ , 77  
 $\Omega_q(G)$ , 132  
 $\mathcal{U}_q(G)$ , 132  
 $\Omega(V, \rho)$ , 70  
 $\omega(c_i)$ , 115  
 $P\Omega(V, \rho)$ , 70  
 $PSO(V, \rho)$ , 69  
 $PSU(V)$ , 60  
 $PSU(n, q)$ , 60  
 $P\text{Sp}(V)$ , 54  
 $\Phi$ , 86  
 $\Pi$ , 86  
 $SO(V, \rho)$ , 69  
 $SU(V)$ , 60  
 $SU(n, q)$ , 60  
 $\sigma_v$ , 86  
 $\text{Sp}(V)$ , 54  
 $Sz(q)$ , 58  
 $W^*(G)$ , 125  
 $W(G)$ , 124  
 $x_v$ , 86  
 $Z^2(H, N)$ , 32  
 $Z_s^2(H, A)$ , 32  
 $Z^*(G)$ , 42  
 $\partial\varphi$ , 32

## A

Adjan-Rabin, 135  
 affine Ebene, 78  
 Alphabet, 4  
 Anshel-Anshel-Goldfeld-Protokoll, 136  
 Antisymmetrie, 54  
 Artingruppe, 83  
 Austauschbedingung, 90  
 Automorphismensystem, 22

## B

Baer, 44, 134  
 Baker-Campbell-Hausdorff-Formel, 134  
 Basiskommutator, 115  
 Baumslag, 122  
 Beyl-Felgner-Schmid, 43  
 Birkhoff, 125  
 Buchstabe, 4  
 Burnside-Gruppe, 110

## C

Cayley-Algebra, 71  
 Cayley-Graph, 9  
 CFSG, 72  
 Chapman, 77  
 Conway-Gruppe, 82  
 Coxeter, 96  
 Coxeter-Todd-Algorithmus, 15  
 Coxetergraph, 91  
 Coxetergruppe, 83  
     alternierende Untergruppe, 84  
     irreduzible, 91  
     universelle, 84

## D

Dehns Probleme, 135  
 Dickson-Invariante, 72  
 Dynkin-Diagramm, 96

## E

Engel, 126  
 Epizentrum, 42  
 Erweiterung, 21  
     zentrale, 32  
     zerfallende, 21  
     äquivalente, 21

## F

Faktorensystem, 22  
     triviales, 22  
 Fano-Ebene, 79  
 Fishers Ungleichung, 79  
 freie Algebra, 118  
 freies Produkt, 102

Frucht, 10

## G

GAP, 7, 11, 14–16, 19, 20, 22, 28, 31, 37, 46, 49, 52, 53, 62, 81, 99

Gaschütz, 29, 41, 140

Gewicht

Basiskommutator, 115

Gitter, 141

Golay-Code, 80

Golod, 109

Groves, 133

Gruppe

endlich präsentierte, 6

hopfsche, 123

isoklin, 44

isokline, 44

metazyklische, 137

minimal nicht-abelsche, 137

orthogonale, 68

polyzyklische, 28

symplektische, 54

unitäre, 60

vollständige, 31

zentral erweiterbare, 42

Gruppenklasse, 121

Gupta, 109

Guralnick-Kantor-Kassabov-Lubotzky, 17

## H

Hall, 8, 46, 122, 123

Hall-Higman-Lemma, 114

Hall-Janko-Gruppe, 82

Hall-Petrescu-Formel, 131

Halls Kollektor-Prozess, 130

Higman, 129

Higman-Neumann-Neumann, 107

Higman-Sims-Graph, 80

Higman-Sims-Gruppe, 80

HNN-Erweiterung, 108

Hölder, 48

Hopf-Formel, 40

Hurwitz-Gruppe, 101

hyperbolisches Paar, 54

## I

Isoklinismus, 44

Isometrie, 60

Isomorphieproblem, 135

Iwasawa, 122

## J

Jacobi-Identität, 100

Johnson-Zassenhaus, 31

## K

Keevash, 83

Kirkman, 79

Kohomologiegruppe, 32

Kommutator

freie Algebra, 118

Konjugationsproblem, 135

Koprodukt, 138

Kozyklus, 32

Kurosch, 105

## L

Lazard-Korrespondenz, 134

Leech-Gitter, 81

Levi, 111, 112

Lie-Algebra, 100

Liedahl, 137

Länge, 4, 84

Löschbedingung, 90

## M

Magnus, 122

Magnus' Freiheitssatz, 18

Mal'cev, 123

Mathieu, 74, 75

Mathieugruppen, 77

McLaughlin-Gruppe, 82

Mendelsohn, 80

Miller, 78, 102

Monstergruppe, 101

Moore, 16, 17

## N

Neumann, 8, 124

Newman, 20

Nielsen-Schreier, 12

Nielsen-Transformationen, 19

Norton, 82

Novikov-Adjan, 108

Novikov-Boone, 135

## O

Oktonionen, 71

Olschanski, 112

orthogonaler Raum, 68

## P

Paarung, 30

Parallelenpostulat, 141

Parametersystem, 22

normalisiertes, 22

äquivalente, 24

Petersen-Graph, 138

Ping-Pong-Lemma, 6

projektive Darstellung, 42

projektive Ebene, 79

Präsentation

balancierte, 9



## Q

quadratische Form, 68  
Quasideterminante, 72

## R

Rang, 5  
    Coxetergruppe, 83  
Read, 41  
Rédei, 138  
Reidemeister-Schreier, 15  
Relation, 6  
Relator, 6

## S

Sanov, 113  
Schreier, 26  
Schreier-Transversale, 12  
Schreiers Formel, 13  
Schulmädchenproblem, 79  
Schur, 36, 41  
Schur-Erweiterung, 34  
    maximale, 36  
    universelle, 39  
Schur-Multiplikator, 34  
Shephard-Todd, 100  
Sims-Newman-Seeley, 130  
Spiegelung, 70, 84  
    komplexe, 100  
Spiegelungsgruppe, 84  
Spinornorm, 70  
Stammgruppe, 45  
Steinberg, 11  
Steinersystem, 78  
Stirling-Zahl, 78  
subdirektes Produkt, 121  
Suzuki-Gruppen, 59  
symplektische Basis, 54  
symplektischer Raum, 53

## T

Tarski-Monster, 112  
Tietze-Transformation, 18  
Tits, 90, 136  
Transvektion  
    symplektische, 56  
    unitäre, 64

## U

unitärer Raum, 59  
Universeller Koeffizientensatz, 37  
Untergruppe  
     $W$ -marginale, 125  
    verbale, 124

## V

Valentiner-Gruppe, 53  
Van der Waerden, 112

Varietät, 125

verschränkter Homomorphismus, 139

Verzweigungsfaktor, 45

von Dyck, 7

von-Dyck-Gruppe, 100

## W

Wall, 67  
Witt, 63, 74  
Witt-Index, 140  
Witts Formel, 118  
Wort, 4  
    leeres, 4  
    reduziert  
        Coxetergruppe, 84  
    reduziertes, 4  
    zyklisch reduziert, 18  
    äquivalente, 4  
Wortproblem, 135  
Wurzel, 86  
    positive/negative, 86  
Wurzelsystem, 86

## Z

Zelmanov, 108  
Zopfgruppe, 83  
Zorn, 127  
Zsigmondy-Primzahlen, 140