

Clase 8 · Matrices simétricas y definidas positivas

Ejes principales, energía y vibraciones

Contenido

1	Una elipse inclinada	2
2	El teorema espectral	2
3	Formas cuadráticas y ejes principales	7
4	Matrices definidas positivas	9
5	La factorización de Cholesky	13
6	El cociente de Rayleigh	15
7	El Hessiano y los puntos críticos	17
8	Modos normales de vibración	19
9	El tensor de inercia	22
10	★ Para ir más allá: el teorema de Courant–Fischer	24
11	Resumen	26
12	Ejercicios	26

1. Una elipse inclinada

La curva $2x^2 + 2xy + 2y^2 = 1$ es una elipse, pero está **inclinada**: el término $2xy$ la tuerce. ¿Hay un par de ejes en los que la ecuación se escriba sin ese término? Probemos con los ejes diagonales,

$$u = \frac{x+y}{\sqrt{2}}, \quad v = \frac{x-y}{\sqrt{2}}, \quad \text{es decir} \quad x = \frac{u+v}{\sqrt{2}}, \quad y = \frac{u-v}{\sqrt{2}}.$$

Entonces

$$\begin{aligned} 2x^2 + 2y^2 &= (u+v)^2 + (u-v)^2 = 2u^2 + 2v^2, \\ 2xy &= (u+v)(u-v) = u^2 - v^2, \end{aligned}$$

y al sumar, $2x^2 + 2xy + 2y^2 = 3u^2 + v^2$. En los ejes (u, v) la curva es $3u^2 + v^2 = 1$, una elipse **derecha**, con semiejes $1/\sqrt{3}$ (a lo largo de u) y 1 (a lo largo de v). Los números 3 y 1 que aparecieron son los valores propios de la matriz simétrica

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad 2x^2 + 2xy + 2y^2 = \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix},$$

y las direcciones $(1, 1)$ y $(1, -1)$ de los ejes nuevos son sus vectores propios (Ejemplo 2.1). Esta clase muestra que **toda** matriz simétrica real tiene ejes así, perpendiculares entre sí, y cosecha las consecuencias: la geometría de las elipses y elipsoides, el criterio para saber si una matriz es “positiva” (lo que garantiza que una energía sea positiva o que un punto crítico sea un mínimo), una factorización que resuelve sistemas con la mitad del trabajo, y cómo vibran de verdad un sistema de masas y resortes y un cuerpo rígido que gira.

2. El teorema espectral

Sea A una matriz **simétrica real** $n \times n$ ($A' = A$). La Clase 7 mostró que una matriz puede tener valores propios complejos y vectores propios que no son perpendiculares. Para las simétricas, ninguna de las dos cosas ocurre.

Lema 2.1 (Los valores propios de una simétrica real son reales). Si A es real y simétrica y $Av = \lambda v$ con $v \in \mathbb{C}^n$, $v \neq 0$, entonces $\lambda \in \mathbb{R}$.

i Borrador

Si λ fuera complejo, $\lambda = \bar{\lambda}$ fallaría. Calculo el escalar v^*Av de dos maneras: con $Av = \lambda v$ sale $\lambda\|v\|^2$, y, por la simetría, ese mismo escalar es igual a su propio conjugado, o sea real.

Demostración. Sea $v^* = \bar{v}'$ el vector fila conjugado, de modo que $v^*v = \sum_i |v_i|^2 = \|v\|^2 > 0$. De $Av = \lambda v$ sale $v^*Av = \lambda v^*v = \lambda\|v\|^2$. Por otro lado, el escalar $s = v^*Av$ cumple

$$\bar{s} = \overline{v^*Av} = (v^*Av)^* = v^*A^*(v^*)^* = v^*A'v = v^*Av = s,$$

porque A es real ($A^* = A'$) y simétrica ($A' = A$). Un número igual a su conjugado es real. Luego $\lambda = s/\|v\|^2$ es real. $\square$

Lema 2.2 (Vectores propios de valores propios distintos son perpendiculares). Si $A' = A$, $Av = \lambda v$, $Aw = \mu w$ y $\lambda \neq \mu$, entonces $v \cdot w = 0$.

Demostración. Por una parte, $(Av) \cdot w = \lambda v \cdot w$. Por otra, $(Av) \cdot w = v' A' w = v' Aw = v \cdot (Aw) = \mu v \cdot w$. Restando, $(\lambda - \mu) v \cdot w = 0$, y como $\lambda \neq \mu$, $v \cdot w = 0$. $\square$

El Lema 2.2 no basta: un valor propio repetido puede tener un espacio propio de dimensión mayor que uno, y ahí hay que *elegir* vectores perpendiculares. El teorema siguiente dice que siempre se puede, y lo demuestra de una vez para todos los casos.

Teorema 2.1 (Teorema espectral). Sea A una matriz real simétrica $n \times n$. Existen una matriz **ortogonal** Q ($Q'Q = I$) y una matriz **diagonal real** $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ tales que

$$A = Q\Lambda Q'.$$

Las columnas $q_1, \dots, q_n$ de Q son una base ortonormal de $\mathbb{R}^n$ formada por vectores propios, $Aq_i = \lambda_i q_i$.

Borrador

Inducción sobre n . Tomo un valor propio λ_1 (real, por el Lema 2.1) con un vector propio unitario q_1 , y lo completo a una base ortonormal con Gram-Schmidt (Clase 5). En esa base, A queda con la forma $\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$: la primera columna sale de $Aq_1 = \lambda_1 q_1$ y la primera fila, de la simetría. El bloque B es simétrico y más chico, así que se le aplica la hipótesis de inducción.

Demostración. Para $n = 1$, $A = (a)$ y se toma $Q = (1)$, $\Lambda = (a)$.

Supongamos el teorema cierto para matrices simétricas de tamaño $n - 1$ y sea A de tamaño n .

Un valor propio y su vector. El polinomio característico tiene una raíz $\lambda_1 \in \mathbb{C}$ (Clase 7: es un polinomio de grado n), real por el Lema 2.1. Entonces $A - \lambda_1 I$ es una matriz **real** singular, y tiene un vector $q_1 \in \mathbb{R}^n$ no nulo en su espacio nulo (la eliminación gaussiana sobre $\mathbb{R}$ produce una variable libre real, Clase 1). Normalizamos para que $\|q_1\| = 1$.

Una base ortonormal. Por Gram-Schmidt (Clase 5) existe una base ortonormal de $\mathbb{R}^n$ cuyo primer vector es q_1 . Sean W la matriz $n \times (n - 1)$ con los otros vectores como columnas y $Q_1 = (q_1 \ W)$, ortogonal.

La forma de $Q_1' A Q_1$. El producto $Q_1' A Q_1$ es simétrico, porque $(Q_1' A Q_1)' = Q_1' A' Q_1 = Q_1' A Q_1$. Su primera columna es $Q_1' A q_1 = \lambda_1 Q_1' q_1 = \lambda_1 e_1$, porque las columnas de Q_1 son ortonormales ($Q_1' q_1 = e_1$). Por simetría, su primera fila también es $(\lambda_1 \ 0 \ \cdots \ 0)$. Así,

$$Q_1' A Q_1 = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}, \quad B = W' A W,$$

y B es simétrica de tamaño $n - 1$ (porque $B' = W' A' W = B$).

Inducción. Por hipótesis de inducción, $B = Q_2 \Lambda_2 Q_2'$ con Q_2 ortogonal y Λ_2 diagonal real. Sea

$$Q = Q_1 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q_2 \end{pmatrix}.$$

Es ortogonal, por ser producto de ortogonales ($Q'Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q'_2 \end{pmatrix} Q'_1 Q_1 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q_2 \end{pmatrix} = I$). Además,

$$Q'AQ = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q'_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & Q'_2 B Q_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \Lambda_2 \end{pmatrix} = \Lambda,$$

y multiplicando por Q a la izquierda y por Q' a la derecha, $A = Q\Lambda Q'$. $\square$

Un valor propio repetido no es problema: el teorema entrega igual una base ortonormal completa. Lo recíproco también vale, y es inmediato: toda matriz de la forma $Q\Lambda Q'$ es simétrica, porque $(Q\Lambda Q')' = Q\Lambda'Q' = Q\Lambda Q'$. Es decir, **una matriz real es simétrica si y solo si se diagonaliza con una base ortonormal**.

Corolario 2.1 (Descomposición espectral). Si $A = Q\Lambda Q'$ como en el Teorema 2.1, entonces:

1. $A = \lambda_1 q_1 q'_1 + \dots + \lambda_n q_n q'_n$, y cada $P_i = q_i q'_i$ es la matriz de proyección sobre la recta de q_i (Clase 6), con $P_i P_j = 0$ si $i \neq j$ y $P_1 + \dots + P_n = I$.
2. $A^k = Q\Lambda^k Q' = \sum_i \lambda_i^k P_i$ para todo $k \geq 0$; si A es invertible, $A^{-1} = \sum_i \lambda_i^{-1} P_i$.
3. $\text{tr } A = \sum_i \lambda_i$, $\det A = \prod_i \lambda_i$, y rango A es el número de valores propios no nulos.

Demostración.

- (1) $Q\Lambda$ tiene columnas $\lambda_i q_i$, y el producto de una matriz por Q' es la suma de (columna i)(fila i de Q'): $Q\Lambda Q' = \sum_i (\lambda_i q_i) q'_i$. Cada $q_i q'_i$ es la proyección sobre la recta de q_i porque $\|q_i\| = 1$ (Clase 6, con $a = q_i$). Además $P_i P_j = q_i (q'_i q_j) q'_j = 0$ si $i \neq j$, y $\sum P_i = Q Q' = I$.
- (2) $A^2 = Q\Lambda Q' Q\Lambda Q' = Q\Lambda^2 Q'$ porque $Q'Q = I$; se sigue por inducción. Si A es invertible, ningún λ_i es cero (Clase 7: $\det A = \prod \lambda_i \neq 0$) y $Q\Lambda^{-1}Q'$ cumple $(Q\Lambda^{-1}Q')A = Q\Lambda^{-1}\Lambda Q' = I$.

- (3) Traza y determinante son los de la Clase 7. El rango de $A = Q\Lambda Q'$ es el de Λ (multiplicar por matrices invertibles no cambia el rango, Clase 3), que es el número de entradas diagonales no nulas.

□

Ejemplo 2.1 (Una matriz 2×2). Para $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$: $\tau = 4, \Delta = 3$,
 $p(\lambda) = \lambda^2 - 4\lambda + 3 = (\lambda - 3)(\lambda - 1)$. Para $\lambda = 3$: $A - 3I = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ da $x_1 = x_2, q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)'$. Para $\lambda = 1$: $A - I = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ da $x_1 = -x_2, q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)'$. Son perpendiculares: $1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) = 0$ (Lema 2.2). Con $Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ y $\Lambda = \text{diag}(3, 1)$,

$$A = 3 \cdot \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + 1 \cdot \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} + \frac{1}{2} & \frac{3}{2} - \frac{1}{2} \\ \frac{3}{2} - \frac{1}{2} & \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \square$$

Ejemplo 2.2 (Una matriz 3×3 con un valor propio repetido).

Sea $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} = I + J$, donde J es la matriz de unos. Como $A(1, 1, 1)' = (4, 4, 4)'$, $\lambda = 4$ es un valor propio con $q_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)'$. Para $\lambda = 1$: $A - I = J$, y $Jx = 0$ significa $x_1 + x_2 + x_3 = 0$, un **plano** (espacio propio de dimensión 2). Una base ortogonal del plano es $(1, -1, 0)'$ y $(1, 1, -2)'$ (producto interno $1 - 1 + 0 = 0$; ambos suman cero). Normalizando,

$$q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad q_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

La traza $6 = 4 + 1 + 1$ y el determinante $4 = 4 \cdot 1 \cdot 1$ coinciden con los de A ($\det A = 2(4 - 1) - 1(2 - 1) + 1(1 - 2) = 6 - 1 - 1 = 4$). Las proyecciones son

$$P_4 = q_1 q_1' = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\begin{aligned}
P_1 = q_2 q_2' + q_3 q_3' &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 \\ -2 & -2 & 4 \end{pmatrix} \\
&= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix},
\end{aligned}$$

que cumplen $P_1 = I - P_4$, y

$$A = 4P_4 + 1 \cdot P_1 = \frac{4}{3}J + \left(I - \frac{1}{3}J\right) = I + J \quad \square$$

Dentro del plano propio, q_2 y q_3 **no son únicos** (cualquier par ortonormal del plano sirve), pero la proyección P_1 sí lo es: depende solo del espacio propio.

3. Formas cuadráticas y ejes principales

Una **forma cuadrática** en $x \in \mathbb{R}^n$ es una función $q(x) = x'Ax$. Siempre se puede suponer A simétrica.

Proposición 3.1 (La matriz de una forma cuadrática se toma simétrica). *Para toda matriz cuadrada B , $x'Bx = x'Sx$ con $S = \frac{1}{2}(B + B')$ simétrica, y la matriz simétrica de una forma cuadrática es única.*

Demostración. $x'Bx$ es un escalar, igual a su transpuesta $x'B'x$; entonces $x'Bx = \frac{1}{2}(x'Bx + x'B'x) = x'Sx$. Unicidad: si S y T son simétricas con $x'Sx = x'Tx$ para todo x , $D = S - T$ es simétrica con $x'Dx = 0$ siempre. Con $x = e_i$: $d_{ii} = 0$. Con $x = e_i + e_j$: $0 = d_{ii} + d_{jj} + 2d_{ij} = 2d_{ij}$. Luego $D = 0$. $\square$

Por ejemplo, $q(x, y) = 2x^2 + 2xy + 2y^2$ tiene matriz $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$: el término cruzado $2xy$ se reparte a mitades entre las posiciones $(1, 2)$ y $(2, 1)$.

Teorema 3.1 (Teorema de los ejes principales). *Sea $A = Q\Lambda Q'$ simétrica. Con el cambio de variables $y = Q'x$ (las **coordenadas en los vectores propios**),*

$$x'Ax = \lambda_1 y_1^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2, \quad \text{con} \quad \|y\| = \|x\|.$$

Demostración. $x = Qy$ (porque $QQ' = I$), así que $x'Ax = y'Q'AQy = y'\Lambda y = \sum \lambda_i y_i^2$. Y $\|y\|^2 = x'QQ'x = x'x = \|x\|^2$. $\square$

Como $y \mapsto Qy$ conserva distancias (es una rotación, quizá con reflexión), el **conjunto de nivel** $\{x : x'Ax = 1\}$ es la figura $\sum \lambda_i y_i^2 = 1$ puesta, sin deformarla, en los ejes $q_1, \dots, q_n$. Hay tres casos (Figura 1):

- **Todos los $\lambda_i > 0$:** una **elipse** (en $\mathbb{R}^2$) o un **elipsoide** (en $\mathbb{R}^3$) con semiejes $1/\sqrt{\lambda_i}$ a lo largo de q_i . Cuanto *mayor* es el valor propio, *más corto* es el semieje.
- **Valores propios de ambos signos:** una **hipérbola** o un **hiperboloide**.
- **Algún $\lambda_i = 0$:** la figura se estira sin límite en la dirección de q_i : **rectas paralelas** en $\mathbb{R}^2$ (o un cilindro en $\mathbb{R}^3$).




Figura 1: Los tres casos de $x'Ax = 1$ en el plano. **Izquierda:** $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, valores propios 1 y 3: elipse con semiejes 1 (a lo largo de $(1, -1)$) y $1/\sqrt{3}$ (a lo largo de $(1, 1)$). **Centro:** $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, valores propios -1 y 3: hipérbola ($3y_1^2 - y_2^2 = 1$). **Derecha:** $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, valores propios 0 y 2: las rectas $x + y = \pm 1$, porque $x'Ax = (x + y)^2$.

Ejemplo 3.1 (La elipse de la apertura). Para $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ (Ejemplo 2.1), los valores propios son 3 y 1 y las coordenadas en los vectores propios son $y_1 = \frac{x_1+x_2}{\sqrt{2}}$ y $y_2 = \frac{x_1-x_2}{\sqrt{2}}$; es el cambio (u, v) del principio. La elipse $x'Ax = 1$ es $3y_1^2 + y_2^2 = 1$, con semiejes

$1/\sqrt{3} \approx 0,577$ en la dirección $(1, 1)$ y 1 en la dirección $(1, -1)$. Verificación con el extremo del semieje largo, $(x_1, x_2) = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)$: $x_1^2 = x_2^2 = \frac{1}{2}$ y $x_1 x_2 = -\frac{1}{2}$, así que $2 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot (-\frac{1}{2}) + 2 \cdot \frac{1}{2} = 1 \checkmark$.

Ejemplo 3.2 (Un elipsoide de revolución en el espacio). Para $A = I + J$ (Ejemplo 2.2) los valores propios son $4, 1, 1$. En las coordenadas de los vectores propios, $x'Ax = 4y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 = 1$: semieje $\frac{1}{2}$ a lo largo de $(1, 1, 1)$ y semiejes 1 y 1 en el plano $x_1 + x_2 + x_3 = 0$. Es un elipsoide **achatao de revolución** (un disco grueso): al haber dos valores propios iguales, todas las direcciones del plano perpendicular a $(1, 1, 1)$ son ejes principales (Figura 2). Por ejemplo, el punto $(1, -1, 0)/\sqrt{2}$ cumple $x'Ax = \frac{1}{2}(2 + 2 - 2) = 1 \checkmark$ (está en la superficie, en el plano propio) y $(1, 1, 1)/(2\sqrt{3})$ también: $\frac{1}{12}(2 \cdot 3 + 2 \cdot 3) = 1 \checkmark$.




Figura 2: El elipsoide $x'Ax = 1$ para $A = I + J$. El eje corto (semieje $1/2$) apunta en la dirección $(1, 1, 1)$; en el plano perpendicular los semiejes valen 1 (las dos flechas ocres son dos ejes principales, pero cualquier par perpendicular del plano sirve).

4. Matrices definidas positivas

Una energía debe ser positiva; la curvatura de un mínimo, también. La propiedad matricial que captura esto es la siguiente.

Definición 4.1 (Definida positiva). Una matriz simétrica A es **definida positiva** si $x'Ax > 0$ para todo $x \neq 0$; **semidefinida positiva** si $x'Ax \geq 0$ para todo x ; **definida negativa** si $-A$ es definida positiva; e **indefinida** si $x'Ax$ toma valores positivos y negativos.

Decidir cuál es el caso parece exigir probar infinitos vectores. El teorema siguiente lo reduce a un cálculo finito, de cuatro maneras equivalentes.

Teorema 4.1 (Criterios de definición positiva). Para una matriz simétrica A de $n \times n$ son equivalentes:

- (a) $x'Ax > 0$ para todo $x \neq 0$ (A es definida positiva).
- (b) Todos los valores propios de A son positivos.
- (c) $A = R'R$ para alguna matriz **cuadrada invertible** R .
- (d) La eliminación gaussiana sin intercambio de filas tiene n pivotes y **todos son positivos**.
- (e) Todos los **menores principales** $\det A_1, \dots, \det A_n$ son positivos, donde A_k es la esquina superior izquierda $k \times k$ de A .

Borrador

Demuestro un ciclo de implicaciones. (a) $\Leftrightarrow$ (b) sale del teorema de los ejes principales. (b) $\Rightarrow$ (c) con una raíz cuadrada de Λ . (c) $\Rightarrow$ (a) con la norma de Rx . Para los pivotes y menores recorro (a) $\Rightarrow$ (e) $\Rightarrow$ (d) $\Rightarrow$ (a), usando que $A = LDL'$ cuando A es simétrica.

Demostración. (a) $\Leftrightarrow$ (b). Con $A = Q\Lambda Q'$ y $y = Q'x$, el Teorema 3.1 da $x'Ax = \sum \lambda_i y_i^2$, $y \neq 0$ si y solo si $x \neq 0$. Si todos los $\lambda_i > 0$, la suma es positiva para $y \neq 0$. Recíprocamente, si (a) vale, $q_i' A q_i = \lambda_i q_i' q_i = \lambda_i$ debe ser positivo para cada vector propio unitario q_i .

(b) $\Rightarrow$ (c). Sea $\Lambda^{1/2} = \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_n})$ y $R = \Lambda^{1/2} Q'$. Entonces $R'R = Q\Lambda^{1/2}\Lambda^{1/2}Q' = Q\Lambda Q' = A$, y R es invertible porque es producto de matrices invertibles.

(c) $\Rightarrow$ (a). $x'Ax = x'R'R x = \|Rx\|^2 \geq 0$, y vale 0 solo si $Rx = 0$, es decir, solo si $x = 0$ (porque R es invertible).

(a) $\Rightarrow$ (e). Sea $z \in \mathbb{R}^k$ no nulo y $x = (z, 0)' \in \mathbb{R}^n$, no nulo. Entonces $z' A_k z = x' A x > 0$: A_k es simétrica y definida positiva. Por (a) $\Leftrightarrow$ (b) aplicado a A_k , todos sus valores propios son positivos, y su determinante (el producto, Clase 7) es positivo.

(e) $\Rightarrow$ (d). Si $\det A_k > 0$ para todo k , todas las submatrices principales son invertibles y, por el teorema de la sección $\star$ de la Clase 2, $A = LU$ existe sin intercambio de filas, con L unitriangular inferior. Al multiplicar por bloques, la esquina $k \times k$ de LU es $L_k U_k$ (el producto de las esquinas, porque los bloques fuera de la esquina no aportan a ella: L es triangular inferior y U , triangular superior). Entonces $\det A_k = \det L_k \det U_k = u_{11} \cdots u_{kk}$, y el k -ésimo pivote es $u_{kk} = \det A_k / \det A_{k-1}$ (con $\det A_0 = 1$), positivo.

(d) $\Rightarrow$ (a). Con pivotes $d_1, \dots, d_n > 0$ escribimos $A = LU = LD\tilde{U}$, con $D = \text{diag}(d_i)$ y $\tilde{U}$ unitriangular superior. Como A es simétrica, $A = A' = \tilde{U}' D L'$ es otra factorización de la forma (unitriangular inferior)(diagonal)(unitriangular superior), y por la unicidad de la Clase 2, $\tilde{U}' = L$. Así $A = LDL'$. Para $x \neq 0$, sea $z = L'x \neq 0$ (L' es invertible); entonces

$$x' A x = x' L D L' x = z' D z = d_1 z_1^2 + \cdots + d_n z_n^2 > 0.$$

□

Para una matriz **definida negativa** los menores principales alternan de signo: $(-1)^k \det A_k > 0$ (aplicar (e) a $-A$, y $\det(-A_k) = (-1)^k \det A_k$).

Ejemplo 4.1 (Los cuatro criterios en dos matrices). 2×2 . $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$: menores 2 y $\det A = 3$, ambos positivos; pivotes 2 y $2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$; valores propios 1 y 3. Es definida positiva.

3×3 . Sea $K = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$. Eliminación: sumando $\frac{1}{2}$ de la fila 1 a la fila 2, queda $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$; sumando $\frac{2}{3}$ de la fila 2 a la

fila 3, el tercer pivote es $2 - \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$. Los pivotes son $2, \frac{3}{2}, \frac{4}{3}$ y los multiplicadores $l_{21} = -\frac{1}{2}, l_{32} = -\frac{2}{3}$:

$$K = LDL' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{2}{3} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & & \\ & \frac{3}{2} & \\ & & \frac{4}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Los menores son $2, 2 \cdot 2 - 1 = 3$ y $\det K = 2(4 - 1) + 1(-2 - 0) = 6 - 2 = 4$: el producto de pivotes ($2 \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{3} = 4$) y cada cociente de menores consecutivos ($\frac{3}{2}, \frac{4}{3}$) es un pivote. Los valores propios son $2 - \sqrt{2} \approx 0,586, 2$ y $2 + \sqrt{2} \approx 3,414$ (suman $6 = \text{tr } K$ y multiplican $2(4 - 2) = 4 = \det K$). Todo coincide: K es definida positiva.

Ejemplo 4.2 (Una matriz indefinida). $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ tiene menores 1 y $\det A = 1 - 4 = -3 < 0$: no es definida positiva. Sus valores propios son 3 y -1 (suman $2 = \tau$, producto $-3 = \Delta$), de signos opuestos. Un vector que lo muestra: $x = (1, -1)'$ da $x'Ax = 1 - 4 + 1 = -2 < 0$, mientras que $x = (1, 1)'$ da $1 + 4 + 1 = 6 > 0$.

Proposición 4.1 (Semidefinidas). *Una matriz simétrica A es semidefinida positiva si y solo si todos sus valores propios son ≥ 0 , si y solo si $A = R'R$ para alguna matriz R (no necesariamente invertible).*

La demostración es la misma que la de (a) $\Leftrightarrow$ (b) $\Leftrightarrow$ (c), cambiando $>$ por $\geq$ ($R = \Lambda^{1/2}Q'$ sirve, y $x'R'R x = \|Rx\|^2 \geq 0$ siempre). Ojo: para semidefinidas **no** basta que los menores líderes $\det A_k$ sean ≥ 0 . La matriz $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ tiene menores líderes 0 y 0 , pero $x'Ax = -x_2^2$ es negativa en $(0, 1)$. (El criterio correcto para semidefinidas exige **todos** los menores principales, no solo los de la esquina.)

Proposición 4.2 (Matrices de la forma $A'A$). *Para cualquier matriz A de $m \times n$, $A'A$ es simétrica y semidefinida positiva. Es definida positiva si y solo si las columnas de A son independientes.*

Demostración. $(A'A)' = A'A$ y $x'A'Ax = \|Ax\|^2 \geq 0$. Es 0 solo si $Ax = 0$; con columnas independientes, $N(A) = \{0\}$ (Clase 3) y eso obliga a $x = 0$. Si las columnas son dependientes hay $x \neq 0$ con $Ax = 0$ y $x'A'Ax = 0$. $\square$

Esto explica por qué las ecuaciones normales de mínimos cuadrados (Clase 6) tienen solución única exactamente cuando las columnas son independientes: la matriz $G = A'A$ de ese sistema es definida positiva. Por ejemplo, $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ (columnas independientes) da $A'A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, la matriz definida positiva de arriba.

5. La factorización de Cholesky

Si A es simétrica y definida positiva, la factorización $A = LDL'$ de la demostración anterior se puede dividir en partes iguales.

Teorema 5.1 (Factorización de Cholesky). *Si A es simétrica y definida positiva, existe una **única** matriz triangular inferior L con diagonal positiva tal que*

$$A = LL'.$$

Borrador

Existencia: ya tengo $A = L_1DL'_1$ con $D > 0$; absorbo $\sqrt{D}$ en cada lado. Unicidad: si $LL' = MM'$, paso M al otro lado y obtengo una matriz que es a la vez triangular inferior y superior, o sea diagonal; la positividad de la diagonal fuerza que sea la identidad.

Demostración. Existencia. Por el Teorema 4.1 (d), $A = L_1DL'_1$ con L_1 unitriangular inferior y $D = \text{diag}(d_i)$, $d_i > 0$. Sea $L = L_1D^{1/2}$ con $D^{1/2} = \text{diag}(\sqrt{d_i})$. Es triangular inferior con diagonal $\sqrt{d_i} > 0$ y $LL' = L_1D^{1/2}D^{1/2}L'_1 = L_1DL'_1 = A$.

Unicidad. Sean $A = LL' = MM'$ con L, M triangulares inferiores de diagonal positiva (invertibles). Entonces $M^{-1}L = M'(L')^{-1}$. El lado izquierdo es triangular inferior (producto e inversa de triangulares inferiores) y el derecho, triangular superior; por lo tanto es una matriz diagonal E , con $M^{-1}L = E$, y la igualdad $M'(L')^{-1} = E$ da $M' = EL'$, es decir $M = LE$ (transponiendo, $E' = E$). Pero también $L = ME$. Sustituyendo, $L = LE \cdot E = LE^2$, así que $E^2 = I$, y E tiene diagonal ± 1 . Como las diagonales de L y $M = LE$ son positivas, $E = I$ y $M = L$. $\square$

El cálculo de L sale de comparar entradas en $A = LL'$. Como $a_{ij} = \sum_{k \leq \min(i,j)} l_{ik}l_{jk}$:

- para $i = j$: $a_{jj} = \sum_{k < j} l_{jk}^2 + l_{jj}^2$, de donde $l_{jj} = \sqrt{a_{jj} - \sum_{k < j} l_{jk}^2}$;
- para $i > j$: $a_{ij} = \sum_{k < j} l_{ik}l_{jk} + l_{ij}l_{jj}$, de donde $l_{ij} = \frac{a_{ij} - \sum_{k < j} l_{ik}l_{jk}}{l_{jj}}$.

Algoritmo: Cholesky

Entrada: A simétrica $n \times n$. **Salida:** L triangular inferior con $A = LL'$.

1. Para $j = 1, \dots, n$ (columna por columna):
2. $l_{jj} = \sqrt{a_{jj} - \sum_{k < j} l_{jk}^2}$.
3. Para $i = j + 1, \dots, n$: $l_{ij} = (a_{ij} - \sum_{k < j} l_{ik}l_{jk})/l_{jj}$.
4. Para resolver $Ax = b$: resolver $Ly = b$ hacia adelante y $L'x = y$ hacia atrás (Clase 2).

Costo: unas $n^3/3$ multiplicaciones, **la mitad** que la LU, porque se aprovecha la simetría. No requiere pivoteo y es estable. **Cuándo falla:** si en el paso 2 el radicando es ≤ 0 , A **no** es definida positiva (por el teorema, si lo fuera la raíz existiría). Por eso Cholesky es la forma práctica de comprobar la definición positiva.

Ejemplo 5.1 (2×2). $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$: $l_{11} = \sqrt{4} = 2$, $l_{21} = 2/2 = 1$, $l_{22} = \sqrt{5 - 1^2} = 2$. Entonces $L = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ y $LL' = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 + 4 \end{pmatrix} = A \checkmark$.

Ejemplo 5.2 (3×3 y un sistema). Sea $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 5 & 3 \\ 2 & 3 & 6 \end{pmatrix}$. Columna 1: $l_{11} = 2$, $l_{21} = 2/2 = 1$, $l_{31} = 2/2 = 1$. Columna 2: $l_{22} = \sqrt{5 - 1^2} = 2$, $l_{32} = (3 - 1 \cdot 1)/2 = 1$. Columna 3: $l_{33} = \sqrt{6 - 1 - 1} = 2$. Así

$$L = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad LL' = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 1 + 4 & 1 + 2 \\ 2 & 1 + 2 & 1 + 1 + 4 \end{pmatrix} = A \checkmark$$

y $\det A = (2 \cdot 2 \cdot 2)^2 = 64$. Resolvamos $Ax = b$ con $b = (8, 10, 11)'$. Primero $Ly = b$: $y_1 = 8/2 = 4$; $y_2 = (10 - 4)/2 = 3$; $y_3 = (11 - 4 - 3)/2 = 2$. Luego $L'x = y$, con $L' = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$: $x_3 = 2/2 = 1$; $x_2 = (3 - 1)/2 = 1$; $x_1 = (4 - 1 - 1)/2 = 1$. La solución es $x = (1, 1, 1)'$, y se comprueba: $A(1, 1, 1)' = (8, 10, 11)' \checkmark$.

Una aplicación en estadística: si z tiene componentes independientes con media 0 y varianza 1, y $\Sigma = LL'$ es una matriz de covarianzas, el vector $x = Lz$ tiene covarianza $LI L' = \Sigma$. Así se simulan variables correlacionadas.¹

¹ André-Louis Cholesky (1875–1918), oficial del ejército francés, ideó el método para cálculos geodésicos; se publicó póstumamente, en 1924.

6. El cociente de Rayleigh

¿Cuánto puede valer $x'Ax$ entre vectores de la misma longitud? El **cociente de Rayleigh** mide la “energía por unidad de longitud al cuadrado”:

$$R(x) = \frac{x'Ax}{x'x}, \quad x \neq 0.$$

Teorema 6.1 (Los valores propios extremos son los extremos de R). Sea A simétrica con valores propios $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$ y vectores propios ortonormales $q_1, \dots, q_n$. Entonces para todo $x \neq 0$

$$\lambda_1 \leq R(x) \leq \lambda_n,$$

con $R(q_1) = \lambda_1$ y $R(q_n) = \lambda_n$. En consecuencia, $\lambda_n = \max_{\|x\|=1} x'Ax$ y $\lambda_1 = \min_{\|x\|=1} x'Ax$.

Demostración. Con $y = Q'x$ y el Teorema 3.1, $R(x) = \frac{\sum \lambda_i y_i^2}{\sum y_i^2} = \sum_i w_i \lambda_i$ con $w_i = y_i^2 / \|y\|^2 \geq 0$ y $\sum w_i = 1$. Es un **promedio ponderado** de los valores propios, y un promedio ponderado está entre el menor y el mayor: $\lambda_1 = \sum w_i \lambda_1 \leq \sum w_i \lambda_i \leq \sum w_i \lambda_n = \lambda_n$. Para $x = q_1$, $y = e_1$ y $R = \lambda_1$; para $x = q_n$, $R = \lambda_n$. $\square$

La derivada confirma que los puntos críticos de R son los vectores propios: para A simétrica, $\partial(x'Ax)/\partial x_k = 2(Ax)_k$ (cada x_k aparece en $\sum_{i,j} a_{ij}x_i x_j$ con coeficiente $2 \sum_j a_{kj}x_j$), de modo que

$$\nabla R(x) = \frac{2Ax \cdot x'x - x'Ax \cdot 2x}{(x'x)^2} = \frac{2}{x'x}(Ax - R(x)x),$$

que se anula si y solo si $Ax = R(x)x$.

Ejemplo 6.1 (2×2 y 3×3). 2×2 . Para $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ y el vector unitario $x = (\cos \theta, \sin \theta)'$: $R = 2 \cos^2 \theta + 2 \cos \theta \sin \theta + 2 \sin^2 \theta = 2 + \sin 2\theta$. Varía entre 1 (en $\theta = 135^\circ$, la dirección $(1, -1)$) y 3 (en $\theta = 45^\circ$, la dirección $(1, 1)$): son los valores propios (Figura 3, izquierda). A la derecha, la imagen del círculo unidad por A es una elipse de semiejes 3 y 1: el vector propio de $\lambda = 3$ se estira al máximo y el de $\lambda = 1$ no cambia de largo.

3×3 . Para $A = I + J$ (valores propios 1, 1, 4): $R(e_1) = 2$; para $x = (1, 1, 0)'$, $Ax = (3, 3, 2)'$ y $x'Ax = 6$, $x'x = 2$, así que $R = 3$; para $x = (1, 1, 1)'$, $Ax = (4, 4, 4)'$, $x'Ax = 12$ y $x'x = 3$, así que $R = 4$ (el máximo); y para $x = (1, -1, 0)'$, $Ax = (1, -1, 0)'$, $x'Ax = 2$ y $x'x = 2$, así que $R = 1$ (el mínimo). Todos los valores caen entre 1 y 4 $\checkmark$.




Figura 3: **Izquierda:** el cociente de Rayleigh de $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ sobre vectores unitarios, $R = 2 + \sin 2\theta$; el máximo y el mínimo son los valores propios, en las direcciones de los vectores propios. **Derecha:** el círculo unidad y su imagen Ax (una elipse de semiejes 3 y 1).

7. El Hessiano y los puntos críticos

La matriz de segundas derivadas (el **Hessiano**) de una función es simétrica y decide si un punto crítico es mínimo, máximo o silla. Primero el caso exacto, la función cuadrática.

Teorema 7.1 (Mínimo de una función cuadrática). Sea $f(x) = \frac{1}{2}x'Ax - b'x + c$ con A simétrica. Si A es definida positiva, f tiene un **único** mínimo, en $x^* = A^{-1}b$, y

$$f(x) = f(x^*) + \frac{1}{2}(x - x^*)'A(x - x^*) \geq f(x^*).$$

Si A tiene un valor propio negativo, f no está acotada inferiormente.

Demostración. Sea $x = x^* + h$ con $Ax^* = b$. Expandiendo,

$$\begin{aligned} f(x^* + h) &= \frac{1}{2}x^{*'}Ax^* + \frac{1}{2}(x^{*'}Ah + h'Ax^*) + \frac{1}{2}h'Ah - b'x^* - b'h + c \\ &= f(x^*) + h'(Ax^* - b) + \frac{1}{2}h'Ah, \end{aligned}$$

donde se usó $x^{*'}Ah = h'Ax^*$ (simetría). Como $Ax^* = b$, el término lineal desaparece y $f(x^* + h) = f(x^*) + \frac{1}{2}h'Ah > f(x^*)$ para $h \neq 0$. Si $Aq = \lambda q$ con $\lambda < 0$ y $\|q\| = 1$, entonces $f(x^* + tq) = f(x^*) + \frac{1}{2}\lambda t^2 \rightarrow -\infty$ cuando $t \rightarrow \infty$. $\square$

Para una función general f de clase C^2 , en un punto crítico x^* ($\nabla f(x^*) = 0$) el desarrollo de Taylor de segundo orden dice $f(x^* + h) = f(x^*) + \frac{1}{2}h'Hh + o(\|h\|^2)$, donde H es el Hessiano en x^* (esto se usa sin demostración, es cálculo). Con él se obtiene el criterio.

Proposición 7.1 (Clasificación de puntos críticos). *Sea x^* un punto crítico y H el Hessiano ahí, con valores propios $\lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_n$.*

1. Si H es definida positiva ($\lambda_1 > 0$), x^* es un **mínimo local estricto**.
2. Si H es definida negativa ($\lambda_n < 0$), x^* es un **máximo local estricto**.
3. Si H es indefinida ($\lambda_1 < 0 < \lambda_n$), x^* es un **punto silla**.

Demostración.

- (1) Por el Teorema 6.1, $h'Hh \geq \lambda_1 \|h\|^2$, así que $f(x^* + h) - f(x^*) \geq \frac{1}{2}\lambda_1 \|h\|^2 + o(\|h\|^2) > 0$ para $h \neq 0$ chico. (2) Es (1) aplicado a $-f$. (3) Con $Hq = \lambda q$ y $\|q\| = 1$, $f(x^* + tq) - f(x^*) = \frac{1}{2}\lambda t^2 + o(t^2)$, que es negativo para t chico si $\lambda < 0$ y positivo si $\lambda > 0$: baja en una dirección y sube en otra.

□

Si H es solo semidefinida, el criterio no decide (hay que mirar términos de orden superior). En econometría, la función de mínimos cuadrados $S(\beta) = \|y - X\beta\|^2$ tiene Hessiano $2X'X$, definido positivo si y solo si las columnas de X son independientes (Proposición 4.2): ese es el motivo por el que el mínimo es único (Clase 6).

Ejemplo 7.1 (Un mínimo cuadrático, y un mínimo con una silla).

Cuadrática. $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 3x - 3y = \frac{1}{2}x'Ax - b'x$ con $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ y $b = (3, 3)'$. A es definida positiva, y $x^* = A^{-1}b$ resuelve $2x + y = 3, x + 2y = 3$: $x^* = (1, 1)'$, con $f(1, 1) = 3 - 6 = -3$. Por el Teorema 7.1, $f(x) = -3 + \frac{1}{2}(x - x^*)'A(x - x^*) \geq -3$ ✓.

No cuadrática. $f(x, y) = x^3 - 3x + y^2$ tiene $\nabla f = (3x^2 - 3, 2y)$, que se anula en $(1, 0)$ y $(-1, 0)$. El Hessiano es $H = \begin{pmatrix} 6x & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. En $(1, 0)$: $H = \text{diag}(6, 2)$, definido positivo, **mínimo local** con $f = -2$. En $(-1, 0)$: $H = \text{diag}(-6, 2)$, indefinido, **silla** ($f = 2$): a lo largo de x la derivada segunda es $-6 < 0$ (la función baja al alejarse del punto) y a lo largo de y es $2 > 0$ (sube) (Figura 4, izquierda).




Figura 4: Curvas de nivel de dos funciones con sus puntos críticos.

Izquierda: $f = x^3 - 3x + y^2$ tiene un mínimo en $(1, 0)$ y una silla en $(-1, 0)$. **Derecha:** $g = x^3 + y^3 - 3xy$ (Ejercicio 8.5) tiene una silla en el origen y un mínimo local en $(1, 1)$.

8. Modos normales de vibración

Tres masas iguales (de masa 1) se mueven sobre una recta, unidas entre sí y a dos paredes por resortes iguales de constante 1. Sea x_i el desplazamiento de la masa i desde su posición de reposo, con $x_0 = x_{n+1} = 0$ (las paredes). La ley de Hooke dice que cada resorte tira con fuerza igual a su estiramiento; sobre la masa i actúan el resorte de la izquierda, que está estirado en $x_i - x_{i-1}$, y el de la derecha, estirado en $x_{i+1} - x_i$, así que la ley de Newton da

$$x_i'' = -(x_i - x_{i-1}) + (x_{i+1} - x_i) = x_{i-1} - 2x_i + x_{i+1},$$

es decir, $x'' = -Kx$, con $K = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ para $n = 3$ y

$K = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ para $n = 2$. Es simétrica. La **energía potencial**

almacenada en los resortes es $V = \frac{1}{2}[x_1^2 + (x_2 - x_1)^2 + (x_3 - x_2)^2 + x_3^2]$, una suma de cuadrados; al expandir,

$$x'Kx = 2x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 - 2x_1x_2 - 2x_2x_3 = x_1^2 + (x_2 - x_1)^2 + (x_3 - x_2)^2 + x_3^2,$$

así que $V = \frac{1}{2}x'Kx$. Esta suma es ≥ 0 , y es 0 solo si $x_1 = 0$, $x_2 = x_1$, $x_3 = x_2$, es decir, $x = 0$. Luego K es **definida positiva**, **sin calcular un solo valor propio**: la positividad es la afirmación física “estirar un resorte cuesta energía”.

Teorema 8.1 (Modos normales). Sea $K = Q\Lambda Q'$ simétrica y definida positiva, $\omega_i = \sqrt{\lambda_i}$. La solución de $x'' = -Kx$ con $x(0) = x_0$ y $x'(0) = v_0$ es

$$x(t) = \sum_{i=1}^n q_i (a_i \cos \omega_i t + b_i \sin \omega_i t), \quad a_i = q'_i x_0, \quad b_i = \frac{q'_i v_0}{\omega_i}.$$

Cada q_i es un **modo normal**: si el sistema parte de $x_0 = q_i$ (con $v_0 = 0$), todas las masas oscilan en fase con la misma frecuencia ω_i .

Borrador

En las coordenadas $y = Q'x$ el sistema se desacopla: la matriz K se vuelve diagonal y cada coordenada obedece su propia ecuación del oscilador. Resuelvo esas ecuaciones y deshago el cambio. La positividad de los λ_i hace que ω_i sea real, o sea, que la solución oscile y no crezca.

Demostración. Sea $y = Q'x$, con Q constante. Entonces $y'' = Q'x'' = -Q'Kx = -Q'KQy = -\Lambda y$, es decir, $y''_i = -\omega_i^2 y_i$ para cada i , con $y_i(0) = q'_i x_0 = a_i$ y $y'_i(0) = q'_i v_0$. La función $y_i = a_i \cos \omega_i t + (q'_i v_0 / \omega_i) \sin \omega_i t$ cumple la ecuación (derivando dos veces cada término se obtiene $-\omega_i^2$ por el término) y las

condiciones iniciales. Es la única: si z es la diferencia de dos soluciones, $z'' = -\omega^2 z$ con $z(0) = z'(0) = 0$, y $\frac{d}{dt}(z'^2 + \omega^2 z^2) = 2z'(z'' + \omega^2 z) = 0$, así que $z'^2 + \omega^2 z^2$ es constante e igual a 0 en $t = 0$; luego $z \equiv 0$. Finalmente $x = Qy = \sum_i y_i q_i$. $\square$

Si K tuviera un valor propio negativo, ω sería imaginario y aparecerían exponenciales crecientes (Clase 7): un sistema inestable. La definición positiva de K es lo que garantiza la oscilación.

Ejemplo 8.1 (Dos masas). $K = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ tiene valores propios 1 y 3 (traza 4, determinante 3) y vectores propios $q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)'$ (las masas se mueven **juntas**, con $\omega_1 = 1$) y $q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)'$ (se mueven en **sentidos opuestos**, con $\omega_2 = \sqrt{3}$; el resorte del medio se estira más, por eso la frecuencia es mayor). Si se tira de la masa 1 hasta $x_0 = (1, 0)'$ y se suelta ($v_0 = 0$): $a_1 = q_1' x_0 = 1/\sqrt{2}$ y $a_2 = 1/\sqrt{2}$, así que

$$x(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} q_1 \cos t + \frac{1}{\sqrt{2}} q_2 \cos \sqrt{3}t = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cos t + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \cos \sqrt{3}t,$$

o sea $x_1 = \frac{1}{2}(\cos t + \cos \sqrt{3}t)$ y $x_2 = \frac{1}{2}(\cos t - \cos \sqrt{3}t)$. Verificación: $x(0) = (1, 0)'$ y $x''(0) = -\frac{1}{2}(1, 1)' - \frac{3}{2}(1, -1)' = (-2, 1)' = -Kx(0)$. La energía pasa de una masa a la otra (Figura 5, izquierda).

Ejemplo 8.2 (Tres masas). Los valores propios de K (Ejemplo 4.1) son $2 - \sqrt{2}$, 2 y $2 + \sqrt{2}$, y los vectores propios son

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -\sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Verificación de v_2 : $Kv_2 = (2 \cdot 1 - 0, -1 + 0 + 1, 0 - 2)' = (2, 0, -2)' = 2v_2$. De v_1 : $Kv_1 = (2 - \sqrt{2}, -1 + 2\sqrt{2} - 1, -\sqrt{2} + 2)' = (2 - \sqrt{2}, 2\sqrt{2} - 2, 2 - \sqrt{2})' = (2 - \sqrt{2})(1, \sqrt{2}, 1)'$ (porque $(2 - \sqrt{2})\sqrt{2} = 2\sqrt{2} - 2$). Las frecuencias son $\omega_1 = \sqrt{2 - \sqrt{2}} \approx 0,765$, $\omega_2 = \sqrt{2} \approx 1,414$ y $\omega_3 = \sqrt{2 + \sqrt{2}} \approx 1,848$. En el modo 1 las tres masas van juntas, con la del medio más lejos; en el

modo 2 la del medio queda quieta y las de los extremos van en sentidos opuestos; en el modo 3 la del medio va contra las otras dos (Figura 5).

Si solo se desplaza la masa 1 ($x_0 = (1, 0, 0)'$, $v_0 = 0$), los coeficientes son $a_i = q_i' x_0$ con $q_1 = v_1/2$, $q_2 = v_2/\sqrt{2}$, $q_3 = v_3/2$: $a_1 = \frac{1}{2}$, $a_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $a_3 = \frac{1}{2}$, y

$$x(t) = \frac{1}{4}v_1 \cos \omega_1 t + \frac{1}{2}v_2 \cos \omega_2 t + \frac{1}{4}v_3 \cos \omega_3 t.$$

En $t = 0$: $\frac{1}{4}(1, \sqrt{2}, 1) + \frac{1}{2}(1, 0, -1) + \frac{1}{4}(1, -\sqrt{2}, 1) = (1, 0, 0) \checkmark$.




Figura 5: **Izquierda:** dos masas con $x(0) = (1, 0)$: la energía se intercambia entre ellas. **Tres modos de tres masas:** el patrón de desplazamientos de cada modo normal (las paredes en los extremos) y su frecuencia ω .

9. El tensor de inercia

Un cuerpo rígido formado por masas puntuales m_i en las posiciones $r_i \in \mathbb{R}^3$ gira alrededor del origen con velocidad angular $\omega \in \mathbb{R}^3$ (el vector ω apunta a lo largo del eje de giro y su largo es la velocidad de giro). Cada masa tiene velocidad $v_i = \omega \times r_i$ (producto cruz).

Proposición 9.1 (Energía y momento angular). Sea $I = \sum_i m_i (\|r_i\|^2 \text{Id} - r_i r_i')$ (el **tensor de inercia**, simétrico 3×3 , donde Id es la identidad). Entonces la energía cinética es $T = \frac{1}{2} \omega' I \omega$ y el momento angular, $L = \sum m_i r_i \times v_i = I \omega$. Además I es semidefinida positiva, y definida positiva si y solo si las masas no están todas sobre una misma recta por el origen.

Demostración. Por la identidad de Lagrange, $\|\omega \times r\|^2 = \|\omega\|^2 \|r\|^2 - (\omega \cdot r)^2 = \omega'(\|r\|^2 \text{Id} - rr'). Entonces $T = \frac{1}{2} \sum m_i \|v_i\|^2 = \frac{1}{2} \omega' I \omega$. Para el momento angular, $r \times (\omega \times r) = \omega \|r\|^2 - r(r \cdot \omega)$ (identidad del triple producto vectorial), y sumando, $L = \sum m_i (\|r_i\|^2 \omega - r_i(r_i \cdot \omega)) = I \omega$. Como $x' I x = \sum m_i \|x \times r_i\|^2 \geq 0$ (misma identidad), I es semidefinida positiva; vale 0 para $x \neq 0$ si y solo si $x \times r_i = 0$ para todo i , es decir, si todos los r_i son paralelos a x . $\square$$

Los **momentos de inercia** son los valores propios de I y los **ejes principales** son sus vectores propios. Si el cuerpo gira alrededor de un eje principal ($\omega = \omega_0 q$, $Iq = \lambda q$), entonces $L = \lambda \omega$ es paralelo a ω y el giro es estable; alrededor de cualquier otro eje, L **no** es paralelo a ω , y el eje de giro se bambolea. Por el Teorema 6.1, la inercia alrededor de un eje unitario u es $u' I u = R(u)$, con extremos λ_1 y λ_3 .

Ejemplo 9.1 (Una mancuerna). Dos masas de 1 en $r = (1, 1, 0)'$ y $-r$, con $\|r\|^2 = 2$ y $rr' = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ (igual para $-r$). Entonces

$$I = 2(2 \text{Id} - rr') = 2 \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Su polinomio característico es $\det(I - \lambda \text{Id}) = [(2 - \lambda)^2 - 4](4 - \lambda) = \lambda(\lambda - 4)(4 - \lambda) = -\lambda(\lambda - 4)^2$, con raíces 0, 4 y 4. El valor propio 0 tiene vector propio $(1, 1, 0)'$: **la inercia alrededor del eje de la mancuerna es cero** (masas puntuales sobre el eje no se resisten a girar), y por eso I es semidefinida y **no** definida positiva (Proposición 9.1: las masas están sobre una recta por el origen). Los otros dos momentos valen 4 (ejes $(1, -1, 0)'$ y $(0, 0, 1)'$, perpendiculares a la mancuerna). Si $\omega = (1, 0, 0)'$: $L = I \omega = (2, -2, 0)'$, que no es paralelo a ω (el eje e_1 no es principal), y $T = \frac{1}{2} \omega' I \omega = \frac{1}{2} \cdot 2 = 1$, entre los extremos 0 y 4 de R $\checkmark$.

10. ★ Para ir más allá: el teorema de Courant–Fischer

! ★ Para ir más allá

El Teorema 6.1 caracteriza el **mayor** y el **menor** valor propio como extremos de $R(x)$. ¿Y los intermedios? Se obtienen con un problema de “mínimo de máximos” sobre subespacios. Con eso se demuestra, entre otras cosas, que los valores propios cambian de forma monótona cuando se suma una matriz semidefinida positiva.

Teorema 10.1 (Courant–Fischer). Sea A simétrica $n \times n$ con valores propios $\lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_n$. Para $k = 1, \dots, n$,

$$\lambda_k = \min_{\dim S=k} \max_{x \in S, x \neq 0} R(x) = \max_{\dim S=n-k+1} \min_{x \in S, x \neq 0} R(x),$$

donde S recorre los subespacios de $\mathbb{R}^n$ de la dimensión indicada.

i Borrador

Para “ $\leq$ ”: el subespacio generado por los primeros k vectores propios tiene máximo de R igual a λ_k . Para “ $\geq$ ”: cualquier subespacio de dimensión k corta al generado por los vectores propios $q_k, \dots, q_n$ (hay más incógnitas que ecuaciones), y ahí $R \geq \lambda_k$.

Demostración. Primera igualdad, “ $\leq$ ”. Sea $S_0 = \text{gen}(q_1, \dots, q_k)$. Para $x = \sum_{i \leq k} y_i q_i \in S_0$, $R(x) = \sum_{i \leq k} \lambda_i y_i^2 / \sum_{i \leq k} y_i^2 \leq \lambda_k$ (promedio ponderado de $\lambda_1, \dots, \lambda_k$), con igualdad en $x = q_k$. Entonces $\max_{S_0} R = \lambda_k$, y el mínimo sobre todos los S es $\leq \lambda_k$.

Primera igualdad, “ $\geq$ ”. Sea S cualquier subespacio de dimensión k , con base $s_1, \dots, s_k$. Buscamos $x = \sum c_i s_i \neq 0$ que cumpla $q'_j x = 0$ para $j = 1, \dots, k-1$. Son $k-1$ ecuaciones homogéneas en las k incógnitas $c_1, \dots, c_k$, que tienen una solución no nula (hay más incógnitas que ecuaciones, Clase 1), y $x \neq 0$ porque los s_i son independientes. Como $x \in S$ es perpendicular a $q_1, \dots, q_{k-1}$,

$x = \sum_{i \geq k} y_i q_i$ y $R(x) = \sum_{i \geq k} \lambda_i y_i^2 / \sum_{i \geq k} y_i^2 \geq \lambda_k$. Por lo tanto $\max_S R \geq R(x) \geq \lambda_k$, para todo S ; el mínimo sobre S es $\geq \lambda_k$.

Segunda igualdad. Los valores propios de $-A$ son $-\lambda_n \leq \dots \leq -\lambda_1$, es decir, $\lambda_j(-A) = -\lambda_{n-j+1}(A)$, y $R_{-A} = -R_A$. Aplicando la primera igualdad a $-A$ con $j = n - k + 1$: $-\lambda_k(A) = \lambda_{n-k+1}(-A) = \min_{\dim S = n-k+1} \max_S (-R_A) = -\max_{\dim S = n-k+1} \min_S R_A$, y se cambia el signo. $\square$

Corolario 10.1 (Monotonía de los valores propios). *Si A es simétrica y B es simétrica semidefinida positiva, entonces $\lambda_k(A + B) \geq \lambda_k(A)$ para todo k .*

Demostración. Para todo $x \neq 0$, $R_{A+B}(x) = R_A(x) + x'Bx/x'x \geq R_A(x)$. Por lo tanto $\max_S R_{A+B} \geq \max_S R_A$ para cada subespacio S , y al tomar el mínimo sobre los S de dimensión k se conserva la desigualdad; por el Teorema 10.1, $\lambda_k(A + B) \geq \lambda_k(A)$. $\square$

El Ejercicio 8.7 usa el teorema para probar que los valores propios de una submatriz principal quedan **entrelazados** con los de la matriz completa.

En más dimensiones

Todo lo de esta clase vale para $n \times n$ con las mismas demostraciones: el teorema espectral, los cuatro criterios de definición positiva, Cholesky, el cociente de Rayleigh, el Hessiano y Courant–Fischer. Lo que cambia con n grande es el cálculo: para comprobar que una matriz es definida positiva, se intenta Cholesky ($\sim n^3/3$ operaciones) y no se calculan los valores propios; estos se obtienen con métodos iterativos (Clase 10) y, cuando la matriz es enorme y dispersa, con métodos de Krylov (curso de Álgebra lineal). Si las masas del sistema vibratorio son distintas, $x'' = -M^{-1}Kx$ con M diagonal definida positiva: el problema $Kx = \lambda Mx$ se reduce al caso simétrico escribiendo $M = LL'$ (Cholesky) y trabajando con $L^{-1}KL^{-'}$; el caso con M singular se trata en la Clase 15. En dimensión infinita, el teorema espectral para operadores autoadjuntos da las series de Fourier y los modos de una cuerda vibrante: el curso de Álgebra lineal lo desarrolla.

11. Resumen

- **Teorema espectral:** una matriz real simétrica tiene valores propios **reales** y una base **ortonormal** de vectores propios: $A = Q\Lambda Q' = \sum \lambda_i q_i q_i'$ (Teorema 2.1, Corolario 2.1). Es simétrica si y solo si se diagonaliza con una base ortonormal.
- **Ejes principales:** con $y = Q'x$, $x'Ax = \sum \lambda_i y_i^2$ (Teorema 3.1). El conjunto $x'Ax = 1$ es una elipse o un elipsoide de semiejes $1/\sqrt{\lambda_i}$ si todos los $\lambda_i > 0$; hipérbola si hay signos mixtos; rectas o cilindro si hay un $\lambda_i = 0$.
- **Definida positiva** (Teorema 4.1): equivale a todos los $\lambda_i > 0$, a $A = R'R$ con R invertible, a todos los pivotes > 0 y a todos los menores principales > 0 . $A'A$ es definida positiva si y solo si las columnas de A son independientes (Proposición 4.2).
- **Cholesky:** $A = LL'$, única con diagonal positiva (Teorema 5.1); cuesta $n^3/3$, sin pivoteo, y falla exactamente cuando A no es definida positiva.
- **Rayleigh:** $\lambda_1 \leq R(x) \leq \lambda_n$ y los extremos se alcanzan en los vectores propios (Teorema 6.1).
- **Hessiano:** en un punto crítico, H definido positivo $\Rightarrow$ mínimo, definido negativo $\Rightarrow$ máximo, indefinido $\Rightarrow$ silla (Proposición 7.1); para la cuadrática $\frac{1}{2}x'Ax - b'x$ con A definida positiva el mínimo es $A^{-1}b$ (Teorema 7.1).
- **Modos normales:** $x'' = -Kx$ con $K = Q\Lambda Q'$ definida positiva se desacopla en osciladores de frecuencias $\omega_i = \sqrt{\lambda_i}$ (Teorema 8.1). Tensor de inercia: simétrico y semidefinido positivo; los ejes principales son sus vectores propios (Proposición 9.1).
- ★ Courant–Fischer: $\lambda_k = \min_{\dim S=k} \max_S R$ (Teorema 10.1); implica la monotonía de los valores propios (Corolario 10.1).

12. Ejercicios

Ejercicio 8.1. Sea $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$. (a) Calcula los valores propios y un par de vectores propios unitarios perpendiculares. (b) Escribe

$A = 6P_1 + 1 \cdot P_2$ con las dos proyecciones. (c) Usa (b) para calcular A^5 . (d) Describe la curva $5x^2 + 4xy + 2y^2 = 1$ y calcula $R(1, 0)$.

💡 Solución 8.1

(a) $\tau = 7, \Delta = 10 - 4 = 6, p(\lambda) = \lambda^2 - 7\lambda + 6 = (\lambda - 6)(\lambda - 1)$. Para $\lambda = 6$: $A - 6I = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix}, x_1 = 2x_2,$
 $v_1 = (2, 1)'$. Para $\lambda = 1$: $A - I = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, 2x_1 + x_2 = 0, v_2 = (1, -2)'$. Son perpendiculares ($2 - 2 = 0$).
 Unitarios: $q_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}(2, 1)', q_2 = \frac{1}{\sqrt{5}}(1, -2)'$.

(b) $P_1 = q_1 q_1' = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, P_2 = q_2 q_2' = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$.
 Entonces $6P_1 + P_2 = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 24 + 1 & 12 - 2 \\ 12 - 2 & 6 + 4 \end{pmatrix} =$
 $\frac{1}{5} \begin{pmatrix} 25 & 10 \\ 10 & 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \checkmark$.

(c) $A^5 = 6^5 P_1 + 1^5 P_2$ con $6^5 = 7776$:
 $A^5 = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 \cdot 7776 + 1 & 2 \cdot 7776 - 2 \\ 2 \cdot 7776 - 2 & 7776 + 4 \end{pmatrix} =$
 $\frac{1}{5} \begin{pmatrix} 31105 & 15550 \\ 15550 & 7780 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6221 & 3110 \\ 3110 & 1556 \end{pmatrix}.$

(d) En los ejes de q_1, q_2 la curva es $6y_1^2 + y_2^2 = 1$: una **elipse** con semieje $1/\sqrt{6} \approx 0,408$ a lo largo de $(2, 1)$ y semieje 1 a lo largo de $(1, -2)$. $R(1, 0) = \frac{x'Ax}{x'x} = \frac{5}{1} = 5$, entre 1 y 6 $\checkmark$.

Ejercicio 8.2. Sea $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$. (a) Encuentra una base ortormal de vectores propios y escribe $A = 2P_2 + 4P_4$ con P_2 la proyección sobre el espacio propio de $\lambda = 2$ y P_4 sobre el de $\lambda = 4$. (b) Calcula la raíz cuadrada $\sqrt{A} = \sqrt{2}P_2 + 2P_4$ y verifica que $(\sqrt{A})^2 = A$. (c) Calcula $R(x)$ para $x = (1, 1, 0)'$ y compara con los valores propios.

💡 Solución 8.2

(a) A es diagonal por bloques: $\lambda = 2$ del primer bloque, y $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ tiene $\lambda^2 - 6\lambda + 8 = (\lambda - 2)(\lambda - 4)$. Valo-

res propios 2, 2, 4. Para $\lambda = 2$: $A - 2I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

da $x_2 + x_3 = 0$, un plano con base ortonormal $q_1 = (1, 0, 0)'$ y $q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, -1)'$. Para $\lambda = 4$: $A - 4I =$

$\begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ da $x_1 = 0, x_2 = x_3$: $q_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, 1)'$.

Las proyecciones son

$$P_2 = q_1 q_1' + q_2 q_2' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix},$$

$$P_4 = q_3 q_3' = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix},$$

$$\text{y } 2P_2 + 4P_4 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1+2 & -1+2 \\ 0 & -1+2 & 1+2 \end{pmatrix} = A \checkmark.$$

$$(b) \sqrt{A} = \sqrt{2}P_2 + 2P_4 = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} + 1 & 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} + 1 \end{pmatrix}. \text{ Con}$$

$a = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$ y $b = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$, el cuadrado del bloque es

$\begin{pmatrix} a^2 + b^2 & 2ab \\ 2ab & a^2 + b^2 \end{pmatrix}$, con $a^2 + b^2 = 2(1 + \frac{1}{2}) = 3$ y

$2ab = 2(1 - \frac{1}{2}) = 1$, y $(\sqrt{2})^2 = 2$: se recupera $A \checkmark$.

(c) $Ax = (2, 3, 1)'$, $x'Ax = 2 + 3 = 5$, $x'x = 2$, $R = \frac{5}{2} = 2,5$, entre 2 y 4 $\checkmark$.

Ejercicio 8.3. Decide si cada matriz es definida positiva, semidefi-

nida (no definida), o indefinida, y justifica con el criterio que prefieras: (a) $\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$; (b) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$; (c) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$; (d) $\begin{pmatrix} 1 & a \\ a & 4 \end{pmatrix}$, según a .

💡 Solución 8.3

(a) Menores: 2 y $\det = 10 - 16 = -6 < 0$. No es definida positiva y, como $\det < 0$, los dos valores propios tienen signos opuestos: **indefinida**. Vectores que lo muestran: $x = (1, 0)'$ da $x'Ax = 2 > 0$ y $x = (2, -1)'$ da $2 \cdot 4 + 8 \cdot (2)(-1) + 5 = 8 - 16 + 5 = -3 < 0$.

(b) Eliminación: restar la fila 1 de las filas 2 y 3 da $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$; restar la fila 2 de la 3 da el tercer pivote $2 - 1 = 1$. Pivotes 1, 1, 1 > 0 (menores 1, $2 - 1 = 1$ y $\det = 1$): **definida positiva**. De hecho $A = LL'$ con $L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$: LL' tiene entrada (i, j) igual a $\min(i, j)$, que es A ✓.

(c) Menores 1 y $\det = 4 - 4 = 0$; valores propios 0 y 5 ($\tau = 5, \Delta = 0$). **Semidefinida positiva, no definida**: $x'Ax = x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_2^2 = (x_1 + 2x_2)^2 \geq 0$, que se anula en $x = (2, -1)' \neq 0$.

(d) Menores 1 y $4 - a^2$. Es definida positiva si y solo si $4 - a^2 > 0$, es decir $-2 < a < 2$. Para $a = \pm 2$ el determinante es 0 (valores propios 0 y 5): semidefinida. Para $|a| > 2$, $\det < 0$: indefinida.

Ejercicio 8.4. Calcula la factorización de Cholesky de $A =$

$\begin{pmatrix} 9 & 3 & 6 \\ 3 & 5 & 4 \\ 6 & 4 & 6 \end{pmatrix}$, el determinante de A , y resuelve $Ax = b$ con $b = (18, 6, 14)'$.

 Solución 8.4

Columna 1: $l_{11} = \sqrt{9} = 3$, $l_{21} = 3/3 = 1$, $l_{31} = 6/3 = 2$.

Columna 2: $l_{22} = \sqrt{5 - 1^2} = 2$, $l_{32} = (4 - 2 \cdot 1)/2 = 1$.

Columna 3: $l_{33} = \sqrt{6 - 2^2 - 1^2} = 1$. Así

$$L = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad LL' = \begin{pmatrix} 9 & 3 & 6 \\ 3 & 1+4 & 2+2 \\ 6 & 2+2 & 4+1+1 \end{pmatrix} = A \quad \square$$

$\det A = (3 \cdot 2 \cdot 1)^2 = 36$. Resolvemos $Ly = b$: $y_1 = 18/3 = 6$;
 $y_2 = (6 - 1 \cdot 6)/2 = 0$; $y_3 = (14 - 2 \cdot 6 - 1 \cdot 0)/1 = 2$. Luego

$L'x = y$ con $L' = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$: $x_3 = 2$; $x_2 = (0 - 1 \cdot 2)/2 = -1$;
 $x_1 = (6 - 1 \cdot (-1) - 2 \cdot 2)/3 = 3/3 = 1$. La solución es $x = (1, -1, 2)'$. Comprobación: $A(1, -1, 2)' = (9 - 3 + 12, 3 - 5 + 8, 6 - 4 + 12)' = (18, 6, 14)'$ ✓.

Ejercicio 8.5. Sea $g(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$. Encuentra sus puntos críticos y clasifícalos con el Hessiano. ¿Es el mínimo local un mínimo global?

 Solución 8.5

$\nabla g = (3x^2 - 3y, 3y^2 - 3x)$. De $y = x^2$ y $x = y^2$ sale $x = x^4$, es decir $x(x^3 - 1) = 0$: $x = 0$ o $x = 1$. Los puntos críticos son $(0, 0)$ y $(1, 1)$. El Hessiano es $H = \begin{pmatrix} 6x & -3 \\ -3 & 6y \end{pmatrix}$.

En $(0, 0)$: $H = \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}$, con $\det = -9 < 0$ (valores propios ± 3): **indefinido, silla**. Se comprueba: $g(t, t) = 2t^3 - 3t^2 < 0$ para $0 < t < \frac{3}{2}$, y $g(t, -t) = 3t^2 > 0$.

En $(1, 1)$: $H = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ -3 & 6 \end{pmatrix}$, con menores 6 y $36 - 9 = 27$, ambos positivos (valores propios 3 y 9): **definido positivo, mínimo local estricto**, con $g(1, 1) = 1 + 1 - 3 = -1$.

No es mínimo global: $g(-t, -t) = -2t^3 - 3t^2 \rightarrow -\infty$ cuando $t \rightarrow \infty$.

Ejercicio 8.6. En el sistema de tres masas, tira de la masa 1 hasta

$x_0 = (1, 0, 0)'$ y suéltala. (a) Calcula los coeficientes $a_i = q_i'x_0$. (b) Escribe $x(t)$. (c) Verifica la ecuación de movimiento en $t = 0$: $x''(0) = -Kx(0)$.

💡 Solución 8.6

(a) Los vectores propios unitarios son $q_1 = \frac{1}{2}(1, \sqrt{2}, 1)'$, $q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, -1)'$, $q_3 = \frac{1}{2}(1, -\sqrt{2}, 1)'$. Con $x_0 = e_1$: $a_1 = \frac{1}{2}$, $a_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $a_3 = \frac{1}{2}$. Como $v_0 = 0$, todos los $b_i = 0$.

(b) $x(t) = \frac{1}{4}(1, \sqrt{2}, 1)' \cos \omega_1 t + \frac{1}{2}(1, 0, -1)' \cos \sqrt{2} t + \frac{1}{4}(1, -\sqrt{2}, 1)' \cos \omega_3 t$, con $\omega_1 = \sqrt{2 - \sqrt{2}}$ y $\omega_3 = \sqrt{2 + \sqrt{2}}$ (se obtiene de $a_i q_i$ con los vectores sin normalizar).

(c) Derivando dos veces, $x''(0) = -\frac{1}{4}\lambda_1(1, \sqrt{2}, 1)' - \frac{1}{2} \cdot 2(1, 0, -1)' - \frac{1}{4}\lambda_3(1, -\sqrt{2}, 1)'$ con $\lambda_1 = 2 - \sqrt{2}$ y $\lambda_3 = 2 + \sqrt{2}$. Primera componente: $-\frac{1}{4}(\lambda_1 + \lambda_3) - 1 = -\frac{1}{4} \cdot 4 - 1 = -2$. Segunda: $\frac{\sqrt{2}}{4}(\lambda_3 - \lambda_1) = \frac{\sqrt{2}}{4} \cdot 2\sqrt{2} = 1$. Tercera: $-\frac{1}{4}(\lambda_1 + \lambda_3) + 1 = 0$. Entonces $x''(0) = (-2, 1, 0)'$, y $-Kx(0) = -(2, -1, 0)' = (-2, 1, 0)'$ ✓.

Ejercicio 8.7 ★. (a) Sea A simétrica $n \times n$, con valores propios $\lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_n$, y sea B la matriz $(n-1) \times (n-1)$ que resulta de borrar la última fila y la última columna de A , con valores propios $\mu_1 \leq \dots \leq \mu_{n-1}$. Demuestra el **entrelazado** $\lambda_k \leq \mu_k \leq \lambda_{k+1}$ para

$k = 1, \dots, n-1$. (b) Compruébalo con $A = K = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$.

(c) Con $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ y $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ (semidefinida positiva), verifica el Corolario 10.1.

💡 Solución 8.7 ★

- (a) Para un vector $z \in \mathbb{R}^{n-1}$ sea $\tilde{z} = (z, 0)' \in \mathbb{R}^n$. Entonces $\tilde{z}' A \tilde{z} = z' B z$ y $\tilde{z}' \tilde{z} = z' z$: $R_A(\tilde{z}) = R_B(z)$.

Cota inferior, $\lambda_k \leq \mu_k$. Sea S' un subespacio de $\mathbb{R}^{n-1}$ de dimensión k donde $\max_{S'} R_B = \mu_k$ (el generado por los primeros k vectores propios de B , como en el teorema). Su inmersión $\tilde{S} = \{\tilde{z}\}$ es un subespacio de $\mathbb{R}^n$ de dimensión k con $\max_{\tilde{S}} R_A = \max_{S'} R_B = \mu_k$. Por el Teorema 10.1 (primera forma), $\lambda_k \leq \max_{\tilde{S}} R_A = \mu_k$.

Cota superior, $\mu_k \leq \lambda_{k+1}$. Por el Teorema 10.1 (segunda forma) para A con índice $k+1$: $\lambda_{k+1} = \max_{\dim S=n-k} \min_S R_A$. Sea T' el subespacio de $\mathbb{R}^{n-1}$ generado por los vectores propios de B asociados a $\mu_k, \dots, \mu_{n-1}$ (dimensión $n-k$), donde $\min_{T'} R_B = \mu_k$. Su inmersión $\tilde{T}$ tiene dimensión $n-k$ y $\min_{\tilde{T}} R_A = \mu_k$. Luego $\lambda_{k+1} \geq \mu_k$.

- (b) K tiene valores propios $2 - \sqrt{2} \approx 0,586$, 2 , $2 + \sqrt{2} \approx 3,414$. $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ tiene valores propios 1 y 3. Se cumple $0,586 \leq 1 \leq 2 \leq 3 \leq 3,414 \checkmark$.

- (c) $A + P = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ tiene $\tau = 5$ y $\Delta = 5$: valores propios $\frac{5 \pm \sqrt{5}}{2} \approx 1,382$ y $3,618$. Los de A son 1 y 3: $1,382 \geq 1$ y $3,618 \geq 3 \checkmark$.