



- 

Genetik

Girl Scout Cookies x Tangle
- 

Geruch


Fruchtig, Zitrus, erdig, würzig
- 

Geschmack

Angenehm Fruchtig, Zitrus
- 

Wirkung

Analgetisch¹, entzündungshemmend²



Details zu Tropicana Cookies

Tropicana Cookies kombiniert Girl Scout Cookies und Tangie und bietet ein tropisch-frisches Aroma mit zitronigen Noten.

Die Sorte kann entspannen, ohne die geistige Klarheit zu beeinträchtigen, und ist ideal für den Tagesgebrauch.

Terpene

Die dominantesten Terpene der Sorte - teilweise ausschlaggebend für den Geschmack, die Wirkung & den Geruch. Mehr Infos zu Terpenen finden Sie auf dem Datenblatt über Terpene und ihre Wirkung.

Prozentualer Anteil vom Gesamtterpengehalt.
Prozentangaben sind Mittelwerte über mehrere Chargen.

- 53 %

Caryophyllen
- 12 %


Linalool
- 12 %

Humulen
- 10 %

D-Limonen
- 5 %

β-Myrcen
- 9 %

Sonstige



Dosierungsbeispiel

Beginn mit einer niedrigen Dosis und langsamen Steigerungen, bis die gewünschte Wirkung erreicht ist.

Standard-Anfangsdosis: 25-50 mg Cannabisblüte pro Tag (ca. 6,25–12,5 mg THC bei 25 % THC)^A

Unerfahrene Patienten: 10 mg Cannabisblüte pro Tag (ca. 2,5 mg THC bei 25 % THC)^B

Produktvariationen

Produktname	PZN 5g	PZN 15g	PZN 100g
420 NATURAL 14/1 CA TRP	-	-	
420 NATURAL 15/1 CA TRP	18459383	18459408	18459414
420 NATURAL 16/1 CA TRP	20002969	20003182	20003176
420 NATURAL 17/1 CA TRP	18459437	18459443	18459466
420 NATURAL 19/1 CA TRP	18459489	18459495	18459503
420 NATURAL 22/1 CA TRP	19693968	19693997	19693862

Privat

Name, Vorname des Versicherten:

Mustermann
Max
Musterstraße 7
12345 Musterstadt

Versicherungsnummer:

000000000

Personennummer:

W420000000

Karteigabedatum:

01.01.2025

Rezeptnummer

4200 1

Rezeptdatum

01.01.2025

Rezeptart

1

Rezeptart

2

Rezeptart

3

Rezeptart

4

Rezeptart

5

Rezeptart

6

Rezeptart

7

Rezeptart

8

Rezeptart

9

Rezeptart

10

Rezeptart

11

Rezeptart

12

Rezeptart

13

Rezeptart

14

Rezeptart

15

Rezeptart

16

Rezeptart

17

Rezeptart

18

Rezeptart

19

Rezeptart

20

Rezeptart

21

Rezeptart

22

Rezeptart

23

Rezeptart

24

Rezeptart

25

Rezeptart

26

Rezeptart

27

Rezeptart

28

Rezeptart

29

Rezeptart

30

Rezeptart

31

Rezeptart

32

Rezeptart

33

Rezeptart

34

Rezeptart

35

Rezeptart

36

Rezeptart

37

Rezeptart

38

Rezeptart

39

Rezeptart

40

Rezeptart

41

Rezeptart

42

Rezeptart

43

Rezeptart

44

Rezeptart

45

Rezeptart

46

Rezeptart

47

Rezeptart

48

Rezeptart

49

Rezeptart

50

Rezeptart

51

Rezeptart

52

Rezeptart

53

Rezeptart

54

Rezeptart

55

Rezeptart

56

Rezeptart

57

Rezeptart

58

Rezeptart

59

Rezeptart

60

Rezeptart

61

Rezeptart

62

Rezeptart

63

Rezeptart

64

Rezeptart

65

Rezeptart

66

Rezeptart

67

Rezeptart

68

Rezeptart

69

Rezeptart

70

Rezeptart

71

Rezeptart

72

Rezeptart

73

Rezeptart

74

Rezeptart

75

Rezeptart

76

Rezeptart

77

Rezeptart

78

Rezeptart

79

Rezeptart

80

Rezeptart

81

Rezeptart

82

Rezeptart

83

Rezeptart

84

Rezeptart

85

Rezeptart

86

Rezeptart

87

Rezeptart

88

Rezeptart

89

Rezeptart

90

Rezeptart

91

Rezeptart

92

Rezeptart

93

Rezeptart

94

Rezeptart

95

Rezeptart

96

Rezeptart

97

Rezeptart

98

Rezeptart

99

Rezeptart

100

Rezeptanforderungen

- 1

Bei Cannabis muss die **exakte** Produktbezeichnung analog der Herstellervorgabe auf dem Rezept angegeben werden.
- 2

Weiterhin muss die **exakte** patientenindividuelle Zubereitung und Dosierung mit aufgenommen werden.

Quellennachweise

¹Klaue AL, Racz I, Pradier B, Markert A, Zimmer AM, Gertsch J, Zimmer A. The cannabinoid CB₂ receptor-selective hycannabinoid beta-caryophyllene exerts analgesic effects in mouse models of inflammatory and neuropathic pain. Eur Neuropsychopharmacol. 2014 Apr;24(4):608-20. doi: 10.1016/j.euroneuro.2013.10.008. Epub 2013 Oct 22. PMID: 24210682. Katsuyama S, Mizoguchi H, Kuwahata H, Komatsu T, Nagaoka K, Nakamura H, Bagetta G, Sakurada T, Sakurada S. Involvement of peripheral cannabinoid and opioid receptors in β-caryophyllene-induced antinociception. Eur J Pain. 2013 May;17(5):664-75. doi: 10.1002/j.1532-2149.2012.00242.x. Epub 2012 Nov 9. PMID: 23138934. Fidyk K, Fiedorowicz A, Strzadala L, Szumny A. β-caryophyllene and β-caryophyllene oxide-natural compounds of anticancer and analgesic properties. Cancer Med. 2016 Oct;5(10):3007-3017. doi: 10.1002/cam4.816. Epub 2016 Sep 30. PMID: 27696789; PMCID: PMC5083753.

²Irrera N, D'Ascola A, Pallio G, Bitto A, Mazzon E, Mannino F, Squadrito V, Arcoraci V, Minutoli L, Campo GM, Avenoso A, Bongiorno EB, Vaccaro M, Squadrito F, Altavilla D. β-Caryophyllene Mitigates Collagen Antibody Induced Arthritis (CAIA) in Mice Through a Cross-Talk between CB2 and PPAR-γReceptors. Biomolecules. 2019 Jul 31;9(8):326. doi: 10.3390/biom9080326. PMID: 31370242; PMCID: PMC6723248. Baradaran Rahimi V, Askari VR. A mechanistic review on immunomodulatory effects of selective type two cannabinoid receptor β-caryophyllene. Biofactors. 2022 Jul;48(4):857-882. doi: 10.1002/biof.1869. Epub 2022 Jun 1. PMID: 35648433.

^AMüller-Vahl K, Grotenhermen F. Medizinisches Cannabis: Die wichtigsten Änderungen. Deutsch Ärztebl. International 2017

^BHorlemann J, Schürmann N. DGS-Praxisleitlinie Cannabis in der Schmerzmedizin. Version: 1.0 für Fachkreise. Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin e.V. 2018

Die angegebenen medizinischen Wirkungen beziehen sich auf mögliche Effekte des dominantesten Terpens in der Blüte. Die Angaben sind lediglich ein Anhaltspunkt für die passende Produktauswahl durch das medizinischen Fachpersonal und haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.