

Befundbericht

Auftragsnummer	00723024	Auftragsdatum	02.07.2026 00:00
Priorität	R	Abnahmedatum	02.07.2026 00:00
Einsender	RIDD (Dr.med. Jörn Ridder)	Laboreingang	02.07.2026 12:49
Patientenname	Dums, Benjamin		
Geburtsdatum	20.03.1986 (40 J.)	Geschlecht	m
Fallnummer	194843967	Aufnahmedatum	

Verfahren		
[Werte bereich][Einheit][Material]		
Hepatitis-Serologie		
HBs-Antikörper (quantitativ)	< 3	
[<10] [IU/l] [Serum]		

[Auftragsnummer]	Befundkommentare
Verfahren	
[00723024]	
HBs-Antikörper (quantitativ)	Aktuelle Empfehlungen der STIKO bei Werten zwischen <10 IU/l, wenn sie ca. 4-8 Wochen nach der 3. Impfstoffdosis gemessen wurden, wie empfohlen für best immunste Personen (Indikationsgruppen): Bei Non-Respondern (Anti-HBs <10 IU/L) sollten zum Ausschluss einer bestehenden chronischen HBV-Infektion HBsAg und Anti-HBc bestimmt werden. Falls beide Parameter negativ sind, wird folgendes Procedere empfohlen: Es wird eine sofortige weitere Impfstoffdosis mit erneuter Anti-HBs-Kontrolle nach weiteren 4-8 Wochen empfohlen. Falls der Anti-HBs-Spiegel dann immer noch <100 IU/L ist, sollten bis zu 2 weitere Impfstoffdosen jeweils mit anschließender Anti-HBs-Kontrolle nach 4-8 Wochen verabreicht werden. Das weitere Vorgehen, falls nach insgesamt 6 Impfstoffdosen der Anti-HBs-Spiegel stets <100 IU/L ist, wird kontrovers diskutiert. Bei einer akuten Exposition ist für diese Personen eine passive Immunisierung notwendig.