

Tabelle Fondamenti Logico Matematici

Deduzione Naturale Proposizionale Varie Logiche

connettivo/falso	introduzione	eliminazione
\wedge	$\frac{A, B}{A \wedge B} i \wedge$	$\frac{A \wedge B}{A} e \wedge \quad \frac{A \wedge B}{B} e \wedge$
\vee	$\frac{A}{A \vee B} i \vee \quad \frac{B}{A \vee B} i \vee$	$\frac{A \vee B, \overset{A}{\cancel{\pi'_C}}, \overset{B}{\cancel{\pi''_C}}}{C} e \vee$
\rightarrow	$\frac{\overset{A}{\cancel{\pi_B}}}{A \rightarrow B} i \rightarrow$	$\frac{A, A \rightarrow B}{B} e \rightarrow$
\neg	$\frac{\overset{A}{\cancel{\pi_{\neg A}}}}{\neg A} i \neg$	$\frac{\overset{A}{\cancel{\pi_{\neg A}}}}{A} e \neg$
\perp	$\frac{A, \neg A}{\perp} i \perp$	$\frac{\perp}{B} e \perp$

- La regola dell'eliminazione del \perp non si può usare in logica minimale
- La regola dell'introduzione del \neg non si può usare in logica minimale
- La regola dell'eliminazione del \neg non si può usare in logica intuizionistica
- Le altre regole sono valide sia per la logica classica che per quella intuizionistica che per quella modale

Deduzione Naturale Predicativa Varie Logiche

quantificatore	introduzione	eliminazione
\exists	$\frac{P(a)}{\exists x P(x)} i \exists$	$\frac{\overset{\pi}{\cancel{P(a)}} \overset{\pi_1}{\cancel{C}}}{\exists x P(x), C} e \exists$
\forall	$\frac{\overset{\pi}{P(a)}}{\forall x P(x)} i \forall$	$\frac{\forall x P(x)}{P(a)} e \forall$

- Le regole valgono sia per logica classica che intuizionistica

Tableaux Logica Intuizionistica Proporzionale

connettivo	T-regola	F-regola
\wedge	$\frac{S, T(A \wedge B)}{S, TA, TB} T \wedge$	$\frac{S, F(A \wedge B)}{S, FA/S, FB} F \wedge$
\vee	$\frac{S, T(A \vee B)}{S, TA/S, TB} T \vee$	$\frac{S, F(A \vee B)}{S, FA, FB} F \vee$
\rightarrow	$\frac{S, T(A \rightarrow B)}{S, FA/S, TB} T \rightarrow$	$\frac{S, F(A \rightarrow B)}{S, TA, FB} F \rightarrow$
\neg	$\frac{S, T(\neg A)}{S, FA} T \neg$	$\frac{S, F(\neg A)}{S, TA} F \neg$

Tableaux Logica Intuizionistica Proporzionale Estesi con Ripetizioni

connettivo	T-regola con eventuale ripetizione
\rightarrow	$\frac{S, T(A \rightarrow B)}{S, FA, T(A \rightarrow B)/S, TB} T \rightarrow$
\neg	$\frac{S, T(\neg A)}{S, FA, T(\neg A)} T \neg$

Tableaux Ottimizzati Logica Intuizionistica Proporzionale

	T-regola	F-regola	F_C -regola
\wedge	$\frac{S, T(A \wedge B)}{S, TA, TB} T \wedge$	$\frac{S, F(A \wedge B)}{S, FA/S, FB} F \wedge$	$\frac{S, F_C(A \wedge B)}{S_C, F_C A/S_C, F_C B} F_C \wedge$
\vee	$\frac{S, T(A \vee B)}{S, TA/S, TB} T \vee$	$\frac{S, F(A \vee B)}{S, FA, FB} F \vee$	$\frac{S, F_C(A \vee B)}{S, F_C A, F_C B} F_C \vee$
\rightarrow	$\frac{S, T(A \rightarrow B)}{S, FA, T(A \rightarrow B)/S, TB} T \rightarrow$	$\frac{S, F(A \rightarrow B)}{S_C, TA, FB} F \rightarrow$	$\frac{S, F_C(A \rightarrow B)}{S_C, TA, F_C B} F_C \rightarrow$
\neg	$\frac{S, T(\neg A)}{S, F_C A} T \neg$	$\frac{S, F(\neg A)}{S_C, TA} F \neg$	$\frac{S, F_C(\neg A)}{S_C, TA} F_C \neg$

- S_C è definito come l'insieme S meno l'insieme delle formule segnate con F

Ottimizzazioni Implicazione Logica Intuizionistica Proporzionale

Antecedente Ant	$\mathbf{T} \rightarrow$
$Ant = A \text{ o } Ant = \neg A$	$\frac{S, TA \rightarrow B}{S, FA/S, TB} T \rightarrow AN$
$Ant = A \wedge B$	$\frac{S, T(A \wedge B) \rightarrow C}{S, T(A \rightarrow (B \rightarrow C))} T \rightarrow \wedge$
$Ant = A \vee B$	$\frac{S, T(A \vee B) \rightarrow C}{S, TA \rightarrow C, TB \rightarrow C} T \rightarrow \vee$
$Ant = A \rightarrow B$	$\frac{S, T(A \rightarrow B) \rightarrow C}{S, FA \rightarrow B, TB \rightarrow C/S, TC} T \rightarrow \rightarrow$

Implicazione segnata (*versione corretta ma non completa di $T \rightarrow$*)

$$\frac{S, TA \rightarrow B}{S, F_C A/S_C, TB} \overline{T \rightarrow}$$

Traduzione da Logica Classica Predicativa a Intuizionistica

Si ha $\vdash_{CL} A \iff \vdash_{INT} \tau(A)$ con:

- $\tau(A) = \neg\neg A$, con A atomica
- $\tau(A \wedge B) = \tau(A) \wedge \tau(B)$
- $\tau(A \rightarrow B) = \tau(A) \rightarrow \tau(B)$
- $\tau(A \vee B) = \neg(\neg\tau(A) \wedge \neg\tau(B))$
- $\tau(\neg A) = \neg\tau(A)$
- $\tau(\forall x A(x)) = \forall x \tau(A(x))$
- $\tau(\exists x A(x)) = \neg\forall x \neg\tau(A(x))$

Tableaux Logica Intuizionistica Predicativa

quantificatore	T-regola	F-regola
\exists	$\frac{S, T \exists x A(x)}{S, T A(a)} \text{ (con a nuovo)}$	$\frac{S, F \exists x A(x)}{S, F A(a)}$
\forall	$\frac{S, T \forall x A(x)}{S, T A(a)}$	$\frac{S, F \forall x A(x)}{S, F A(a)} \text{ (con a nuovo)}$

Tableaux Logica Intuizionistica Predicativa Estesi con Ripetizioni

quantificatore	T-regola	F-regola
\exists	$\frac{S, T \exists x A(x)}{S, T A(a)} \text{ (con a nuovo)}$	$\frac{S, F \exists x A(x)}{S, F A(a)}$
\forall	$\frac{S, T \forall x A(x)}{S, T A(a), T \forall x A(x)}$	$\frac{S, F \forall x A(x)}{S, F A(a)} \text{ (con a nuovo)}$

Tableaux Ottimizzati Logica Intuizionistica Predicativa

quantificatore	F_C -regola
\exists	$\frac{S, F_C \exists x A(x)}{S, F_C A(a), F_C \exists x A(x)}$
\forall	$\frac{S, F_C \forall x A(x)}{S, F_C A(a), F_C \forall x A(x)} \text{ (con a nuovo)}$

Ottimizzazioni Implicazione Logica Intuizionistica Predicativa

quantificatore Ant	$T \rightarrow$
\exists	$\frac{S, T \exists x A(x) \rightarrow B}{S, T (\forall x (A(x) \rightarrow B))}$
\forall	$\frac{S, T \forall x A(x) \rightarrow B}{S, F \forall x A(x), T \forall x A(x) \rightarrow B / S, T B}$

Logica di Kuroda

Si usano le regole dei tableaux Intuizionistici predicativi tranne le seguenti regole:

$$\frac{S, F_C \forall x A(x)}{S_C, F_C A(a)} \overline{F_C \forall} \text{ (con } a \text{ nuovo)}$$

$$\frac{S, T \forall x A(x) \rightarrow B}{S, F \forall x A(x), F_C \neg \exists x (A(x) \rightarrow B) / S, TB} \overline{T \rightarrow \forall}$$

$$\frac{S_C, TA \rightarrow B}{S_C, F_C A / S_C, TB} CL-T \rightarrow$$

$$\frac{S}{S_C} AT \quad (\text{se } S \text{ contiene formule segnate } F \text{ solo atomiche, pi\u00f9 le } T \text{ e } F_C \text{ qualsiasi})$$