Date de l'examen _____ Heure de l'examen _____

Nom de l'examinateur _____ Signature _____

Nom de l'examinateur _____ Signature _____

○ PT ○ Chirurgien rachidien ○ Physiatre ○ Infirmière ○ Autre (spécifiez): _____

NORMES INTERNATIONALES POUR LA CLASSIFICATION DES LÉSIONS MÉDULLAIRES (ISNCSCI)

ASIA — American Spinal Injury Association

ISCOS — International Spinal Cord Society

DROITE

MUSCLES-CLÉS MOTEUR		SENSITIF POINTS SENSITIFS-CLÉS Toucher Léger (TL)	Piqûre (P)
	C2		
	C3		
	C4		
MSD (Membre Supérieur Droit) — *Fléchisseurs du coude*	C5		
Extenseurs du poignet	C6		
Extenseurs du coude	C7		
Fléchisseurs des doigts	C8		
Abducteurs des doigts (petit doigt)	T1		
	T2		
	T3		
	T4		
	T5		
	T6		
	T7		
	T8		
	T9		
	T10		
	T11		
	T12		
	L1		
MID (Membre Inférieur Droit) — *Fléchisseurs de la hanche*	L2		
Extenseurs du genou	L3		
Dorsifléchisseurs de la cheville	L4		
Extenseurs du gros orteil	L5		
Fléchisseurs plantaires de la cheville	S1		
	S2		
	S3		
	S4-5		
TOTAUX DROIT (MAXIMUM)		(50)	(56)	(56)

Commentaires *(muscle non-clé? Raisons pour NÉ? Douleur? Condition autre que médullaire?):*

(CAV) Contraction anale volontaire (Oui/Non) ☐



Autre déficit neurologique
- ☐ Myélopathie
- ☐ Lésion nerveuse périphérique sans lésion médullaire
- ☐ Lésion nerveuse périphérique avec lésion médullaire
- ☐ Aucun
- ☐ Inconnu

GAUCHE

SENSITIF POINTS SENSITIFS-CLÉS Toucher Léger (TL)	Piqûre (P)	MUSCLES-CLÉS MOTEUR	
		C2	
		C3	
		C4	
		MSG (Membre Supérieur Gauche) — C5 *Fléchisseurs du coude*	
		C6 *Extenseurs du poignet*	
		C7 *Extenseurs du coude*	
		C8 *Fléchisseurs des doigts*	
		T1 *Abducteurs des doigts (petit doigt)*	
		T2	
		T3	
		T4	
		T5	
		T6	
		T7	
		T8	
		T9	
		T10	
		T11	
		T12	
		L1	
		MIG (Membre Inférieur Gauche) — L2 *Fléchisseurs de la hanche*	
		L3 *Extenseurs du genou*	
		L4 *Dorsifléchisseurs de la cheville*	
		L5 *Extenseurs du gros orteil*	
		S1 *Fléchisseurs plantaires de la cheville*	
		S2	
		S3	
		S4-5	
(56)	(56)	(50)	*TOTAUX GAUCHE* (MAXIMUM)

MOTEUR *(POINTAGE AU VERSO)*

0 = Paralysie totale
1 = Contraction visible ou palpable
2 = Mouvement actif sans gravité
3 = Mouvement actif contre gravité
4 = Mouvement actif contre une certaine résistance
5 = Mouvement actif, contre pleine résistance
NÉ = Non-évaluable
0, 1*, 2*, 3*, 4*, NE* = Condition autre que médullaire*

SENSITIF *(POINTAGE AU VERSO)*

0 = Absent — *NÉ = Non-évaluable*
1 = Altéré — *0*, 1*, NE* = Condition autre que médullaire*
2 = Normal

(PAP) Pression anale profonde (Oui/Non) ☐

SOUS-TOTAUX MOTEURS

MSD ____ + MSG ____ = *FMMS TOTAL* ____ (MAX (25) / (25) / (50))

MID ____ + MIG ____ = *FMMI TOTAL* ____ (MAX (25) / (25) / (50))

SOUS-TOTAUX SENSITIFS

TLD ____ + TLG ____ = *TL TOTAL* ____ (MAX (56) / (56) / (112))

PD ____ + PG ____ = *P TOTAL* ____ (MAX (56) / (56) / (112))

RBC: ○ Présent ○ Absent ○ Inconnu

Syndrome de la queue de cheval: ○ Oui ○ Non ○ Inconnu

Besoin d'aide? Outil de classification informatisée disponible à: www.isncscialgorithm.com

NIVEAUX NEUROLOGIQUES *Étapes 1-6 pour la classification au verso*

	D	G
1. SENSITIF		
2. MOTEUR		

3. NIVEAU NEUROLOGIQUE DE LA LÉSION (NNL) ____

4. COMPLÈTE OU INCOMPLÈTE? ____ *Incomplète = toute fonction sensitive ou motrice en S4-5*

5. ÉCHELLE DE SÉVÉRITÉ ASIA (AIS) ____

6. ZONE DE PRÉSERVATION PARTIELLE *(Pour les lésions avec absence de fonction motrice ou sensitive au niveau S4-5 seulement)* *Niveau le plus caudal avec innervation*

	D	G
SENSITIVE		
MOTRICE		

Ce formulaire a été modifié à partir de la feuille de travail INSCSCI version REV 04/19 avec la permission de l'American Spinal Injury Association.

RHI Version: V2019-05-07

Date de l'examen _____ Heure de l'examen _____

Nom de l'examinateur _____ Signature _____

Nom de l'examinateur _____ Signature _____

○ PT ○ Chirurgien rachidien ○ Physiatre ○ Infirmière ○ Autre (spécifiez): _____

NORMES INTERNATIONALES POUR LA CLASSIFICATION DES LÉSIONS MÉDULLAIRES (ISNCSCI)

DROITE

MUSCLES-CLÉS		SENSITIF Chaud	SENSITIF Froid
	C2		
	C3		
	C4		
Fléchisseurs du coude	C5		
Extenseurs du poignet	C6		
Extenseurs du coude	C7		
Fléchisseurs des doigts	C8		
Abducteurs des doigts (petit doigt)	T1		
	T2		
	T3		
	T4		
	T5		
	T6		
	T7		
	T8		
	T9		
	T10		
	T11		
	T12		
	L1		
Fléchisseurs de la hanche	L2		
Extenseurs du genou	L3		
Dorsifléchisseurs de la cheville	L4		
Extenseurs du gros orteil	L5		
Fléchisseurs plantaires de la cheville	S1		
	S2		
	S3		
	S4-5		
TOTAUX DROIT (MAXIMUM)		(50)	(56) (56)

MSD (Membre Supérieur Droit)

MID (Membre Inférieur Droit)

Commentaires (muscle non-clé? Raisons pour NÉ? Douleur? Condition autre que médullaire?):

(CAV) Contraction anale volontaire (Oui/Non) ☐



Déficit neurologique

pathie

nerveuse périphérique sans lésion médulaire

nerveuse périphérique avec lésion médulaire

☐ Inconnu

GAUCHE

SENSITIF Chaud	SENSITIF Froid	MUSCLES-CLÉS
		C5 *Fléchisseurs du coude*
		C6 *Extenseurs du poignet*
		C7 *Extenseurs du coude*
		C8 *Fléchisseurs des doigts*
		T1 *Abducteurs des doigts (petit doigt)*

Bilan articulaire :

Membres inférieurs		Gauche	Droit
Hanche	Flexion		
	Extension GF Extension GT		
	Rotation interne		
	Rotation externe		
	Abduction HT GT		
	Adduction HT GT		
Genou	Flexion		
	Extension		
Cheville	Flexion dorsale GF		
	Flexion dorsale GT		

Membres supérieurs		Gauche	Droit
Epaule	Elévalation antérieure		
	Elévation latérale		
	Extension		
	Rotation externe		
Coude	Flexion		
	Extension		
	Pronation		
	Supnination		
Poignet	Ext. poignet		
	Fléch. poignet		
Doigts	Ext. doigts		
	Fléch. doigts		
	Ext. pouce		
	Fléch. pouce		

1. SCATS

	Droite	Gauche
Clonus		
Spasmes en flexion		
Spasmes en extension		

Spasticité :

Échelle d'Ashworth modifiée :
0 : pas d'augmentation du tonus musculaire
1 : une augmentation discrète du tonus musculaire se manifestant par un ressaut suivi d'un relâchement ou par une résistance minime à la fin du mouvement
2 : une augmentation discrète du tonus musculaire se manifestant par un ressaut suivi d'une résistance minime perçue sur moins de la moitié de l'amplitude articulaire
3 : une augmentation plus marquée du tonus musculaire touchant la majeure partie de l'amplitude articulaire, l'articulation pouvant être mobilisée facilement
4 : une augmentation importante du tonus musculaire rendant la mobilisation passive difficile
5 : l'articulation concernée est fixée en flexion ou en extension (abduction ou adduction)

Échelle de Tardieu :
Angle
- V1 : Angle d'amplitude maximale obtenue à vitesse lente (référence = limitation mécanique)
- V3 : Angle où une réaction spastique survient à vitesse rapide

Score :
- 0 : Aucune résistance pendant l'étirement
- 1 : Légère résistance sans arrêt
- 2 : « Accrochage » clair suivi d'un relâchement, avec poursuite du mouvement
- 3 : « Accrochage » net, avec résistance sur une courte distance
- 4 : blocage complet empêchant le mouvement

Muscles du MI	Aschworth	Tardieu
Grand fessier D		
Grand fessier G		
Iliopsoas D		
Iliopsoas G		
Adducteurs D		
Adducteurs G		
Quadriceps D		
Quadriceps G		
Ischio-jambiers D		
Ischio-jambiers G		
Gastrocnémiens D		
Gastrocnémiens G		
Soléaire D		
Soléaire G		
Tibial postérieur D		
Tibial postérieur G		
Tibial antérieur D		
Tibial antérieur G		

Muscles du MS	Aschworth	Tardieu
Deltoïde D		
Deltoïde G		
Biceps D		
Biceps G		
Brachial D		
Brachial G		
Bracho-radial D		
Bracho-radial G		
Triceps D		
Triceps G		
Pronation D		
Pronation G		
Supination D		
Supination G		
Ext. poignet D		
Ext. poignet G		
Fléch. poignet D		
Fléch. poignet G		
Interosseux lomb. D		
Interosseux lomb. G		
Ext. Pouce D		
Ext. Pouce G		
Fléch. pouce D		
Fléch. pouce G		
Flech. doigts D		
Fléch. doigts G		
Ext. doigts D		
Ext. doigts G		

Réflexes ostéo-tendineux :

	Normal	Aboli	Vif	Hypo
Bicipital D				
Bicipital G				
Tricipital D				
Tricipital G				
Stylo Radial D				
Stylo Radial G				
Rotulien D				
Rotulien G				
Achilléen D				
Achilléen G				
Flexion orteils D				
Flexion orteils G				

Bilan musculaire :

Membres inférieurs			Gauche	Droit
Hanche	Flexion			
	Extension			
	Rotation interne			
	Rotation externe			
	Abduction			
	Adduction			
Genou	Flexion			
	Extension			
Cheville	Flexion dorsale	Extenseur commun orteils		
		Extenseur du gros orteil		
		Tibial antérieur		
		Fibulaire		
	Flexion plantaire	Fléchisseur orteils		
		Fléchisseur du gros orteil		
		Triceps sural		
		Tibial postérieur		

Membres supérieurs		Gauche	Droit
Epaule	Trapèze		
	Deltoide ant.		
	Deltoide moyen		
	Deltoide postérieur		
	Sous-scapulaire		
	Grand pectoral		
	Sous-épineux		
	Sus-épineux		
Coude	Biceps		
	Brachial		
	Bracho-radial		
	Triceps		
Poignet	Pronation		
	Supination		
	Ext. poignet		
	Fléch. poignet		
	Inclinaison radiale		
	Inclinaison cubitale		
Doigts	Ext. doigts		
	Fléch. doigts		
	Interosseux lomb.		
	Ext. pouce		
	Fléch. pouce		
	Abduction du V		
	Opposition pouce Kapandji		

Abdominaux	Gauche	Droit
Grand droit		
Obliques		
Transverse		
Diaphragme		

Dorsaux	Gauche	Droit
Érecteurs du rachis		
Carré des lombes		
Grand dorsal		
Grand rond		
Grand dentelé		

Paramètres thoraciques	
Au repos	
Inspiration max	
Expiration max	

Questionnaire
DN4

Un outil simple pour rechercher les douleurs neuropathiques

Pour estimer la probabilité d'une douleur neuropathique, le patient doit répondre à chaque item des 4 questions ci dessous par « oui » ou « non ».

QUESTION 1 : la douleur présente-t-elle une ou plusieurs des caractéristiques suivantes ?

	Oui	Non
1. Brûlure	☐	☐
2. Sensation de froid douloureux	☐	☐
3. Décharges électriques	☐	☐

QUESTION 2 : la douleur est-elle associée dans la même région à un ou plusieurs des symptômes suivants ?

	Oui	Non
4. Fourmillements	☐	☐
5. Picotements	☐	☐
6. Engourdissements	☐	☐
7. Démangeaisons	☐	☐

QUESTION 3 : la douleur est-elle localisée dans un territoire où l'examen met en évidence :

	Oui	Non
8. Hypoesthésie au tact	☐	☐
9. Hypoesthésie à la piqûre	☐	☐

QUESTION 4 : la douleur est-elle provoquée ou augmentée par :

	Oui	Non
10. Le frottement	☐	☐

OUI = 1 point **NON = 0 point** **Score du Patient : /10**

NPSI

Neuropathic Pain Symptom Inventory

Q1/ Votre douleur est-elle comme une brûlure ?

Pas de douleur 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 douleur maxi

Q2/ Votre douleur est-elle comme un étau ?

Pas de douleur 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 douleur maxi

Q3/ est-elle comme une compression ?

Pas de douleur 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 douleur maxi

Q4/ **Au cours des dernières 24 heures**, vos douleurs spontanées ont été présentes :

En permanence/jour ☐

Entre 8 et 12 heures/jour ☐

Entre 4 et 7 heures/jour ☐

Entre 1 et 3 heures/jour ☐

Moins de 1heure/jour ☐

Q5/ Avez-vous des crises douloureuses comme des décharges électriques ?

Pas de douleur 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 douleur maxi

Q6/ Avez-vous des crises douloureuses comme des coups de couteau ?

Pas de douleur 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 douleur maxi

Q7/ **Au cours des dernières 24 heures**, combien de crises douloureuses avez-vous présenté ?

Plus de 20 ☐

Entre 11 et 20 ☐

Entre 6 et 10 ☐

Entre 1 et 5 ☐

Pas de crise douloureuse ☐

Q8/ Avez-vous des douleurs provoquées ou augmentées par le frottement sur la zone douloureuse ?

Pas de douleur 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 douleur maxi

Q9/ Avez-vous des douleurs provoquées ou augmentées par la pression sur la zone douloureuse ?

Pas de douleur 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 douleur maxi

Q10/ Avez-vous des douleurs provoquées ou augmentées par le contact avec un objet froid sur la zone douloureuse ?

Pas de douleur 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 douleur maxi

Q11/ Avez-vous des picotements ?

Pas de douleur 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 douleur maxi

Q12/ Avez-vous des fourmillements ?

Pas de douleur 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 douleur maxi

<u>Bilan cutané, trophique et vasculaire :</u>

Boubée :

Shirado :

- Temps :

- Position de la table :

SPINAL CORD INDEPENDENCE MESURE - SCIM III

				Date
SOINS PERSONNELS ***1. Alimentation*** *(couper la viande, ouvrir une boîte, tenir un gobelet plein, verser du liquide, porter les aliments à la bouche)* 0 Nutrition parentérale, gastrotomie ou assistance totale pour alimentation orale 1 Assistance partielle pour manger et/ou boire, pour aliments coupés, assiette et couverts adaptés, incapable de tenir un gobelet 2 Indépendant pour manger, besoin d'AT ou assistance seulement pour couper les aliments et/ou verser et/ou ouvrir une boite) 3 Indépendant dans toutes les tâches sans assistance ou AT				
2. Toilette *(utiliser le savon, manipuler les robinets , se laver, se sécher le corps et la tête)* ***A. Partie supérieure du corps*** 0 Assistance totale 1 Assistance partielle 2 Indépendant avec AT ou installation spéciale 3 Indépendant sans AT ni installation spéciale				
B. Partie inférieure du corps 0 Assistance totale 1 Assistance partielle 2 Indépendant avec AT ou installation spéciale 3 Indépendant sans AT ni installation spéciale				
3 Habillage *(préparation des habits, habillage, déshabillage,chaussage, mise en place des orthèses permanentes)* ***A. Partie supérieure du corps*** 0 Assistance totale 1 Assistance partielle pour avec les **v**êtements **s**ans **b**outons, **f**ermetures éclairs ou **l**acets (**vsbfl**) 2 Indépendant pour **vsbfl** ; besoin AT et/ ou installation spéciale 3 Indépendant pour **vsbfl** ; pas besoin AT et/ou installation spéciale sauf pour **bfl** 4 Indépendant (pour tout type de vêtement) sans AT et/ ou installation spéciale				
B. Partie inférieure du corps 0 Assistance totale 1 Assistance partielle pour avec les vêtements sans boutons, fermetures éclairs ou lacets (**vsbfl**) 2 Indépendant pour **vsbfl** ; besoin AT et/ ou installation spéciale 3 Indépendant pour **vsbfl** ; pas besoin AT et/ou installation spéciale sauf pour **bfl** 4 Indépendant (pour tout type de vêtement) sans AT et/ou installation spéciale				
4 Soins d'apparence *(se laver les mains et le visage, se coiffer, brossage des dents, rasage, maquillage)* 0 Assistance totale 1 Assistance partielle 2 Indépendant avec AT 3 Indépendant sans AT				
Sous total (0-20)				
RESPIRATION ET CONTROLE SPHINCTÉRIEN ***5. Respiration*** 0 Sonde trachéale (ST) et ventilation assistée (VA) permanente ou intermittente 2 Respire spontanément avec ST; besoin oxygène, assistance pour tousser et soins trachéaux 4 Respire spontanément avec ST + peu d'assistance pour tousser ou soins trachéaux 6 Respire spontanément sans ST + besoin d'oxygène et soins importants pour tousser, un masque ou VA 8 Respire sans ST; besoin d'un peu d'assistance mécanique pour tousser 10 Respiration normale sans aide ou AT				
6. Contrôle vésico-sphinctérien - Vessie 0 Sonde urinaire à demeure 3 Résidu post mictionnel (RPM) > 100 cc, pas de sonde, pas de SI 6 RPM <100 cc, ou auto sondages intermittents, aide nécessaire pour vidange vésicale 9 Auto sondages intermittents < 100 cc, utilise une AT pour vidange vésicale sans assistance 11 Auto sondages intermittents, continent entre les sondages, sans AT 13 RPM < 100 cc, vidange vésicale externe uniquement sans aide 15 RPM < 100 cc, totalement continent sans vidange vésicale				
7. Contrôle sphincter anal 0 Évacuation des selles inappropriées, ou irrégulières, ou fréquence < à 1 fois/3j 5 Évacuation régulière et adaptée avec assistance (ex : mise du suppo), rares fuites (< 1 fois/mois) 8 Évacuation régulière et adaptée sans assistance, rares fuites (< 1 fois/mois) 10 Évacuation régulière sans assistance pas d'accidents				
8. Utilisation des toilettes *(hygiène périnéale, déshabillage, rhabillage, utilisation de couches ou de serviettes périodiques)* 0 Besoin d'assistance totale 1 Assistance partielle, ne peut se laver seul 2 Assistance partielle, peut se laver seul 4 Indépendant dans toutes les tâches, nécessite AT ou installation spéciale 5 Indépendant sans AT ni installation spéciale				
Sous total (0-40)				

MOBILITÉ (Chambre et Toilettes) ***9. Mobilité dans le lit et prévention des points d'appui*** 0 Besoin d'assistance totale dans toutes les activités :tourner le haut et bas du corps dans le lit, s'asseoir, push-up en fauteuil, avec ou sans AT, mais sans aides électriques 2 Peut accomplir une de ces activités sans aide 4 Peut accomplir deux ou trois activités sans aide 6 Totalement indépendant pour toutes les activités de mobilité dans le lit et prévention des points d'appui				
10. Transferts lit-fauteuil roulant *(bloquer le fauteuil, soulever les appuis-pieds, enlever et ajuster les repose-bras, transfert, lever les pieds)* 0 Besoin d'assistance totale 1 Besoin d'assistance partielle et/ou surveillance et/ou AT (ex : planche de transfert) 2 Indépendant (ou n'a pas besoin de fauteuil roulant)				
11. Transferts fauteuil roulant-W.C. *(bloquer le fauteuil, soulever les appuis-pieds, enlever et ajusterles repose-bras, transfert, lever les pieds)* 0 Besoin d'assistance totale 1 Besoin assistance partielle et/ou surveillance ou aménagement (ex : barre d'appui) 2 Indépendant (ou n'a pas besoin de fauteuil roulant)				
DÉPLACEMENTS (à l'intérieur et à l'extérieur, sur surfaces planes) ***12. Déplacements à l'intérieur (courtes distances)*** 0 Assistance totale 1 A besoin d'un FRE ou d'une aide pour déplacer le FRM 2 Se déplace seul avec un FRM 3 Surveillance pour la marche (avec ou sans AT) 4 Marche avec déambulateur ou cannes anglaises (swing) 5 Marche avec 2 cannes anglaises ou cannes simples (marche réciproque) 6 Marche avec 1 canne simple 7 Utilise seulement une orthèse 8 Marche sans AT				
13. Déplacements sur distances moyennes (10 - 100 m) 0 Assistance totale 1 A besoin d'un FRE ou d'une aide pour déplacer le FRM 2 Se déplace seul avec un FRM 3 Surveillance pour la marche (avec ou sans AT) 4 Marche avec déambulateur ou cannes anglaises (swing) 5 Marche avec 2 cannes anglaises ou cannes simples (marche réciproque) 6 Marche avec 1 canne simple 7 Utilise seulement une orthèse 8 Marche sans AT				
14. Déplacements à l'extérieur (> 100 m) 0 Assistance totale 1 A besoin d'un FRE ou d'une aide pour déplacer le FRM 2 Se déplace seul avec un FRM 3 Surveillance pour la marche (avec ou sans AT) 4 Marche avec déambulateur ou cannes anglaises (swing) 5 Marche avec 2 cannes anglaises ou cannes simples (marche réciproque) 6 Marche avec 1 canne simple 7 Utilise seulement une orthèse 8 Marche sans AT				
15. Escaliers 0 Incapable de monter ou descendre des escaliers 1 Monte et descend au moins 3 marches avec aide ou surveillance d'un tiers 2 Monte et descend au moins 3 marches avec appui d'une rampe et / ou canne 3 Monte et descend au moins 3 marches sans aucun appui ni surveillance				
16. Transferts fauteuil roulant - voiture *(accéder à la voiture, bloquer le fauteuil roulant, enlever les appuis-pieds et repose-bras, transfert fauteuil roulant-voiture, mettre/sortir le fauteuil roulant)* 0 Besoin d'assistance totale 1 Besoin d'assistance partielle et / ou surveillance et / ou aide technique 2 Indépendant sans aide technique				
16. Transferts fauteuil roulant-sol 0 Besoin d'assistance totale 1 Indépendant pour les transferts avec ou sans AT				
Sous total (0-40)				
TOTAL (sur 100)				

AT : aide technique / FRM : Fauteuil roulant manuel / FRE : Fauteuil roulant électrique/ RPM : résidu post-mictionnel

INTERNATIONAL SPINAL CORD INJURY
QUALITY OF LIFE BASIC DATA SET– DATA FORM (Version 2.0)

1. En pensant à votre vie et à vos circonstances personnelles, **à quel point êtes-vous satisfait(e) de votre vie dans son ensemble au cours des quatre dernières semaines ?**
Veuillez utiliser une échelle allant de 0 (complètement insatisfait) à 10 (complètement satisfait). Vous pouvez choisir 0, 10 ou n'importe quel nombre entre les deux.

Complètement insatisfait Complètement satisfait

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9 ☐10

2. À quel point êtes-vous satisfait(e) de votre santé physique au cours des quatre dernières semaines ?
Veuillez utiliser une échelle allant de 0 (complètement insatisfait) à 10 (complètement satisfait). Vous pouvez choisir 0, 10 ou n'importe quel nombre entre les deux.

Complètement insatisfait Complètement satisfait

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9 ☐10

3. À quel point êtes-vous satisfait(e) de votre santé psychologique, de vos émotions et de votre humeur au cours des quatre dernières semaines ?
Veuillez utiliser une échelle allant de 0 (complètement insatisfait) à 10 (complètement satisfait). Vous pouvez choisir 0, 10 ou n'importe quel nombre entre les deux.

Complètement insatisfait Complètement satisfait

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9 ☐10

4. À quel point êtes-vous satisfait(e) de votre vie sociale au cours des quatre dernières semaines ?
Veuillez utiliser une échelle allant de 0 (complètement insatisfait) à 10 (complètement satisfait). Vous pouvez choisir 0, 10 ou n'importe quel nombre entre les deux.

Complètement insatisfait Complètement satisfait

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9 ☐10

SCORE FONCTIONNEL DIGESTIF DES MALADES NEUROLOGIQUES (SCORE NBD)

(Krogh K, Christensen P, Sabroe S, Laurberg S. Neurogenic bowel dysfunction score. Spinal Cord. 2006;44:625-31).

Avec quelle fréquence allez vous à la selle?	Chaque jour	0
	2 à 6 fois par semaine	1
	Moins d'une fois par semaine	6
Quel temps passé vous en moyenne aux toilettes à chaque fois ?	Moins de 30 minutes	0
	De 30 à 60 minutes	3
	Plus d'une heure	7
Ressentez vous une sensation de malaise, mal à la tête ou transpirez vous au moment de la défécation ?	Non	0
	Oui	2
Prenez vous des médicaments en comprimés pour la constipation ?	Non	0
	Oui	2
Prenez vous des médicaments en sachets pour la Constipation ?	Non	0
	Oui	2
Avez-vous besoin de mettre le doigt dans l'anus pour aller à la selle ?	Moins d'une fois par semaine	0
	Plus d'une fois par semaine	6
Avez-vous des pertes incontrôlées de selles par l'anus ?	Moins d'une fois par mois	0
	1 à 4 fois par mois	6
	1 à 6 fois par semaine	7
	Quotidiennes au moins	13
Prenez vous des médicaments pour l'incontinence ?	Non	0
	Oui	4
Avez-vous des pertes incontrôlées de gaz ?	Non	0
	Oui	2
Avez-vous des problèmes de peau autour de votre anus ?	non	0
	oui	3
	Total	

Interprétation du score NBD :

0 à 6	Très minime	Les malades rapportant un score modéré ont trois fois sur quatre un retentissement sur la qualité de vie et ceux rapportant un score important ont un retentissement plus de neuf fois sur dix.
7 à 9	Minime	
10 à 13	Modérée	
14 et plus	Sévère	

QUESTIONNAIRE DES TROUBLES DIGESTIFS (GIQLI)

1.Durant les 15 derniers jours, vous avez eu mal au ventre :

toujours	la plupart du temps	quelques fois	rarement	jamais
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)

2.Durant les 15 derniers jours, vous avez eu la sensation d'avoir l'estomac gonflé :

toujours	la plupart du temps	quelques fois	rarement	jamais
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)

3.Durant les 15 derniers jours, vous avez eu la sensation d'avoir beaucoup de gaz dans le ventre :

toujours	la plupart du temps	quelques fois	rarement	jamais
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)

4.Durant les 15 derniers jours, vous avez été gêné(e) par l'émission de «vents» :

toujours	la plupart du temps	quelques fois	rarement	jamais
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)

5.Durant les 15 derniers jours, vous avez été gêné(e) par des éructations ou des renvois :

toujours	la plupart du temps	quelques fois	rarement	jamais
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)

6.Dans les 15 jours qui ont précédé, vous avez été gêné(e) par des bruits de «glouglou» dans le ventre :

toujours	la plupart du temps	quelques fois	rarement	jamais
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)

7.Durant les 15 derniers jours, vous avez été gêné(e) par des selles fréquentes :

toujours	la plupart du temps	quelques fois	rarement	jamais
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)

8.Durant les 15 derniers jours, vous avez mangé avec plaisir et appétit:

jamais	rarement	quelques fois	la plupart du temps	toujours
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)

9.A cause de votre maladie, vous êtes obligé(e) de supprimer certains aliments :

de façon très importante	de façon importante	un peu	un tout petit peu	pas du tout

(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	☐

10.Durant les 15 derniers jours, vous avez été capable de surmonter les problèmes quotidiens :

extrêmement mal	mal	modérément	bien	extrêmement bien	
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	☐

11.Durant les 15 derniers jours, combien de fois votre maladie vous a-t-elle rendu(e) triste :

toujours	la plupart du temps	quelques fois	rarement	jamais	
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	☐

12.Durant les 15 dernier jours, combien de fois avez-vous été anxieux(e) à cause de votre maladie

toujours	la plupart du temps	quelques fois	rarement	jamais	
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	☐

13.Durant les 15 derniers jours, combien de fois avez-vous ressenti la joie de vivre :

jamais	rarement	quelques fois	la plupart du temps	toujours	
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	☐

14.Durant les 15 derniers jours, combien de fois avez-vous été frustré(e) à cause de votre maladie :

toujours	la plupart du temps	quelques fois	rarement	jamais	
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	☐

15.Durant les 15 derniers jours, combien de fois vous êtes-vous senti(e) fatigué(e) :

toujours	la plupart du temps	quelques fois	rarement	jamais	
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	☐

16.Durant les 15 derniers jours, combien de fois avez-vous été souffrant :

toujours	la plupart du temps	quelques fois	rarement	jamais	
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	☐

17.Durant la dernière semaine, vous êtes-vous réveillé(e) pendant la nuit ?

toutes les nuits	5 ou 6 nuits	3 ou 4 nuits	1 ou 2 nuits	jamais	
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	☐

18.Depuis que vous êtes malade, avez-vous été chagriné(e) par les modifications de votre apparence :

pour une grande part	modérement	un peu	un tout petit peu	pas du tout	
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	☐

19.A quel degré est-ce que la maladie a réduit votre condition physique en général ?

énormément	beaucoup	un peu	un tout petit peu	pas du tout	
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	☐

20.A cause de votre maladie, vous avez perdu de votre endurance :

pour une grande part	modérément	un peu	un tout petit peu	pas du tout
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)

21.De part votre maladie, vous estimez la perte de votre tonus :

majeure	modérée	minime	insignifiante	nulle, vous êtes en forme
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)

22.Durant les 15 derniers jours, combien de fois avez-vous été capable d'accomplir vos activités habituelles (travail, école, ménage, etc)

jamais	rarement	quelques fois	la plupart du temps	toujours
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)

23.Durant les 15 derniers jours, vous avez été capable de vaquer à vos loisirs habituels ou d'entreprendre de nouvelles activités :

jamais	rarement	quelques fois	la plupart du temps	toujours
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)

24.Durant les 15 derniers jours, avez-vous été incommodé(e) par le traitement médical :

énormément	beaucoup	un peu	un tout petit peu	pas du tout
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)

25.Dans quelle mesure votre maladie perturbe-t-elle vos relations avec les autres (famille ou amis)

pour une très grande part	pour une part importante	un peu	un tout petit peu	pas du tout
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)

26.Dans quelle mesure votre maladie a-t-elle causé du tort à votre vie sexuelle :

pour une très grande part	pour une part importante	un peu	un tout petit peu	pas du tout
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)

27.Durant les 15 derniers jours, combien de fois avez-vous été incommodé(e) par des remontées de liquide ou d'aliments dans la bouche (régurgitations)

toujours	la plupart du temps	quelques fois	rarement	jamais
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)

28.Durant les 15 derniers jours, vous êtes-vous senti(e) obligé(e) de diminuer la vitesse avec laquelle vous mangez :

toujours	la plupart du temps	quelques fois	rarement	jamais
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)

29.Durant les 15 derniers jours, vous avez eu des problèmes pour avaler

toujours	la plupart du temps	quelques fois	rarement	jamais
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)

30.Durant les 15 derniers jours, vous avez ressenti le besoin urgent d'aller à la selle

toujours	la plupart du temps	quelques fois	rarement	jamais
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)

31.Durant les 15 derniers jours, vous avez été incommodé(e) par de la diarrhée :

toujours	la plupart du temps	quelques fois	rarement	jamais
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)

32.Durant les 15 derniers jours, vous avez été incommodé(e) par une constipation :

toujours	la plupart du temps	quelques fois	rarement	jamais
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)

33.Durant les 15 derniers jours, vous avez été incommodé(e) par une nausée :

toujours	la plupart du temps	quelques fois	rarement	jamais
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)

34.Durant les 15 derniers jours, vous avez été inquiété(e) par la présence de sang dans les selles :

toujours	la plupart du temps	quelques fois	rarement	jamais
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)

35.Durant les 15 derniers jours, vous avez été incommodé(e) par une brûlure ou une acidité remontant dans la poitrine :

toujours	la plupart du temps	quelques fois	rarement	jamais
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)

36.Durant les 15 derniers jours, vous avez été incommodé(e) par une incontinence pour les selles :

toujours	la plupart du temps	quelques fois	rarement	jamais
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)

Score digestif de qualité de vie comprenant 36 items portnt sur les symptômes, le statut physique, les émotions, les problèmes sociaux, et l'effet des traitements médicaux. Le score est compris entre 0 et 144, plus le score est haut, meilleure est la qualité de vie. La validation du questionnaire français fait état d'un score de 96 pour les volontaires sains contre 126 en moyenne pour les patients.

First validation of the french version of the gastrointestinal quality of life index. Slim K et al.Gastroenterol Clin Biol 1999 Jan ;23(1) :25-31.

(Fecal Incontinence Quality of Life Scale - FIQOL)

INCONTINENCE FÉCALE

QUESTIONNAIRE DE QUALITÉ DE VIE

Q1 : **De manière générale, diriez-vous que votre état de santé est :**
☐ Excellent (1); ☐ Très bon (2); ☐ Bon (3); ☐ Moyen (4); ☐ Médiocre (5).

Pour chacune des questions suivantes, indiquez avec quelle fréquence le problème vous concerne en raison de pertes fécales incontrôlées (gaz et/ou selles). Si le problème vous concerne pour d'autres raisons que les pertes fécales incontrôlées, cochez la case NAP («»).

Q2 : **En raison de pertes fécales incontrôlées :**	Le plus souvent	Assez souvent	Rarement	Jamais	NAP
a) J'évite de sortir	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐
b) J'évite les activités physiques prolongées	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐
c) J'évite de rendre visite à des amis	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐
d) J'évite de passer la nuit ailleurs que chez moi	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐
e) Il m'est difficile de sortir pour faire des choses telles que aller au cinéma ou à l'église	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐
f) Je fais attention à ce que je mange avant de sortir	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐
g) Chaque fois que je ne suis pas chez moi, je m'efforce de rester près des toilettes aussi souvent que possible	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐
h) J'organise mes activités journalières en fonction de mes difficultés intestinales	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐
i) J'évite de voyager	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐
j) Je crains de ne pas arriver à atteindre les toilettes à temps	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐
k) Je sens que je n'arrive pas à contrôler mes selles ou mes gaz	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐
l) Je ne peux retenir mes selles suffisamment longtemps pour atteindre les toilettes	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐
m) Je perds des selles sans m'en apercevoir	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐
n) J'essaie d'éviter les accidents d'incontinence en restant près des toilettes	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐

Indiquez dans quelle mesure vous êtes d'accord ou pas d'accord avec chacune des propositions suivantes pour des raisons liées à des pertes fécales accidentelles (gaz et/ou selles). (Si le problème vous concerne pour d'autres raisons que les pertes fécales incontrôlées, cochez la case NAP.

Q3 : **En raison de pertes fécales incontrôlées :**	Le plus souvent	Assez souvent	Rarement	Jamais	NAP
a) J'évite de manger certains aliments que j'aime	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐
b) Je me sens honteux(se)	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐
c) Je ne peux plus faire les choses que j'aime	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐
d) Je m'inquiète de ne pas pouvoir me retenir	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐
e) Je me sens déprimé(e)	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐
f) Je m'inquiète de sentir mauvais	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐
g) Je crains d'être gêné(e) ou humilié(e) par mon état	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐
h) J'ai l'impression de ne pas être en bonne santé	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐
i) Je profite moins de la vie	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐
j) Je fais moins souvent l'amour que je le souhaiterais	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐
k) Je me sens différent(e) des autres	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐
l) Je pense toujours à la possibilité d'un accident d'incontinence	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐
m) Je redoute d'avoir des relations sexuelles	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐
n) J'évite de voyager en train ou en avion	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐
o) J'évite de manger à l'extérieur	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐
p) Chaque fois que je suis dans un endroit inconnu, je cherche immédiatement à localiser les toilettes	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐
q) Ma vie est plus difficile	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐

Q4 : Au cours du dernier mois, vous êtes-vous senti(e) si triste ou découragé(e), ou avez-vous eu de telles difficultés que vous vous êtes demandé(e) si tout ceci valait la peine d'être vécu ?

☐ Absolument (au point de vouloir tout abandonner) (1); ☐ Tout à fait (2); ☐ Vraiment (3); ☐ Suffisamment pour me préoccuper (4); ☐ Un peu (5) ; ☐ Pas du tout (6).

INTERPRETATION DU QUESTIONNAIRE

L'interprétation du questionnaire se fait sur 5 échelles explorant différents aspects de la qualité de vie. Les chiffres les plus bas représentent la qualité de vie la plus médiocre et, à l'opposé, les chiffres les plus élevés, la qualité de vie la plus satisfaisante.

L'analyse de la qualité de vie peut être utilisée pour comparer des malades incontinents entre eux, mais également pour comparer le résultat d'actions thérapeutiques chez un malade donné, et de façon répétée dans le temps.

Echelle 1 — Elle évalue le comportement engendré par l'incontinence anale, notamment en rapport avec l'accès aux toilettes. 10 questions : 2 G, 2J, 2K, 2L, 2N, 3D, 3G, 3L, 3P, 3Q. Réponse minimale (qualité de vie la plus médiocre) = 10, Réponse maximale (qualité de vie la plus satisfaisante) = 40

Echelle 2 — Elle évalue les modifications dans le mode de vie : voyage, alimentation, activités extérieures. 12 questions : 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2H, 2I, 3A, 3C, 3N, 3O. Réponse minimale = 12, Réponse maximale (qualité de vie la plus satisfaisante) = 48

Echelle 3 — Elle évalue la dépression et l'estime de soi. 5 questions : 1, 3F, 3I, 3J, 4. Réponse minimale = 5, Réponse maximale = 14

Echelle 4 — Elle évalue l'état psychologique (honte du handicap) et les événements liés à la survenue d'épisodes d'incontinence anale. 4 questions : 2M, 3B, 3F, 3K. Réponse minimale = 4, Réponse maximale = 16

Echelle 5 — Elle évalue le retentissement de l'incontinence anale sur le comportement sexuel. 2 questions : 3J, 3M. Réponse minimale = 2, Réponse maximale = 8

Score total de qualité de vie = addition des 5 échelles. Réponse minimale (qualité de vie la plus médiocre) = 33, Réponse maximale (qualité de vie la plus satisfaisante) = 126

L'échelle des selles de Bristol permet d'estimer le degré de constipation.

L'échelle de Bristol (en anglais : Bristol Stool Scale) est une échelle visuelle répartissant les selles humaines en sept types. Elle a été développée à l'université de Bristol et a été initialement publiée en 1997 dans le Scandinavian Journal of Gastroenterology. La forme des selles dépend du temps qu'elles ont passé dans le côlon.



Les types 1 et 2 indiquent une constipation.

Les types 3 et 4 sont les selles idéales (en particulier le type 4, car ce sont les plus faciles à évacuer).

Les types 5 à 7 tendent de plus en plus vers la diarrhée.

SCORE DE CONSTIPATION (KESS)

1. Depuis combien de temps êtes-vous constipé(e)?	Entre 0 & 18 mois (0)	Entre 18 mois & 5 ans (1)	Entre 5 & 10 ans (2)	Entre 10 & 20 ans (3)	Plus de 20ans (4)	☐
2. Utilisez vous des médicaments laxatifs ?	Jamais (0)	Rare / courte période (1)	Fréquent / utilisation régulière (2)	En continu mais inefficaces (3)		☐
3. Allez vous à la selle (avec ou sans traitement) ?	Au moins 1 fois tous les 2 jours (0)	2 fois par semaine ou moins (1)	Moins d'une fois par semaine (2)	Moins d'une fois toutes les 2 semaines (3)		☐
4. Vous arrive-t-il d'avoir du mal à évacuer?	Jamais ou rarement (0)	De temps en temps (1)	Régulièrement (2)	Toujours ou en s'aidant (3)		☐
5. Avez vous l'impression d'évacuer incomplètement ?	Jamais (0)	Rarement (1)	De temps en temps (2)	Fréquemment (3)	Toujours (4)	☐
6. Avez vous des douleurs de ventre ?	Jamais (0)	Rarement (1)	De temps en temps (2)	Fréquemment (3)	Toujours (4)	☐
7. Avez vous des ballonnements de ventre ?	Jamais (0)	Uniquement perçus par vous-même (1)	Perçus par vos proches (2)	Fréquemment (3)	Toujours (4)	☐
8. Faites vous des lavements, mettez vous des suppositoires ou aidez vous de vos doigts pour évacuer ?	Jamais (0)	Lavements et suppositoires occasionnels (1)	Lavements et suppositoires réguliers (2)	Aide digitale occasionnelle (3)	Aide digitale fréquente (4)	☐
9. Combien de temps vous faut il en moyenne pour évacuer ?	Moins de 5 minutes (0)	5 à 10 minutes (1)	10 à 30 minutes (2)	Plus de 30 minutes (3)		☐
10. Avez vous des défécations difficiles et douloureuses?	Jamais (0)	Rarement (1)	De temps en temps (2)	Fréquemment (3)	Toujours (4)	☐
11. La consistance de vos selles est elle ?	Normale ou molle (0)	De temps en temps dure (1)	Toujours dure (2)	Dure comme des billes (3)		☐
12. Vous arrive-t-il d'avoir besoin d'aller la selle et de ne pas pouvoir évacuer ?	Jamais (0)	Rarement (1)	De temps en temps (2)	Toujours (3)		☐

Le score de KESS comporte au total 12 items portant sur l'ancienneté de la constipation, l'utilisation de laxatifs (± suppositoire ± lavements), la réalisation de manœuvres digitales, la fréquence des selles. Une constipation est retenue pour un score ≥ 10/39. Deux questions du score de KESS recherchent une éventuelle dyschésie associée.