The group G is isomorphic to the projective special linear group PSL(2,11).
Ordinary character table of $G \cong$ PSL(2,11):

	$1a$	$2a$	$3a$	$5a$	$5b$	$6a$	$11a$	$11b$
χ_1	1	1	1	1	1	1	1	1
χ_2	5	1	-1	0	0	1	$E(11)+E(11)^3+E(11)^4+E(11)^5+E(11)^9$	$E(11)^2+E(11)^6+E(11)^7+E(11)^8+E(11)^{10}$
χ_3	5	1	-1	0	0	1	$E(11)^2+E(11)^6+E(11)^7+E(11)^8+E(11)^{10}$	$E(11)+E(11)^3+E(11)^4+E(11)^5+E(11)^9$
χ_4	10	-2	1	0	0	1	-1	-1
χ_5	10	2	1	0	0	-1	-1	-1
χ_6	11	-1	-1	1	1	-1	0	0
χ_7	12	0	0	$E(5)+E(5)^4$	$E(5)^2+E(5)^3$	0	1	1
χ_8	12	0	0	$E(5)^2+E(5)^3$	$E(5)+E(5)^4$	0	1	1

Trivial source character table of $G \cong$ PSL(2,11) at $p = 2$:

Normalisers N_i	N_1						N_2		N_3		
p-subgroups of G up to conjugacy in G	P_1						P_2		P_3		
Representatives $n_j \in N_i$	$1a$	$3a$	$5a$	$5b$	$11a$	$11b$	$1a$	$3a$	$1a$	$3b$	$3a$
$1\cdot\chi_1+0\cdot\chi_2+0\cdot\chi_3+0\cdot\chi_4+0\cdot\chi_5+1\cdot\chi_6+0\cdot\chi_7+0\cdot\chi_8$	12	0	2	2	1	1	0	0	0	0	0
$0\cdot\chi_1+0\cdot\chi_2+1\cdot\chi_3+0\cdot\chi_4+0\cdot\chi_5+1\cdot\chi_6+0\cdot\chi_7+0\cdot\chi_8$	16	-2	1	1	$E(11)^2+E(11)^6+E(11)^7+E(11)^8+E(11)^{10}$	$E(11)+E(11)^3+E(11)^4+E(11)^5+E(11)^9$	0	0	0	0	0
$0\cdot\chi_1+1\cdot\chi_2+0\cdot\chi_3+0\cdot\chi_4+0\cdot\chi_5+1\cdot\chi_6+0\cdot\chi_7+0\cdot\chi_8$	16	-2	1	1	$E(11)+E(11)^3+E(11)^4+E(11)^5+E(11)^9$	$E(11)^2+E(11)^6+E(11)^7+E(11)^8+E(11)^{10}$	0	0	0	0	0
$0\cdot\chi_1+0\cdot\chi_2+0\cdot\chi_3+1\cdot\chi_4+1\cdot\chi_5+0\cdot\chi_6+0\cdot\chi_7+0\cdot\chi_8$	20	2	0	0	-2	-2	0	0	0	0	0
$0\cdot\chi_1+0\cdot\chi_2+0\cdot\chi_3+0\cdot\chi_4+0\cdot\chi_5+0\cdot\chi_6+1\cdot\chi_7+0\cdot\chi_8$	12	0	$E(5)+E(5)^4$	$E(5)^2+E(5)^3$	1	1	0	0	0	0	0
$0\cdot\chi_1+0\cdot\chi_2+0\cdot\chi_3+0\cdot\chi_4+0\cdot\chi_5+0\cdot\chi_6+0\cdot\chi_7+1\cdot\chi_8$	12	0	$E(5)^2+E(5)^3$	$E(5)+E(5)^4$	1	1	0	0	0	0	0
$1\cdot\chi_1+1\cdot\chi_2+1\cdot\chi_3+0\cdot\chi_4+0\cdot\chi_5+1\cdot\chi_6+0\cdot\chi_7+0\cdot\chi_8$	22	-2	2	2	0	0	2	2	0	0	0
$0\cdot\chi_1+0\cdot\chi_2+0\cdot\chi_3+0\cdot\chi_4+1\cdot\chi_5+0\cdot\chi_6+0\cdot\chi_7+0\cdot\chi_8$	10	1	0	0	-1	-1	2	-1	0	0	0
$1\cdot\chi_1+0\cdot\chi_2+0\cdot\chi_3+0\cdot\chi_4+0\cdot\chi_5+0\cdot\chi_6+0\cdot\chi_7+0\cdot\chi_8$	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
$0\cdot\chi_1+1\cdot\chi_2+0\cdot\chi_3+0\cdot\chi_4+0\cdot\chi_5+0\cdot\chi_6+0\cdot\chi_7+0\cdot\chi_8$	5	-1	0	0	$E(11)+E(11)^3+E(11)^4+E(11)^5+E(11)^9$	$E(11)^2+E(11)^6+E(11)^7+E(11)^8+E(11)^{10}$	1	1	1	$E(3)^2$	$E(3)$
$0\cdot\chi_1+0\cdot\chi_2+1\cdot\chi_3+0\cdot\chi_4+0\cdot\chi_5+0\cdot\chi_6+0\cdot\chi_7+0\cdot\chi_8$	5	-1	0	0	$E(11)^2+E(11)^6+E(11)^7+E(11)^8+E(11)^{10}$	$E(11)+E(11)^3+E(11)^4+E(11)^5+E(11)^9$	1	1	1	$E(3)$	$E(3)^2$

$P_1 = Group([()]) \cong 1$
$P_2 = Group([(2,4)(3,9)(5,10)(7,11)]) \cong$ C2
$P_3 = Group([(2,4)(3,9)(5,10)(7,11),(2,7)(3,9)(4,11)(6,8)]) \cong$ C2 x C2

$N_1 = Group([(2,10)(3,4)(5,9)(6,7),(1,2,11)(3,5,10)(6,8,9)]) \cong$ PSL(2,11)
$N_2 = Group([(2,4)(3,9)(5,10)(7,11),(1,8)(2,9)(3,4)(5,10),(2,7)(3,9)(4,11)(6,8)]) \cong$ D12
$N_3 = Group([(2,7)(3,9)(4,11)(6,8),(2,4)(3,9)(5,10)(7,11),(3,8,5)(4,7,11)(6,10,9)]) \cong$ A4