

GUIA SIMBAS • CÃO IDOSO

Ele não ficou calmo. Ele parou de fazer o que dói.

Os 12 sinais de dor que o seu cão não consegue te contar — e como observar cada um deles em casa, hoje, sem sair do lugar.

CHECKLIST PARA IMPRIMIR E LEVAR AO VETERINÁRIO

Cão não reclama de dor. Cão reduz.

Se alguém te perguntasse quando o seu cão ficou mais quieto, você provavelmente não saberia dizer. Não houve um dia. Houve meses.

É assim que a dor crônica funciona em cachorro. Ela não chega com grito nem com mancada evidente. Ela chega como uma lista de coisas que ele deixou de fazer — e cada uma dessas coisas some tão devagar que ninguém percebe a subtração.

Ele parou de subir na cama. Parou de correr até o portão. Parou de pedir para brincar. E a explicação que a gente dá é sempre a mesma, porque é a única que temos à mão: **envelheceu**.

Envelhecer deixa o cão mais lento. Não faz ele parar de fazer o que gosta.

Quando um comportamento desaparece por completo — e não só fica mais devagar — a pergunta certa não é "quantos anos ele tem?". É "o que dói quando ele faz isso?".

Você não é uma tutora ruim por não ter percebido. Ninguém percebe. A mudança é lenta de propósito, e o seu cão não tem nenhuma forma de te avisar além do próprio corpo.

Como usar este guia



Observe durante três dias, não agora

Vários sinais só aparecem no primeiro movimento da manhã ou depois de uma soneca longa. Deixe o guia à vista e vá marcando conforme perceber.



Marque o que mudou, não o que ele sempre foi

Um cão que nunca gostou de escada não conta. O que importa é o que ele fazia antes e não faz mais.



Leve o guia marcado à consulta

O veterinário vê o seu cão por vinte minutos, num ambiente estranho, onde a adrenalina mascara a dor. Você vê ele em casa. A sua observação vale muito.

Os 12 sinais

Marque tudo que mudou nos últimos meses. Não tente adivinhar a causa — só observe.

1 Como ele se move

observe de manhã

☐

Hesita antes de subir

Levanta a pata na direção do degrau, para no ar e desiste. Ou sobe, mas pensa antes.

☐

Parou de se espreguiçar ao acordar

Aquele alongamento de patas dianteiras e arqueada de costas simplesmente sumiu da rotina.

☐

Demora para levantar depois de deitado

Levanta em etapas: dianteira primeiro, pausa, e só então a traseira.

☐

Não sobe mais sozinho na cama ou no sofá

Espera ajuda, fica ao lado, ou desistiu de tentar e passou a dormir no chão.

2 O que o corpo mostra

observe com as mãos

☐

Lambe sempre o mesmo lugar

O pelo daquela região está mais escuro, ralo ou úmido. Cão lambe onde dói.

☐

Senta de forma torta

Joga o peso para um lado, deixa uma perna esticada para fora, ou não fecha o sentar.

☐

Ofega parado, sem calor e sem esforço

Respiração acelerada em repouso, num dia fresco, sem ter corrido.

☐

Se afasta ou enrijece quando você toca em certo ponto

Não precisa rosnar. Vira a cabeça, congela o corpo ou sai de perto.

3 O que mudou nele

observe no dia a dia

☐

Parou de te receber na porta

Continua feliz que você chegou — mas espera você ir até ele.

☐

Parou de pedir para brincar

O brinquedo continua ali. Ele não busca mais.

☐

Ficou mais irritado ou mais retraído

Rosna onde nunca rosnou, ou se esconde onde nunca se escondia. Dor muda humor.

☐

Come em pé, mais devagar, ou deixa comida

Abaixar a cabeça até o pote pode ser o movimento que dói.

Nenhum sinal isolado significa alguma coisa sozinho. O que importa é o conjunto — e, principalmente, a mudança em relação ao que ele era antes.

Some as marcas. É isso que você leva.

0–1

Provavelmente tranquilo

Guarde o guia e refaça em três meses. Cão idoso muda rápido, e a comparação entre duas leituras vale mais que uma leitura só.

2–4

Marque uma consulta

Não é emergência, mas também não é para esperar piorar. Leve este guia marcado e diga há quanto tempo cada item mudou.

5+

Consulta com prioridade

Muitos sinais juntos indicam que ele vem se adaptando há bastante tempo. Peça avaliação ortopédica e de dor especificamente.

Não espere consulta marcada se aparecer qualquer um destes

- Ele não consegue levantar, ou cai ao tentar
- Grita, chora ou tenta morder quando você encosta nele
- Parou de comer e de beber água
- Barriga inchada, tensa ou dolorida ao toque
- Respiração muito alterada, gengiva pálida ou arroxeada
- Tremores, desorientação ou incapacidade de se manter em pé

Nesses casos, procure atendimento veterinário de urgência no mesmo dia.

O que dizer na consulta

"Nos últimos meses ele parou de [o que sumiu]. Começou por volta de [quando]. Fica pior [de manhã / depois de deitado / no frio]. Marquei estes sinais em casa." — Essa frase vale mais que qualquer descrição vaga de que ele "está diferente".

E se o veterinário descartar dor?

Então a mudança de comportamento tem outra origem — e a mais comum de todas é o que acontece com ele quando você sai de casa. Se o seu cão chora, destrói ou faz xixi sempre nos primeiros minutos depois que a porta fecha, isso não é manha nem idade. Tem nome, tem protocolo e tem solução.

simbaspets.com.br