

Physics 213 Formula Sheet

Constants, Data, Definitions

$$0\text{ K} = -273.15\text{ }^{\circ}\text{C} = -459.67\text{ }^{\circ}\text{F}$$

$$N_A = 6.022 \times 10^{23} / \text{mole}$$

$$k = 1.381 \times 10^{-23} \text{ J/K} = 8.617 \times 10^{-5} \text{ eV/K}$$

$$R = kN_A = 8.314 \text{ J/mol}\cdot\text{K} = 8.206 \times 10^{-2} \text{ l}\cdot\text{atm/mol}\cdot\text{K}$$

$$1 \text{ atm} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa} \quad 1 \text{ liter} = 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$\text{STP} \rightarrow T = 0^{\circ}\text{C}; p = 1 \text{ atm}$$

$$h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s} = 4.136 \times 10^{-15} \text{ eV}\cdot\text{s}$$

$$\hbar = h/2\pi = 1.055 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$$

$$1 \text{ eV} = 1.602 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$c = 2.998 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$\mu_e = 9.2848 \times 10^{-24} \text{ J/T}$$

$$m_e = 9.109 \times 10^{-31} \text{ kg}$$

$$g = 9.8 \text{ m/s}^2$$

$$\mu_p = 1.4106 \times 10^{-26} \text{ J/T}$$

$$m_p = 1836 m_e$$

$$= 1.673 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

For oscillators

$$\langle E \rangle = \sum_{n=0}^{\infty} E_n P_n = \frac{\epsilon}{e^{\epsilon/kT} - 1}$$

Fundamental Laws/Principles:

$$\text{First law: } dU = dQ + dW$$

$$\text{Second Law: } d\sigma/dt \geq 0$$

$$P_i \propto \Omega_i = e^{\sigma_i}$$

$$\text{Classical equipartition } \langle \text{energy} \rangle = \frac{1}{2} kT \text{ per quadratic term}$$

$$\text{Entropy \& Temperature: } S = k\sigma = k \ln \Omega; \quad \frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial U} \right)_{V,N}$$

$$\text{Heat Capacities: } C_V = (\partial U / \partial T)_V; \quad C_p = (\partial (U + pV) / \partial T)_p$$

Special properties of \alpha-ideal gases

$$U = \alpha NkT = \alpha nRT \quad pV = NkT \quad p_{\text{tot}} = p_1 + p_2 + \dots$$




$$C_V = \alpha Nk = \alpha nR \quad C_p = C_V + Nk \quad n = \# \text{ moles} = N/N_A$$

$$c_p/c_V = (\alpha + 1)/\alpha = \gamma \quad W_{\text{by}} = NkT \ln(V_f/V_i)$$

$$\text{绝热时 } VT^{\alpha} = \text{const.}, \text{ or } pV^{\gamma} = \text{const.}, \gamma = (\alpha + 1)/\alpha$$

$$W_{\text{by}} = \alpha Nk (T_1 - T_2) = \alpha (p_1 V_1 - p_2 V_2)$$

$$\Delta S = C_V \ln(T_f/T_i) + Nk \ln(V_f/V_i)$$

	α	γ
	3/2	5/3
	5/2	7/5
	3	4/3

Processes, Heat Engines, etc

$$\Delta U = Q - W_{\text{by}} \quad W_{\text{by}} = \int p dV$$

$$\text{Quasistatic: } dS = dQ/T \text{ so } \Delta S = \int (C/T) dT$$

$$dQ = dU + p dV$$

$$\epsilon_{\text{Carnot}} = 1 - T_C/T_H$$

$$\Delta S = \int_{T_i}^{T_f} \frac{1}{T} dU, \quad \Delta U = \int_{T_i}^{T_f} C_V(T) dT, \quad \Delta S = \int_{T_i}^{T_f} \frac{C_V(T)}{T} dT$$

Freezing/Melting: $L_F = T_F (S_L - S_S)$ 此过程 G 不变?
Boiling/Evaporation: $L_B = T_B (S_G - S_L)$

Diffusion and Heat Conduction

$$D = (\ell^2/3\tau) = v\ell/3 \quad \tau = \ell/v$$

$$\langle x^2 \rangle = 2Dt \quad \langle r^2 \rangle = 6Dt$$

$$J_x = \kappa \Delta T / \Delta x, \quad \kappa = D_{\text{HC}} \text{ where } c = C_V/V$$

$$H_x = J A = \Delta T / R_{\text{th}} \quad R_{\text{th}} = d/\kappa A$$

$$\Delta L/L = \alpha \Delta T$$

$$T_A(t) = T_f + (T_{A0} - T_f) e^{-t/\tau}, \quad \tau = R_{\text{th}} C_A$$

Spins

$$\Omega(N, N_{\text{up}}) = \frac{N!}{N_{\text{up}}! N_{\text{down}}!} = \frac{N!}{N_{\text{up}}! (N - N_{\text{up}})!}; \quad \Omega(m) = 2^N \sqrt{\frac{2}{\pi N}} e^{-m^2/2N}; \quad P(m) = \Omega(m) / 2^N$$

$$M = (N_{\text{up}} - N_{\text{down}}) \mu = m\mu, \quad M = N\mu \tanh(\mu B/kT)$$

SHO

$$P_n = (1 - e^{-\epsilon/kT}) e^{-n\epsilon/kT}; \quad \langle E \rangle = \epsilon / (e^{\epsilon/kT} - 1) \quad \epsilon = hf; \quad \Omega = \frac{(q + N - 1)!}{q!(N - 1)!}$$

Counting, Bin Statistics, Entropy

	Occupancy (N << M)		
Ω	Unlimited	Single	Dilute
Distinct	M^N	$\frac{M!}{(M-N)!}$	M^N
Identical	$\frac{(N+M-1)!}{N!(M-1)!}$	$\frac{M!}{(M-N)!N!}$	$\frac{M^N}{N!}$

$$\ln N! \approx N \ln N - N$$

Equilibrium

$$U = \sum_i \epsilon_i P_i + \sum_i \epsilon_i P_i + \dots \quad \text{Boltzmann: } P_n = \frac{d_n e^{-\epsilon_n/kT}}{Z}; \quad Z = \sum_i d_i e^{-\epsilon_i/kT} \quad G = \mu N$$

$$\text{Free energies: } F = U - TS \quad G = U - TS + pV$$

$$\text{Chemical potential: } \mu = \left(\frac{\partial F}{\partial N} \right)_{V,T} = \left(\frac{\partial G}{\partial N} \right)_{p,T}; \quad \text{equilibrium } \sum_i (\Delta N_i) \mu_i = 0$$

$$\mu_i = kT \ln(n_i/n_{Ti}) - \Delta_i \text{ (ideal gas)}$$

$$n_Q = (2\pi mkT/h^2)^{3/2} = (10^{30} \text{ m}^{-3}) (m/m_p)^{3/2} (T/300\text{K})^{3/2}$$

$$\text{Semiconductors } n_e n_h = n_i^2; \quad n_i = n_Q e^{-\Delta/2kT}$$

Thermal Radiation

$$J = \sigma_B T^4, \quad \sigma_B = 5.670 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2 \text{ K}^4 \quad \lambda_{\text{max}} T = 0.0029 \text{ m}\cdot\text{K}$$

$$dS = \frac{1}{T} dU + \frac{p}{T} dV - \frac{\mu}{T} dN$$

Fall 2010

change boiling/freezing point

$$dT_B = \frac{kT_B^2}{P(L_B/N)} dP$$


$$dT_F = - \frac{N_S}{N} \frac{kT_F^2}{(F_F/N)}$$

$$m = N_{\text{up}} - N_{\text{down}} \quad \left| = \frac{1.381 \times 10^{-23} \cdot 373.15^2}{101300 \cdot (2.25 \times 10^6)} \right.$$

$$\frac{1}{0.018} \cdot (6.022 \times 10^{23})$$

Particle mass/mol

N ₂	28g
O ₂	32g
He	4g
Ar	40g
CO ₂	44g
H ₂	2g
Si	28g
Ge	73g
Cu	64g
Al	27g
1g	= 10 ⁻³ kg



$$a\mu_A + b\mu_B = c\mu_C$$

$$\frac{n_c^c}{n_a^a n_b^b} = \frac{n_c^c}{n_a^a n_b^b} e^{c\Delta/kT}$$

$$\frac{N_{\text{solute}}}{N_{\text{solvent}}} = e^{-\frac{\Delta}{kT}}$$

$$Q = H$$

$$\Delta S = \int_{T_i}^{T_f} \frac{1}{T} dU, \quad \Delta U = \int_{T_i}^{T_f} C_V(T) dT, \quad \Delta S = \int_{T_i}^{T_f} \frac{C_V(T)}{T} dT$$