

Devoir du 20/03/2021

Exercice : Déterminer les développements limités suivants :

1. A l'ordre 3 en 0 de $f : x \mapsto \frac{1}{(x+3)(1-x)}$.
2. A l'ordre 2 en 0 de $f : x \mapsto \frac{x^2 + x - \sin x}{\ln(1+x)}$.
3. A l'ordre 2 en 1 de $f : x \mapsto \frac{x \ln x}{x^2 - 1}$.
4. A l'ordre 4 en 0 de $f : x \mapsto \sqrt{1-x} - \sqrt{1+x}$.
5. A l'ordre 4 en 0 de $f : x \mapsto \ln\left(\frac{1}{\cos x}\right)$.

Problème 1 :

Dans la suite E est un \mathbb{K} -espace vectoriel et u un endomorphisme de E .

On dit que u est nilpotent s'il existe un entier k tel que $u^k = 0$.

Si F est un sous-espace vectoriel de E stable par u , alors $u_F : F \rightarrow F, x \mapsto u(x)$ est un endomorphisme appelé endomorphisme induit par u sur F .

Pour tout entier n , on note $I_n = \text{Im}(u^n)$ et $K_n = \text{Ker}(u^n)$.

Enfin, on note $I = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n$ et $K = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} K_n$.

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. Prouver que $I_{n+1} \subset I_n$ et $K_n \subset K_{n+1}$.
2. (a) Montrer que I et K sont des sous-espaces vectoriels de E et qu'ils sont stables par u .
(b) Prouver que u est injectif si, et seulement si, $K = \{0\}$.
(c) Prouver que u est surjectif si, et seulement si, $I = E$.
3. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Prouver les équivalences suivantes :

$$\text{Ker} f = \text{Ker} f^2 \iff \text{Im} f \cap \text{Ker} f = \{0\}$$

$$\text{Im} f = \text{Im} f^2 \iff \text{Im} f + \text{Ker} f = E$$

4. On suppose dans cette question uniquement qu'il existe un entier n_0 tel que $K_{n_0} = K_{n_0+1}$.
(a) Prouver que pour tout entier p , on a $K_{n_0+p} = K_{n_0}$.
(b) Justifier qu'il existe un plus petit entier s tel que $K_s = K_{s+1}$.
(c) Prouver que u_K est nilpotent, que $I_s \cap K = \{0\}$ et que u_I est injectif.
(d) Déterminer le plus petit entier p tel que $u_K^p = 0$.
5. On suppose dans cette question uniquement qu'il existe un entier n_1 tel que $I_{n_1} = I_{n_1+1}$.
(a) Prouver que pour tout entier p , on a $I_{n_1+p} = I_{n_1}$.
(b) Soit r le plus petit entier tel que $I_r = I_{r+1}$. Montrer que u_I est surjectif et que $E = I + K_r$.

On dit que u est de caractère fini s'il existe des entiers r et s tels que $I_r = I_{r+1}$ et $K_s = K_{s+1}$. Dans la suite, on supposera ces entiers choisis les plus petits possibles.

6. Montrer que si u est de caractère fini, alors $E = I \oplus K$, u_K est nilpotent et u_I est un automorphisme.
7. (a) Montrer les implications suivantes :

$$\left\{ \begin{array}{l} I_n = I_{n+1} \\ K_{n+1} = K_{n+2} \end{array} \right. \Rightarrow K_{n+1} = K_n \quad \text{et} \quad \left\{ \begin{array}{l} K_n = K_{n+1} \\ I_{n+1} = I_{n+2} \end{array} \right. \Rightarrow I_{n+1} = I_n$$

- (b) Prouver que si u est de caractère fini, alors $r = s$.

8. Montrer que si F et G sont des sous-espaces vectoriels de E vérifiant :

- $E = F + G$,
- F et G sont stables par u ,
- u_G est nilpotent et u_F est bijectif,

alors u est de caractère fini, $G = K$ et $F = I$.

Problème 2 :

Soit $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite de polynômes de $\mathbb{R}[X]$ définie par :
 $T_0(X) = 1$, $T_1(X) = X$ et $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $T_{n+1}(X) = 2XT_n(X) - T_{n-1}(X)$.

I. Étude de la suite des polynômes $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$:

1. Déterminer le degré, la parité et le coefficient dominant de T_m pour $m \in \mathbb{N}^*$.
2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que la famille (T_0, T_1, \dots, T_n) est une base de $\mathbb{R}_n[X]$.
3. Établir par récurrence $\forall x \in \mathbb{R}$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $T_n(\cos(x)) = \cos(nx)$
4. (a) Pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$, résoudre dans $[0, \pi]$, l'équation $T_n(\cos(x)) = 0$.
(b) En déduire la décomposition de T_n en facteurs irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$.

II. A. Étude d'un produit scalaire sur $\mathbb{R}[X]$:

À tout couple (P, Q) de polynômes de $\mathbb{R}[X]$, on associe l'intégrale suivante :

$$\phi(P, Q) = \int_0^\pi P(\cos(x)) Q(\cos(x)) \, dx.$$

1. Soit $(p, q) \in \mathbb{N}^2$ tel que $p \neq q$. Calculer $\phi(T_p, T_q)$.
2. En déduire que pour tout $Q \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$, $\phi(T_n, Q) = 0$.
3. En déduire que $\phi(T_n, X^n) = \frac{\pi}{2^n}$.

II. B. Calcul exact d'une intégrale :

Dans toute la suite, on fixe $n \in \mathbb{N}^*$ et pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on pose $x_k = \frac{2k-1}{2n}\pi$.

À tout polynôme $P \in \mathbb{R}[X]$, on associe

$$I(P) = \int_0^\pi P(\cos x) \, dx \quad \text{et} \quad S_n(P) = \frac{\pi}{n} \sum_{k=1}^n P(\cos(x_k))$$

1. (a) Pour $p \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, calculer $I(T_p)$ et $S_n(T_p)$.
(b) En déduire que pour tout $P \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$, on a $I(P) = S_n(P)$.
2. Soit $P \in \mathbb{R}_{2n-1}[X]$. On note Q et R le quotient et le reste de la division Euclidienne de P par T_n .
(a) Montrer que $Q \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$ et en déduire à l'aide de II.A que $I(P) = I(R)$.
(b) En déduire que, $I(P) = S_n(P)$.

III. Calcul approché d'une intégrale :

À toute fonction f continue sur $[-1, 1]$, on associe

$$I(f) = \int_0^\pi f(\cos x) \, dx \quad \text{et} \quad S_n(f) = \frac{\pi}{n} \sum_{k=1}^n f(\cos(x_k))$$

On admet (théorème sur les sommes de Riemann) que $I(f) = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n(f)$.

Soit $f : t \mapsto \ln(a^2 - 2at + 1)$ où $a \in \mathbb{R}^{+*} \setminus \{1\}$.

1. Montrer que f est continue sur $[-1, 1]$.
2. Déterminer la factorisation en irréductibles de $X^{2n} + 1$ dans $\mathbb{C}[X]$.
3. En déduire celle de $X^{2n} + 1$ dans $\mathbb{R}[X]$. On fera apparaître les réels x_k .
4. Montrer que $S_n(f) = \frac{\pi}{n} \ln(a^{2n} + 1)$.
5. En déduire la valeur de $I(f)$. On distinguera les cas $a \in]0, 1[$ et $a > 1$.
6. Donner, suivant les cas, un équivalent de $S_n(f) - I(f)$ quand n tend vers $+\infty$.