


# Cualificador de riesgo de esguince lateral de tobillo



**UNIVERSIDAD DE  
SAN BUENAVENTURA**

**Camilo Andrés Cortés Garzón  
Daniel Steven Betancourt Correa  
Gian Lucas Cerquera Villanueva**

Universidad de San Buenaventura sede Bogotá  
Facultad de Ingeniería  
Programa de Ingeniería Mecatrónica  
Bogotá D.C., Colombia  
2019



# **Cualificador de riesgo de esguince lateral de tobillo**

**Camilo Andrés Cortés Garzón  
Daniel Steven Betancourt Correa  
Gian Lucas Cerquera Villanueva**

Director del trabajo de grado:  
**Edwin Nikolay Prieto**

Universidad de San Buenaventura sede Bogotá  
Facultad de Ingeniería  
Programa de Ingeniería Mecatrónica  
Bogotá D.C., Colombia  
2019



# Dedicatoria

Opcional... .



# Agradecimientos

Opcional...





# Contenido

1.1	Justificación . . . . .	3
1.2	Problema . . . . .	3
1.3	Pregunta problema . . . . .	3
1.4	Objetivos . . . . .	3
1.4.1	Objetivo General . . . . .	3
1.4.2	Objetivos Específicos . . . . .	4
1.5	Alcances y limitaciones . . . . .	4
1.6	Marco conceptual . . . . .	4
1.6.1	Introducción . . . . .	4
1.6.2	Antecedentes . . . . .	5
1.7	Consideraciones teóricas . . . . .	6
1.8	Metodología . . . . .	7
1.9	Cronograma . . . . .	7
	<b>Bibliografía</b>	<b>8</b>



# 1

## 1.1. Justificación

El sistema locomotor del humano constantemente realiza movimientos de forma automática (como es el caso de caminar y correr) en superficies regulares e irregulares, así pues, el tobillo al ser la articulación que une la tibia con los huesos del pie, constantemente se somete a distintas magnitudes físicas en diferentes direcciones, por lo tanto, cuando el tobillo es sometido a una fuerza mayor a la que puede soportar genera una lesión esguince tobillo. Dicha lesión es uno de los problemas más comunes en deportistas y en el diario vivir de las personas, provocando dolor, limitaciones funcionales y inestabilidad crónica.

## 1.2. Problema

En la actualidad para cuantificar la inestabilidad del tobillo, se hace uso de la herramienta conocida como CAIT la cual consiste en un cuestionario cuyas opciones se les asigna un peso, consecuentemente se suman para finalmente determinar el diagnóstico del paciente. Sin embargo, estos resultados dependen del juicio y la interpretación de los usuarios, lo cual puede generar incertidumbre a la hora de cuantificar la inestabilidad del tobillo.

## 1.3. Pregunta problema

¿Cómo determinar un peso adecuado de las variables que más influyen en la cuantificación de riesgo de esguince lateral de tobillo usando algoritmos de reducción de dimensiones?

## 1.4. Objetivos

### 1.4.1. Objetivo General

Determinar un algoritmo de inteligencia artificial para cualificar el riesgo de padecer una lesión de esguince lateral de tobillo.

### 1.4.2. Objetivos Específicos

- Identificar propiedades y condiciones en la marcha en personas que no han sufrido de un esguince lateral de tobillo como referencia.
- Identificar propiedades y condiciones en la marcha en personas que han sufrido de un esguince lateral de tobillo.
- Diseñar la estructura de inteligencia artificial mas adecuado para la cualificación basada en los datos adquiridos por el laboratorio de marcha.
- Verificar y comprobar los datos obtenidos por el algoritmo con el fin de cualificar el estado de una persona para padecer de esguince lateral de tobillo.

## 1.5. Alcances y limitaciones

## 1.6. Marco conceptual

### 1.6.1. Introducción

El esguince de tobillo es por lejos una de las lesiones más comunes para el cuerpo humano tanto en la población general como en la vida de los deportistas, ya que esta articulación está involucrada en la mayoría de las tareas cotidianas. Comprende el 15 % de todas las lesiones relacionadas con el deporte, según la revista de la Universidad Industrial de Santander y la Facultad de Medicina de la Universidad la Salle de México (?) precisan una relación de incidencia de 1:10000 personas diarias afectadas en el mundo, lo cual se traduce en 1,7 millones de habitantes colombianos que padecen esguince de tobillo, siendo la más frecuente la lesión de tobillo de ligamento lateral (“Lateral ankle spring” - LAS). Esta se produce cuando una carga excede los límites de tensión en el complejo ligamentoso lateral, pero no llega a romper los ligamentos o a fracturar los huesos en esta zona, ocasionando problemas en una buena ejecución de la locomoción de la marcha, los cuales se ven reflejados en daños de las neuronas aferentes y en una reorganización sensoriomotora en la interacción pie-superficie como lo demuestran estudios de análisis de marcha posteriores al trauma.

Para el tratamiento de lesión de LAS existe un protocolo básico orientado principalmente a la disminución del edema y dolor para lograr una movilización y apoyo temprano, esta se realiza de forma secuencial, durante las fases de inflamación, reparación y remodelación, reevaluando la gravedad de la lesión. Sin embargo, según el estudio realizado por la “Escuela de Salud Pública, Fisioterapia y Ciencias del Deporte” y “University College Dublin” en Dublín, Irlanda, en el artículo “Gait Biomechanics in Participants, Six Months

after First-time Lateral Ankle Sprain” se obtuvo un resultado de casi el 50 % de pacientes que desarrollan una inestabilidad crónica del tobillo (“chronic ankle instability” - CAI) las cuales pueden ser inestabilidad mecánica o inestabilidad funcional. La inestabilidad mecánica es debido principalmente a un cambio en la elasticidad de los ligamentos que causa movimientos más allá de fisiológicamente permisibles mientras que la inestabilidad funcional es más de carácter sensorial al percibir desequilibrio debido a un déficit neuromuscular.

Para identificar qué personas padecen CAI existen diferentes métodos como la herramienta de inestabilidad del tobillo de Cumberland (“Cumberland ankle instability tool” - CAIT) sin embargo al ser una herramienta de carácter subjetiva, carece de exactitud. Por consiguiente, mediante un enfoque mecatrónico se pretende complementar la herramienta CAIT para determinar el nivel de inestabilidad del tobillo. Se implementará un algoritmo basado en principios de la inteligencia artificial con el fin de poder clasificar el riesgo que posee un paciente posterior a la lesión de padecer nuevamente un esguince de tobillo lateral.

### 1.6.2. Antecedentes

En los últimos años la inteligencia artificial ha adquirido alto protagonismo en diferentes campos de investigación y desarrollo tales como el sector de comercio, arquitectura, diseño, comercio electrónico y la medicina. Dentro del campo de la medicina se han desarrollado distintas aplicaciones con las cuales se han mejorado procesos como los que se muestran a continuación:

- En Polonia se realizó un estudio mediante el cual se encontró ventajas en la utilización de inteligencia artificial para el monitoreo de la recuperación de una lesión en el tendón de Aquiles. Mediante redes neuronales convolucionales se distinguieron los tendones sanos de los heridos obteniendo un 97 % de precisión. Adicionalmente, se determinaron estimaciones de curvas de curación con las capas intermedias de la CNN las cuales pueden ser utilizadas por profesionales para realizar una evaluación precisa del daño del paciente.
- En 2019 la revista BURNS publicó un artículo titulado “Inteligencia artificial y aprendizaje automático para predecir la lesión renal aguda en quemaduras de pacientes con quemaduras graves: una prueba de concepto”, en el cual se desarrollaron modelos de machine learning utilizando el algoritmo k-nearest neighbor, logrando

así un porcentaje de precisión del 90-100 % de los pacientes que padecían lesión renal aguda

Para identificar qué personas padecen CAI existen diferentes métodos como la herramienta de inestabilidad del tobillo de Cumberland (“Cumberland ankle instability tool” - CAIT) que mediante un cuestionario de 9 preguntas busca principalmente medir la inestabilidad funcional de un paciente que ha padecido LAS.

El CAIT surge de la derivación de cuestionarios antecedentes como el FAIQ (Functional Ankle Instability Questionnaire) y el AJFAT (Ankle Joint Functional Assessment Tool) que en un primer momento permitieron medir el grado de inestabilidad de un paciente mediante una comparación con el tobillo sano. Se derivaron preguntas de dichos estudios y de grupos focales de inestabilidad crónica con los cuales se determinaron 12 preguntas. Posteriormente, fueron reducidas a 9 luego de algunas pruebas donde se eliminaron preguntas que mostraron no tener gran relación.

La validez del CAIT se realizó mediante una comparación con la escala funcional de extremidad inferior (LEFS) dado que no existía un evaluador de estabilidad funcional hasta el momento. EL LEFS mide la función de las extremidades inferiores permitiendo ver con facilidad los cambios producidos en algún miembro inferior incluyendo anomalías derivadas de una lesión. Adicionalmente se incluyó una escala analógica visual de 10cm para reforzar el puntaje de dolor. Finalmente se validó la construcción por artículos y personas mediante el análisis de Rasch. El análisis de Rasch proporciona intervalos y crea jerarquías para cada elemento y persona. Funciona con estadísticas de bondad de ajuste para garantizar la suposición que se le asigna, en este caso que los pacientes con mayor estabilidad tengan mas probabilidades de obtener un puntaje alto.

Sin embargo al ser una herramienta de carácter subjetiva, carece de exactitud. Por consiguiente, mediante un enfoque mecatrónico se pretende complementar la herramienta CAIT para determinar el nivel de inestabilidad del tobillo. Se implementará un algoritmo basado en principios de la inteligencia artificial con el fin de poder clasificar el riesgo que posee un paciente posterior a la lesión de padecer nuevamente un esguince de tobillo lateral.

## 1.7. Consideraciones teóricas

Estructura del tobillo:

La articulación del tobillo es de tipo deslizante y se compone de la unión de los huesos tibia y fíbula con el hueso astrágalo del pie. La unión está delimitada principalmente por los ligamentos ubicados entre la tibia y la fíbula evitando que estos huesos se separen, también cuenta con sus correspondientes ligamentos colaterales. El movimiento significativo en esta articulación es dorsiflexión y flexión plantar. Sin embargo, también existen la evasión y la inversión en esta unión que son movimientos más limitados, pero con gran relevancia en el análisis de un esguince de tobillo lateral.

Un esguince de tobillo lateral o LAS por sus siglas en inglés (Lateral ankle spring) sucede cuando en la articulación del tobillo existe una inversión (abducción) que fuerza el ligamento lateral exterior de tal forma que supera una tensión admisible, con posibles rupturas de las fibras del tendón. Por lo general se produce una equimosis y hematoma produciendo dolor y dificultando la estabilidad, por ende, la marcha del paciente. Un esguince lateral puede llegar a ser de tercer grado, en cuyo caso existe una ruptura completa del ligamento.

Inteligencia artificial:

Es a ramificación del campo de la informática que busca recrear comportamientos inteligentes en máquinas. Dentro de esta área existe lo que se denomina Machine learning que es el subcampo dentro de la inteligencia artificial que propone generar algoritmos para que las máquinas no solo puedan imitar estas actividades, sino que también puedan aprender a hacerlas. Desarrollar dichas tareas implica una selección apropiada del método de solución que depende directamente de lo que se proponga realizar. La robótica, el Natural Language processing o los comandos de voz son solo algunas de las aplicaciones más recurridas dentro del machine learning.

Algunos de los principales algoritmos del Machine learning son los siguientes:

- 1. Regresión
- 2. Bayesianos
- 3. Agrupación
- 4. Árbol de decisión
- 5. Redes neuronales
- 6. Reducción de dimensión

- 7. Aprendizaje profundo

## **1.8. Metodología**

## **1.9. Cronograma**