

Maths – MPI

Romain Bricout

18 juin 2025

## Introduction

Ce document réunit l'ensemble de mes cours de Mathématiques de MPI, ainsi que les exercices les accompagnant. Le professeur était M. Walbron. J'ai adapté certaines formulations me paraissant floues ou ne me plaisant pas mais le contenu pur des cours est strictement équivalent.

Les éléments des tables des matières initiale et présentes au début de chaque chapitre sont cliquables (amenant directement à la partie cliquée). C'est également le cas des références à des éléments antérieurs de la forme, par exemple, « Démonstration 5.22 ».

Cette version contient, en plus des cours imprimés distribués durant l'année, toutes les démonstrations qui vont avec. Voir l'autre version pour n'avoir que les cours bruts.

# Table des matières

<b>I</b>	<b>Cours</b>	<b>12</b>
<b>1</b>	<b>Espaces vectoriels normés</b>	<b>13</b>
1.1	Bornes supérieures, bornes inférieures . . . . .	14
1.1.1	Borne supérieure d'une partie de $\mathbb{R}$ . . . . .	14
1.1.2	Borne supérieure d'une application à valeurs dans $\mathbb{R}$ . . . . .	16
1.1.3	Règles pratiques . . . . .	16
1.2	Normes. . . . .	17
1.2.1	Définition . . . . .	17
1.2.2	Exemples fondamentaux . . . . .	18
1.2.3	Normes équivalentes . . . . .	20
1.2.4	Boules . . . . .	23
1.2.5	Parties bornées . . . . .	26
1.3	Convergence des suites . . . . .	31
1.3.1	Définition . . . . .	31
1.3.2	Propriétés usuelles . . . . .	32
1.3.3	Cas particulier en dimension finie . . . . .	34
1.3.4	Point adhérent à une partie . . . . .	36
1.4	Limites de fonctions . . . . .	39
1.4.1	Définition . . . . .	39
1.4.2	Caractérisation séquentielle de la limite . . . . .	39
1.4.3	Propriétés usuelles . . . . .	40
1.4.4	Cas particulier de la dimension finie . . . . .	41
1.4.5	Composition des limites . . . . .	42

1.4.6	Extensions des définitions . . . . .	42
1.5	Fonctions continues . . . . .	43
1.5.1	Continuité en un point . . . . .	43
1.5.2	Continuité sur une partie . . . . .	44
1.5.3	Cas particulier de la dimension finie . . . . .	44
1.5.4	Fonctions lipschitziennes . . . . .	45
1.5.5	Continuité des applications linéaires et $n$ -linéaires . . . . .	47
1.5.6	Norme subordonnée . . . . .	54
1.6	Topologie d'un espace vectoriel normé. . . . .	58
1.6.1	Intérieur d'une partie, voisinage d'un point . . . . .	58
1.6.2	Parties ouvertes . . . . .	60
1.6.3	Parties fermées . . . . .	61
1.6.4	Ouverts ou fermés relatifs à une partie . . . . .	66
1.6.5	Image réciproque d'un ouvert ou d'un fermé par une fonction continue . . . . .	66
1.6.6	Frontière d'une partie . . . . .	69
1.7	Compacité . . . . .	69
1.7.1	Valeurs d'adhérence d'une suite . . . . .	69
1.7.2	Théorème de Bolzano-Weierstrass . . . . .	71
1.7.3	Parties compactes . . . . .	73
1.7.4	Théorème des bornes atteintes . . . . .	77
1.8	Connexité par arcs . . . . .	82
1.8.1	Chemin . . . . .	82
1.8.2	Parties connexes par arcs . . . . .	83
1.8.3	Théorème des valeurs intermédiaires . . . . .	84

## 2 Séries numériques et vectorielles : révisions et compléments 86

2.1	Rappels . . . . .	86
2.1.1	Définitions et notations . . . . .	86
2.1.2	Convergence d'une série . . . . .	87
2.1.3	Lien entre convergence de suites et convergence de séries . . . . .	88

2.2	Séries réelles à termes positifs . . . . .	89
2.2.1	Théorème de Cesàro . . . . .	93
2.2.2	Théorème de comparaison par domination de séries à termes positifs . . . . .	94
2.2.3	Théorème de comparaison par équivalence de séries à termes positifs . . . . .	96
2.2.4	Théorème de comparaison série - intégrale . . . . .	98
2.3	Séries absolument convergentes . . . . .	102
2.3.1	Lien entre absolue convergence et convergence . . . . .	102
2.3.2	Un exemple fondamental : l'exponentielle de matrice . . . . .	103
2.3.3	Extension des résultats par comparaison . . . . .	103
2.3.4	Produit de Cauchy de deux séries absolument convergentes . . . . .	105
2.4	Séries alternées . . . . .	107
<b>3</b>	<b>Familles sommables</b>	<b>109</b>
3.1	Sommes finies . . . . .	109
3.1.1	Définition . . . . .	109
3.1.2	Propriétés . . . . .	112
3.2	Conventions de calcul dans $\mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$ . . . . .	113
3.3	Somme d'une famille de réels positifs . . . . .	114
3.3.1	Propriétés . . . . .	115
3.3.2	Théorème de sommation par paquets . . . . .	116
3.3.3	Théorème de Fubini . . . . .	116
3.4	Familles sommables dans un espace vectoriel normé de dimension finie . . . . .	117
3.4.1	Définitions . . . . .	117
3.4.2	Propriétés . . . . .	119
3.4.3	Théorème de sommation par paquets . . . . .	120
3.4.4	Théorème de Fubini . . . . .	122
3.4.5	Produit de Cauchy de deux séries . . . . .	124
<b>4</b>	<b>Rappels et compléments d'algèbre linéaire</b>	<b>126</b>

4.1	Sommes de sous-espaces vectoriels . . . . .	127
4.1.1	Généralités . . . . .	127
4.1.2	Sommes directes . . . . .	127
4.1.3	Sous-espaces supplémentaires . . . . .	129
4.1.4	Cas particulier de deux sous-espaces . . . . .	133
4.1.5	Applications linéaires et sommes directes . . . . .	133
4.2	Somme de sous-espaces vectoriels en dimension finie. . . . .	134
4.2.1	Base adaptée à un sous-espace . . . . .	134
4.2.2	Sommes directes et bases . . . . .	135
4.2.3	Dimension d'une somme de sous-espaces vectoriels . . . . .	135
4.2.4	Sous-espaces supplémentaires . . . . .	137
4.2.5	Dimension d'une somme de deux sous-espaces vectoriels . . . . .	139
4.3	Polynômes d'endomorphismes et de matrices. . . . .	139
4.3.1	$\mathbb{K}$ -algèbres . . . . .	139
4.3.2	Cas particulier des algèbres $\mathcal{L}(E)$ ou $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ . . . . .	141
4.3.3	Polynôme annulateur d'une matrice ou d'un endomorphisme . . . . .	141
4.3.4	Utilisation pratique d'un polynôme annulateur . . . . .	144
4.4	Matrices semblables, trace. . . . .	151
4.4.1	Trace d'une matrice . . . . .	151
4.4.2	Matrices semblables . . . . .	151
4.4.3	Trace d'un endomorphisme . . . . .	152
4.5	Opérations par blocs . . . . .	153
4.5.1	Cas général . . . . .	153
4.5.2	Cas particuliers des matrices carrées . . . . .	154
4.5.3	Interprétation des blocs . . . . .	154

## 5 Réduction des endomorphismes 157

5.1	Éléments propres d'un endomorphisme . . . . .	158
5.1.1	Valeurs propres et vecteurs propres . . . . .	158
5.1.2	Lien avec les polynômes annulateurs . . . . .	159

5.1.3	Sous-espaces propres . . . . .	161
5.2	Polynôme caractéristique d'un endomorphisme . . . . .	163
5.2.1	Caractérisation des valeurs propres en dimension finie . . . . .	163
5.2.2	Définition et lien avec les valeurs propres . . . . .	163
5.2.3	Ordre de multiplicité et dimension du sous-espace propre . . . . .	166
5.2.4	Endomorphisme scindé . . . . .	167
5.3	Éléments propres d'une matrice carrée . . . . .	168
5.3.1	Valeurs propres et vecteurs propres . . . . .	168
5.3.2	Lien avec les polynômes annulateurs . . . . .	169
5.3.3	Sous-espaces propres . . . . .	169
5.4	Polynôme caractéristique d'une matrice carrée . . . . .	170
5.4.1	Définition et lien avec les valeurs propres . . . . .	170
5.4.2	Ordre de multiplicité et dimension du sous-espace propre . . . . .	172
5.4.3	Matrice scindée . . . . .	172
5.5	Endomorphismes diagonalisables, matrices diagonalisables . . . . .	173
5.5.1	Définition . . . . .	173
5.5.2	Caractérisations équivalentes . . . . .	174
5.5.3	Lien avec le polynôme caractéristique . . . . .	176
5.6	Lien entre diagonalisabilité et polynômes annulateurs . . . . .	177
5.6.1	Racines du polynôme minimal . . . . .	177
5.6.2	Lemme des noyaux . . . . .	178
5.6.3	Application à la diagonalisabilité . . . . .	180
5.6.4	Diagonalisabilité d'un endomorphisme induit . . . . .	183
5.7	Quelques applications de la diagonalisation . . . . .	184
5.7.1	Puissances d'une matrice, suites récurrentes linéairement . . . . .	184
5.7.2	Systèmes d'équations différentielles . . . . .	185
5.8	Endomorphismes trigonalisables, matrices trigonalisables . . . . .	185
5.8.1	Définition et propriétés . . . . .	185
5.8.2	Caractérisation équivalente . . . . .	186

5.8.3	Théorème de Cayley-Hamilton . . . . .	189
5.8.4	Sous-espaces caractéristiques . . . . .	190
5.9	Endomorphismes nilpotents, matrices nilpotentes . . . . .	192
5.9.1	Généralités . . . . .	192
5.9.2	Éléments propres d'un nilpotent . . . . .	194
5.9.3	Application aux sous-espaces caractéristiques d'un endomorphisme . . . . .	194
<b>6</b>	<b>Intégrales généralisées</b>	<b>197</b>
	Fonctions continues par morceaux sur un intervalle . . . . .	198
6.1	Intégrales généralisées sur $[a ; +\infty[$ . . . . .	198
6.1.1	Définition et exemples fondamentaux . . . . .	198
6.1.2	Propriétés . . . . .	200
6.1.3	Cas des fonctions réelles positives . . . . .	202
6.1.4	Théorème de comparaison entre fonctions positives . . . . .	203
6.1.5	Lien avec les séries . . . . .	206
6.2	Intégrales généralisées sur d'autres types d'intervalles . . . . .	210
6.2.1	Intégrales généralisées sur $[a ; b[$ . . . . .	210
6.2.2	Intégrales généralisées sur $]a ; b]$ . . . . .	210
6.2.3	Intégrales généralisées sur $]a ; b[$ . . . . .	212
6.2.4	Propriétés communes à toutes ces intégrales . . . . .	214
6.3	Résumé pour étudier la convergence d'une intégrale . . . . .	220
6.4	Fonctions intégrables sur un intervalle. . . . .	222
6.4.1	Intégrales absolument convergentes . . . . .	222
6.4.2	Fonctions intégrables . . . . .	224
6.4.3	Théorème de comparaison des fonctions intégrables . . . . .	225
6.5	Intégration des relations de comparaison . . . . .	226
6.5.1	Théorème de comparaison par domination . . . . .	227
6.5.2	Théorème de comparaison par équivalence . . . . .	228
<b>7</b>	<b>Intégrales à paramètre</b>	<b>230</b>



7.1	Introduction . . . . .	230
7.2	Convergence simple . . . . .	231
7.2.1	Convergence simple d'une suite de fonctions . . . . .	231
7.2.2	Convergence simple d'une série de fonctions . . . . .	233
7.3	Suites et séries de fonctions intégrables . . . . .	234
7.3.1	Théorème de convergence dominée . . . . .	234
7.3.2	Théorème d'intégration terme à terme . . . . .	237
7.4	Fonctions définies par une intégrale à paramètre . . . . .	239
7.4.1	Continuité . . . . .	239
7.4.2	Dérivabilité . . . . .	240
7.5	Domination sur des sous-intervalles . . . . .	244
7.6	Complément : la fonction $\Gamma$ d'Euler. . . . .	247
<b>8</b>	<b>Espaces préhilbertiens réels</b>	<b>249</b>
8.1	Généralités . . . . .	249
8.1.1	Produit scalaire . . . . .	249
8.1.2	Exemples fondamentaux . . . . .	250
8.1.3	Norme euclidienne . . . . .	251
8.1.4	Vecteurs orthogonaux . . . . .	254
8.2	Bases orthonormées . . . . .	255
8.2.1	Familles orthonormées . . . . .	255
8.2.2	Existence de bases orthonormées . . . . .	256
8.2.3	Calculs en base orthonormée . . . . .	258
8.3	Sous-espaces orthogonaux . . . . .	258
8.3.1	Orthogonalité de deux sous-espaces vectoriels . . . . .	258
8.3.2	Orthogonal d'un sous-espace vectoriel . . . . .	259
8.4	Projection orthogonale sur un sous-espace vectoriel de dimension finie . . . . .	261
8.4.1	Projection orthogonale . . . . .	261
8.4.2	Distance à un sous-espace vectoriel . . . . .	262

## 9 Endomorphismes dans un espace euclidien 264

9.1	Adjoint d'un endomorphisme . . . . .	264
9.1.1	Représentation des formes linéaires . . . . .	264
9.1.2	Adjoint . . . . .	265
9.1.3	Matrice de l'adjoint . . . . .	269
9.1.4	Stabilité de sous-espaces vectoriels . . . . .	271
9.2	Orientation d'un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie . . . . .	271
9.3	Isométries vectorielles . . . . .	272
9.4	Matrices orthogonales . . . . .	275
9.4.1	Déterminant d'une isométrie vectorielle . . . . .	278
9.4.2	Changements de bases orthonormées . . . . .	279
9.4.3	Produit mixte . . . . .	280
9.4.4	Produit vectoriel en dimension 3 . . . . .	281
9.5	Étude en dimension 2. . . . .	282
9.6	Réduction des isométries vectorielles ou des matrices orthogonales. . . . .	284
9.6.1	Réduction des isométries vectorielles . . . . .	284
9.6.2	Réduction des matrices orthogonales . . . . .	289
9.6.3	Étude en dimension 3 . . . . .	289
9.7	Endomorphismes auto-adjoints. . . . .	295
9.7.1	Définition et propriétés . . . . .	295
9.7.2	Théorème spectral . . . . .	296
9.8	Endomorphismes auto-adjoints positifs, définis-positifs. . . . .	299
9.8.1	Endomorphismes auto-adjoints positifs . . . . .	299
9.8.2	Matrices symétriques positives . . . . .	301

## 10 Fonctions vectorielles 302

10.1	Dérivée en un point . . . . .	302
10.1.1	Dérivabilité en un point . . . . .	302
10.1.2	Interprétation géométrique, développement limité d'ordre 1, continuité . . . .	303
10.1.3	Dérivées à gauche, dérivées à droite . . . . .	304

10.1.4	Lien avec les coordonnées . . . . .	304
10.1.5	Théorèmes opératoires . . . . .	305
10.2	Fonction dérivée . . . . .	307
10.3	Dérivées successives . . . . .	310
10.3.1	Définitions et exemples . . . . .	310
10.3.2	Théorèmes opératoires pour les dérivées successives . . . . .	311
10.4	Intégrales . . . . .	312
10.4.1	Définition . . . . .	312
10.4.2	Propriétés . . . . .	313
10.4.3	Primitives d'une fonction continue . . . . .	314
10.4.4	Formules de Taylor . . . . .	315
<b>11</b>	<b>Suites et séries de fonctions</b>	<b>316</b>
11.1	Convergence d'une suite de fonctions . . . . .	316
11.1.1	Convergence simple . . . . .	317
11.1.2	Convergence uniforme . . . . .	317
11.2	Convergence d'une série de fonctions . . . . .	324
11.2.1	Convergence simple . . . . .	324
11.2.2	Convergence uniforme . . . . .	326
11.2.3	Convergence normale . . . . .	328
11.3	Propriétés de la fonction limite. . . . .	332
11.3.1	Monotonie . . . . .	332
11.3.2	Continuité . . . . .	333
11.3.3	Interversion de limite et d'intégrale . . . . .	341
11.3.4	Interversion de limites . . . . .	346
11.3.5	Dérivabilité . . . . .	348
11.3.6	Dérivation à un ordre plus élevé . . . . .	351
11.4	Généralisation . . . . .	352
11.4.1	Convergence simple . . . . .	352
11.4.2	Convergence uniforme . . . . .	352

11.4.3	Convergence normale des séries . . . . .	353
11.4.4	Résultats préservés . . . . .	353
11.5	Approximation uniforme . . . . .	353
11.5.1	Densité des fonctions en escaliers dans les fonctions continues par morceaux .	353
11.5.2	Densité des polynômes sur un segment dans les fonctions continues . . . . .	355
<b>12</b>	<b>Séries entières</b>	<b>357</b>
12.1	Convergence simple d'une série entière . . . . .	357
12.1.1	Rayon de convergence . . . . .	357
12.1.2	Détermination du rayon de convergence . . . . .	359
12.1.3	Comparaison de séries entières . . . . .	363
12.1.4	Opérations sur les séries entières . . . . .	366
12.2	Propriétés de la fonction somme d'une série entière . . . . .	368
12.2.1	Convergence uniforme et continuité . . . . .	368
12.2.2	Primitivation et dérivation . . . . .	369
12.2.3	Convergence radiale . . . . .	373
12.3	Fonction développable en série entière. . . . .	374
12.3.1	Généralités . . . . .	374
12.3.2	Unicité du développement en série entière . . . . .	377
12.3.3	Série de Taylor d'une fonction . . . . .	378
12.3.4	Développements en série entière usuels . . . . .	381
<b>13</b>	<b>Probabilités</b>	<b>383</b>
13.1	Dénombrabilité . . . . .	383
13.1.1	Vocabulaire . . . . .	383
13.1.2	Exemples . . . . .	383
13.1.3	Quelques propriétés . . . . .	386
13.2	Espace probabilisé . . . . .	387
13.2.1	Univers d'une expérience aléatoire . . . . .	387
13.2.2	Tribu d'événements . . . . .	388

13.2.3	Probabilité . . . . .	389
13.2.4	Propriétés . . . . .	390
13.2.5	Probabilité discrète . . . . .	396
13.3	Probabilités conditionnelles . . . . .	398
13.3.1	Généralités . . . . .	398
13.3.2	Systèmes complets d'événements . . . . .	401
13.3.3	Formule des probabilités totales . . . . .	402
13.3.4	Formule de Bayes . . . . .	403
13.4	Indépendance . . . . .	406
13.4.1	Indépendance de deux événements . . . . .	406
13.4.2	Indépendance mutuelle . . . . .	408
<b>14</b>	<b>Variables aléatoires discrètes</b>	<b>410</b>
<b>15</b>	<b>Équations différentielles linéaires</b>	<b>411</b>
<b>16</b>	<b>Calcul différentiel</b>	<b>412</b>
<b>17</b>	<b>Structures algébriques</b>	<b>413</b>
<b>II</b>	<b>Exercices</b>	<b>414</b>
<b>1</b>	<b>Espaces vectoriels normés</b>	<b>415</b>
<b>2</b>	<b>Séries numériques et vectorielles : révisions et compléments</b>	<b>416</b>
<b>3</b>	<b>Familles sommables</b>	<b>417</b>
<b>4</b>	<b>Rappels et compléments d'algèbre linéaire</b>	<b>418</b>
<b>5</b>	<b>Réduction des endomorphismes</b>	<b>419</b>
<b>6</b>	<b>Intégrales généralisées</b>	<b>420</b>
<b>7</b>	<b>Intégrales à paramètre</b>	<b>421</b>

8	Espaces préhilbertiens réels	422
9	Endomorphismes dans un espace euclidien	423
10	Fonctions vectorielles	424
11	Suites et séries de fonctions	425
12	Séries entières	426
13	Probabilités	427
14	Variables aléatoires discrètes	428
15	Équations différentielles linéaires	429
16	Calcul différentiel	430
17	Structures algébriques	431

# Première partie

## Cours

# Chapitre 1

## Espaces vectoriels normés

### Sommaire

---

<b>1.1</b>	<b>Bornes supérieures, bornes inférieures . . . . .</b>	<b>14</b>
1.1.1	Borne supérieure d'une partie de $\mathbb{R}$ . . . . .	14
1.1.2	Borne supérieure d'une application à valeurs dans $\mathbb{R}$ . . . . .	16
1.1.3	Règles pratiques . . . . .	16
<b>1.2</b>	<b>Normes . . . . .</b>	<b>17</b>
1.2.1	Définition . . . . .	17
1.2.2	Exemples fondamentaux . . . . .	18
1.2.3	Normes équivalentes . . . . .	20
1.2.4	Boules . . . . .	23
1.2.5	Parties bornées . . . . .	26
<b>1.3</b>	<b>Convergence des suites . . . . .</b>	<b>31</b>
1.3.1	Définition . . . . .	31
1.3.2	Propriétés usuelles . . . . .	32
1.3.3	Cas particulier en dimension finie . . . . .	34
1.3.4	Point adhérent à une partie . . . . .	36
<b>1.4</b>	<b>Limites de fonctions . . . . .</b>	<b>39</b>
1.4.1	Définition . . . . .	39
1.4.2	Caractérisation séquentielle de la limite . . . . .	39
1.4.3	Propriétés usuelles . . . . .	40
1.4.4	Cas particulier de la dimension finie . . . . .	41
1.4.5	Composition des limites . . . . .	42
1.4.6	Extensions des définitions . . . . .	42
<b>1.5</b>	<b>Fonctions continues . . . . .</b>	<b>43</b>
1.5.1	Continuité en un point . . . . .	43
1.5.2	Continuité sur une partie . . . . .	44
1.5.3	Cas particulier de la dimension finie . . . . .	44
1.5.4	Fonctions lipschitziennes . . . . .	45
1.5.5	Continuité des applications linéaires et $n$ -linéaires . . . . .	47
1.5.6	Norme subordonnée . . . . .	54
<b>1.6</b>	<b>Topologie d'un espace vectoriel normé . . . . .</b>	<b>58</b>
1.6.1	Intérieur d'une partie, voisinage d'un point . . . . .	58
1.6.2	Parties ouvertes . . . . .	60
1.6.3	Parties fermées . . . . .	61
1.6.4	Ouverts ou fermés relatifs à une partie . . . . .	66



1.6.5	Image réciproque d'un ouvert ou d'un fermé par une fonction continue . . .	66
1.6.6	Frontière d'une partie . . . . .	69
<b>1.7</b>	<b>Compacité.</b> . . . . .	<b>69</b>
1.7.1	Valeurs d'adhérence d'une suite . . . . .	69
1.7.2	Théorème de Bolzano-Weierstrass . . . . .	71
1.7.3	Parties compactes . . . . .	73
1.7.4	Théorème des bornes atteintes . . . . .	77
<b>1.8</b>	<b>Connexité par arcs</b> . . . . .	<b>82</b>
1.8.1	Chemin . . . . .	82
1.8.2	Parties connexes par arcs . . . . .	83
1.8.3	Théorème des valeurs intermédiaires . . . . .	84

---

Dans ce chapitre, la lettre  $\mathbb{K}$  désigne  $\mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ .

## 1.1 Bornes supérieures, bornes inférieures

### 1.1.1 Borne supérieure d'une partie de $\mathbb{R}$

On rappelle le théorème fondamental, dit « théorème (ou axiome) de la borne supérieure ».

---

#### Théorème 1.1

*Toute partie  $A$  de  $\mathbb{R}$ , non-vide et majorée, possède une borne supérieure, notée  $\sup A$ .*

*Toute partie  $A$  de  $\mathbb{R}$ , non-vide et minorée, possède une borne inférieure, notée  $\inf A$ .*

On dispose de caractérisations équivalentes de la borne supérieure.

---

#### Proposition 1.2

*Soient  $A$  une partie de  $\mathbb{R}$ , non-vide et majorée, et  $s$  un réel.*

*Alors il y a équivalence entre les propositions suivantes :*

$$(\alpha) \quad s = \sup A$$

$$(\beta) \quad \begin{cases} \forall a \in A, \quad a \leq s \\ \forall \varepsilon > 0, \quad \exists x \in A, \quad s - \varepsilon < x \leq s \end{cases}$$

$$(\gamma) \quad \begin{cases} \forall a \in A, \quad a \leq s \\ \exists (x_n) \in A^{\mathbb{N}}, \quad x_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} s \end{cases}$$

---

*Démonstration 1.3*  $((\alpha) \implies (\beta))$

►  $s = \sup A$  est le plus petit majorant de  $A$  donc c'est un majorant de  $A$  :

$$\forall a \in A, \quad a \leq s.$$

►  $s$  est le plus petit majorant de  $A$  donc

$$\forall \varepsilon > 0, \quad s - \varepsilon < s$$

donc  $s - \varepsilon$  n'est pas un majorant de  $A$ .

Donc il existe  $x \in A$  tel que  $s - \varepsilon < x \leq s$ . ■

---

*Démonstration 1.4*  $((\beta) \implies (\alpha))$

$s$  est un majorant de  $A$  et tout réel strictement inférieur à  $s$  n'est pas un majorant *i.e.* tout majorant est supérieur ou égal à  $s$ .

Donc  $s = \sup A$ . ■

---

*Démonstration 1.5*  $((\beta) \implies (\gamma))$

On spécialise  $\varepsilon \leftarrow \frac{1}{n+1}$  pour  $n \in \mathbb{N}$ . On a

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \exists x_n \in A, \quad s - \frac{1}{n+1} < x_n \leq s.$$

De cette façon, on construit une suite  $(x_n) \in A^{\mathbb{N}}$  telle que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad s - \frac{1}{n+1} < x_n \leq s.$$

D'après le théorème des gendarmes, on a  $x_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} s$ . ■

---

*Démonstration 1.6*  $((\gamma) \implies (\beta))$

Soit  $\varepsilon > 0$ .

Il existe  $N \in \mathbb{N}$  tel que

$$\forall n \geq N, \quad |x_n - s| \leq \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\text{donc } s - \frac{\varepsilon}{2} \leq x_n.$$

Or  $x_n \in A$  donc  $s - \varepsilon < s - \frac{\varepsilon}{2} \leq x_n \leq s$ .

D'où

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists x \in A, \quad s - \varepsilon < x \leq s. \quad \blacksquare$$

On a évidemment les caractérisations associées à la borne inférieure.

### 1.1.2 Borne supérieure d'une application à valeurs dans $\mathbb{R}$

---

#### Définition 1.7

Soient  $X$  un ensemble non-vide et  $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$ .

Si  $f$  est majorée sur  $X$ , alors on appelle borne supérieure de  $f$  sur  $X$  le réel  $\sup f(X) = \sup_X f = \sup_{x \in X} f(x)$ .

Si  $f$  est minorée sur  $X$ , alors on appelle borne inférieure de  $f$  sur  $X$  le réel  $\inf f(X) = \inf_X f = \inf_{x \in X} f(x)$ .

On déduit de la Proposition 1.2 les caractérisations suivantes.

---

#### Proposition 1.8

Soient  $X$  un ensemble non-vide,  $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$  majorée sur  $X$  et  $s$  un réel.

Alors il y a équivalence entre les propositions suivantes :

- ▷  $s = \sup_X f$
- ▷  $\begin{cases} \forall x \in X, f(x) \leq s \\ \forall \varepsilon > 0, \exists x \in X, s - \varepsilon < f(x) \leq s \end{cases}$
- ▷  $\begin{cases} \forall x \in X, f(x) \leq s \\ \exists (x_n) \in X^{\mathbb{N}}, f(x_n) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} s \end{cases}$

### 1.1.3 Règles pratiques

D'abord, des évidences auxquelles on ne pense pas toujours.

---

#### Proposition 1.9

Soit  $A$  une partie de  $\mathbb{R}$ , non-vide et majorée. Alors  $\forall a \in A, a \leq \sup A$ .

Soient  $X$  un ensemble non-vide et  $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$  majorée sur  $X$ . Alors  $\forall x \in X, f(x) \leq \sup_X f$ .

En pratique, on n'a pas souvent besoin de connaître la valeur exacte d'une borne supérieure, on a plus souvent besoin de la majorer.

---

#### Proposition 1.10

- ▷ Soient  $A$  une partie de  $\mathbb{R}$ , non-vide et majorée, et  $M$  un réel.  
Pour montrer  $\sup A \leq M$ , il suffit de montrer  $\forall a \in A, a \leq M$ .
- ▷ Soient  $X$  un ensemble non-vide,  $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$  majorée sur  $X$  et  $M$  un réel.  
Pour montrer  $\sup_X f \leq M$ , il suffit de montrer  $\forall x \in X, f(x) \leq M$ .

Multiplication par un réel positif.

---

**Proposition 1.11**

Soient  $X$  un ensemble non-vide et  $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$  majorée sur  $X$ .

Alors pour tout  $\lambda \geq 0$ ,  $\sup_X (\lambda f) = \lambda \sup_X f$ .

---

*Démonstration 1.12*

Soit  $\lambda \geq 0$ . On pose  $s = \sup_X f$ .

On veut montrer  $\sup_X (\lambda f) = \lambda s$ .

On a  $\forall x \in X$ ,  $f(x) \leq s$  et  $\lambda \geq 0$  donc

$$\forall x \in X, \lambda f(x) \leq \lambda s.$$

Donc  $\lambda s$  est un majorant de  $\lambda f$ .

Comme  $s = \sup_X f$ , il existe  $(x_n) \in X^{\mathbb{N}}$  telle que  $f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} s$ .

D'après les théorèmes d'opération sur les limites, on a

$$\lambda f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \lambda s.$$

D'où  $\lambda s = \sup_X (\lambda f)$  d'après la Proposition 1.2. ■

Attention ! C'est bien sûr faux si  $\lambda < 0$ .

## 1.2 Normes

### 1.2.1 Définition

---

**Définition 1.13**

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

On appelle norme sur  $E$  toute application  $N : E \longrightarrow \mathbb{R}_+$  telle que :

- pour tout  $x \in E$ ,  $N(x) = 0 \iff x = 0$  (séparation)
- pour tout  $x \in E$ , pour tout  $\lambda \in \mathbb{K}$ ,  $N(\lambda x) = |\lambda| N(x)$  (homogénéité)
- pour tout  $(x, y) \in E^2$ ,  $N(x + y) \leq N(x) + N(y)$  (inégalité triangulaire).

Un espace vectoriel est dit espace vectoriel normé quand on lui associe une norme.

On déduit de l'inégalité triangulaire une inégalité classique (souvent appelée aussi inégalité triangulaire) :

$$\text{pour tout } (x, y) \in E^2, \quad |N(x) - N(y)| \leq N(x - y).$$

---

*Démonstration 1.14*

Soit  $(x, y) \in E^2$ .

D'après l'inégalité triangulaire, on a

$$N(x - y + y) \leq N(x - y) + N(y)$$

$$N(x) \leq N(x - y) + N(y)$$

$$N(x) - N(y) \leq N(x - y).$$

De même, en échangeant  $x$  et  $y$  :

$$N(y) - N(x) \leq N(y - x).$$

Or

$$N(x - y) = N(-(y - x)) = |-1| N(y - x) = N(y - x).$$

D'où

$$\begin{cases} N(x) - N(y) \leq N(x - y) \\ N(y) - N(x) \leq N(x - y) \end{cases}$$

donc

$$|N(x) - N(y)| \leq N(x - y). \quad \blacksquare$$

Si  $N$  est une norme sur  $E$ , alors on peut définir une distance entre deux vecteurs de  $E$  :  $d(u, v) = N(u - v)$ .

On définit ainsi une application  $d : E^2 \longrightarrow \mathbb{R}_+$  telle que :

- ▷ pour tout  $(x, y) \in E^2$ ,  $d(y, x) = d(x, y)$  (symétrie)
- ▷ pour tout  $(x, y) \in E^2$ ,  $d(x, y) = 0 \iff x = y$  (séparation)
- ▷ pour tout  $(x, y, z) \in E^3$ ,  $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$  (inégalité triangulaire).

### 1.2.2 Exemples fondamentaux

- ▷ La valeur absolue dans  $\mathbb{R}$  et le module dans  $\mathbb{C}$  sont des normes.
- ▷ La norme euclidienne habituelle en géométrie plane ou spatiale est une norme.

- Plus généralement, si  $\langle \cdot | \cdot \rangle$  est un produit scalaire sur  $E$ , la norme euclidienne associée  $x \mapsto \sqrt{\langle x | x \rangle}$  est une norme au sens précédent.
- Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie. On choisit une base de  $E$   $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ . Si  $v$  est un vecteur de  $E$ , on note  $(v_1, \dots, v_n)$  les coordonnées de  $v$  dans la base  $\mathcal{B}$ . On définit classiquement trois normes sur  $E$  :

$$\|v\|_\infty = \max_{i \in \llbracket 1; n \rrbracket} |v_i| \quad \|v\|_1 = \sum_{i=1}^n |v_i| \quad \|v\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n |v_i|^2}$$

appelées respectivement norme infinie ou norme sup, norme 1 et norme 2.

Cas particulier :  $E = \mathbb{R}^n$  muni de la base canonique.

Cas particulier :  $E = \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$  muni de la base canonique. Si  $A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$  est une matrice de  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ , alors

$$\|A\|_\infty = \max_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} |a_{ij}| \quad \|A\|_1 = \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} |a_{ij}| \quad \|A\|_2 = \sqrt{\sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} |a_{ij}|^2}$$

- Soient  $X$  un ensemble et  $E$  l'ensemble des applications bornées de  $X$  dans  $\mathbb{K}$ . La norme sup sur  $E$  est définie par  $\|f\|_\infty = \sup_{x \in X} |f(x)|$ .
- Cas particulier : si  $X = \mathbb{N}$ ,  $E$  est l'ensemble des suites bornées et  $\|u\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |u_n|$ .

*Démonstration 1.15 ( $\|\cdot\|_\infty$  est une norme sur  $E$ )*

- Si  $\|v\|_\infty = 0$  alors par définition d'un maximum

$$\forall i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, \quad 0 \leq |v_i| \leq \|v\|_\infty = 0 \text{ donc } v_i = 0$$

donc  $v = 0$ .

- Soit  $\lambda \in \mathbb{K}$ . On a

$$\begin{aligned} \|\lambda v\|_\infty &= \sup_{i \in \llbracket 1; n \rrbracket} |\lambda v_i| \\ &= \sup_{i \in \llbracket 1; n \rrbracket} |\lambda| \times |v_i| \\ &= |\lambda| \sup_{i \in \llbracket 1; n \rrbracket} |v_i| \\ &= |\lambda| \|v\|_\infty. \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} |\lambda| \geq 0 \text{ (Proposition 1.11)}$$

- Soit  $(v, w) \in E^2$ . On veut montrer  $\|v + w\|_\infty \leq \|v\|_\infty + \|w\|_\infty$ .

D'après la Proposition 1.10, il suffit de montrer

$$\forall i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, \quad |v_i + w_i| \leq \|v\|_\infty + \|w\|_\infty.$$

Pour  $i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$ , on a

$$\begin{aligned} |v_i + w_i| &\leq |v_i| + |w_i| \\ &\leq \|v\|_\infty + \|w\|_\infty. \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \begin{cases} |v_i| \leq \|v\|_\infty \\ |w_i| \leq \|w\|_\infty \end{cases}$$

Donc  $\|v + w\|_\infty \leq \|v\|_\infty + \|w\|_\infty$ . ■

---

*Démonstration 1.16* ( $\|\cdot\|_1$  est une norme sur  $E$ )

► Si  $\|v\|_1 = 0$  alors  $\sum_{i=1}^n |v_i| = 0$ . Or une somme de réels positifs est nulle ssi tous les réels sont nuls.

Donc

$$\forall i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, |v_i| = 0$$

donc  $v = 0$ .

► Soit  $\lambda \in \mathbb{R}$ . On a

$$\begin{aligned}\|\lambda v\|_1 &= \sum_{i=1}^n |\lambda v_i| \\ &= \sum_{i=1}^n |\lambda| \times |v_i| \\ &= |\lambda| \sum_{i=1}^n |v_i| \\ &= |\lambda| \|v\|_1.\end{aligned}$$

► Soit  $(v, w) \in E^2$ . On a

$$\begin{aligned}\|v + w\|_1 &= \sum_{i=1}^n |v_i + w_i| \\ &\leq \sum_{i=1}^n (|v_i| + |w_i|) \\ &= \|v\|_1 + \|w\|_1.\end{aligned}$$

■

---

### Proposition 1.17

Soient  $E, F$  deux espaces vectoriels normés.

L'application de  $E \times F$  dans  $\mathbb{R}_+$  qui à  $(x, y)$  associe  $\max(\|x\|_E, \|y\|_F)$  est une norme.

Autrement dit, le produit de deux espaces vectoriels normés est encore un espace vectoriel normé, résultat qui se généralise par récurrence à un nombre quelconque (fini) d'espaces vectoriels normés.

### 1.2.3 Normes équivalentes

---

#### Définition 1.18

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $N_1, N_2$  deux normes sur  $E$ .

On dit que  $N_1$  et  $N_2$  sont équivalentes quand il existe deux constantes strictement positives  $a, b$  telles que pour tout  $v \in E$ ,  $aN_1(v) \leq N_2(v) \leq bN_1(v)$ .

---

**Proposition 1.19**

On note  $\mathcal{N}(E)$  l'ensemble des normes sur  $E$  et

$$\forall (N_1, N_2) \in \mathcal{N}(E)^2, N_1 \sim N_2 \iff N_1 \text{ et } N_2 \text{ sont équivalentes.}$$

La relation  $\sim$  est alors une relation d'équivalence sur  $\mathcal{N}(E)$ .

---

**Démonstration 1.20**

▷ Soit  $N \in \mathcal{N}(E)$ . On a  $N \leq N \leq N$  donc  $N \sim N$ .

Donc  $\sim$  est réflexive.

▷ Soit  $(N_1, N_2) \in \mathcal{N}(E)^2$  tel que  $N_1 \sim N_2$ .

Il existe  $a, b > 0$  tels que  $aN_1 \leq N_2 \leq bN_1$ .

Donc  $\frac{1}{b}N_2 \leq N_1 \leq \frac{1}{a}N_2$  i.e.  $N_2 \sim N_1$ .

Donc  $\sim$  est symétrique.

▷ Soit  $(N_1, N_2, N_3) \in \mathcal{N}(E)^3$  tel que  $N_1 \sim N_2$  et  $N_2 \sim N_3$ .

Il existe  $a, b, c, d > 0$  tels que 
$$\begin{cases} aN_1 \leq N_2 \leq bN_1 \\ cN_2 \leq N_3 \leq dN_2 \end{cases}$$

Donc  $acN_1 \leq N_3 \leq bdN_1$  i.e.  $N_1 \sim N_3$ .

Donc  $\sim$  est transitive.

Finalement,  $\sim$  est une relation d'équivalence. ■

---

**Exercice 1.21**

Montrez que si  $E$  est de dimension finie, les trois normes  $\|\cdot\|_\infty$ ,  $\|\cdot\|_1$  et  $\|\cdot\|_2$  sont équivalentes.

---

**Correction 1.22**

Soient  $E$  un espace vectoriel normé de dimension finie et  $\mathcal{B}$  une base de  $E$ .

Soit  $v = (v_1, \dots, v_n)_{\mathcal{B}}$ .

On a

$$\|v\|_\infty = \sup_{i \in \llbracket 1; n \rrbracket} |v_i| \quad \|v\|_1 = \sum_{i=1}^n |v_i| \quad \|v\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n |v_i|^2}.$$



► On a  $\|v\|_\infty \leq \|v\|_1 \leq n \|v\|_\infty$ .

En effet, il existe  $j \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$  tel que  $\|v\|_\infty = |v_j|$  donc

$$\|v\|_\infty = |v_j| \leq |v_1| + \cdots + |v_n| = \|v\|_1.$$

De plus, pour tout  $i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$ ,  $|v_i| \leq \|v\|_\infty$  donc en additionnant les inégalités :

$$\sum_{i=1}^n |v_i| = \|v\|_1 \leq \sum_{i=1}^n \|v\|_\infty = n \|v\|_\infty.$$

Donc  $\|\cdot\|_\infty \sim \|\cdot\|_1$ .

► En mettant des carrés partout on arrive à

$$\|v\|_\infty \leq \|v\|_2 \leq \sqrt{n} \|v\|_\infty.$$

Donc  $\|\cdot\|_\infty \sim \|\cdot\|_2$ .

► Par transitivité, on a  $\|\cdot\|_1 \sim \|\cdot\|_2$ .

### Exercice 1.23

Soient  $E = \mathbb{R}[X]$  et  $P = \sum_{i=0}^n a_i X^i \in E$ . On pose  $N_1(P) = \sum_{i=0}^n |a_i|$  et  $N_\infty(P) = \max_{0 \leq i \leq n} |a_i|$ .

Montrez que  $N_1$  et  $N_\infty$  sont des normes sur  $E$ .

Montrez qu'elles ne sont pas équivalentes en considérant la suite des polynômes  $P_n = \sum_{i=0}^n X^i$ .

### Correction 1.24

►  $N_1$  et  $N_\infty$  sont clairement des normes (cf. Démonstration 1.15 et Démonstration 1.16).

► Pour  $n \in \mathbb{N}$ , on pose  $P_n = \sum_{i=0}^n X^i = 1 + X + \cdots + X^n$ .

Par l'absurde, on suppose  $N_1 \sim N_\infty$ .

Il existe  $a, b > 0$  tels que  $a N_1 \leq N_\infty \leq b N_1$ .

Donc

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \underbrace{a N_1(P_n)}_{=n+1} \leq \underbrace{N_\infty(P_n)}_{=1} \leq \underbrace{b N_1(P_n)}_{=n+1}$$

donc

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad a(n+1) \leq 1$$

or  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a(n+1) = +\infty$  : contradiction.

Donc  $N_1$  et  $N_\infty$  ne sont pas équivalentes.

---

*Remarque 1.25*

Soit  $(N_1, N_2) \in \mathcal{N}(E)^2$ . On a

$$N_1 \sim N_2 \iff v \mapsto \frac{N_1(v)}{N_2(v)} \text{ est bornée sur } E \setminus \{0\}.$$

Ainsi, pour montrer que  $N_1$  et  $N_2$  ne sont pas équivalentes, on cherche une suite  $(v_n) \in (E \setminus \{0\})^{\mathbb{N}}$  telle que

$$\frac{N_1(v_n)}{N_2(v_n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty \quad \text{ou} \quad \frac{N_1(v_n)}{N_2(v_n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Le résultat suivant est fondamental.

---

**Théorème 1.26**

*Si  $E$  est un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie, alors toutes les normes sur  $E$  sont équivalentes.*

Quand on est en dimension finie, cela signifie que tous les résultats qu'on peut démontrer pour une norme sont à facteurs près valables pour n'importe quelle norme, autrement dit cela nous permettra de choisir la norme que l'on préfère si on ne nous l'impose pas.

Dans toute la suite,  $E$  est un espace vectoriel normé par la norme  $\|\cdot\|$ .

## 1.2.4 Boules

---

**Définition 1.27**

Soient  $a \in E$  et  $r \in \mathbb{R}_+^*$ .

On appelle boule ouverte de centre  $a$  et de rayon  $r$  l'ensemble noté  $B(a, r)$  défini de la façon suivante :

$$B(a, r) = \{v \in E \mid \|v - a\| < r\}.$$

On appelle boule fermée de centre  $a$  et de rayon  $r$  l'ensemble noté (généralement)  $\overline{B}(a, r)$  :

$$\overline{B}(a, r) = \{v \in E \mid \|v - a\| \leq r\}.$$

On appelle sphère de centre  $a$  et de rayon  $r$  l'ensemble (généralement) noté  $S(a, r)$  :

$$S(a, r) = \{v \in E \mid \|v - a\| = r\}.$$

On appelle boule-unité la boule de centre 0 et de rayon 1, sphère-unité la sphère de centre 0 et de rayon 1.

---

**Exercice 1.28**

Que sont les boules dans  $\mathbb{R}$ ? Que sont les sphères dans  $\mathbb{R}$ ?

---

*Correction 1.29*

$|\cdot|$  est une norme sur  $\mathbb{R}$ .

Soient  $a \in \mathbb{R}$  et  $r > 0$ .

On a

$$B(a, r) = ]a - r ; a + r[ \quad \overline{B}(a, r) = [a - r ; a + r] \quad S(a, r) = \{a - r, a + r\}.$$

---

**Exercice 1.30**

On prend  $E = \mathbb{R}^2$  et on définit les normes infinie, 1 et 2 relativement à la base canonique.

Représentez graphiquement les boules-unités pour chacune de ces trois normes.




---

*Correction 1.31*

On a

$$\|(x, y)\|_{\infty} = \max(|x|, |y|) \quad \|(x, y)\|_1 = |x| + |y| \quad \|(x, y)\|_2 = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

On en déduit les boules suivantes :



---

**Exercice 1.32**

Montrez que toute boule ouverte est contenue dans une boule fermée et contient une boule fermée de mêmes centres.

Montrez la même chose en inversant les mots « ouverte » et « fermée ».

---

*Correction 1.33*

Soient  $a \in E$  et  $r > 0$ .

On a

$$\overline{B}\left(a, \frac{r}{2}\right) \subseteq B(a, r) \subseteq \overline{B}(a, r)$$

et

$$B(a, r) \subseteq \overline{B}(a, r) \subseteq B(a, 2r).$$

---

**Définition 1.34**

Soit  $(x, y) \in E^2$ . On note  $[xy] = \{tx + (1-t)y \mid t \in [0; 1]\}$ , appelé segment (géométrique) d'extrémités  $x$  et  $y$ .

Une partie  $A$  de  $E$  est dite convexe quand pour tout  $(x, y) \in A^2$ ,  $[xy] \subseteq A$ .

On a :

$$A \text{ est convexe} \iff \forall (x, y) \in A^2, \forall t \in [0; 1], tx + (1-t)y \in A.$$

---

**Proposition 1.35**

*Les boules (ouvertes ou fermées) sont des parties convexes.*

*Les sphères ne sont jamais convexes.*

*Dans  $\mathbb{R}$ , les convexes sont les intervalles.*

---

*Démonstration 1.36 (Les boules sont convexes)*

Soient  $a \in E$  et  $r > 0$ .

Soient  $(x, y) \in B(a, r)^2$  et  $t \in [0; 1]$ .

On veut montrer que  $tx + (1-t)y \in B(a, r)$  i.e.  $\|tx + (1-t)y - a\| < r$ .

On a

$$\begin{aligned} \|tx + (1-t)y - a\| &= \|t(x-a) + at + (1-t)y - a\| \\ &= \|t(x-a) + (t-1)a + (1-t)y\| \\ &= \|t(x-a) + (1-t)(y-a)\| \\ &\leq \|t(x-a)\| + \|(1-t)(y-a)\| && \left. \begin{array}{l} \text{inégalité triangulaire} \\ \text{homogénéité et } t \geq 0 \text{ et} \\ 1-t \geq 0 \end{array} \right\} \\ &= t\|x-a\| + (1-t)\|y-a\| && x, y \in B(a, r) \\ &< tr + (1-t)r \\ &= r. \end{aligned}$$

Ceci prouve

$$\forall (x, y) \in B(a, r), [xy] \subseteq B(a, r)$$

i.e.  $B(a, r)$  est convexe.

De même,  $\overline{B}(a, r)$  est convexe. ■

---

*Démonstration 1.37 (Les sphères ne sont pas convexes)*

Soient  $a \in E$  et  $r > 0$ .

On veut montrer que  $S(a, r)$  n'est pas convexe *i.e.*

$$\exists (x, y) \in S(a, r)^2, \exists t \in [0 ; 1], tx + (1 - t)y \notin S(a, r).$$

On choisit  $x \in S(a, r)$  puis  $y = 2a - x$  (diamétralement opposé).

On a

$$a \in [xy]$$

$$\text{car } a = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y \text{ et}$$

$$a \notin S(a, r).$$

Donc  $S(a, r)$  n'est pas convexe. ■

## 1.2.5 Parties bornées

---

### Définition 1.38

On dit qu'une partie  $A$  de  $E$  est bornée quand il existe une boule qui la contient.

---

### Exercice 1.39

Montrez que  $A$  est bornée ssi  $A$  est contenue dans une boule de centre 0.

Plus généralement, on choisit arbitrairement un point de  $E$ , noté  $x$ . Montrez l'équivalence  $A$  est bornée ssi  $A$  est contenue dans une boule de centre  $x$ .

---

*Correction 1.40 (Première équivalence)*

$\boxed{\Leftarrow}$  Immédiat.

$\boxed{\Rightarrow}$

Soit  $A$  une partie bornée de  $E$ .

Il existe  $a \in E$  et  $r > 0$  tels que  $A \subseteq B(a, r)$ .

On pose  $r' = \|a\| + r > 0$ .

Soit  $x \in A$ .

On a  $x \in B(a, r)$  donc  $\|x - a\| < r$ .

Donc  $r > \|\|x\| - \|a\|\|$ .

Donc  $r > \|x\| - \|a\|$ .

Donc  $r + \|a\| > \|x\|$ .

Donc  $A \subseteq B(0, r')$ .

---

*Correction 1.41 (Seconde équivalence)*

Plus généralement, soit  $x \in E$ .

Avec  $r'' = \|x - a\| + r$ , on a de même  $A \subseteq B(x, r'')$ .

---

### **Exercice 1.42**

Montrez qu'en dimension finie, cette définition ne dépend pas de la norme.

---

*Correction 1.43*

On veut montrer que si  $E$  est de dimension finie et  $N_1, N_2$  sont des normes sur  $E$ , alors

$$A \text{ est bornée pour } N_1 \iff A \text{ est bornée pour } N_2.$$

Soit  $A$  une partie bornée pour  $N_1$ .

Alors il existe  $r_1 > 0$  tel que  $A \subseteq B_1(0, r_1)$ .

Comme  $E$  est de dimension finie, les normes  $N_1$  et  $N_2$  sont équivalentes.

Il existe donc  $a, b > 0$  tels que  $aN_2 \leq N_1 \leq bN_2$ .

On pose  $r_2 = \frac{r_1}{a} > 0$ .

Soit  $x \in A$ .

Alors  $x \in B_1(0, r_1)$  donc

$$N_1(x) < r_1$$

$$N_2(x) \leq \frac{1}{a} N_1(x) < r_2.$$

Donc  $x \in B_2(0, r_2)$ .

Donc  $A \subseteq B_2(0, r_2)$ .

Donc  $A$  est bornée pour  $N_2$ .

Et réciproquement.

---

### **Proposition 1.44**

Une partie  $A$  de  $E$  n'est pas bornée ssi il existe une suite  $(v_n)$  à termes dans  $A$  telle que  $\|v_n\| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ .

---

**Exercice 1.45**

Dans  $E = \mathbb{R}^2$ , on pose  $A = \{(x, y) \mid x^4 + y^4 = 20\}$  :  $A$  est-elle bornée ? Si oui, pour chacune des normes infinie, 1 et 2, donnez un rayon d'une boule centrée en 0 qui contient  $A$ .

---

*Correction 1.46*

$E$  est de dimension finie donc les normes sur  $E$  sont toutes équivalentes.

On choisit la norme sup.

Soit  $(x, y) \in A$ .

On a  $x^4 + y^4 = 20$  donc  $x^4 \leq x^4 + y^4 = 20$  car  $x^4 \geq 0$ .

Donc  $|x| \leq \sqrt[4]{20}$  et, de même,  $|y| \leq \sqrt[4]{20}$ .

Donc  $(x, y) \in \overline{B_\infty}(0, \sqrt[4]{20})$ .

Donc  $A \subseteq \overline{B_\infty}(0, \sqrt[4]{20})$ .

D'après l'Exercice 1.21, on a

$$\|\cdot\|_\infty \leq \|\cdot\|_1 \leq 2 \|\cdot\|_\infty$$

et

$$\|\cdot\|_\infty \leq \|\cdot\|_2 \leq \sqrt{2} \|\cdot\|_\infty.$$

Donc  $A \subseteq \overline{B_1}(0, 2\sqrt[4]{20})$  et  $A \subseteq \overline{B_2}(0, \sqrt{2}\sqrt[4]{20})$ .

---

**Exercice 1.47**

Même question avec  $E = \mathbb{C}^2$ .

---

*Correction 1.48*

$E$  est de dimension finie donc les normes sur  $E$  sont équivalentes.

$x$  étant quelconque dans  $\mathbb{C}$ , existe-t-il  $y \in \mathbb{C}$  tel que  $x^4 + y^4 = 20$  ?

Dans  $\mathbb{C}$ , tout nombre possède une racine quatrième donc en posant  $y$  une racine quatrième de  $20 - x^4$ , on obtient  $(x, y) \in A$ .

On pose  $v_n = (n, y_n)$  où  $y_n$  est une racine quatrième de  $20 - n^4$ .

On a  $\|v_n\|_\infty = \max(n, |y_n|) \geq n$  donc

$$\|v_n\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty.$$

Or  $(v_n) \in A^{\mathbb{N}}$  donc  $A$  n'est pas bornée.

---

**Exercice 1.49**

Dans  $E = \mathbb{R}^3$ , on pose  $B = \{(x, y, z) \mid x^2 + 3y^2 + 4z^2 + 2xy + 2xz - 2yz \leq 42\}$  :  $B$  est-elle bornée ? Si oui, pour chacune des normes infinie, 1 et 2, donnez un rayon d'une boule centrée en 0 qui contient  $B$ .

---

**Correction 1.50**

$E$  est de dimension finie donc les normes sur  $E$  sont équivalentes.

On a

$$\begin{aligned} \forall (x, y, z) \in E, \quad x^2 + 3y^2 + 4z^2 + 2xy + 2xz - 2yz &= (x + y + z)^2 - y^2 - z^2 - 2yz + 3y^2 + 4z^2 - 2yz \\ &= (x + y + z)^2 + 2y^2 + 3z^2 - 4yz \\ &= (x + y + z)^2 + 2(y - z)^2 + z^2. \end{aligned}$$

Si  $(x, y, z) \in B$  alors  $(x + y + z)^2 + 2(y - z)^2 + z^2 \leq 42$ .

$$\text{Donc } \begin{cases} z^2 \leq 42 \\ 2(y - z)^2 \leq 42 \\ (x + y + z)^2 \leq 42 \end{cases}$$

$$\text{Donc } \begin{cases} |z| \leq 7 \\ |y - z| \leq 5 \\ |x + y + z| \leq 7 \end{cases}$$

$$\text{Donc } \begin{cases} |z| \leq 7 \\ |y| = |y - z + z| \leq |y - z| + |z| \leq 12 \\ |x| = |x + y + z - y - z| \leq |x + y + z| + |y| + |z| \leq 26 \end{cases}$$

Donc  $\|(x, y, z)\|_\infty \leq 26$  et on a

$$B \subseteq B_\infty(0, 26) \quad B \subseteq B_1(0, 78) \quad B \subseteq B_2(0, 26\sqrt{3}).$$

---

**Exercice 1.51**

Dans  $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ , on note  $\mathcal{P}$  l'ensemble des matrices de projecteurs :  $\mathcal{P}$  est-il borné ?

---

**Correction 1.52**

$\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$  est de dimension finie donc les normes sont équivalentes.

On choisit la norme sup :

$$\left\| \begin{pmatrix} x & z \\ y & t \end{pmatrix} \right\|_\infty = \max(|x|, |y|, |z|, |t|).$$



On a  $\mathcal{P} = \{M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \mid M^2 = M\}$ .

On pose  $M = \begin{pmatrix} x & z \\ y & t \end{pmatrix}$  et on a

$$M = M^2 \iff \begin{cases} x^2 + yz = x \\ z(x+t) = z \\ y(x+t) = y \\ t^2 + yz = t \end{cases}$$

On impose  $x+t=1$ .

On a

$$t - t^2 = (1-x) - (1-x)^2 = x - x^2.$$

Donc avec  $y \neq 0$ , on a  $M = \begin{pmatrix} x & \frac{x-x^2}{y} \\ y & 1-x \end{pmatrix}$ .

On en déduit que  $\mathcal{P}$  contient les matrices  $M_n = \begin{pmatrix} n & n-n^2 \\ 1 & 1-n \end{pmatrix}$  et on a  $\|M_n\|_\infty \geq n$ .

Donc  $\mathcal{P}$  n'est pas bornée.

### Définition 1.53

On dit qu'une suite  $v$  à termes dans  $E$  est bornée quand l'ensemble de ses valeurs est borné, autrement dit quand il existe  $M > 0$  tel que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $\|v_n\| \leq M$ .

On dit qu'une fonction  $f$  d'un ensemble  $X$  dans  $E$  est bornée quand l'ensemble de ses valeurs prises sur  $X$  est borné, autrement dit quand il existe  $M > 0$  tel que pour tout  $x \in X$ ,  $\|f(x)\| \leq M$ .

### Exercice 1.54

Soit  $u$  une suite complexe arithmético-géométrique de raison  $a$ . À quelle condition est-elle bornée ?

#### Correction 1.55

Soit  $(u_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$  telle que  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+1} = au_n + b$ .

Si  $a \neq 1$ ,  $(u_n)$  est de la forme  $\left(\lambda a^n + \frac{b}{1-a}\right)_{n \in \mathbb{N}}$  où  $\lambda \in \mathbb{C}$ .

Si  $a = 1$ ,  $(u_n)$  est de la forme  $(\lambda + nb)_{n \in \mathbb{N}}$  où  $\lambda \in \mathbb{C}$ .

On choisit  $\lambda \neq 0$ .

On a alors

$$(u_n) \text{ est bornée } \iff \begin{cases} |a| \leq 1 \text{ et } a \neq 1 \\ \text{ou} \\ a = 1 \text{ et } b = 0 \end{cases}$$

---

**Exercice 1.56**

Soient  $B, B'$  deux boules de  $E$ . Si  $(x, x') \in E^2$ , on pose  $f(x, x') = d(x, x')$ . Montrez que  $f$  est bornée sur  $B \times B'$ .

---

*Correction 1.57*

Soient  $(a, b) \in E^2$  et  $r, s > 0$  tels que  $B = B(a, r)$  et  $B' = B(b, s)$ .

On a

$$\forall (x, x') \in B \times B', \quad 0 \leq f(x, x') \leq \|b - a\| + r + s$$

car

$$\begin{aligned} f(x, x') &= \|x - x'\| \\ &= \|x - a + a - b + b - x'\| \\ &\leq \|x - a\| + \|a - b\| + \|b - x'\| \\ &\leq r + s + \|b - a\|. \end{aligned}$$

## 1.3 Convergence des suites

Dans cette section,  $E$  désigne un espace vectoriel normé par la norme  $\|\cdot\|$ .

### 1.3.1 Définition

---

**Définition 1.58**

Soient  $u = (u_n)$  une suite à termes dans  $E$  et  $\ell \in E$ .

On dit que la suite  $u$  converge vers  $\ell$  quand toute boule ouverte de centre  $\ell$  contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang :

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists n_0 \in \mathbb{N}, \quad \forall n \geq n_0, \quad u_n \in B(\ell, \varepsilon).$$

---

**Proposition 1.59**

Dans la définition, on peut remplacer les boules ouvertes par des boules fermées.

On peut réécrire la définition sous deux formes équivalentes :

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists n_0 \in \mathbb{N}, \quad \forall n \geq n_0, \quad \|u_n - \ell\| < \varepsilon$$

ou

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists n_0 \in \mathbb{N}, \quad \forall n \geq n_0, \quad \|u_n - \ell\| \leq \varepsilon.$$

On peut donc se ramener aux suites réelles positives : la suite vectorielle  $u$  converge vers  $\ell$  ssi la suite réelle  $(\|u_n - \ell\|)$  converge vers 0.

Une suite qui ne converge vers aucun élément de  $E$  est dite divergente.

### 1.3.2 Propriétés usuelles

---

#### Proposition 1.60 (Unicité de la limite)

Si une suite  $u \in E^{\mathbb{N}}$  converge vers  $\ell \in E$ , elle ne peut converger vers un autre point de  $E$ .

On peut donc noter classiquement  $\ell = \lim u = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$  ou  $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell$ .

---

#### Démonstration 1.61

Par l'absurde, soit  $(\ell, \ell') \in E^2$  tel que  $u$  converge vers  $\ell$  et  $\ell'$ , et  $\ell \neq \ell'$ .

$$\text{Soit } \varepsilon = \frac{\|\ell - \ell'\|}{2}.$$

Il existe  $N_1 \in \mathbb{N}$  et  $N_2 \in \mathbb{N}$  tels que

$$\forall n \geq N_1, \quad \|u_n - \ell\| < \varepsilon$$

et

$$\forall n \geq N_2, \quad \|u_n - \ell'\| < \varepsilon.$$

On pose  $N = \max(N_1, N_2)$ .

On a alors

$$\begin{aligned} \forall n \geq N, \quad \varepsilon &= \frac{\|\ell - \ell'\|}{2} \\ &= \frac{\|\ell - u_n + u_n - \ell'\|}{2} \\ &\leq \frac{\|\ell - u_n\| + \|u_n - \ell'\|}{2} \\ &< \varepsilon. \end{aligned}$$

Contradiction donc  $\ell = \ell'$ . ■

---

#### Proposition 1.62

Si une suite  $u \in E^{\mathbb{N}}$  converge, alors elle est bornée.

---

#### Démonstration 1.63

On pose  $\varepsilon = 42$ .

Il existe  $N \in \mathbb{N}$  tel que

$$\forall n \geq N, \quad \|u_n - \ell\| \leq 42$$

i.e.  $\forall n \geq N, \quad u_n \in \overline{B}(\ell, 42)$ .

Parmi les  $N$  premiers termes de la suite  $u$ , on détermine le plus lointain de  $\ell$  : on pose

$$r = \max_{0 \leq k \leq N-1} \|u_k - \ell\|.$$

Puis on pose  $R = \max(42, r) > 0$ .

On a alors  $\forall n \in \mathbb{N}, \|u_n - \ell\| \leq R$ .

Donc  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \in \overline{B}(\ell, R)$ .

Donc la suite est bornée. ■

---

**Théorème 1.64 (Opérations sur les suites convergentes)**

Soient  $u, v \in E^{\mathbb{N}}$  convergeant respectivement vers  $\ell$  et  $m$  deux éléments de  $E$ .

Alors pour tout  $(a, b) \in \mathbb{K}^2$ , la suite  $au + bv$  converge vers  $a\ell + bm$ .

Soit  $\alpha \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$  convergeant vers  $\lambda \in \mathbb{K}$ .

Alors la suite  $\alpha u$  converge vers  $\lambda\ell$ .

---

*Démonstration 1.65 ( $\alpha u$  converge vers  $\lambda\ell$ )*

On a

$$\begin{aligned}\forall n \in \mathbb{N}, \|\alpha_n u_n - \lambda\ell\| &= \|\alpha_n u_n - \lambda u_n + \lambda u_n - \lambda\ell\| \\ &= \|(\alpha_n - \lambda) u_n + \lambda(u_n - \ell)\| \\ &\leq \|(\alpha_n - \lambda) u_n\| + \|\lambda(u_n - \ell)\| \\ &= |\alpha_n - \lambda| \|u_n\| + |\lambda| \|u_n - \ell\| \\ &\leq |\alpha_n - \lambda| \|u_n\| + (|\lambda| + 1) \|u_n - \ell\|.\end{aligned}$$

Soit  $\varepsilon > 0$ .

Il existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  tel que

$$\forall n \geq n_0, \|u_n - \ell\| \leq \frac{\varepsilon}{|\lambda| + 1}.$$

$u$  converge donc est bornée : il existe  $K \in \mathbb{R}_+^*$  tel que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \|u_n\| \leq K.$$

Donc il existe  $n_1 \in \mathbb{N}$  tel que

$$\forall n \geq n_1, |\alpha_n - \lambda| \leq \frac{\varepsilon}{K}.$$

Donc

$$\begin{aligned}\forall n \geq \max(n_0, n_1), \|\alpha_n u_n - \lambda\ell\| &\leq K \frac{\varepsilon}{K} + (|\lambda| + 1) \frac{\varepsilon}{|\lambda| + 1} \\ &= 2\varepsilon.\end{aligned}$$

D'où  $\alpha_n u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \lambda\ell$ . ■

---

**Proposition 1.66**

*Toute suite extraite d'une suite convergente converge vers la même limite.*

*Quasi-réciproque : si  $u$  est une suite telle que les deux suites extraites  $(u_{2n})$  et  $(u_{2n+1})$  convergent vers la même limite  $\ell$ , alors  $u$  converge vers  $\ell$ .*

---

**Proposition 1.67**

*Dans un produit de deux espaces vectoriels normés  $E \times F$ , une suite  $(u_n) = ((a_n, b_n))$  converge ssi les suites  $(a_n)$  et  $(b_n)$  convergent dans  $E$ , respectivement  $F$ .*

*Dans ce cas,  $\lim (a_n, b_n) = (\lim a_n, \lim b_n)$ .*

*Ce résultat se généralise sans difficulté par récurrence à un nombre quelconque (fini) d'espaces vectoriels normés.*

### 1.3.3 Cas particulier en dimension finie

Dans cette partie, on suppose que  $E$  est de dimension finie.

---

**Définition 1.68**

Soit  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  une base de  $E$ .

Pour  $i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$ , on appelle  $i$ -ème forme coordonnée (relative à la base  $\mathcal{B}$ ), notée souvent  $d_i$ , la forme linéaire qui à un vecteur associe sa  $i$ -ème coordonnée dans la base  $\mathcal{B}$  :

$$\text{pour tout } v \in E, \quad v = \sum_{i=1}^n d_i(v) e_i.$$

---

**Théorème 1.69**

*Soit  $\mathcal{B}$  une base de  $E$ .*

*Une suite  $u \in E^{\mathbb{N}}$  converge vers  $\ell \in E$  ssi pour toute forme coordonnée  $d$  relative à  $\mathcal{B}$ , la suite  $(d(u_n))$  converge vers  $d(\ell)$ .*

*Autrement dit, une suite converge ssi ses suites-coordonnées dans n'importe quelle base convergent.*

*Dans ce cas, la limite de la suite  $u$  est le vecteur  $\ell$  tel que pour toute forme coordonnée  $d$ ,  $d(\ell) = \lim_{n \rightarrow +\infty} d(u_n)$ .*

---

*Démonstration 1.70*

$E$  est de dimension finie donc toutes les normes sur  $E$  sont équivalentes. On note  $p = \dim E$ .

$\mathcal{B}$  étant une base de  $E$ , on choisit la norme  $\|\cdot\|_\infty$  relative à  $\mathcal{B}$ .

Il existe  $a, b > 0$  tels que  $a \|\cdot\|_\infty \leq \|\cdot\| \leq b \|\cdot\|_\infty$ .

$\Rightarrow$

Si  $(u_n)$  converge vers  $\ell$ , alors  $\|u_n - \ell\| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$  donc d'après l'inégalité ci-dessus, on a

$$0 \leq \|u_n - \ell\|_\infty \leq \frac{1}{a} \|u_n - \ell\|_\infty.$$

Donc, d'après le théorème des gendarmes, on a

$$\|u_n - \ell\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

En notant  $u_n = (u_{n,1}, \dots, u_{n,p})_{\mathcal{B}}$  et  $\ell = (\ell_1, \dots, \ell_p)_{\mathcal{B}}$ , on a

$$\|u_n - \ell\|_\infty = \max_{k \in \llbracket 1; p \rrbracket} |u_{n,k} - \ell_k|.$$

Donc  $\forall k \in \llbracket 1; p \rrbracket$ ,  $|u_{n,k} - \ell_k| \leq \|u_n - \ell\|_\infty$  et, par théorème des gendarmes, on a

$$u_{n,k} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell_k.$$

$\Leftarrow$

Si pour tout  $k \in \llbracket 1; p \rrbracket$ ,  $(u_{n,k})_{n \in \mathbb{N}}$  converge vers  $\ell_k$ , on a  $\|u_n - \ell\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$  et d'après l'inégalité précédente, on a

$$\|u_n - \ell\| \leq b \|u_n - \ell\|_\infty$$

donc  $\|u_n - \ell\| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$  i.e.  $(u_n)$  converge vers  $\ell$ . ■

---

*Exemple 1.71*

Si  $M_n = \begin{pmatrix} 1 & e^{-n} \\ 1/n & n \sin(1/n) \end{pmatrix}$ , alors la suite de matrices  $(M_n)$  converge vers la matrice  $I_2$ .

---

**Corollaire 1.72**

Si  $E$  est de dimension finie, la convergence d'une suite ne dépend pas du choix de la norme. On peut donc choisir la norme qu'on veut.

### 1.3.4 Point adhérent à une partie

---

#### Définition 1.73

Soient  $A$  une partie de  $E$  et  $x \in E$ .

On dit que  $x$  est un point adhérent à  $A$  quand il existe une suite  $u \in A^{\mathbb{N}}$  qui converge vers  $x$ .

L'adhérence de  $A$  est l'ensemble de ses points adhérents, noté  $\overline{A}$ .

Intuitivement, l'adhérence d'une partie est elle-même à laquelle on ajoute tous les points qui se trouvent sur son bord.

---

#### Remarque 1.74

On remarque qu'on a  $A \subseteq \overline{A}$  car pour tout  $a \in A$ , la suite constante égale à  $a$  converge vers  $a$  et est à termes dans  $A$ .

---

#### Exercice 1.75

Quelle est l'adhérence d'une boule ouverte ?

---

#### Correction 1.76

Soient  $a \in E$  et  $r > 0$ . Montrons que  $\overline{B(a, r)} = \overline{B}(a, r)$ .

$\subseteq$

Soit  $b \in \overline{B(a, r)}$ .

Il existe  $(u_n) \in B(a, r)^{\mathbb{N}}$  qui converge vers  $b$ .

D'après la deuxième inégalité triangulaire, on a

$$\begin{aligned} ||u_n - a|| - ||b - a|| &\leq ||(u_n - a) - (b - a)|| \\ &= ||u_n - b||. \end{aligned}$$

Or  $||u_n - b|| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$  donc d'après le théorème d'encadrement, on a

$$||u_n - a|| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} ||b - a||.$$

Or  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \in B(a, r)$  donc  $||u_n - a|| < r$ .

Par passage à la limite,  $||b - a|| \leq r$ .

Donc  $b \in \overline{B}(a, r)$ .

$\supseteq$

Soit  $b \in \overline{B}(a, r)$ .

Alors  $\|b - a\| \leq r$ .

Si  $\|b - a\| < r$ , alors  $b \in B(a, r) \subseteq \overline{B(a, r)}$ .

Si  $\|b - a\| = r$ , on pose, pour  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $u_n = \frac{1}{n}a + \left(1 - \frac{1}{n}\right)b$ .

La suite  $(u_n)$  converge vers  $b$  par opérations sur les limites et on a

$$\begin{aligned}\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \|u_n - a\| &= \left\| \left(\frac{1}{n} - 1\right)a + \left(1 - \frac{1}{n}\right)b \right\| \\ &= \left| 1 - \frac{1}{n} \right| \|b - a\| \\ &= \frac{n-1}{n} r \\ &< r\end{aligned}$$

donc  $(u_n) \in B(a, r)^{\mathbb{N}}$ .

On a ainsi trouvé une suite à termes dans  $B(a, r)$  qui converge vers  $b$  donc  $b \in \overline{B(a, r)}$ .

---

*Remarque 1.77*

On a montré au passage que si  $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell$  alors pour tout  $a \in E$ ,  $\|u_n - a\| \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \|\ell - a\|$ .

---

### Exercice 1.78

Quelle est l'adhérence de  $\mathbb{Z}$  dans  $\mathbb{R}$  ?

---

*Correction 1.79*

$\mathbb{R}$  est muni de la norme  $|\cdot|$ .

Montrons que  $\mathbb{Z} = \overline{\mathbb{Z}}$ .

$\boxed{\subseteq}$  Trivial.

$\boxed{\supseteq}$

Soit  $b \in \overline{\mathbb{Z}}$ .

Il existe une suite  $(u_n) \in \mathbb{Z}^{\mathbb{N}}$  qui converge vers  $b$ .

On pose  $\varepsilon = \frac{1}{2}$ .

Il existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  tel que

$$\forall n \geq n_0, \quad |u_n - b| < \frac{1}{2}$$

$$i.e. \quad u_n \in \left] b - \frac{1}{2}; b + \frac{1}{2} \right[.$$



Or l'intervalle  $\left] b - \frac{1}{2} ; b + \frac{1}{2} \right[$  est de longueur 1 et est ouvert donc il contient au plus un entier.

Or il en contient un donc il en contient un et un seul.

On en déduit que  $(u_n)$  est stationnaire en cet entier à partir de  $n_0$  et donc  $\lim u = b$  est un entier.

Donc  $b \in \mathbb{Z}$ .

---

**Proposition 1.80**

Soient  $A$  une partie de  $E$  et  $x \in E$ .

Alors  $x$  est adhérent à  $A$  ssi toute boule centrée en  $x$  rencontre  $A$ .

De manière formalisée :  $x \in \overline{A} \iff \forall r > 0, \exists y \in A, y \in B(x, r)$ .

---

Démonstration 1.81

$\boxed{\Leftarrow}$

On a pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $B\left(x, \frac{1}{n}\right) \cap A \neq \emptyset$ .

On peut choisir  $y_n \in B\left(x, \frac{1}{n}\right) \cap A$ .

On construit ainsi une suite  $(y_n) \in A^{\mathbb{N}^*}$  telle que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \|x - y_n\| < \frac{1}{n}.$$

D'après le théorème d'encadrement, on a donc  $y_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} x$ .

Donc  $x \in \overline{A}$ .

$\boxed{\Rightarrow}$

Soient  $x \in \overline{A}$  et  $(u_n) \in A^{\mathbb{N}}$  telle que  $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} x$ .

Soit  $r > 0$ .

Il existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  tel que

$$\forall n \geq n_0, \|u_n - x\| < r$$

donc  $u_{n_0} \in A \cap B(x, r)$  donc  $A \cap B(x, r) \neq \emptyset$ . ■

On peut donner la définition de la densité d'une partie.

---

**Définition 1.82**

On dit qu'une partie  $A$  est dense dans  $E$  quand  $\overline{A} = E$ , c'est-à-dire qu'on peut trouver des éléments de  $A$  aussi proches de n'importe quel point.

---

*Exemple 1.83*

- ▷ Dans  $\mathbb{R}$ ,  $\mathbb{Q}$  et  $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$  sont denses (*cf.* cours de première année).
- ▷  $\text{GL}_n(\mathbb{K})$  est dense dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  (démonstration ultérieure).

## 1.4 Limites de fonctions

Dans cette section,  $E$  et  $F$  sont deux espaces vectoriels normés par les normes  $\|\cdot\|_E$  et  $\|\cdot\|_F$ .

### 1.4.1 Définition

---

**Définition 1.84**

Soient  $f$  une fonction de  $E$  dans  $F$ ,  $D$  son ensemble de définition,  $a \in \overline{D}$  et  $\ell \in F$ .

On dit que  $f$  a pour limite  $\ell$  en  $a$  quand

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in D, \|x - a\|_E < \eta \implies \|f(x) - \ell\|_F < \varepsilon.$$

---

*Remarque 1.85*

On peut remplacer les inégalités strictes sur les normes par des inégalités larges.

On peut réécrire la définition à l'aide de boules ouvertes (ou fermées) :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in D \cap B(a, \eta), f(x) \in B(\ell, \varepsilon).$$

Si  $E$  et  $F$  sont de dimension finie, cette définition ne dépend pas du choix des normes.

### 1.4.2 Caractérisation séquentielle de la limite

---

**Théorème 1.86**

Soient  $f$  une fonction de  $E$  dans  $F$ ,  $D$  son ensemble de définition,  $a \in \overline{D}$  et  $\ell \in F$ .

$f$  a pour limite  $\ell$  en  $a$  ssi pour toute suite  $u$  à termes dans  $D$  convergeant vers  $a$ , la suite  $f \circ u = (f(u_n))$  converge vers  $\ell$ .

---

Démonstration 1.87

$\Rightarrow$

Supposons que  $f$  a pour limite  $\ell$  en  $a$ .

Soit  $u \in D^{\mathbb{N}}$  qui converge vers  $a$ .

Pour tout  $\varepsilon > 0$ , il existe  $\eta > 0$  tel que

$$\forall x \in D, \|x - a\|_E < \eta \implies \|f(x) - \ell\|_F < \varepsilon.$$

On a  $\eta > 0$  et  $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} a$  donc il existe  $N \in \mathbb{N}$  tel que

$$\forall n \geq N, \|u_n - a\|_E < \eta.$$

Donc pour tout  $n \geq N$ , comme  $u_n \in D$  et  $\|u_n - a\|_E < \eta$ , on a

$$\|f(u_n) - \ell\|_F < \varepsilon.$$

Donc  $(f(u_n))$  converge vers  $\ell$ .

$\Leftarrow$

Par contraposée, montrons que si  $f$  n'a pas pour limite  $\ell$  en  $a$  alors il existe  $u \in D^{\mathbb{N}}$  telle que  $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} a$  et  $f(u_n) \not\xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell$ .

Si  $f$  n'a pas pour limite  $\ell$  en  $a$ , alors il existe  $\varepsilon > 0$  tel que pour tout  $\eta > 0$ , il existe  $x \in D$  tel que  $\|x - a\|_E < \eta$  et  $\|f(x) - \ell\|_F \geq \varepsilon$ .

Donc pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , il existe  $u_n \in D$  tel que 
$$\begin{cases} \|u_n - a\|_E < \frac{1}{n+1} \\ \|f(u_n) - \ell\|_F \geq \varepsilon \end{cases}.$$

On construit ainsi une suite  $(u_n) \in D^{\mathbb{N}}$  telle que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \begin{cases} \|u_n - a\|_E < \frac{1}{n+1} \\ \|f(u_n) - \ell\|_F \geq \varepsilon \end{cases}$$

Par encadrement,  $(u_n)$  converge vers  $a$  mais  $(f(u_n))$  ne converge pas vers  $\ell$ . ■

En pratique, on utilise beaucoup plus souvent le sens direct de l'équivalence précédente.

### 1.4.3 Propriétés usuelles

---

**Proposition 1.88 (Unicité de la limite)**

Soient  $f$  une fonction de  $E$  dans  $F$ ,  $D$  son ensemble de définition,  $a \in \overline{D}$  et  $\ell \in F$ .

Si  $f$  a pour limite  $\ell$  en  $a$ , alors elle ne peut avoir d'autre limite que  $\ell$  en  $a$ .

On peut donc noter classiquement  $\ell = \lim_a f = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$  ou  $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$ .

---

**Proposition 1.89**

Si  $f$  a pour limite  $\ell$  en  $a$ , alors elle est bornée au voisinage de  $a$ .

---

**Théorème 1.90 (Opérations sur les limites)**

Soient  $f$  et  $g$  deux fonctions de  $E$  dans  $F$ , définies sur la même partie  $D$  et ayant respectivement pour limites  $\ell$  et  $m$  deux éléments de  $F$  en  $a \in \overline{D}$ .

Alors pour tout  $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$ , la fonction  $\lambda f + \mu g$  a pour limite  $\lambda \ell + \mu m$  en  $a$ .

Soient  $\alpha$  une fonction de  $E$  dans  $\mathbb{K}$  et  $f$  une fonction définie de  $E$  dans  $F$ , définies sur la même partie  $D$  et ayant respectivement pour limites  $\beta \in \mathbb{K}$  et  $\ell \in F$  en  $a \in \overline{D}$ .

Alors  $\alpha f$  a pour limite  $\beta \ell$  en  $a$ .

---

**Proposition 1.91**

Une fonction  $f = (g, h)$  à valeurs dans un produit d'espaces vectoriels normés a une limite ssi  $g$  et  $h$  ont chacune une limite.

Dans ce cas,  $\lim_a f = \left( \lim_a g, \lim_a h \right)$ .

Ce résultat se généralise sans difficulté par récurrence à un nombre quelconque (fini) d'espaces vectoriels normés.

---

### 1.4.4 Cas particulier de la dimension finie

---

**Théorème 1.92**

On suppose que  $F$  est de dimension finie. Soit  $\mathcal{B}$  une base de  $F$ .

Soit  $f$  une fonction de  $E$  dans  $F$ ,  $D$  son ensemble de définition,  $a \in \overline{D}$  et  $\ell \in F$ .

La fonction  $f$  a pour limite  $\ell$  en  $a$  ssi pour toute forme coordonnée  $d$  relative à  $\mathcal{B}$ , la fonction  $d \circ f$  a pour limite  $d(\ell)$  en  $a$ .

Autrement dit, une fonction a une limite en  $a$  ssi ses fonctions-coordonnées dans n'importe quelle base ont chacune une limite en  $a$ .

Dans ce cas, la limite de la fonction  $f$  en  $a$  est le vecteur  $\ell$  tel que pour toute forme coordonnée  $d$ ,  $d(\ell) = \lim_{x \rightarrow a} d(f(x))$ .

## 1.4.5 Composition des limites

$G$  désigne un troisième espace vectoriel normé.

---

### Théorème 1.93

Soient  $f$  une fonction de  $E$  dans  $F$  et  $D_f$  son ensemble de définition. Soient  $g$  une fonction de  $F$  dans  $G$  et  $D_g$  son ensemble de définition. On suppose que  $f(D_f) \subseteq D_g$  (condition qui permet de définir la composée  $g \circ f$  sur  $D_f$ ).

Soient  $a \in \overline{D_f}$ ,  $b \in \overline{D_g}$  et  $\ell \in G$ .

Si  $f$  a pour limite  $b$  en  $a$  et  $g$  a pour limite  $\ell$  en  $b$ , alors  $g \circ f$  a pour limite  $\ell$  en  $a$ .

Autrement dit, si 
$$\begin{cases} f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} b \\ g(y) \xrightarrow{y \rightarrow b} \ell \end{cases} \text{ alors } g \circ f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell.$$

## 1.4.6 Extensions des définitions

D'abord les limites infinies en un point dans le cas où l'espace d'arrivée est  $\mathbb{R}$ .

---

### Définition 1.94

Soient  $f$  une fonction de  $E$  dans  $\mathbb{R}$ ,  $D$  son ensemble de définition et  $a \in \overline{D}$ .

On dit que  $f$  a pour limite  $+\infty$  en  $a$  quand

$$\forall M > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in D, \|x - a\|_E \leq \eta \implies f(x) \geq M.$$

On dit que  $f$  a pour limite  $-\infty$  en  $a$  quand

$$\forall M < 0, \exists \eta > 0, \forall x \in D, \|x - a\|_E \leq \eta \implies f(x) \leq M.$$

Puis les limites en « l'infini ».

---

### Définition 1.95

Soient  $f$  une application de  $E$  dans  $F$  et  $\ell \in F$ .

On dit que  $f$  a pour limite  $\ell$  quand  $\|x\|$  tend vers l'infini quand

$$\forall \varepsilon > 0, \exists B > 0, \forall x \in E, \|x\|_E \geq B \implies \|f(x) - \ell\|_F \leq \varepsilon.$$

Dans le cas où  $F = \mathbb{R}$ , on dit que  $f(x)$  a pour limite  $+\infty$  quand  $\|x\|$  tend vers l'infini quand

$$\forall M > 0, \exists B > 0, \forall x \in E, \|x\|_E \geq B \implies f(x) \geq M.$$

(Définition semblable pour la limite  $-\infty$ ).

Enfin, dans le cas où l'espace de départ est  $\mathbb{R}$ , on peut parler de limite en l'infini au sens habituel.

---

**Définition 1.96**

Soient  $f$  une fonction de  $\mathbb{R}$  dans  $F$ , définie sur un ouvert  $]a; +\infty[$  et  $\ell \in F$ .

On dit que  $f(x)$  a pour limite  $\ell$  quand  $x$  tend vers  $+\infty$  quand

$$\forall \varepsilon > 0, \exists B > 0, \forall x \geq B, \|f(x) - \ell\| \leq \varepsilon.$$

(Définition semblable pour la limite  $x$  tend vers  $-\infty$ ).

## 1.5 Fonctions continues

Dans cette section,  $E$  et  $F$  sont des espaces vectoriels normés par les normes  $\|\cdot\|_E$  et  $\|\cdot\|_F$ .

### 1.5.1 Continuité en un point

---

**Proposition 1.97**

Soient  $f$  une fonction de  $E$  dans  $F$ ,  $D$  son ensemble de définition,  $a \in \overline{D}$  et  $\ell \in F$ .

Si  $f$  a pour limite  $\ell$  en  $a$  et si  $a \in D$ , alors  $\ell = f(a)$ .

Dans ce cas, on dit que la fonction  $f$  est continue en  $a$ .

---

**Définition 1.98**

Soient  $f$  une fonction de  $E$  dans  $F$ ,  $D$  son ensemble de définition et  $a \in D$ .

On dit que  $f$  est continue en  $a$  quand  $f$  a pour limite  $f(a)$  en  $a$ .

On déduit de cette définition et des théorèmes précédents

- la caractérisation séquentielle de la continuité en un point ;
- le fait qu'une fonction continue en un point est bornée au voisinage de ce point ;
- les théorèmes d'opérations et de compositions des fonctions continues en un point ;
- l'équivalence entre la continuité d'une fonction et celle de ses fonctions-coordonnées dans une certaine base de  $F$  dans le cas où  $F$  est de dimension finie.

## 1.5.2 Continuité sur une partie

---

### Définition 1.99

Soient  $f$  une fonction de  $E$  dans  $F$ ,  $D$  son ensemble de définition et  $A \subseteq D$ .

On dit que  $f$  est continue sur  $A$  quand  $f$  est continue en tout point de  $A$ .

On déduit de cette définition et des théorèmes précédents

- les théorèmes d'opérations et de compositions des fonctions continues sur une partie ;
- l'équivalence entre la continuité d'une fonction et celle de ses fonctions-coordonnées dans une certaine base de  $F$  dans le cas où  $F$  est de dimension finie.

---

### Proposition 1.100

Soient  $f$  et  $g$  deux fonctions de  $E$  dans  $F$  définies sur  $D$  et  $A \subseteq D$ .

Si  $A$  est dense dans  $D$ ,  $f$  et  $g$  sont continues sur  $D$  et  $f = g$  sur  $A$ , alors  $f = g$  sur  $D$ .

---

#### Démonstration 1.101

On suppose que  $A$  est dense dans  $D$  et que  $f$  et  $g$  sont continues.

Soit  $x \in D$ .

Il existe  $(u_n) \in A^{\mathbb{N}}$  telle que  $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x$ .

$f$  est continue en  $x$  donc d'après la caractérisation séquentielle de la continuité, on a

$$f(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(x).$$

De même, on a

$$g(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} g(x).$$

Or  $f = g$  sur  $A$  donc  $(f(u_n)) = (g(u_n))$  donc  $f(x) = g(x)$  par unicité de la limite. ■

## 1.5.3 Cas particulier de la dimension finie

On suppose que  $E$  et  $F$  sont de dimensions finies.

Dans une base donnée, les formes coordonnées relatives à cette base sont en particulier des applications continues.

Donc toute fonction  $f$  de  $E$  dans  $F$  dont les fonctions-coordonnées  $(f_1, \dots, f_n)$  dans une base de  $F$  sont définies polynomialement à partir des formes coordonnées dans une base de  $E$  est continue.

---

*Exemple 1.102*

- La fonction  $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$  telle que  $f(x, y) = (x^2 + y^2, xy - (1+x)^3)$  est continue sur  $\mathbb{R}^2$ .
- Les applications trace et déterminant définies sur  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  sont continues.

---

**Exercice 1.103**

Montrez que l'application  $A \mapsto A^2$  est continue de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  dans lui-même.

---

*Correction 1.104*

On a  $A^2 = \left( \sum_{k=1}^n a_{i,k} a_{k,j} \right)_{(i,j) \in \llbracket 1;n \rrbracket^2}$  donc  $A \mapsto A^2$  est continue.

---

**Exercice 1.105**

En admettant (momentanément) que  $\text{GL}_n(\mathbb{K})$  est un ouvert, montrez que l'application  $A \mapsto A^{-1}$  est continue de  $\text{GL}_n(\mathbb{K})$  dans lui-même.

---

*Correction 1.106*

Si  $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ , alors  $A^{-1} = \frac{1}{\det A} (\text{Com } A)^\top$ .

Les coefficients de  $(\text{Com } A)^\top$  sont des déterminants calculés à partir des coefficients de  $A$  donc dépendent polynomialement de ces coefficients, donc  $A \mapsto (\text{Com } A)^\top$  est continue.

Donc  $A \mapsto A^{-1}$  est le produit de deux fonctions continues et est donc continue.

---

## 1.5.4 Fonctions lipschitziennes

---

**Définition 1.107**

Soient  $f$  une application de  $E$  dans  $F$ ,  $A$  une partie de  $E$  et  $K \in \mathbb{R}_+$ .

On dit que  $f$  est  $K$ -lipschitzienne sur  $A$  (ou lipschitzienne de rapport  $K$ ) quand

$$\forall (x, y) \in A^2, \quad \|f(y) - f(x)\|_F \leq K \|y - x\|_E.$$

On dit que  $f$  est lipschitzienne sur  $A$  quand il existe  $K \in \mathbb{R}_+$  tel que  $f$  soit  $K$ -lipschitzienne sur  $A$ .



---

*Remarque 1.108*

Si  $f$  est  $K$ -lipschitzienne sur  $A$ , alors le rapport  $K$  n'est pas unique, puisque pour tout  $L \geq K$ , on a encore  $f$   $L$ -lipschitzienne sur  $A$ .

---

**Proposition 1.109**

*Toute fonction lipschitzienne est continue.*

Mais la réciproque est fautive (contre-exemple : la fonction  $\sqrt{\cdot}$  sur  $[0 ; +\infty[$ ).

Un exemple fondamental : la fonction  $x \mapsto d(x, A)$ .

---

**Définition 1.110**

Soit  $A$  une partie de  $E$ .

Pour  $x \in E$ , on appelle distance de  $x$  à  $A$  le réel  $\inf_{a \in A} d(x, a)$ .

---

**Proposition 1.111**

*Pour toute partie  $A$  de  $E$ , la fonction  $x \mapsto d(x, A)$  est 1-lipschitzienne.*

*L'adhérence de  $A$  est l'ensemble des points à distance nulle de  $A$ , i.e. tels que  $d(x, A) = 0$ .*

---

*Démonstration 1.112 (1-lipschitzianité de la fonction)*

On veut montrer

$$\forall (x, y) \in E^2, \quad |d(x, A) - d(y, A)| \leq \|x - y\|.$$

On montre d'abord

$$\forall (x, y) \in E^2, \quad d(x, A) - d(y, A) \leq \|x - y\|$$

ce qui est équivalent à

$$\forall (x, y) \in E^2, \quad d(x, A) \leq d(y, A) + \|x - y\|.$$

On a  $d(x, A) = \inf_{a \in A} \|x - a\|$  donc pour tout  $a \in A$ , on a

$$d(x, A) \leq \|x - a\|.$$

Or  $\|x - a\| = \|x - y + y - a\| \leq \|x - y\| + \|y - a\|$  donc

$$d(x, A) \leq \|x - y\| + \|y - a\|.$$

De plus, on a  $d(y, A) = \inf_{a \in A} \|y - a\|$  donc il existe  $(u_n) \in A^{\mathbb{N}}$  telle que

$$\|y - u_n\| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} d(y, A).$$

Alors pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $d(x, A) \leq \|x - y\| + \|y - u_n\|$ , donc par passage à la limite quand  $n \rightarrow +\infty$  :

$$d(x, A) \leq \|x - y\| + d(y, A)$$

donc  $d(x, A) - d(y, A) \leq \|x - y\|$ .

En échangeant  $x$  et  $y$ , on obtient

$$\forall (x, y) \in E^2, \quad d(y, A) - d(x, A) \leq \|y - x\| = \|x - y\|.$$

D'où

$$\forall (x, y) \in E^2, \quad |d(x, A) - d(y, A)| \leq \|x - y\|.$$

■

*Démonstration 1.113* ( $x \in \overline{A} \iff d(x, A) = 0$ )

$\implies$

Si  $x \in \overline{A}$  alors il existe une suite  $(u_n) \in A^{\mathbb{N}}$  qui converge vers  $x$ .

Or  $x \mapsto d(x, A)$  est lipschitzienne donc continue, donc

$$d(u_n, A) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} d(x, A).$$

Or pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $d(u_n, A) = 0$  car  $(u_n) \in A^{\mathbb{N}}$ , donc

$$d(x, A) = 0.$$

$\impliedby$

Si  $d(x, A) = 0$ , alors  $\inf_{a \in A} \|x - a\| = 0$ .

Donc il existe  $(a_n) \in A^{\mathbb{N}}$  telle que  $\|x - a_n\| \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$  i.e.  $(a_n)$  converge vers  $x$  i.e.  $x \in \overline{A}$ .

■

### 1.5.5 Continuité des applications linéaires et $n$ -linéaires

#### Proposition 1.114

Soit  $f \in \mathcal{L}(E, F)$ .

Il y a équivalence entre les propositions suivantes :

- (1)  $f$  est continue en 0 ;
- (2)  $f$  est continue en un point  $x$  ;
- (3)  $f$  est continue sur  $E$  ;

(4)  $f$  est lipschitzienne sur  $E$  ;

(5) il existe  $K \geq 0$  tel que pour tout  $x \in E$ ,  $\|f(x)\|_F \leq K \|x\|_E$  ;

(6)  $f$  est bornée sur la boule-unité ;

(7)  $f$  est bornée sur une boule.

---

*Démonstration 1.115*

On a clairement  $(4) \implies (3)$ ,  $(3) \implies (2)$  et  $(3) \implies (1)$ . ■

---

*Démonstration 1.116 ((1)  $\implies$  (2))*

Soit  $x \in E$ .

$f$  est continue en 0 donc  $\lim_{h \rightarrow 0} f(h) = f(0) = 0$ .

Donc  $f(x+h) = f(x) + f(h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} f(x)$ .

Donc  $f$  est continue en  $x$ . ■

---

*Démonstration 1.117 ((2)  $\implies$  (3))*

Soit  $y \in E$ .

$f$  est continue en  $x$  donc  $\lim_{t \rightarrow x} f(t) = f(x)$ .

Donc

$$\begin{aligned} f(t) &= f(t - y + x - x + y) \\ &= f(t - y + x) - f(x) + f(y) \\ &\xrightarrow{t \rightarrow y} f(y). \end{aligned}$$

Donc  $f$  est continue en  $y$ .

Donc  $f$  est continue sur  $E$ . ■

---

*Démonstration 1.118 ((3)  $\implies$  (7))*

Soit  $x \in E$ .

$f$  est continue en  $x$  donc  $f$  est bornée au voisinage de  $x$  i.e. il existe  $r > 0$  tel que  $f$  soit bornée sur  $B(x, r)$ . ■

---

*Démonstration 1.119 ((7)  $\implies$  (6))*

$f$  est bornée sur  $B(x, r)$  : il existe  $M > 0$  tel que

$$\forall t \in B(x, r), \quad \|f(t)\| \leq M.$$

Pour tout  $y \in B(0, r)$ , on a  $x + y \in B(x, r)$ .

Donc  $\|f(x + y)\| \leq M$ .

Donc  $\|f(x) + f(y)\| \leq M$  donc  $\|f(y)\| - \|f(x)\| \leq \|f(y) + f(x)\| \leq M$ .

Donc  $\|f(y)\| \leq M + \|f(x)\| = M'$ .

Pour tout  $z \in B(0, 1)$ , on a  $rz \in B(0, r)$ .

Donc d'après ce qui précède :

$$\|f(rz)\| \leq M'$$

$$\|rf(z)\| \leq M'$$

$$r\|f(z)\| \leq M'$$

$$\|f(z)\| \leq \frac{M'}{r}.$$

Donc  $f$  est bornée sur  $B(0, 1)$ . ■

---

*Démonstration 1.120 ((6)  $\implies$  (5))*

Pour tout  $x \in E \setminus \{0\}$ ,  $\left\| \frac{x}{\|x\|} \right\| = 1$ .

Donc  $\frac{x}{2\|x\|} \in B(0, 1)$ .

$f$  est bornée sur  $B(0, 1)$  : il existe  $M > 0$  tel que

$$\forall t \in B(0, 1), \quad \|f(t)\| \leq M.$$

Donc pour tout  $x \neq 0$ ,  $\left\| f\left(\frac{x}{2\|x\|}\right) \right\| \leq M$ .

Donc  $\left\| \frac{1}{2\|x\|} f(x) \right\| \leq M$ .

Donc  $\frac{1}{2\|x\|} \|f(x)\| \leq M$ .

Donc  $\|f(x)\| \leq 2M\|x\|$ .

Ceci est vrai aussi pour  $x = 0$  :  $\|f(0)\| = \|0\| = 0 \leq 2M\|0\|$ . ■


---

*Démonstration 1.121* ((5)  $\implies$  (4))

On a

$$\forall (x, y) \in E^2, \quad \|f(x) - f(y)\| = \|f(x - y)\| \leq K \|x - y\|.$$

On a donc montré toutes les équivalences :



■

---

### Exercice 1.122

On pose  $E = \mathcal{C}^0([0; 1], \mathbb{R})$  muni de la norme infinie.

L'application  $f \mapsto \int_0^1 f(t) dt$  est-elle continue sur  $E$  ?

---

### Correction 1.123

Pour  $f \in E$ , on a  $\|f\|_\infty = \sup_{[0;1]} |f| \in \mathbb{R}$  car  $|f|$  est continue sur le segment  $[0; 1]$ .

On note  $I : f \mapsto \int_0^1 f(t) dt$ .  $I$  est linéaire.

Pour  $f \in E$ , on a  $|I(f)| \leq \int_0^1 |f|$ .

Or  $\forall t \in [0; 1], |f(t)| \leq \|f\|_\infty$ .

Donc

$$|I(f)| \leq \int_0^1 |f| \leq \int_0^1 \|f\|_\infty dt = \|f\|_\infty.$$

Donc d'après la Proposition 1.114,  $I$  est continue sur  $E$ .

---

**Exercice 1.124**

$E$  désigne le même espace et on pose  $\|f\|_1 = \int_0^1 |f(t)| dt$ .

Montrez que  $\|\cdot\|_1$  est une norme sur  $E$ .

L'application  $f \mapsto f(1)$  est-elle continue sur  $E$  ?

---

*Correction 1.125 ( $\|\cdot\|_1$  est une norme sur  $E$ )*

► Soit  $f \in E$ . Si  $\|f\|_1 = 0$  alors  $\int_0^1 |f| = 0$ . Or  $|f|$  est continue et positive donc d'après le théorème de stricte positivité de l'intégrale,  $|f| = 0$  donc  $f = 0$ .

► Soient  $f \in E$  et  $\lambda \in \mathbb{R}$ . On a

$$\|\lambda f\|_1 = \int_0^1 |\lambda f| = \int_0^1 |\lambda| |f| = |\lambda| \int_0^1 |f| = |\lambda| \|f\|_1.$$

► Soit  $(f, g) \in E^2$ . On a

$$\|f + g\|_1 = \int_0^1 |f + g| \leq \int_0^1 (|f| + |g|) = \int_0^1 |f| + \int_0^1 |g| = \|f\|_1 + \|g\|_1.$$

► Donc  $\|\cdot\|_1$  est une norme sur  $E$ .

---

*Correction 1.126 (Continuité de l'application ?)*

On pose  $V : E \rightarrow \mathbb{R}$   
 $f \mapsto f(1)$

Pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , on pose  $f_n : x \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } x \in \left[0 ; 1 - \frac{1}{n}\right] \\ n^2 \left(x - \left(1 - \frac{1}{n}\right)\right) & \text{sinon} \end{cases}$

Pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , on a  $\int_0^1 |f| = \int_0^1 f_n = \frac{1}{2}$  donc  $f_n \in B(0, 1)$ .

Or  $|V(f_n)| = |f_n(1)| = n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ .

On a ainsi trouvé une suite  $(f_n)$  à termes dans  $B(0, 1)$  telle que  $V(f_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ .

Donc  $V$  n'est pas bornée sur  $B(0, 1)$ .

Donc comme  $V$  est linéaire,  $V$  n'est pas continue sur  $(E, \|\cdot\|_1)$ .

Remarque : on a  $\forall f \in E, |V(f)| = |f(1)| \leq \|f\|_\infty$  donc  $V$  est continue sur  $(E, \|\cdot\|_\infty)$ .

---

**Définition 1.127**

On note  $\mathcal{L}_c(E, F)$  l'ensemble des applications linéaires continues de  $E$  dans  $F$ .

---

**Proposition 1.128**

$\mathcal{L}_c(E, F)$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathcal{L}(E, F)$ , en général distinct de  $\mathcal{L}(E, F)$ .

Cas particulier en dimension finie.

---

**Théorème 1.129**

On suppose que  $E$  est de dimension finie.

Toute application linéaire de  $E$  dans  $F$  est lipschitzienne sur  $E$ , donc continue.

Autrement dit, si  $E$  est de dimension finie, alors  $\mathcal{L}_c(E, F) = \mathcal{L}(E, F)$ .

---

*Démonstration 1.130*

On note  $p = \dim E$  et  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$  une base de  $E$ .

Pour  $x = (x_1, \dots, x_p)_{\mathcal{B}}$ , on a  $\|x\|_{\infty} = \sup_{1 \leq i \leq p} |x_i| = \max_{1 \leq i \leq p} |x_i|$ .

Soit  $f \in \mathcal{L}(E, F)$  et  $N$  une norme sur  $F$ .

Pour  $x = (x_1, \dots, x_p)_{\mathcal{B}}$ , on a  $x = \sum_{k=1}^p x_k e_k$ .

Donc,  $f$  étant linéaire, on a  $f(x) = \sum_{k=1}^p x_k f(e_k)$ .

Donc

$$\begin{aligned} N(f(x)) &= N\left(\sum_{k=1}^p x_k f(e_k)\right) \\ &\leq \sum_{k=1}^p N(x_k f(e_k)) \\ &= \sum_{k=1}^p |x_k| N(f(e_k)). \end{aligned}$$

De plus, on a

$$\begin{aligned} \forall i \in \llbracket 1 ; p \rrbracket, \quad |x_i| &\leq \|x\|_{\infty} \\ |x_i| N(f(e_i)) &\leq \|x\|_{\infty} N(f(e_i)). \end{aligned}$$

Donc  $N(f(x)) \leq \|x\|_{\infty} \underbrace{\sum_{k=1}^p N(f(e_k))}_K$ .

Ceci prouve d'après la Proposition 1.114 que  $f$  est continue de  $(E, \|\cdot\|_\infty)$  dans  $(F, N)$ .

Soit maintenant  $\|\cdot\|$  une norme quelconque sur  $E$ .

Comme  $E$  est de dimension finie, toutes les normes sur  $E$  sont équivalentes, donc il existe  $a, b > 0$  tels que  $a \|\cdot\| \leq \|\cdot\|_\infty \leq b \|\cdot\|$ .

Donc pour tout  $x \in E$ ,  $N(f(x)) \leq bK \|x\|$ .

Donc  $f$  est continue de  $(E, \|\cdot\|)$  dans  $(F, N)$ . ■

*Remarque 1.131*

L'hypothèse de dimension finie de  $E$  est indispensable. Dans le cas contraire, c'est faux en général.

Le résultat précédent s'étend aux applications multilinéaires.

### **Théorème 1.132**

Soient  $E_1, \dots, E_n$  des espaces vectoriels normés de dimensions finies et  $f : E_1 \times \dots \times E_n \longrightarrow F$  une application  $n$ -linéaire.

Il existe alors une constante  $K \geq 0$  telle que

$$\text{pour tout } (x_1, \dots, x_n) \in E_1 \times \dots \times E_n, \quad \|f(x_1, \dots, x_n)\| \leq K \|x_1\|_{E_1} \dots \|x_n\|_{E_n}.$$

*Démonstration 1.133*

Pour tout  $i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$ , on note  $p_i = \dim E_i$  et  $\mathcal{B}_i = (e_{i,1}, \dots, e_{i,p_i})$  une base de  $E_i$ .

Soit  $(x_1, \dots, x_n) \in E_1 \times \dots \times E_n$ . Pour tout  $i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$ , on note  $x_i = (x_{i,1}, \dots, x_{i,p_i})_{\mathcal{B}_i}$ .

On a

$$\begin{aligned} f(x_1, \dots, x_n) &= f\left(\sum_{j_1=1}^{p_1} x_{1,j_1} e_{1,j_1}, \dots, \sum_{j_n=1}^{p_n} x_{n,j_n} e_{n,j_n}\right) \\ &= \sum_{j_1=1}^{p_1} \dots \sum_{j_n=1}^{p_n} x_{1,j_1} \dots x_{n,j_n} f(e_{1,j_1}, \dots, e_{n,j_n}). \end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned} N(f(x_1, \dots, x_n)) &\leq \sum_{\substack{1 \leq j_1 \leq p_1 \\ \vdots \\ 1 \leq j_n \leq p_n}} |x_{1,j_1}| \dots |x_{n,j_n}| N(f(e_{1,j_1}, \dots, e_{n,j_n})) \\ &\leq \|x_1\|_{1,\infty} \dots \|x_n\|_{n,\infty} \underbrace{\sum_{\substack{1 \leq j_1 \leq p_1 \\ \vdots \\ 1 \leq j_n \leq p_n}} N(f(e_{1,j_1}, \dots, e_{n,j_n}))}_{K}. \end{aligned}$$

On conclut de la même façon que dans la démonstration précédente. ■



---

**Corollaire 1.134**

Soient  $E_1, \dots, E_n$  des espaces vectoriels normés de dimensions finies.

Toute application  $f : E_1 \times \dots \times E_n \longrightarrow F$  qui est  $n$ -linéaire est continue sur  $E_1 \times \dots \times E_n$ .

---

**Exemple 1.135**

- Le produit matriciel de  $\mathcal{M}_{np}(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_{pq}(\mathbb{K})$  dans  $\mathcal{M}_{nq}(\mathbb{K})$  est bilinéaire, donc continu.
- Un produit scalaire dans un espace euclidien est bilinéaire, donc continu.
- Le déterminant dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  est  $n$ -linéaire par rapport aux colonnes, donc il est continu.

## 1.5.6 Norme subordonnée

On définit sur l'espace vectoriel  $\mathcal{L}_c(E, F)$  des applications linéaires continues de  $E$  dans  $F$  la notion de norme subordonnée (relative aux deux normes sur  $E$  et  $F$ ) ou norme triple.

---

**Définition 1.136**

Soit  $f \in \mathcal{L}_c(E, F)$ .

On pose  $\|f\| = \sup_{x \in B(0,1)} \|f(x)\|$ , appelée la norme subordonnée de  $f$ .

---

**Remarque 1.137**

Cette définition a un sens car  $f$  étant linéaire de  $E$  dans  $F$  et continue, elle est bornée sur  $B(0,1)$  d'après la Proposition 1.114.

---

**Remarque 1.138**

On a

$$\|f\| = \sup_{x \in B(0,1)} \|f(x)\| = \sup_{x \in S(0,1)} \|f(x)\| = \sup_{x \in \overline{B}(0,1)} \|f(x)\|.$$

---

**Proposition 1.139**

Soit  $f \in \mathcal{L}_c(E, F)$ .

Alors  $\|f\|$  est

- égal à  $\sup_{x \neq 0} \frac{\|f(x)\|}{\|x\|}$ , mais aussi à  $\sup_{x \in S(0,1)} \|f(x)\|$  ;
- le plus petit réel positif  $M$  tel que pour tout  $x \in E$ ,  $\|f(x)\| \leq M \|x\|$ .

---

*Démonstration 1.140*

On note  $N_1(f) = \sup_{x \neq 0} \frac{\|f(x)\|}{\|x\|}$  et  $N_2(f) = \sup_{x \in S(0,1)} \|f(x)\|$ . ■

---

*Démonstration 1.141* ( $N_1(f) = N_2(f)$ )

Pour tout  $x \neq 0$ ,  $\frac{x}{\|x\|} \in S(0,1)$ .

Donc  $\left\| f\left(\frac{x}{\|x\|}\right) \right\| \leq N_2(f)$ .

Donc  $\frac{1}{\|x\|} \|f(x)\| \leq N_2(f)$  i.e.  $N_1(f) \leq N_2(f)$ .

De plus, pour tout  $x \in S(0,1)$ ,  $\|x\| = 1$  donc  $\frac{\|f(x)\|}{\|x\|} = \|f(x)\| \leq N_1(f)$ .

Donc  $N_2(f) \leq N_1(f)$ .

Finalement, on a  $N_1(f) = N_2(f)$ . ■

---

*Démonstration 1.142* ( $N_2(f) = \|f\|$ )

Pour tout  $x \in B(0,1) \setminus \{0\}$ , on a  $\frac{x}{\|x\|} \in S(0,1)$  donc

$$\left\| f\left(\frac{x}{\|x\|}\right) \right\| \leq N_2(f)$$
$$\frac{1}{\|x\|} \|f(x)\| \leq N_2(f).$$

Or  $\|x\| \leq 1$  donc  $\|f(x)\| \leq \frac{1}{\|x\|} \|f(x)\| \leq N_2(f)$ .

Ceci est encore vrai pour  $x = 0$  donc  $\|f\| \leq N_2(f)$ .

De plus, soient  $x \in S(0,1)$  et  $\lambda \in [0; 1[$ .

On a  $\|\lambda x\| = \lambda < 1$  donc  $\lambda x \in B(0,1)$ .

Donc  $\|f(\lambda x)\| = \lambda \|f(x)\| \leq \|f\|$ .

Donc, par passage à la limite quand  $\lambda \rightarrow 1$  :

$$\|f(x)\| \leq \|f\|$$

i.e.  $N_2(f) \leq \|f\|$ .

Donc  $N_2(f) = \|f\|$ . ■

---

*Démonstration 1.143 (Second point)*

On a

$$\begin{aligned}\|f\| &= \sup_{x \neq 0} \frac{\|f(x)\|}{\|x\|} \\ &= \min \left\{ K \in \mathbb{R} \mid \forall x \neq 0, \frac{\|f(x)\|}{\|x\|} \leq K \right\} \\ &= \min \{ K \in \mathbb{R} \mid \forall x \in E, \|f(x)\| \leq K \|x\| \}.\end{aligned}$$

■

---

*Exemple 1.144*

Dans l'Exercice 1.122, on avait montré  $\forall f \in E, |I(f)| \leq \|f\|_\infty$ .

On a  $|I(1)| = 1 = 1 \times \|1\|_\infty$ .

Donc  $\|I\| = 1$ .

---

### Méthode 1.145

Si

$$\forall x \in E, \|f(x)\| \leq K \|x\|$$

et s'il existe  $x_0 \in E$  tel que

$$\|f(x_0)\| = K \|x_0\|$$

alors  $\|f\| = K$ .

---

### Proposition 1.146

*Les normes subordonnées sont des normes sur les espaces  $\mathcal{L}_c(E, F)$ .*

*Elles sont dites sous-multiplicatives : pour toutes applications linéaires continues et composables  $f$  et  $g$ ,*

$$\|f \circ g\| \leq \|f\| \times \|g\|.$$

---

*Démonstration 1.147 ( $\|\cdot\|$  est une norme sur  $\mathcal{L}_c(E, F)$ )*

► Soit  $f \in \mathcal{L}_c(E, F)$ .

Si  $\|f\| = 0$  alors  $\forall x \in E, \|f(x)\| \leq 0 \times \|x\|$  donc  $f = 0$ .

► Soient  $f \in \mathcal{L}_c(E, F)$  et  $\lambda \in \mathbb{K}$ .

On a

$$\|\lambda f\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|\lambda f(x)\|}{\|x\|} = \sup_{x \neq 0} |\lambda| \frac{\|f(x)\|}{\|x\|} = |\lambda| \sup_{x \neq 0} \frac{\|f(x)\|}{\|x\|} = |\lambda| \|f\|.$$

► Soit  $(f, g) \in \mathcal{L}_c(E, F)^2$ .

On a

$$\begin{aligned} \forall x \in B(0, 1), \quad \|(f + g)(x)\| &= \|f(x) + g(x)\| \\ &\leq \|f(x)\| + \|g(x)\| \\ &\leq \|f\| + \|g\| \end{aligned}$$

donc  $\|f + g\| \leq \|f\| + \|g\|$ . ■

*Démonstration 1.148 (Sous-multiplicativité)*

On a

$$\begin{aligned} \forall x \in E, \quad \|f \circ g(x)\| &= \|f(g(x))\| \\ &\leq \|f\| \|g(x)\| \\ &\leq \|f\| \|g\| \|x\|. \end{aligned}$$

Donc  $\|f \circ g\| \leq \|f\| \|g\|$ . ■

Comme en dimension finie, on peut représenter par choix de bases les applications linéaires par des matrices, on définit de manière semblable la notion de norme sous-multiplicative de matrices (relativement aux normes) ou norme triple.

### Définition 1.149

Soit  $(n, p) \in (\mathbb{N}^*)^2$ . On choisit deux normes sur  $\mathbb{K}^p$  et  $\mathbb{K}^n$  (espaces identifiés à ceux des matrices-colonnes).

Pour toute matrice  $A \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$ , on pose  $\|A\| = \sup_{\|X\|=1} \|AX\|$ .

### Proposition 1.150

Des normes étant choisies sur les espaces  $\mathbb{K}^p$  et  $\mathbb{K}^n$ , les normes subordonnées sont des normes sur tous les espaces  $\mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$ .

Elles sont dites sous-multiplicatives : pour toutes matrices multipliables  $A$  et  $B$ ,

$$\|AB\| \leq \|A\| \times \|B\|.$$

### Remarque 1.151

Dans le cas où un espace vectoriel normé  $E$  est aussi une  $\mathbb{K}$ -algèbre, on dit qu'il est une algèbre normée quand la norme vérifie en plus la propriété de sous-multiplicativité :  $\forall (x, y) \in E^2, \quad \|xy\| \leq \|x\| \cdot \|y\|$ .

---

*Remarque 1.152*

En dimension finie, toute  $\mathbb{K}$ -algèbre  $A$  possède des normes sous-multiplicatives.

---

*Démonstration 1.153*

Soit  $A$  une  $\mathbb{K}$ -algèbre de dimension finie.

L'application  $A^2 \longrightarrow A$  est bilinéaire donc continue.  
 $(a, b) \longmapsto ab$

Il existe donc  $K > 0$  tel que

$$\forall (a, b) \in A^2, \quad \|ab\| \leq K \|a\| \|b\|.$$

On pose  $N = K \|\cdot\|$ .

On a alors

$$\forall (a, b) \in A^2, \quad N(ab) \leq N(a) N(b)$$

et  $N$  est une norme sur  $A$ . ■

## 1.6 Topologie d'un espace vectoriel normé

Dans cette section,  $E$  est un espace vectoriel normé.

### 1.6.1 Intérieur d'une partie, voisinage d'un point

---

**Définition 1.154**

Soient  $A$  une partie de  $E$  et  $a \in A$ .

On dit que  $a$  est un point intérieur à  $A$  quand on peut trouver un rayon  $r > 0$  tel que  $B(a, r)$  soit incluse dans  $A$ . On dit aussi dans ce cas que  $A$  est un voisinage de  $a$ .

L'intérieur de  $A$  est l'ensemble de ses points intérieurs, noté  $\overset{\circ}{A}$ .

On a :

$$a \in \overset{\circ}{A} \iff \exists r > 0, \quad B(a, r) \subseteq A.$$

---

**Exercice 1.155**

Dans  $\mathbb{R}$ , quels sont les intérieurs des parties suivantes :  $[0 ; 1]$ ,  $[0 ; +\infty[$ ,  $\mathbb{Q}$  ?

---

*Correction 1.156*

► Si  $A = [0 ; 1]$ , alors  $\overset{\circ}{A} = ]0 ; 1[$ .

En effet, pour  $x \in ]0 ; 1[$ , on peut poser  $r = \min\left(\frac{x}{2}, \frac{1-x}{2}\right) > 0$  pour avoir  $B(x, r) \subseteq [0 ; 1]$ .

► Si  $A = [0 ; +\infty[$ , alors  $\overset{\circ}{A} = ]0 ; +\infty[$  (même idée).

► Si  $A = \mathbb{Q}$ , alors  $\overset{\circ}{A} = \emptyset$ .

En effet, pour tout  $x \in \mathbb{Q}$ , pour tout  $r > 0$ , il existe  $y \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$  tel que  $|x - y| < r$  i.e.  $B(x, r) \not\subseteq \mathbb{Q}$ .

---

**Exercice 1.157**

Quel est l'intérieur d'une boule de centre  $a$  et de rayon  $r > 0$  ?

---

*Correction 1.158*

Soient  $a \in E$  et  $r > 0$ .

Si  $A = B(a, r)$ , alors  $\overset{\circ}{A} = A$ .

En effet, pour tout  $x \in B(a, r)$ , on pose  $p = \frac{r - \|x - a\|}{2} > 0$  et on a

$$B(x, p) \subseteq A.$$

---

*Remarque 1.159*

Cette notion dépend a priori de la norme utilisée. En dimension finie, ce n'est pas le cas : l'intérieur d'une partie d'un espace vectoriel normé de dimension finie ne dépend pas du choix de la norme (pourquoi ?).

---

*Démonstration 1.160*

Si  $N_1, N_2$  sont deux normes équivalentes sur  $E$ ,  $A$  est une partie de  $E$  et  $a \in E$ , alors  $a$  est intérieur à  $A$  pour  $N_1$  ssi  $a$  est intérieur à  $A$  pour  $N_2$ .

Il existe  $\alpha, \beta > 0$  tels que  $\alpha N_2 \leq N_1 \leq \beta N_2$ .

Si  $a$  est intérieur à  $A$  pour  $N_1$ , alors il existe  $r > 0$  tel que  $B_1(a, r) \subseteq A$ .

On pose  $p = \frac{r}{\beta} > 0$  et on montre  $B_2(a, p) \subseteq A$ .

Soit  $x \in B_2(a, p)$ .

On a  $N_2(a - x) < p = \frac{r}{\beta}$ .

Donc  $N_1(a-x) \leq \beta N_2(a-x) < r$ .

Donc  $x \in B_1(a, r) \subseteq A$ .

Donc  $x$  est intérieur à  $A$  pour  $N_2$ .

On montre la réciproque de même, en montrant  $B_1(a, ar) \subseteq B_2(a, r)$ . ■

---

**Proposition 1.161**

Soient  $u \in E^{\mathbb{N}}$  et  $\ell \in E$ .

*La suite  $u$  converge vers  $\ell$  ssi tout voisinage de  $\ell$  contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang.*

## 1.6.2 Parties ouvertes

---

**Définition 1.162**

On dit qu'une partie  $A$  de  $E$  est ouverte (ou est un ouvert) quand à tout point de  $a \in A$ , on peut associer un rayon  $r > 0$  tel que la boule de centre  $a$  et de rayon  $r$  soit incluse dans  $A$  :

$$\forall a \in A, \exists r > 0, B(a, r) \subseteq A.$$

Autrement dit,  $A$  est ouverte quand tout point de  $A$  est intérieur à  $A$  :  $A = \mathring{A}$ , ou, autrement dit, quand  $A$  est un voisinage de chacun de ses points.

---

**Proposition 1.163**

*L'ensemble vide et  $E$  sont des parties ouvertes. Toute boule ouverte est une partie ouverte. Tout produit (fini) de parties ouvertes est ouvert.*

---

*Démonstration 1.164*

Soient  $E, F$  deux espaces vectoriels normés par  $\|\cdot\|_E$  et  $\|\cdot\|_F$ .

On pose  $N(x, y) = \max(\|x\|_E, \|y\|_F)$  pour obtenir une norme  $N$  sur  $E \times F$ .

Montrons que si  $A$  est un ouvert de  $E$  et  $B$  un ouvert de  $F$ , alors  $A \times B$  est un ouvert de  $E \times F$ .

Soit  $(a, b) \in A \times B$ .

$a \in A$  et  $A$  est un ouvert donc il existe  $r > 0$  tel que  $B_E(a, r) \subseteq A$ .

$b \in B$  et  $B$  est un ouvert donc il existe  $s > 0$  tel que  $B_F(b, s) \subseteq B$ .

On pose  $p = \min(r, s) > 0$ .

Montrons que  $B_{E \times F}((a, b), p) \subseteq A \times B$ .

Soit  $(x, y) \in B_{E \times F}((a, b), p)$ .

On a  $N((x, y) - (a, b)) < p$  i.e.  $N(x - a, y - b) < p$ .

Donc  $\|x - a\|_E < p$  et  $\|y - b\|_F < p$ .

Donc  $x \in B_E(a, p)$  et  $y \in B_F(b, p)$ .

Or  $p \leq r$  donc  $B_E(a, p) \subseteq B_E(a, r) \subseteq A$  et  $p \leq s$  donc  $B_F(b, p) \subseteq B_F(b, s) \subseteq B$ .

Donc  $(x, y) \in A \times B$ .

Donc  $B_{E \times F}((a, b), p) \subseteq A \times B$ .

On généralise à un produit de plusieurs ouverts par récurrence. ■

La topologie de  $E$  est l'ensemble de tous les ouverts de  $E$ .

---

#### Remarque 1.165

La topologie dépend a priori de la norme utilisée. En dimension finie, ce n'est pas le cas : dans un espace vectoriel normé de dimension finie, le fait d'être un ouvert ne dépend pas du choix de la norme.

### 1.6.3 Parties fermées

On rappelle la notion de point adhérent à une partie.

---

#### Définition 1.166

Soient  $A$  une partie de  $E$  et  $x \in E$ .

On dit que  $x$  est un point adhérent à  $A$  quand il existe une suite  $u \in A^{\mathbb{N}}$  qui converge vers  $x$ , ou, ce qui revient au même, quand toute boule centrée en  $x$  rencontre  $A$ , ou encore quand  $d(x, A) = 0$ .

L'adhérence de  $A$  est l'ensemble de ses points adhérents, noté  $\overline{A}$ .

On a montré

---

#### Définition 1.167

On dit qu'une partie  $A$  de  $E$  est fermée (ou est un fermé) quand tout point adhérent à  $A$  est dans  $A$ , autrement dit quand la propriété suivante est vraie :

si une suite quelconque à termes dans  $A$  converge vers un point  $x$  de  $E$ , alors  $x \in A$ .

Ou encore :  $A$  est fermée quand  $A = \overline{A}$ .



---

**Proposition 1.168**

*L'ensemble vide et  $E$  sont des parties fermées. Toute boule fermée est une partie fermée. Tout produit (fini) de parties fermées est fermé.*

On note le lien avec les parties ouvertes.

---

**Proposition 1.169**

*Soit  $A$  une partie de  $E$ .*

*Alors  $A$  est une partie ouverte ssi son complémentaire est une partie fermée.*

---

*Démonstration 1.170*

$\Rightarrow$

On suppose  $A$  ouverte. On veut montrer que  $E \setminus A$  est fermée.

Soit  $(x_n) \in (E \setminus A)^{\mathbb{N}}$  qui converge vers  $\ell$ .

Par l'absurde, supposons  $\ell \in A$ .

$A$  est ouverte donc il existe  $\varepsilon > 0$  tel que  $B(\ell, \varepsilon) \subseteq A$ .

Or  $x_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell$  donc il existe  $N \in \mathbb{N}$  tel que

$$\forall n \geq N, x_n \in B(\ell, \varepsilon).$$

Donc pour tout  $n \geq N$ ,  $x_n \in A$  : contradiction.

Donc  $\ell \in E \setminus A$ .

Donc  $E \setminus A$  est un fermé.

$\Leftarrow$

Supposons que  $E \setminus A$  est fermée. On veut montrer que  $A$  est ouverte.

Soit  $a \in A$ .

Par l'absurde, on suppose  $\forall r > 0, \exists x \in B(a, r), x \notin A$ .

Alors pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , il existe  $x_n \in B\left(a, \frac{1}{n+1}\right)$  tel que  $x_n \notin A$ .

On a construit une suite  $(x_n) \in (E \setminus A)^{\mathbb{N}}$  telle que  $\forall n \in \mathbb{N}, \|a - x_n\| < \frac{1}{n+1}$ .

Par théorème d'encadrement, on a  $x_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} a$ .

Or  $a \notin E \setminus A$  : contradiction car  $E \setminus A$  est un fermé.

Donc il existe  $r > 0$  tel que  $B(a, r) \subseteq A$ .

Donc  $A$  est un ouvert. ■

Encore une fois, le fait d'être un fermé en dimension finie ne dépend pas de la norme.

---

**Proposition 1.171**

- *Toute réunion de parties ouvertes est ouverte. Toute intersection finie de parties ouvertes est ouverte.*
- *Toute intersection de parties fermées est fermée. Toute réunion finie de parties fermées est fermée.*

---

*Démonstration 1.172 (Réunion d'ouverts)*

Soit  $(A_i)_{i \in I}$  une famille de parties ouvertes.

Montrons que  $\bigcup_{i \in I} A_i$  est ouverte.

Soit  $x \in \bigcup_{i \in I} A_i$ .

Il existe  $i \in I$  tel que  $x \in A_i$ .

Or  $A_i$  est ouverte donc il existe  $r > 0$  tel que  $B(x, r) \subseteq A_i$ .

Donc  $B(x, r) \subseteq \bigcup_{i \in I} A_i$ . ■

---

*Démonstration 1.173 (Intersection finie d'ouverts)*

Soient  $A_1, \dots, A_n$  des parties ouvertes.

Montrons que  $\bigcap_{i=1}^n A_i$  est ouverte.

Soit  $x \in \bigcap_{i=1}^n A_i$ .

Pour tout  $i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$ , il existe  $r_i > 0$  tel que  $B(x, r_i) \subseteq A_i$ .

On pose  $r = \min_{1 \leq i \leq n} r_i > 0$ .

Pour tout  $i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$ ,  $B(x, r) \subseteq B(x, r_i) \subseteq A_i$ .

Donc  $B(x, r) \subseteq \bigcap_{i=1}^n A_i$ . ■

---

*Remarque 1.174*

Si la famille d'ouverts n'est pas finie, on ne peut rien dire sur l'intersection.

Par exemple, pour  $n \in \mathbb{N}$ , on pose les ouverts  $A_n = \left] \frac{-1}{n+1} ; \frac{1}{n+1} \right[$ .

Alors  $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n = \{0\}$  n'est pas ouverte.

---

**Exercice 1.175**

Montrez que pour tout  $a \in E$ ,  $E \setminus \{a\}$  est un ouvert. D duisez-en que si  $A$  est une partie finie de  $E$ , alors  $E \setminus A$  est un ouvert.

---

*Correction 1.176*

Pour tout  $x \in E \setminus \{a\}$ , on pose  $r = \frac{\|x - a\|}{2}$ .

Alors  $B(x, r) \subseteq E \setminus \{a\}$ .

Donc  $E \setminus \{a\}$  est un ouvert.

Si  $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ , alors  $E \setminus A$  est le compl mentaire de  $\bigcup_{i=1}^n \{a_i\}$ , qui est un ferm  par union finie de ferm s, et est donc un ouvert.

---

**Exercice 1.177**

Quels sont les sous-espaces vectoriels de  $E$  qui sont ouverts ?

---

*Correction 1.178*

Soit  $F$  un sous-espace vectoriel de  $E$  ouvert dans  $E$ .

$0 \in F$  et  $F$  est un ouvert donc il existe  $r > 0$  tel que  $B(0, r) \subseteq F$ .

Soit  $x \in E \setminus \{0\}$ .

On a  $\frac{r}{2} \frac{x}{\|x\|} \in B(0, r)$  donc

$$x = \frac{2\|x\|}{r} \left( \frac{r}{2} \frac{x}{\|x\|} \right) \in F.$$

Donc  $E = F$  :  $E$  est le seul sous-espace vectoriel de  $E$  ouvert dans  $E$ .

---

**Exercice 1.179**

Montrez que  $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0 \text{ et } xy = 1\}$  est un fermé de  $\mathbb{R}^2$ .

---

*Correction 1.180*

Soit  $((x_n, y_n)) \in F^{\mathbb{N}}$  qui converge vers  $(a, b)$ .

Montrons que  $(a, b) \in F$ .

On a  $x_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} a$ ,  $y_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} b$  et  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $x_n y_n = 1$ .

Donc par passage à la limite quand  $n \rightarrow +\infty$ , on a  $a \geq 0$  et  $ab = 1$ .

Donc  $(a, b) \in F$ .

Donc  $F$  est un fermé.

---

**Exercice 1.181**

On note  $S$  l'ensemble des matrices de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  telles que tous les coefficients soient positifs et sur chaque ligne la somme des coefficients vaut 1.

Montrez que  $S$  est un fermé.

NB :  $S$  est l'ensemble des matrices dites stochastiques.

---

*Remarque 1.182*

A priori, une partie de  $E$  n'est ni ouverte ni fermée : par exemple, dans  $\mathbb{R}$ , l'ensemble  $]0 ; 1]$  n'est ni ouvert ni fermé.

Donc ne pas confondre « complémentaire » et « contraire » : on peut dire qu'une partie est un fermé quand son complémentaire est un ouvert, mais pas que le contraire d'être un ouvert c'est être un fermé.

---

*Remarque 1.183*

Il est souvent assez facile de montrer qu'une partie est un fermé grâce à la caractérisation séquentielle. Donc pour montrer qu'une partie est un ouvert, on montre souvent de cette façon que son complémentaire est un fermé.

Les fermés sont souvent définis par des égalités ou des inégalités larges. Par complémentaire, les ouverts sont souvent définis par des inégalités strictes ou des différences.

### 1.6.4 Ouverts ou fermés relatifs à une partie

Les définitions précédentes parlent d'ouverts et de fermés de  $E$ . On peut définir ces notions relativement à une partie.

---

**Définition 1.184**

Soient  $A$  une partie de  $E$  et  $U$  un sous-ensemble de  $A$ .

On dit que  $U$  est un ouvert de  $A$  quand il existe un ouvert  $V$  de  $E$  tel que  $U = A \cap V$ .

On dit que  $U$  est un fermé de  $A$  quand il existe un fermé  $V$  de  $E$  tel que  $U = A \cap V$ .

On remarque que les fermés de  $A$  sont les complémentaires dans  $A$  des ouverts de  $A$ . On peut caractériser de même une partie  $U$  fermée de  $A$  par l'égalité entre  $U$  et l'ensemble de ses points adhérents dans  $A$ .

### 1.6.5 Image réciproque d'un ouvert ou d'un fermé par une fonction continue

---

*Rappel 1.185*

Si  $f$  est une fonction de  $E$  dans  $F$  définie sur  $D_f$  et  $B \subseteq F$ , l'image réciproque de  $B$  par  $f$  est

$$f^{-1}(B) = \{x \in D_f \mid f(x) \in B\}.$$

---

**Théorème 1.186**

Soit  $f$  une fonction de  $E$  dans  $F$  définie sur  $D$ .

Alors on a équivalence entre les propositions suivantes :

- (1)  $f$  est continue sur  $D$  ;
- (2) pour tout fermé  $B$  de  $F$ , son image réciproque  $f^{-1}(B)$  est un fermé de  $D$  ;
- (3) pour tout ouvert  $B$  de  $F$ , son image réciproque  $f^{-1}(B)$  est un ouvert de  $D$ .

Ceci est valable en particulier quand  $f$  est une application continue de  $E$  dans  $F$ , auquel cas on peut se passer des notions d'ouvert ou fermé relatif.

---

*Démonstration 1.187 ((1)  $\implies$  (2))*

Soient  $B$  un fermé de  $F$  et  $(u_n) \in f^{-1}(B)^{\mathbb{N}}$  telle que  $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell \in D$ .

$f$  étant continue sur  $D$  et donc en  $\ell$ , on a  $f(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(\ell)$ .

De plus, on a  $(f(u_n)) \in B^{\mathbb{N}}$  or  $B$  est un fermé donc  $f(\ell) \in B$ .

Donc  $\ell \in f^{-1}(B)$ .

Donc  $f^{-1}(B)$  est un fermé de  $D$ . ■

---

*Démonstration 1.188 ((2)  $\implies$  (3))*

Soit  $A$  un ouvert de  $F$ .

Alors  $F \setminus A$  est un fermé de  $F$ .

Donc  $f^{-1}(F \setminus A)$  est un fermé de  $D$ .

Or  $f^{-1}(F \setminus A) = D \setminus f^{-1}(A)$ .

Donc  $f^{-1}(A)$  est un ouvert de  $D$ . ■

---

*Démonstration 1.189 ((3)  $\implies$  (1))*

On suppose que pour tout  $A$  ouvert de  $F$ ,  $f^{-1}(A)$  est un ouvert de  $D$ .

Soit  $d \in D$ . Montrons que  $f$  est continue en  $d$ .

Soit  $\varepsilon > 0$ .

La boule  $B(f(d), \varepsilon)$  est un ouvert de  $F$ .

Donc  $f^{-1}(B(f(d), \varepsilon))$  est un ouvert de  $D$ .

Or  $f(d) \in B(f(d), \varepsilon)$  donc  $d \in f^{-1}(B(f(d), \varepsilon))$ .

Donc il existe  $\alpha > 0$  tel que  $D \cap B(d, \alpha) \subseteq f^{-1}(B(f(d), \varepsilon))$ .

Donc pour tout  $x \in D$  tel que  $x \in B(d, \alpha)$ , on a  $f(x) \in B(f(d), \varepsilon)$  i.e.

$$\forall x \in D, \|x - d\| < \alpha \implies \|f(x) - f(d)\| < \varepsilon.$$

Donc  $f$  est continue en  $d$ . ■

---

*Exemple 1.190 (Cas particuliers fondamentaux)*

Si  $f$  est continue sur  $E$  et à valeurs réelles, alors pour tout  $a \in \mathbb{R}$ , les ensembles suivants sont des fermés de  $E$  :

$$\{x \in E \mid f(x) \geq a\} \quad \{x \in E \mid f(x) \leq a\} \quad \{x \in E \mid f(x) = a\}.$$

---

*Exemple 1.191*

► Les courbes de fonctions continues de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  sont des fermés de  $\mathbb{R}^2$ .

► L'ensemble des matrices de trace nulle est un fermé de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

---

*Démonstration 1.192 (Courbes des fonctions continues)*

Si  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  est continue, on pose  $\Gamma_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = f(x)\}$ .

On a alors

$$\Gamma_f = \varphi^{-1}(\{0\})$$

où  $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  est continue sur  $\mathbb{R}^2$  car  $f$  est continue sur  $\mathbb{R}$ .  
 $(x, y) \mapsto y - f(x)$

Or  $\{0\}$  est un fermé de  $\mathbb{R}$  donc  $\Gamma_f$  est un fermé de  $\mathbb{R}^2$ . ■

---

*Démonstration 1.193 (Ensemble des matrices de trace nulle)*

L'ensemble des matrices de trace nulle dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  est

$$T = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mid \text{tr}(M) = 0\}.$$

Or  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  est de dimension finie et  $\text{tr}$  est linéaire donc  $\text{tr}$  est continue.

Donc  $T$  est l'image réciproque du fermé  $\{0\}$  par l'application continue  $\text{tr}$ .

Donc  $T$  est un fermé de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ . ■

Par passage au complémentaire, si  $f$  est continue sur  $E$  et à valeurs réelles, alors pour tout  $a \in \mathbb{R}$ , les ensembles suivants sont des ouverts de  $E$  :

$$\{x \in E \mid f(x) < a\} \quad \{x \in E \mid f(x) > a\} \quad \{x \in E \mid f(x) \neq a\}.$$

---

*Exemple 1.194*

- L'ensemble des couples  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$  tels que  $x > 0$  et  $y > x$  est un ouvert de  $\mathbb{R}^2$ .
- $\text{GL}_n(\mathbb{K})$  est un ouvert de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  : si une matrice  $A$  est inversible, alors toutes les matrices proches de  $A$  le sont aussi.

---

*Démonstration 1.195 (Ensemble des couples susmentionnés)*

On pose

$$\begin{aligned} A &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0 \text{ et } y > x\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in ]0 ; +\infty[ \} \cap \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y - x \in ]0 ; +\infty[ \}. \end{aligned}$$

Or  $(x, y) \mapsto x$  et  $(x, y) \mapsto y - x$  sont continues.

Donc  $A$  est un ouvert de  $\mathbb{R}^2$ . ■

---

*Démonstration 1.196 ( $\text{GL}_n(\mathbb{K})$ )*

On a  $\text{GL}_n(\mathbb{K}) = \det^{-1}(\mathbb{K} \setminus \{0\})$ .

Or  $\det$  est continue et  $\mathbb{K} \setminus \{0\}$  est un ouvert de  $\mathbb{K}$  donc  $\text{GL}_n(\mathbb{K})$  est un ouvert de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ . ■

## 1.6.6 Frontière d'une partie

---

### Définition 1.197

Soit  $A$  une partie de  $E$ . On appelle frontière de  $A$  l'ensemble  $\overline{A} \setminus \overset{\circ}{A}$ .

---

### Exemple 1.198

- Si  $B$  est une boule, alors son intérieur est la boule ouverte de même centre et de même rayon, son adhérence est la boule fermée et sa frontière est la sphère.
- L'ensemble des rationnels est d'intérieur vide, d'adhérence égale à  $\mathbb{R}$  et donc de frontière  $\mathbb{R}$ .

## 1.7 Compacité

Dans cette section,  $E$  est un espace vectoriel normé.

### 1.7.1 Valeurs d'adhérence d'une suite

---

#### Définition 1.199

Soient  $u = (u_n) \in E^{\mathbb{N}}$  et  $a \in E$ .

On dit que  $a$  est une valeur d'adhérence de la suite  $u$  quand il existe une extractrice  $\varphi$  telle que la suite extraite  $(u_{\varphi(n)})$  converge vers  $a$ .

Une suite peut avoir une ou plusieurs valeurs d'adhérence ou ne pas avoir de valeur d'adhérence :

- la suite  $(n)_{n \in \mathbb{N}}$  n'a pas de valeur d'adhérence ;
- toute suite convergente possède une seule valeur d'adhérence : sa limite ;
- la suite  $u$  définie par  $u_{2n} = \frac{1}{n+1}$  et  $u_{2n+1} = 1 - \frac{1}{n+1}$  possède deux valeurs d'adhérence : 0 et 1 ;
- il est possible de numérotter les rationnels, autrement dit de créer une suite  $u$  qui prend exactement toutes les valeurs rationnelles dans  $\mathbb{R}$  : cette suite a pour valeurs d'adhérence tous les réels.

On peut donner une caractérisation équivalente sans passer par la notion de suite extraite.

---

#### Proposition 1.200

Soient  $u = (u_n) \in E^{\mathbb{N}}$  et  $a \in E$ .

Alors  $a$  est une valeur d'adhérence de  $u$  ssi pour tout  $\varepsilon > 0$ ,  $\{n \in \mathbb{N} \mid u_n \in B(a, \varepsilon)\}$  est infini.



---

Démonstration 1.201



Supposons que pour tout  $\varepsilon > 0$ ,  $\{n \in \mathbb{N} \mid u_n \in B(a, \varepsilon)\}$  est infini.

On spécialise  $\varepsilon \leftarrow \frac{1}{k+1}$  pour  $k \in \mathbb{N}$ .

L'ensemble  $\{n \in \mathbb{N} \mid u_n \in B(a, 1)\}$  est infini donc non-vidé. On choisit  $\varphi(0)$  un élément de cet ensemble.

L'ensemble  $\left\{n \in \mathbb{N} \mid u_n \in B\left(a, \frac{1}{2}\right)\right\}$  est infini donc il contient des entiers strictement supérieurs à  $\varphi(0)$ ; on en choisit un, qu'on note  $\varphi(1)$ .

Si on suppose avoir construit  $\varphi(0) < \varphi(1) < \dots < \varphi(k)$  tels que  $u_{\varphi(0)} \in B(a, 1)$ ,  $u_{\varphi(1)} \in B\left(a, \frac{1}{2}\right)$ , ...,  $u_{\varphi(k)} \in B\left(a, \frac{1}{k+1}\right)$ , comme l'ensemble

$$\left\{n \in \mathbb{N} \mid u_n \in B\left(a, \frac{1}{k+2}\right)\right\}$$

est infini, on peut choisir  $\varphi(k+1)$  dans cet ensemble tel que  $\varphi(k+1) > \varphi(k)$ .

Par récurrence, on construit une suite  $(\varphi(k))_{k \in \mathbb{N}}$  strictement croissante d'entiers naturels tels que

$$\forall k \in \mathbb{N}, u_{\varphi(k)} \in B\left(a, \frac{1}{k+1}\right)$$

$$i.e. \|u_{\varphi(k)} - a\| < \frac{1}{k+1}.$$

Par théorème d'encadrement, on a  $u_{\varphi(k)} \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} a$  :  $a$  est une valeur d'adhérence de la suite  $(u_n)$ .



Supposons que  $a$  est une valeur d'adhérence de la suite  $(u_n)$ .

Il existe alors une extractrice  $\varphi$  telle que  $u_{\varphi(k)} \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} a$ .

Donc pour tout  $\varepsilon > 0$ , il existe  $N \in \mathbb{N}$  tel que

$$\forall n \geq N, \|u_{\varphi(n)} - a\| < \varepsilon.$$

Donc  $\{n \in \mathbb{N} \mid u_n \in B(a, \varepsilon)\}$  contient  $\varphi(N), \varphi(N+1), \dots$  i.e. c'est un ensemble infini. ■

Ceci peut encore être réécrit de la façon suivante.

---

**Proposition 1.202**

Soient  $u = (u_n) \in E^{\mathbb{N}}$  et  $a \in E$ .

Alors  $a$  est une valeur d'adhérence de  $u$  ssi  $\forall \varepsilon > 0, \forall N \in \mathbb{N}, \exists n \geq N, \|u_n - a\| < \varepsilon$ .

---

*Démonstration 1.203*

Soit  $I$  une partie de  $\mathbb{N}$ .

On a

$$\begin{aligned} I \text{ est infini} &\iff I \text{ n'est pas majorée} \\ &\iff \neg (\exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in I, n \leq N) \\ &\iff \forall N \in \mathbb{N}, \exists n \in I, n > N. \end{aligned}$$

Pour tout  $\varepsilon > 0$ , on pose  $I_\varepsilon = \{n \in \mathbb{N} \mid u_n \in B(a, \varepsilon)\}$ .

On a alors, d'après la Proposition 1.200 :

$$\begin{aligned} a \text{ est une valeur d'adhérence de } u &\iff \forall \varepsilon > 0, I_\varepsilon \text{ est infini} \\ &\iff \forall \varepsilon > 0, \forall N \in \mathbb{N}, \exists n \in I_\varepsilon, n > N \\ &\iff \forall \varepsilon > 0, \forall N \in \mathbb{N}, \exists n > N, \|u_n - a\| < \varepsilon. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

---

**Exercice 1.204**

Soit  $u = (u_n) \in E^{\mathbb{N}}$ . Montrez que l'ensemble  $V$  des valeurs d'adhérence de la suite  $u$  est un fermé de  $E$  en utilisant les ensembles  $U_p = \{u_n \mid n \geq p\}$ .

---

*Correction 1.205*

Soit  $a \in E$ .

On a

$$\begin{aligned} a \in V &\iff \forall \varepsilon > 0, \forall N \in \mathbb{N}, \exists x \in U_N, \|x - a\| < \varepsilon \\ &\iff \forall \varepsilon > 0, \forall N \in \mathbb{N}, U_N \cap B(a, \varepsilon) \neq \emptyset \\ &\iff \forall N \in \mathbb{N}, \forall \varepsilon > 0, U_N \cap B(a, \varepsilon) \neq \emptyset \\ &\iff \forall N \in \mathbb{N}, a \in \overline{U_N} \\ &\iff a \in \bigcap_{N \in \mathbb{N}} \overline{U_N}. \end{aligned}$$

$$\text{Donc } V = \bigcap_{N \in \mathbb{N}} \overline{U_N}.$$

$V$  est donc un fermé par intersection de fermés.

## 1.7.2 Théorème de Bolzano-Weierstrass

---

**Théorème 1.206**

*Si  $E$  est de dimension finie, alors toute suite bornée de  $E$  possède une valeur d'adhérence.*

---

**Démonstration 1.207**

On note  $\mathcal{P}(k)$  le prédicat « si  $E$  est de dimension  $k$ , alors toute suite bornée de  $E$  possède une valeur d'adhérence ».

► Pour  $k = 1$  :

On pose  $E = \text{Vect}(e_1)$ .

Si  $(u_n)$  est une suite bornée de  $E$ , en notant  $(u_n) = (\lambda_n e_1)$  où  $(\lambda_n)$  est une suite bornée de  $\mathbb{K}$ , d'après le théorème de Bolzano-Weierstrass dans  $\mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ ,  $(\lambda_n)$  possède une valeur d'adhérence et donc  $(u_n)$  aussi.

D'où  $\mathcal{P}(1)$ .

► Soit  $k \in \mathbb{N}^*$  tel que  $\mathcal{P}(k)$  soit vraie.

Soit  $E$  de dimension  $k + 1$ .

On choisit une base  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_{k+1})$  de  $E$ .

Soit  $(u_n) \in E^{\mathbb{N}}$  une suite bornée.

Alors les suites-coordonnées associées sont bornées.

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on note  $u_n = (u_{1,n}, \dots, u_{k+1,n})_{\mathcal{B}}$ .

$(u_{k+1,n})_{n \in \mathbb{N}}$  est une suite bornée de  $\mathbb{K}$  donc (même théorème) il existe une extractrice  $\varphi$  telle que  $(u_{k+1,\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$  converge.

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on pose  $v_n = (u_{1,n}, \dots, u_{k,n}, 0)_{\mathcal{B}}$ .

$(v_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$  est une suite de vecteurs de  $\text{Vect}(e_1, \dots, e_k)$  et bornée donc par hypothèse de récurrence, il existe une extractrice  $\psi$  telle que  $(v_{\varphi \circ \psi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$  converge.

De plus,  $(u_{k+1,\varphi \circ \psi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$  converge car c'est une suite extraite d'une suite convergente.

Donc  $(u_{\varphi \circ \psi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$  converge.

Donc  $\mathcal{P}(k + 1)$  est vrai.

► Donc pour tout  $k \in \mathbb{N}^*$ ,  $\mathcal{P}(k)$  est vrai. ■

---

*Remarque 1.208*

Ce théorème est faux en dimension infinie donc il faut bien mettre en valeur la dimension finie.

On peut ajouter une précision au théorème précédent.

---

**Proposition 1.209**

*Si  $E$  est de dimension finie, alors toute suite bornée de  $E$  qui ne possède qu'une seule valeur d'adhérence est convergente vers cette valeur d'adhérence.*

---

*Démonstration 1.210*

Supposons  $E$  de dimension finie.

Soit  $(u_n) \in E^{\mathbb{N}}$  une suite bornée qui admet une unique valeur d'adhérence  $\ell$ .

Par l'absurde, on suppose que  $(u_n)$  ne converge pas vers  $\ell$ .

On a

$$\exists \varepsilon > 0, \quad \underbrace{\forall N \in \mathbb{N}, \exists n \geq N, \|u_n - \ell\| \geq \varepsilon}_{\{n \in \mathbb{N} \mid u_n \notin B(\ell, \varepsilon)\} \text{ infini}}.$$

En ordonnant les éléments de cet ensemble et en les notant  $\varphi(0) < \varphi(1) < \dots$ , on construit une extractrice  $\varphi$  telle que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{\varphi(n)} \notin B(\ell, \varepsilon).$$

Or  $(u_{\varphi(n)})$  est bornée et  $E$  est de dimension finie donc d'après le théorème de Bolzano-Weierstrass, il existe une extractrice  $\psi$  et  $\ell' \in E$  tels que

$$u_{\varphi \circ \psi(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell'.$$

Or pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{\varphi(n)}$  appartient au fermé  $E \setminus B(\ell, \varepsilon)$  donc  $\ell' \in E \setminus B(\ell, \varepsilon)$ .

Donc  $\ell' \neq \ell$ .

Donc  $\ell' = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_{\varphi \circ \psi(n)}$  est une autre valeur d'adhérence de  $(u_n)$  : contradiction.

Donc  $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$ . ■

### 1.7.3 Parties compactes

---

**Définition 1.211**

Soit  $A$  une partie de  $E$ .

On dit que  $A$  est une partie compacte de  $E$  (ou un compact de  $E$ ) quand toute suite à termes dans  $A$  possède une valeur d'adhérence dans  $A$  (propriété dite de Bolzano-Weierstrass).

---

*Exemple 1.212*

- ▶ Tout segment  $[a ; b]$  de  $\mathbb{R}$  est un compact et ce sont les seuls intervalles compacts.  $[0 ; 1] \cup [2 ; 3]$  est compact.
- ▶ Dans  $\mathbb{K}^n$ , tout pavé  $\prod_{i=1}^n [a_i ; b_i]$  est un compact. Plus généralement, un produit (fini) de compacts est compact.

Les parties compactes sont donc celles dont on peut extraire des sous-suites convergentes. Un résultat précédent se généralise alors.

---

**Proposition 1.213**

*Si  $A$  est une partie compacte, alors toute suite de  $A$  qui ne possède qu'une seule valeur d'adhérence est convergente vers cette valeur d'adhérence.*

Un compact étant connu, il est facile d'en construire d'autres.

---

**Proposition 1.214**

*Si  $A$  est une partie compacte de  $E$ , alors toute partie  $B$  fermée dans  $A$  est aussi compacte.*

---

*Démonstration 1.215*

Soient  $A$  une partie compacte de  $E$ ,  $B$  un fermé de  $A$  et  $(u_n) \in B^{\mathbb{N}}$ .

Comme  $B \subseteq A$ , on a  $(u_n) \in A^{\mathbb{N}}$ .

$A$  est compacte donc il existe une extractrice  $\varphi$  et  $\ell \in A$  tels que  $u_{\varphi(n)} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell$ .

La suite  $(u_{\varphi(n)})$  est à termes dans  $B$  et converge vers  $\ell$  donc comme  $B$  est un fermé, on a  $\ell \in B$ .

Ainsi, toute suite de  $B^{\mathbb{N}}$  possède une valeur d'adhérence dans  $B$  i.e.  $B$  est un compact. ■

Reconnaître si une partie est compacte n'est pas toujours facile. On dispose d'une condition nécessaire, qui est suffisante en dimension finie.

---

**Proposition 1.216**

*Soit  $A$  une partie de  $E$ .*

*Si  $A$  est compacte, alors  $A$  est une partie fermée et bornée.*

---

*Démonstration 1.217*

► Si  $A$  n'est pas bornée, alors pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , il existe  $a_n \in A$  tel que  $\|a_n\| \geq n$ .

Si  $(a_n)$  possède une valeur d'adhérence dans  $A$ , alors il existe une extractrice  $\varphi$  et  $\ell \in A$  tels que  $a_{\varphi(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$ .

Alors  $\|a_{\varphi(n)}\| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \|\ell\|$  : contradiction.

Donc  $A$  n'est pas compacte.

► Supposons que  $A$  est compacte.

Soit  $(u_n) \in A^{\mathbb{N}}$  telle que  $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell \in E$ .

$A$  étant compacte, il existe  $\varphi$  une extractrice et  $\ell' \in A$  tels que  $u_{\varphi(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell'$ .

La suite  $(u_{\varphi(n)})$  est extraite de la suite convergente  $(u_n)$  donc  $u_{\varphi(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$ .

Donc par unicité de la limite, on a  $\ell' = \ell \in A$ .

Donc  $A$  est fermée. ■

La réciproque est hélas fausse en général. Néanmoins, en dimension finie, elle est vraie.

---

**Proposition 1.218**

*Si  $E$  est de dimension finie, alors une partie de  $E$  est compacte ssi elle est fermée et bornée.*

---

*Remarque 1.219*

En fait, il n'y a qu'en dimension finie que ce résultat est vrai. Un théorème de Riesz affirme que la boule-unité fermée d'un espace vectoriel normé est compacte ssi l'espace est de dimension finie, ce qui revient à dire que l'équivalence précédente n'est valable que dans un espace de dimension finie.

En dimension infinie, il se passe des choses vraiment étranges : les compacts sont des parties très petites et plates, par exemple, un compact est forcément d'intérieur vide. Heureusement, il est plus courant de travailler à notre niveau en dimension finie.

---

*Exemple 1.220*

► L'ensemble des matrices stochastiques de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  est un compact.

► La boule-unité fermée de  $E = \mathcal{C}^0([0; 1], \mathbb{R})$  pour la norme infinie n'est pas compacte, car la suite des fonctions  $(x \mapsto x^n)$  a pour seule valeur d'adhérence possible la fonction  $x \mapsto 0$  si  $x \neq 1$  et  $1 \mapsto 1$ , qui n'est même pas dans l'espace  $E$ .

---

*Démonstration 1.221 (Matrices stochastiques)*

On note

$$S_n = \left\{ M = (m_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid \forall (i,j) \in \llbracket 1 ; n \rrbracket^2, m_{i,j} \geq 0 \text{ et } \forall i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, \sum_{j=1}^n m_{i,j} = 1 \right\}.$$

Soit  $M = (m_{i,j}) \in S_n$ .

Pour tout  $i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$ ,  $\sum_{j=1}^n m_{i,j}$  est une somme de réels positifs qui vaut 1 donc pour tout  $j \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$ ,  $0 \leq m_{i,j} \leq 1$ .

Donc  $\|M\|_\infty \leq 1$ .

Donc  $S_n$  est bornée.

Soit  $(M_k) = \left( (m_{i,j}^k)_{i,j} \right)_k$  une suite de matrices de  $S_n$  qui converge vers  $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  :

$$\forall (i,j) \in \llbracket 1 ; n \rrbracket^2, m_{i,j}^k \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} a_{i,j}.$$

Par passage à la limite quand  $k \rightarrow +\infty$  dans les deux conditions qui définissent  $S_n$ , on obtient

$$\forall (i,j) \in \llbracket 1 ; n \rrbracket^2, a_{i,j} \geq 0 \quad \text{et} \quad \forall i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, \sum_{j=1}^n a_{i,j} = 1.$$

Donc  $A \in S_n$ .

Donc  $S_n$  est fermée.

On aurait aussi pu considérer les fonctions continues sur  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$

$$c_{i,j} : (m_{i,j}) \mapsto m_{i,j} \quad \text{et} \quad s_i : (m_{i,j}) \mapsto \sum_{j=1}^n m_{i,j}$$

et remarquer que

$$S_n = \bigcap_{1 \leq i,j \leq n} c_{i,j}^{-1}([0 ; +\infty[) \cap \bigcap_{i=1}^n s_i^{-1}(\{1\})$$

ce qui montre que  $S_n$  est un fermé par intersection de fermés.

Alors, comme  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  est de dimension finie, on en déduit que  $S_n$  est un compact de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ . ■

---

*Démonstration 1.222 (Deuxième point)*

On pose  $f_n : x \mapsto x^n$ .

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $\|f\|_\infty = 1$ .

Si  $(f_n)$  a une valeur d'adhérence  $g \in \overline{B}(0, 1)$ , alors il existe une extractrice  $\varphi$  telle que  $f_{\varphi(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} g$   
*i.e.*  $\|f_{\varphi(n)} - g\|_{\infty} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ .

Or pour tout  $x \in [0 ; 1]$ ,  $|f_{\varphi(n)}(x) - g(x)| \leq \|f_{\varphi(n)} - g\|_{\infty}$ .

Donc par encadrement, on a  $f_{\varphi(n)}(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} g(x)$ .

Si  $x \in [0 ; 1[$ , alors  $f_{\varphi(n)}(x) = x^{\varphi(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ .

Si  $x = 1$ , alors  $f_{\varphi(n)}(x) = 1 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$ .

Donc  $g : x \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } x \in [0 ; 1[ \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$

Or  $g \notin E$  : contradiction de la compacité. ■

Une application importante de la notion de compacité est le théorème suivant.

### **Théorème 1.223**

*Tout sous-espace vectoriel de dimension finie de  $E$  est fermé.*

*Démonstration 1.224*

Soit  $F$  un sous-espace vectoriel de  $E$  de dimension finie.

Soit  $(u_n) \in F^{\mathbb{N}}$  une suite convergente vers  $\ell \in E$ .

Alors  $(u_n)$  est bornée : il existe  $R > 0$  tel que  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n \in \overline{B}(0, R)$ .

Donc  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n \in \overline{B}(0, R) \cap F = \{x \in F \mid \|x\| \leq R\} = \overline{B_F}(0, R)$ .

Donc  $\overline{B_F}(0, R)$  est un fermé borné de  $F$  et donc un compact de  $F$ .

Il existe donc une extractrice  $\varphi$  et  $a \in \overline{B_F}(0, R)$  tels que  $u_{\varphi(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} a$ .

Donc  $\ell = a \in F$ .

Donc  $F$  est fermé. ■

En dimension infinie, là encore il peut se passer des choses étranges : un sous-espace de  $E$  de dimension infinie peut être dense (et donc non-fermé s'il est différent de  $E$ ).

## **1.7.4 Théorème des bornes atteintes**

Le principal intérêt des compacts est de pouvoir généraliser un théorème de première année.



---

**Théorème 1.225**

Soient  $E, F$  deux espaces vectoriels normés,  $A$  une partie de  $E$  et  $f : A \longrightarrow F$ .

Si  $f$  est continue sur  $A$  et  $A$  est compacte, alors  $f(A)$  est compacte.

---

*Démonstration 1.226*

On suppose que  $f$  est continue et que  $A$  est compacte.

Soit  $(u_n) \in f(A)^{\mathbb{N}}$ .

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n \in f(A)$  donc il existe  $v_n \in A$  tel que  $u_n = f(v_n)$ .

$(v_n) \in A^{\mathbb{N}}$  et  $A$  est compacte donc il existe une extractrice  $\varphi$  et  $a \in A$  tels que  $v_{\varphi(n)} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} a$ .

$f$  est continue en  $a$  donc  $u_{\varphi(n)} = f(v_{\varphi(n)}) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} f(a) \in f(A)$ .

Donc  $f(A)$  est compacte. ■

On résume en disant que l'image continue d'un compact est un compact.

En particulier, toute fonction continue sur un compact est donc bornée. Dans le cas des fonctions numériques (*i.e.* à valeurs dans  $\mathbb{R}$ ), on peut même être plus précis.

---

**Théorème 1.227**

Toute fonction continue sur un compact et à valeurs réelles est bornée et atteint ses bornes.

Autrement dit, si  $f : A \longrightarrow \mathbb{R}$  est continue sur  $A$  et  $A$  est une partie compacte de  $E$ , alors il existe  $(a, b) \in A^2$  tel que pour tout  $x \in A$ ,  $f(a) \leq f(x) \leq f(b)$ , ce qui revient à dire que  $f$  possède un minimum et un maximum sur  $A$ .

---

*Démonstration 1.228*

$f(A)$  est un fermé borné de  $\mathbb{R}$  donc possède un minimum et un maximum. ■

---

*Remarque 1.229*

Pour toute partie  $X$  bornée de  $\mathbb{R}$  non-vide,  $\sup X$  et  $\inf X$  sont dans l'adhérence de  $X$ .

---

*Remarque 1.230*

Ce théorème est à rapprocher du théorème vu en première année : toute fonction de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  continue sur un segment est bornée et atteint ses bornes.

Néanmoins, le théorème de l'an dernier donnait un résultat un peu plus précis que celui de cette année car il donnait aussi l'image du segment, en précisant qu'il s'agissait aussi d'un segment, car il faisait aussi intervenir le théorème des valeurs intermédiaires.

Ici, dans la version proposée cette année, on ne peut rien dire de plus.

---

**Exercice 1.231**

Un exercice classique, à savoir refaire ! C'est la base de nombreux exercices.

Soient  $E$  de dimension finie et  $f : E \rightarrow \mathbb{R}$  continue et telle que  $f(x)$  tende vers  $+\infty$  quand  $\|x\|$  tend vers  $+\infty$ . Montrez que  $f$  possède un minimum.

Exemple : dans le plan euclidien géométrique, on choisit trois points  $A, B, C$  ; montrez alors qu'il existe un point  $M$  du plan tel que la somme  $AM + BM + CM$  soit minimale.

---

*Correction 1.232 (Cas général)*

On a  $f(0) \in \mathbb{R}$  donc il existe  $A > 0$  tel que  $\forall x \in E, \|x\| > A \implies f(x) \geq f(0)$ .

Sur  $\overline{B}(0, A)$ , fermé borné d'un espace de dimension finie donc un compact,  $f$  est continue et y admet donc un minimum en  $x_0$  d'après le théorème des bornes atteintes.

Pour tout  $x \in E$ ,

▷ si  $x \notin \overline{B}(0, A)$ , alors  $f(x) \geq f(0) \geq f(x_0)$  car  $0 \in \overline{B}(0, A)$

▷ si  $x \in \overline{B}(0, A)$ , alors  $f(x) \geq f(x_0)$ .

Donc  $f(x_0) = \min_E f$ .

---

*Correction 1.233 (Exemple)*

On note  $\mathcal{P}$  le plan considéré.

On pose  $f : \mathcal{P} \rightarrow \mathbb{R}$  qui est une fonction continue.

$$M \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto AM + BM + CM$$

Par inégalité triangulaire, on a  $f(M) \geq 3OM + \text{cte}$  donc

$$f(M) \xrightarrow{\|\vec{OM}\| \rightarrow +\infty} +\infty.$$

D'où l'existence d'un minimum d'après la propriété démontrée précédemment.

---

**Exercice 1.234**

Soit  $f : (x, y) \mapsto xy\sqrt{1-x^2-2y^2}$ .

Justifiez que l'ensemble de définition  $D$  de  $f$  est un compact de  $\mathbb{R}^2$ .

Déterminez les points critiques de  $f$  dans l'ouvert  $\overset{\circ}{D}$ , puis les maxima et minima de  $f$ .

Correction 1.235

On a  $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + 2y^2 \leq 1\}$ .

Pour tout  $(x, y) \in D$ , on a

$$x^2 \leq 1 \text{ donc } |x| \leq 1$$

et

$$2y^2 \leq 1 \text{ donc } |y| \leq \frac{1}{\sqrt{2}} \leq 1$$

donc  $\|(x, y)\|_\infty \leq 1$  donc  $D$  est borné.

De plus,  $D = \varphi^{-1}([-\infty; 1])$  où  $\varphi : (x, y) \mapsto x^2 + 2y^2$  continue sur  $\mathbb{R}^2$  donc  $D$  est un fermé.

$\mathbb{R}^2$  est de dimension finie donc  $D$  est un compact.

$f$  est continue sur  $D$  donc d'après le théorème des bornes atteintes,  $\max_D f$  et  $\min_D f$  existent.

Sur  $\mathring{D}$ ,  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$ .

$$(x, y) \in \mathring{D} \text{ est un point critique de } f \text{ ssi } \nabla f(x, y) = 0 \text{ i.e. } \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0 \end{cases}$$

Or

$$\begin{aligned} \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0 \end{cases} &\iff \begin{cases} y\sqrt{1-x^2-2y^2} - xy\frac{x}{\sqrt{1-x^2-2y^2}} = 0 \\ x\sqrt{1-x^2-2y^2} - xy\frac{2y}{\sqrt{1-x^2-2y^2}} = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} y(1-x^2-2y^2) - x^2y = 0 \\ x(1-x^2-2y^2) - 2xy^2 = 0 \end{cases} \\ &\iff (S) \begin{cases} y(1-x^2-2y^2) = 0 \\ x(1-x^2-4y^2) = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Si  $x = 0$  alors  $y = 0$  donc une solution :  $(0, 0)$ .

Si  $x \neq 0$ , alors

$$\begin{aligned} (S) &\iff \begin{cases} x^2 = 1 - 4y^2 \\ y(1 - 2(1 - 4y^2) - 2y^2) = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x^2 = 1 - 4y^2 \\ y = 0 \text{ ou } y^2 = \frac{1}{6} \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x^2 = \frac{1}{3} \\ y^2 = \frac{1}{6} \end{cases} \end{aligned}$$

On en déduit quatre autres solutions :  $\left(\frac{t}{\sqrt{3}}, \frac{t}{\sqrt{6}}\right)$  où  $t \in \{-1, 1\}$ .

★★ À finir ★★

On retrouve aussi le théorème de Heine en conséquence de la compacité.

---

**Définition 1.236**

Soient  $E, F$  deux espaces vectoriels normés,  $A$  une partie de  $E$  et  $f : A \longrightarrow F$ .

On dit que  $f$  est uniformément continue sur  $A$  quand

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall (x, y) \in A^2, \|x - y\| \leq \eta \implies \|f(x) - f(y)\| \leq \varepsilon.$$

---

**Théorème 1.237**

Soient  $E, F$  deux espaces vectoriels normés,  $A$  une partie de  $E$  et  $f : A \longrightarrow F$ .

Si  $f$  est continue sur  $A$  et  $A$  est compacte, alors  $f$  est uniformément continue sur  $A$ .

---

*Démonstration 1.238*

Par l'absurde, on suppose

$$\exists \varepsilon > 0, \forall \eta > 0, \exists (x, y) \in A^2, \begin{cases} \|x - y\| \leq \eta \\ \|f(x) - f(y)\| > \varepsilon. \end{cases}$$

On spécialise  $\eta \leftarrow \frac{1}{n+1}$  pour  $n \in \mathbb{N}$ .

Pour  $n \in \mathbb{N}$ , il existe  $(x_n, y_n) \in A^2$  tel que  $\|x - y\| \leq \frac{1}{n+1}$  et  $\|f(x) - f(y)\| > \varepsilon$ .

On a ainsi construit deux suites  $(x_n), (y_n) \in A^{\mathbb{N}}$  telles que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \|x_n - y_n\| \leq \frac{1}{n+1} \quad \text{et} \quad \|f(x_n) - f(y_n)\| > \varepsilon.$$

$A$  étant compacte,  $(x_n)$  possède une valeur d'adhérence dans  $A$  donc il existe une extractrice  $\varphi$  et  $\ell \in A$  tels que  $x_{\varphi(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$ .

On a

$$\begin{aligned} \forall n \in \mathbb{N}, \|y_{\varphi(n)} - \ell\| &\leq \|y_{\varphi(n)} - x_{\varphi(n)}\| + \|x_{\varphi(n)} - \ell\| \\ &\leq \frac{1}{\varphi(n) + 1} + \|x_{\varphi(n)} - \ell\|. \end{aligned}$$

Or  $\varphi(n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$  et  $\|x_{\varphi(n)} - \ell\| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$  donc par encadrement, on a  $y_{\varphi(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$ .

Par continuité de  $f$  en  $\ell$ , on a 
$$\begin{cases} f(x_{\varphi(n)}) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(\ell) \\ f(y_{\varphi(n)}) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(\ell) \end{cases}$$

Donc  $f(x_{\varphi(n)}) - f(y_{\varphi(n)}) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ , ce qui contredit l'inégalité

$$\forall n \in \mathbb{N}, \|f(x_{\varphi(n)}) - f(y_{\varphi(n)})\| > \varepsilon.$$

■

## 1.8 Connexité par arcs

Dans cette section,  $E$  est un espace vectoriel normé.

### 1.8.1 Chemin

---

#### Définition 1.239

Soient  $A$  une partie de  $E$  et  $a, b \in A$ .

On appelle chemin (ou arc) dans  $A$  de  $a$  à  $b$  toute application continue  $\varphi : [0 ; 1] \longrightarrow A$  telle que  $\varphi(0) = a$  et  $\varphi(1) = b$ . Le support du chemin est l'image de  $\varphi$ .

On peut définir une relation d'équivalence sur une partie de  $E$  en mettant en relation les points joignables par un chemin.

---

#### Définition 1.240

Soient  $A$  une partie de  $E$  et  $a, b \in A$ .

On pose  $a\mathcal{R}b$  quand il existe un chemin dans  $A$  de  $a$  à  $b$ .

---

#### Proposition 1.241

Avec les notations précédentes, la relation  $\mathcal{R}$  est une relation d'équivalence sur  $A$ .

---

#### Démonstration 1.242

► Soit  $a \in A$ .

La fonction 
$$\begin{array}{ccc} \varphi : [0 ; 1] & \longrightarrow & A \\ t & \longmapsto & a \end{array}$$
 est continue sur  $[0 ; 1]$  et on a  $\varphi(0) = a$  et  $\varphi(1) = a$ .

Donc  $a\mathcal{R}a$  :  $\mathcal{R}$  est réflexive.

► Soit  $(a, b) \in A^2$  tel que  $a\mathcal{R}b$ .

Il existe une fonction continue  $\varphi : [0 ; 1] \longrightarrow A$  telle que  $\varphi(0) = a$  et  $\varphi(1) = b$ .

On pose  $\psi : [0 ; 1] \longrightarrow A$   
 $t \longmapsto \varphi(1 - t)$

$\psi$  est une fonction continue sur  $[0 ; 1]$  telle que  $\psi(0) = b$  et  $\psi(1) = a$ .

Donc  $b\mathcal{R}a : \mathcal{R}$  est symétrique.

► Soit  $(a, b, c) \in A^3$  tel que  $a\mathcal{R}b$  et  $b\mathcal{R}c$ .

Il existe  $(\varphi, \psi) \in \mathcal{C}^0([0 ; 1], A)$  tel que  $\varphi(0) = a$ ,  $\varphi(1) = b$ ,  $\psi(0) = b$  et  $\psi(1) = c$ .

On pose  $\theta : [0 ; 1] \longrightarrow A$   
 $x \longmapsto \begin{cases} \varphi(2x) & \text{si } 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ \psi(2x - 1) & \text{sinon} \end{cases}$

$\theta$  est une fonction continue sur  $[0 ; 1]$  telle que  $\theta(0) = a$  et  $\theta(1) = c$ .

Donc  $a\mathcal{R}c : \mathcal{R}$  est transitive.

► Finalement,  $\mathcal{R}$  est une relation d'équivalence. ■

## 1.8.2 Parties connexes par arcs

### Définition 1.243

Soit  $A$  une partie de  $E$ .

On dit que  $A$  est connexe par arcs quand tout couple de points  $(a, b) \in A^2$  est joignable par un chemin.

#### Exemple 1.244

- Les parties convexes de  $E$  sont connexes par arcs.
- Les parties étoilées de  $E$  sont connexes par arcs.
- $\mathbb{C}^*$  et  $\mathbb{C} \setminus D$  où  $D$  est la demi-droite des réels négatifs sont connexes par arcs.

#### Démonstration 1.245

- Une partie convexe est une partie dont tous les points sont reliables en ligne droite donc, en particulier, est une partie connexe par arcs.

- Une partie  $A$  est dite étoilée quand il existe  $c \in A$  tel que pour tout  $b \in A$ ,  $[cb] \subseteq A$ . Alors  $A$  est clairement connexe par arcs. ■

Les classes d'équivalences de la relation notée  $\mathcal{R}$  précédemment s'appellent les composantes connexes par arcs de  $A$  : ce sont par définition des parties connexes par arcs.

---

### Proposition 1.246

*Les seules parties connexes par arcs de  $\mathbb{R}$  sont les intervalles.*

---

#### Remarque 1.247

Il existe une notion plus générale, celle de partie connexe : une partie  $A$  de  $E$  est dite connexe quand les seules parties de  $A$  à la fois ouvertes et fermées sont  $\emptyset$  et  $A$ . Elle est plus délicate à aborder et est hors-programme, c'est pourquoi on s'en tient à la notion de connexité par arcs (toute partie connexe par arcs est connexe).

## 1.8.3 Théorème des valeurs intermédiaires

Là encore, la notion de connexité par arcs permet de généraliser des résultats de première année.

---

### Théorème 1.248

*Soient  $E, F$  deux espaces vectoriels normés,  $A$  une partie de  $E$  et  $f : A \longrightarrow F$ .*

*Si  $f$  est continue par  $A$  et  $A$  est connexe par arcs, alors  $f(A)$  est connexe par arcs.*

---

#### Démonstration 1.249

Supposons que  $A$  est connexe par arcs et que  $f$  est continue.

Soit  $(x, y) \in f(A)^2$ .

Il existe  $(a, b) \in A^2$  tel que  $f(a) = x$  et  $f(b) = y$ .

Or  $A$  est connexe par arcs donc il existe  $\varphi : [0 ; 1] \longrightarrow A$  continue telle que  $\varphi(0) = a$  et  $\varphi(1) = b$ .

$f \circ \varphi$  est donc un chemin qui relie  $x$  et  $y$  (par composition de fonctions continues).

Donc  $f(A)$  est connexe par arcs. ■

On résume en disant que l'image continue d'un connexe par arcs est un connexe par arcs.

Dans le cas des fonctions numériques (*i.e.* à valeurs dans  $\mathbb{R}$ ), on peut même être plus précis.

---

**Théorème 1.250**

*Toute fonction continue sur un connexe par arcs et à valeurs réelles vérifie la propriété des valeurs intermédiaires.*

*Autrement dit, si  $f : A \longrightarrow F$  est continue sur  $A$  une partie connexe par arcs de  $E$ , alors  $f(A)$  est un intervalle.*

*Ou encore :*

$$\forall (y, z) \in f(A)^2, \forall w \in [yz], \exists t \in A, f(t) = w.$$

---

*Démonstration 1.251*

Évident à partir du Théorème 1.248. ■



# Chapitre 2

## Séries numériques et vectorielles : révisions et compléments

### Sommaire

<b>2.1</b>	<b>Rappels . . . . .</b>	<b>86</b>
2.1.1	Définitions et notations . . . . .	86
2.1.2	Convergence d'une série . . . . .	87
2.1.3	Lien entre convergence de suites et convergence de séries . . . . .	88
<b>2.2</b>	<b>Séries réelles à termes positifs. . . . .</b>	<b>89</b>
2.2.1	Théorème de Cesàro . . . . .	93
2.2.2	Théorème de comparaison par domination de séries à termes positifs . . . .	94
2.2.3	Théorème de comparaison par équivalence de séries à termes positifs . . . .	96
2.2.4	Théorème de comparaison série - intégrale . . . . .	98
<b>2.3</b>	<b>Séries absolument convergentes . . . . .</b>	<b>102</b>
2.3.1	Lien entre absolue convergence et convergence . . . . .	102
2.3.2	Un exemple fondamental : l'exponentielle de matrice . . . . .	103
2.3.3	Extension des résultats par comparaison . . . . .	103
2.3.4	Produit de Cauchy de deux séries absolument convergentes . . . . .	105
<b>2.4</b>	<b>Séries alternées . . . . .</b>	<b>107</b>

Dans ce chapitre,  $E$  désigne un espace vectoriel normé (qui peut être  $\mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ ) et  $\|\cdot\|$  la norme associée (qui est dans ces cas la valeur absolue ou le module).

## 2.1 Rappels

### 2.1.1 Définitions et notations

#### Définition 2.1 (Série vectorielle)

Soit  $u$  une suite de  $E$ .

On associe à cette suite la suite  $s$  définie de la façon suivante : pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $s_n = \sum_{k=0}^n u_k$ .

La suite  $s$  est appelée série de terme général  $u_n$  et notée  $\sum_{n \geq 0} u_n$  ou  $\sum u$ .

Chaque nombre  $s_n$  est appelé somme partielle d'indice  $n$  de la série.

L'adjectif « numérique » associé au mot « série » signifie que les termes généraux de la série sont en fait des nombres réels ou complexes.

## 2.1.2 Convergence d'une série

### Définition 2.2

Soit  $u$  une suite de  $E$ .

On dit que la série  $\sum u$  converge ssi la suite des sommes partielles  $(s_n) = \left( \sum_{k=0}^n u_k \right)$  converge.

Dans ce cas, si  $\ell = \lim_{n \rightarrow +\infty} s_n$ , alors  $\ell$  est appelée somme de la série  $\sum u$  et on note  $\ell = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ .

On appelle aussi reste partiel d'indice  $n$  de la série le nombre  $r_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k$ , de sorte que  $r_n + s_n = \ell$ .

La suite des restes partiels converge donc vers 0.

Dans le cas contraire, on dit que la série  $\sum u$  diverge.

### Exemple 2.3

► Soit  $x \in \mathbb{C}$ . La série  $\sum_{n \geq 0} x^n$  converge ssi  $|x| < 1$  et, dans ce cas,  $\sum_{n=0}^{+\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$ . Cette série est appelée série géométrique de raison  $x$ .

► Les séries de Riemann :  $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$  converge ssi  $\alpha > 1$ .

► Pour tout  $z \in \mathbb{C}$ , la série  $\sum \frac{z^n}{n!}$  converge et  $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!} = e^z$ .

On peut bien sûr généraliser aux séries quelques théorèmes d'opérations.

### Proposition 2.4

Soient  $u, v$  deux suites de  $E$  et  $\lambda$  un scalaire.

Si les séries  $\sum u$  et  $\sum v$  convergent, alors la série  $\sum (u + \lambda v)$  converge et  $\sum_{n=0}^{+\infty} (u_n + \lambda v_n) = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n + \lambda \sum_{n=0}^{+\infty} v_n$ .

Ceci prouve aussi que l'ensemble des séries convergentes est un espace vectoriel.

---

*Remarque 2.5*

La somme d'une série divergente et d'une série convergente est une série divergente.

En revanche, il n'y a rien à dire a priori à propos de la somme de deux séries divergentes.

### 2.1.3 Lien entre convergence de suites et convergence de séries

---

**Proposition 2.6**

Soit  $u$  une suite de  $E$ .

Si la série  $\sum u$  converge, alors la suite  $u$  converge vers 0.

---

*Remarque 2.7*

- La réciproque est fausse.
- Par contraposition, si une suite  $u$  ne tend pas vers 0, alors la série associée diverge : on dit que la série  $\sum u$  diverge grossièrement.

---

*Exemple 2.8*

On appelle série harmonique la série  $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$ .

Cette série diverge, pourtant son terme général tend vers 0.

---

**Définition 2.9**

Soit  $u$  une suite de  $E$ . On pose  $v_n = u_{n+1} - u_n$ .

La série  $\sum v$  est appelée la série télescopique (ou série domino, ou série différence) associée à  $u$ .

---

**Proposition 2.10**

Une suite converge ssi sa série télescopique associée converge.

---

**Exercice 2.11**

On pose  $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n$ . Montrez que la suite  $u$  converge.

---

Correction 2.12

$u$  converge ssi  $\sum (u_{n+1} - u_n)$  converge.

On a

$$\begin{aligned}u_{n+1} - u_n &= \frac{1}{n+1} - \ln(n+1) + \ln n \\&= \frac{1}{n+1} + \ln \frac{n}{n+1} \\&= \frac{1}{n+1} + \ln \left(1 - \frac{1}{n+1}\right).\end{aligned}$$

Or  $\ln(1+u) \underset{u \rightarrow 0}{=} u - \frac{u^2}{2} + o(u^2)$  et  $\frac{1}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$  donc

$$\begin{aligned}u_{n+1} - u_n &\underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{n+1} + \left( \frac{-1}{n+1} + \frac{1}{2(n+1)^2} + o\left(\frac{1}{(n+1)^2}\right) \right) \\&\underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{2(n+1)^2} + o\left(\frac{1}{(n+1)^2}\right) \\&\underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{2n^2}.\end{aligned}$$

Les séries  $\sum (u_{n+1} - u_n)$  et  $\sum \frac{1}{2n^2}$  sont à termes positifs à partir d'un certain rang et  $\sum \frac{1}{n^2}$  converge donc d'après le théorème de comparaison des séries à termes positifs,  $\sum (u_{n+1} - u_n)$  converge *i.e.*  $u$  converge.

Note culturelle : on appelle constante d'Euler-Mascheroni la limite de cette suite, notée  $\gamma$  et on a le développement asymptotique

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \ln n + \gamma + o(1).$$

On remarque que l'on a

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \ln n.$$

## 2.2 Séries réelles à termes positifs

Dans cette section, on s'intéresse uniquement aux séries dont le terme général est un réel positif.

On appelle un premier théorème issu du cours de première année.

---

### Théorème 2.13

Soient  $u$  et  $v$  deux suites réelles positives.

► Si  $0 \leq u \leq v$  et si la série  $\sum v$  converge, alors la série  $\sum u$  converge.

- Si  $0 \leq u \leq v$  et si la série  $\sum u$  diverge, alors la série  $\sum v$  diverge.
- Si  $u \sim v$ , alors les séries  $\sum u$  et  $\sum v$  sont de même nature.

Une application classique : la règle de d'Alembert.

### Proposition 2.14

Soit  $u$  une suite réelle strictement positive telle que  $\frac{u_{n+1}}{u_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$ . Alors

- si  $\ell < 1$ , la série  $\sum u$  converge ;
- si  $\ell > 1$ , la série  $\sum u$  diverge ;
- si  $\ell = 1$ , on ne peut rien conclure.

### Démonstration 2.15

- Si  $\ell < 1$ , on pose  $K = \frac{1+\ell}{2}$ .

Comme  $\ell < K < 1$  et  $\frac{u_{n+1}}{u_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$ , il existe  $N \in \mathbb{N}$  tel que pour tout  $n \geq N$ ,  $0 < \frac{u_{n+1}}{u_n} \leq K$ .

Par récurrence, on montre  $\forall n \geq N$ ,  $u_n \leq u_N K^{n-N} = \frac{u_N}{K^N} K^n$ .

Comme  $0 < K < 1$ , la série  $\sum K^n$  converge donc d'après le théorème de comparaison des séries à termes positifs,  $\sum u_n$  converge.

- Si  $\ell > 1$ , à partir d'un certain rang, on a  $u_n \geq \left(\frac{1+\ell}{2}\right)^n \times \text{cte} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \pm\infty$ .

Donc  $\sum u_n$  diverge grossièrement.

- Si  $\ell = 1$ , on ne peut rien dire. Deux exemples :

— En posant  $u_n = \frac{1}{n}$ , on a  $\frac{u_{n+1}}{u_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$  mais  $\sum u_n$  diverge.

— En posant  $u_n = \frac{1}{n^2}$ , on a  $\frac{u_{n+1}}{u_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$  mais  $\sum u_n$  converge. ■

### Exercice 2.16

Soient  $x, y > 0$ . Représentez graphiquement l'ensemble des couples  $(x, y)$  tels que la série  $\sum \frac{x^n}{y^n + n^x}$  converge.

---

*Correction 2.17*

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on pose  $u_n = \frac{x^n}{y^n + n^x} \geq 0$ .

► Si  $x = 1$ , alors  $u_n = \frac{1}{y^n + n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ .

— Si  $y > 1$  :

On a  $n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(y^n)$  donc  $y^n + n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} y^n$ .

Donc  $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{y^n} = \left(\frac{1}{y}\right)^n$ .

Or  $0 \leq \frac{1}{y} < 1$  donc la série géométrique  $\sum \left(\frac{1}{y}\right)^n$  converge.

Ainsi, d'après le théorème de comparaison des séries à termes positifs,  $\sum u_n$  converge.

— Sinon, on a  $y^n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(n)$  donc  $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n}$ .

Or  $\sum \frac{1}{n}$  diverge donc d'après le théorème de comparaison des séries à termes positifs,  $\sum u_n$  diverge.

► Si  $y < 1$ , on a  $n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(y^n)$  donc  $y^n + n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} y^n$ .

Donc  $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{x^n}{y^n} = \left(\frac{x}{y}\right)^n$ .


Ainsi, d'après le théorème de comparaison des séries à termes positifs,  $\sum u_n$  converge ssi  $\frac{x}{y} < 1$  i.e.  $x < y$ .

► Si  $y \leq 1$ , on a  $y^n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(n^x)$  donc  $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{x^n}{n^x}$ .

— Si  $x > 1$ , on a  $n^x \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(x^n)$  donc  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$  :  $\sum u_n$  diverge grossièrement.

— Si  $x < 1$ , on a  $0 \leq \frac{x^n}{n^x} \leq x^n$  donc, comme  $0 < x < 1$ ,  $\sum x^n$  converge et par théorème de comparaison des séries à termes positifs,  $\sum \frac{x^n}{n^x}$  converge, donc  $\sum u_n$  converge.

Finalement, on a la représentation graphique suivante :



### Exercice 2.18

Montrez que la suite  $(u_n)$  définie par  $u_0 \in [0 ; 1]$  et  $u_{n+1} = \frac{1}{2} (u_n + u_n^2)$  converge vers 0 et donnez la nature de la série  $\sum u_n$ .

#### Correction 2.19

Localisation : on montre par récurrence triviale que  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \in [0 ; 1]$ .

Monotonie : pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on a

$$u_{n+1} - u_n = \frac{u_n + u_n^2}{2} - u_n = \frac{u_n^2 - u_n}{2} \leq \frac{u_n(u_n - 1)}{2} \leq 0$$

donc  $(u_n)$  est décroissante.

Or  $(u_n)$  est minorée par 0 donc  $(u_n)$  converge d'après le théorème de la limite monotone.

On pose  $\ell = \lim_n u_n \in [0 ; 1]$ .

Par opérations sur les limites, on a

$$u_{n+1} = \frac{u_n + u_n^2}{2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{\ell + \ell^2}{2}.$$

Or  $(u_{n+1})$  est extraite de  $(u_n)$  donc  $u_{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$ .

Par unicité de la limite, on a donc  $\ell = \frac{\ell + \ell^2}{2}$ .

Donc  $\ell(\ell - 1) = 0$ , or  $\ell \in [0 ; 1]$  donc  $\ell = 0$ .

Enfin, on a  $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$  donc il existe  $N \in \mathbb{N}$  tel que  $\forall n \geq N, u_n^2 \leq \frac{u_n}{2}$ .

Donc pour  $n \geq N$ , on a  $u_{n+1} \leq \frac{3}{4}u_n$ .

Par récurrence, on montre que pour tout  $n \geq N, u_n \leq \left(\frac{3}{4}\right)^{-N} u_N \times \left(\frac{3}{4}\right)^n$ .

Or la série géométrique  $\sum \left(\frac{3}{4}\right)^n$  converge donc d'après le théorème de comparaison des séries à termes positifs,  $\sum u_n$  converge.

On donne quelques versions plus élaborées du théorème de comparaison.

### 2.2.1 Théorème de Cesàro

#### Théorème 2.20

Soit  $u$  une suite numérique qui converge vers  $\ell$ . Alors  $\frac{u_0 + \cdots + u_n}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$ .

#### Démonstration 2.21

Soit  $\varepsilon > 0$ . Il existe  $N \in \mathbb{N}$  tel que  $\forall n \geq N, |u_n - \ell| \leq \varepsilon$ .

On a

$$\begin{aligned} \frac{u_0 + \cdots + u_n}{n} - \ell &= \frac{u_0 + \cdots + u_N}{n} + \frac{u_{N+1} + \cdots + u_n}{n} - \ell \\ &= \frac{u_0 + \cdots + u_N}{n} + \frac{u_{N+1} - \ell + \cdots + u_n - \ell}{n} + \frac{(n - N)\ell}{n} - \ell \\ &= \frac{u_0 + \cdots + u_N}{n} - \frac{N\ell}{n} + \frac{u_{N+1} - \ell + \cdots + u_n - \ell}{n}. \end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned} \left| \frac{u_0 + \cdots + u_n}{n} - \ell \right| &\leq \overbrace{\left| \frac{u_0 + \cdots + u_N - N\ell}{n} \right|}^K + \frac{|u_{N+1} - \ell| + \cdots + |u_n - \ell|}{n} \\ &\leq \frac{K}{n} + \frac{(n - N)\varepsilon}{n} \\ &\leq \frac{K}{n} + \varepsilon. \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\frac{K}{n}} \right) \frac{n - N}{n} \leq 1$$

Or  $\frac{K}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$  donc il existe  $N' \in \mathbb{N}$  tel que  $\forall n \geq N', \frac{K}{n} \leq \varepsilon$ .

On pose  $N'' = \max(N, N')$ .

Donc pour tout  $n \geq N''$ ,  $\left| \frac{u_0 + \cdots + u_n}{n} - \ell \right| \leq 2\varepsilon$ .

On a montré

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, \left| \frac{u_0 + \cdots + u_n}{n} - \ell \right| \leq \varepsilon$$

donc  $\frac{u_0 + \cdots + u_n}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$ . ■



Dans le cas où  $\ell \neq 0$ , la série  $\sum u$  diverge grossièrement et  $\sum_{k=0}^n u_k \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n\ell$ .

Dans le cas où  $\ell = 0$ , on peut juste dire  $\sum_{k=0}^n u_k = o(n)$ .

### Exercice 2.22

Soit  $u$  la suite définie par récurrence par  $u_0 > 0$  et pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+1} = u_n + \frac{u_n + 1}{u_n + 2}$ .

Étudiez la convergence ou divergence de la suite  $u$ , puis donnez un équivalent simple de  $u_n$  quand  $n$  tend vers  $+\infty$ .

#### Correction 2.23

Par récurrence immédiate,  $(u_n)$  est à termes strictement positifs.

On en déduit que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+1} - u_n = \frac{u_n + 1}{u_n + 2} > 0$  donc  $(u_n)$  est croissante.

Par l'absurde, on suppose que  $(u_n)$  converge vers  $\ell \in \mathbb{R}_+^*$ .

De la même façon que dans l'Exercice 2.18, par passage à la limite, on obtient  $\ell - \ell = \frac{\ell + 1}{\ell + 2}$  donc  $\ell = -1$  : contradiction.

Donc  $(u_n)$  est croissante et diverge donc elle diverge vers  $+\infty$ .

De plus, on a  $\sum_{k=0}^{n-1} (u_{k+1} - u_k) = u_n - u_0 = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{u_k + 1}{u_k + 2}$ .

Or  $\frac{u_n + 1}{u_n + 2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$  donc d'après le théorème de Cesàro, on a

$$\frac{\sum_{k=0}^{n-1} \frac{u_k + 1}{u_k + 2}}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$$

i.e.  $u_n - u_0 \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n$ .

Donc  $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n$ .

## 2.2.2 Théorème de comparaison par domination de séries à termes positifs

Dans le cas convergent d'abord, les restes partiels suivent la même relation de comparaison.

---

**Théorème 2.24**

Soient  $u, v$  deux suites réelles positives.

Si  $u = \mathcal{O}(v)$  et la série  $\sum v$  converge, alors la série  $\sum u$  converge. De plus,  $\sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k = \mathcal{O}\left(\sum_{k=n+1}^{+\infty} v_k\right)$ .

Si  $u = o(v)$  et la série  $\sum v$  converge, alors la série  $\sum u$  converge. De plus,  $\sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k = o\left(\sum_{k=n+1}^{+\infty} v_k\right)$ .

---

**Démonstration 2.25**

► Si  $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \mathcal{O}(v_n)$ , il existe  $K > 0$  et  $N \in \mathbb{N}$  tels que  $\forall n \geq N, 0 \leq u_n \leq K v_n$ .

La série  $\sum v_n$  converge donc d'après le théorème de comparaison des séries à termes positifs,  $\sum u_n$  converge.

Pour  $n \geq N$ , on a  $\sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k \leq K \sum_{k=n+1}^{+\infty} v_k$ .

D'où  $\sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \mathcal{O}\left(\sum_{k=n+1}^{+\infty} v_k\right)$ .

► Si  $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(v_n)$ , pour tout  $\varepsilon > 0$ , il existe  $N \in \mathbb{N}$  tel que  $\forall n \geq N, 0 \leq u_n \leq \varepsilon v_n$ .

La série  $\sum v_n$  converge donc d'après le théorème de comparaison des séries à termes positifs,  $\sum u_n$  converge.

Pour  $n \geq N$ , on a  $\sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k \leq \varepsilon \sum_{k=n+1}^{+\infty} v_k$ .

D'où  $\sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o\left(\sum_{k=n+1}^{+\infty} v_k\right)$ . ■

Dans le cas divergent ensuite, les sommes partielles suivent aussi la même relation de comparaison.

---

**Théorème 2.26**

Soient  $u, v$  deux suites réelles positives.

Si  $u = \mathcal{O}(v)$  et la série  $\sum u$  diverge, alors la série  $\sum v$  diverge. De plus,  $\sum_{k=0}^n u_k = \mathcal{O}\left(\sum_{k=0}^n v_k\right)$ .

Si  $u = o(v)$  et la série  $\sum u$  diverge, alors la série  $\sum v$  diverge. De plus,  $\sum_{k=0}^n u_k = o\left(\sum_{k=0}^n v_k\right)$ .

---

*Démonstration 2.27*

► Si  $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \mathcal{O}(v_n)$ , il existe  $K > 0$  et  $N \in \mathbb{N}$  tels que  $\forall n \geq N, 0 \leq u_n \leq K v_n$ .

Par comparaison de séries à termes positifs,  $\sum v_n$  diverge.

$u$  et  $v$  étant deux suites positives telles que  $\sum u_n$  et  $\sum v_n$  divergent, on en déduit que

$$\sum_{k=0}^n u_k \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty \text{ et } \sum_{k=0}^n v_k \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty.$$

Pour  $n \geq N$ , on a

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n u_k &= \sum_{k=0}^N u_k + \sum_{k=N+1}^n u_k \\ &\leq \sum_{k=0}^N u_k + K \sum_{k=N+1}^n v_k \\ &\leq \underbrace{\sum_{k=0}^N u_k - K \sum_{k=0}^N v_k}_L + K \sum_{k=0}^n v_k. \end{aligned}$$

Or  $\sum_{k=0}^n v_k \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$  donc il existe  $N' \in \mathbb{N}$  tel que  $\forall n \geq N', L \leq \sum_{k=0}^n v_k$ .

Alors, pour  $n \geq \max(N, N')$ , on a  $\sum_{k=0}^n u_k \leq (K+1) \sum_{k=0}^n v_k$ .

On a montré :  $\sum_{k=0}^n u_k \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \mathcal{O}\left(\sum_{k=0}^n v_k\right)$ .

► Idem. ■

### 2.2.3 Théorème de comparaison par équivalence de séries à termes positifs

---

#### Théorème 2.28

Soient  $u, v$  deux suites réelles positives.

Si  $u \sim v$ , alors les séries  $\sum u$  et  $\sum v$  sont de même nature ; l'une converge ssi l'autre converge.

De plus,

► si les séries convergent, alors les restes partiels sont équivalents :  $\sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sum_{k=n+1}^{+\infty} v_k$  ;

► si les séries divergent, alors les sommes partielles divergent vers  $+\infty$  et sont équivalentes :

$$\sum_{k=0}^n u_k \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sum_{k=0}^n v_k.$$

---

*Démonstration 2.29*

► Si les séries convergent, comme  $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$ , on a

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, (1 - \varepsilon) v_n \leq u_n \leq (1 + \varepsilon) v_n$$

donc

$$\forall n \geq N, (1 - \varepsilon) \sum_{k=n+1}^{+\infty} v_k \leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k \leq (1 + \varepsilon) \sum_{k=n+1}^{+\infty} v_k.$$

$$\text{Donc } \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sum_{k=n+1}^{+\infty} v_k.$$

► Si les séries divergent, la démonstration est similaire à la Démonstration 2.27. ■

---

**Exercice 2.30**

Soit  $a > 0$ . On pose  $u_n = \sin \frac{a^n}{n}$  pour  $n \in \mathbb{N}^*$ . Selon la valeur de  $a$ , déterminez la nature de la série  $\sum_{n \geq 1} u_n$ .

Montrez que si  $a = 1$ , alors  $\sum_{k=1}^n u_k \sim \ln n$  et si  $a < 1$ ,  $\sum_{k=n}^{+\infty} u_k = o(a^n)$ .

---

*Correction 2.31*

► Si  $a = 1$ , on a  $u_n = \sin \frac{1}{n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n}$ .

Or  $\sum \frac{1}{n}$  diverge donc par théorème de comparaison des séries à termes positifs,  $\sum u_n$  diverge.

► Si  $a < 1$ , on a  $u_n = \sin \frac{a^n}{n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{a^n}{n} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(a^n)$ .

Or  $\sum a^n$  converge car  $a < 1$  donc par théorème de comparaison des séries à termes positifs,  $\sum u_n$  converge.

De plus, d'après le Théorème 2.28, si  $a = 1$ , on a

$$\sum_{k=1}^n u_k \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \ln n$$

et d'après le Théorème 2.24, si  $a < 1$ , on a

$$\begin{aligned} \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k &\underset{n \rightarrow +\infty}{=} o\left(\sum_{k=n+1}^{+\infty} a^k\right) \\ &\underset{n \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{a^{n+1}}{1-a}\right) \\ &\underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(a^n). \end{aligned}$$

## 2.2.4 Théorème de comparaison série - intégrale

---

### Proposition 2.32

Soit  $f$  une fonction continue, positive et décroissante sur  $\mathbb{R}_+$ .

Alors la série de terme général  $f(n)$  et la suite de terme général  $\int_0^n f$  sont de même nature.

---

#### Démonstration 2.33

$f$  étant décroissante et continue sur  $\mathbb{R}_+$ , pour  $k \in \mathbb{N}^*$ , pour tout  $t \in [k-1; k]$ ,  $f(k) \leq f(t)$ .

$$\text{Donc } \int_{k-1}^k f(k) dt \leq \int_{k-1}^k f(t) dt \text{ i.e. } f(k) \leq \int_{k-1}^k f(t) dt.$$

$$\text{De même, } \int_k^{k+1} f(t) dt \leq f(k).$$

$$\text{Donc pour tout } n \in \mathbb{N}^*, \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} f(t) dt \leq \sum_{k=1}^n f(k) \leq \sum_{k=1}^n \int_{k-1}^k f(t) dt.$$

$$\text{Donc } \int_1^{n+1} f(t) dt \leq \sum_{k=1}^n f(k) \leq \int_0^n f(t) dt.$$

$f$  étant positive, les suites  $\left(\sum_{k=1}^n f(k)\right)$  et  $\left(\int_0^n f(t) dt\right)$  sont croissantes.

Donc si  $\left(\int_0^n f\right)$  converge, elle est majorée, donc  $\left(\sum_{k=1}^n f(k)\right)$  est majorée et donc convergente, i.e.  $\sum f(n)$  converge.

Réciproquement, si  $\sum f(n)$  converge,  $\left(\sum_{k=1}^n f(k)\right)$  est majorée donc  $\left(\int_1^{n+1} f\right)$  est majorée et croissante donc convergente. Donc  $\left(\int_0^n f\right)$  converge. ■

---

### Méthode 2.34 (À retenir)

La technique d'encadrement des sommes partielles d'une série  $\sum f(n)$  (ou des restes partiels) par des intégrales quand  $f$  est continue, positive et monotone.

---

#### Exemple 2.35

$$\triangleright \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \ln n \text{ (à connaître).}$$

► Si  $\alpha > 1$ , un équivalent simple de  $\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha}$  quand  $n \longrightarrow +\infty$  est  $\frac{1}{(\alpha-1)n^{\alpha-1}}$ .

---

*Rappel 2.36*

Si  $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$  et  $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$  ou 0, alors

$$\ln u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \ln v_n.$$

---

*Démonstration 2.37 (Premier point)*

La fonction  $f : t \mapsto \frac{1}{t}$  est positive, décroissante et continue sur  $[1 ; +\infty[$ .

On a donc l'inégalité :

$$\underbrace{\int_2^{n+1} \frac{1}{t} dt}_{=\ln(n+1)-\ln 2} \leq \sum_{k=2}^n \frac{1}{k} \leq \underbrace{\int_1^n \frac{1}{t} dt}_{=\ln n}.$$

Or on a

$$\ln(n+1) - \ln 2 \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \ln(n+1) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \ln n$$

donc d'après le théorème d'encadrement, on a

$$\sum_{k=2}^n \frac{1}{k} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \ln n. \quad \blacksquare$$

---

*Démonstration 2.38 (Deuxième point)*

Soit  $\alpha > 1$ .

La fonction  $f : t \mapsto \frac{1}{t^\alpha}$  est continue, décroissante et positive sur  $[1 ; +\infty[$ .

On a

$$\int_{n+1}^{+\infty} f(t) dt \leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} f(k) \leq \underbrace{\int_n^{+\infty} f(t) dt}_{=\lim_{X \rightarrow +\infty} \int_n^X f(t) dt}.$$

Soient  $X \geq n \geq 1$ .

On a

$$\int_{n+1}^{X+1} \frac{1}{t^\alpha} dt \leq \sum_{k=n+1}^X \frac{1}{k^\alpha} \leq \int_n^X \frac{1}{t^\alpha} dt.$$

Or

$$\int_n^X \frac{1}{t^\alpha} dt = \left[ \frac{1}{-\alpha+1} t^{-\alpha+1} \right]_n^X = \frac{1}{1-\alpha} \left( \frac{1}{X^{\alpha-1}} - \frac{1}{n^{\alpha-1}} \right).$$

Donc

$$\frac{1}{\alpha-1} \left( \frac{1}{(n+1)^{\alpha-1}} - \frac{1}{(X+1)^{\alpha-1}} \right) \leq \sum_{k=n+1}^X \frac{1}{k^\alpha} \leq \frac{1}{\alpha-1} \left( \frac{1}{n^{\alpha-1}} - \frac{1}{X^{\alpha-1}} \right).$$

Or  $\frac{1}{X^{\alpha-1}} \xrightarrow{X \rightarrow +\infty} 0$  et  $\frac{1}{(X+1)^{\alpha-1}} \xrightarrow{X \rightarrow +\infty} 0$ .

Donc, par passage à la limite quand  $X \rightarrow +\infty$ , on a

$$\frac{1}{(\alpha-1)(n+1)^{\alpha-1}} \leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha} \leq \frac{1}{(\alpha-1)n^{\alpha-1}}.$$

Or  $\frac{1}{(n+1)^{\alpha-1}} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n^{\alpha-1}}$  donc par encadrement, on a

$$\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{(\alpha-1)n^{\alpha-1}}.$$

■

---

### Exercice 2.39

Pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , on pose  $u_n = \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{\ln k}{k^2}$ .

Justifiez l'existence de  $u_n$ , puis montrez la divergence de la série  $\sum u_n$ .

Montrez que  $\sum_{k=1}^n u_k \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\ln^2 n}{2}$ .

---

### Correction 2.40

Pour  $k \geq 1$ , on a

$$0 \leq \frac{\ln k}{k^2} = \frac{\ln k}{k^{1/2} \times k^{3/2}} = \frac{\ln k}{k^{1/2}} \times \frac{1}{k^{3/2}}.$$

Or  $\frac{\ln k}{k^{1/2}} \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} 0$  donc  $\frac{\ln k}{k^{1/2}} \underset{k \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{1}{k^{3/2}}\right)$ .

Or  $\sum \frac{1}{k^{3/2}}$  converge donc d'après le théorème de comparaison des séries à termes positifs,  $\sum \frac{\ln k}{k^2}$  converge.

Donc pour tout  $n \geq 1$ ,  $\sum_{k=n}^{+\infty} \frac{\ln k}{k^2}$  existe.

La fonction  $f : t \mapsto \frac{\ln t}{t^2}$  est de classe  $\mathcal{C}^\infty$  et positive sur  $[1; +\infty[$ .

On a  $f' : t \mapsto \frac{t - 2t \ln t}{t^4}$ .

Or, pour  $t \geq 2$ , on a  $t \leq 2t \ln t$  et  $t^4 \geq 0$  donc

$$\forall t \in [2; +\infty[, \quad f'(t) \leq 0$$

donc  $f$  est décroissante sur  $[2; +\infty[$ .

Soient  $X \geq n \geq 3$ .

On a

$$\int_n^{X+1} \frac{\ln t}{t^2} dt \leq \sum_{k=n}^X \frac{\ln k}{k^2} \leq \int_{n-1}^X \frac{\ln t}{t^2} dt.$$

Or, par intégration par parties, on a

$$\int_{n-1}^X \frac{\ln t}{t^2} dt = \frac{\ln(n-1) + 1}{n-1} - \frac{\ln X + 1}{X}.$$

Donc

$$\frac{\ln n + 1}{n} - \frac{\ln(X+1) + 1}{X+1} \leq \sum_{k=n}^X \frac{\ln k}{k^2} \leq \frac{\ln(n-1) + 1}{n-1} - \frac{\ln X + 1}{X}.$$

Donc, par passage à la limite quand  $X \rightarrow +\infty$ , on a

$$\frac{\ln n + 1}{n} \leq u_n \leq \frac{\ln(n-1) + 1}{n-1}.$$

Or  $\ln(n-1) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \ln n$  donc

$$\frac{\ln(n-1) + 1}{n-1} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\ln n + 1}{n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\ln n}{n}.$$

D'où  $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\ln n}{n}$ .

Pour  $n \geq 3$ , on a  $\frac{\ln n}{n} \geq \frac{1}{n} \geq 0$ .

Or  $\sum \frac{1}{n}$  diverge donc d'après le théorème de comparaison des séries à termes positifs,  $\sum \frac{\ln n}{n}$  diverge et donc  $\sum u_n$  diverge.

De plus, d'après le Théorème 2.28, on a

$$\sum_{k=1}^n u_k \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sum_{k=1}^n \frac{\ln k}{k}.$$

La fonction  $g : t \mapsto \frac{\ln t}{t}$  est de classe  $\mathcal{C}^\infty$ , positive et décroissante sur  $[3; +\infty[$ .

On pose  $n \geq 4$ . On a

$$\int_4^{n+1} \frac{\ln t}{t} dt \leq \sum_{k=4}^n g(k) \leq \int_3^n \frac{\ln t}{t} dt.$$



Or

$$\int_3^n \frac{\ln t}{t} dt = \int_3^n \frac{1}{t} \ln t dt = \left[ \frac{\ln^2 t}{2} \right]_3^n = \frac{\ln^2 n}{2} - \frac{\ln^2 3}{2}.$$

Donc

$$\underbrace{\frac{\ln^2(n+1)}{2} + K_2}_{\underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\ln^2 n}{2}} \leq \sum_{k=4}^n \frac{\ln k}{k} \leq \underbrace{\frac{\ln^2 n}{2} + K_1}_{\underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\ln^2 n}{2}}.$$

Par encadrement, on a  $\sum_{k=4}^n u_k \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\ln^2 n}{2}$  puis  $\sum_{k=1}^n u_k \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\ln^2 n}{2}$ .

## 2.3 Séries absolument convergentes

---

### Définition 2.41

Soit  $u$  une suite de  $E$ .

On dit que la série  $\sum u$  est absolument convergente ssi la série à termes positifs  $\sum \|u\|$  est convergente.

### 2.3.1 Lien entre absolue convergence et convergence

---

#### Théorème 2.42

Si  $E$  est de dimension finie, alors toute série absolument convergente est convergente.

#### Démonstration 2.43

Soient  $E$  un espace vectoriel normé de dimension finie  $p \in \mathbb{N}$  et  $\mathcal{B}$  une base de  $E$ .

On choisit la norme sup  $\|\cdot\|_\infty$  associée à cette base.

Toutes les normes sont équivalentes sur  $E$  donc si  $\|\cdot\|$  est une norme telle que  $\sum \|u_n\|$  converge, alors  $\sum \|u_n\|_\infty$  converge d'après le théorème de comparaison des séries à termes positifs.

On note  $(u_{n,1}, \dots, u_{n,p})$  les coordonnées de  $u_n$  dans  $\mathcal{B}$ .

On a  $\forall k \in \llbracket 1 ; p \rrbracket$ ,  $|u_{n,k}| \leq \|u_n\|_\infty$  donc d'après le théorème de comparaison des séries à termes positifs,  $\sum_n |u_{n,k}|$  converge, donc  $\sum_n u_{n,k}$  est absolument convergente et donc convergente.

Donc les suites des sommes partielles  $\left( \sum_{j=0}^n u_j \right) = \left( \left( \sum_{j=0}^n u_{j,1}, \dots, \sum_{j=0}^n u_{j,p} \right) \right)$  convergent i.e.  $\sum u_n$  converge. ■

---

Remarque 2.44

- La réciproque est fautive : la série  $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n}$  converge (on l'appelle la série harmonique alternée) mais ne converge pas absolument.
- L'hypothèse de la dimension finie est indispensable. En dimension infinie, ce résultat est faux en général.

---

### Exercice 2.45

Soit  $x > 0$ . Montrez que les séries suivantes convergent :

$$\sum_{n \geq 2} \frac{\ln(n^2 + (-1)^n n)}{n^2 + (-1)^n x^n} \quad \sum_{n \geq 0} \sqrt{n} \cos(x) \sin^n(x) \quad \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n \sqrt{n+x}}{x^n + n^{2/x}}.$$

### 2.3.2 Un exemple fondamental : l'exponentielle de matrice

Soit  $p \in \mathbb{N}^*$ .

On choisit comme norme sur  $E = \mathcal{M}_p(\mathbb{C})$  une norme sous-multiplicative.

Alors pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\|A^n\| \leq \|A\|^n$ , donc  $\left\| \frac{A^n}{n!} \right\| \leq \frac{\|A\|^n}{n!}$ .

Or la série  $\sum \frac{\|A\|^n}{n!}$  converge (et sa somme vaut  $\exp \|A\|$ ), donc par comparaison de séries à termes positifs, la série  $\sum \frac{A^n}{n!}$  est absolument convergente.

On pose alors  $\exp A = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{A^n}{n!}$ .

### 2.3.3 Extension des résultats par comparaison

---

#### Définition 2.46

Soit  $u$  une suite de  $E$  et  $v$  une suite réelle positive.

On dit que  $u = \mathcal{O}(v)$  quand  $\exists M > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, \|u_n\| \leq M v_n$ .

On dit que  $u = o(v)$  quand  $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, \|u_n\| \leq \varepsilon v_n$ .

---

**Proposition 2.47**

Soient  $u$  une suite de  $E$  et  $v$  une suite réelle positive.

Si  $E$  est de dimension finie,  $u_n = \mathcal{O}(v_n)$  quand  $n$  tend vers  $+\infty$  et la série  $\sum v$  converge, alors la série  $\sum u$  est absolument convergente.

$$\text{De plus, } \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k = \mathcal{O}\left(\sum_{k=n+1}^{+\infty} v_k\right).$$

---

**Démonstration 2.48**

$$\text{On a } u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \mathcal{O}(v_n) \iff \|u_n\| \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \mathcal{O}(v_n).$$

Si  $\sum v_n$  converge alors  $\sum \|u_n\|$  converge d'après le théorème de comparaison des séries à termes positifs donc, comme  $E$  est de dimension finie,  $\sum u_n$  converge.

De plus, on a  $\left\| \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k \right\| \leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} \|u_k\|$  donc d'après le Théorème 2.24, on a

$$\sum_{k=n+1}^{+\infty} \|u_k\| \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \mathcal{O}\left(\sum_{k=n+1}^{+\infty} v_k\right).$$

Donc

$$\left\| \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k \right\| \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \mathcal{O}\left(\sum_{k=n+1}^{+\infty} v_k\right).$$

■

Ceci est encore valable si  $u_n = o(v_n)$ .

---

**Proposition 2.49**

Soient  $u$  une suite de  $E$  et  $v$  une suite réelle positive.

Si  $E$  est de dimension finie,  $u_n = o(v_n)$  quand  $n$  tend vers  $+\infty$  et la série  $\sum v$  converge, alors la série  $\sum u$  est absolument convergente.

$$\text{De plus, } \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k = o\left(\sum_{k=n+1}^{+\infty} v_k\right).$$

---

**Démonstration 2.50**

Idem.

■

## 2.3.4 Produit de Cauchy de deux séries absolument convergentes

### Définition 2.51

Une  $\mathbb{K}$ -algèbre est un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel muni d'un produit interne bilinéaire.

### Définition 2.52

Soient  $E$  une algèbre normée de dimension finie,  $\sum_{n \geq 0} a_n$  et  $\sum_{n \geq 0} b_n$  deux séries à termes dans  $E$ .

On appelle produit de Cauchy des deux séries la série  $\sum_{n \geq 0} c_n$  où pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$ .

### Remarque 2.53

Quand les séries ne commencent pas à partir du rang 0, il faut se méfier ! Une idée simple est de se ramener au cas précédent en décalant les indices.

Exemple très courant : les séries commencent au rang 1. Dans ce cas, le produit de Cauchy des séries

$\sum_{n \geq 1} a_n$  et  $\sum_{n \geq 1} b_n$  est la série  $\sum_{n \geq 1} c_n$  où pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $c_n = \sum_{k=1}^n a_k b_{n+1-k}$ .

### Théorème 2.54

Avec les mêmes hypothèses sur  $E$ .

Si les séries  $\sum_{n \geq 0} a_n$  et  $\sum_{n \geq 0} b_n$  convergent absolument, alors leur produit de Cauchy est aussi absolument convergent et

$$\sum_{n=0}^{+\infty} c_n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \times \sum_{k=0}^{+\infty} b_k.$$

*Démonstration 2.55 (Premier cas :  $E = \mathbb{R}$  et  $(a_n), (b_n)$  positives)*

On pose  $A_n = \sum_{k=0}^n a_k$ ,  $B_n = \sum_{k=0}^n b_k$  et  $C_n = \sum_{k=0}^n c_k$ .

On a  $A_n B_n = \sum_{k=0}^n a_k \times \sum_{k=0}^n b_k = \sum_{\substack{0 \leq k \leq n \\ 0 \leq \ell \leq n}} a_k b_\ell$ .

On a  $(\star) \ C_n \leq A_n B_n \leq C_{2n}$ .

Les séries  $\sum a_n$  et  $\sum b_n$  convergent donc les suites  $(A_n)$  et  $(B_n)$  convergent et sont donc majorées.

Comme ce sont des suites positives, la suite  $(A_n B_n)$  est majorée (produit d'inégalités entre positifs).

Donc  $(C_n)$ , qui est croissante, est majorée donc converge *i.e.*  $\sum c_n$  converge.

Donc  $A_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^{+\infty} a_k$ ,  $B_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^{+\infty} b_k$ ,  $C_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^{+\infty} c_k$  et  $C_{2n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^{+\infty} c_k$ .

Donc, par passage à la limite dans  $(\star)$ , on a

$$\sum_{k=0}^{+\infty} c_k = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k \times \sum_{k=0}^{+\infty} b_k. \quad \blacksquare$$

### Démonstration 2.56 (Cas général)

On a  $\dim E \in \mathbb{N}$  donc toutes les normes sont équivalentes sur  $E$ ; on en choisit donc une qui est sous-multiplicative.

Avec les mêmes notations, on a  $A_n B_n - C_n = \sum_{k=0}^n \sum_{j=n-k+1}^n c_j$ , d'où

$$\begin{aligned} \|A_n B_n - C_n\| &\leq \sum_{k=0}^n \sum_{j=n-k+1}^n \|c_j\| \\ &= \sum_{k=0}^n \sum_{j=n-k+1}^n \left\| \sum_{\ell=0}^j a_{j-\ell} b_\ell \right\| \\ &\leq \sum_{k=0}^n \sum_{j=n-k+1}^n \sum_{\ell=0}^j \|a_{j-\ell} b_\ell\| \\ &\leq \sum_{k=0}^n \sum_{j=n-k+1}^n \sum_{\ell=0}^j \|a_{j-\ell}\| \times \|b_\ell\|. \end{aligned}$$

On pose  $A'_n = \sum_{k=0}^n \|a_k\|$ ,  $B'_n = \sum_{k=0}^n \|b_k\|$  et  $C'_n = \sum_{k=0}^n c'_k = \sum_{k=0}^n \sum_{j=0}^k \|a_{k-j}\| \times \|b_j\|$ .

On a de même  $\|A_n B_n - C_n\| \leq A'_n B'_n - C'_n$ .

D'après le premier cas,  $(C'_n)$  converge vers  $\sum_{k=0}^{+\infty} \|a_k\| \times \sum_{k=0}^{+\infty} \|b_k\| = \lim_n A'_n B'_n$ .

Donc  $A'_n B'_n - C'_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$  donc par encadrement  $A_n B_n - C_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ .

Or  $A_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^{+\infty} a_k$  et  $B_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^{+\infty} b_k$  donc

$$C_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^{+\infty} a_k \times \sum_{k=0}^{+\infty} b_k. \quad \blacksquare$$

## 2.4 Séries alternées

---

### Définition 2.57

Une série alternée est une série réelle  $\sum u_n$  telle que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+1}$  est de signe opposé à  $u_n$ .

En général, les séries alternées sont reconnaissables à la présence d'un facteur  $(-1)^n$  dans l'expression du terme général.

On dispose d'une condition suffisante de convergence d'une série alternée qu'on appelle le critère spécial des séries alternées.

---

### Théorème 2.58

Soit  $\sum (-1)^n u_n$  une série alternée.

Si la suite  $u$

- ▷ est positive,
- ▷ est décroissante,
- ▷ et converge vers 0,

alors la série  $\sum (-1)^n u_n$  converge.

Dans ce cas, la somme de la série est positive, et si on note  $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} (-1)^k u_k$  le reste partiel d'indice  $n$ , alors pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $R_n$  est du signe de son premier terme (i.e. du signe de  $(-1)^{n+1}$ ) et  $|R_n| \leq u_{n+1}$ .

---

### Exemple 2.59

- ▷ La série harmonique alternée  $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n}$  converge.
- ▷ La série  $\sum_{n \geq 2} \frac{(-1)^n}{\ln n}$  converge.

---

### Remarque 2.60

- ▷ Si  $\sum_{n \geq n_0} (-1)^n u_n$  est une série alternée convergente, sa somme a le signe du premier terme de la série (ici le signe de  $(-1)^{n_0} u_{n_0}$ ).
- ▷ La condition de décroissance de la suite  $u$  est essentielle ! Contre-exemple : la série  $\sum_{n \geq 2} \frac{(-1)^n}{(-1)^n + \sqrt{n}}$  est une série alternée divergente.  
De plus, cela fournit un contre-exemple au théorème de comparaison par équivalents si on ne tient pas compte de la condition sur le signe, qui doit être constant.

---

**Exercice 2.61**

Soit  $\alpha > 1$ . Pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , on pose  $u_n = \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k^\alpha + k}$ .

Justifiez l'existence de  $u_n$ . Montrez que la série  $\sum_{n \geq 1} u_n$  converge.

---

*Correction 2.62*

La suite  $\left(\frac{1}{k^\alpha + k}\right)_{k \in \mathbb{N}^*}$  est positive, décroissante et converge vers 0 donc d'après le critère spécial des séries alternées,  $\sum \frac{(-1)^k}{k^\alpha + k}$  converge.

Ainsi,  $u_n = \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k^\alpha + k}$  existe pour  $n \in \mathbb{N}^*$ .

De plus, on a

$$|u_n| = \left| \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k^\alpha + k} \right| \leq \frac{1}{n^\alpha + n} \leq \frac{1}{n^\alpha}.$$

Or  $\alpha > 1$  donc d'après le théorème de comparaison des séries à termes positifs,  $\sum |u_n|$  converge et donc  $\sum u_n$  converge.

# Chapitre 3

## Familles sommables

### Sommaire

---

<b>3.1</b>	<b>Sommes finies . . . . .</b>	<b>.109</b>
3.1.1	Définition . . . . .	109
3.1.2	Propriétés . . . . .	112
<b>3.2</b>	<b>Conventions de calcul dans <math>\mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}</math> . . . . .</b>	<b>.113</b>
<b>3.3</b>	<b>Somme d'une famille de réels positifs . . . . .</b>	<b>.114</b>
3.3.1	Propriétés . . . . .	115
3.3.2	Théorème de sommation par paquets . . . . .	116
3.3.3	Théorème de Fubini . . . . .	116
<b>3.4</b>	<b>Familles sommables dans un espace vectoriel normé de dimension finie . . . . .</b>	<b>.117</b>
3.4.1	Définitions . . . . .	117
3.4.1.1	Cas réel . . . . .	117
3.4.1.2	Cas complexe . . . . .	117
3.4.1.3	Cas général . . . . .	119
3.4.2	Propriétés . . . . .	119
3.4.3	Théorème de sommation par paquets . . . . .	120
3.4.4	Théorème de Fubini . . . . .	122
3.4.5	Produit de Cauchy de deux séries . . . . .	124

---

Dans ce chapitre,  $E$  désigne un espace vectoriel normé de dimension finie (qui peut être  $\mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ ) et  $\|\cdot\|$  la norme associée (qui est dans ce cas la valeur absolue ou le module).

Si  $A, B$  sont deux ensembles, alors on note  $A \subseteq_f B$  pour indiquer que  $A$  est un sous-ensemble fini de  $B$ .

### 3.1 Sommes finies

#### 3.1.1 Définition

D'abord un rappel : on définit par récurrence la somme de  $n$  éléments de  $E$  notés  $x_1, \dots, x_n$  par :



- ▷ si  $n = 0$ , alors  $\sum_{k=1}^n x_k = 0$  (une somme vide a pour valeur 0 par convention) ;
- ▷ pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $\sum_{k=1}^{n+1} x_k = x_{n+1} + \sum_{k=1}^n x_k$ .

On définit de même par récurrence les sommes de la forme  $\sum_{k=p}^q x_k$  quand  $p - 1 \leq q$  (si  $q = p - 1$ , la somme est vide donc vaut 0).

---

### Proposition 3.1

Soient  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $x_1, \dots, x_n \in E$ .

Alors :

- (1) pour tout  $(p, q) \in \llbracket 1 ; n \rrbracket^2$  tel que  $p \leq q$ ,  $\sum_{k=p}^n x_k = \sum_{k=p}^q x_k + \sum_{k=q+1}^n x_k$  ;
- (2) pour tout  $\varphi \in \mathfrak{S}_n$ ,  $\sum_{k=1}^n x_k = \sum_{k=1}^n x_{\varphi(k)}$ .

---

#### Démonstration 3.2 (1)

On pose  $\mathcal{P}(n)$  la proposition «  $\forall (p, q) \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, p \leq q \implies \sum_{k=p}^n x_k = \sum_{k=p}^q x_k + \sum_{k=q+1}^n x_k$  ».

Si  $n = 1$ , alors pour tout  $(p, q) \in \llbracket 1 ; n \rrbracket^2$ ,  $p = q = 1$  donc  $\sum_{k=p}^n x_k = x_1 + 0 = \sum_{k=p}^q x_k + \sum_{k=q+1}^n x_k$  donc  $\mathcal{P}(1)$  est vraie.

Si  $\mathcal{P}(n)$  est vraie, alors soient  $(x_1, \dots, x_{n+1}) \in E^{n+1}$  et  $(p, q) \in \llbracket 1 ; n+1 \rrbracket^2$  tel que  $p \leq q$  :

- ▷ si  $q \leq n$ , alors par définition,  $\sum_{k=p}^{n+1} x_k = \sum_{k=p}^n x_k + x_{n+1}$ , donc d'après l'hypothèse de récurrence,
$$\sum_{k=p}^{n+1} x_k = \sum_{k=p}^q x_k + \sum_{k=q+1}^n x_k + x_{n+1} = \sum_{k=p}^q x_k + \sum_{k=q+1}^{n+1} x_k ;$$
- ▷ si  $q = n+1$ , alors  $\sum_{k=p}^{n+1} x_k = \sum_{k=p}^q x_k + 0 = \sum_{k=p}^q x_k + \sum_{k=q+1}^{n+1} x_k$ .

Dans les deux cas, on a montré  $\sum_{k=p}^{n+1} x_k = \sum_{k=p}^q x_k + \sum_{k=q+1}^{n+1} x_k$ . Autrement dit,  $\mathcal{P}(n+1)$  est vraie.

D'après le principe de récurrence, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\mathcal{P}(n)$  est vraie. ■

---

*Démonstration 3.3 (2)*

On pose  $\mathcal{P}(n)$  la proposition «  $\forall \varphi \in \mathfrak{S}_n, \sum_{k=1}^n x_k = \sum_{k=1}^n x_{\varphi(k)}$  ».

$\mathcal{P}(1)$  est vraie car le seul élément de  $\mathfrak{S}_1$  est l'application  $1 \mapsto 1$ .

Si  $\mathcal{P}(n)$  est vraie, alors soient  $(x_1, \dots, x_{n+1}) \in E^{n+1}$  et  $\varphi \in \mathfrak{S}_{n+1}$  :

- ▷ si  $\varphi(n+1) = n+1$  alors  $\varphi$  induit une bijection de  $\llbracket 1 ; n \rrbracket$  dans lui-même donc d'après l'hypothèse de récurrence,  $\sum_{k=1}^n x_k = \sum_{k=1}^n x_{\varphi(k)}$  donc  $\sum_{k=1}^{n+1} x_{\varphi(k)} = \sum_{k=1}^n x_{\varphi(k)} + x_{\varphi(n+1)} = \sum_{k=1}^n x_k + x_{n+1} = \sum_{k=1}^{n+1} x_k$  ;
- ▷ si  $\varphi(n+1) = m \neq n+1$ , alors on pose  $\psi = (m \ n+1)\varphi$  et  $a = \varphi^{-1}(n+1)$ . On a alors  $\psi(n+1) = n+1$ ,  $\psi(a) = m$  et pour tout  $k \in \llbracket 1 ; n+1 \rrbracket \setminus \{a, n+1\}$ ,  $\psi(k) = \varphi(k)$ . D'après le cas précédent,  $\sum_{k=1}^{n+1} x_k = \sum_{k=1}^{n+1} x_{\psi(k)}$ , donc en utilisant le résultat précédent :

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} x_k &= \sum_{k=1}^{a-1} x_{\psi(k)} + x_{\psi(a)} + \sum_{k=a+1}^n x_{\psi(k)} + x_{\psi(n+1)} \\ &= \sum_{k=1}^{a-1} x_{\varphi(k)} + x_m + \sum_{k=a+1}^n x_{\varphi(k)} + x_{n+1} \\ &= \sum_{k=1}^{a-1} x_{\varphi(k)} + x_{\varphi(n+1)} + \sum_{k=a+1}^n x_{\varphi(k)} + x_{\varphi(a)} \\ &= \sum_{k=1}^{n+1} x_{\varphi(k)}. \end{aligned}$$

Dans les deux cas, on a montré  $\sum_{k=1}^{n+1} x_{\varphi(k)} = \sum_{k=1}^{n+1} x_k$ . Autrement dit,  $\mathcal{P}(n+1)$  est vraie.

D'après le principe de récurrence, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\mathcal{P}(n)$  est vraie. ■

---

**Proposition 3.4**

Soient  $I$  un ensemble fini et non-vide d'indices,  $n$  son cardinal et  $f, g$  deux bijections de  $\llbracket 1 ; n \rrbracket$  dans  $I$  (des énumérations de  $I$ ).

Alors pour tout  $(x_i)_{i \in I} \in E^I$ ,  $\sum_{k=1}^n x_{f(k)} = \sum_{k=1}^n x_{g(k)}$ .

---

*Démonstration 3.5*

On remarque que  $g^{-1} \circ f$  est une bijection de  $\llbracket 1 ; n \rrbracket$  dans lui-même donc d'après la Proposition 3.1 :

$$\sum_{k=1}^n x_{g(k)} = \sum_{k=1}^n x_{g(g^{-1} \circ f(k))} = \sum_{k=1}^n x_{f(k)}.$$
■

Autrement dit, quel que soit l'ordre dans lequel on numérote les éléments de la famille  $(x_i)_{i \in I}$ , on obtient toujours la même somme en les additionnant.

---

### Définition 3.6

Si  $I$  est un ensemble fini d'indices et  $(x_i)_{i \in I}$  une famille d'éléments de  $E$ , alors on pose  $\sum_{i \in I} x_i$  la valeur d'une somme  $\sum_{k=1}^n x_{f(k)}$ , où  $f$  est une bijection de  $\llbracket 1 ; n \rrbracket$  dans  $I$  quelconque.

Cette définition est cohérente, puisque la valeur de la somme  $\sum_{k=1}^n x_{f(k)}$  ne dépend pas du choix de  $f$  d'après la proposition précédente. Autrement dit, il est inutile de connaître l'énumération choisie pour additionner les éléments de la famille, on peut considérer cette somme comme une somme « en vrac » de tous les éléments.

### 3.1.2 Propriétés

---

#### Proposition 3.7

Soient  $I$  un ensemble fini d'indices de cardinal  $n$  et  $(x_i)_{i \in I}$  une famille d'éléments de  $E$ .

Alors :

- (1) pour toute bijection  $f$  d'un ensemble  $J$  dans  $I$ ,  $\sum_{i \in I} x_i = \sum_{j \in J} x_{f(j)}$  (changement d'indice dans une somme) ;
- (2) pour toute bijection  $f$  de  $I$  dans lui-même,  $\sum_{i \in I} x_i = \sum_{i \in I} x_{f(i)}$  (propriété de commutativité) ;
- (3) pour tout couple  $(J, J')$  de parties de  $I$  disjointes et de réunion  $I$ ,  $\sum_{i \in I} x_i = \sum_{i \in J} x_i + \sum_{i \in J'} x_i$  (propriété d'associativité) ;
- (4) plus généralement, pour toute partition  $(I_k)_{k \in K}$  de l'ensemble  $I$ ,  $\sum_{i \in I} x_i = \sum_{k \in K} \sum_{i \in I_k} x_i$ .

---

#### Démonstration 3.8 (1)

Soit  $f$  une bijection de  $J$  dans  $I$ . On choisit une énumération  $\psi$  de  $J$ . Alors  $f \circ \psi$  est une énumération de  $I$ .

Alors, par définition,  $\sum_{i \in I} x_i = \sum_{k=1}^n x_{f \circ \psi(k)}$  et  $\sum_{j \in J} x_{f(j)} = \sum_{k=1}^n x_{f \circ \psi(k)}$  donc  $\sum_{i \in I} x_i = \sum_{j \in J} x_{f(j)}$ . ■

*Démonstration 3.9 (2)*

Cas particulier  $I = J$  du point précédent. ■

*Démonstration 3.10 (3)*

Soit  $(J, J')$  un couple de parties de  $I$  disjointes et de réunion  $I$ . On note  $q$  le cardinal de  $J$ , de sorte que  $n - q$  est le cardinal de  $J'$ .

On choisit une énumération  $\varphi$  de  $J$  et une énumération  $\psi$  de  $J'$ . Alors l'application

$$\begin{aligned} \theta : \llbracket 1 ; n \rrbracket &\longrightarrow I \\ k &\longmapsto \begin{cases} \varphi(k) & \text{si } k \leq q \\ \psi(k - q) & \text{sinon} \end{cases} \end{aligned}$$

est une énumération de  $I$ .

Donc

$$\begin{aligned} \sum_{i \in I} x_i &= \sum_{k=1}^n x_{\theta(k)} \\ &= \sum_{k=1}^q x_{\theta(k)} + \sum_{k=q+1}^n x_{\theta(k)} \\ &= \sum_{k=1}^q x_{\varphi(k)} + \sum_{k=q+1}^n x_{\psi(k-q)} \\ &= \sum_{k=1}^q x_{\varphi(k)} + \sum_{k=1}^{n-q} x_{\psi(k)} \\ &= \sum_{i \in J} x_i + \sum_{i \in J'} x_i. \end{aligned} \quad \blacksquare$$

*Démonstration 3.11 (4)*

Si  $(I_k)_{k \in K}$  est une partition de l'ensemble  $I$ , l'ensemble  $K$  est fini donc par récurrence sur le cardinal  $b$  de  $K$ , on montre  $\sum_{i \in I} x_i = \sum_{k \in K} \sum_{i \in I_k} x_i$  en utilisant le cas  $b = 2$  démontré précédemment (il suffit de choisir un élément  $a$  de  $K$ , poser  $J = I_a$  et  $J' = \bigsqcup_{k \in K \setminus \{a\}} I_k$  et remarquer que la famille  $(I_k)_{k \in K \setminus \{a\}}$  est une partition de l'ensemble  $J'$  et que le cardinal de  $K \setminus \{a\}$  est  $b - 1$ ). ■

## 3.2 Conventions de calcul dans $\mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$

L'ensemble  $\mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$  est muni d'une addition : pour tout  $(x, y) \in (\mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\})^2$ ,

- si  $x$  et  $y$  sont réels,  $x + y$  est la somme habituelle de deux réels positifs ;
- si  $x = +\infty$  ou  $y = +\infty$  alors on pose  $x + y = +\infty$

et d'une multiplication :

- si  $x$  et  $y$  sont réels,  $xy$  est le produit habituel de deux réels positifs ;
- si  $x = 0$  ou  $y = 0$  alors on pose  $xy = 0$  ;
- si  $x = y = +\infty$  alors on pose  $xy = +\infty$ .

Il est aussi muni d'une relation d'ordre :

- si  $x$  et  $y$  sont deux réels, alors  $x \leq y$  ou  $x < y$  désignent les relations habituelles ;
- si  $x$  est réel et  $y = +\infty$ , alors on pose  $x \leq +\infty$  et  $x < +\infty$  ;
- si  $x = y = +\infty$  alors  $+\infty \leq +\infty$ .

### Proposition 3.12

*L'addition dans  $\mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$  est associative, commutative et admet pour neutre 0.*

*La relation  $\leq$  est une relation d'ordre total dans  $\mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$ .*

*De plus, l'addition et la multiplication sont compatibles avec la relation d'ordre : on peut additionner ou multiplier deux inégalités membre à membre.*

### Définition 3.13

Soit  $A$  une partie non-vide de  $\mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$ .

Si  $A$  ne contient pas  $+\infty$ , alors :

- si  $A$  est majorée, elle possède une borne supérieure dans  $\mathbb{R}$  ;
- sinon on pose  $\sup A = +\infty$ .

Si  $A$  contient  $+\infty$ , on pose  $\sup A = +\infty$ .

Cette définition prolonge la notion de borne supérieure à toutes les parties de  $\mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$ , au sens où pour toute partie  $A$  de  $\mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$ ,  $\sup A$  est le plus petit majorant dans  $\mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$  de la partie  $A$ .

## 3.3 Somme d'une famille de réels positifs

---

**Définition 3.14**

Soit  $(x_i)_{i \in I}$  une famille d'éléments de  $\mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$ .

On pose  $\sum_{i \in I} x_i = \sup \left\{ \sum_{i \in J} x_i \mid J \subseteq_f I \right\}$ .

---

*Remarque 3.15*

Cette définition est sensée, car l'ensemble  $\left\{ \sum_{i \in J} x_i \mid J \subseteq_f I \right\}$  est une partie de  $\mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$ , donc possède toujours une borne supérieure dans  $\mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$ .

---

**Définition 3.16**

Soit  $(x_i)_{i \in I}$  une famille d'éléments de  $\mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$ .

On dit que la famille  $(x_i)_{i \in I}$  est sommable quand  $\sum_{i \in I} x_i < +\infty$ .

Évidemment, une famille sommable positive ne peut pas prendre la valeur  $+\infty$ , autrement dit, une famille sommable est nécessairement une famille de réels positifs.

### 3.3.1 Propriétés

---

**Proposition 3.17**

La somme d'une famille  $(x_i)_{i \in I}$  d'éléments de  $\mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$  est invariante par permutation : si  $\sigma$  est une permutation de  $I$ , alors  $\sum_{i \in I} x_i = \sum_{i \in I} x_{\sigma(i)}$ .

En particulier, si  $(x_i)_{i \in I}$  est une famille sommable, toute permutation de la famille est encore une famille sommable de même somme.

En particulier, dans le cas où  $I = \mathbb{N}$ , si une série à termes positifs  $\sum u_n$  est convergente, alors on dit qu'elle est commutativement convergente : changer l'ordre des termes change bien sûr les valeurs des sommes partielles mais ne change pas la valeur de la limite de ces sommes partielles.

---

**Proposition 3.18**

Soient  $(x_i)_{i \in I}, (y_i)_{i \in I}$  deux familles d'éléments de  $\mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$  et  $\lambda$  un réel positif.

Alors  $\sum_{i \in I} (x_i + y_i) = \sum_{i \in I} x_i + \sum_{i \in I} y_i$  et  $\sum_{i \in I} \lambda x_i = \lambda \sum_{i \in I} x_i$ .

---

**Corollaire 3.19**

*La somme de deux familles positives est sommable ssi les deux familles sont sommables.*

*Le produit par un réel strictement positif d'une famille positive est sommable ssi la famille est sommable.*

---

**Proposition 3.20**

*Soient  $(x_i)_{i \in I}$ ,  $(y_i)_{i \in I}$  deux familles d'éléments de  $\mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$ .*

*Si pour tout  $i \in I$ ,  $0 \leq x_i \leq y_i$  et si la famille  $(y_i)_{i \in I}$  est sommable, alors la famille  $(x_i)_{i \in I}$  l'est aussi et  $\sum_{i \in I} x_i \leq \sum_{i \in I} y_i$ .*

### 3.3.2 Théorème de sommation par paquets

---

**Théorème 3.21**

*Soit  $(x_i)_{i \in I}$  une famille de réels positifs.*

*Si  $I$  est partitionné en une famille  $(I_p)_{p \in P}$  de parties, alors*

$$\sum_{p \in P} \sum_{i \in I_p} x_i = \sum_{i \in I} x_i.$$

### 3.3.3 Théorème de Fubini

---

**Théorème 3.22**

*Soit  $(x_{ij})_{(i,j) \in I \times J}$  une famille de réels positifs. Alors*

$$\sum_{(i,j) \in I \times J} x_{ij} = \sum_{j \in J} \sum_{i \in I} x_{ij} = \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} x_{ij}.$$

Ce résultat se généralise par récurrence dans le cas d'un produit cartésien  $I_1 \times \cdots \times I_k$ .

Un cas particulier courant.

---

**Proposition 3.23**

*Soient  $(a_i)_{i \in I}$ ,  $(b_j)_{j \in J}$  deux familles de réels positifs.*

*Alors la famille  $(a_i b_j)_{(i,j) \in I \times J}$  est sommable ssi les familles  $(a_i)_{i \in I}$  et  $(b_j)_{j \in J}$  sont sommables et dans ce cas, on a*

$$\sum_{(i,j) \in I \times J} a_i b_j = \sum_{i \in I} a_i \times \sum_{j \in J} b_j.$$

## 3.4 Familles sommables dans un espace vectoriel normé de dimension finie

### 3.4.1 Définitions

---

#### Définition 3.24

Soit  $(x_i)_{i \in I}$  une famille de vecteurs de  $E$ .

On dit que la famille  $(x_i)_{i \in I}$  est sommable quand la famille  $(\|x_i\|)_{i \in I}$  est sommable, c'est-à-dire quand  $\sum_{i \in I} \|x_i\| < +\infty$ .

Cette définition est indépendante du choix de la norme, car en dimension finie, toutes les normes sont équivalentes.

#### 3.4.1.1 Cas réel

---

#### Définition 3.25

Soit  $x$  un réel.

On appelle partie positive de  $x$  le réel  $x^+ = \max(0, x)$  et partie négative de  $x$  le réel  $x^- = -\min(x, 0)$ .

On remarque les égalités suivantes :  $|x| = x^+ + x^-$  et  $x = x^+ - x^-$ .

#### Proposition 3.26

Soit  $(x_i)_{i \in I}$  une famille sommable de nombre réels.

Alors les familles positives  $(x_i^+)_{i \in I}$  et  $(x_i^-)_{i \in I}$  sont sommables et on a bien sûr  $\sum_{i \in I} |x_i| = \sum_{i \in I} x_i^+ + \sum_{i \in I} x_i^-$ .

On pose alors  $\sum_{i \in I} x_i = \sum_{i \in I} x_i^+ - \sum_{i \in I} x_i^-$ , qui est un réel tel que  $\left| \sum_{i \in I} x_i \right| \leq \sum_{i \in I} |x_i|$ .

#### 3.4.1.2 Cas complexe

---

#### Proposition 3.27

Soit  $(a_k)_{k \in I}$  une famille sommable de nombres complexes.

Alors les deux familles réelles  $(\operatorname{Re} a_k)_{k \in I}$  et  $(\operatorname{Im} a_k)_{k \in I}$  sont sommables.

On pose alors  $\sum_{k \in I} a_k = \sum_{k \in I} \operatorname{Re} a_k + i \sum_{k \in I} \operatorname{Im} a_k$  qui est un complexe tel que  $\left| \sum_{k \in I} a_k \right| \leq \sum_{k \in I} |a_k|$ .



---

*Exemple 3.28*

- Toute famille finie est sommable et sa somme au sens des familles sommables est sa somme habituelle.
- Une suite  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est sommable ssi la série  $\sum_n a_n$  est absolument convergente.

---

**Exercice 3.29**

Soit  $\theta \in ]0 ; 2\pi[$ . Montrez que la famille  $\left( \frac{e^{i\ell\theta}}{(k+\ell)^3} \right)_{(k,\ell) \in (\mathbb{N}^*)^2}$  est sommable.

---

*Correction 3.30*

On a

$$\begin{aligned} \sum_{(k,\ell) \in (\mathbb{N}^*)^2} \left| \frac{e^{i\ell\theta}}{(k+\ell)^3} \right| &= \sum_{(k,\ell) \in (\mathbb{N}^*)^2} \frac{1}{(k+\ell)^3} \\ &= \sum_{k \in \mathbb{N}^*} \sum_{\ell \in \mathbb{N}^*} \frac{1}{(k+\ell)^3} \\ &= \sum_{k=1}^{+\infty} \sum_{\ell=1}^{+\infty} \frac{1}{(k+\ell)^3}. \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \text{Fubini positif}$$

On veut donc montrer que pour  $k \in \mathbb{N}^*$ , la série  $\sum_{\ell \geq 1} \frac{1}{(k+\ell)^3}$  converge et que la série  $\sum_{k \geq 1} \sum_{\ell=1}^{+\infty} \frac{1}{(k+\ell)^3}$  converge.

Pour  $k \geq 1$ , on a  $\frac{1}{(k+\ell)^3} \underset{\ell \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{\ell^3}$  donc par théorème de comparaison des séries à termes positifs,  $\sum_{\ell \geq 1} \frac{1}{(k+\ell)^3}$  converge.

Or  $\sum_{\ell=1}^{+\infty} \frac{1}{(k+\ell)^3} = \sum_{\ell=k+1}^{+\infty} \frac{1}{\ell^3} \underset{k \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{2k^2}$  (cf. DS1).

Donc  $\sum_{k \geq 1} \sum_{\ell=1}^{+\infty} \frac{1}{(k+\ell)^3}$  converge par théorème de comparaison des séries à termes positifs.

Finalement,  $\left( \frac{e^{i\ell\theta}}{(k+\ell)^3} \right)_{(k,\ell) \in (\mathbb{N}^*)^2}$  est sommable.

### 3.4.1.3 Cas général

Comme  $E$  est de dimension finie, on en choisit une base  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$ .

Pour toute famille sommable  $(x_i)_{i \in I} \in E^I$ , on note  $(x_{i1}, \dots, x_{ip})$  les coordonnées de  $x_i$  dans la base  $\mathcal{B}$ .

Alors pour tout  $k \in \llbracket 1 ; p \rrbracket$ , la famille de réels ou de complexes  $(x_{ik})_{i \in I}$  est sommable.

On pose alors  $\sum_{i \in I} x_i$  le vecteur qui a pour coordonnées  $\left( \sum_{i \in I} x_{i1}, \dots, \sum_{i \in I} x_{ip} \right)$  dans la base  $\mathcal{B}$ .

On note  $\ell^1(I, E)$  l'ensemble des familles sommables de  $E$  indicées par  $I$ .

## 3.4.2 Propriétés

---

### Proposition 3.31

*Toute sous-famille d'une famille sommable de  $E$  est elle-même sommable.*

*Toute permutation d'une famille sommable de  $E$  est encore sommable et de même somme.*

En particulier, les séries absolument convergentes sont commutativement convergentes.

Les familles sommables sont celles qui sont approchables par des familles finies à  $\varepsilon$  près au sens de la proposition suivante.

Comme pour les séries, on dispose d'un théorème de comparaison entre familles sommables.

---

### Proposition 3.32

*Soient  $(a_i)_{i \in I}, (b_i)_{i \in I}$  deux familles d'éléments indicées par  $I$ .*

*Si pour tout  $i \in I$ ,  $0 \leq \|a_i\| \leq b_i$  et si la famille  $(b_i)_{i \in I}$  est une famille sommable de réels positifs, alors la famille  $(a_i)_{i \in I}$  est sommable et on a  $\left\| \sum_{i \in I} a_i \right\| \leq \sum_{i \in I} \|a_i\| \leq \sum_{i \in I} b_i$ .*

La linéarité est encore vérifiée, mais n'est pas évidente au regard des définitions.

---

### Proposition 3.33

*L'ensemble  $\ell^1(I, E)$  est un espace vectoriel et l'application  $(a_i)_{i \in I} \mapsto \sum_{i \in I} a_i$  est une forme linéaire :*

*si  $(a_i), (b_i) \in \ell^1(I, E)$  et  $\lambda$  est un scalaire, alors  $\sum_{i \in I} (a_i + b_i) = \sum_{i \in I} a_i + \sum_{i \in I} b_i$  et  $\sum_{i \in I} \lambda a_i = \lambda \sum_{i \in I} a_i$ .*

### 3.4.3 Théorème de sommation par paquets

---

#### Théorème 3.34

Soit  $(a_i)_{i \in I}$  une famille sommable de  $E$ .

Si  $I$  est partitionné en une famille  $(I_p)_{p \in P}$  de parties, alors pour tout  $p \in P$ ,  $(a_i)_{i \in I_p}$  est sommable et

$$\sum_{i \in I} a_i = \sum_{p \in P} \sum_{i \in I_p} a_i.$$

---

#### Exercice 3.35

Montrez que pour tout complexe  $z$  tel que  $0 < |z| < 1$ , la famille  $(z^{|n|})_{n \in \mathbb{Z}}$  est sommable et calculez sa somme.

---

*Correction 3.36*

On a

$$\begin{aligned} \sum_{n \in \mathbb{Z}} |z^{|n|}| &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} |z|^{|n|} \\ &= \sum_{n \in \mathbb{N}} |z|^n + \sum_{n \in \mathbb{Z}_-^*} |z|^{-n} \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} |z|^n + \sum_{n=1}^{+\infty} |z|^n \quad \left. \vphantom{\sum_{n=1}^{+\infty} |z|^n} \right) |z| < 1 \text{ donc } \sum |z|^n \text{ converge} \\ &< +\infty. \end{aligned}$$

Donc  $(z^{|n|})_{n \in \mathbb{Z}}$  est sommable et on a

$$\begin{aligned} \sum_{n \in \mathbb{Z}} z^{|n|} &= \sum_{n \in \mathbb{N}} z^n + \sum_{n \in \mathbb{Z}_-^*} z^{-n} \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} z^n + \sum_{n=1}^{+\infty} z^n \\ &= \frac{1}{1-z} + \frac{z}{1-z} \\ &= \frac{1+z}{1-z}. \end{aligned}$$

---

#### Exercice 3.37

Montrez que la famille  $\left( \frac{(-1)^n}{\max(m, n)^3} \right)_{m, n \geq 1}$  est sommable et calculez sa somme en fonction de  $\zeta(2)$  et  $\zeta(3)$ .

On a 
$$\sum_{(m,n) \in (\mathbb{N}^*)^2} \left| \frac{(-1)^n}{\max(m,n)^3} \right| = \sum_{(m,n) \in (\mathbb{N}^*)^2} \frac{1}{\max(m,n)^3}.$$

On pose  $I_k = \{(m, k) \mid m \in \llbracket 1 ; k \rrbracket\} \cup \{(k, n) \mid n \in \llbracket 1 ; k \rrbracket\}$ .

On a bien  $(\mathbb{N}^*)^2 = \bigsqcup_{k \in \mathbb{N}^*} I_k$ .

On a donc

$$\begin{aligned} \sum_{(m,n) \in (\mathbb{N}^*)^2} \frac{1}{\max(m,n)^3} &= \sum_{k \in \mathbb{N}^*} \sum_{(m,n) \in I_k} \frac{1}{\max(m,n)^3} \\ &= \sum_{k \in \mathbb{N}^*} \sum_{(m,n) \in I_k} \frac{1}{k^3} \\ &= \sum_{k \in \mathbb{N}^*} \frac{2k-1}{k^3} \\ &= \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{2k-1}{k^3} \\ &< +\infty \end{aligned}$$

car  $\frac{2k-1}{k^3} \underset{k \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{2}{k^2}$  donc par théorème de comparaison des séries à termes positifs,  $\sum \frac{2k-1}{k^3}$  converge.

Donc  $\left( \frac{(-1)^n}{\max(m,n)^3} \right)_{(m,n) \in (\mathbb{N}^*)^2}$  est sommable.

Donc 
$$S = \sum_{(m,n) \in (\mathbb{N}^*)^2} \frac{(-1)^n}{\max(m,n)^3} = \sum_{k \in \mathbb{N}^*} \frac{1}{k^3} \sum_{(m,n) \in I_k} (-1)^n.$$

Or

$$\begin{aligned} \sum_{(m,n) \in I_k} (-1)^n &= k (-1)^k + \sum_{n=1}^{k-1} (-1)^n \\ &= k (-1)^k + (-1) \frac{1 - (-1)^{k-1}}{1 - (-1)} \\ &= k (-1)^k - \frac{1}{2} (1 + (-1)^k). \end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned}
 S &= \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{k(-1)^k - \frac{1}{2}(1 + (-1)^k)}{k^3} \\
 &= \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k^2} - \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ pair}}}^{+\infty} \frac{1}{k^3} \\
 &= \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k^2} - \underbrace{\sum_{\ell=1}^{+\infty} \frac{1}{(2\ell)^3}}_{=\frac{1}{8}\zeta(3)}.
 \end{aligned}$$

Or

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k^2} &= \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^k + 1 - 1}{k^2} \\
 &= \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^k + 1}{k^2} - \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} \\
 &= \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ pair}}} \frac{2}{k^2} - \zeta(2) \\
 &= \sum_{\ell=1}^{+\infty} \frac{2}{(2\ell)^2} - \zeta(2) \\
 &= \frac{-1}{2} \zeta(2).
 \end{aligned}$$

D'où  $S = -\frac{1}{8}\zeta(3) - \frac{1}{2}\zeta(2)$ .

### 3.4.4 Théorème de Fubini

#### Théorème 3.39

Soit  $(a_{ij})_{(i,j) \in I \times J}$  une famille sommable de  $E$ .

Alors pour tout  $i \in I$ , la famille  $(a_{ij})_{j \in J}$  est sommable; pour tout  $j \in J$ , la famille  $(a_{ij})_{i \in I}$  est sommable et

$$\sum_{(i,j) \in I \times J} a_{ij} = \sum_{j \in J} \sum_{i \in I} a_{ij} = \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} a_{ij}.$$

Ce résultat se généralise par récurrence dans le cas d'un produit cartésien  $I_1 \times \cdots \times I_k$ .

---

**Exercice 3.40**

Montrez que la famille  $\left(\frac{(-1)^p}{q^p}\right)_{p,q \geq 2}$  est sommable et calculez sa somme.

---

*Correction 3.41*

On a

$$\begin{aligned}\sum_{p,q \geq 2} \left| \frac{(-1)^p}{q^p} \right| &= \sum_{p,q \geq 2} \frac{1}{q^p} \\ &= \sum_{q \geq 2} \sum_{p \geq 2} \frac{1}{q^p} \\ &= \sum_{q \geq 2} \frac{1/q^2}{1 - 1/q} \\ &= \sum_{q \geq 2} \frac{1}{q^2 - q} \\ &= \sum_{q \geq 2} \frac{1}{q(q-1)} \\ &= \sum_{q \geq 2} \left( \frac{1}{q-1} - \frac{1}{q} \right).\end{aligned}$$

Donc  $\left(\frac{(-1)^p}{q^p}\right)_{p,q \geq 2}$  est sommable.

De plus, on a

$$\begin{aligned}\sum_{p,q \geq 2} \frac{(-1)^p}{q^p} &= \sum_{p,q \geq 2} \left( \frac{-1}{q} \right)^p \\ &= \sum_{q=2}^{+\infty} \sum_{p=2}^{+\infty} \left( \frac{-1}{q} \right)^p \\ &= \sum_{q=2}^{+\infty} \frac{1/q^2}{1 + 1/q} \\ &= \sum_{q=2}^{+\infty} \frac{1}{q(q+1)} \\ &= \sum_{q=2}^{+\infty} \left( \frac{1}{q} - \frac{1}{q+1} \right) \\ &= \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

Un cas particulier courant.

---

**Proposition 3.42**

Soient  $(a_i) \in \ell^1(I, E)$  et  $(b_j) \in \ell^1(J, E)$ .

Alors la famille  $(a_i b_j)_{(i,j) \in I \times J}$  est sommable et

$$\sum_{(i,j) \in I \times J} a_i b_j = \sum_{i \in I} a_i \times \sum_{j \in J} b_j.$$

### 3.4.5 Produit de Cauchy de deux séries

---

**Définition 3.43**

Soient  $\sum_{n \geq 0} a_n$  et  $\sum_{n \geq 0} b_n$  deux séries à termes dans  $E$ .

On appelle produit de Cauchy des deux séries la série  $\sum_{n \geq 0} c_n$  où pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$ .

---

*Remarque 3.44*

Quand les séries ne commencent pas à partir du rang 0, il faut se méfier ! Une idée simple est de se ramener au cas précédent en décalant les indices.

Exemple très courant : les séries commençant au rang 1. Dans ce cas, le produit de Cauchy des séries

$\sum_{n \geq 1} a_n$  et  $\sum_{n \geq 1} b_n$  est la série  $\sum_{n \geq 1} c_n$  où pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $c_n = \sum_{k=1}^n a_k b_{n-k+1}$ .

---

**Théorème 3.45**

Si les séries  $\sum_{n \geq 0} a_n$  et  $\sum_{n \geq 0} b_n$  sont absolument convergentes, alors leur produit de Cauchy est aussi absolument convergent et

$$\sum_{n=0}^{+\infty} c_n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \times \sum_{n=0}^{+\infty} b_n.$$

Un exemple fondamental.

---

**Proposition 3.46**

Soit  $z \in \mathbb{C}$ . La série de terme général  $\frac{z^n}{n!}$  est absolument convergente et

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!} = e^z.$$

---

*Remarque 3.47*

L'absolue convergence des séries est indispensable ! Si on ne suppose que la convergence des séries, alors le produit de Cauchy peut très bien être une série divergente (voir exercice suivant).

---

**Exercice 3.48**

Soit  $x > 0$ . On pose  $b_n$  la somme partielle de la série  $\sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{n!}$  et  $c_n = \frac{b_n}{x^n}$ .

Donnez une CNS sur  $x$  pour que la série  $\sum_{n \geq 0} c_n$  converge. Dans le cas où elle converge, donnez la valeur de sa somme en fonction de  $x$ .

---

**Exercice 3.49**

Pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , on pose  $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ .

Montrez que la série  $\sum_{n \geq 1} a_n$  converge, mais que son produit de Cauchy avec elle-même diverge

(indication : pour tout  $b > 0$ , pour tout  $x \in [0 ; b]$ ,  $x(b-x) \leq \frac{b^2}{4}$ ).



# Chapitre 4

## Rappels et compléments d'algèbre linéaire

### Sommaire

---

<b>4.1</b>	<b>Sommes de sous-espaces vectoriels . . . . .</b>	<b>127</b>
4.1.1	Généralités . . . . .	127
4.1.2	Sommes directes . . . . .	127
4.1.3	Sous-espaces supplémentaires . . . . .	129
4.1.4	Cas particulier de deux sous-espaces . . . . .	133
4.1.5	Applications linéaires et sommes directes . . . . .	133
<b>4.2</b>	<b>Somme de sous-espaces vectoriels en dimension finie . . . . .</b>	<b>134</b>
4.2.1	Base adaptée à un sous-espace . . . . .	134
4.2.2	Sommes directes et bases . . . . .	135
4.2.3	Dimension d'une somme de sous-espaces vectoriels . . . . .	135
4.2.4	Sous-espaces supplémentaires . . . . .	137
4.2.5	Dimension d'une somme de deux sous-espaces vectoriels . . . . .	139
<b>4.3</b>	<b>Polynômes d'endomorphismes et de matrices . . . . .</b>	<b>139</b>
4.3.1	$\mathbb{K}$ -algèbres . . . . .	139
4.3.1.1	Définition . . . . .	139
4.3.1.2	Polynômes d'éléments dans une $\mathbb{K}$ -algèbre . . . . .	140
4.3.2	Cas particulier des algèbres $\mathcal{L}(E)$ ou $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ . . . . .	141
4.3.3	Polynôme annulateur d'une matrice ou d'un endomorphisme . . . . .	141
4.3.4	Utilisation pratique d'un polynôme annulateur . . . . .	144
4.3.4.1	Calcul de l'inverse . . . . .	144
4.3.4.2	Calcul de puissances . . . . .	147
<b>4.4</b>	<b>Matrices semblables, trace . . . . .</b>	<b>151</b>
4.4.1	Trace d'une matrice . . . . .	151
4.4.2	Matrices semblables . . . . .	151
4.4.3	Trace d'un endomorphisme . . . . .	152
<b>4.5</b>	<b>Opérations par blocs . . . . .</b>	<b>153</b>
4.5.1	Cas général . . . . .	153
4.5.2	Cas particuliers des matrices carrées . . . . .	154
4.5.3	Interprétation des blocs . . . . .	154

---

Dans tout ce chapitre,  $\mathbb{K}$  désigne un sous-corps de  $\mathbb{C}$ , en général  $\mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ .

## 4.1 Sommes de sous-espaces vectoriels

### 4.1.1 Généralités

---

**Définition 4.1**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $F_1, \dots, F_n$  des sous-espaces vectoriels de  $E$ .

On appelle somme de  $F_1, \dots, F_n$  l'ensemble noté  $F_1 + \dots + F_n$  :

$$F_1 + \dots + F_n = \left\{ \sum_{i=1}^n x_i \mid (x_1, \dots, x_n) \in F_1 \times \dots \times F_n \right\}.$$

---

**Proposition 4.2**

Soit  $(u_1, \dots, u_p, u_{p+1}, \dots, u_n) \in E^n$ .

Alors  $\text{Vect}(u_1, \dots, u_p, u_{p+1}, \dots, u_n) = \text{Vect}(u_1, \dots, u_p) + \text{Vect}(u_{p+1}, \dots, u_n)$ .

---

**Proposition 4.3**

Avec les mêmes notations :  $F_1 + \dots + F_n$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ .

De plus, c'est le plus petit sous-espace vectoriel qui contient  $F_1, \dots, F_n$ .

Si on connaît des familles génératrices de chacun des sous-espaces vectoriels  $F_1, \dots, F_n$ , alors en concaténant ces familles, on obtient une famille génératrice de  $F_1 + \dots + F_n$ .

Conséquence : en fractionnant une famille génératrice de  $E$  en sous-familles, on décompose l'espace  $E$  en une somme de sous-espaces vectoriels.

### 4.1.2 Sommes directes

---

**Définition 4.4**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $F_1, \dots, F_n$  des sous-espaces vectoriels de  $E$ .

On dit que la somme  $F_1 + \dots + F_n$  est directe quand tout vecteur de  $F_1 + \dots + F_n$  a une unique écriture  $\sum_{i=1}^n x_i$  où  $(x_1, \dots, x_n) \in F_1 \times \dots \times F_n$ .

On dit aussi que les sous-espaces sont en somme directe. Dans ce cas, quand on veut insister sur cette propriété, on note la somme sous la forme  $F_1 \oplus \dots \oplus F_n = \bigoplus_{i=1}^n F_i$ .

---

**Proposition 4.5**

Avec les mêmes hypothèses.

La somme  $F_1 + \cdots + F_n$  est directe ssi le vecteur nul a une unique décomposition  $\sum_{i=1}^n x_i$  où  $(x_1, \dots, x_n) \in F_1 \times \cdots \times F_n$ , qui est la décomposition triviale.

Autrement dit, la somme  $F_1 + \cdots + F_n$  est directe ssi la seule solution de l'équation  $\sum_{i=1}^n x_i = 0$  d'inconnue  $(x_1, \dots, x_n) \in F_1 \times \cdots \times F_n$  est le  $n$ -uplet nul.

---

**Démonstration 4.6**

$\Rightarrow$

Immédiat : le vecteur nul appartient à  $F_1 + \cdots + F_n$  et a une unique écriture sous la forme  $\sum_{i=1}^n x_i$  où  $(x_1, \dots, x_n) \in F_1 \times \cdots \times F_n$ .

Or on en connaît une :  $0 = 0 + \cdots + 0$ .

Donc la seule solution à l'équation  $\sum_{i=1}^n x_i = 0$  d'inconnue  $(x_1, \dots, x_n) \in F_1 \times \cdots \times F_n$  est la solution triviale  $(0, \dots, 0)$ .

$\Leftarrow$

Soit  $z \in F_1 + \cdots + F_n$ .

On veut montrer que  $z$  a une unique écriture  $z = \sum_{i=1}^n x_i$  où  $(x_1, \dots, x_n) \in F_1 \times \cdots \times F_n$ .

Si  $z = \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n x'_i$  où  $(x_1, \dots, x_n), (x'_1, \dots, x'_n) \in F_1 \times \cdots \times F_n$ , alors  $\sum_{i=1}^n (x_i - x'_i) = 0$ .

Or pour tout  $i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$ ,  $x_i - x'_i \in F_i$  car  $F_i$  est un sous-espace vectoriel.

Ainsi, pour tout  $i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$ ,  $x_i - x'_i = 0$  i.e.  $(x_1, \dots, x_n) = (x'_1, \dots, x'_n)$ .

D'où l'unicité voulue. ■

Un exemple fondamental : si  $(v_1, \dots, v_n)$  est une famille libre, alors les droites vectorielles  $\text{Vect}(v_i)$  sont en somme directe.

---

**Proposition 4.7**

Avec les mêmes hypothèses.

Si la somme  $F_1 + \cdots + F_n$  est directe, alors en concaténant des familles libres de chacun des sous-espaces vectoriels, on obtient une famille libre.

---

#### Démonstration 4.8

Si  $F_1 + \dots + F_n$  est une somme directe alors soient  $L_1, \dots, L_n$  des familles libres de  $F_1, \dots, F_n$  respectivement.

On note  $L_i = (e_{i1}, \dots, e_{i\ell_i})$  où  $i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$ .

Soit  $(\lambda_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq \ell_i}}$  une famille de scalaires telle que  $\sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq \ell_i}} \lambda_{ij} e_{ij} = 0$ .

Alors  $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{\ell_i} \lambda_{ij} e_{ij} = 0$ .

Or  $F_1 + \dots + F_n$  est directe donc pour tout  $i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$ ,  $\sum_{j=1}^{\ell_i} \lambda_{ij} e_{ij} = 0$ .

Or  $L_i$  est libre donc  $\lambda_{i1} = \dots = \lambda_{i\ell_i} = 0$ .

Donc la concaténation de  $L_1, \dots, L_n$  est libre. ■

### 4.1.3 Sous-espaces supplémentaires

---

#### Définition 4.9

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $F_1, \dots, F_n$  des sous-espaces vectoriels de  $E$ .

On dit que les sous-espaces  $F_1, \dots, F_n$  sont supplémentaires (dans  $E$ ) quand  $E = \bigoplus_{i=1}^n F_i$ .

On déduit des deux parties précédentes le résultat de la décomposition d'un vecteur.

---

#### Proposition 4.10

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $F_1, \dots, F_n$  des sous-espaces vectoriels de  $E$ .

Il y a équivalence entre :

- ▷ les sous-espaces  $F_1, \dots, F_n$  sont supplémentaires
- ▷ tout vecteur de  $E$  peut s'écrire de façon unique comme somme de vecteurs des sous-espaces vectoriels  $F_1, \dots, F_n$  :

$$\forall v \in E, \exists! (v_1, \dots, v_n) \in F_1 \times \dots \times F_n, \quad v = \sum_{i=1}^n v_i.$$

Dans ce cas, soit  $v$  un vecteur de  $E$ . Il existe un unique  $n$ -uplet  $(v_1, \dots, v_n) \in F_1 \times \dots \times F_n$  tel que  $v = \sum_{i=1}^n v_i$ .

Pour tout  $j \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$ , on définit  $p_j : E \longrightarrow E$  en posant  $p_j(v) = v_j$ .

Alors les applications  $p_j$  sont des projecteurs qui vérifient les propriétés :

$$\triangleright \sum_{i=1}^n p_i = \text{id}_E$$

$\triangleright$  pour tout  $(i, j) \in \llbracket 1 ; n \rrbracket^2$ ,  $p_i \circ p_j = \delta_{ij} p_i$  où  $\delta_{xy}$  est le symbole de Kronecker.

La réciproque est vraie : si  $(p_1, \dots, p_n)$  sont  $n$  projecteurs vérifiant les deux propriétés précédentes, alors les sous-espaces  $(\text{Im } p_i)_{1 \leq i \leq n}$  sont supplémentaires.

*Démonstration 4.11*

Soient  $F_1, \dots, F_n$  supplémentaires dans  $E$ .

$\triangleright$  Pour tout  $j \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$ ,  $p_j$  est un projecteur :

Soit  $v \in E$ . On écrit  $v = v_1 + \dots + v_j + \dots + v_n$ .

Par définition, on a  $p_j(v) = v_j = 0 + \dots + 0 + v_j + 0 + \dots + 0$ .

Donc, par définition, on a  $p_j(p_j(v)) = p_j(v_j) = v_j$ .

Donc  $p_j^2 = p_j$ .

Donc  $p$  est un projecteur (la linéarité est évidente).

$\triangleright$  Pour tout  $v \in E$ ,  $v = v_1 + \dots + v_n = p_1(v) + \dots + p_n(v)$  donc  $\sum_{i=1}^n p_i = \text{id}_E$ .

$\triangleright$  Montrons que pour tout  $(i, j) \in \llbracket 1 ; n \rrbracket^2$ ,  $p_i p_j = \delta_{ij} p_i$ .

Si  $i = j$ , c'est vrai car  $p_i$  est un projecteur.

Si  $i \neq j$ , soit  $v \in E$ . On écrit  $v = v_1 + \dots + v_n$ .

Par définition,  $p_j(v) = v_j = 0 + \dots + 0 + v_j + 0 + \dots + 0$ .

D'où  $p_i p_j(v) = 0$ .

Réciproquement, montrons que si  $p_1, \dots, p_n$  sont des projecteurs tels que  $\sum_{i=1}^n p_i = \text{id}_E$  et  $\forall (i, j) \in \llbracket 1 ; n \rrbracket^2$ ,  $p_i p_j = \delta_{ij} p_i$ , alors  $E = \bigoplus_{i=1}^n \text{Im } p_i$ .

$\triangleright$  Montrons que  $\text{Im } p_1 + \dots + \text{Im } p_n$  est directe.

Soit  $(v_1, \dots, v_n) \in \text{Im } p_1 \times \dots \times \text{Im } p_n$  telle que  $v_1 + \dots + v_n = 0$ .

Pour  $i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$ , on a

$$\begin{aligned} p_i(0) &= 0 = p_i(v_1) + \dots + p_i(v_n) \\ &= p_i p_1(v_1) + \dots + p_i p_i(v_i) + \dots + p_i p_n(v_n) \\ &= v_i. \end{aligned}$$

Donc  $v_1 = \dots = v_n = 0$ .

Donc la somme est directe.

► On a  $\sum_{i=1}^n p_i = \text{id}_E$  donc pour tout  $v \in E$ ,  $v = \sum_{i=1}^n p_i(v)$ .

Donc  $v \in \text{Im } p_1 + \dots + \text{Im } p_n$ .

Finalement,  $E = \bigoplus_{i=1}^n \text{Im } p_i$ . ■

### Exercice 4.12

Soit  $E = \mathcal{F}(\mathbb{C}, \mathbb{C})$ . Pour  $k \in \{0, 1, 2\}$ , on pose  $E_k = \{f \in E \mid \forall x \in \mathbb{C}, f(jx) = j^k f(x)\}$ .

Montrez que  $E_0, E_1, E_2$  sont trois sous-espaces vectoriels de  $E$  supplémentaires.

### Correction 4.13

► Soit  $k \in \{0, 1, 2\}$ .  $E_k$  contient l'application nulle.

Soient  $(f, g) \in E_k^2$ ,  $\lambda \in \mathbb{C}$  et  $x \in \mathbb{C}$ .

On a

$$\begin{aligned} (\lambda f + g)(jx) &= \lambda f(jx) + g(jx) \\ &= \lambda j^k f(x) + j^k g(x) \\ &= j^k (\lambda f(x) + g(x)) \\ &= j^k (\lambda f + g)(x). \end{aligned}$$

Donc  $\lambda f + g \in E_k$  i.e.  $E_k$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ .

► Montrons que  $\forall f \in E, \exists! (f_0, f_1, f_2) \in E_0 \times E_1 \times E_2, f = f_0 + f_1 + f_2$ .

analyse

Soient  $f \in E$  et  $(f_0, f_1, f_2) \in E_0 \times E_1 \times E_2$  telles que  $f = f_0 + f_1 + f_2$ .

Pour tout  $x \in \mathbb{C}$ , on a

$$f(jx) = f_0(jx) + f_1(jx) + f_2(jx) = f_0(x) + j f_1(x) + j^2 f_2(x)$$

et

$$f(j^2x) = f_0(x) + j^2 f_1(x) + j f_2(x).$$

D'où

$$\begin{cases} f_0(x) + f_1(x) + f_2(x) = f(x) \\ f_0(x) + j f_1(x) + j^2 f_2(x) = f(jx) \\ f_0(x) + j^2 f_1(x) + j f_2(x) = f(j^2x) \end{cases}$$

Or  $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & j & j^2 \\ 1 & j^2 & j^4 \end{vmatrix}$  est un déterminant de Vandermonde et est donc non-nul.

En faisant  $L_1 + L_2 + L_3$ , on obtient

$$f_0(x) = \frac{1}{3} (f(x) + f(jx) + f(j^2x)).$$

En faisant  $L_1 + j^2 L_2 + j L_3$ , on obtient

$$f_1(x) = \frac{1}{3} (f(x) + j^2 f(jx) + j f(j^2x)).$$

En faisant  $L_1 + j L_2 + j^2 L_3$ , on obtient

$$f_2(x) = \frac{1}{3} (f(x) + j f(jx) + j^2 f(j^2x)).$$

Ceci prouve l'unicité de la décomposition (si elle existe).

synthèse

On pose  $f_k : x \mapsto \frac{1}{3} (f(x) + j^{2k} f(jx) + j^k f(j^2x))$  pour  $k \in \{0, 1, 2\}$ .

On a  $\forall x \in \mathbb{C}, f(x) = f_0(x) + f_1(x) + f_2(x)$  i.e.  $f = f_0 + f_1 + f_2$ .

De plus, on a  $f_0(jx) = \frac{1}{3} (f(jx) + f(j^2x) + f(j^3x)) = f_0(x)$  car  $j^3 = 1$  donc  $f_0 \in E_0$ .

On montre de même que  $f_1 \in E_1$  et  $f_2 \in E_2$ .

conclusion On a bien  $E = \bigoplus_{k=0}^2 E_k$ .

---

### Proposition 4.14

Avec les mêmes hypothèses.

Si les sous-espaces  $F_1, \dots, F_n$  sont supplémentaires, alors en concaténant des bases de chacun des sous-espaces vectoriels, on obtient une base de  $E$ .

#### 4.1.4 Cas particulier de deux sous-espaces

---

##### Proposition 4.15

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $F, G$  deux sous-espaces vectoriels de  $E$ .

La somme  $F + G$  est directe ssi  $F \cap G = \{0\}$ .

Attention ! Il ne faut pas généraliser à trois ou plus sous-espaces. Même si  $F_1 \cap F_2 \cap F_3$  est le sous-espace nul, on ne peut pas conclure que la somme  $F_1 + F_2 + F_3$  est directe.

#### 4.1.5 Applications linéaires et sommes directes

---

##### Proposition 4.16

Soient  $E, F$  deux  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels,  $E_1, \dots, E_n$  des sous-espaces vectoriels supplémentaires dans  $E$  et  $f_1, \dots, f_n$  des applications linéaires de  $E_1, \dots, E_n$  dans  $F$  respectivement.

Alors il existe une unique application linéaire  $f$  de  $E$  dans  $F$  telle que pour tout  $i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$ ,  $f|_{E_i} = f_i$ .

Autrement dit, pour définir une application linéaire sur une somme directe de sous-espaces vectoriels, il suffit de la définir sur chacun des sous-espaces vectoriels.

---

Démonstration 4.17

analyse

On suppose que  $f$  existe telle que  $\forall i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$ ,  $f|_{E_i} = f_i$ .

Soit  $x \in E$ .

Comme  $E = \bigoplus_{i=1}^n E_i$ , il existe un unique  $n$ -uplet  $(x_1, \dots, x_n) \in E_1 \times \dots \times E_n$  tel que  $x = \sum_{i=1}^n x_i$ .

$f$  étant linéaire, on a  $f(x) = \sum_{i=1}^n f(x_i)$ .

Or pour tout  $i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$ ,  $x_i \in E_i$  et  $f|_{E_i} = f_i$  donc  $f(x_i) = f_i(x_i)$ .

Donc  $f(x) = \sum_{i=1}^n f_i(x_i)$ .

L'analyse prouve l'unicité de  $f$  (si elle existe).

synthèse

Pour  $x \in E$  qu'on écrit  $\sum_{i=1}^n x_i$  où  $(x_1, \dots, x_n) \in E_1 \times \dots \times E_n$ , on pose  $f(x) = \sum_{i=1}^n f_i(x_i)$ .



► Montrons que pour tout  $i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$ ,  $f|_{E_i} = f_i$ .

Pour  $i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$ , pour  $x \in E_i$ , on a  $x = 0 + \cdots + 0 + x + 0 + \cdots + 0$ .

Donc  $f(x) = f_1(0) + \cdots + f_{i-1}(0) + f_i(x) + f_{i+1}(0) + \cdots + f_n(0) = f_i(x)$ .

Donc  $f|_{E_i} = f_i$ .

► Montrons que  $f$  est linéaire.

Soient  $(x, y) \in E^2$  et  $\lambda \in \mathbb{K}$ .

On écrit  $x = \sum_{i=1}^n x_i$  et  $y = \sum_{i=1}^n y_i$  où  $(x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n) \in E_1 \times \cdots \times E_n$ .

Alors

$$\begin{aligned} f(\lambda x + y) &= \sum_{i=1}^n f_i(\lambda x_i + y_i) \\ &= \sum_{i=1}^n (\lambda f_i(x_i) + f_i(y_i)) \\ &= \lambda \sum_{i=1}^n f_i(x_i) + \sum_{i=1}^n f_i(y_i) \\ &= \lambda f(x) + f(y). \end{aligned}$$

■

---

### Exercice 4.18

Soient  $E_1, \dots, E_n$  des sous-espaces vectoriels supplémentaires. Quelles sont les applications qui induisent l'application identité sur un des  $E_i$  et l'application nulle sur les autres  $E_j$  ?

---

*Correction 4.19*

On pose  $f = \text{id}_{E_i}$  sur  $E_i$  et  $f = 0$  sur  $E_j$  pour  $j \neq i$ .

$f$  est le projecteur sur  $E_i$  parallèlement à  $\bigoplus_{j \neq i} E_j$ .

## 4.2 Somme de sous-espaces vectoriels en dimension finie

### 4.2.1 Base adaptée à un sous-espace

---

**Définition 4.20**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension  $n$  et  $F$  un sous-espace vectoriel de  $E$  de dimension  $p$ .

On appelle base de  $E$  adaptée à  $F$  toute base de  $E$  qui contient une base de  $F$ . Quitte à changer l'ordre des vecteurs, on peut supposer dans une base adaptée à  $F$  que les  $p$  premiers vecteurs de la base forment une base de  $F$ .

---

**Définition 4.21**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension  $n$  et  $(F_1, \dots, F_p)$  une famille de sous-espaces vectoriels supplémentaires dans  $E$ .

On appelle base adaptée à la somme  $E = \bigoplus_{i=1}^p F_i$  la concaténation de bases de chacun des sous-espaces  $F_1, \dots, F_p$  (dans cet ordre).

Si  $\mathcal{B}$  est une base de  $E$ , alors en fractionnant la base en sous-familles, les sous-espaces vectoriels engendrés par chacune de ces sous-familles sont supplémentaires et la base est alors adaptée à la somme des sous-espaces.

## 4.2.2 Sommes directes et bases

On donne un moyen simple de vérifier qu'une somme est directe, voire plus.

---

**Proposition 4.22**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension  $n$  et  $(F_1, \dots, F_p)$  une famille de sous-espaces vectoriels de  $E$ .

*Si en concaténant des bases de chacun des sous-espaces vectoriels  $F_1, \dots, F_p$  on obtient une famille libre, alors les sous-espaces vectoriels sont en somme directe.*

*Si en concaténant des bases de chacun des sous-espaces vectoriels  $F_1, \dots, F_p$  on obtient une base de  $E$ , alors les sous-espaces vectoriels sont supplémentaires.*

## 4.2.3 Dimension d'une somme de sous-espaces vectoriels

---

**Proposition 4.23**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et  $F_1, \dots, F_n$  des sous-espaces vectoriels de  $E$ .

Alors  $\dim \sum_{i=1}^n F_i \leq \sum_{i=1}^n \dim F_i$ .

---

*Démonstration 4.24*

On note  $p_i = \dim F_i$  pour  $i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$ .

Pour tout  $i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$ , on choisit une base  $\mathcal{B}_i$  de  $F_i$  et on a  $F_i = \text{Vect}(\mathcal{B}_i)$ .

Donc  $F_1 + \dots + F_n = \text{Vect}(\mathcal{B}_1 \dots \mathcal{B}_n)$ .

Donc

$$\begin{aligned} \dim(F_1 + \dots + F_n) &\leq \text{Card}(\mathcal{B}_1 \dots \mathcal{B}_n) \\ &= \sum_{i=1}^n \dim F_i. \end{aligned}$$

■

---

*Démonstration 4.25 (Autre méthode)*

On pose l'application linéaire

$$\begin{aligned} \varphi : F_1 \times \dots \times F_n &\longrightarrow E \\ (x_1, \dots, x_n) &\longmapsto \sum_{i=1}^n x_i \end{aligned}$$

On a  $\text{Im } \varphi = F_1 + \dots + F_n$ .

Donc

$$\begin{aligned} \dim(F_1 + \dots + F_n) &= \dim \text{Im } \varphi \\ &= \text{rg } \varphi \\ &= \dim(F_1 \times \dots \times F_n) - \dim \ker \varphi \\ &\leq \dim(F_1 \times \dots \times F_n) \\ &= \sum_{i=1}^n \dim F_i. \end{aligned}$$

■

Il y a égalité quand la somme est directe.

---

### **Théorème 4.26**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et  $F_1, \dots, F_n$  des sous-espaces vectoriels de  $E$ .

Alors  $F_1, \dots, F_n$  sont en somme directe ssi  $\dim \sum_{i=1}^n F_i = \sum_{i=1}^n \dim F_i$ .

---

*Démonstration 4.27*

On reprend la Démonstration 4.25.

Si  $\dim \sum_{i=1}^n F_i = \sum_{i=1}^n \dim F_i$ , alors  $\dim \ker \varphi = 0$ .

$$\text{Donc } \ker \varphi = \left\{ (x_1, \dots, x_n) \in F_1 \times \dots \times F_n \left| \sum_{i=1}^n x_i = 0 \right. \right\} = \{(0, \dots, 0)\}.$$

Ainsi,  $F_1 + \dots + F_n$  est directe.

Et réciproquement. ■

## 4.2.4 Sous-espaces supplémentaires

En dimension finie, on a une façon plus simple de prouver que des sous-espaces vectoriels sont supplémentaires.

---

### Proposition 4.28 (Trois pour le prix de deux)

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et  $F_1, \dots, F_n$  des sous-espaces vectoriels de  $E$ .

Quand deux propriétés parmi les trois suivantes sont vraies, alors la troisième l'est aussi :

- ▷  $E = \sum_{i=1}^n F_i$
- ▷  $\dim \sum_{i=1}^n F_i = \sum_{i=1}^n \dim F_i$
- ▷  $\dim E = \sum_{i=1}^n \dim F_i$

Donc dans ce cas, les sous-espaces vectoriels  $F_1, \dots, F_n$  sont supplémentaires.

En pratique, le cas le plus utile est le suivant : si  $\dim \sum_{i=1}^n F_i = \sum_{i=1}^n \dim F_i = \dim E$ , alors les sous-espaces vectoriels  $F_1, \dots, F_n$  sont supplémentaires.

---

*Démonstration 4.29*

Si  $\dim \sum_{i=1}^n F_i = \sum_{i=1}^n \dim F_i$  et  $\dim \sum_{i=1}^n F_i = \dim E$ .

Alors  $F_1 + \dots + F_n$  est directe et  $\sum_{i=1}^n F_i = E$ .

Alors  $E = \bigoplus_{i=1}^n F_i$ . ■

---

**Exercice 4.30**

Dans  $\mathbb{R}^4$ , soient  $H = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + z + t = 0 \text{ et } x - y - z + t = 0\}$ ,  $F = \text{Vect}((-1, 0, 1, 1))$  et  $G = \text{Vect}((2, -1, 1, 0))$ .

$F$ ,  $G$  et  $H$  sont-ils supplémentaires ?

---

*Correction 4.31*

$H$  est l'ensemble des solutions d'un système linéaire homogène :

$$S : \begin{cases} x + z + t = 0 \\ x - y - z + t = 0 \end{cases}$$

i.e.  $H = \ker f$  où  $f : (x, y, z, t) \mapsto (x + z + t, x - y - z + t)$ .

D'après le théorème du rang, on a  $\dim H = \dim \mathbb{R}^4 - \text{rg } S = 4 - 2 = 2$ .

$F$  et  $G$  sont des droites vectorielles donc  $\dim F = \dim G = 1$ .

On a donc  $\dim \mathbb{R}^4 = \dim F + \dim G + \dim H$ .

On a

$$\begin{aligned} v = (x, y, z, t) \in H &\iff \begin{cases} x + z + t = 0 \\ x - y - z + t = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x = -z - t \\ y = -2z \end{cases} \\ &\iff v = (-z - t, -2z, z, t) \\ &\iff v = z \underbrace{(-1, -2, 1, 0)}_{h_1} + t \underbrace{(-1, 0, 0, 1)}_{h_2}. \end{aligned}$$

Donc  $H = \text{Vect}(h_1, h_2)$ .

On note  $f = (-1, 0, 1, 1)$  et  $g = (2, -1, 1, 0)$ .

On a alors  $F + G + H = \text{Vect}(f, g, h_1, h_2)$ .

Donc  $\dim(F + G + H) = \text{rg}(f, g, h_1, h_2)$ .

On note  $\mathcal{B}_0$  la base canonique de  $\mathbb{R}^4$ .

On a

$$A = \text{Mat}_{\mathcal{B}_0}(f, g, h_1, h_2) = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{matrix} L_3 \leftarrow \tilde{L}_3 + L_1 \\ L_4 \leftarrow \tilde{L}_4 + L_1 \end{matrix} \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{matrix} L_3 \leftarrow \tilde{L}_3 + 3L_2 \\ L_4 \leftarrow \tilde{L}_4 + 2L_2 \end{matrix} \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -6 & -1 \\ 0 & 0 & -5 & 0 \end{pmatrix}.$$

Donc  $\text{rg } A = 4$ .

Donc  $\dim(F + G + H) = \dim \mathbb{R}^4 = \dim F + \dim G + \dim H$ .

Finalement, on a  $\mathbb{R}^4 = F \oplus G \oplus H$ .

## 4.2.5 Dimension d'une somme de deux sous-espaces vectoriels

Rappel : la formule de Grassmann.

---

### Proposition 4.32

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et  $F, G$  deux sous-espaces vectoriels de  $E$ .

Alors  $\dim(F + G) = \dim F + \dim G - \dim(F \cap G)$ .

## 4.3 Polynômes d'endomorphismes et de matrices

### 4.3.1 $\mathbb{K}$ -algèbres

#### 4.3.1.1 Définition

---

#### Définition 4.33

Un ensemble  $A$  est appelé  $\mathbb{K}$ -algèbre quand  $A$  est à la fois un anneau et un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, dont les multiplications sont compatibles.

Il y a donc trois lois dans une  $\mathbb{K}$ -algèbre :

- une addition classique  $+$  ;

- une multiplication externe . ;
- une multiplication interne, compatible avec la précédente :

$$\forall (\lambda, a, b) \in \mathbb{K} \times A^2, \quad \lambda.(ab) = (\lambda.a)b = a(\lambda.b).$$

On qualifie les  $\mathbb{K}$ -algèbres par du vocabulaire des anneaux (algèbres intègres, algèbres principales, etc) ou des espaces vectoriels (algèbres de dimension finie, etc).

#### Exemple 4.34

- $\mathbb{K}$  est lui-même une  $\mathbb{K}$ -algèbre, où les deux multiplications sont confondues ;  $\mathbb{C}$  est aussi une  $\mathbb{R}$ -algèbre de dimension 2.
- $\mathbb{K}[X]$  est une  $\mathbb{K}$ -algèbre intègre, commutative et de dimension finie.
- Si  $I$  est un intervalle,  $\mathcal{F}(I, \mathbb{K})$  est une  $\mathbb{K}$ -algèbre commutative, non-intègre et de dimension finie.
- Si  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  est une  $\mathbb{K}$ -algèbre de dimension  $n^2$  qui n'est ni intègre ni commutative.
- Si  $E$  est un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, alors  $\mathcal{L}(E)$  est une  $\mathbb{K}$ -algèbre de dimension finie ssi  $E$  l'est aussi qui n'est ni intègre ni commutative.

### 4.3.1.2 Polynômes d'éléments dans une $\mathbb{K}$ -algèbre

#### Proposition 4.35

Soient  $A$  une  $\mathbb{K}$ -algèbre et  $a \in A$ .

Pour  $P = \sum_{i=0}^n c_i X^i \in \mathbb{K}[X]$ , on pose  $P(a) = \sum_{i=0}^n c_i a^i$ .

L'application  $\begin{array}{ccc} \mathbb{K}[X] & \longrightarrow & A \\ P & \longmapsto & P(a) \end{array}$  est alors un morphisme d'algèbres :

$$\forall (P, Q) \in \mathbb{K}[X]^2, \quad \forall \lambda \in \mathbb{K}, \quad \begin{cases} (P+Q)(a) = P(a) + Q(a) \\ (PQ)(a) = P(a)Q(a) \\ (\lambda P)(a) = \lambda P(a) \end{cases}$$

De plus, on note  $\mathbb{K}[a]$  l'ensemble  $\{P(a) \mid P \in \mathbb{K}[X]\}$  : cet ensemble est stable par les lois de  $A$ , on dit que c'est une sous-algèbre de  $A$ .

### 4.3.2 Cas particulier des algèbres $\mathcal{L}(E)$ ou $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$

$E$  étant un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, l'ensemble  $\mathcal{L}(E)$  est une  $\mathbb{K}$ -algèbre. De même,  $n$  étant un entier non-nul,  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  est une  $\mathbb{K}$ -algèbre. Dans ces algèbres, on définit naturellement la notion de polynôme d'endomorphisme ou de matrice. Bien sûr, ces notions sont liées par choix d'une base de l'espace.

---

**Proposition 4.36**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension  $n$ ,  $\mathcal{B}$  une base de  $E$  et  $f \in \mathcal{L}(E)$  tel que  $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = A$ .

Alors pour tout polynôme  $P \in \mathbb{K}[X]$ ,  $P(f)$  a pour matrice  $P(A)$  dans la base  $\mathcal{B}$ .

---

*Démonstration 4.37*

Comme  $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ , pour tout  $k \in \mathbb{N}$ ,  $A^k = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f^k)$ .

Donc  $\forall (a_0, \dots, a_p) \in \mathbb{K}^p$ ,  $\text{Mat}_{\mathcal{B}}\left(\sum_{i=0}^p a_i f^i\right) = \sum_{i=0}^p a_i A^i$  c'est-à-dire

$$\forall P \in \mathbb{K}[X], \text{Mat}_{\mathcal{B}}(P(f)) = P(A).$$

■

---

*Remarque 4.38*

- La « multiplication » dans  $\mathcal{L}(E)$  est la composition  $\circ$ . Donc la deuxième propriété de la Proposition 4.35 doit être comprise comme suit : si  $f \in \mathcal{L}(E)$ , alors  $(PQ)(f) = P(f) \circ Q(f)$ .
- Même si les multiplications dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  ou  $\mathcal{L}(E)$  ne sont pas commutatives en général, on peut intervertir l'ordre des polynômes car la multiplication dans  $\mathbb{K}[X]$  est commutative : si  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ,  $(PQ)(A) = P(A)Q(A) = Q(A)P(A)$  ; si  $u \in \mathcal{L}(E)$ ,  $(PQ)(u) = P(u) \circ Q(u) = Q(u) \circ P(u)$ .
- Attention aux notations ! Si  $f \in \mathcal{L}(E)$ ,  $x \in E$  et  $P \in \mathbb{K}[X]$ , alors l'application de  $P(f)$  au vecteur  $x$  se note  $P(f)(x)$  et pas  $P(f(x))$ , notation qui n'a aucun sens.

### 4.3.3 Polynôme annulateur d'une matrice ou d'un endomorphisme

---

**Définition 4.39**

Soient  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ . On appelle polynôme annulateur de  $A$  tout polynôme non-nul  $P \in \mathbb{K}[X]$  tel que  $P(A) = 0$ .

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $u \in \mathcal{L}(E)$ . On appelle polynôme annulateur de  $u$  tout polynôme non-nul  $P \in \mathbb{K}[X]$  tel que  $P(u) = 0$ .



---

*Remarque 4.40*

Attention à ne pas confondre les notions : si  $P$  est un polynôme annulateur de la matrice  $A$  (on dit aussi que  $P$  annule  $A$  par abus de langage), on ne dit pas que  $A$  est une racine de  $P$  !

Une racine d'un polynôme est un nombre...

De même, si  $P(u) = 0$ , on ne dit pas que  $u$  est une racine de  $P$ , ça n'a aucun sens.

---

**Définition 4.41**

Si  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ , alors l'ensemble  $\text{Ann}(A) = \{P \in \mathbb{K}[X] \mid P(A) = 0\}$  est appelé idéal annulateur de  $A$ .

Si  $u$  est un endomorphisme d'un espace vectoriel  $E$ , alors l'ensemble  $\text{Ann}(u) = \{P \in \mathbb{K}[X] \mid P(u) = 0\}$  est appelé idéal annulateur de  $u$ .

---

**Théorème 4.42**

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ . Alors  $\text{Ann}(A)$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{K}[X]$  stable par  $\times$ . De plus, il existe un unique polynôme unitaire  $\mu_A$  tel que  $\text{Ann}(A) = \mu_A \mathbb{K}[X]$ .

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et  $u \in \mathcal{L}(E)$ . Alors  $\text{Ann}(u)$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{K}[X]$  stable par  $\times$ . De plus, il existe un unique polynôme unitaire  $\mu_u$  tel que  $\text{Ann}(u) = \mu_u \mathbb{K}[X]$ .

---

*Démonstration 4.43*

► Soient  $(P, Q) \in \text{Ann}(A)^2$  et  $\lambda \in \mathbb{K}$ .

On a

$$(P + Q)(A) = P(A) + Q(A) = 0 + 0 = 0$$

et

$$(PQ)(A) = P(A)Q(A) = 0 \times 0 = 0$$

et

$$(\lambda P)(A) = \lambda P(A) = \lambda \times 0 = 0.$$

Donc  $P + Q \in \text{Ann}(A)$ ,  $PQ \in \text{Ann}(A)$  et  $\lambda P \in \text{Ann}(A)$ .

Remarque : on a même montré que  $\forall P \in \mathbb{K}[X], \forall Q \in \text{Ann}(A), PQ \in \text{Ann}(A)$ .

► On montre d'abord l'existence d'un polynôme annulateur de  $A$  non-nul.

On considère la famille  $(I_n, A, \dots, A^{n^2})$  qui contient  $n^2 + 1$  éléments de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ , espace de dimension  $n^2$ , et est donc liée : il existe  $(a_0, \dots, a_{n^2}) \in \mathbb{K}^{n^2+1}$  tel que

$$(a_0, \dots, a_{n^2}) \neq (0, \dots, 0) \quad \text{et} \quad \sum_{i=0}^{n^2} a_i A^i = 0.$$

Alors le polynôme  $\sum_{i=0}^{n^2} a_i X^i$  est un polynôme annulateur de  $A$ .

► On pose  $D = \{\deg P \mid P \in \text{Ann}(A) \setminus \{0\}\}$ .

D'après ce qui précède,  $D$  est une partie non-vide de  $\mathbb{N}$ .

Donc  $D$  admet un minimum  $d \geq 1$  d'après le principe fondamental de  $\mathbb{N}$ , associé à un polynôme  $P \neq 0$  tel que  $P(A) = 0$ .

En notant  $\lambda$  le coefficient dominant de  $P$ , le polynôme  $\mu = \frac{1}{\lambda}P$  est annulateur de  $A$  et unitaire.

► Montrons que  $\text{Ann}(A) = \mu\mathbb{K}[X]$ .

L'inclusion  $\mu\mathbb{K}[X] \subseteq \text{Ann}(A)$  est triviale.

Soit  $P \in \text{Ann}(A)$ . On effectue la division euclidienne de  $P$  par  $\mu$  : il existe  $(Q, R) \in \mathbb{K}[X]^2$  tel que

$$P = Q\mu + R \quad \text{et} \quad \deg R < \deg \mu = d.$$

Donc  $P(A) = Q(A)\mu(A) + R(A)$ .

Or  $P(A) = \mu(A) = 0$  donc  $R(A) = 0$  i.e.  $R \in \text{Ann}(A)$ .

Par définition de  $d$ , on a  $R = 0$ .

Donc  $P$  est un multiple de  $\mu$ .

D'où  $\text{Ann}(A) \subseteq \mu\mathbb{K}[X]$ .

Donc  $\text{Ann}(A) = \mu\mathbb{K}[X]$ .

► Montrons maintenant l'unicité de  $\mu$ .

Si  $\nu$  est un polynôme annulateur de  $A$  de degré  $d$  et unitaire, alors  $\text{Ann}(A) = \nu\mathbb{K}[X] = \mu\mathbb{K}[X]$ .

Donc  $\nu \mid \mu$  et  $\mu \mid \nu$ .

Or  $\mu$  et  $\nu$  sont unitaires donc  $\mu = \nu$ . ■

#### Remarque 4.44

Ce dernier résultat est faux en dimension infinie. Contre-exemple : l'endomorphisme  $u : \mathbb{K}[X] \longrightarrow \mathbb{K}[X]$  défini par  $u(P) = XP$ .

#### Définition 4.45

On appelle polynôme minimal d'une matrice carrée  $A$  le polynôme  $\mu_A$  précédent (noté aussi parfois  $\pi_A$ ). C'est le polynôme unitaire de degré minimal qui annule  $A$ .

On appelle polynôme minimal d'un endomorphisme  $u$  en dimension finie le polynôme  $\mu_u$  précédent (noté aussi parfois  $\pi_u$ ). C'est le polynôme unitaire de degré minimal qui annule  $u$ .

Autrement dit, on a l'équivalence : pour tout  $P \in \mathbb{K}[X]$ ,

$$P(u) = 0 \iff \mu_u \mid P.$$

De même, on a l'équivalence : pour tout  $P \in \mathbb{K}[X]$ ,

$$P(A) = 0 \iff \mu_A \mid P.$$

Les polynômes annulateurs sont donc les multiples des polynômes minimaux.

On verra plus tard qu'on peut trouver des polynômes annulateurs de plus petits degrés que ceux donnés par le théorème précédent.

En général, il est souvent pénible de calculer le polynôme minimal. En pratique, on se contente de trouver des polynômes annulateurs de degrés pas trop grands (et souvent, il s'agit du polynôme minimal).

---

*Remarque 4.46*

Si  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  et  $\mathbb{K}'$  est un sous-corps de  $\mathbb{C}$  qui contient  $\mathbb{K}$  (on dit que  $\mathbb{K}'$  est une extension de  $\mathbb{K}$ ), alors le polynôme minimal de  $A$ , vue comme matrice de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K}')$ , est a priori différent de celui de  $A$  vue comme matrice de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ . On peut seulement affirmer pour l'instant que  $\mu_{A\mathbb{K}'}$  divise  $\mu_{A\mathbb{K}}$ .

En fait, on montre plus loin que le polynôme minimal ne dépend pas du corps  $\mathbb{K}$ .

### 4.3.4 Utilisation pratique d'un polynôme annulateur

#### 4.3.4.1 Calcul de l'inverse

---

**Proposition 4.47**

Soient  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

Alors  $A$  est inversible ssi  $A$  possède un polynôme annulateur  $P$  tel que  $0$  ne soit pas racine de  $P$ . Dans ce cas,  $A^{-1}$  est un polynôme en  $A$ .

De même, soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $f \in \mathcal{L}(E)$ .

Alors si  $f$  possède un polynôme annulateur  $P$  tel que  $0$  ne soit pas racine de  $P$ ,  $f$  est un automorphisme de  $E$ . Dans ce cas,  $f^{-1}$  est un polynôme en  $f$ . La réciproque est vraie si  $E$  est de dimension finie.

---

*Démonstration 4.48*



On suppose que  $A$  possède un polynôme annulateur  $P$  tel que  $P(0) \neq 0$ .

En notant  $P = \sum_{i=0}^p a_i X^i$ , on a  $\sum_{i=0}^p a_i A^i = 0$  et  $a_0 \neq 0$ .

Donc  $a_0 I_n + a_1 A + \cdots + a_p A^p = 0$ .

Donc  $a_0 I_n = -a_1 A - \cdots - a_p A^p$ .

$$\text{Donc } I_n = A \underbrace{\left( \frac{-a_1}{a_0} I_n - \cdots - \frac{a_p}{a_0} A^{p-1} \right)}_B.$$

On a trouvé une matrice  $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  telle que  $AB = I_n = BA$ .

Donc  $A$  est inversible et  $A^{-1} = B = Q(A)$  où  $Q = \sum_{i=0}^{p-1} \frac{-a_{i+1}}{a_0} X^i$ .

$\Rightarrow$

On suppose  $A$  inversible. On veut montrer que  $\mu_A(0) \neq 0$ .

Par l'absurde, on suppose  $\mu_A(0) = 0$ .

On a  $\mu_A = a_1 X + \cdots + X^p$  et  $\mu_A(A) = 0$ .

Donc  $a_1 A + \cdots + A^p = 0$ .

$A$  étant inversible, on multiplie par  $A^{-1}$  et on obtient  $a_1 I_n + a_2 A + \cdots + A^{p-1} = 0$ .

Donc  $a_1 + a_2 X + \cdots + X^{p-1}$  est annulateur de  $A$  et de degré strictement inférieur à celui de  $\mu_A$  : contradiction.

Donc  $\mu_A(0) \neq 0$ . ■

---

#### Exercice 4.49

On pose  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ . Déterminez un polynôme annulateur de  $A$ , montrez que  $A$  est inversible et calculez  $A^{-1}$ .

---

#### Correction 4.50

$$\text{On a } A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \text{ et } A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 11 \\ 0 & 1 & 7 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}.$$

Donc on a

$$A^3 = xA^2 + yA + zI_3 \iff \begin{cases} 1 = x + y + z \\ 8 = 4x + 2y + z \\ 7 = 3x + y \\ 11 = 4x + y \\ 3 = 2x + y \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x = 4 \\ y = -5 \\ z = 2 \end{cases}$$

Donc  $A^3 = 4A^2 - 5A + 2I_3$ .

Donc  $P = X^3 - 4X^2 + 5X - 2$  est un polynôme annulateur de  $A$ .

On a  $P(0) \neq 0$  donc  $A$  est inversible.

On obtient

$$A^{-1} = \frac{1}{2} (A^2 - 4A + 5I_3) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1/2 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

#### Exercice 4.51

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $p \in \mathcal{L}(E)$  un projecteur. Déterminez un polynôme annulateur de  $p$ .

Soit  $\lambda \in \mathbb{K}$ . On pose  $f = p - \lambda \text{id}_E$ . Déterminez un polynôme annulateur de  $f$  et vérifiez que  $f$  est un automorphisme pour presque toutes les valeurs de  $\lambda$ ; dans ce cas, calculez son inverse.

#### Correction 4.52

$p$  est un projecteur donc  $p^2 = p$  donc  $X^2 - X$  est un polynôme annulateur de  $p$ .

Donc le polynôme annulateur minimal de  $p$  est un diviseur unitaire de  $X^2 - X : X^2 - X, X$  (auquel cas  $p = 0$ ) ou  $X - 1$  (auquel cas  $p = \text{id}_E$ ).

On a  $f = p - \lambda \text{id}_E$  donc

$$\begin{aligned} f^2 &= p^2 - 2\lambda p + \lambda^2 \text{id}_E \\ &= (1 - 2\lambda) p + \lambda^2 \text{id}_E \\ &= (1 - 2\lambda) f + \lambda(1 - 2\lambda) \text{id}_E + \lambda^2 \text{id}_E \\ &= (1 - 2\lambda) f + (-\lambda^2 + \lambda) \text{id}_E. \end{aligned}$$

Donc  $P = X^2 + (2\lambda - 1)X + (\lambda^2 - \lambda)$  est annulateur de  $f$ .

Si  $\lambda \neq 0$  et  $\lambda \neq 1$  alors  $\lambda^2 - \lambda = P(0) = 0$ .

Donc d'après la Proposition 4.47,  $f \in \text{GL}(E)$ .

De plus,  $f^{-1} = \frac{1}{\lambda - \lambda^2} (f + (2\lambda - 1) \text{id}_E)$ .

Si  $\lambda = 0$  alors  $f = p$  est un automorphisme ssi  $p = \text{id}_E$ .

Si  $\lambda = 1$  alors  $f = p - \text{id}_E$  est un automorphisme ssi  $p = 0$ .

#### 4.3.4.2 Calcul de puissances

---

##### Proposition 4.53

Soient  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ . On choisit un polynôme annulateur  $P$  de la matrice  $A$ .

Alors pour tout  $p \in \mathbb{N}$ ,  $A^p = R_p(A)$  où  $R_p$  est le reste de la division euclidienne de  $X^p$  par  $P$ .

De même, soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $f \in \mathcal{L}(E)$  qui possède un polynôme annulateur  $P$ .

Alors pour tout  $p \in \mathbb{N}$ ,  $f^p = R_p(f)$  où  $R_p$  est le reste de la division euclidienne de  $X^p$  par  $P$ .

---

##### Démonstration 4.54

On effectue la division euclidienne de  $X^p$  par  $P$  :  $X^p = PQ + R_p$  et  $\deg R_p < \deg P$ .

Alors  $A^p = P(A)Q(A) + R_p(A) = R_p(A)$  car  $P(A) = 0$ . ■

Conséquence :

- si  $A$  possède un polynôme annulateur de degré  $a$ , alors  $\mathbb{K}[A] = \{P(A) \mid P \in \mathbb{K}_{a-1}[X]\}$  ;
- si  $f$  possède un polynôme annulateur de degré  $a$ , alors  $\mathbb{K}[f] = \{P(f) \mid P \in \mathbb{K}_{a-1}[X]\}$ .

---

##### Proposition 4.55

Si  $p$  est le degré du polynôme minimal d'une matrice  $A$ , alors  $\dim \mathbb{K}[A] = p$  et  $(I_n, A, \dots, A^{p-1})$  est une base de  $\mathbb{K}[A]$ .

Si  $p$  est le degré du polynôme minimal d'un endomorphisme  $f$  d'un espace vectoriel  $E$ , alors  $\dim \mathbb{K}[f] = p$  et  $(\text{id}_E, f, \dots, f^{p-1})$  est une base de  $\mathbb{K}[f]$ .

---

##### Démonstration 4.56

On note  $p = \deg \mu_A$ .

Soit  $B \in \mathbb{K}[A]$ .

Il existe  $P \in \mathbb{K}[X]$  tel que  $B = P(A)$ .

On effectue la division euclidienne de  $P$  par  $\mu_A : P = Q\mu_A + R$  avec  $\deg R < p$ .

Donc  $P(A) = Q(A)\mu_A(A) + R(A) = R(A) \in \text{Vect}(I_n, A, \dots, A^{p-1})$ .

Donc  $\mathbb{K}[A] \subseteq \text{Vect}(I_n, A, \dots, A^{p-1})$ .

L'inclusion réciproque est immédiate.

Donc  $\mathbb{K}[A] = \text{Vect}(I_n, A, \dots, A^{p-1})$ .

Si  $(I_n, A, \dots, A^{p-1})$  est liée, alors il existe  $(a_0, \dots, a_{p-1}) \neq (0, \dots, 0)$  tel que  $\sum_{i=0}^{p-1} a_i A^i = 0$ .

En posant  $P = \sum_{i=0}^{p-1} a_i X^i$ , on a un polynôme annulateur de  $A$  de degré strictement inférieur à  $p = \deg \mu_A$  : contradiction.

Donc  $(I_n, A, \dots, A^{p-1})$  est libre et est donc une base de  $\mathbb{K}[A]$  et  $\dim \mathbb{K}[A] = p$ . ■

#### Exercice 4.57

Soient  $E$  un espace vectoriel et  $(p, q) \in \mathcal{L}(E)^2$  deux projecteurs tels que  $p + q = \text{id}_E$ . Vérifiez que  $p \circ q = q \circ p = 0$ . Déterminez un polynôme annulateur de  $f = 2p + 3q$ . Donnez une expression générale de  $f^k$  en fonction de  $f$  et  $k$ .

*Correction 4.58*

On a  $p + q = \text{id}_E$  donc  $p \circ p + p \circ q = p$  donc  $p \circ q = 0$  car  $p \circ p = p$ .

De même,  $q \circ p = 0$ .

On a donc  $f^2 = 4p^2 + 6pq + 6qp + 9q^2 = 4p + 9q$ .

Donc

$$\begin{aligned} f^2 = xf + y\text{id}_E &\iff \begin{cases} 4 = 2x + y \\ 9 = 3x + y \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} 5 = x \\ -6 = y \end{cases} \end{aligned}$$

Donc  $P = X^2 - 5X + 6$  est un polynôme annulateur de  $f$  dont les racines sont 2 et 3.

Soit  $k \in \mathbb{N}$ .

On effectue la division euclidienne de  $X^k$  par  $P$  :

$$X^k = (X^2 - 5X + 6)Q + a_k X + b_k.$$

En appliquant en 2 et en 3, on obtient

$$\begin{cases} 2a_k + b_k = 2^k \\ 3a_k + b_k = 3^k \end{cases} \quad \text{donc} \quad \begin{cases} a_k = 3^k - 2^k \\ b_k = 3 \times 2^k - 2 \times 3^k \end{cases}$$

Donc  $f^k = a_k f + b_k \text{id}_E = (3^k - 2^k) f + (3 \times 2^k - 2 \times 3^k) \text{id}_E$ .

---

*Remarque 4.59*

Plus généralement, si  $P$  est annulateur de  $f$  et de degré  $N$  à  $N$  racines simples  $\omega_1, \dots, \omega_N$ .

Alors  $X^k = PQ + c_{N-1}X^{N-1} + \dots + c_1X + c_0$ .

Alors on a un système linéaire à  $N$  équations et  $N$  inconnues

$$\begin{cases} c_0 + c_1\omega_1 + c_2\omega_1^2 + \dots + c_{N-1}\omega_1^{N-1} = \omega_1^k \\ \vdots \\ c_0 + c_1\omega_N + c_2\omega_N^2 + \dots + c_{N-1}\omega_N^{N-1} = \omega_N^k \end{cases}$$

Ce système a pour déterminant

$$\begin{vmatrix} 1 & \omega_1 & \omega_1^2 & \dots & \omega_1^{N-1} \\ & & \vdots & & \vdots \\ 1 & \omega_N & \omega_N^2 & \dots & \omega_N^{N-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (\omega_j - \omega_i) \neq 0$$

et admet donc une unique solution.

---

#### Exercice 4.60

On pose  $A = \begin{pmatrix} 2 & -4 & -5 \\ -1 & 2 & 2 \\ 1 & -2 & -2 \end{pmatrix}$ . Vérifiez que  $P = X^3 - 2X^2 + X$  est un polynôme annulateur de  $A$ . Donnez une expression générale de  $A^p$  en fonction de  $A$  et  $p$ .

---

*Correction 4.61*

On a  $A^2 = \begin{pmatrix} 3 & -6 & -8 \\ -2 & 4 & 5 \\ 2 & -4 & -5 \end{pmatrix}$  et  $A^3 = \begin{pmatrix} 4 & -8 & -11 \\ -3 & 6 & 8 \\ 3 & -6 & -8 \end{pmatrix}$  donc  $P = X^3 - 2X^2 + X = X(X-1)^2$  est annulateur de  $A$ .

Soit  $k \in \mathbb{N}$ .

On effectue la division euclidienne de  $X^k$  par  $P$  :

$$X^k = X(X-1)^2 Q + a_k X^2 + b_k X + c_k.$$

En évaluant en 0 et 1, on obtient

$$\begin{cases} c_k = 0^k \\ a_k + b_k + c_k = 1^k \\ 2a_k + b_k = k1^k \end{cases}$$



Or 1 est racine double donc  $P'(1) = 0$  donc  $2a_k + b_k = k$ .

Donc, si  $k \neq 0$ , on a

$$\begin{cases} c_k = 0 \\ a_k + b_k = 1 \\ 2a_k + b_k = k \end{cases} \quad \text{donc} \quad \begin{cases} a_k = k - 1 \\ b_k = 2 - k \\ c_k = 0 \end{cases}$$

Donc pour tout  $k \in \mathbb{N}^*$ ,  $A^k = (k - 1) A^2 + (2 - k) A$ .

### Corollaire 4.62

Si  $\mathbb{K}'$  est une extension de  $\mathbb{K}$ , alors pour toute matrice  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ , ses polynômes minimaux relativement à  $\mathbb{K}$  et  $\mathbb{K}'$  sont égaux :  $\mu_{A\mathbb{K}} = \mu_{A\mathbb{K}'}$ .

Autrement dit, le polynôme minimal ne dépend pas du corps  $\mathbb{K}$ .

### Démonstration 4.63

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

On note  $\text{Ann}_{\mathbb{K}}(A) = \{P \in \mathbb{K}[X] \mid P(A) = 0\}$  et  $\text{Ann}_{\mathbb{K}'}(A) = \{P \in \mathbb{K}'[X] \mid P(A) = 0\}$ .

Soit  $P \in \text{Ann}_{\mathbb{K}}(A)$ .

Comme  $\mathbb{K} \subseteq \mathbb{K}'$ , on a  $P \in \text{Ann}_{\mathbb{K}'}(A)$ .

Donc  $\mu_{A\mathbb{K}}[X] = \text{Ann}_{\mathbb{K}}(A) \subseteq \text{Ann}_{\mathbb{K}'}(A) = \mu_{A\mathbb{K}'}[X]$ .

Donc  $\mu_{A\mathbb{K}} \in \text{Ann}_{\mathbb{K}'}(A)$  donc  $\mu_{A\mathbb{K}'} \mid \mu_{A\mathbb{K}}$ .

Donc  $p' = \deg \mu_{A\mathbb{K}'} \leq \deg \mu_{A\mathbb{K}} = p$ .

Or  $(I_n, A, \dots, A^{p-1})$  est libre dans le  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel  $\mathbb{K}[A]$  et  $(I_n, A, \dots, A^{p'-1})$  est libre dans le  $\mathbb{K}'$ -espace vectoriel  $\mathbb{K}'[A]$ .

On veut montrer que  $(I_n, A, \dots, A^{p-1})$  est libre dans le  $\mathbb{K}'$ -espace vectoriel  $\mathbb{K}'[A]$ .

Par l'absurde, si cette famille est liée, alors il existe  $(\lambda_0, \dots, \lambda_{p-1}) \in (\mathbb{K}')^p$  tel que

$$\begin{cases} (\lambda_0, \dots, \lambda_{p-1}) \neq (0, \dots, 0) \\ \sum_{i=0}^{p-1} \lambda_i A^i = 0 \end{cases}$$

On pose  $q = \max \{i \in \llbracket 0 ; p-1 \rrbracket \mid \lambda_i \neq 0\}$ .

On a alors  $A^q = - \sum_{i=0}^{q-1} \frac{\lambda_i}{\lambda_q} A^i$ .

Cette égalité est interprétable en un système linéaire à  $n^2$  équations dont les « inconnues » sont  $\frac{-\lambda_i}{\lambda_q}$  et les coefficients sont les coefficients de  $A^q, \dots, I_n$  qui sont tous dans  $\mathbb{K}$ .

En résolvant ce système linéaire, on obtient des solutions qui sont dans  $\mathbb{K}$ .

Donc on obtient une relation de dépendance linéaire entre les matrices  $(I_n, \dots, A^q, \dots, A^{p-1})$  à coefficients dans  $\mathbb{K}$  : contradiction car  $(I_n, \dots, A^{p-1})$  est libre.

Donc  $p \leq \dim_{\mathbb{K}'} \mathbb{K}'[A] = p'$ .

D'où  $p = p'$ .

Donc, comme  $\mu_{A\mathbb{K}'} \mid \mu_{A\mathbb{K}}$  et que ces polynômes sont unitaires, on a

$$\mu_{A\mathbb{K}'} = \mu_{A\mathbb{K}}. \quad \blacksquare$$

## 4.4 Matrices semblables, trace

### 4.4.1 Trace d'une matrice

---

#### Définition 4.64

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ . On appelle trace de  $A$  la somme de ses coefficients diagonaux :

$$\text{tr } A = \sum_{i=1}^n a_{ii}.$$

L'application trace vérifie de remarquables propriétés.

---

#### Proposition 4.65

- La trace est une forme linéaire sur  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .
- Pour tout  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ,  $\text{tr}(A^\top) = \text{tr } A$ .
- Pour tout  $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2$ ,  $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$ .

### 4.4.2 Matrices semblables

---

#### Définition 4.66

Soient  $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

On dit que  $A$  et  $B$  sont semblables quand il existe  $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$  telle que  $B = P^{-1}AP$ .

---

**Proposition 4.67**

*La relation de similitude entre matrices de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  est une relation d'équivalence.*

La relation de similitude est une relation très contraignante. Il n'existe pas de caractérisation simple de la similitude entre deux matrices carrées : savoir si deux matrices sont semblables est un problème difficile.

D'après la formule de changement de base, on a immédiatement le résultat suivant.

---

**Proposition 4.68**

*Deux matrices de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  sont semblables ssi elle représentent un même endomorphisme dans des bases différentes. La matrice  $P$  est la matrice de passage d'une base à l'autre.*

---

**Corollaire 4.69**

*Deux matrices semblables ont même rang, même trace et même déterminant.*

Mais c'est loin d'être suffisant pour être semblables.

---

**Proposition 4.70**

*Si  $A$  et  $B$  sont deux matrices semblables, alors pour tout polynôme  $P \in \mathbb{K}[X]$ ,  $P(A)$  et  $P(B)$  sont semblables avec la même matrice de passage.*

---

*Démonstration 4.71*

Si  $A$  et  $B$  sont semblables, il existe  $Q \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$  telle que  $B = Q^{-1}AQ$ .

Alors, par récurrence sur  $k \in \mathbb{N}$ , on a  $B^k = Q^{-1}A^kQ$ .

Puis, par combinaison linéaire, pour tout  $P \in \mathbb{K}[X]$ ,  $P(B) = Q^{-1}P(A)Q$ . ■

---

### 4.4.3 Trace d'un endomorphisme

---

**Proposition 4.72**

*Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et  $f \in \mathcal{L}(E)$ .*

*Toutes les matrices carrées représentant  $f$  ont la même trace. Cette trace ne dépend donc pas du choix de la base dans laquelle on écrit la matrice de  $f$ , elle ne dépend que de  $f$  : on l'appelle trace de  $f$  et on la note  $\text{tr } f$ .*

On peut alors reformuler les résultats sur la trace d'une matrice.

---

**Proposition 4.73**

► *La trace est une forme linéaire sur  $\mathcal{L}(E)$ .*

► *Pour tout  $(u, v) \in \mathcal{L}(E)^2$ ,  $\text{tr}(u \circ v) = \text{tr}(v \circ u)$ .*

## 4.5 Opérations par blocs

### 4.5.1 Cas général

Soit  $(n, p) \in (\mathbb{N}^*)^2$ . On fixe deux entiers  $k, \ell$  tels que  $1 \leq k \leq n-1$  et  $1 \leq \ell \leq p-1$ .

À toute matrice  $M \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$ , on associe quatre matrices obtenues en découpant la matrice en blocs :

$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$$

où  $A = (m_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq k \\ 1 \leq j \leq \ell}}$ ,  $B = (m_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq k \\ \ell+1 \leq j \leq p}}$ ,  $C = (m_{ij})_{\substack{k+1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq \ell}}$  et  $D = (m_{ij})_{\substack{k+1 \leq i \leq n \\ \ell+1 \leq j \leq p}}$ .

Cette décomposition par blocs permet de faire des calculs formellement comme s'il s'agissait de nombres.

---

#### Proposition 4.74

Soient  $M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$  et  $M' = \begin{pmatrix} A' & B' \\ C' & D' \end{pmatrix}$  deux matrices de même taille décomposées de la même façon en blocs et  $\lambda \in \mathbb{K}$ .

Alors  $M + M' = \begin{pmatrix} A + A' & B + B' \\ C + C' & D + D' \end{pmatrix}$  et  $\lambda M = \begin{pmatrix} \lambda A & \lambda B \\ \lambda C & \lambda D \end{pmatrix}$ .

---

#### Proposition 4.75

Soient  $M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$  et  $M' = \begin{pmatrix} A' & B' \\ C' & D' \end{pmatrix}$  deux matrices telles que le produit  $MM'$  existe et décomposées en blocs.

Alors, sous réserve que les blocs soient de tailles compatibles pour la multiplication, on a

$$MM' = \begin{pmatrix} AA' + BC' & AB' + BD' \\ CA' + DC' & CB' + DD' \end{pmatrix}.$$

---

#### Remarque 4.76

- Comme les symboles mis en jeu ne sont pas des nombres mais des matrices, il est indispensable de respecter l'ordre dans les produits.
- On peut généraliser à un nombre quelconque de blocs, pas forcément deux en ligne ou en colonne.

### 4.5.2 Cas particuliers des matrices carrées

Si  $M$  est une matrice de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ , alors avec les mêmes notations, on choisit toujours  $A$  et  $D$  carrées elles aussi. Dans ce paragraphe, on suppose que c'est le cas.

---

**Définition 4.77**

On dit que  $M$  est triangulaire supérieure par blocs quand il existe des matrices carrées  $A_1, \dots, A_k$  telles que  $M$  soit de la forme

$$M = \begin{pmatrix} A_1 & ? & ? & \dots & ? \\ 0 & A_2 & ? & \dots & ? \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & A_{k-1} & ? \\ 0 & \dots & 0 & 0 & A_k \end{pmatrix}.$$

On définit de même la notion de matrice triangulaire inférieure par blocs.

---

**Définition 4.78**

On dit que  $M$  est diagonale par blocs quand il existe des matrices carrées  $A_1, \dots, A_k$  telles que  $M$  soit de la forme

$$M = \begin{pmatrix} A_1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & A_2 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & A_{k-1} & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & A_k \end{pmatrix}.$$

Les résultats sur les matrices triangulaires ou diagonales restent valables par blocs : la somme et le produit de deux matrices triangulaires supérieures par blocs de mêmes tailles l'est encore, et de même pour les matrices triangulaires inférieures par blocs et les matrices diagonales par blocs.

Une conséquence est qu'une matrice  $M$  triangulaire par blocs est inversible ssi tous les blocs diagonaux sont inversibles.

Dans ce cas, l'inverse de  $M$  est triangulaire par blocs et ses blocs diagonaux sont les inverses des blocs diagonaux de  $M$ .

En particulier, l'inverse d'une matrice  $M$  diagonale par blocs est la matrice diagonale par blocs dont les blocs diagonaux sont les inverses de ceux de  $M$ .

De plus, le déterminant d'une matrice triangulaire par blocs est le produit des déterminants des blocs diagonaux.

### 4.5.3 Interprétation des blocs

---

**Définition 4.79**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel,  $f \in \mathcal{L}(E)$  et  $F$  un sous-espace vectoriel de  $E$ .

On dit que  $F$  est stable par  $f$  quand  $f(F) \subseteq F$ , *i.e.* pour tout  $x \in F$ ,  $f(x) \in F$ .

Dans ce cas, on peut définir une application  $\varphi$  de  $F$  dans  $F$  en posant pour tout  $x \in F$ ,  $\varphi(x) = f(x)$ .

Il est facile de vérifier que  $\varphi$  est un endomorphisme de  $F$ , appelé endomorphisme induit par  $f$  dans  $F$ .

*Exemple 4.80*

Si  $g$  est un endomorphisme de  $E$  qui commute avec  $f$  (i.e.  $fg = gf$ ), alors  $\ker g$  et  $\operatorname{Im} g$  sont stables par  $f$ .

### Proposition 4.81

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension  $n$ ,  $f \in \mathcal{L}(E)$  et  $F$  un sous-espace vectoriel de  $E$  de dimension  $p$ .

Si  $F$  est stable par  $f$ , alors il existe une base de  $E$  dans laquelle la matrice de  $f$  est triangulaire supérieure par bloc, le premier bloc étant de taille  $(p, p)$  :

$$\operatorname{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix} \text{ et } A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K}).$$

Réciproquement, si  $f$  possède une matrice de cette forme, alors le sous-espace vectoriel engendré par les  $p$  premiers vecteurs est stable par  $f$ .

*Démonstration 4.82*

On choisit une base de  $E$  adaptée à  $F$  :  $\mathcal{B} = \left( \underbrace{e_1, \dots, e_p}_{\text{base de } F}, e_{p+1}, \dots, e_n \right)$ .

Pour tout  $j \in \llbracket 1 ; p \rrbracket$ , en notant  $f(e_j) = (a_{1j}, \dots, a_{nj})_{\mathcal{B}}$ , on a

$$\begin{aligned} f(e_j) \in F &\iff f(e_j) \in \operatorname{Vect}(e_1, \dots, e_p) \\ &\iff \forall i \geq p+1, a_{ij} = 0 \\ &\iff f(e_j) = (a_{1j}, \dots, a_{pj}, 0, \dots, 0)_{\mathcal{B}}. \end{aligned}$$

Alors, si  $F$  est stable par  $f$ , on a

$$\operatorname{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1p} & ? & \dots & ? \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{p1} & \dots & a_{pp} & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \vdots & & \vdots \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & ? & \dots & ? \end{pmatrix}.$$

Et réciproquement. ■

---

**Proposition 4.83**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension  $n$  et  $f \in \mathcal{L}(E)$ .

Si  $F_1, \dots, F_k$  sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires stables par  $f$  de dimensions respectives  $p_1, \dots, p_k$ , alors il existe une base de  $E$  dans laquelle la matrice de  $f$  est diagonale par blocs, la taille du  $i$ -ème bloc étant  $(p_i, p_i)$  :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} A_1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & A_2 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & A_{k-1} & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & A_k \end{pmatrix}.$$

Réciproquement, si  $f$  possède une matrice dans une certaine base qui est diagonale par blocs et contenant  $k$  blocs carrés, alors il existe  $k$  sous-espaces vectoriels  $F_1, \dots, F_k$  stables par  $f$  et supplémentaires dans  $E$ .

# Chapitre 5

## Réduction des endomorphismes

### Sommaire

---

<b>5.1</b>	<b>Éléments propres d'un endomorphisme . . . . .</b>	<b>158</b>
5.1.1	Valeurs propres et vecteurs propres . . . . .	158
5.1.2	Lien avec les polynômes annulateurs . . . . .	159
5.1.3	Sous-espaces propres . . . . .	161
<b>5.2</b>	<b>Polynôme caractéristique d'un endomorphisme . . . . .</b>	<b>163</b>
5.2.1	Caractérisation des valeurs propres en dimension finie . . . . .	163
5.2.2	Définition et lien avec les valeurs propres . . . . .	163
5.2.3	Ordre de multiplicité et dimension du sous-espace propre . . . . .	166
5.2.4	Endomorphisme scindé . . . . .	167
<b>5.3</b>	<b>Éléments propres d'une matrice carrée. . . . .</b>	<b>168</b>
5.3.1	Valeurs propres et vecteurs propres . . . . .	168
5.3.2	Lien avec les polynômes annulateurs . . . . .	169
5.3.3	Sous-espaces propres . . . . .	169
<b>5.4</b>	<b>Polynôme caractéristique d'une matrice carrée . . . . .</b>	<b>170</b>
5.4.1	Définition et lien avec les valeurs propres . . . . .	170
5.4.2	Ordre de multiplicité et dimension du sous-espace propre . . . . .	172
5.4.3	Matrice scindée . . . . .	172
<b>5.5</b>	<b>Endomorphismes diagonalisables, matrices diagonalisables . . . . .</b>	<b>173</b>
5.5.1	Définition . . . . .	173
5.5.2	Caractérisations équivalentes . . . . .	174
5.5.3	Lien avec le polynôme caractéristique . . . . .	176
<b>5.6</b>	<b>Lien entre diagonalisabilité et polynômes annulateurs . . . . .</b>	<b>177</b>
5.6.1	Racines du polynôme minimal . . . . .	177
5.6.2	Lemme des noyaux . . . . .	178
5.6.3	Application à la diagonalisabilité . . . . .	180
5.6.4	Diagonalisabilité d'un endomorphisme induit . . . . .	183
<b>5.7</b>	<b>Quelques applications de la diagonalisation . . . . .</b>	<b>184</b>
5.7.1	Puissances d'une matrice, suites récurrentes linéairement . . . . .	184
5.7.2	Systèmes d'équations différentielles . . . . .	185
<b>5.8</b>	<b>Endomorphismes trigonalisables, matrices trigonalisables . . . . .</b>	<b>185</b>
5.8.1	Définition et propriétés . . . . .	185
5.8.2	Caractérisation équivalente . . . . .	186
5.8.3	Théorème de Cayley-Hamilton . . . . .	189
5.8.4	Sous-espaces caractéristiques . . . . .	190



<b>5.9</b>	<b>Endomorphismes nilpotents, matrices nilpotentes . . . . .</b>	<b>192</b>
5.9.1	Généralités . . . . .	192
5.9.2	Éléments propres d'un nilpotent . . . . .	194
5.9.3	Application aux sous-espaces caractéristiques d'un endomorphisme . . . . .	194

---

Dans ce chapitre,  $\mathbb{K}$  désigne un sous-corps de  $\mathbb{C}$ , en général  $\mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ .

## 5.1 Éléments propres d'un endomorphisme

Dans cette section,  $E$  est un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension quelconque, finie ou non.

### 5.1.1 Valeurs propres et vecteurs propres

---

#### Définition 5.1

Soient  $f \in \mathcal{L}(E)$  et  $\lambda \in \mathbb{K}$ .

On dit que  $\lambda$  est une valeur propre de  $f$  quand il existe un vecteur  $v$  non-nul tel que  $f(v) = \lambda v$ .

Si  $\lambda$  est une valeur propre de  $f$ , alors tout vecteur non-nul  $v$  tel que  $f(v) = \lambda v$  est appelé vecteur propre associé à la valeur propre  $\lambda$ .

---

#### Remarque 5.2

Si  $f(v) = \lambda v$  et  $v \neq 0$  alors pour tout  $\alpha \neq 0$ ,  $f(\alpha v) = \alpha f(v) = \alpha(\lambda v) = \lambda(\alpha v)$ . Donc  $\alpha v$  est un vecteur propre de  $f$  pour la valeur propre  $\lambda$ .

---

#### Exemple 5.3

- Pour tout  $\alpha \in \mathbb{K}$ ,  $\alpha \text{id}_E$  a pour unique valeur propre  $\alpha$  et tout vecteur non-nul de  $E$  est un vecteur propre associé.
- Si  $p$  est un projecteur non-trivial (*i.e.*  $p \neq 0$  et  $p \neq \text{id}_E$ ), alors  $p$  a pour seules valeurs propres 0 et 1.
- De même, si  $s$  est une symétrie non-triviale (*i.e.*  $s \neq \text{id}_E$  et  $s \neq -\text{id}_E$ ), alors les valeurs propres de  $s$  sont 1 et  $-1$ .
- L'endomorphisme de  $\mathbb{K}[X]$   $P \mapsto XP$  n'a pas de valeur propre.

L'ensemble des valeurs propres d'un endomorphisme  $f$  est appelé le spectre de  $f$  et est noté  $\text{Sp}_{\mathbb{K}}(f)$  ou plus simplement  $\text{Sp}(f)$  (en toute rigueur, cette définition est fautive en dimension infinie, mais à notre niveau, cette approximation est acceptable).

---

**Définition 5.4**

On appelle droite propre d'un endomorphisme toute droite dirigée par un vecteur propre.

---

**Proposition 5.5**

*Les droites propres d'un endomorphisme sont exactement les droites stables par cet endomorphisme.*

---

**Exercice 5.6**

Soit  $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^{\mathbb{N}})$  défini par : si  $(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ , on pose  $f(u) = (u_{n+1})$ . Quelles sont les valeurs propres de  $f$  et les vecteurs propres associés ?

---

**Exercice 5.7**

Même question avec  $d$  l'opérateur de dérivation dans  $\mathcal{C}^{\infty}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ .

---

**Exercice 5.8**

Même question avec  $D$  l'opérateur de dérivation dans  $\mathbb{R}[X]$ .

---

### 5.1.2 Lien avec les polynômes annulateurs

En dimension quelconque, il est souvent difficile de trouver les valeurs propres d'un endomorphisme. La connaissance d'un polynôme annulateur peut aider.

---

**Lemme 5.9**

Soient  $f \in \mathcal{L}(E)$  et  $P \in \mathbb{K}[X]$ . Si  $\lambda$  est une valeur propre de  $f$  et  $v$  un vecteur propre associé, alors  $P(f)(v) = P(\lambda)v$ .

---

*Démonstration 5.10*

On montre par récurrence la propriété  $\mathcal{P}(k)$  : «  $f^k(v) = \lambda^k v$  ».

On a  $f^0(v) = v = \lambda^0 v$ .

Si  $\mathcal{P}(k)$  est vraie, alors

$$\begin{aligned} f^{k+1}(v) &= f f^k(v) \\ &= f(\lambda^k v) \\ &= \lambda^k f(v) \\ &= \lambda^k \lambda v \\ &= \lambda^{k+1} v. \end{aligned}$$

D'où  $\mathcal{P}(k+1)$ .

Par récurrence, pour tout  $k \in \mathbb{N}$ ,  $\mathcal{P}(k)$  est vraie.

On écrit  $P = \sum_{i=0}^n a_i X^i$ .

Alors  $P(f) = \sum_{i=0}^n a_i f^i$ .

Donc

$$\begin{aligned} P(f)(v) &= \sum_{i=0}^n a_i f^i(v) \\ &= \sum_{i=0}^n a_i (\lambda^i v) \\ &= v \sum_{i=0}^n a_i \lambda^i \\ &= P(\lambda) v. \end{aligned}$$

■

Si  $P \in \mathbb{K}[X]$ , on note  $Z_{\mathbb{K}}(P)$  l'ensemble des racines de  $P$  dans  $\mathbb{K}$ .

---

**Proposition 5.11**

Soit  $f \in \mathcal{L}(E)$ .

Si  $P$  est un polynôme annulateur de  $f$ , alors  $\text{Sp}(f) \subseteq Z_{\mathbb{K}}(P)$ .

---

*Démonstration 5.12*

Il existe  $v \neq 0$  tel que  $f(v) = \lambda v$ .

D'après le lemme précédent,  $P(f)(v) = P(\lambda)v$ .

Or  $P(f) = 0$  donc  $P(\lambda)v = 0$ .

Or  $v \neq 0$  donc  $P(\lambda) = 0$ .

Donc  $\lambda \in Z_{\mathbb{K}}(P)$ .

■

---

*Remarque 5.13*

Attention ! La réciproque est fautive. Contre-exemple : le polynôme  $P = X^2 - 1$  est annulateur de  $\text{id}_E$  et pourtant  $-1$ , qui est racine de  $P$ , n'est pas valeur propre de  $\text{id}_E$ .

---

**Exercice 5.14**

Soit  $n \geq 2$ . Pour  $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ , on pose  $f(M) = M + M^T + \text{tr}(M)I_n$  :  $f$  est clairement un endomorphisme de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

Déterminez un polynôme annulateur de  $f$  de degré 3 et déduisez-en les valeurs propres de  $f$ .

### 5.1.3 Sous-espaces propres

---

#### Proposition 5.15

Soient  $f \in \mathcal{L}(E)$  et  $\lambda \in \mathbb{K}$ .

Alors  $\lambda$  est valeur propre de  $f$  ssi  $\ker(f - \lambda \text{id}_E) \neq \{0\}$ , autrement dit ssi  $f - \lambda \text{id}_E$  n'est pas injectif.

---

#### Démonstration 5.16

On a

$$\begin{aligned}\lambda \in \text{Sp}(f) &\iff \exists v \in E, v \neq 0 \text{ et } f(v) = \lambda v \\ &\iff \exists v \in E, v \neq 0 \text{ et } f(v) - \lambda v = 0 \\ &\iff \exists v \in E, v \neq 0 \text{ et } (f - \lambda \text{id}_E)(v) = 0 \\ &\iff \exists v \in E, v \neq 0 \text{ et } v \in \ker(f - \lambda \text{id}_E) \\ &\iff \ker(f - \lambda \text{id}_E) \neq \{0\} \\ &\iff f - \lambda \text{id}_E \text{ non-injective.} \quad \blacksquare\end{aligned}$$

---

#### Définition 5.17

Soit  $f \in \mathcal{L}(E)$ .

Si  $\lambda \in \text{Sp}(f)$ , le noyau  $\ker(f - \lambda \text{id}_E)$  est appelé le sous-espace propre associé à la valeur propre  $\lambda$ . Il est souvent noté  $\text{sep}(f, \lambda)$ .

Par conséquent,  $\text{sep}(f, \lambda)$  est l'ensemble des vecteurs propres associés à la valeur propre  $\lambda$  auquel on ajoute le vecteur nul.

---

#### Remarque 5.18

Un cas particulier important : 0 est valeur propre ssi  $f$  n'est pas injective.

---

#### Exercice 5.19

Soit  $u$  un endomorphisme ayant pour matrice  $M = \begin{pmatrix} -3 & 4 & -4 \\ 4 & -3 & 3 \\ 4 & -4 & 4 \end{pmatrix}$  dans une certaine base  $\mathcal{B}$ .

Calculez  $M^3 + 2M^2 - 3M$ . Déduisez-en les valeurs propres de  $u$  puis déterminez les sous-espaces propres associés.

---

#### Proposition 5.20

Tout sous-espace propre d'un endomorphisme est stable par cet endomorphisme. L'endomorphisme induit sur un sous-espace propre est alors une homothétie.

---

*Démonstration 5.21*

Soit  $v \in \text{sep}(f, \lambda)$ .

On a  $f(v) = \lambda v$ .

Donc  $f(f(v)) = \lambda f(v)$ .

Donc  $f(v) \in \text{sep}(f, \lambda)$ .

Donc le sous-espace propre  $\text{sep}(f, \lambda)$  est stable par  $f$ .

De plus, l'endomorphisme induit par  $f$  sur ce sous-espace est

$$\begin{array}{ccc} \text{sep}(f, \lambda) & \longrightarrow & \text{sep}(f, \lambda) \\ v & \longmapsto & f(v) = \lambda v \end{array}$$

i.e. l'homothétie de rapport  $\lambda$ . ■

---

### **Théorème 5.22**

Soient  $f \in \mathcal{L}(E)$  et  $\lambda_1, \dots, \lambda_p$  des valeurs propres distinctes de  $f$ .

Alors les sous-espaces propres  $(\text{sep}(f, \lambda_i))_{1 \leq i \leq p}$  sont en somme directe.

Autrement dit, toute famille de vecteurs propres associés à des valeurs propres distinctes est libre.

---

*Démonstration 5.23*

Soit  $(v_1, \dots, v_p) \in \prod_{i=1}^p \text{sep}(f, \lambda_i)$  tel que  $v_1 + \dots + v_p = 0$  (1).

On veut montrer que  $v_1 = \dots = v_p = 0$ .

On applique  $f$  à (1) :  $f(v_1) + \dots + f(v_p) = 0$  i.e.  $\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_p v_p = 0$ .

On réitère  $p - 2$  fois et on obtient le système suivant :

$$\left\{ \begin{array}{l} v_1 + \dots + v_p = 0 \\ \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_p v_p = 0 \\ \lambda_1^2 v_1 + \dots + \lambda_p^2 v_p = 0 \\ \vdots \\ \lambda_1^{p-1} v_1 + \dots + \lambda_p^{p-1} v_p = 0 \end{array} \right.$$

La matrice de ce système linéaire est

$$\begin{pmatrix} 1 & \dots & \dots & \dots & 1 \\ \lambda_1 & \dots & \dots & \dots & \lambda_p \\ \lambda_1^2 & \dots & \dots & \dots & \lambda_p^2 \\ \vdots & & & & \vdots \\ \lambda_1^{p-1} & \dots & \dots & \dots & \lambda_p^{p-1} \end{pmatrix}$$

*i.e.* une matrice de Vandermonde inversible car les  $\lambda_i$  sont distincts donc le système a une unique solution  $(v_1, \dots, v_p) = (0, \dots, 0)$ . ■

---

*Remarque 5.24*

Quand on demande de déterminer les éléments propres d'un endomorphisme, on demande de déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres associés, *i.e.* les sous-espaces propres.

À partir de maintenant, il est toujours supposé que  $E$  est de dimension finie  $n$

## 5.2 Polynôme caractéristique d'un endomorphisme

### 5.2.1 Caractérisation des valeurs propres en dimension finie

---

**Proposition 5.25**

Soient  $f \in \mathcal{L}(E)$  et  $\lambda \in \mathbb{K}$ . Alors

$$\lambda \in \text{Sp}(f) \iff \text{rg}(f - \lambda \text{id}_E) < n.$$

Dans ce cas,  $\dim \text{sep}(f, \lambda) = n - \text{rg}(f - \lambda \text{id}_E)$ .

---

*Démonstration 5.26*

D'après le théorème du rang, on a

$$n = \underbrace{\dim \ker(f - \lambda \text{id}_E)}_{=\dim \text{sep}(f, \lambda)} + \text{rg}(f - \lambda \text{id}_E).$$

Donc  $\dim \text{sep}(f, \lambda) = n - \text{rg}(f - \lambda \text{id}_E)$ .

On obtient l'inégalité voulue grâce à la Proposition 5.15. ■

### 5.2.2 Définition et lien avec les valeurs propres

---

**Définition 5.27**

Soit  $f \in \mathcal{L}(E)$ .

On appelle polynôme caractéristique de  $f$  le polynôme  $\chi_f = \det(X \text{id}_E - f)$ .

La notation  $\chi_f$  est très courante : elle est à connaître.

---

**Théorème 5.28**

Soit  $f \in \mathcal{L}(E)$ .

Alors  $\chi_f$  est un polynôme unitaire de degré  $n$  de  $\mathbb{K}[X]$  et les valeurs propres de  $f$  sont exactement les racines dans  $\mathbb{K}$  de  $\chi_f : Z_{\mathbb{K}}(\chi_f) = \text{Sp}(f)$ .

Par conséquent, un endomorphisme d'un espace de dimension  $n$  a au plus  $n$  valeurs propres distinctes.

---

*Démonstration 5.29*

On choisit une base  $\mathcal{B}$  de  $E$  et on pose  $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  la matrice de  $f$  dans  $\mathcal{B}$ .

On a

$$\begin{aligned}
\chi_f &= \det(\text{Id}_E - f) \\
&= \det(XI_n - A) \\
&= \begin{vmatrix} X - a_{11} & -a_{12} & \dots & -a_{1n} \\ -a_{21} & X - a_{22} & \dots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & -a_{n-1n} \\ -a_{n1} & \dots & -a_{nn-1} & X - a_{nn} \end{vmatrix}
\end{aligned}$$

On pose  $c_{ij} = \begin{cases} -a_{ij} & \text{si } i \neq j \\ X - a_{ii} & \text{sinon} \end{cases}$

Alors

$$\begin{aligned}
\chi_f &= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n c_{i\sigma(i)} \\
&= \varepsilon(\text{id}) \prod_{i=1}^n c_{ii} + \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n \setminus \{\text{id}\}} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n c_{i\sigma(i)}
\end{aligned}$$

On remarque que si  $\sigma \in \mathfrak{S}_n$  alors  $\sigma$  a  $n$  points fixes si  $\sigma = \text{id}$  et  $\sigma$  a moins de  $n - 2$  points fixes sinon donc si  $\sigma \neq \text{id}$ , il existe au moins deux entiers  $i, j \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$  tels que  $\sigma(i) \neq i$  et  $\sigma(j) \neq j$ .

Donc pour toute permutation  $\sigma \neq \text{id}$ , parmi les facteurs du produit  $\prod_{i=1}^n a_{i\sigma(i)}$ , il en existe au moins

deux qui sont de la forme  $a_{??}$  donc  $\prod_{i=1}^n c_{i\sigma(i)}$  est un polynôme de degré au plus  $n - 2$ .

Donc  $\deg \chi_f = n$  et  $\chi_f$  est unitaire.

De plus, on a

$$\begin{aligned}
\lambda \in \text{Sp}(f) &\iff f - \lambda \text{id}_E \text{ n'est pas injectif} \\
&\iff f - \lambda \text{id}_E \text{ n'est pas bijectif} \\
&\iff \det(f - \lambda \text{id}_E) = 0 \\
&\iff \det(\lambda \text{id}_E - f) = 0 \\
&\iff \chi_f(\lambda) = 0.
\end{aligned}$$

) dimension finie

■

---

**Exercice 5.30**

Montrez que si  $\dim E = 2$ , alors pour tout  $f \in \mathcal{L}(E)$ ,  $\chi_f = X^2 - \operatorname{tr}(f)X + \det f$ .

---

**Exercice 5.31**

Calculez le polynôme caractéristique d'un endomorphisme de matrice  $\begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$  et donnez ses valeurs propres.

---

**Exercice 5.32**

Soient  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  une base de  $E$ ,  $s = \sum_{i=1}^n e_i$  et  $f \in \mathcal{L}(E)$  tel que pour tout  $j \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$ ,  $f(e_j) = e_j + s$ .

Calculez son polynôme caractéristique et ses éléments propres.

On peut noter un lien avec la trace et le déterminant.

---

**Proposition 5.33**

Soit  $f \in \mathcal{L}(E)$ .

Alors  $\chi_f = X^n - \operatorname{tr}(f)X^{n-1} + \dots + (-1)^n \det f$ .

---

*Démonstration 5.34*

► On a  $\chi_f = \det(X\operatorname{Id}_E - f)$  donc

$$\chi_f(0) = \det(-f) = (-1)^n \det f$$

est le coefficient constant de  $\chi_f$ .

► On avait  $\chi_f = \prod_{i=1}^n (X - a_{ii}) + Q$  avec  $\deg Q \leq n - 2$  (cf. Démonstration 5.29).

Donc le coefficient d'indice  $n - 1$  est celui du produit  $\prod_{i=1}^n (X - a_{ii})$ .

Or on a

$$\begin{aligned} (X - a_{11}) \dots (X - a_{nn}) &= X^n + (-a_{11} - \dots - a_{nn})X^{n-1} + \dots \\ &= X^n - \operatorname{tr}(f)X^{n-1} + \dots \end{aligned}$$

■



### 5.2.3 Ordre de multiplicité et dimension du sous-espace propre

---

**Définition 5.35**

Soient  $f \in \mathcal{L}(E)$  et  $\lambda \in \text{Sp}(f)$ .

On appelle ordre de multiplicité de la valeur propre  $\lambda$  son ordre de multiplicité en tant que racine de  $\chi_f$ .

---

**Proposition 5.36**

Soient  $f \in \mathcal{L}(E)$ ,  $F$  un sous-espace vectoriel de  $E$  stable par  $f$  et  $g$  l'endomorphisme induit par  $f$  dans  $F$ .

Alors  $\chi_g$  divise  $\chi_f$ .

---

*Démonstration 5.37*

On choisit une base  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p, e_{p+1}, \dots, e_n)$  de  $E$  adaptée à  $F$  :  $(e_1, \dots, e_p)$  est une base de  $F$ .

Alors

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} A & ? \\ 0 & B \end{pmatrix}$$

où  $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$  et  $B \in \mathcal{M}_{n-p}(\mathbb{K})$ .

On remarque que  $A = \text{Mat}_{(e_1, \dots, e_p)}(g)$ .

Alors

$$\begin{aligned} \chi_f &= \begin{vmatrix} XI_p - A & -? \\ 0 & XI_{n-p} - B \end{vmatrix} \\ &= \underbrace{\det(XI_p - A)}_{=\chi_g} \det(XI_{n-p} - B). \end{aligned}$$

Donc  $\chi_g \mid \chi_f$ . ■

Une conséquence très importante de ce résultat est le théorème suivant.

---

**Théorème 5.38**

Soient  $f \in \mathcal{L}(E)$  et  $\lambda \in \text{Sp}(f)$ .

Si  $\lambda$  est une valeur propre d'ordre  $\alpha$ , alors  $1 \leq \dim \text{sep}(f, \lambda) \leq \alpha$ .

---

**Démonstration 5.39**

Si  $\lambda \in \text{Sp}(f)$  alors  $\text{sep}(f, \lambda)$  est stable par  $f$  et l'endomorphisme induit par  $f$  dans  $\text{sep}(f, \lambda)$  est l'homothétie de rapport  $\lambda : g = \lambda \text{id}$ .

On note  $p = \dim \text{sep}(f, \lambda)$ .

On a

$$\chi_g = \begin{vmatrix} X - \lambda & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & X - \lambda \end{vmatrix}_{[p]} = (X - \lambda)^p.$$

D'après la Proposition 5.36,  $(X - \lambda)^p \mid \chi_f$  donc  $p \leq \alpha$ .

De plus, on a  $1 \leq p$  car  $\text{sep}(f, \lambda) \neq \{0\}$ . ■

**Exercice 5.40**

Soit  $f$  un endomorphisme de matrice  $\begin{pmatrix} 3 & -4 & -5 \\ -1 & 3 & 2 \\ 1 & -2 & -1 \end{pmatrix}$ . Déterminez les valeurs propres de  $f$ , leur multiplicité et la dimension des sous-espaces propres associés.

## 5.2.4 Endomorphisme scindé

---

**Définition 5.41**

On dit qu'un endomorphisme de  $E$  est scindé quand son polynôme caractéristique est scindé dans  $\mathbb{K}[X]$ .

Dans le cas d'un endomorphisme scindé, on connaît alors la somme et le produit des valeurs propres.

**Proposition 5.42**

Si  $f \in \mathcal{L}(E)$  est scindé et a pour valeurs propres  $\lambda_1, \dots, \lambda_p$  avec les ordres de multiplicité  $\alpha_1, \dots, \alpha_p$ , alors

$$\text{tr } f = \sum_{k=1}^p \alpha_k \lambda_k \quad \text{et} \quad \det f = \prod_{k=1}^p \lambda_k^{\alpha_k}.$$

**Démonstration 5.43**

Relations coefficients/racines. ■

Si  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$  alors on est dans ce cas, car tous les polynômes de  $\mathbb{C}[X]$  sont scindés dans  $\mathbb{C}[X]$  d'après le théorème de d'Alembert-Gauss.

Mais si  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ , alors il faut se méfier des raisonnements hâtifs : comme un  $\mathbb{R}$ -endomorphisme peut ne pas avoir de valeurs propres réelles, la trace et le déterminant peuvent ne pas avoir de rapport avec les valeurs propres.

---

**Exercice 5.44**

Soit  $f$  un endomorphisme d'un  $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension  $n \geq 2$  dont la matrice dans une base est remplie par ligne de 1, ligne de 2, etc. Sans calculer le polynôme caractéristique, déterminez les valeurs propres complexes de  $f$ , leur multiplicité et la dimension des sous-espaces propres associés.

---

*Remarque 5.45*

Dans le langage courant, on dit souvent que la trace est la somme des valeurs propres. Cette phrase est correcte seulement si l'on sous-entend que l'on parle de la somme des valeurs propres comptées chacune avec son ordre de multiplicité.

On rencontre en fait deux types de résultats à propos des valeurs propres :

- ceux où l'on parle des valeurs propres distinctes (comme le Théorème 5.28) ;
- ceux où l'on parle des valeurs propres comptées selon leur multiplicité (comme la Proposition 5.42).

Il faut donc être très attentif à la façon dont on considère les valeurs propres.

## 5.3 Éléments propres d'une matrice carrée

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . Les matrices-colonnes d'ordre  $n$  sont les matrices de  $\mathcal{M}_{n1}(\mathbb{K})$ , espace souvent identifié avec  $\mathbb{K}^n$ .

### 5.3.1 Valeurs propres et vecteurs propres

---

**Définition 5.46**

Soient  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  et  $\lambda \in \mathbb{K}$ .

On dit que  $\lambda$  est valeur propre de  $A$  quand il existe une matrice-colonne  $X$  non-nulle telle que  $AX = \lambda X$ .

Si  $\lambda$  est une valeur propre de  $A$ , alors toute matrice-colonne non-nulle  $X$  telle que  $AX = \lambda X$  est appelée vecteur propre associé à la valeur propre  $\lambda$ .

---

*Exemple 5.47*

- Pour tout  $\alpha \in \mathbb{K}$ ,  $\alpha I_n$  a pour unique valeur propre  $\alpha$  et toute matrice-colonne non-nulle est un vecteur propre associé.
- Si  $A$  est une matrice diagonale, alors ses valeurs propres sont les coefficients diagonaux et des vecteurs propres associés sont les colonnes remplies de 0 sauf un seul coefficient égal à 1.

L'ensemble des valeurs propres d'une matrice  $A$  est appelé le spectre de  $A$  et est noté  $\text{Sp}_{\mathbb{K}}(A)$  ou plus simplement  $\text{Sp}(A)$ .

Mais comme une matrice à coefficients réels est aussi une matrice à coefficients complexes, il vaut mieux savoir si on parle des valeurs propres réelles ou complexes. Il est donc préférable d'indiquer clairement le corps de base, comme le montre le résultat suivant.

---

**Proposition 5.48**

Soient  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  et  $\mathbb{K}'$  une extension de  $\mathbb{K}$  dans  $\mathbb{C}$ .

Alors  $\text{Sp}_{\mathbb{K}}(A) \subseteq \text{Sp}_{\mathbb{K}'}(A)$ .

---

**Proposition 5.49**

Soient  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ,  $f \in \mathcal{L}(E)$  et  $\mathcal{B}$  une base de  $E$ .

Si  $A = \underset{\mathcal{B}}{\text{Mat}}(f)$ , alors  $\text{Sp}_{\mathbb{K}}(A) = \text{Sp}(f)$ .

Par conséquent, deux matrices semblables ont les mêmes valeurs propres (mais attention, pas forcément les mêmes vecteurs propres).

### 5.3.2 Lien avec les polynômes annulateurs

---

**Proposition 5.50**

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

Si  $P$  est un polynôme annulateur de  $A$ , alors  $\text{Sp}_{\mathbb{K}}(A) \subseteq Z_{\mathbb{K}}(P)$ .

Attention ! La réciproque est fausse. Contre-exemple : le polynôme  $P = X^2 - 1$  est annulateur de  $I_n$  et pourtant  $-1$ , qui est racine de  $P$ , n'est pas valeur propre de  $I_n$ .

### 5.3.3 Sous-espaces propres

---

**Proposition 5.51**

Soient  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  et  $\lambda \in \mathbb{K}$ .

Alors  $\lambda$  est valeur propre de  $A$  ssi  $A - \lambda I_n$  n'est pas inversible, autrement dit ssi  $\text{rg}(A - \lambda I_n) < n$  ou  $\det(A - \lambda I_n) = 0$ .

Si  $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(A)$ , le sous-espace propre associé à la valeur propre  $\lambda$  est l'ensemble des vecteurs propres associés à la valeur propre  $\lambda$  auquel on ajoute le vecteur nul. Il est souvent noté  $\text{sep}_{\mathbb{K}}(A, \lambda)$  :

$$\text{sep}_{\mathbb{K}}(A, \lambda) = \{X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) \mid AX = \lambda X\}.$$

---

**Proposition 5.52**

Soient  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  et  $\lambda \in \mathbb{K}$ . Alors

$$\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(A) \iff \text{rg}(A - \lambda I_n) < n.$$

Dans ce cas,  $\dim \text{sep}_{\mathbb{K}}(A, \lambda) = n - \text{rg}(A - \lambda I_n)$ .

Attention ! Dans la relation  $\dim \text{sep}_{\mathbb{K}}(A, \lambda) = n - \text{rg}(A - \lambda I_n)$ , c'est  $n$ , pas  $n^2$  ! Il s'agit de la dimension de  $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ , pas celle de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

---

**Remarque 5.53**

Un cas particulier important : 0 est valeur propre ssi  $A$  n'est pas inversible, c'est-à-dire ssi  $\text{rg } A < n$ .

---

**Théorème 5.54**

Soient  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  et  $\lambda_1, \dots, \lambda_p$  des valeurs propres distinctes de  $A$ .

Alors les sous-espaces propres  $(\text{sep}_{\mathbb{K}}(A, \lambda_i))_{1 \leq i \leq p}$  sont en somme directe.

Autrement dit, toute famille de vecteurs propres associés à des valeurs propres distinctes est libre.

---

**Remarque 5.55**

Quand on demande de déterminer les éléments propres d'une matrice, on demande de déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres associés, *i.e.* les sous-espaces propres.

---

## 5.4 Polynôme caractéristique d'une matrice carrée

### 5.4.1 Définition et lien avec les valeurs propres

---

**Définition 5.56**

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

On appelle polynôme caractéristique de  $A$  le polynôme  $\chi_A = \det(XI_n - A)$ .

---

**Proposition 5.57**

Soient  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ,  $f \in \mathcal{L}(E)$  et  $\mathcal{B}$  une base de  $E$ .

Si  $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ , alors  $\chi_A = \chi_f$ .

Par conséquent, deux matrices semblables ont le même polynôme caractéristique.

---

**Théorème 5.58**

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

Alors  $\chi_A$  est un polynôme unitaire de degré  $n$  de  $\mathbb{K}[X]$  et les valeurs propres de  $A$  sont exactement les racines de  $\chi_A$  dans  $\mathbb{K}$ .

Par conséquent, une matrice carrée de taille  $(n, n)$  a au plus  $n$  valeurs propres distinctes.

---

**Corollaire 5.59**

L'ensemble  $\text{GL}_n(\mathbb{K})$  est dense dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

---

*Démonstration 5.60*

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

On veut montrer qu'il existe une suite de matrices inversibles qui converge vers  $A$ .

Considérons la suite  $\left(A + \frac{1}{k}I_n\right)_{k \in \mathbb{N}^*}$ .

On a  $\lim_{k \rightarrow +\infty} \left(A + \frac{1}{k}I_n\right) = A$ .

Montrons qu'à partir d'un certain rang, cette suite est constituée de matrices inversibles.

Pour tout  $k \in \mathbb{N}^*$ ,  $A + \frac{1}{k}I_n$  n'est pas inversible  $\iff \frac{-1}{k}$  est valeur propre de  $A$ .

- ▷ Si  $A$  n'a que des valeurs propres positives ou nulles, alors comme pour tout  $k \in \mathbb{N}^*$ ,  $\frac{-1}{k} < 0$ ,  $\frac{-1}{k}$  n'est pas valeur propre.
- ▷ Si  $A$  possède au moins une valeur propre strictement négative, on pose  $r = \min \{|\lambda| \mid \lambda \in \text{Sp}(A) \cap \mathbb{R}_-^*\} > 0$ .  
Dès que  $\frac{1}{k} < r$ , il est certain que  $\frac{-1}{k}$  n'est pas valeur propre. ■

On peut noter un lien avec la trace et le déterminant.

---

**Proposition 5.61**

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

Alors  $\chi_A = X^n - \text{tr}(A)X^{n-1} + \dots + (-1)^n \det A$ .

## 5.4.2 Ordre de multiplicité et dimension du sous-espace propre

---

### Définition 5.62

Soient  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  et  $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(A)$ .

On appelle ordre de multiplicité de la valeur propre  $\lambda$  son ordre de multiplicité en tant que racine de  $\chi_A$ .

---

### Théorème 5.63

Soient  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  et  $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(A)$ .

Si  $\lambda$  est une valeur propre d'ordre  $\alpha$ , alors  $1 \leq \dim \text{sep}_{\mathbb{K}}(A, \lambda) \leq \alpha$ .

---

### Proposition 5.64

Soient  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ,  $f \in \mathcal{L}(E)$  et  $\mathcal{B}$  une base de  $E$ .

Si  $A = \underset{\mathcal{B}}{\text{Mat}}(f)$ , alors  $\dim \text{sep}_{\mathbb{K}}(A, \lambda) = \dim \text{sep}(f, \lambda)$ .

Par conséquent, deux matrices semblables ont des sous-espaces propres de même dimension (mais pas les mêmes vecteurs propres).

## 5.4.3 Matrice scindée

---

### Définition 5.65

On dit qu'une matrice de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  est scindée quand son polynôme caractéristique est scindé dans  $\mathbb{K}[X]$ .

Dans le cas d'une matrice scindée, on connaît alors la somme et le produit des valeurs propres.

---

### Proposition 5.66

Si  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  est scindée et a pour valeurs propres  $\lambda_1, \dots, \lambda_p$  avec les ordres de multiplicité  $\alpha_1, \dots, \alpha_p$ , alors

$$\text{tr } A = \sum_{k=1}^p \alpha_k \lambda_k \quad \text{et} \quad \det A = \prod_{k=1}^p \lambda_k^{\alpha_k}.$$

Si  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ , alors on est dans ce cas, car tous les polynômes de  $\mathbb{C}[X]$  sont scindés dans  $\mathbb{C}[X]$  d'après le théorème de d'Alembert-Gauss.

Mais si  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ , alors il faut se méfier des raisonnements hâtifs : comme un polynôme à coefficients réels peut ne pas avoir de racines réelles, la trace et le déterminant peuvent ne pas avoir de rapport avec les valeurs propres.

## 5.5 Endomorphismes diagonalisables, matrices diagonalisables

### 5.5.1 Définition

---

**Définition 5.67**

Soient  $f \in \mathcal{L}(E)$  et  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

On dit que  $f$  est diagonalisable quand il existe une base de  $E$  constituée de vecteurs propres de  $f$ .

On dit que  $A$  est diagonalisable dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  (ou  $\mathbb{K}$ -diagonalisable) quand il existe une base de  $\mathcal{M}_{n1}(\mathbb{K})$  constituée de vecteurs propres de  $A$ .

D'après le lien entre les endomorphismes et les matrices carrées, un endomorphisme est diagonalisable ssi sa matrice dans n'importe quelle base est diagonalisable.

---

**Exercice 5.68**

La matrice  $\begin{pmatrix} 1 & \sqrt{3} \\ -\sqrt{3} & 1 \end{pmatrix}$  est-elle  $\mathbb{R}$ -diagonalisable ?  $\mathbb{C}$ -diagonalisable ?

---

**Exercice 5.69**

Montrez que la matrice  $A = \begin{pmatrix} 5 & -8 & -4 \\ 8 & -15 & -8 \\ -10 & 20 & 11 \end{pmatrix}$  est diagonalisable.

---

**Exercice 5.70**

Même exercice avec  $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 4 & -2 & 4 \end{pmatrix}$ .

---

**Exercice 5.71**

La matrice  $C = \begin{pmatrix} 11 & 7 & -3 \\ 11 & 7 & -3 \\ 66 & 42 & -18 \end{pmatrix}$  est-elle diagonalisable ?

---

**Proposition 5.72**

*Si un endomorphisme (une matrice) est diagonalisable, alors il (elle) est scindé(e).*

Mais la réciproque est fausse.



## 5.5.2 Caractérisations équivalentes

On note  $\mathcal{D}_n(\mathbb{K})$  l'ensemble des matrices diagonales de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

### Proposition 5.73

Soient  $f \in \mathcal{L}(E)$  et  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

$f$  est diagonalisable ssi il existe une base  $\mathcal{B}$  de  $E$  telle que  $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) \in \mathcal{D}_n(\mathbb{K})$ . Dans ce cas, les valeurs propres de  $f$  sont les éléments diagonaux de cette matrice.

$A$  est  $\mathbb{K}$ -diagonalisable ssi elle est  $\mathbb{K}$ -semblable à une matrice diagonale, i.e. il existe  $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$  et  $D \in \mathcal{D}_n(\mathbb{K})$  tel que  $A = PDP^{-1}$ . Dans ce cas, les valeurs propres de  $A$  sont les éléments diagonaux de  $D$ .

### Démonstration 5.74

Si  $f$  est diagonalisable, il existe une base  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  de  $E$  constituée de vecteurs propres, i.e.

$$\text{pour tout } j \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, f(e_j) = \lambda_j e_j$$

où  $\lambda_j$  est la valeur propre associée à  $e_j$ .

Donc

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix} \in \mathcal{D}_n(\mathbb{K}).$$

Et réciproquement. ■

### Exemple 5.75

- Toute matrice diagonale est diagonalisable, car elle est semblable à elle-même.
- Les projecteurs et les symétries sont diagonalisables.

### Remarque 5.76

Quitte à changer l'ordre des vecteurs dans la base, on peut ranger les valeurs propres sur la diagonale dans l'ordre qu'on veut.

### Exemple 5.77

Si  $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ ,  $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 3 \end{pmatrix}$  et  $D = P^{-1}AP$ , alors la colonne 1 de  $P$  est un vecteur propre de  $A$  pour la valeur propre 1 et les deux autres sont des vecteurs propres pour la valeur propre 3, donc en posant  $Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ , on a  $Q^{-1}AQ = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ .

---

**Lemme 5.78**

Soit  $f \in \mathcal{L}(E)$  diagonalisable : il existe une base de  $E$  dans laquelle la matrice  $D$  de  $f$  est diagonale.

Les valeurs propres de  $f$  sont les éléments diagonaux de  $D$  et si  $\lambda$  est un tel nombre, alors la dimension de  $\text{sep}(f, \lambda)$  est le nombre d'occurrences de  $\lambda$  dans la diagonale de  $D$ .

On en déduit les théorèmes suivants.

---

**Théorème 5.79**

Soit  $f \in \mathcal{L}(E)$ .

Il y a équivalence entre les propositions suivantes :

- ▷  $f$  est diagonalisable
- ▷ les sous-espaces propres de  $f$  sont supplémentaires dans  $E$
- ▷  $\sum_{\lambda \in \text{Sp}(f)} \dim \text{sep}(f, \lambda) = n$

---

*Démonstration 5.80*

Les sous-espaces propres d'un endomorphisme sont en somme directe donc ils sont supplémentaires ssi la somme de leurs dimensions est celle de l'espace  $E$ . ■

Et sa version matricielle.

---

**Théorème 5.81**

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

Il y a équivalence entre les propositions suivantes :

- ▷  $A$  est diagonalisable dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$
- ▷ les sous-espaces propres de  $A$  dans  $\mathcal{M}_{n1}(\mathbb{K})$  sont supplémentaires dans  $\mathcal{M}_{n1}(\mathbb{K})$
- ▷  $\sum_{\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(A)} \dim \text{sep}_{\mathbb{K}}(A, \lambda) = n$

---

**Exercice 5.82**

On pose  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 4 & -2 & 4 \end{pmatrix}$ . On a vu à l'Exercice 5.70 que  $A$  est diagonalisable. Diagonalisez  $A$ .

### 5.5.3 Lien avec le polynôme caractéristique

---

**Théorème 5.83**

Soit  $f \in \mathcal{L}(E)$ .

Il y a équivalence entre les propositions suivantes :

- ▷  $f$  est diagonalisable
- ▷  $f$  est scindé et pour tout  $\lambda \in \text{Sp}(f)$ , la dimension de  $\text{sep}(f, \lambda)$  est égale à l'ordre de multiplicité de  $\lambda$

---

*Démonstration 5.84*

Si  $\lambda \in \text{Sp}(f)$ , on note  $\omega(\lambda)$  l'ordre de multiplicité de la valeur propre  $\lambda$ .

$\Rightarrow$

Si  $f$  est diagonalisable alors  $\sum_{\lambda \in \text{Sp}(f)} \dim \text{sep}(f, \lambda) = n = \sum_{\lambda \in \text{Sp}(f)} \omega(\lambda)$ .

Donc  $\sum_{\lambda \in \text{Sp}(f)} \underbrace{(\omega(\lambda) - \dim \text{sep}(f, \lambda))}_{\geq 0 \text{ d'après le Théorème 5.38}} = 0$ .

Or une somme de réels positifs est nulle ssi tous ces réels sont nuls donc

$$\forall \lambda \in \text{Sp}(f), \quad \omega(\lambda) = \dim \text{sep}(f, \lambda).$$

$\Leftarrow$

Si  $f$  est scindé et  $\forall \lambda \in \text{Sp}(f), \quad \omega(\lambda) = \dim \text{sep}(f, \lambda)$ , alors  $\chi_f$  est scindé.

Donc  $\sum_{\lambda \in \text{Sp}(f)} \omega(\lambda) = \deg \chi_f = n$ .

Donc  $\sum_{\lambda \in \text{Sp}(f)} \dim \text{sep}(f, \lambda) = n$ .

Donc  $f$  est diagonalisable d'après le Théorème 5.79. ■

Et sa version matricielle.

---

**Théorème 5.85**

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

Il y a équivalence entre les propositions suivantes :

- ▷  $A$  est diagonalisable dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$

- $A$  est scindée et pour tout  $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(A)$ , la dimension de  $\text{sep}_{\mathbb{K}}(A, \lambda)$  est égale à l'ordre de multiplicité de  $\lambda$

Dans le cas où  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ , la condition « être scindé » est automatiquement satisfaite.

Un cas particulier très courant.

### Proposition 5.86

Si un endomorphisme de  $E$  possède exactement  $n$  valeurs propres distinctes, alors il est diagonalisable.

Si une matrice de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  possède exactement  $n$  valeurs propres distinctes dans  $\mathbb{K}$ , alors elle est diagonalisable dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

### Exercice 5.87

Montrez que la matrice  $\begin{pmatrix} -4 & 8 & 22 \\ -2 & 3 & 4 \\ -1 & 2 & 7 \end{pmatrix}$  est diagonalisable.

### Théorème 5.88 (Théorème spectral)

Si  $A$  est une matrice réelle symétrique, alors  $A$  est diagonalisable.

Démonstration 5.89

★★ Admis, sera démontré plus tard (cf. Démonstration 9.96) ★★

■

## 5.6 Lien entre diagonalisabilité et polynômes annulateurs

### 5.6.1 Racines du polynôme minimal

### Proposition 5.90

Soit  $f \in \mathcal{L}(E)$ . Les racines de  $\mu_f$  sont exactement les valeurs propres de  $f$  :  $Z_{\mathbb{K}}(\mu_f) = \text{Sp}(f)$ .

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ . Les racines dans  $\mathbb{K}$  de  $\mu_A$  sont exactement les valeurs propres dans  $\mathbb{K}$  de  $A$  :  $Z_{\mathbb{K}}(\mu_A) = \text{Sp}_{\mathbb{K}}(A)$ .

---

*Démonstration 5.91*

$\supseteq$  Cf. Proposition 5.11 car  $\mu_f$  est un polynôme annulateur de  $f$ .

$\subseteq$

Soit  $\lambda \in Z_{\mathbb{K}}(\mu_f)$ .

Alors  $X - \lambda \mid \mu_f$ , i.e. il existe  $Q \in \mathbb{K}[X]$  tel que  $\mu_f = (X - \lambda)Q$ .

Alors  $\mu_f(f) = 0 = (f - \lambda \text{id}_E) \circ Q(f)$ .

Donc pour tout  $x \in E$ ,  $(f - \lambda \text{id}_E)(Q(f)(x)) = 0$ .

Donc  $\text{Im } Q(f) \subseteq \ker(f - \lambda \text{id}_E)$ .

Or  $\deg Q < \deg \mu_f$  donc  $Q$  n'est pas annulateur de  $f$ , i.e.  $Q(f) \neq 0$ , i.e.  $\text{Im } Q(f) \neq \{0\}$ .

Donc  $\ker(f - \lambda \text{id}_E) \neq \{0\}$ , i.e.  $\lambda \in \text{Sp}(f)$ .

Donc  $Z_{\mathbb{K}}(\mu_f) \subseteq \text{Sp}(f)$ . ■

## 5.6.2 Lemme des noyaux

---

### Proposition 5.92

Soient  $f \in \mathcal{L}(E)$  et  $P, Q \in \mathbb{K}[X]$  tels que  $P \wedge Q = 1$ .

Alors  $\ker(PQ)(f) = \ker P(f) \oplus \ker Q(f)$ .

---

*Démonstration 5.93*

D'après le théorème de Bézout, il existe  $(U, V) \in \mathbb{K}[X]^2$  tel que  $UP + VQ = 1$ .

Donc  $(UP)(f) + (VQ)(f) = \text{id}_E$ , i.e.

$$U(f) \circ P(f) + V(f) \circ Q(f) = \text{id}_E \quad (1)$$

Soit  $x \in \ker P(f) \cap \ker Q(f)$ .

On a  $P(f)(x) = 0$  et  $Q(f)(x) = 0$ .

Donc, en appliquant (1) sur le vecteur  $x$ , on obtient

$$\begin{aligned} x &= U(f)(P(f)(x)) + V(f)(Q(f)(x)) \\ &= U(f)(0) + V(f)(0) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Donc  $\ker P(f)$  et  $\ker Q(f)$  sont en somme directe.

□

On a  $(PQ)(f) = P(f) \circ Q(f) = Q(f) \circ P(f)$ .

Donc  $\ker P(f) \subseteq \ker (PQ)(f)$  et  $\ker Q(f) \subseteq \ker (PQ)(f)$ .

Donc  $\ker P(f) \oplus \ker Q(f) \subseteq \ker (PQ)(f)$ .

□

Soit  $x \in \ker (PQ)(f)$ .

On veut montrer qu'il existe  $(a, b) \in \ker P(f) \times \ker Q(f)$  tel que  $x = a + b$ .

On applique (1) sur  $x$  :

$$x = U(f) \circ P(f)(x) + V(f) \circ Q(f)(x).$$

On pose  $a = V(f) \circ Q(f)(x)$ .

On a

$$P(f)(a) = P(f)(V(f) \circ Q(f)(x)) = (P(f) \circ V(f) \circ Q(f))(x).$$

Or  $\mathbb{K}[f]$  est une algèbre commutative donc

$$\begin{aligned} P(f)(a) &= (V(f) \circ P(f) \circ Q(f))(x) \\ &= V(f)(P(f) \circ Q(f)(x)) \\ &= V(f)((PQ)(f)(x)) \\ &= V(f)(0) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Donc  $a \in \ker P(f)$ .

De même,  $b = U(f) \circ P(f)(x) \in \ker Q(f)$ .

Finalement, on a

$$\ker (PQ)(f) = \ker P(f) \oplus \ker Q(f). \quad \blacksquare$$

### Proposition 5.94

Soient  $f \in \mathcal{L}(E)$  et  $P_1, \dots, P_k \in \mathbb{K}[X]$  premiers entre eux deux à deux. On pose  $P = \prod_{i=1}^k P_i$ .

Alors  $\ker P(f) = \bigoplus_{i=1}^k \ker P_i(f)$ .

---

*Démonstration 5.95*

On note  $\mathcal{P}(k)$  le prédicat énoncé.

- On a clairement  $\mathcal{P}(1)$  et  $\mathcal{P}(2)$  est vraie (*cf.* Proposition 5.92).
- Soit  $k \in \mathbb{N}^*$  tel que  $\mathcal{P}(k)$  soit vraie.

Soient  $P_1, \dots, P_{k+1} \in \mathbb{K}[X]$  premiers entre eux deux à deux.

On a  $P_1 \dots P_k \wedge P_{k+1} = 1$ .

D'après  $\mathcal{P}(2)$ , on a

$$\ker(P_1 \dots P_{k+1})(f) = \ker(P_1 \dots P_k)(f) \oplus \ker P_{k+1}(f).$$

Puis, par hypothèse de récurrence, on a

$$\ker(P_1 \dots P_k)(f) = \bigoplus_{i=1}^k \ker P_i(f).$$

Finalement, on a

$$\ker(P_1 \dots P_{k+1})(f) = \bigoplus_{i=1}^{k+1} \ker P_i(f)$$

d'où  $\mathcal{P}(k+1)$ .

- D'après le principe de récurrence, pour tout  $k \in \mathbb{N}^*$ ,  $\mathcal{P}(k)$  est vraie. ■

### 5.6.3 Application à la diagonalisabilité

---

#### Définition 5.96

Un polynôme est dit simplement scindé quand il est scindé et à racines simples.

---

#### Théorème 5.97

Soit  $f \in \mathcal{L}(E)$ .

Il y a équivalence entre les propositions suivantes :

( $\alpha$ )  $f$  est diagonalisable

( $\beta$ )  $\mu_f$  est simplement scindé

( $\gamma$ ) il existe un polynôme annulateur de  $f$  simplement scindé

( $\delta$ ) le polynôme  $\prod_{\lambda \in \text{Sp}(f)} (X - \lambda)$  est un polynôme annulateur de  $f$

---

*Démonstration 5.98* (( $\beta$ )  $\implies$  ( $\gamma$ ))

Immédiat car  $\mu_f$  est annulateur de  $f$ . ■

---

*Démonstration 5.99* (( $\gamma$ )  $\implies$  ( $\beta$ ))

Si  $P$  est simplement scindé et  $P(f) = 0$  alors  $\mu_f \mid P$  donc  $\mu_f$  est simplement scindé. ■

---

*Démonstration 5.100* (( $\beta$ )  $\implies$  ( $\delta$ ))

On sait que  $Z_{\mathbb{K}}(\mu_f) = \text{Sp}(f)$  donc si  $\mu_f$  est simplement scindé, alors  $\mu_f = \prod_{\lambda \in \text{Sp}(f)} (X - \lambda)$ . Or  $\mu_f$  est annulateur de  $f$ . ■

---

*Démonstration 5.101* (( $\delta$ )  $\implies$  ( $\gamma$ ))

Immédiat. ■

---

*Démonstration 5.102* (( $\alpha$ )  $\implies$  ( $\delta$ ))

Supposons  $f$  diagonalisable, i.e. il existe une base  $\mathcal{B}$  de  $E$  telle que  $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$  soit diagonale :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} \Lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & \Lambda_k \end{pmatrix} = D$$

où  $\lambda_1, \dots, \lambda_k$  sont les valeurs propres distinctes de  $f$  et pour tout  $i \in \llbracket 1 ; k \rrbracket$ ,  $\Lambda_i = \begin{pmatrix} \lambda_i & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & \lambda_i \end{pmatrix}$ .

On pose  $P = \prod_{i=1}^k (X - \lambda_i)$ .

Or on a pour tout  $Q \in \mathbb{K}[X]$ ,  $Q(D) = \begin{pmatrix} Q(\Lambda_1) & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & Q(\Lambda_k) \end{pmatrix}$



et pour tout  $Q \in \mathbb{K}[X]$ , pour tout  $i \in \llbracket 1 ; k \rrbracket$ ,  $Q(\Lambda_i) = \begin{pmatrix} Q(\lambda_i) & 0 & \dots & 0 \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & Q(\lambda_i) \end{pmatrix}$ .

En particulier,  $P(D) = 0$  car  $\{\lambda_1, \dots, \lambda_k\} = Z_{\mathbb{K}}(P)$ . ■

*Démonstration 5.103 (( $\delta$ )  $\implies$  ( $\alpha$ ))*

On pose  $\text{Sp}(f) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_k\}$  et pour tout  $i \in \llbracket 1 ; k \rrbracket$ ,  $P_i = X - \lambda_i$ .

Les polynômes  $P_1, \dots, P_k$  sont premiers entre eux deux à deux donc d'après le lemme des noyaux, on a

$$\underbrace{\ker(P_1 \dots P_k)(f)}_{=0} = \bigoplus_{i=1}^k \underbrace{\ker P_i(f)}_{=\text{sep}(f, \lambda_i)}.$$

D'où  $E = \bigoplus_{i=1}^k \text{sep}(f, \lambda_i)$ .

Donc d'après le Théorème 5.79,  $f$  est diagonalisable. ■

Et sa version matricielle.

### **Théorème 5.104**

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

Il y a équivalence entre les propositions suivantes :

- ▷  $A$  est diagonalisable dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$
- ▷  $\mu_A$  est simplement scindé
- ▷ il existe un polynôme annulateur de  $A$  simplement scindé dans  $\mathbb{K}[X]$
- ▷ le polynôme  $\prod_{\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(A)} (X - \lambda)$  est un polynôme annulateur de  $A$

### **Exercice 5.105**

On pose  $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ . Calculez  $(A + I_3)^3$ .  $A$  est-elle diagonalisable ?

### **Exercice 5.106**

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  telle que  $A^3 = I_n$ . Selon que  $\mathbb{K}$  soit égal à  $\mathbb{C}$  ou  $\mathbb{R}$ , à quelle condition  $A$  est-elle  $\mathbb{K}$ -diagonalisable ?

## 5.6.4 Diagonalisabilité d'un endomorphisme induit

### Proposition 5.107

Soient  $f \in \mathcal{L}(E)$ ,  $F$  un sous-espace vectoriel de  $E$  stable par  $f$  et  $g$  l'endomorphisme induit par  $f$  dans  $F$ .

Alors  $\mu_g$  divise  $\mu_f$ .

---

*Démonstration 5.108*

$$\begin{aligned} \text{On a } g : F &\longrightarrow F \\ x &\longmapsto f(x) \end{aligned}$$

Pour tout  $x \in F$ , pour tout  $P \in \mathbb{K}[X]$ ,  $P(g)(x) = P(f)(x)$ .

Or  $\mu_f(f) = 0$  donc pour tout  $x \in F$ ,  $\mu_f(g)(x) = 0$ , i.e.  $\mu_f$  est annulateur de  $g$ .

Donc  $\mu_g \mid \mu_f$ . ■

---

### Corollaire 5.109

Soient  $f \in \mathcal{L}(E)$  et  $F$  un sous-espace vectoriel de  $E$  stable par  $f$ .

Si  $f$  est diagonalisable, alors l'endomorphisme induit par  $f$  dans  $F$  est aussi diagonalisable.

---

*Démonstration 5.110*

Si  $f$  est diagonalisable, d'après le Théorème 5.97,  $\mu_f$  est simplement scindé.

Or  $\mu_g \mid \mu_f$  donc  $\mu_g$  est simplement scindé.

Donc  $g$  est diagonalisable d'après le Théorème 5.97. ■

---

*Remarque 5.111*

On a également :

$$\triangleright \text{Sp}(g) = Z_{\mathbb{K}}(\mu_g) \subseteq Z_{\mathbb{K}}(\mu_f) = \text{Sp}(f)$$

$$\triangleright \text{si } x \text{ est un vecteur propre de } g \text{ pour la valeur propre } \lambda, \text{ i.e. } \begin{cases} x \in F \\ x \neq 0 \\ g(x) = f(x) = \lambda x \end{cases} \quad \text{alors } x \text{ est un}$$

vecteur propre de  $f$  dans  $F$ , et réciproquement.

On a donc  $\text{sep}(g, \lambda) = \text{sep}(f, \lambda) \cap F$ .

---

**Exercice 5.112**

Soit  $f$  un endomorphisme de matrice  $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$  dans une base  $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ . Déterminez les sous-espaces vectoriels de  $E$  stables par  $f$ .

---

**Exercice 5.113 (Codiagonalisation ou diagonalisation simultanée)**

Soient  $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  diagonalisables et qui commutent.

Montez qu'il existe  $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$  telle que  $P^{-1}AP$  et  $P^{-1}BP$  sont diagonales.

## 5.7 Quelques applications de la diagonalisation

### 5.7.1 Puissances d'une matrice, suites récurrentes linéairement

Un petit lemme déjà rencontré.

---

**Lemme 5.114**

Soient  $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  et  $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$  telles que  $A = PBP^{-1}$ .

Alors pour tout  $k \in \mathbb{N}$ ,  $A^k = PB^kP^{-1}$ .

Le lemme précédent est particulièrement utile si  $A$  est diagonalisable et si on choisit  $B = D$ , matrice diagonale semblable à  $A$ , car calculer les puissances d'une matrice diagonale est très facile.

Grâce à la diagonalisation de  $A$ , on peut espérer exprimer la forme générale des suites récurrentes linéaires (voir le chapitre précédent, section sur les polynômes annulateurs).

---

**Exercice 5.115**

Soient  $u, v, w$  les trois suites réelles telles que  $u_0 = v_0 = w_0 = 1$  et

$$\text{pour tout } n \in \mathbb{N}, \quad \begin{cases} u_{n+1} = u_n - v_n \\ v_{n+1} = -4u_n + 4v_n - 6w_n \\ w_{n+1} = -3u_n + 3v_n - 4w_n \end{cases}$$

Déterminez des expressions de  $u_n, v_n, w_n$  en fonction de  $n$ .

Cette technique s'applique en particulier aux suites  $u$  vérifiant une relation de récurrence linéaire de la forme : pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+d} = a_{d-1}u_{n+d-1} + \cdots + a_2u_{n+2} + a_1u_{n+1} + a_0u_n$ .

On pose alors  $X_n = \begin{pmatrix} u_n \\ u_{n+1} \\ \vdots \\ u_{n+d-1} \end{pmatrix}$  et  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ a_0 & a_1 & a_2 & \dots & a_{d-1} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_d(\mathbb{K})$ .

Alors pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $X_{n+1} = AX_n$  et on est ramené au cas précédent.

La matrice  $A$  s'appelle la matrice-compagnon du polynôme  $P = X^d - a_{d-1}X^{d-1} - \dots - a_1X - a_0$  : elle a la propriété remarquable que son polynôme caractéristique est  $P$ , son polynôme minimal est aussi  $P$  et donc que ses valeurs propres sont les racines de  $P$ . C'est pourquoi le polynôme  $P$  est appelé polynôme caractéristique associé à la suite  $u$  (cas déjà étudié en première année :  $d = 2$ ).

On en déduit que  $A$  est diagonalisable ssi  $P$  est simplement scindé et dans ce cas,  $A$  possède  $d$  valeurs propres distinctes. Dans ce cas, en notant  $\lambda_1, \dots, \lambda_p$  les valeurs propres distinctes, la suite  $u$  est combinaison linéaire des suites géométriques  $(\lambda_1^n), \dots, (\lambda_d^n)$ .

### Exercice 5.116

Explicitez l'unique suite  $(u_n)$  vérifiant

$$u_0 = 0, u_1 = 1, u_2 = 5 \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+3} = 6u_{n+2} - 11u_{n+1} + 6u_n.$$

## 5.7.2 Systèmes d'équations différentielles

Ce point sera traité dans le chapitre sur les équations différentielles linéaires.

## 5.8 Endomorphismes trigonalisables, matrices trigonalisables

### 5.8.1 Définition et propriétés

#### Définition 5.117

Un endomorphisme est dit trigonalisable quand il existe une base dans laquelle sa matrice est triangulaire supérieure.

Une matrice carrée de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  est dite trigonalisable dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  quand elle est semblable à une matrice triangulaire dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

#### Remarque 5.118

- Si un endomorphisme (une matrice) est diagonalisable, alors il (elle) est trigonalisable.
- Si une matrice est trigonalisable, ses valeurs propres sont les nombres sur la diagonale de toute matrice triangulaire semblable.

---

**Exercice 5.119**

On considère la matrice  $M = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 7 \\ 5 & 4 & -8 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$  et  $f$  un endomorphisme de matrice  $M$ . Déterminez les éléments propres de  $M$ . Est-elle diagonalisable? En complétant une famille libre de vecteurs propres, déterminez une base  $\mathcal{B}$  de l'espace où la matrice de  $f$  est triangulaire supérieure, puis trigonalisez  $M$ .

---

**Exercice 5.120**

Soit  $f$  un endomorphisme de matrice  $A = \begin{pmatrix} 2 & -4 & -5 \\ -1 & 2 & 2 \\ 1 & -2 & -2 \end{pmatrix}$ . Montrez que  $f$  n'est pas diagonalisable mais est trigonalisable et donnez une base de trigonalisation de  $f$ . Donnez une forme générale pour  $A^n$ .

Quand un endomorphisme ou une matrice n'est pas diagonalisable, on peut espérer qu'il ou elle est trigonalisable : faute de grives, on se contente de merles !

---

*Remarque 5.121*

On ne confondra pas la trigonalisation d'une matrice carrée et la transformation par lignes (ou colonnes) des matrices vue en première année ! Seule la trigonalisation fournit des matrices semblables ! La transformation par lignes ne conserve que le rang !

## 5.8.2 Caractérisation équivalente

La trigonalisabilité est beaucoup plus courante que la diagonalisabilité, comme on le voit grâce aux résultats suivants.

---

**Proposition 5.122**

*Un endomorphisme (une matrice) est trigonalisable ssi il (elle) est scindé(e).*

---

*Démonstration 5.123*

On pose  $\mathcal{P}(n)$  : « si  $f$  est un endomorphisme d'un espace de dimension  $n$  et si  $\chi_f$  est scindé, alors  $f$  est trigonalisable ».

►  $\mathcal{P}(1)$  est vraie car tout endomorphisme en dimension 1 est trigonalisable.

► Supposons  $\mathcal{P}(n-1)$ .

Soient  $E$  un espace de dimension  $n$  et  $f \in \mathcal{L}(E)$  tel que  $\chi_f$  soit scindé.

Comme  $\chi_f$  est scindé, il existe  $\lambda \in \mathbb{K}$  tel que  $\lambda$  soit racine de  $\chi_f$  et donc une valeur propre de  $f$  à laquelle on associe un vecteur propre  $u_1$ .

Comme  $u_1 \neq 0$ , d'après le théorème de la base incomplète, il existe  $(u_2, \dots, u_n) \in E^{n-1}$  tel que  $\mathcal{B}_0 = (u_1, \dots, u_n)$  soit une base de  $E$ .

On a

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}_0}(f) = \left( \begin{array}{c|c} \lambda & L \\ \hline 0 & B \\ \vdots & \\ 0 & \end{array} \right).$$

Donc

$$\chi_f = \left| \begin{array}{c|c} X - \lambda & -L \\ \hline 0 & XI_{n-1} - B \\ \vdots & \\ 0 & \end{array} \right| = (X - \lambda) \chi_B.$$

On pose  $F = \text{Vect}(u_2, \dots, u_n)$ .

Soit  $g \in \mathcal{L}(F)$  tel que  $\text{Mat}_{(u_2, \dots, u_n)}(g) = B$ .

On a  $\chi_g = \chi_B$  scindé donc par hypothèse de récurrence,  $g$  est trigonalisable : il existe une base

$$(u'_2, \dots, u'_n) \text{ de } F \text{ telle que } \text{Mat}_{(u'_2, \dots, u'_n)}(g) = \begin{pmatrix} t_{22} & t_{23} & \dots & t_{2n} \\ & \ddots & & \vdots \\ 0 & & & t_{n-1n} \\ & & & t_{nn} \\ \vdots & & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \end{pmatrix} = T.$$

La famille  $\mathcal{B} = (u_1, u'_2, \dots, u'_n)$  est une base de  $E$ .

On veut montrer que

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} \lambda & \alpha_2 & \dots & \alpha_n \\ 0 & t_{22} & t_{23} & \dots & t_{2n} \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ \vdots & 0 & & & t_{n-1n} \\ 0 & 0 & \dots & 0 & t_{nn} \end{pmatrix}.$$

On a  $g = p \circ f|_F$  où  $p$  est le projecteur sur  $F$  parallèlement à  $\text{Vect}(u_1)$ .

Donc pour tout  $x \in F$ ,  $f(x) = \underbrace{g(x)}_{\in F} + \alpha u_1$  où  $\alpha \in \mathbb{K}$ .

De plus,

$$\text{pour tout } j \in \llbracket 2 ; n \rrbracket, \quad f(u'_j) = g(u'_j) + \alpha_j u_1$$

$$= \sum_{i=2}^j t_{ij} u'_i + \alpha_j u_1.$$

D'où  $\mathcal{P}(n)$ .

► Par récurrence, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\mathcal{P}(n)$  est vraie. ■

En particulier, quand  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ , tous les endomorphismes sont trigonalisables, toutes les matrices de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  sont trigonalisables dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ .

En pratique, quand on cherche à trigonaliser un endomorphisme, on peut chercher une base dans laquelle la matrice est triangulaire supérieure avec des 1 ou des 0 sur la sur-diagonale et des 0 sur les diagonales partielles encore au-dessus (c'est démontrable, mais c'est difficile à démontrer, cela s'appelle le théorème de Jordan – hors-programme –).

---

**Théorème 5.124**

Soit  $f \in \mathcal{L}(E)$ .

Il y a équivalence entre les propositions suivantes :

- ▷  $f$  est trigonalisable
- ▷  $\chi_f$  est scindé
- ▷  $\mu_f$  est scindé
- ▷ il existe un polynôme annulateur de  $f$  scindé

Et sa version matricielle.

---

**Théorème 5.125**

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

Il y a équivalence entre les propositions suivantes :

- ▷  $A$  est trigonalisable dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$
- ▷  $\chi_A$  est scindé
- ▷  $\mu_A$  est scindé
- ▷ il existe un polynôme annulateur de  $A$  qui est scindé dans  $\mathbb{K}[X]$

---

**Exercice 5.126**

Soit  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ . Calculez  $A^2$ , puis  $A^3$ . La matrice  $A$  est-elle diagonalisable ? trigonalisable ? Dans l'affirmative, diagonalisez ou trigonalisez la.

### 5.8.3 Théorème de Cayley-Hamilton

#### Théorème 5.127

Le polynôme caractéristique d'un endomorphisme (d'une matrice carrée) est un polynôme annulateur.

*Démonstration 5.128*

On pose  $\mathcal{P}(n)$  : « si  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ , alors  $\chi_A(A) = 0$  ».

► Si  $n = 1$  : on pose  $A = (a)$ .

On a  $\chi_A = X - a$  donc  $\chi_A(A) = A - aI_1 = (a) - (a) = 0$ .

D'où  $\mathcal{P}(1)$ .

► Supposons  $\mathcal{P}(n-1)$ .

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ .

Le polynôme  $\chi_A$  est scindé donc  $A$  est trigonalisable dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ , i.e. il existe  $P \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$  et

$$T \in \mathcal{T}_n^+(\mathbb{C}) \text{ telles que } A = PTP^{-1}, \text{ avec } T = \begin{pmatrix} \lambda_1 & ? & \dots & ? \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & ? \\ 0 & \dots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

$$\text{On a } \chi_A = \chi_T = \prod_{i=1}^n (X - \lambda_i).$$

On peut écrire

$$T = \begin{pmatrix} \lambda_1 & ? & \dots & ? \\ 0 & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & ? \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & ? & \dots & ? \\ 0 & & & \\ \vdots & & U & \\ 0 & & & \end{pmatrix}$$

où  $U \in \mathcal{M}_{n-1}(\mathbb{C})$ .

$$\text{On a } \chi_U = \prod_{i=2}^n (X - \lambda_i) \text{ donc } \chi_A = \chi_T = (X - \lambda_1) \chi_U.$$

Donc

$$\begin{aligned} \chi_A(A) &= (A - \lambda_1 I_n) \chi_U(A) \\ &= (PTP^{-1} - \lambda_1 I_n) \chi_U(PTP^{-1}) \\ &= P(T - \lambda_1 I_n) \chi_U(T) P^{-1}. \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} \chi_A(A) &= (A - \lambda_1 I_n) \chi_U(A) \\ &= (PTP^{-1} - \lambda_1 I_n) \chi_U(PTP^{-1}) \\ &= P(T - \lambda_1 I_n) \chi_U(T) P^{-1}. \end{aligned}} \right) (PTP^{-1})^k = PT^k P^{-1}$$



Or on a

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 0 & ? & \dots & ? \\ 0 & \lambda_2 - \lambda_1 & ? & ? \\ \vdots & 0 & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}}_{T - \lambda_1 I_n} \underbrace{\begin{pmatrix} \chi_U(\lambda_1) & ? & \dots & ? \\ 0 & & & \\ \vdots & & \chi_U(U) & \\ 0 & & & \end{pmatrix}}_{\chi_U(T)} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & 0 & \\ 0 & & & \end{pmatrix}$$

car  $\chi_U(U) = 0$ .

Donc  $\chi_A(A) = 0$ , d'où  $\mathcal{P}(n)$ .

► Par récurrence, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\mathcal{P}(n)$  est vraie. ■

### Corollaire 5.129

*Le polynôme minimal divise le polynôme caractéristique. Donc en dimension  $n$ , le polynôme minimal est de degré au plus  $n$ .*

Les polynômes minimal et caractéristique partagent les mêmes racines dans  $\mathbb{C}$  (en fait dans tout corps  $\mathbb{K}$ ) mais pas avec les mêmes ordres de multiplicité : si  $f$  est scindé, alors en notant  $\lambda_1, \dots, \lambda_k$  les  $k$  valeurs propres distinctes de  $f$ , on peut écrire

$$\chi_f = \prod_{i=1}^k (X - \lambda_i)^{\alpha_i} \quad \text{et} \quad \mu_f = \prod_{i=1}^k (X - \lambda_i)^{\beta_i}$$

où pour tout  $i \in \llbracket 1 ; k \rrbracket$ ,  $1 \leq \beta_i \leq \alpha_i$ .

## 5.8.4 Sous-espaces caractéristiques

### Définition 5.130

Soit  $f \in \mathcal{L}(E)$  un endomorphisme scindé. On écrit  $\chi_f = \prod_{i=1}^k (X - \lambda_i)^{\alpha_i}$  où  $\lambda_1, \dots, \lambda_k$  sont les  $k$  valeurs propres distinctes de  $f$ .

Les sous-espaces caractéristiques de  $f$  sont les noyaux  $\ker (f - \lambda_i \text{id}_E)^{\alpha_i}$ .

### Proposition 5.131

*Les sous-espaces caractéristiques d'un endomorphisme scindé sont supplémentaires et stables par  $f$ .*

---

*Démonstration 5.132*

► Soient  $\lambda \in \text{Sp}(f)$  et  $\alpha$  l'ordre de multiplicité de  $\lambda$ .

Soit  $x \in \ker(f - \lambda \text{id}_E)^\alpha$ .

On a

$$\begin{aligned}(f - \lambda \text{id}_E)^\alpha(f(x)) &= ((f - \lambda \text{id}_E)^\alpha \circ f)(x) && \left. \begin{array}{l} \text{composée de deux} \\ \text{polynômes en } f \text{ donc} \\ \text{commutative} \end{array} \right\} \\ &= (f \circ (f - \lambda \text{id}_E)^\alpha)(x) \\ &= f(0) \\ &= 0.\end{aligned}$$

Donc  $f(x) \in \ker(f - \lambda \text{id}_E)^\alpha$ .

Donc  $\ker(f - \lambda \text{id}_E)^\alpha$  est stable par  $f$ .

► On a  $\chi_f = \prod_{i=1}^k (X - \lambda_i)^{\alpha_i}$  : produit de polynômes premiers entre eux deux à deux.

D'après le lemme des noyaux, on a

$$\ker \chi_f(f) = \bigoplus_{i=1}^k \ker(f - \lambda_i \text{id}_E)^{\alpha_i}.$$

Or  $\chi_f(f) = 0$  d'après le théorème de Cayley-Hamilton donc

$$E = \bigoplus_{i=1}^k \ker(f - \lambda_i \text{id}_E)^{\alpha_i}.$$

■

---

**Théorème 5.133**

*Tout endomorphisme scindé possède une base dans laquelle sa matrice est diagonale par blocs telle que :*

- *il y a autant de blocs que de valeurs propres : à chaque valeur propre, on associe un unique bloc ;*
- *chaque bloc est de la forme  $\lambda I_r + U$  où  $\lambda$  est la valeur propre associée au bloc,  $r$  est l'ordre de multiplicité de  $\lambda$  et  $U$  est une matrice strictement triangulaire supérieure de  $\mathcal{M}_r(\mathbb{K})$*

*Toute matrice scindée est semblable à une matrice diagonale par blocs vérifiant les conditions précédentes.*

---

**Démonstration 5.134**

Soient  $\lambda \in \text{Sp}(f)$  et  $\alpha$  son ordre de multiplicité.

Sur  $F = \ker(f - \lambda \text{id}_E)^\alpha$ ,  $f$  induit un endomorphisme  $\tilde{f}$  tel que  $(\tilde{f} - \lambda \text{id}_F)^\alpha = 0$ .

Donc  $(X - \lambda)^\alpha$  est un polynôme annulateur de  $\tilde{f}$  qui est scindé donc  $\tilde{f}$  a pour unique valeur propre  $\lambda$  et est trigonalisable.

Donc il existe une base  $\mathcal{B}_\lambda$  de  $F$  telle que

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}_\lambda}(\tilde{f}) = \begin{pmatrix} \lambda & ? & \dots & ? \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & ? \\ 0 & \dots & 0 & \lambda \end{pmatrix} = \lambda I_\alpha + U.$$

Comme  $E = \bigoplus_{i=1}^k \ker(f - \lambda_i \text{id}_E)^{\alpha_i}$ , en concaténant de telles bases, on obtient une base de  $E$  dans laquelle la matrice de  $f$  est

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 I_{\alpha_1} + U_1 & 0 & \dots & 0 \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ & 0 & \ddots & 0 \\ & & & \lambda_k I_{\alpha_k} + U_k \end{pmatrix}.$$

■

---

**Corollaire 5.135**

La dimension d'un sous-espace caractéristique est l'ordre de multiplicité de la valeur propre associée.

## 5.9 Endomorphismes nilpotents, matrices nilpotentes

### 5.9.1 Généralités

---

**Définition 5.136**

Soit  $u \in \mathcal{L}(E)$ . On dit que  $u$  est nilpotent quand il existe  $p \in \mathbb{N}$  tel que  $u^p = 0$ .

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ . On dit que  $A$  est nilpotente quand il existe  $p \in \mathbb{N}$  tel que  $A^p = 0$ .

Le plus petit indice  $p$  satisfaisant à la condition précédente s'appelle l'indice de nilpotence de  $u$  (de  $A$ ).

---

**Proposition 5.137**

Toute matrice strictement triangulaire (supérieure ou inférieure) est nilpotente. Par conséquent, les matrices semblables à une matrice strictement triangulaire sont nilpotentes.

---

*Démonstration 5.138*

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  une matrice strictement triangulaire :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & ? & \dots & ? \\ & 0 & \ddots & \vdots \\ & \vdots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

On a  $\chi_A = X^n$  et  $\chi_A(A) = 0$  donc  $A^n = 0$ . ■

Dans la décomposition en sous-espaces caractéristiques, on a vu apparaître des matrices  $\lambda I_r + U$  : les matrices  $U$  sont nilpotentes.

L'ensemble des matrices nilpotentes n'a pas de structure particulière : en général, la somme et le produit de deux matrices nilpotentes ne sont pas nilpotents. Néanmoins, avec une condition de commutation supplémentaire, on a quelques résultats.

---

**Proposition 5.139**

Soient  $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  deux matrices nilpotentes.

Si  $A$  et  $B$  commutent, alors  $A + B$  et  $AB$  sont nilpotentes.

---

*Démonstration 5.140*

Soit  $(k, \ell) \in \mathbb{N}^2$  tel que  $A^k = 0$  et  $B^\ell = 0$ .

Supposons  $AB = BA$ .

On a

$$\begin{aligned} (AB)^{\min(k, \ell)} &= A^{\min(k, \ell)} B^{\min(k, \ell)} \\ &= 0 \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} (A + B)^{k+\ell} &= \sum_{i=0}^{k+\ell} \binom{k+\ell}{i} A^i B^{k+\ell-i} \\ &= \sum_{i=0}^k \binom{k+\ell}{i} A^i \underbrace{B^{k+\ell-i}}_{=0} + \sum_{i=k+1}^{k+\ell} \binom{k+\ell}{i} \underbrace{A^i}_{=0} B^{k+\ell-i} \\ &= 0. \end{aligned}$$
■

On a bien sûr les mêmes résultats concernant les endomorphismes nilpotents.

## 5.9.2 Éléments propres d'un nilpotent

### Proposition 5.141

Un endomorphisme en dimension  $n$  est nilpotent ssi son polynôme caractéristique est  $X^n$ , i.e. s'il est scindé et admet 0 comme unique valeur propre.

Une matrice de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  est nilpotente ssi son polynôme caractéristique est  $X^n$ , i.e. si elle est scindée et admet 0 comme unique valeur propre.

L'indice de nilpotence dans ces deux cas est alors le degré du polynôme minimal ; il est donc inférieur ou égal à  $n$ .

### Démonstration 5.142

Si  $f$  est nilpotent alors il existe  $k \in \mathbb{N}$  tel que  $f^k = 0$  donc  $X^k$  est annulateur de  $f$  donc  $\text{Sp}(f) = \{0\}$  donc  $\chi_f = X^n$ .

Réciproquement, si  $\chi_f = X^n$ , d'après le théorème de Cayley-Hamilton,  $f^n = 0$  donc  $f$  est nilpotent.

Or  $\mu_f \mid \chi_f$  donc  $\mu_f$  est de la forme  $X^\ell$  avec  $\ell \leq n$  et par définition de  $\mu_f$ ,  $\ell$  est l'indice de nilpotence de  $f$ . ■

Mis à part la matrice nulle, aucune matrice nilpotente n'est diagonalisable : c'est une idée parfois utile pour prouver qu'une matrice est nulle (diagonalisable et nilpotente implique nulle).

### Proposition 5.143

Tout endomorphisme nilpotent est trigonalisable : il existe une base dans laquelle sa matrice est triangulaire supérieure stricte. Réciproquement, si un endomorphisme est trigonalisable et n'a que 0 pour valeur propre, alors il est nilpotent.

Toute matrice nilpotente est trigonalisable : elle est semblable à une matrice triangulaire supérieure stricte. La réciproque est vraie.

## 5.9.3 Application aux sous-espaces caractéristiques d'un endomorphisme

### Proposition 5.144

Soit  $f \in \mathcal{L}(E)$ .

Pour toute valeur propre  $\lambda$  de  $f$ , si  $\alpha$  est l'ordre de multiplicité de  $\lambda$  dans le polynôme minimal de  $f$ , le sous-espace caractéristique associé est aussi le noyau  $\ker(f - \lambda \text{id}_E)^\alpha$ .

### Lemme 5.145

Si  $F_1, \dots, F_k, G_1, \dots, G_k$  vérifient  $\bigoplus_{i=1}^k F_i = \bigoplus_{i=1}^k G_i$  et pour tout  $i \in \llbracket 1 ; k \rrbracket$ ,  $F_i \subseteq G_i$ , alors pour tout  $i \in \llbracket 1 ; k \rrbracket$ ,  $F_i = G_i$ .

---

*Démonstration 5.146*

Soient  $i \in \llbracket 1 ; k \rrbracket$  et  $x \in G_i$ .

On a  $x \in \bigoplus_{j=1}^k G_j = \bigoplus_{j=1}^k F_j$ .

Donc il existe  $(y_1, \dots, y_k) \in F_1 \times \dots \times F_k$  tel que

$$\underbrace{x}_{\in G_i} = \underbrace{y_1}_{\in F_1 \subseteq G_1} + \dots + \underbrace{y_k}_{\in F_k \subseteq G_k}.$$

Or la somme  $\bigoplus_{j=1}^k G_j$  est directe donc par unicité

$$\left\{ \begin{array}{l} y_1 = 0 \\ \vdots \\ y_{i-1} = 0 \\ y_i = x \\ y_{i+1} = 0 \\ \vdots \\ y_k = 0 \end{array} \right.$$

Donc  $x = y_i \in F_i$ .

Donc  $F_i \subseteq G_i$ .

Donc  $F_i = G_i$ . ■

---

*Démonstration 5.147 (de la Proposition 5.144)*

On note  $\chi_f = \prod_{i=1}^k (X - \lambda_i)^{\alpha_i}$  et  $\mu_f = \prod_{i=1}^k (X - \lambda_i)^{\beta_i}$  où pour tout  $i \in \llbracket 1 ; k \rrbracket$ ,  $\alpha_i \geq \beta_i \geq 1$ .

On veut montrer que pour tout  $i \in \llbracket 1 ; k \rrbracket$ ,  $\ker(f - \lambda_i \text{id}_E)^{\alpha_i} = \ker(f - \lambda_i \text{id}_E)^{\beta_i}$ .

Comme  $\beta_i \leq \alpha_i$ , on a immédiatement pour tout  $i \in \llbracket 1 ; k \rrbracket$ ,  $\ker(f - \lambda_i \text{id}_E)^{\beta_i} \subseteq \ker(f - \lambda_i \text{id}_E)^{\alpha_i}$ .

Comme  $\mu_f(f) = \chi_f(f) = 0$ , d'après le lemme des noyaux :

$$E = \bigoplus_{i=1}^k \ker(f - \lambda_i \text{id}_E)^{\beta_i} = \bigoplus_{i=1}^k \ker(f - \lambda_i \text{id}_E)^{\alpha_i}.$$

D'après le Lemme 5.145, on en déduit

$$\forall i \in \llbracket 1 ; k \rrbracket, \ker(f - \lambda_i \text{id}_E)^{\alpha_i} = \ker(f - \lambda_i \text{id}_E)^{\beta_i}. \quad \blacksquare$$

On peut même démontrer mieux.

---

**Proposition 5.148**

Soient  $f \in \mathcal{L}(E)$ ,  $\lambda \in \text{Sp}(f)$  et  $\alpha$  l'ordre de multiplicité de  $\lambda$  dans le polynôme minimal de  $f$ .

Alors la suite des noyaux  $\left(\ker(f - \lambda \text{id}_E)^k\right)_{k \in \mathbb{N}}$  est strictement croissante jusqu'au rang  $\alpha$ , puis constante à partir du rang  $\alpha$  :

$$\{0\} \subsetneq \ker(f - \lambda \text{id}_E) \subsetneq \ker(f - \lambda \text{id}_E)^2 \subsetneq \dots \subsetneq \ker(f - \lambda \text{id}_E)^\alpha = \ker(f - \lambda \text{id}_E)^{\alpha+1} = \dots$$

# Chapitre 6

## Intégrales généralisées

### Sommaire

---

<b>Fonctions continues par morceaux sur un intervalle . . . . .</b>	<b>.198</b>
<b>6.1 Intégrales généralisées sur <math>[a ; +\infty[</math> . . . . .</b>	<b>.198</b>
6.1.1 Définition et exemples fondamentaux . . . . .	198
6.1.2 Propriétés . . . . .	200
6.1.3 Cas des fonctions réelles positives . . . . .	202
6.1.4 Théorème de comparaison entre fonctions positives . . . . .	203
6.1.5 Lien avec les séries . . . . .	206
<b>6.2 Intégrales généralisées sur d'autres types d'intervalles . . . . .</b>	<b>.210</b>
6.2.1 Intégrales généralisées sur $[a ; b[$ . . . . .	210
6.2.2 Intégrales généralisées sur $]a ; b]$ . . . . .	210
6.2.3 Intégrales généralisées sur $]a ; b[$ . . . . .	212
6.2.4 Propriétés communes à toutes ces intégrales . . . . .	214
6.2.4.1 Changement de variable . . . . .	214
6.2.4.2 Intégration par parties . . . . .	217
6.2.4.3 Primitives . . . . .	219
<b>6.3 Résumé pour étudier la convergence d'une intégrale . . . . .</b>	<b>.220</b>
<b>6.4 Fonctions intégrables sur un intervalle . . . . .</b>	<b>.222</b>
6.4.1 Intégrales absolument convergentes . . . . .	222
6.4.2 Fonctions intégrables . . . . .	224
6.4.3 Théorème de comparaison des fonctions intégrables . . . . .	225
<b>6.5 Intégration des relations de comparaison . . . . .</b>	<b>.226</b>
6.5.1 Théorème de comparaison par domination . . . . .	227
6.5.2 Théorème de comparaison par équivalence . . . . .	228

---

Dans ce chapitre,  $\mathbb{K}$  désigne l'ensemble  $\mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ . Les fonctions considérées dans ce chapitre sont à valeurs dans  $\mathbb{K}$ .

On suppose connue la notion d'intégrale sur un segment d'une fonction continue par morceaux à valeurs réelles ou complexes (*cf.* cours de première année).

Si  $f$  est une fonction continue sur un segment  $[a ; b]$  (ou  $[b ; a]$ ), on note  $\int_a^b f = \int_a^b f(t) dt$  (ou toute autre lettre à la place de  $t$ ) l'intégrale de  $f$  entre  $a$  et  $b$  : quand on a pas besoin de nommer la variable d'intégration, on ne la note pas, mais si on la note alors on n'oublie pas l'élément différentiel.

En préambule, on généralise la notion de fonction continue par morceaux sur un intervalle quelconque.



# Fonctions continues par morceaux sur un intervalle

---

## Définition 6.1

Soit  $I$  un intervalle quelconque.

On dit qu'une fonction est continue par morceaux sur  $I$  quand elle est continue par morceaux sur tout segment inclus dans  $I$ .

---

### Exemple 6.2

- La fonction  $t \mapsto \begin{cases} -\ln t & \text{si } t \in ]0 ; 1] \\ e^{-t} & \text{si } t \in [1 ; +\infty[ \end{cases}$  est continue par morceaux sur  $]0 ; +\infty]$ .
- La fonction  $t \mapsto \left\lfloor \frac{1}{t} \right\rfloor$  est continue par morceaux sur  $]0 ; +\infty]$ .

Dans toute la suite, on note  $\mathcal{C}_m^0(I, \mathbb{K})$  l'ensemble des fonctions continues par morceaux sur  $I$  et à valeurs dans  $\mathbb{K}$ .

---

## Proposition 6.3

L'ensemble  $\mathcal{C}_m^0(I, \mathbb{K})$  est une  $\mathbb{K}$ -algèbre.

## 6.1 Intégrales généralisées sur $[a ; +\infty[$

Dans cette section,  $a$  est un réel.

### 6.1.1 Définition et exemples fondamentaux

---

#### Définition 6.4

Soit  $f \in \mathcal{C}_m^0([a ; +\infty[, \mathbb{K})$ .

On dit que l'intégrale  $\int_a^{+\infty} f$  converge (ou qu'elle est convergente, ou simplement qu'elle existe) quand  $\int_a^x f$  a une limite finie quand  $x$  tend vers  $+\infty$ .

Dans ce cas, on pose  $\int_a^{+\infty} f = \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_a^x f$ .

Dans le cas contraire, on dit que l'intégrale  $\int_a^{+\infty}$  diverge (ou qu'elle est divergente).

---

*Remarque 6.5*

Une intégrale généralisée  $\int_a^{+\infty}$  est une limite et une limite n'existe pas toujours. Avant d'utiliser une telle intégrale dans un raisonnement ou un calcul, on doit donc toujours justifier son existence !

Les résultats ci-dessous sont à connaître.

---

*Exemple 6.6*

- Soit  $\alpha$  un réel. L'intégrale  $\int_0^{+\infty} e^{-\alpha t} dt$  converge ssi  $\alpha > 0$ .
- Soit  $\alpha$  un réel. L'intégrale  $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^\alpha} dt$  converge ssi  $\alpha > 1$  (intégrale dite de Riemann).

---

*Démonstration 6.7*

- La fonction  $t \mapsto e^{-\alpha t}$  est continue sur  $[0 ; +\infty[$ .

Pour  $x \geq 0$ , si  $\alpha \neq 0$ , on a

$$\int_0^x e^{-\alpha t} dt = \left[ \frac{1}{-\alpha} e^{-\alpha t} \right]_0^x = \frac{1}{\alpha} (1 - e^{-\alpha x}).$$

Donc si  $\alpha > 0$ , on a

$$\int_0^x e^{-\alpha t} dt \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\alpha}$$

et si  $\alpha < 0$ , on a

$$\int_0^x e^{-\alpha t} dt \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty.$$

De plus, si  $\alpha = 0$ , on a

$$\int_0^x e^{-\alpha t} dt = x \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty.$$

Donc  $\int_0^{+\infty} e^{-\alpha t} dt$  converge ssi  $\alpha > 0$  et, dans ce cas,  $\int_0^{+\infty} e^{-\alpha t} dt = \frac{1}{\alpha}$ .

- La fonction  $t \mapsto \frac{1}{t^\alpha}$  est continue sur  $[1 ; +\infty[$ .

Pour  $x \geq 1$ , si  $\alpha \neq 1$ , on a

$$\int_1^x \frac{1}{t^\alpha} dt = \int_1^x t^{-\alpha} dt = \left[ \frac{1}{-\alpha + 1} t^{-\alpha+1} \right]_1^x = \frac{1}{\alpha - 1} (1 - x^{-\alpha+1}).$$

Donc si  $\alpha > 1$ , on a

$$\int_1^x \frac{1}{t^\alpha} dt \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\alpha - 1}$$

et si  $\alpha < 1$ , on a

$$\int_1^x \frac{1}{t^\alpha} dt \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty.$$

De plus, si  $\alpha = 1$  alors

$$\int_1^x \frac{1}{t^\alpha} dt = \ln x \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty.$$

Donc  $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^\alpha} dt$  converge ssi  $\alpha > 1$  et, dans ce cas,  $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^\alpha} dt = \frac{1}{\alpha - 1}$ . ■

---

**Exercice 6.8**

Quelle est la nature de l'intégrale  $\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+t^2} dt$  ?

---

*Correction 6.9*

La fonction  $t \mapsto \frac{1}{1+t^2}$  est continue sur  $[0 ; +\infty[$ .

Pour  $x \geq 0$ , on a

$$\int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt = [\operatorname{Arctan} t]_0^x = \operatorname{Arctan} x \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{2}$$

.

Donc  $\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+t^2} dt$  converge et vaut  $\frac{\pi}{2}$ .

---

**Exercice 6.10**

Quelle est la nature de l'intégrale  $\int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{t} dt$ .

---

*Correction 6.11*

La fonction  $t \mapsto \frac{\ln t}{t}$  est continue sur  $[1 ; +\infty[$ .

Pour  $x \geq 1$ , on a

$$\int_1^x \frac{\ln t}{t} dt = \left[ \frac{\ln^2 t}{2} \right]_1^x = \frac{\ln^2 x}{2} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty.$$

Donc  $\int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{t} dt$  diverge.

## 6.1.2 Propriétés

La convergence de l'intégrale ne dépend pas de la borne  $a$ , ce qui généralise la relation de Chasles.

---

**Proposition 6.12**

Soient  $f \in \mathcal{C}_m^0([a ; +\infty[, \mathbb{K})$  et  $b \in [a ; +\infty[$ .

Alors l'intégrale  $\int_a^{+\infty} f$  converge ssi  $\int_b^{+\infty} f$  converge.

Dans ce cas, on a  $\int_a^{+\infty} f = \int_a^b f + \int_b^{+\infty} f$ .

---

*Démonstration 6.13*

Soit  $x \geq a$ .

Par relation de Chasles sur les intégrales classiques, on a

$$\int_a^x f = \underbrace{\int_a^b f}_{\in \mathbb{K}} + \int_b^x f.$$

Donc  $\int_a^x f$  a une limite finie quand  $x \rightarrow +\infty$  ssi  $\int_b^x f$  a une limite finie quand  $x \rightarrow +\infty$  par opération sur les limites.

Dans ce cas, on a

$$\begin{aligned} \int_a^{+\infty} f &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_a^x f \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \int_a^b f + \int_b^x f \right) \\ &= \int_a^b f + \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_b^x f \\ &= \int_a^b f + \int_b^{+\infty} f. \end{aligned}$$

■

Dans le cas convergent, on retrouve la linéarité.

---

**Proposition 6.14**

Soient  $(f, g) \in \mathcal{C}_m^0([a; +\infty[, \mathbb{K})^2$  et  $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$ .

Si les intégrales  $\int_a^{+\infty} f$  et  $\int_a^{+\infty} g$  convergent, alors  $\int_a^{+\infty} (\lambda f + \mu g)$  converge.

Dans ce cas, on a  $\int_a^{+\infty} (\lambda f + \mu g) = \lambda \int_a^{+\infty} f + \mu \int_a^{+\infty} g$ .

---

*Démonstration 6.15*

Pour  $x \geq 0$ , on a

$$\int_a^x (\lambda f + \mu g) = \lambda \int_a^x f + \mu \int_a^x g$$

par linéarité de l'intégrale classique.

Puis, d'après les théorèmes d'opérations sur les limites, si  $\int_a^{+\infty} f$  et  $\int_a^{+\infty} g$  convergent, les deux fonctions  $x \mapsto \int_a^x f$  et  $x \mapsto \int_a^x g$  ont des limites finies en  $+\infty$  donc  $x \mapsto \lambda \int_a^x f + \mu \int_a^x g$  en a une aussi, i.e.  $\int_a^{+\infty} (\lambda f + \mu g)$  converge.

Dans ce cas,  $\int_a^{+\infty} (\lambda f + \mu g) = \lambda \int_a^{+\infty} f + \mu \int_a^{+\infty} g$ .

■

---

*Remarque 6.16*

- ▷ « La somme d'une intégrale convergente et d'une divergente est divergente ».
- ▷ Il n'y a rien à dire *a priori* sur la « somme de deux intégrales divergentes ».

---

*Démonstration 6.17*

Montrons que si  $\int_a^{+\infty} f$  converge et  $\int_a^{+\infty} g$  diverge, alors  $\int_a^{+\infty} (f + g)$  diverge.

Par l'absurde, si  $\int_a^{+\infty} (f + g)$  converge alors comme  $g = (f + g) - f$ , d'après la proposition précédente,  $\int_a^{+\infty} g$  converge : contradiction. ■

### 6.1.3 Cas des fonctions réelles positives

Quand une fonction  $f$  est positive et continue par morceaux, dans le cas où l'intégrale  $\int_a^{+\infty} f$  diverge, on pose par convention  $\int_a^{+\infty} f = +\infty$ , ce qui permet de donner un sens à toutes les intégrales de fonctions positives.

---

**Proposition 6.18**

Soit  $f \in \mathcal{C}_m^0([a; +\infty[, \mathbb{R})$ .

Si  $f \geq 0$ , alors  $\int_a^{+\infty} f \geq 0$ .

Si, de plus,  $f$  est continue et prend au moins une valeur strictement positive, alors  $\int_a^{+\infty} f > 0$ .

Ceci est vrai en particulier quand  $f$  est continue et strictement positive sur  $[a; +\infty[$ .

---

*Démonstration 6.19*

- ▷ Si  $f \geq 0$  sur  $[a; +\infty[$ , alors pour tout  $x \in [a; +\infty[$ ,  $f \geq 0$  sur  $[a; x]$ .

Donc par positivité de l'intégrale classique,  $\int_a^x f \geq 0$ .

Donc si  $\int_a^{+\infty} f$  diverge, alors

$$\int_a^{+\infty} f = +\infty \geq 0$$

et si  $\int_a^{+\infty} f$  converge, on a

$$\int_a^{+\infty} f \geq 0$$

par passage à la limite quand  $x \rightarrow +\infty$ .

- Si  $f$  est continue, positive et prend au moins une valeur strictement positive en  $x_0$ , pour  $x \geq x_0 + 1$ , on a

$$\int_a^x f = \int_a^{x_0+1} f + \int_{x_0+1}^x f.$$

D'après le théorème de stricte positivité de l'intégrale classique, comme  $f$  est continue et positive sur  $[a ; x_0 + 1]$ ,  $f(x_0) > 0$  et  $x_0 \in [a ; x_0 + 1]$ , on a  $\int_a^{x_0+1} f > 0$ .

Or  $\int_{x_0+1}^x f \geq 0$  donc  $\int_a^x f \geq \int_a^{x_0+1} f$ .

Par passage à la limite quand  $x \rightarrow +\infty$ , on obtient

$$\int_a^{+\infty} f \geq \int_a^{x_0+1} f > 0. \quad \blacksquare$$

*Remarque 6.20 (Contraposée)*

Si  $f$  est continue et positive sur  $[a ; +\infty[$  et  $\int_a^{+\infty} f = 0$ , alors  $f = 0$  sur  $[a ; +\infty[$ .

On en déduit la propriété de croissance des intégrales.

### Proposition 6.21

Soit  $(f, g) \in \mathcal{C}_m^0([a ; +\infty[, \mathbb{R})^2$  tel que  $f$  et  $g$  soient positives.

Si  $f \leq g$ , alors  $\int_a^{+\infty} f \leq \int_a^{+\infty} g$ .

## 6.1.4 Théorème de comparaison entre fonctions positives

D'abord une condition nécessaire et suffisante de convergence dans le cas d'une fonction positive.

### Proposition 6.22

Soit  $f \in \mathcal{C}_m^0([a ; +\infty[, \mathbb{R})$ .

Si  $f \geq 0$ , alors l'intégrale  $\int_a^{+\infty} f$  converge ssi la fonction  $x \mapsto \int_a^x f$  est majorée.

---

*Démonstration 6.23*

Si  $f \geq 0$  sur  $[a ; +\infty[$ , alors  $x \mapsto \int_a^x f$  est croissante sur  $[a ; +\infty[$ .

Donc pour  $(x, y) \in [a ; +\infty[^2$  tel que  $x \geq y$ , on a

$$\int_a^x f = \int_a^y f + \int_y^x f \geq \int_a^y f.$$

Donc  $\int_a^{+\infty} f$  converge ssi la fonction croissante  $x \mapsto \int_a^x f$  a une limite finie en  $+\infty$  ssi la fonction croissante  $x \mapsto \int_a^x f$  est majorée, par théorème de la limite monotone. ■

On en déduit un théorème de comparaison du même type que celui sur les séries.

---

**Théorème 6.24**

Soit  $(f, g) \in \mathcal{C}_m^0([a ; +\infty[, \mathbb{R})^2$  tel que  $f$  et  $g$  soient positives.

- Si  $f \leq g$  et  $\int_a^{+\infty} g$  converge, alors  $\int_a^{+\infty} f$  converge.
- Si  $f \leq g$  et  $\int_a^{+\infty} f$  diverge, alors  $\int_a^{+\infty} g$  diverge.
- Si  $f \underset{+\infty}{\sim} g$  alors les intégrales  $\int_a^{+\infty} f$  et  $\int_a^{+\infty} g$  sont de même nature : l'une converge ssi l'autre converge.

---

*Démonstration 6.25*

- Si  $0 \leq f \leq g$  sur  $[a ; +\infty[$ , alors pour tout  $x \in [a ; +\infty[$ ,  $\int_a^x f \leq \int_a^x g$ .

Donc si  $\int_a^{+\infty} g$  converge, alors  $x \mapsto \int_a^x g$  est majorée d'après la Proposition 6.22.

Donc  $x \mapsto \int_a^x f$  est majorée.

Donc  $\int_a^{+\infty} f$  converge d'après la Proposition 6.22.

- Par contraposée, si  $\int_a^{+\infty} f$  diverge, alors  $\int_a^{+\infty} g$  diverge.
- Si  $f \underset{+\infty}{\sim} g$ , il existe une fonction  $\varphi$  définie au voisinage de  $+\infty$  telle que  $f = g\varphi$  et  $\varphi \xrightarrow{+\infty} 1$ .

Comme  $\varphi \xrightarrow{+\infty} 1$ , au voisinage de  $+\infty$ , on a  $\frac{1}{2} \leq \varphi \leq \frac{3}{2}$ .

Donc, au voisinage de  $+\infty$ , on a  $0 \leq \frac{1}{2}g \leq \varphi g = f \leq \frac{3}{2}g$ .

D'après ce qui précède, si  $\int_a^{+\infty} f$  converge, alors  $\int_a^{+\infty} \frac{1}{2}g$  converge donc  $\int_a^{+\infty} g = 2 \int_a^{+\infty} \frac{1}{2}g$  converge et si  $\int_a^{+\infty} f$  diverge, alors  $\int_a^{+\infty} \frac{3}{2}g$  diverge donc  $\int_a^{+\infty} g = \frac{2}{3} \int_a^{+\infty} \frac{3}{2}g$  diverge. ■

---

*Remarque 6.26*

- Dans ce théorème, il suffit que les inégalités soient vraies au voisinage de  $+\infty$  seulement.
- Si les fonctions sont à valeurs négatives, on se ramène à ce théorème en travaillant avec les fonctions opposées. Ce qui compte est donc qu'elles soient de signe constant.
- Avec des fonctions dont le signe n'est pas constant, ce théorème est faux. Il faut donc bien s'assurer et mettre en valeur que les fonctions sont positives (ou négatives).
- On compare les fonctions, pas les intégrales ! N'écrivez pas des symboles  $\int_a^{+\infty} \cdots$  partout.

---

**Exercice 6.27**

Montrez que  $\int_1^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t} dt$  converge.

---

*Correction 6.28*

Les fonctions  $t \mapsto \frac{e^{-t}}{t}$  et  $t \mapsto e^{-t}$  sont continues sur  $[1 ; +\infty[$ .

Pour tout  $t \geq 1$ ,  $0 \leq \frac{e^{-t}}{t} \leq e^{-t}$  or  $\int_1^{+\infty} e^{-t} dt$  converge donc par comparaison de fonctions positives,  $\int_1^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t} dt$  converge.

---

**Exercice 6.29**

Montrez que  $\int_2^{+\infty} \frac{1}{\ln t} dt$  diverge.

---

*Correction 6.30*

La fonction  $t \mapsto \frac{1}{\ln t}$  est continue sur  $[2 ; +\infty[$ .

Pour  $t \geq 2$ , on a  $\frac{1}{\ln t} \geq \frac{1}{t} \geq 0$  car  $\forall t > 0$ ,  $\ln t \leq t - 1 \leq t$  car  $\ln$  est concave.

Or  $\int_2^{+\infty} \frac{1}{t} dt$  diverge donc par comparaison de fonctions positives,  $\int_2^{+\infty} \frac{1}{\ln t} dt$  diverge.



---

**Exercice 6.31**

Montrez que pour tout  $\alpha > 1$ ,  $\int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{t^\alpha} dt$  converge.

---

**Correction 6.32**

Pour tout  $\alpha > 1$ ,  $t \mapsto \frac{\ln t}{t^\alpha}$  est continue sur  $[1; +\infty[$ .

- Si  $\alpha > 2$ , comme on a  $0 \leq \frac{\ln t}{t^\alpha} \leq \frac{t}{t^\alpha} = \frac{1}{t^{\alpha-1}}$  pour  $t \in [1; +\infty[$  et  $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^{\alpha-1}} dt$  converge (car  $\alpha - 1 > 1$ ), on en déduit que  $\int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{t^\alpha} dt$  converge.
- Il existe  $a > 1$  tel que pour tout  $t \in [a; +\infty[$ ,  $0 \leq \ln t \leq t^{\alpha-1/2}$  car  $\ln t \underset{t \rightarrow +\infty}{=} o\left(t^{\alpha-1/2}\right)$  car  $\frac{\alpha-1}{2} > 0$ .

Donc pour tout  $t \in [a; +\infty[$ ,  $0 \leq \frac{\ln t}{t^\alpha} \leq \frac{t^{\alpha-1/2}}{t^\alpha} = \frac{1}{t^{\alpha+1/2}}$ .

Comme  $\alpha > 1$ ,  $\frac{\alpha+1}{2} > 1$  donc  $\int_a^{+\infty} \frac{1}{t^{\alpha+1/2}} dt$  converge.

Donc  $\int_a^{+\infty} \frac{\ln t}{t^\alpha} dt$  converge i.e.  $\int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{t^\alpha} dt$  converge.

### 6.1.5 Lien avec les séries

Le théorème de comparaison série-intégrale peut se réécrire comme suit.

---

**Proposition 6.33**

Soit  $f \in \mathcal{C}_m^0(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$  positive et décroissante.

La série  $\sum f(n)$  et l'intégrale  $\int_0^{+\infty} f$  sont de même nature.

Dans le même genre, on peut étudier la convergence d'une intégrale d'une fonction positive par l'intermédiaire d'une série.

---

**Proposition 6.34**

Soient  $f \in \mathcal{C}_m^0(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$  positive et  $u$  une suite positive et strictement croissante qui diverge vers  $+\infty$ .

L'intégrale  $\int_0^{+\infty} f$  converge ssi la série  $\sum_{n \geq 0} \int_{u_n}^{u_{n+1}} f$  converge.

---

Démonstration 6.35

$\Rightarrow$

Si  $f \geq 0$  sur  $[0 ; +\infty[$ , alors  $F : x \mapsto \int_0^x f$  est croissante.

Donc si  $\int_0^{+\infty} f$  converge, alors  $\int_0^x f$  a une limite réelle  $\ell$  quand  $x \rightarrow +\infty$ .

Donc comme  $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$ , on a  $\int_0^{u_n} f \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell$ .

Or  $\int_0^{u_n} f = \int_0^{u_0} f + \int_{u_0}^{u_1} f + \dots + \int_{u_{n-1}}^{u_n} f$  donc

$$\sum_{k=0}^{n-1} \int_{u_k}^{u_{k+1}} f \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell - \int_0^{u_0} f$$

i.e. la série  $\sum_n \int_{u_n}^{u_{n+1}} f$  converge.

$\Leftarrow$

Si la série  $\sum_n \int_{u_n}^{u_{n+1}} f$  converge,  $\sum_{k=0}^{n-1} \int_{u_k}^{u_{k+1}} f = F(u_n) - F(u_0)$  a une limite réelle quand  $n \rightarrow +\infty$  i.e.  $(F(u_n))$  a une limite réelle.

Or  $F$  est croissante donc d'après le théorème de la limite monotone,  $F$  a une limite  $L \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$  en  $+\infty$ .

D'après la caractérisation séquentielle de la limite, on a  $F(u_n) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} L$  car  $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$ .

Donc  $L \in \mathbb{R}$ . Donc  $\int_0^{+\infty} f$  converge. ■

---

Remarque 6.36

L'hypothèse de positivité de  $f$  est essentielle.

Contre-exemple si on ne suppose rien sur le signe de  $f$  :

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $\int_{2n\pi}^{2(n+1)\pi} \sin = 0$  donc  $\sum \int_{2n\pi}^{2(n+1)\pi} \sin$  converge mais  $\int_0^x \sin = 1 - \cos x$  n'a pas de limite quand  $x \rightarrow +\infty$  i.e.  $\int_0^{+\infty} \sin$  diverge.

---

Exercice 6.37

Montrez que l'intégrale  $\int_1^{+\infty} \frac{|\sin t|}{t} dt$  diverge.

---

*Correction 6.38*

La fonction  $t \mapsto \frac{|\sin t|}{t}$  est continue sur  $[1 ; +\infty[$ .

D'après la Proposition 6.34,  $\int_1^{+\infty} \frac{|\sin t|}{t} dt$  converge ssi la série  $\sum_n \int_{u_n}^{u_{n+1}} \frac{|\sin t|}{t} dt$  converge, où  $(u_n)$  est une suite positive et strictement croissante.

On prend  $u_n = n\pi$  pour  $n \geq 1$ .

Pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , on a  $\int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{|\sin t|}{t} dt \geq \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{|\sin t|}{(n+1)\pi} dt$  car

$$\begin{aligned} \forall t \in [n\pi ; (n+1)\pi], \quad n\pi \leq t \leq (n+1)\pi \text{ donc } \frac{1}{(n+1)\pi} \leq \frac{1}{t} \leq \frac{1}{n\pi} \\ \text{donc } \frac{|\sin t|}{(n+1)\pi} \leq \frac{|\sin t|}{t} \leq \frac{|\sin t|}{n\pi}. \end{aligned}$$

Donc on a

$$\begin{aligned} \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{|\sin t|}{t} dt &\geq \frac{1}{(n+1)\pi} \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} |\sin t| dt \\ &= \frac{1}{(n+1)\pi} \int_0^\pi |\sin t| dt \quad \left. \begin{array}{l} \text{ } \\ \text{ } \end{array} \right\} \begin{array}{l} t \mapsto |\sin t| \text{ est } \pi\text{-périodique} \\ \text{ } \end{array} \\ &= \frac{2}{(n+1)\pi}. \end{aligned}$$

Or  $\sum_n \frac{2}{(n+1)\pi}$  diverge donc  $\int_1^{+\infty} \frac{|\sin t|}{t} dt$  diverge.

---

**Exercice 6.39**

En utilisant l'inégalité  $\sin t \geq \frac{2}{\pi}t$ , valable pour tout  $t \in [0 ; \frac{\pi}{2}]$ , montrez que l'intégrale  $\int_0^{+\infty} \frac{1}{1 + e^x |\sin x|} dx$  converge.

---

*Correction 6.40*

La fonction  $x \mapsto \frac{1}{1 + e^x |\sin x|}$  est continue et positive sur  $[0 ; +\infty[$  donc  $\int_0^{+\infty} \frac{1}{1 + e^x |\sin x|} dx$  converge

ssi la série  $\sum_n \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{1}{1 + e^x |\sin x|} dx$  converge.

Pour  $n \in \mathbb{N}$ , on a

$$\begin{aligned} 0 \leq \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{1}{1 + e^x |\sin x|} dx &\quad \left. \begin{array}{l} \text{ } \\ \text{ } \end{array} \right\} \begin{array}{l} x = t + n\pi \\ dx = dt \end{array} \\ = \int_0^\pi \frac{1}{1 + e^{t+n\pi} |\sin t|} dt. \end{aligned}$$

Or, comme on a  $\forall t \in \left[0 ; \frac{\pi}{2}\right]$ ,  $\frac{2}{\pi}t \leq \sin t$ , on a

$$1 + e^{n\pi} \frac{2}{\pi} t \leq 1 + e^{t+n\pi} \frac{2}{\pi} t \leq 1 + e^{t+n\pi} \sin t$$

donc

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} \frac{1}{1 + e^{t+n\pi} |\sin t|} dt &\leq \int_0^{\pi/2} \frac{1}{1 + e^{t+n\pi} \frac{2}{\pi} t} dt \\ &\leq \int_0^{\pi/2} \frac{1}{1 + e^{n\pi} \frac{2}{\pi} t} dt \\ &= \left[ \frac{\ln \left( 1 + e^{n\pi} \frac{2}{\pi} t \right)}{e^{n\pi} \frac{2}{\pi}} \right]_0^{\pi/2} \\ &= \frac{\pi}{2} \frac{\ln (1 + e^{n\pi})}{e^{n\pi}}. \end{aligned}$$

De même, on a  $\forall t \in \left[\frac{\pi}{2} ; \pi\right]$ ,  $\frac{2}{\pi}(\pi - t) \leq \sin t$  donc

$$\begin{aligned} \int_{\pi/2}^{\pi} \frac{1}{1 + e^{t+n\pi} \sin t} dt &\leq \int_{\pi/2}^{\pi} \frac{1}{1 + e^{n\pi} \frac{2}{\pi} (\pi - t)} dt \\ &= \left[ \frac{\ln \left( 1 + e^{n\pi} \frac{2}{\pi} (\pi - t) \right)}{-e^{n\pi} \frac{2}{\pi}} \right]_{\pi/2}^{\pi} \\ &= \frac{\pi}{2} \frac{\ln (1 + e^{n\pi})}{e^{n\pi}}. \end{aligned}$$

Ainsi, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on a

$$0 \leq \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{1}{1 + e^x |\sin x|} dx \leq \pi \frac{\ln (1 + e^{n\pi})}{e^{n\pi}} = a_n.$$

Or  $1 + e^{n\pi} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} e^{n\pi} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$  donc  $\ln (1 + e^{n\pi}) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \ln (e^{n\pi}) = n\pi$ .

Donc  $a_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \pi^2 \frac{n}{e^{n\pi}} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{1}{n^2}\right)$ .

Or  $\sum \frac{1}{n^2}$  converge donc  $\sum a_n$  converge.

Donc  $\sum \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{1}{1 + e^x |\sin x|} dx$  converge.

Donc  $\int_0^{+\infty} \frac{1}{1 + e^x |\sin x|} dx$  converge.

## 6.2 Intégrales généralisées sur d'autres types d'intervalles

### 6.2.1 Intégrales généralisées sur $[a ; b[$

Dans cette partie,  $a$  est un réel et  $b$  est un réel ou  $+\infty$ , de sorte que  $a < b$ .

---

#### Définition 6.41

Soit  $f \in \mathcal{C}_m^0([a ; b[, \mathbb{K})$ .

On dit que l'intégrale  $\int_a^b f$  converge quand  $\int_a^x f$  a une limite finie quand  $x$  tend vers  $b^-$ .

Dans ce cas, on pose  $\int_a^b f = \lim_{x \rightarrow b^-} \int_a^x f$ .

Dans le cas contraire, on dit que l'intégrale  $\int_a^b f$  diverge (ou qu'elle est divergente).

### 6.2.2 Intégrales généralisées sur $]a ; b]$

Dans cette partie,  $a$  est un réel ou  $-\infty$  et  $b$  un réel, de sorte que  $a < b$ .

---

#### Définition 6.42

Soit  $f \in \mathcal{C}_m^0(]a ; b], \mathbb{K})$ .

On dit que l'intégrale  $\int_a^b f$  converge quand  $\int_x^b f$  a une limite finie quand  $x$  tend vers  $a^+$ .

Dans ce cas, on pose  $\int_a^b f = \lim_{x \rightarrow a^+} \int_x^b f$ .

Dans le cas contraire, on dit que l'intégrale  $\int_a^b f$  diverge (ou qu'elle est divergente).

Les résultats suivants sont à connaître.

---

#### Exemple 6.43

▷  $\int_0^1 \ln(t) dt$  converge.

▷ Soit  $\alpha$  un réel. L'intégrale  $\int_0^1 \frac{1}{t^\alpha} dt$  converge ssi  $\alpha < 1$  (intégrale dite de Riemann).

---

*Démonstration 6.44*

► La fonction  $\ln$  est continue sur  $]0 ; 1]$ .

Pour  $x \in ]0 ; 1]$ , on a

$$\int_x^1 \ln(t) dt = [t \ln t - t]_x^1 = -1 - x \ln x + x.$$

Or  $\lim_{x \rightarrow 0} x \ln x = 0$  donc  $\int_x^1 \ln(t) dt \xrightarrow{x \rightarrow 0} -1$ .

Donc  $\int_0^1 \ln(t) dt$  converge et vaut  $-1$ .

► La fonction  $t \mapsto \frac{1}{t^\alpha}$  est continue sur  $]0 ; 1]$ .

Pour  $x \in ]0 ; 1]$ , on a

$$\int_x^1 \frac{1}{t^\alpha} dt = \int_x^1 t^{-\alpha} dt = \left[ \frac{1}{1-\alpha} t^{1-\alpha} \right]_x^1 = \frac{1}{1-\alpha} (1 - x^{1-\alpha}).$$

Donc

$$\begin{cases} \int_x^1 \frac{1}{t^\alpha} dt \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{1}{1-\alpha} & \text{si } \alpha < 1 \\ \int_x^1 \frac{1}{t^\alpha} dt \xrightarrow{x \rightarrow 0} +\infty & \text{si } \alpha > 1 \\ \int_x^1 \frac{1}{t^\alpha} dt = -\ln x \xrightarrow{x \rightarrow 0} +\infty & \text{si } \alpha = 1 \end{cases}$$

Donc  $\int_0^1 \frac{1}{t^\alpha} dt$  converge ssi  $\alpha < 1$  et vaut  $\frac{1}{1-\alpha}$ . ■

---

**Exercice 6.45**

Montrez que l'intégrale  $\int_1^2 \frac{1}{\ln t} dt$  diverge.

À quelle condition sur  $\alpha$  l'intégrale  $\int_1^2 \frac{(t-1)^\alpha}{\ln t} dt$  converge-t-elle ?

---

*Correction 6.46*

► La fonction  $t \mapsto \frac{1}{\ln t}$  est continue sur  $]1 ; 2]$ .

On veut montrer que  $\int_1^2 \frac{1}{\ln t} dt$  diverge *i.e.*  $\int_x^2 \frac{1}{\ln t} dt$  n'a pas de limite réelle quand  $x \rightarrow 1^+$ .

On effectue le changement de variable  $\begin{cases} s = \ln t \\ ds = \frac{dt}{t} \end{cases} \iff \begin{cases} t = e^s \\ dt = e^s ds \end{cases}$

On a ramené le problème à la non-existence d'une limite réelle de  $\int_X^{\ln 2} \frac{e^s}{s} ds$  quand  $X \rightarrow 0$

*i.e.* à la divergence de  $\int_0^{\ln 2} \frac{e^s}{s} ds$ .

Or pour tout  $s > 0$ ,  $\frac{e^s}{s} \geq \frac{1}{s} \geq 0$  et  $\int_0^{\ln 2} \frac{1}{s} ds$  diverge.

Donc par comparaison de fonctions positives,  $\int_0^{\ln 2} \frac{e^s}{s} ds$  diverge *i.e.*  $\int_1^2 \frac{1}{\ln t} dt$  diverge.

► Autre méthode :

Pour tout  $t > 1$ ,  $\ln t \leq t - 1$  donc  $0 \leq \frac{1}{t-1} \leq \frac{1}{\ln t}$ .

Or  $\int_1^2 \frac{1}{t-1} dt = \int_0^1 \frac{1}{t} dt$  diverge.

Donc par comparaison de fonctions positives,  $\int_1^2 \frac{1}{\ln t} dt$  diverge.

► La fonction  $t \mapsto \frac{(t-1)^\alpha}{\ln t}$  est continue et positive sur  $]1; 2]$ .

On a  $\frac{(t-1)^\alpha}{\ln t} \underset{t \rightarrow 1}{\sim} (t-1)^{\alpha-1} = \frac{1}{(t-1)^{1-\alpha}}$  car  $\ln t \underset{t \rightarrow 1}{\sim} t-1$ .

Donc  $\int_1^2 \frac{(t-1)^\alpha}{\ln t} dt$  converge ssi  $1-\alpha < 1$  *i.e.*  $\alpha > 0$ .

On peut remarquer que par changement de variable  $x \mapsto -x$ , l'intégrale  $\int_a^b f(t) dt$  est de même nature (et, dans le cas convergent, a la même valeur) que  $\int_{-b}^{-a} f(-u) du$ . Les résultats valables en un point réel ne dépendent donc pas du côté du point où on se place.

---

*Exemple 6.47*

► Si  $a$  est un réel, alors  $\int_a^{a+1} \frac{1}{(t-a)^\alpha} dt$  converge ssi  $\alpha < 1$ .

► Si  $a$  est un réel, alors  $\int_{a-1}^a \frac{1}{(a-t)^\alpha} dt$  converge ssi  $\alpha < 1$ .

►  $\int_0^1 \ln(1-t) dt$  converge.

### 6.2.3 Intégrales généralisées sur $]a; b[$

Dans cette partie,  $a$  et  $b$  sont des réels ou des infinis tels que  $a < b$ .

---

#### Définition 6.48

Soit  $f \in \mathcal{C}_m^0(]a; b[, \mathbb{K})$ .

On dit que l'intégrale  $\int_a^b f$  converge quand il existe  $c \in ]a; b[$  tel que  $\int_a^c f$  et  $\int_c^b f$  convergent.

Dans ce cas, on pose  $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f = \lim_{x \rightarrow a^+} \int_x^c f + \lim_{y \rightarrow b^-} \int_c^y f$ .

Dans le cas contraire, on dit que l'intégrale  $\int_a^b f$  diverge (ou qu'elle est divergente).

---

*Remarque 6.49*

Grâce à la relation de Chasles, on constate que la valeur de  $c$  n'est finalement pas importante : si ça marche pour un certain réel  $c \in ]a ; b[$ , alors ça marche pour toute autre valeur prise dans  $]a ; b[$ .

---

**Exercice 6.50**

Montrez que l'intégrale de Gauss  $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt$  converge.

---

*Correction 6.51*

La fonction  $t \mapsto e^{-t^2}$  est continue et positive sur  $]-\infty ; +\infty[$ .

$\int_1^{+\infty} e^{-t^2} dt$  converge car pour tout  $t \in [1 ; +\infty[$ ,  $t^2 \geq t$  donc  $0 \leq e^{-t^2} \leq e^{-t}$  et  $\int_1^{+\infty} e^{-t} dt$  converge.

Or  $t \mapsto e^{-t^2}$  est paire donc  $\int_{-\infty}^{-1} e^{-t^2} dt$  est de même nature que  $\int_1^{+\infty} e^{-t^2} dt$  donc elle converge.

Finalement,  $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt$  converge.

---

**Exercice 6.52**

Même chose avec l'intégrale  $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{t(1-t)}} dt$ .

---

*Correction 6.53*

La fonction  $t \mapsto \frac{1}{\sqrt{t(1-t)}}$  est continue et positive sur  $]0 ; 1[$ .

Pour tout  $t \in \left]0 ; \frac{1}{2}\right]$ ,  $0 \leq \frac{1}{\sqrt{t(1-t)}} \leq \frac{2}{\sqrt{t}} = \frac{2}{t^{1/2}}$ .

Or  $\int_0^{1/2} \frac{1}{t^{1/2}} dt$  converge donc  $\int_0^{1/2} \frac{1}{\sqrt{t(1-t)}} dt$  converge.

Pour tout  $t \in \left[\frac{1}{2} ; 1\right[$ ,  $0 \leq \frac{1}{\sqrt{t(1-t)}} \leq \frac{2}{\sqrt{1-t}} = \frac{2}{(1-t)^{1/2}}$ .

Or  $\int_{1/2}^1 \frac{1}{(1-t)^{1/2}} dt$  converge donc  $\int_{1/2}^1 \frac{1}{\sqrt{t(1-t)}} dt$  converge.

Finalement,  $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{t(1-t)}} dt$  converge.



---

**Exercice 6.54**

Même chose avec l'intégrale  $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} dt$ .

---

*Correction 6.55*

La fonction  $t \mapsto \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}}$  est continue et positive sur  $]0 ; +\infty[$ .

Pour tout  $t \geq 1$ ,  $0 \leq \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} \leq e^{-t}$  et  $\int_1^{+\infty} e^{-t} dt$  converge donc  $\int_1^{+\infty} \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} dt$  converge.

On a  $\frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} \underset{t \rightarrow 0}{\sim} \frac{1}{\sqrt{t}}$  et  $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{t}} dt$  converge donc  $\int_0^1 \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} dt$  converge.

Finalement,  $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} dt$  converge.

---

**Exercice 6.56**

Montrez que pour tout  $\alpha > 0$ ,  $\int_0^{+\infty} \frac{1}{t^\alpha} dt$  diverge.

---

*Correction 6.57*

Clair.

## 6.2.4 Propriétés communes à toutes ces intégrales

Toutes les propriétés vues dans la première section sont préservées : linéarité, positivité, croissance, relation de Chasles.

En voici trois autres.

### 6.2.4.1 Changement de variable

---

**Proposition 6.58**

Soient  $a, b, \alpha, \beta$  des réels ou des infinis tels que  $a < b$  et  $\alpha < \beta$  et  $f \in \mathcal{C}_m^0(]a ; b[, \mathbb{K})$ .

Si  $\varphi$  est une bijection de classe  $\mathcal{C}^1$  et strictement croissante de  $]a ; \beta[$  dans  $]a ; b[$ , alors les intégrales  $\int_a^b f(t) dt$  et  $\int_\alpha^\beta f \circ \varphi(u) \varphi'(u) du$  sont de même nature et, si elles sont convergentes, sont égales.

---

**Démonstration 6.59**

Soit  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$  tel que  $a < x \leq y < b$ .

D'après la formule classique du changement de variable, on a

$$\int_x^y f(t) dt = \int_{\varphi^{-1}(x)}^{\varphi^{-1}(y)} f(\varphi(u)) \varphi'(u) du.$$

On a  $\varphi^{-1}(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \alpha$  et  $\varphi^{-1}(y) \xrightarrow{y \rightarrow b} \beta$ .

Donc

$$\begin{aligned} \int_a^b f \text{ converge} &\iff \int_x^y f \text{ a une limite finie quand } x \rightarrow a^+ \text{ et } y \rightarrow b^- \\ &\iff \int_{\varphi^{-1}(x)}^{\varphi^{-1}(y)} f(\varphi(u)) \varphi'(u) du \text{ a une limite finie quand } x \rightarrow a^+ \text{ et } y \rightarrow b^- \\ &\iff \int_\lambda^\mu f(\varphi(u)) \varphi'(u) du \text{ a une limite finie quand } \lambda \rightarrow \alpha^+ \text{ et } \mu \rightarrow \beta^- \\ &\iff \int_\alpha^\beta f(\varphi(u)) \varphi'(u) du \text{ converge.} \end{aligned}$$

■

---

**Remarque 6.60**

On a évidemment un résultat analogue avec un changement de variable strictement décroissant et des bornes inversées.

Comme une bijection de classe  $\mathcal{C}^1$  entre deux intervalles est forcément strictement monotone, l'hypothèse de stricte monotonie est redondante ; mais comme elle est explicitement dans le programme de MPI, il vaut mieux la préciser (de toute façon, elle sera évidente dans les cas pratiques et ne nécessitera pas de longues preuves).

---

**Exercice 6.61**

Montrez que  $\int_0^{\pi/2} \sqrt{\tan t} dt$  converge et qu'on a l'égalité  $\int_0^{\pi/2} \sqrt{\tan t} dt = \int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{u}}{1+u^2} du$ .

---

**Correction 6.62**

On effectue le changement de variable  $u = \tan t$ .

Sous réserve de convergence, on a

$$\int_0^{\pi/2} \sqrt{\tan t} dt = \int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{u}}{1+u^2} du.$$

Or, comme  $u \mapsto \frac{\sqrt{u}}{1+u^2}$  est continue et positive sur  $[0; +\infty[$  et  $\frac{\sqrt{u}}{1+u^2} \underset{u \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{u^{3/2}}$  et  $\frac{3}{2} > 1$ ,  $\int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{u}}{1+u^2} du$  converge.

---

**Exercice 6.63**

Montrez que  $\int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{1+t^2} dt$  converge et vaut 0.

Déduisez-en la valeur de  $\int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{a^2+t^2} dt$  où  $a > 0$ .

---

**Correction 6.64**

► La fonction  $\varphi : t \mapsto \frac{\ln t}{1+t^2}$  est continue sur  $]0 ; +\infty[$ .

Sur  $]0 ; 1]$ ,  $\varphi$  est négative et sur  $[1 ; +\infty[$ ,  $\varphi$  est positive.

On a  $\varphi(t) \underset{t \rightarrow 0}{\sim} \ln t$  et  $\int_0^1 \ln(t) dt$  converge donc  $\int_0^1 \varphi(t) dt$  converge par comparaison de fonctions à signe constant.

On a  $\ln t \underset{t \rightarrow +\infty}{=} o(\sqrt{t})$  donc il existe  $A > 0$  tel que pour tout  $t \geq A$ ,  $0 \leq \ln t \leq \sqrt{t}$  donc

$$0 \leq \frac{\ln t}{1+t^2} \leq \frac{\sqrt{t}}{1+t^2} \leq \frac{\sqrt{t}}{t^2} = \frac{1}{t^{3/2}}$$

.

Or  $\frac{3}{2} > 1$  donc  $\int_A^{+\infty} \frac{1}{t^{3/2}} dt$  converge donc  $\int_A^{+\infty} \frac{\ln t}{1+t^2} dt$  converge et donc  $\int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{1+t^2} dt$  converge.

On veut montrer que  $\int_0^1 \frac{\ln t}{1+t^2} dt = - \int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{1+t^2} dt$  de sorte que  $\int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{1+t^2} dt = 0$ .

En effectuant le changement de variable  $\begin{cases} t = \frac{1}{u} \\ dt = -\frac{1}{u^2} du \end{cases}$  (où  $t \mapsto \frac{1}{t}$  est une bijection  $\mathcal{C}^1$  strictement décroissante de  $]0 ; 1]$  dans  $[1 ; +\infty[$ ), on obtient

$$\int_0^1 \frac{\ln t}{1+t^2} dt = \int_{+\infty}^1 \frac{\ln 1/u}{1+(1/u)^2} \left( \frac{-1}{u^2} \right) du = - \int_1^{+\infty} \frac{\ln u}{1+u^2} du.$$

D'où l'égalité.

Donc  $\int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{1+t^2} dt = 0$ .

► Soit  $a > 0$ .

$\int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{a^2+t^2} dt$  converge (idem).

On a

$$\begin{aligned}
 \int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{a^2 + t^2} dt &= \frac{1}{a^2} \int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{1 + (t/a)^2} dt \\
 &= \frac{1}{a^2} \int_0^{+\infty} \frac{a \ln(au)}{1 + u^2} du \quad \left. \begin{array}{l} t = au \\ dt = a du \end{array} \right\} \\
 &= \frac{1}{a} \int_0^{+\infty} \frac{\ln a}{1 + u^2} du + \underbrace{\frac{1}{a} \int_0^{+\infty} \frac{\ln u}{1 + u^2} du}_{=0} \\
 &= \frac{\pi \ln a}{2a}.
 \end{aligned}$$

### 6.2.4.2 Intégration par parties

Si  $f$  est une fonction définie sur  $]a ; b[$  et a des limites finies en  $a^+$  et en  $b^-$ , on note  $[f]_a^b = \lim_{b^-} f - \lim_{a^+} f$ .

#### Proposition 6.65

Soient  $a, b$  des réels ou des infinis tels que  $a < b$  et  $(f, g) \in \mathcal{C}^1(]a ; b[, \mathbb{K})$ .

Si parmi les trois quantités suivantes

$$\int_a^b f'g, \quad \int_a^b fg', \quad [fg]_a^b$$

deux existent, alors la troisième existe aussi et, dans ce cas, on a l'égalité habituelle

$$\int_a^b f'g = [fg]_a^b - \int_a^b fg'$$

.

#### Démonstration 6.66

Soit  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$  tel que  $a < x \leq y < b$ .

On a  $\int_x^y fg' = [fg]_x^y - \int_x^y f'g$ .

Si parmi les quantités  $\int_x^y fg'$ ,  $\int_x^y f'g$  et  $[fg]_x^y = f(y)g(y) - f(x)g(x)$  deux ont des limites finies quand  $x \rightarrow a$  et  $y \rightarrow b$ , alors la troisième aussi (par opération sur les limites).

Dans ce cas, les limites sont égales :

$$\int_a^b fg' = [fg]_a^b - \int_a^b f'g.$$

■

En pratique, pour éviter d'écrire des choses qui n'ont pas de sens, il vaut mieux revenir à une vraie intégration par parties sur un segment  $[x ; y] \subseteq ]a ; b[$ , s'assurer qu'on peut faire tendre  $x$  vers  $a$  et  $y$  vers  $b$ , puis le faire effectivement pour obtenir la relation entre les intégrales.

---

**Exercice 6.67**

Pour  $n \in \mathbb{N}$ , on pose  $u_n = \int_0^{+\infty} t^n e^{-t} dt$ .

Montrez que les intégrales  $u_n$  convergent, donnez une relation de récurrence simple entre  $u_n$  et  $u_{n+1}$ , puis donnez la valeur de  $u_n$  en fonction de  $n$ .

---

*Correction 6.68*

Pour  $n \in \mathbb{N}$ , la fonction  $t \mapsto t^n e^{-t}$  est continue sur  $[0 ; +\infty[$ .

Sous réserve de convergence, on pose  $u_n = \int_0^{+\infty} t^n e^{-t} dt$  pour  $n \in \mathbb{N}$ .

On a  $t^{n+2} \underset{t \rightarrow +\infty}{=} o(e^t)$  donc  $t^n e^{-t} \underset{t \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{1}{t^2}\right)$ .

Donc il existe  $a > 0$  tel que  $\forall t \geq a, 0 \leq t^n e^{-t} \leq \frac{1}{t^2}$ .

Or  $\int_a^{+\infty} \frac{1}{t^2} dt$  converge donc  $\int_a^{+\infty} t^n e^{-t} dt$  converge et donc  $\int_0^{+\infty} t^n e^{-t} dt$  converge.

Sous réserve de convergence, par intégration par parties, on a

$$\int_0^{+\infty} t^{n+1} e^{-t} dt = [-t^{n+1} e^{-t}]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} (n+1) t^n e^{-t} dt.$$

Les deux intégrales convergent d'après ce qui précède donc l'intégration par parties est licite.

Ainsi, comme  $[-t^{n+1} e^{-t}]_0^{+\infty} = 0$ , on a  $u_{n+1} = (n+1) u_n$ .

Or  $u_0 = \int_0^{+\infty} e^{-t} dt = 1$ .

Donc  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = n!$  (récurrence immédiate).

---

**Exercice 6.69**

Montrez que l'intégrale  $\int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos t}{t^2} dt$  converge, puis déduisez-en que l'intégrale  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$  converge.

---

*Correction 6.70*

► La fonction  $t \mapsto \frac{1 - \cos t}{t^2}$  est continue sur  $]0 ; +\infty[$ .

Pour tout  $t > 0$ ,  $-1 \leq \cos t \leq 1$  donc  $0 \leq 1 - \cos t \leq 2$  donc  $0 \leq \frac{1 - \cos t}{t^2} \leq \frac{2}{t^2}$ .

Or  $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^2} dt$  converge donc  $\int_1^{+\infty} \frac{1 - \cos t}{t^2} dt$  converge.

On a  $\cos t \underset{t \rightarrow 0}{=} 1 - \frac{t^2}{2} + o(t^2)$  donc  $1 - \cos t \underset{t \rightarrow 0}{\sim} \frac{t^2}{2}$  donc  $\frac{1 - \cos t}{t^2} \underset{t \rightarrow 0}{\sim} \frac{1}{2}$ .

Or  $\int_0^1 \frac{1}{2} dt$  converge donc  $\int_0^1 \frac{1 - \cos t}{t^2} dt$  converge.

Finalement,  $\int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos t}{t^2} dt$  converge.

► Soit  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$  tel que  $0 < x \leq y$ .

On a

$$\int_x^y \frac{1 - \cos t}{t^2} dt = \left[ -\frac{1 - \cos t}{t} \right]_x^y + \int_x^y \frac{\sin t}{t} dt.$$

On sait déjà que  $\int_x^y \frac{1 - \cos t}{t^2} dt$  a une limite réelle quand  $x \rightarrow 0$  et  $y \rightarrow +\infty$ .

De plus, on a  $\left[ -\frac{1 - \cos t}{t} \right]_x^y = \frac{1 - \cos x}{x} - \frac{1 - \cos y}{y}$ .

Or  $\frac{1 - \cos x}{x} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{x}{2}$  donc  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = 0$  et  $\frac{1 - \cos y}{y} \underset{y \rightarrow +\infty}{=} \mathcal{O}\left(\frac{1}{y}\right)$  donc  $\lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{1 - \cos y}{y} = 0$  par encadrement.

Donc  $\int_x^y \frac{\sin t}{t} dt$  a une limite réelle quand  $x \rightarrow 0$  et  $y \rightarrow +\infty$  i.e.  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$  converge (NB : elle se nomme intégrale de Dirichlet).

► On peut aussi montrer que  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 t}{t^2} dt$ .

En effet, on a

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt &= \int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos t}{t^2} dt \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{2 \sin^2 t/2}{t^2} dt \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{2 \sin^2 u}{4u^2} du \quad \left\{ \begin{array}{l} t = 2u \\ dt = 2 du \end{array} \right. \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 u}{u^2} du. \end{aligned}$$

### 6.2.4.3 Primitives

#### Proposition 6.71

Soient  $f \in \mathcal{C}_m^0(]a ; b[, \mathbb{K})$  et  $c \in ]a ; b[$  tel que l'intégrale  $\int_a^c f$  converge.

Alors la fonction  $x \mapsto \int_a^x f$  est l'unique primitive de  $f$  sur  $]a ; b[$  qui a pour limite 0 en  $a^+$ .

---

*Démonstration 6.72*

La fonction  $f$  est continue sur  $]a ; b[$  donc elle possède une primitive  $F$  sur  $]a ; b[$ . Par exemple  $F : x \mapsto \int_c^x f$  où  $x \in ]a ; b[$ .

$\int_a^c f$  converge donc  $F$  a une limite finie en  $a^+$ .

Donc

$$\begin{aligned}\forall x \in ]a ; b[, \quad \int_a^x f &= \lim_{y \rightarrow a^+} \int_y^x f \\ &= \lim_{y \rightarrow a^+} (F(x) - F(y)) \\ &= F(x) - \underbrace{\lim_{y \rightarrow a^+} F(y)}_{\text{constante}}.\end{aligned}$$

Donc  $x \mapsto \int_a^x f$  est une primitive de  $f$  sur  $]a ; b[$ .

De plus,  $\lim_{x \rightarrow a^+} \int_a^x f = \lim_{x \rightarrow a^+} F(x) - \lim_{y \rightarrow a^+} F(y) = 0$ . ■

---

**Proposition 6.73**

Soient  $f \in \mathcal{C}_m^0(]a ; b[, \mathbb{K})$  et  $c \in ]a ; b[$  tel que  $\int_c^b f$  converge.

Alors la fonction  $x \mapsto \int_x^b f$  est l'opposée de l'unique primitive de  $f$  sur  $]a ; b[$  qui a pour limite 0 en  $b^-$ .

---

*Exemple 6.74*

- La fonction  $x \mapsto \int_0^x \ln(t) dt$  est la primitive de  $\ln$  qui a pour limite 0 en 0.
- La fonction  $x \mapsto \int_x^{+\infty} \frac{e^{it}}{t^2} dt$  est définie sur  $]0 ; +\infty[$ , de classe  $\mathcal{C}^1$  sur cet intervalle, et sa dérivée est la fonction  $x \mapsto -\frac{e^{ix}}{x^2}$ .

## 6.3 Résumé pour étudier la convergence d'une intégrale

On veut savoir si une intégrale  $\int_a^b f$  existe, où  $a$  et  $b$  sont des réels ou des infinis tels que  $a < b$ .

D'abord, on détermine le plus grand sous-ensemble de  $[a ; b]$  sur lequel  $f$  est continue par morceaux :

- si c'est  $[a ; b]$ , alors il n'y a aucun problème d'existence de l'intégrale : c'est une bête intégrale classique ;
- si c'est  $[a ; b[$  (avec  $a$  réel) ou  $]a ; b]$  (avec  $b$  réel), alors il faut étudier le comportement de  $f$  au voisinage du point ouvert ;
- si c'est  $]a ; b[$ , alors on choisit arbitrairement un point  $c \in ]a ; b[$  et on se ramène deux fois au cas précédent.

Un petit résultat qui supprime parfois le problème en un point ouvert réel : pensez à étudier la limite de la fonction : si elle est réelle, c'est réglé. On dit qu'on a une fausse singularité en ce point réel.

### Proposition 6.75

Soient  $a$  et  $b$  deux réels tels que  $a < b$  et  $f \in \mathcal{C}_m^0(]a ; b], \mathbb{K})$ .

Si  $f$  a une limite réelle en  $a$  par valeurs supérieures, alors on peut prolonger  $f$  par continuité en  $a$ , le prolongement  $\bar{f}$  est une fonction continue par morceaux sur  $[a ; b]$  et l'intégrale  $\int_a^b f$  converge et vaut  $\int_a^b \bar{f}$ .

### Remarque 6.76

Si  $f$  est continue par morceaux sur  $[0 ; +\infty[$  et si  $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \ell$ , alors si  $\ell \neq 0$ ,  $\int_0^{+\infty} f$  diverge (grossièrement).

### Exercice 6.77

Justifiez que l'intégrale  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 t}{t^2} dt$  converge.

### Correction 6.78

La fonction  $t \mapsto \frac{\sin^2 t}{t^2}$  est continue sur  $]0 ; +\infty[$ .

On a  $\sin t \underset{t \rightarrow 0}{\sim} t$  donc  $\frac{\sin^2 t}{t^2} \underset{t \rightarrow 0}{\rightarrow} 1$  donc  $\int_0^1 \frac{\sin^2 t}{t^2} dt$  converge.

Pour tout  $t \geq 1$ ,  $0 \leq \frac{\sin^2 t}{t^2} \leq \frac{1}{t^2}$  or  $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^2} dt$  converge donc  $\int_1^{+\infty} \frac{\sin^2 t}{t^2} dt$  converge.

Finalement,  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 t}{t^2} dt$  converge.

### Exercice 6.79

Montrez que l'intégrale  $\int_0^{+\infty} \frac{t \ln t}{1+t^3} dt$  converge.



## 6.4 Fonctions intégrables sur un intervalle

Dans cette section,  $a$  et  $b$  sont des réels ou des infinis tels que  $a < b$ . On note  $I = ]a ; b[$ .

### 6.4.1 Intégrales absolument convergentes

---

**Définition 6.80**

Soit  $f \in \mathcal{C}_m^0(I, \mathbb{K})$ .

On dit que l'intégrale  $\int_a^b f$  converge absolument (ou est absolument convergente) quand l'intégrale  $\int_a^b |f|$  converge.

Le théorème suivant est primordial pour la suite du cours.

---

**Théorème 6.81**

Soit  $f \in \mathcal{C}_m^0(I, \mathbb{K})$ .

Si l'intégrale  $\int_a^b f$  converge absolument, alors l'intégrale  $\int_a^b f$  converge.

Dans ce cas, on a  $\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|$ .

---

**Démonstration 6.82**

► Si  $f$  est à valeurs réelles, on a  $0 \leq f + |f| \leq 2|f|$ .

Donc si  $\int_a^b |f|$  converge, alors par comparaison de fonctions positives,  $\int_a^b (f + |f|)$  converge.

Donc  $\int_a^b f = \int_a^b (f + |f|) - \int_a^b |f|$  converge.

► Si  $f$  est à valeurs complexes, on a  $|\operatorname{Re} f| \leq |f|$  et  $|\operatorname{Im} f| \leq |f|$ .

Donc si  $\int_a^b |f|$  converge,  $\int_a^b |\operatorname{Re} f|$  et  $\int_a^b |\operatorname{Im} f|$  convergent par comparaison de fonctions positives.

Donc d'après ce qui précède,  $\int_a^b \operatorname{Re} f$  et  $\int_a^b \operatorname{Im} f$  convergent.

Donc  $\int_a^b f = \int_a^b \operatorname{Re} f + i \int_a^b \operatorname{Im} f$  converge. ■

---

**Exercice 6.83**

Montrez que l'intégrale  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^3 t}{t^3} dt$  est absolument convergente et donc convergente.

---

*Correction 6.84*

La fonction  $t \mapsto \frac{\sin^3 t}{t^3}$  est continue sur  $]0 ; +\infty[$ .

On a  $\left| \frac{\sin^3 t}{t^3} \right| \underset{t \rightarrow 0}{\sim} \left| \frac{t^3}{t^3} \right| \xrightarrow{t \rightarrow 0} 1$  : fausse singularité en 0, donc  $\int_0^1 \left| \frac{\sin^3 t}{t^3} \right| dt$  converge.

Pour tout  $t \geq 1$ ,  $\left| \frac{\sin^3 t}{t^3} \right| \leq \frac{1}{t^3}$  or  $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^3} dt$  converge donc  $\int_1^{+\infty} \frac{\sin^3 t}{t^3} dt$  converge absolument par comparaison de fonctions positives.

Finalement,  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^3 t}{t^3} dt$  converge absolument et donc converge.

---

**Exercice 6.85**

Montrez que si  $m$  est un complexe de partie réelle strictement positive, alors l'intégrale  $\int_0^{+\infty} e^{-mt} dt$  converge et donnez sa valeur.

Déduisez-en l'existence et la valeur des intégrales  $\int_0^{+\infty} \sin(t) e^{-t} dt$  et  $\int_0^{+\infty} \cos(t) e^{-t} dt$ .

---

*Correction 6.86*

► On note  $m = a + ib$  où  $(a, b) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$ .

Pour  $t \in [0 ; +\infty[$ , on a  $e^{-mt} = e^{-at} e^{-ibt}$  donc  $|e^{-mt}| = e^{-at}$ .

Or  $a > 0$  donc  $\int_0^{+\infty} |e^{-mt}| dt$  converge donc  $\int_0^{+\infty} e^{-mt} dt$  converge.

► Pour  $X \geq 0$ , on a  $\int_0^X e^{-mt} dt = \left[ \frac{-e^{-mt}}{m} \right]_0^X = \frac{1}{m} (1 - e^{-mX})$ .

Or  $|e^{-mX}| = e^{-aX} \xrightarrow{X \rightarrow +\infty} 0$ .

Donc  $\int_0^{+\infty} e^{-mt} dt = \frac{1}{m}$ .

► Pour  $t \geq 0$ , on a  $\begin{cases} |\sin(t) e^{-t}| \leq e^{-t} \\ |\cos(t) e^{-t}| \leq e^{-t} \end{cases}$  et  $\int_0^{+\infty} e^{-t} dt$  converge donc  $A = \int_0^{+\infty} \cos(t) e^{-t} dt$  et

$B = \int_0^{+\infty} \sin(t) e^{-t} dt$  convergent (absolument).

On a

$$\begin{aligned} A + iB &= \int_0^{+\infty} (\cos t + i \sin t) e^{-t} dt \\ &= \int_0^{+\infty} e^{it} e^{-t} dt \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-(1-i)t} dt \\ &= \frac{1}{1-i} \\ &= \frac{1+i}{2}. \end{aligned}$$

$$\text{Donc } A = \operatorname{Re} \frac{1+i}{2} = \frac{1}{2} \text{ et } B = \operatorname{Im} \frac{1+i}{2} = \frac{1}{2}.$$

---

*Remarque 6.87*

La réciproque est fautive ! On a montré que  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$  converge et qu'elle ne converge pas absolument.

## 6.4.2 Fonctions intégrables

---

### Définition 6.88

Soit  $f \in \mathcal{C}_m^0(I, \mathbb{K})$ .

On dit que  $f$  est intégrable sur  $I$  quand l'intégrale  $\int_a^b f$  converge absolument.

On note alors aussi  $\int_I f = \int_I f(t) dt = \int_a^b f$ .

L'ensemble des fonctions intégrables sur  $I$  est souvent noté  $\mathcal{L}^1(I, \mathbb{K})$ , L comme Lebesgue, mathématicien français de la fin du 19ème et début du 20ème siècle. Par abus de notation, on écrit parfois «  $f$  est  $\mathcal{L}^1$  » pour «  $f$  est intégrable sur  $I$  ».

---

### Exemple 6.89

Soient  $a \in \mathbb{R}$  et  $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$ .

- La fonction  $t \mapsto e^{-t}$  est intégrable sur  $[\varepsilon ; +\infty[$ .  
Plus généralement, la fonction  $t \mapsto t^a e^{-t}$  est intégrable sur  $[\varepsilon ; +\infty[$  (voire  $[0 ; +\infty[$  si  $a > -1$ ).
- La fonction  $t \mapsto \frac{1}{t^\alpha}$  est intégrable sur  $[\varepsilon ; +\infty[$  ssi  $\alpha > 1$  et sur  $]0 ; \varepsilon]$  ssi  $\alpha < 1$ .
- La fonction  $\ln$  est intégrable sur  $]0 ; \varepsilon]$ .

---

**Proposition 6.90**

$\mathcal{L}^1(I, \mathbb{K})$  est un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

---

**Proposition 6.91 (Stricte positivité de l'intégrale)**

Si  $f$  est continue, intégrable sur  $I$  et  $\int_I |f| = 0$ , alors  $f = 0$ .

Par contraposée, si  $f$  est continue, intégrable sur  $I$  et  $f \neq 0$ , alors  $\int_I |f| > 0$ .

### 6.4.3 Théorème de comparaison des fonctions intégrables

---

*Rappel 6.92*

Soient  $f$  et  $g$  deux fonctions définies au voisinage d'un point  $p \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ .

- $f = \mathcal{O}(g)$  au voisinage de  $p$  signifie qu'il existe  $K > 0$  et  $V$  un voisinage de  $p$  tels que

$$\forall x \in V, |f(x)| \leq K |g(x)|.$$

- $f = o(g)$  au voisinage de  $p$  signifie qu'il existe une fonction  $\varepsilon > 0$  et  $V$  un voisinage de  $p$  tels que

$$\forall x \in V, |f(x)| \leq \varepsilon(x) |g(x)| \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow p} \varepsilon(x) = 0.$$

Dans le cas où  $g$  ne s'annule pas (ce qui, en pratique, est toujours le cas) :

- $f = \mathcal{O}(g)$  au voisinage de  $p$  signifie que  $\frac{f}{g}$  est bornée au voisinage de  $p$ .
- $f = o(g)$  au voisinage de  $p$  signifie que  $\frac{f}{g}$  a pour limite 0 en  $p$ .

---

**Théorème 6.93**

Soit  $(f, g) \in \mathcal{C}_m^0(I, \mathbb{K})^2$ .

- Si  $|f| \leq |g|$  sur  $I$  et si  $g$  est intégrable, alors  $f$  est intégrable.
- Si  $f = \mathcal{O}(g)$  au voisinage des bornes ouvertes de  $I$  et  $g$  est intégrable, alors  $f$  est intégrable. C'est vrai en particulier si  $f = o(g)$ .
- Si  $f \sim g$  au voisinage des bornes ouvertes de  $I$ , alors il y a équivalence entre l'intégrabilité de  $f$  et l'intégrabilité de  $g$ .

---

**Exercice 6.94**

Montrez que la fonction  $t \mapsto \frac{\cos t}{\sqrt{t}} e^{-t}$  est intégrable sur  $]0 ; +\infty[$ .

---

*Correction 6.95*

La fonction  $f : t \mapsto \frac{\cos t}{\sqrt{t}} e^{-t}$  est continue sur  $]0 ; +\infty[$ .

On a  $\frac{\cos t}{\sqrt{t}} e^{-t} \underset{t \rightarrow 0}{\sim} \frac{1}{\sqrt{t}}$  et  $t \mapsto \frac{1}{\sqrt{t}}$  est intégrable sur  $]0 ; 1]$  donc  $f$  aussi.

Pour tout  $t \geq 1$ ,  $\left| \frac{\cos t}{\sqrt{t}} e^{-t} \right| \leq e^{-t}$  et  $t \mapsto e^{-t}$  est intégrable sur  $[1 ; +\infty[$  donc  $f$  aussi.

Finalement,  $f$  est intégrable sur  $]0 ; +\infty[$ .

---

**Exercice 6.96**

La fonction  $t \mapsto \frac{\ln t}{\cos t + t^2}$  est-elle intégrable sur  $]0 ; +\infty[$  ?

---

*Correction 6.97*

Pour tout  $t > 1$ ,  $t^2 > 1 \geq -\cos t$  donc  $t^2 + \cos t > 0$ .

Pour tout  $t \in ]0 ; 1]$ ,  $t^2 > 0$  et  $\cos t > 0$  donc  $t^2 + \cos t > 0$ .

Donc  $f : t \mapsto \frac{\ln t}{\cos t + t^2}$  est continue sur  $]0 ; +\infty[$ .

On a  $\frac{\ln t}{\cos t + t^2} \underset{t \rightarrow 0}{\sim} \ln t$  et  $\ln$  est intégrable sur  $]0 ; 1]$  donc  $f$  aussi.

On a  $\cos t + t^2 \underset{t \rightarrow +\infty}{\sim} t^2$  donc  $f(t) \underset{t \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\ln t}{t^2} \underset{t \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{1}{t^{3/2}}\right)$ .

Or  $t \mapsto \frac{1}{t^{3/2}}$  est intégrable sur  $[1 ; +\infty[$  donc  $f$  aussi.

Finalement,  $f$  est intégrable sur  $]0 ; +\infty[$ .

## 6.5 Intégration des relations de comparaison

Les résultats présentés portent sur des fonctions intégrables sur  $[a ; +\infty[$ . On obtient évidemment des résultats analogues sur les autres types d'intervalles.

### 6.5.1 Théorème de comparaison par domination

Dans le cas convergent d'abord, les « restes partiels » suivent la même relation de comparaison.

---

#### Théorème 6.98

Soient  $f, g$  deux fonctions définies sur  $[a ; +\infty[$  avec  $g$  à valeurs dans  $\mathbb{R}_+$ .

Si  $f = \mathcal{O}(g)$  et  $g$  est intégrable sur  $[a ; +\infty[$ , alors  $f$  est intégrable sur  $[a ; +\infty[$ .

De plus,  $\int_x^{+\infty} f = \mathcal{O}\left(\int_x^{+\infty} g\right)$  quand  $x \rightarrow +\infty$ .

Si  $f = o(g)$  et  $g$  est intégrable sur  $[a ; +\infty[$ , alors  $f$  est intégrable sur  $[a ; +\infty[$ .

De plus,  $\int_x^{+\infty} f = o\left(\int_x^{+\infty} g\right)$  quand  $x \rightarrow +\infty$ .

---

#### Démonstration 6.99

► Si  $f = \mathcal{O}(g)$ , alors il existe  $K > 0$  et  $A \geq a$  tels que  $\forall x \geq A, |f(x)| \leq Kg(x)$ .

Donc si  $g$  est  $\mathcal{L}^1$  alors  $|f|$  est  $\mathcal{L}^1$  et donc  $f$  est  $\mathcal{L}^1$ .

De plus,

$$\forall x \geq A, \forall t \geq x, |f(t)| \leq Kg(t)$$

$$\text{donc } \int_x^{+\infty} |f(t)| dt \leq K \int_x^{+\infty} g(t) dt$$

$$\text{donc } \left| \int_x^{+\infty} f(t) dt \right| \leq \int_x^{+\infty} |f(t)| dt \leq K \int_x^{+\infty} g(t) dt$$

$$\text{i.e. } \int_x^{+\infty} f(t) dt = \mathcal{O}\left(\int_x^{+\infty} g(t) dt\right).$$

► Idem avec un « pour tout » devant  $K$  et un  $o$  à la fin pour le cas  $f = o(g)$ . ■

Dans le cas divergent ensuite, les « intégrales partielles » suivent aussi la même relation de comparaison.

---

#### Théorème 6.100

Soient  $f, g$  deux fonctions définies sur  $[a ; +\infty[$  avec  $g$  à valeurs dans  $\mathbb{R}_+$ .

Si  $f = \mathcal{O}(g)$  et  $f$  n'est pas intégrable sur  $[a ; +\infty[$ , alors  $g$  n'est pas intégrable sur  $[a ; +\infty[$ .

De plus,  $\int_a^x f = \mathcal{O}\left(\int_a^x g\right)$  quand  $x \rightarrow +\infty$ .

Si  $f = o(g)$  et  $f$  n'est pas intégrable sur  $[a ; +\infty[$ , alors  $g$  n'est pas intégrable sur  $[a ; +\infty[$ .

De plus,  $\int_a^x f = o\left(\int_a^x g\right)$  quand  $x \rightarrow +\infty$ .

---

*Démonstration 6.101*

► Si  $f = \mathcal{O}(g)$  alors il existe  $K > 0$  et  $A \geq a$  tels que  $\forall x \geq A, |f(x)| \leq Kg(x)$ .

Donc si  $f$  n'est pas  $\mathcal{L}^1$ ,  $\int_a^{+\infty} |f|$  diverge donc  $\int_a^{+\infty} g$  diverge.

Pour  $x \geq A$ , pour  $t \in [A; x]$ , on a  $\int_A^x |f| \leq K \int_A^x g$  donc

$$\int_a^x |f| = \int_a^A |f| + \int_A^x |f| \leq \int_a^A |f| + K \int_A^x g.$$

Or  $\int_A^x g \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$ .

Donc il existe  $B \geq a$  tel que  $\forall x \geq B, \int_a^A |f| \leq K \int_A^x g$ .

Pour  $x \geq \max(A, B)$ , on a  $\int_a^x |f| \leq 2K \int_A^x g \leq 2K \int_a^x g$ .

Donc  $\left| \int_a^x f \right| \leq \int_a^x |f| \leq 2K \int_a^x g$ .

Donc  $\int_a^x f \underset{x \rightarrow +\infty}{=} \mathcal{O} \left( \int_a^x g \right)$ .

► Idem avec un « pour tout » devant le  $K$  et un  $o$  à la fin dans le cas  $f = o(g)$ . ■

## 6.5.2 Théorème de comparaison par équivalence

---

### **Théorème 6.102**

Soient  $f, g$  deux fonctions définies sur  $[a; +\infty[$  avec  $g$  à valeurs dans  $\mathbb{R}_+$ .

Si  $f \sim g$ , alors l'intégrabilité de  $f$  est équivalente à l'intégrabilité de  $g$ .

De plus :

► si les fonctions sont intégrables, alors les restes partiels sont équivalents :

$$\int_x^{+\infty} f \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \int_x^{+\infty} g$$

► si les fonctions ne sont pas intégrables, alors les intégrales partielles divergent et sont équivalentes :

$$\int_a^x f \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \int_a^x g.$$

---

*Démonstration 6.103*

On a  $f \underset{+\infty}{\sim} g \iff f - g \underset{+\infty}{=} o(g)$ .

Si  $g$  est  $\mathcal{L}^1$  alors d'après le Théorème 6.98, on a

$$\begin{aligned} \int_x^{+\infty} (f - g) &\underset{x \rightarrow +\infty}{=} o\left(\int_x^{+\infty} g\right) \\ \int_x^{+\infty} f - \int_x^{+\infty} g &\underset{x \rightarrow +\infty}{=} o\left(\int_x^{+\infty} g\right) \\ \int_x^{+\infty} f &\underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \int_x^{+\infty} g. \end{aligned}$$

Si  $g$  n'est pas  $\mathcal{L}^1$ , d'après le Théorème 6.100, on a

$$\begin{aligned} \int_a^x (f - g) &\underset{x \rightarrow +\infty}{=} o\left(\int_a^x g\right) \\ \int_a^x f - \int_a^x g &\underset{x \rightarrow +\infty}{=} o\left(\int_a^x g\right) \\ \int_a^x f &\underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \int_a^x g. \end{aligned}$$

■



# Chapitre 7

## Intégrales à paramètre

### Sommaire

---

<b>7.1</b>	<b>Introduction . . . . .</b>	<b>230</b>
<b>7.2</b>	<b>Convergence simple . . . . .</b>	<b>231</b>
7.2.1	Convergence simple d'une suite de fonctions . . . . .	231
7.2.2	Convergence simple d'une série de fonctions . . . . .	233
<b>7.3</b>	<b>Suites et séries de fonctions intégrables . . . . .</b>	<b>234</b>
7.3.1	Théorème de convergence dominée . . . . .	234
7.3.2	Théorème d'intégration terme à terme . . . . .	237
<b>7.4</b>	<b>Fonctions définies par une intégrale à paramètre . . . . .</b>	<b>239</b>
7.4.1	Continuité . . . . .	239
7.4.2	Dérivabilité . . . . .	240
<b>7.5</b>	<b>Domination sur des sous-intervalles . . . . .</b>	<b>244</b>
<b>7.6</b>	<b>Complément : la fonction <math>\Gamma</math> d'Euler . . . . .</b>	<b>247</b>

---

Dans ce chapitre,  $\mathbb{K}$  désigne l'ensemble  $\mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ . Les fonctions dans ce chapitre sont à valeurs dans  $\mathbb{K}$ .

On considère dans ce chapitre des intégrales de la forme  $\int_a^b f(p, t) dt$  où  $f(p, t)$  est une expression qui dépend de deux variables  $p$  et  $t$ ,  $p$  pouvant être de n'importe quel type mais  $t$  bien sûr réelle. Par habitude, on distingue dans le vocabulaire ces deux variables :  $t$  est appelée la variable d'intégration (notez le  $dt$  qui le signale) et  $p$  est appelée le paramètre.

L'intégrale  $\int_a^b f(p, t) dt$  est donc une intégrale qui dépend du paramètre  $p$  (mais qui ne dépend bien entendu pas de  $t$ ) et l'objet de ce chapitre est d'étudier des résultats concernant cette dépendance vis-à-vis de  $p$  ; en somme, d'étudier des propriétés de l'application  $p \mapsto \int_a^b f(p, t) dt$ .

Les sections 2 et 3 étudient surtout le cas où  $p$  est un paramètre entier naturel, les suivantes le cas où  $p$  est un paramètre réel.

### 7.1 Introduction

Pour commencer, un exercice d'intervention de symboles, qui marque le début de l'étude de ce problème général et qui va nous occuper durant quelques chapitres.

---

**Exercice 7.1**

Pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , on pose  $f_n(x) = n^2 e^{-nx} (1 - e^{-x})$ .

Pour  $x \geq 0$ , que vaut  $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x)$  ?

Montrez la convergence de l'intégrale  $\int_0^{+\infty} f_n(x) dx$  et donnez sa valeur en fonction de  $n$ .

Comparez  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} f_n(x) dx$  et  $\int_0^{+\infty} \left( \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) \right) dx$ .

Quelle conclusion peut-on en tirer ?

---

**Correction 7.2**

► Si  $x = 0$ , alors  $f_n(x) = 0 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ .

Si  $x > 0$ , alors  $0 < e^{-x} < 1$  donc  $e^{-nx} = (e^{-x})^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ .

Donc  $f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$  car  $n^2 \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o((e^x)^n)$ .

Finalement,  $\forall x \geq 0, f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ .

►  $f_n$  est  $\mathcal{C}^0$  sur  $[0 ; +\infty[$ .

Pour  $x \geq 0, 0 \leq f_n(x) \leq n^2 e^{-nx}$  or  $x \mapsto e^{-nx}$  est  $\mathcal{L}^1$  sur  $[0 ; +\infty[$  donc  $f_n$  aussi.

On a

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} n^2 e^{-nx} (1 - e^{-x}) dx &= n^2 \left( \int_0^{+\infty} e^{-nx} dx - \int_0^{+\infty} e^{-(n+1)x} dx \right) \\ &= n^2 \left( \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \\ &= \frac{n}{n+1}. \end{aligned}$$

► On a  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} f_n(x) dx = 1$  et  $\int_0^{+\infty} \left( \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) \right) dx = \int_0^{+\infty} 0 dx = 0$ .

Or  $1 \neq 0$ .

► Conclusion : on ne peut pas intervertir les symboles  $\lim$  et  $\int$  *a priori*.

## 7.2 Convergence simple

### 7.2.1 Convergence simple d'une suite de fonctions

---

**Définition 7.3**

Soient  $A$  une partie de  $\mathbb{R}$  et  $(f_n)$  une suite de fonctions définies sur  $A$ .

On dit que la suite  $(f_n)$  converge simplement sur  $A$  quand pour tout  $x \in A$ , la suite numérique  $(f_n(x))$  converge.

Dans ce cas, on peut définir une fonction  $f$  sur  $A$  en posant, pour tout  $x \in A$ ,  $f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x)$ .

La fonction  $f$  est alors appelée limite simple sur  $A$  de la suite  $(f_n)$  et on dit que la suite  $(f_n)$  converge simplement vers  $f$  sur  $A$ .

---

**Exercice 7.4**

Étudiez, pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , la convergence simple de la suite de fonctions  $f_n : x \mapsto \frac{ne^{-x} + x^2}{n + x}$  sur  $[0 ; +\infty[$

---

*Correction 7.5*

Les fonctions  $f_n$  sont toutes définies sur  $[0 ; +\infty[$ .

Pour  $x \geq 0$ , on a  $f_n(x) = \frac{ne^{-x} + x^2}{n + x} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{ne^{-x}}{n} = e^{-x} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^{-x}$ .

Donc  $(f_n)$  converge simplement vers  $x \mapsto e^{-x}$  sur  $[0 ; +\infty[$ .

---

**Exercice 7.6**

Même question avec la suite de fonctions  $f_n : x \mapsto \frac{x^n}{1 + x^n}$  sur  $[0 ; +\infty[$ .

---

*Correction 7.7*

Les fonctions  $f_n$  sont toutes définies sur  $[0 ; +\infty[$ .

Pour  $x \geq 0$ , on a  $f_n(x) = \frac{x^n}{1 + x^n}$ .

Si  $x \in [0 ; 1[$ , on a  $f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ .

Si  $x = 1$ , on a  $f_n(x) = \frac{1}{2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2}$ .

Si  $x \in ]1 ; +\infty[$ , on a  $f_n(x) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} 1 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$ .

Donc  $(f_n)$  converge simplement vers  $x \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ 1/2 & \text{si } x = 1 \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$  sur  $[0 ; +\infty[$ .

---

**Exercice 7.8**

Même question avec la suite de fonctions  $f_n : x \mapsto n^\alpha x^n (1 - x)$  où  $\alpha$  est un réel strictement positif.

---

*Correction 7.9*

Si  $x = 0$  ou  $x = 1$ , on a  $f_n(x) = 0 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ .

Si  $x \in ]0 ; 1[$ , on a  $n^\alpha \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o\left(\left(\frac{1}{x}\right)^n\right)$  donc  $n^\alpha x^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$  donc  $f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ .

Donc la suite  $(f_n)$  converge simplement vers la fonction nulle sur  $[0 ; 1]$ .

---

**7.2.2 Convergence simple d'une série de fonctions**

---

**Définition 7.10**

Soient  $A$  une partie de  $\mathbb{R}$  et  $(f_n)$  une suite de fonctions définies sur  $A$ .

On dit que la série  $\sum_{n \geq 0} f_n$  converge simplement sur  $A$  quand pour tout  $x \in A$ , la série numérique  $\sum_{n \geq 0} f_n(x)$  converge.

Autrement dit, la série de fonctions  $\sum_{n \geq 0} f_n$  converge simplement sur  $A$  quand la suite des sommes partielles  $\left(\sum_{k=0}^n f_k\right)$  converge simplement sur  $A$ .

Dans ce cas, on peut définir une fonction  $f$  sur  $A$  en posant, pour tout  $x \in A$ ,  $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x)$ .

La fonction  $f$  est alors appelée (fonction) somme sur  $A$  de la série  $\sum_{n \geq 0} f_n$ .

---

**Exercice 7.11**

Étudiez, pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , la convergence simple de la série de fonctions  $f_n : x \mapsto \frac{nx^2}{n^3 + x^2}$  sur  $[0 ; +\infty[$ .

---

*Correction 7.12*

Si  $x = 0$ , on a  $f_n(x) = 0$  donc  $\sum f_n(0)$  converge.

Si  $x > 0$ , on a  $f_n(x) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{nx^2}{n^3} = \frac{x^2}{n^2}$ .

Donc par théorème de comparaison des séries à termes positifs,  $\sum_{n \geq 1} f_n$  converge simplement sur  $[0 ; +\infty[$ .

---

**Exercice 7.13**

Même question avec la série de fonctions  $f_n : x \mapsto \frac{x^n}{1+x^n}$  sur  $[0 ; +\infty[$ .

---

*Correction 7.14*

Si  $x \geq 1$ , la suite  $(f_n(x))_n$  converge vers  $\frac{1}{2}$  ou 1.

Si  $0 \leq x < 1$ ,  $f_n(x) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} x^n$  or  $\sum x^n$  converge donc par théorème de comparaison des séries à termes positifs,  $\sum_{n \geq 1} f_n(x)$  converge.

Donc  $\sum_{n \geq 1} f_n$  converge simplement sur  $[0 ; 1[$ .

---

**Exercice 7.15**

Même question avec la série de fonctions  $f_n : x \mapsto \frac{\sin(nx)}{n^3 + x^3}$  sur  $[0 ; +\infty[$ .

---

*Correction 7.16*

Pour  $x \geq 0$ , on a  $|f_n(x)| \leq \frac{1}{n^3}$  donc  $\sum_{n \geq 1} f_n(x)$  converge (absolument) sur  $[0 ; +\infty[$ .

## 7.3 Suites et séries de fonctions intégrables

Dans cette section, tous les théorèmes sont admis (démonstrations très difficiles!).

### 7.3.1 Théorème de convergence dominée

---

**Théorème 7.17**

Soient  $I$  un intervalle et  $(f_n)$  une suite de fonctions continues par morceaux sur  $I$ .

Si

- ▷ la suite  $(f_n)$  converge simplement sur  $I$  vers une fonction  $f$  qui est continue par morceaux sur  $I$
- ▷ il existe une fonction  $\varphi$ , intégrable sur  $I$  et à valeurs positives, telle que  
pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $|f_n| \leq \varphi$  sur  $I$  (hypothèse de domination)

alors les fonctions  $f$  et  $f_n$  sont toutes intégrables sur  $I$  et  $\int_I f_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_I f$ .

L'hypothèse de domination est essentielle! Il s'agit donc de trouver une fonction  $\varphi$  (dont on dit qu'elle domine la suite  $(f_n)$ ) intégrable et, surtout, qui ne dépend pas de  $n$ !

---

**Exercice 7.18**

Montrez que la suite d'intégrales  $\left( \int_0^{+\infty} \cos(t) e^{-nt^2} dt \right)_{n \geq 1}$  est bien définie et qu'elle converge vers 0.

---

*Correction 7.19*

On pose  $f_n : t \mapsto \cos(t) e^{-nt^2}$  sur  $[0 ; +\infty[$ .

Pour  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $f_n$  est  $\mathcal{C}^0$  sur  $[0 ; +\infty[$ .

Si  $t = 0$ ,  $f_n(t) = 1 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$ .

Sinon,  $f_n(t) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ .

Donc  $(f_n)$  converge simplement vers  $f : t \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } t = 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$  sur  $[0 ; +\infty[$ .

Pour  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $t \in [0 ; +\infty[$ , on a

$$|f_n(t)| \leq e^{-t^2}.$$

Or  $t \mapsto e^{-t^2}$  est  $\mathcal{L}^1$  sur  $[0 ; +\infty[$  donc d'après le théorème de convergence dominée, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $f_n$  est  $\mathcal{L}^1$  sur  $[0 ; +\infty[$  et

$$\int_0^{+\infty} f_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} f = 0.$$

---

**Exercice 7.20**

Montrez que la suite d'intégrales  $\left( \int_0^{\pi/2} \sin^n t dt \right)$  converge vers 0.

---

*Correction 7.21*

Pour  $n \in \mathbb{N}$ , on pose  $f_n : t \mapsto \sin^n t$  sur  $[0 ; \pi/2]$ .

$(f_n)$  est une suite de fonctions  $\mathcal{C}^0$  sur le segment  $[0 ; \pi/2]$  donc  $\mathcal{L}^1$  sur  $[0 ; \pi/2]$ .

Pour  $t \in [0 ; \pi/2]$ ,  $f_n(t) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$  car  $0 \leq \sin^n t < 1$ .

Si  $t = \frac{\pi}{2}$ ,  $f_n(t) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$ .

Donc  $(f_n)$  converge simplement vers  $f : t \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } t \in [0 ; \pi/2[ \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$  sur  $[0 ; \pi/2]$ .

Pour  $n \in \mathbb{N}$  et  $t \in [0 ; \pi/2]$ , on a

$$|f_n(t)| \leq 1.$$

Or  $t \mapsto 1$  est  $\mathcal{L}^1$  sur  $[0 ; \pi/2]$ .

Donc d'après le théorème de convergence dominée, on a

$$\int_0^{\pi/2} f_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^{\pi/2} f = 0.$$

---

**Exercice 7.22**

Montrez que pour tout  $n \geq 2$ ,  $t \mapsto \frac{1}{1+t^n}$  est intégrable sur  $[0; +\infty[$ , puis donnez la limite des intégrales quand  $n \rightarrow +\infty$ .

---

*Correction 7.23*

Pour  $n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$ , on pose  $f_n : t \mapsto \frac{1}{1+t^n}$  sur  $[0; +\infty[$ .

Pour  $0 \leq t < 1$ ,  $f_n(t) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$ .

Pour  $t = 1$ ,  $f_n(t) = \frac{1}{2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2}$ .

Pour  $t > 1$ ,  $f_n(t) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ .

Donc  $(f_n)$  converge simplement vers  $f : t \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } 0 \leq t < 1 \\ 1/2 & \text{si } t = 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$  sur  $[0; +\infty[$ .

Pour  $n \geq 2$  et  $t \in [0; +\infty[$ , on a

$$|f_n(t)| \leq \begin{cases} 1 & \text{si } t \leq 1 \\ 1/t^2 & \text{sinon} \end{cases}$$

Or  $t \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } t \leq 1 \\ 1/t^2 & \text{sinon} \end{cases}$  est  $\mathcal{L}^1$  sur  $[0; +\infty[$  donc par théorème de convergence dominée,  $(f_n)_{n \geq 2}$  est une suite de fonctions  $\mathcal{L}^1$  sur  $[0; +\infty[$  et

$$\int_0^{+\infty} f_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} f = 1.$$

Quitte à utiliser la caractérisation séquentielle de la limite, on peut étendre le théorème précédent à des fonctions paramétrées par un réel.

---

**Théorème 7.24**

Soient  $I, A$  deux intervalles,  $\alpha \in \overline{A}$  et  $(f_a)_{a \in A}$  une famille de fonctions continues par morceaux sur  $I$ .

Si

► pour tout  $x \in I$ ,  $f_a(x) \xrightarrow{a \rightarrow \alpha} f(x)$  où  $f$  est une fonction continue par morceaux sur  $I$

► il existe une fonction  $\varphi$  intégrable sur  $I$  et à valeurs positives, telle que

pour tout  $a \in A$ ,  $|f_a| \leq \varphi$  sur  $I$  (hypothèse de domination)

alors les fonctions  $f$  et  $f_a$  sont toutes intégrables sur  $I$  et  $\int_I f_a \xrightarrow{a \rightarrow \alpha} \int_I f$ .

---

*Démonstration 7.25*

Si pour  $x \in I$ ,  $f_a(x) \xrightarrow{a \rightarrow \alpha} f(x)$ , d'après la caractérisation séquentielle de la limite, pour toute suite  $(a_n) \in A^{\mathbb{N}}$  convergeant vers  $\alpha$ , on a  $f_{a_n}(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(x)$ .

La suite de fonctions  $(f_{a_n})_{n \in \mathbb{N}}$  converge simplement vers  $f$ .

Or, pour  $x \in I$  et  $n \in \mathbb{N}$ ,  $|f_{a_n}(x)| \leq \varphi(x)$  et  $\varphi$  est  $\mathcal{L}^1$  sur  $I$ .

Donc d'après le théorème de convergence dominée,  $\int_I f_{a_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_I f$ .

Ceci est vrai pour toute suite  $(a_n) \in A^{\mathbb{N}}$  qui converge vers  $\alpha$  donc d'après la caractérisation séquentielle de la limite,  $\int_I f_a \xrightarrow{a \rightarrow \alpha} \int_I f$ . ■

### 7.3.2 Théorème d'intégration terme à terme

---

#### **Théorème 7.26**

Soient  $I$  un intervalle et  $(f_n)$  une suite de fonctions continues par morceaux sur  $I$ .

Si

- ▷ la série  $\sum_{n \geq 0} f_n$  converge simplement sur  $I$  vers une fonction continue par morceaux sur  $I$
- ▷ pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $f_n$  est intégrable sur  $I$
- ▷ la série numérique  $\sum_{n \geq 0} \int_I |f_n|$  converge

alors la fonction somme  $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$  est intégrable sur  $I$  et  $\int_I \sum_{n=0}^{+\infty} f_n = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n$ .

L'hypothèse de convergence de la série des intégrales est essentielle, mais hélas très contraignante. Il arrive souvent qu'il soit plus facile d'utiliser le théorème de convergence dominée sur les sommes partielles de la série de fonctions.

---

#### **Exercice 7.27**

Justifiez l'existence et calculez  $\int_0^{+\infty} \frac{t}{e^t - 1} dt$ .



---

Correction 7.28

On pose  $f : t \mapsto \frac{t}{e^t - 1}$  sur  $]0 ; +\infty[$ .

On a  $e^t - 1 \underset{t \rightarrow 0}{\sim} t$  donc  $f(t) \underset{t \rightarrow 0}{\sim} 1 \xrightarrow{t \rightarrow 0} 1$  : fausse singularité, donc  $\int_0^1 f$  converge.

On a  $f(t) \underset{t \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{t}{e^t} = o\left(\frac{1}{t^2}\right)$  donc  $\int_1^{+\infty} f$  converge.

Donc  $\int_0^{+\infty} f$  converge.

Pour  $t > 0$ ,  $f(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} ?$

On a  $f(t) = \frac{te^{-t}}{e^{-t}(e^t - 1)} = \frac{te^{-t}}{1 - e^{-t}}$ .

Or  $0 < e^{-t} < 1$  donc  $f(t) = te^{-t} \sum_{n=0}^{+\infty} (e^{-t})^n = \sum_{n=0}^{+\infty} te^{-(n+1)t}$ .

On pose  $f_n : t \mapsto te^{-(n+1)t}$  pour  $n \in \mathbb{N}$ .

La série de fonctions  $\sum f_n$  converge simplement sur  $]0 ; +\infty[$  et  $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n = f$ .

Donc  $\int_0^{+\infty} f = \int_0^{+\infty} \sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ .

Pour  $n \in \mathbb{N}$ ,  $f_n$  est  $\mathcal{C}^0$  sur  $[0 ; +\infty[$  et  $f_n(t) \underset{t \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{1}{t^2}\right)$ .

Donc pour  $n \in \mathbb{N}$ ,  $f_n$  est  $\mathcal{L}^1$  sur  $[0 ; +\infty[$  donc sur  $]0 ; +\infty[$ .

Étudions la convergence de la série  $\sum_{n \geq 0} \int_0^{+\infty} |f_n|$ .

On a

$$\int_0^{+\infty} |f_n| = \int_0^{+\infty} te^{-(n+1)t} dt = \left[ \frac{-1}{n+1} te^{-(n+1)t} \right]_0^{+\infty} - \frac{-1}{n+1} \int_0^{+\infty} e^{-(n+1)t} dt = \frac{1}{(n+1)^2}.$$

Donc la série  $\sum_{n \geq 0} \int_0^{+\infty} |f_n|$  converge.

D'après le théorème d'intégration terme à terme, on a donc

$$\int_0^{+\infty} f = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^{+\infty} f_n = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(n+1)^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

---

Remarque 7.29

Si on ajoute l'hypothèse « les fonctions  $f_n$  sont positives » alors  $f$  est intégrable sur  $I$  ssi  $\sum \int_I f_n$  converge et, dans ce cas,  $\int_I f = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n$ .

## 7.4 Fonctions définies par une intégrale à paramètre

On s'intéresse aux propriétés des fonctions définies par des intégrales du type  $x \mapsto \int_I f(x, t) dt$ . On dit que  $x$  est un paramètre de l'intégrale  $\int_I f(x, t) dt$ .

### 7.4.1 Continuité

---

**Théorème 7.30 (Théorème de continuité sous le signe intégrale)**

Soient  $A, I$  deux intervalles de  $\mathbb{R}$  et  $f : (x, t) \mapsto f(x, t)$  une fonction définie sur  $A \times I$ .

Si

- ▷ pour tout  $x \in A$ ,  $t \mapsto f(x, t)$  est continue par morceaux sur  $I$
- ▷ pour tout  $t \in I$ ,  $x \mapsto f(x, t)$  est continue sur  $A$
- ▷ il existe une fonction  $\varphi$  intégrable sur  $I$  et à valeurs positives, telle que  
pour tout  $(x, t) \in A \times I$ ,  $|f(x, t)| \leq \varphi(t)$  (hypothèse de domination)

alors pour tout  $x \in A$ ,  $t \mapsto f(x, t)$  est intégrable sur  $I$  et la fonction  $x \mapsto \int_I f(x, t) dt$  est continue sur  $A$ .

---

Démonstration 7.31

Soit  $x_0 \in A$ .

On a  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, t) = f(x_0, t)$  pour tout  $t \in I$ .

De plus, on a  $|f(x, t)| \leq \varphi(t)$  pour tout  $t \in I$ ,  $x \in A$ .

Donc d'après le Théorème 7.24, on a

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \int_I f(x, t) dt = \int_I \left( \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, t) \right) dt = \int_I f(x_0, t) dt.$$

Donc  $x \mapsto \int_I f(x, t) dt$  est continue en  $x_0$ . ■

---

**Exercice 7.32**

Montrez que la fonction  $g : x \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{\cos(xt^2)}{1+t^2} dt$  est définie et continue sur  $\mathbb{R}$ .

---

*Correction 7.33*

On pose  $f : (x, t) \mapsto \frac{\cos(xt^2)}{1+t^2}$  sur  $\mathbb{R} \times [0 ; +\infty[$ .

$f$  est continue sur  $\mathbb{R} \times [0 ; +\infty[$  donc pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $t \mapsto f(x, t)$  est  $\mathcal{C}^0$  sur  $[0 ; +\infty[$  et pour tout  $t \in [0 ; +\infty[$ ,  $x \mapsto f(x, t)$  est  $\mathcal{C}^0$  sur  $\mathbb{R}$ .

Pour  $x \in \mathbb{R}$ ,  $t \in [0 ; +\infty[$ , on a  $|f(x, t)| \leq \frac{1}{1+t^2}$ .

Or  $t \mapsto \frac{1}{1+t^2}$  est  $\mathcal{L}^1$  sur  $[0 ; +\infty[$ .

Donc d'après le théorème de continuité sous le signe intégrale,  $g$  est continue sur  $\mathbb{R}$  et  $t \mapsto f(x, t)$  est  $\mathcal{L}^1$  sur  $[0 ; +\infty[$ .

---

**Exercice 7.34**

Montrez que la fonction  $h : u \mapsto \int_0^1 \text{Arctan}(u + x \ln x) dx$  est définie et continue sur  $\mathbb{R}$ .

---

*Correction 7.35*

On pose  $f : (u, x) \mapsto \text{Arctan}(u + x \ln x)$  sur  $\mathbb{R} \times ]0 ; 1]$ .

$f$  est continue sur  $\mathbb{R} \times ]0 ; 1]$ .

Pour  $u \in \mathbb{R}$ ,  $x \in ]0 ; 1]$ , on a  $|f(u, x)| \leq \frac{\pi}{2}$ .

Or  $x \mapsto \frac{\pi}{2}$  est  $\mathcal{L}^1$  sur  $]0 ; 1]$ .

Donc d'après le théorème de continuité sous le signe intégrale,  $x \mapsto f(u, x)$  est  $\mathcal{L}^1$  sur  $]0 ; 1]$  et  $h$  est continue sur  $\mathbb{R}$ .

## 7.4.2 Dérivabilité

---

**Théorème 7.36 (Théorème de dérivation sous le signe intégrale)**

Soient  $A, I$  deux intervalles de  $\mathbb{R}$  et  $f : (x, t) \mapsto f(x, t)$  une fonction définie sur  $A \times I$ .

Si

- ▷ pour tout  $x \in A$ ,  $t \mapsto f(x, t)$  est continue par morceaux et intégrable sur  $I$

- ▷ pour tout  $t \in I$ ,  $x \mapsto f(x, t)$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $A$
- ▷ pour tout  $x \in A$ ,  $t \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, t)$  est continue par morceaux sur  $I$
- ▷ il existe une fonction  $\varphi$  intégrable et à valeurs positives, telle que

$$\text{pour tout } (x, t) \in A \times I, \left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| \leq \varphi(t) \text{ (hypothèse de domination)}$$

alors la fonction  $g : x \mapsto \int_I f(x, t) dt$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $A$  et pour tout  $x \in A$ ,  $g'(x) = \int_I \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt$ .

*Démonstration 7.37*

La fonction  $g : x \mapsto \int_I f(x, t) dt$  est bien définie sur  $A$  d'après la première hypothèse.

Soient  $x_0 \in A$  et  $x \neq x_0$ .

On veut montrer que  $g$  est dérivable en  $x_0$  et  $g'(x_0) = \int_I \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, t) dt$ , i.e.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} = \int_I \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, t) dt.$$

L'hypothèse de domination justifie la convergence de cette intégrale.

$$\text{On a } \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} = \int_I \frac{f(x, t) - f(x_0, t)}{x - x_0} dt.$$

On veut intervertir  $\lim_{x \rightarrow x_0}$  et  $\int_I$ .

Pour  $t \in I$ ,  $x \mapsto f(x, t)$  est  $\mathcal{C}^1$  donc d'après le théorème des accroissements finis, il existe  $c_{x,t} \in ]x_0 ; x[$  tel que

$$\frac{f(x, t) - f(x_0, t)}{x - x_0} = \frac{\partial f}{\partial x}(c_{x,t}, t).$$

Par théorème d'encadrement, pour  $t \in I$ ,  $\lim_{x \rightarrow x_0} c_{x,t} = x_0$ .

Or  $x \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, t)$  est continue sur  $A$  donc par composition des limites,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\partial f}{\partial x}(c_{x,t}, t) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, t).$$

Or par hypothèse de domination,  $\left| \frac{\partial f}{\partial x}(c_{x,t}, t) \right| \leq \varphi(t)$ .

Donc d'après le théorème de convergence dominée, on a

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \int_I \frac{\partial f}{\partial x}(c_{x,t}, t) dt = \int_I \left( \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\partial f}{\partial x}(c_{x,t}, t) \right) dt = \int_I \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, t) dt.$$

On a donc montré que  $g$  est dérivable sur  $A$  et

$$\forall x \in A, \quad g'(x) = \int_I \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt.$$

Avec les hypothèses  $x \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, t)$  continue sur  $A$  et  $\left| \frac{\partial f}{\partial x}(c_{x,t}, t) \right| \leq \varphi(t)$  et le Théorème 7.30,  $g'$  est en plus continue sur  $A$ , i.e.  $g$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $A$ . ■

### Exercice 7.38

Montrez que la fonction  $g : x \mapsto \int_0^\pi \cos(x \sin t) dt$  est définie et de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}$ .

#### Correction 7.39

On pose  $f : (x, t) \mapsto \cos(x \sin t)$  sur  $\mathbb{R} \times [0 ; \pi]$ .

$f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R} \times [0 ; \pi]$  (par opérations et compositions de fonctions  $\mathcal{C}^1$ ).

Pour  $x \in \mathbb{R}$ ,  $t \mapsto \cos(x \sin t)$  est  $\mathcal{C}^0$  sur le segment  $[0 ; \pi]$  donc  $y$  est intégrable.

On a  $\frac{\partial f}{\partial x}(x, t) = -\sin(t) \sin(x \sin t)$ .

Pour  $x \in \mathbb{R}$ ,  $t \in [0 ; \pi]$ , on a  $\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| \leq 1$ .

Or  $t \mapsto 1$  est  $\mathcal{L}^1$  sur  $[0 ; \pi]$ .

D'après le théorème de dérivation sous le signe intégrale,  $g$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}$  et, pour  $x \in \mathbb{R}$ ,  $g'(x) = -\int_0^\pi \sin(t) \sin(x \sin t) dt$ .

### Exercice 7.40

Montrez que la fonction  $g : x \mapsto \int_0^{+\infty} \cos(xt^2) e^{-t} dt$  est définie et de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}$ .

#### Correction 7.41

On pose  $f : (x, t) \mapsto \cos(xt^2) e^{-t}$  sur  $\mathbb{R} \times [0 ; +\infty[$ .

$f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R} \times [0 ; +\infty[$ .

Pour  $x \in \mathbb{R}$ ,  $t \in [0 ; +\infty[$ ,  $|f(x, t)| \leq e^{-t}$  or  $t \mapsto e^{-t}$  est  $\mathcal{L}^1$  sur  $[0 ; +\infty[$  donc  $t \mapsto f(x, t)$  l'est aussi.

On a  $\frac{\partial f}{\partial x}(x, t) = -t^2 e^{-t} \sin(xt^2)$ .

Donc  $\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| \leq t^2 e^{-t}$ .

Or  $t \mapsto t^2 e^{-t}$  est  $\mathcal{L}^1$  sur  $[0 ; +\infty[$  (car  $t^2 e^{-t} \underset{t \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{1}{t^{7/2}}\right)$ ).

D'après le théorème de dérivation sous le signe intégrale,  $g$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}$  et, pour  $x \in \mathbb{R}$ ,  
 $g'(x) = - \int_0^{+\infty} t^2 e^{-t} \sin(xt^2) dt$ .

Ce théorème est généralisable pour des dérivations d'ordre plus élevé.

### **Théorème 7.42**

Soient  $A, I$  deux intervalles de  $\mathbb{R}$  et  $f : (x, t) \mapsto f(x, t)$  une fonction définie sur  $A \times I$ .

Si

- ▷ pour tout  $x \in A$ ,  $t \mapsto f(x, t)$  est continue par morceaux et intégrable sur  $I$
- ▷ pour tout  $t \in I$ ,  $x \mapsto f(x, t)$  est de classe  $\mathcal{C}^k$  sur  $A$
- ▷ pour tout  $x \in A$ , pour tout  $j \in \llbracket 1 ; k-1 \rrbracket$ ,  $t \mapsto \frac{\partial^j f}{\partial x^j}(x, t)$  est continue par morceaux et intégrable sur  $I$
- ▷ il existe une fonction  $\varphi$  intégrable sur  $I$  et à valeurs positives, telle que

$$\text{pour tout } (x, t) \in A \times I, \quad \left| \frac{\partial^k f}{\partial x^k}(x, t) \right| \leq \varphi(t) \quad (\text{hypothèse de domination})$$

alors la fonction  $g : x \mapsto \int_I f(x, t) dt$  est de classe  $\mathcal{C}^k$  sur  $A$  et pour tout  $x \in A$ , pour tout  $j \in \llbracket 1 ; k \rrbracket$ ,  $g^{(j)}(x) = \int_I \frac{\partial^j f}{\partial x^j}(x, t) dt$ .

### **Exercice 7.43**

Montrez que la fonction  $g : x \mapsto \int_0^{+\infty} \cos(xt^2) e^{-t} dt$  est définie et de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $\mathbb{R}$ .

### *Correction 7.44*

On reprend les notations de la Correction 7.41.

$f$  est  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $\mathbb{R} \times [0 ; +\infty[$ .

Pour montrer que  $g$  est  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $\mathbb{R}$ , il suffit de donner une domination pour toutes les dérivées partielles : pour  $k \in \mathbb{N}$ ,  $x \in \mathbb{R}$ ,  $t \in [0 ; +\infty[$ ,

$$\left| \frac{\partial^k f}{\partial x^k}(x, t) \right| \leq \varphi_k(t)$$

où  $\varphi_k$  est  $\mathcal{L}^1$  sur  $[0 ; +\infty[$ .

On a  $e^{ix} = \cos x + i \sin x$  donc

$$\frac{d^k}{dx^k} e^{ix} = \cos^{(k)} x + i \sin^{(k)} x = i^k e^{ix}$$

donc

$$\cos^{(k)} x = \operatorname{Re} \left( e^{ik\pi/2} e^{ix} \right) = \cos \left( x + k \frac{\pi}{2} \right)$$

donc

$$\frac{\partial^k f}{\partial x^k} (x, t) = t^{2k} e^{-t} \cos \left( xt^2 + k \frac{\pi}{2} \right).$$

Donc  $\left| \frac{\partial^k f}{\partial x^k} (x, t) \right| \leq t^{2k} e^{-t}$  et  $t \mapsto t^{2k} e^{-t}$  est  $\mathcal{L}^1$  sur  $[0; +\infty[$ .

Donc d'après le théorème de dérivation sous le signe intégrale,  $g$  est  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $\mathbb{R}$  et, pour  $x \in \mathbb{R}$ ,  $k \in \mathbb{N}$ ,  
 $g^{(k)}(x) = \int_0^{+\infty} t^{2k} e^{-t} \cos \left( xt^2 + k \frac{\pi}{2} \right) dt.$

## 7.5 Domination sur des sous-intervalles

La continuité étant une propriété locale, il est souvent inutile d'avoir une domination globale sur  $A$  pour conclure. En général, on peut se contenter de domination sur des parties plus petites que  $A$ , en général les segments inclus dans  $A$ , ou toute famille recouvrante de parties de  $A$ .

### Définition 7.45

Soit  $A$  un intervalle.

Une famille  $\mathcal{F}$  de parties de  $A$  est dite recouvrante quand sa réunion est  $A$  :  $A = \bigcup_{X \in \mathcal{F}} X$ .

### Proposition 7.46

Soit  $A$  un intervalle.

La famille des segments inclus dans  $A$  est recouvrante :  $A = \bigcup_{(a,b) \in A^2} [a; b]$ .

### Démonstration 7.47

Tout intervalle est convexe.

Si  $x \in A$ , il existe  $(a, b) \in A^2$  tel que  $a \leq x \leq b$ .

Donc  $x \in [a; b]$ .

Donc  $x \in \bigcup_{(a,b) \in A^2} [a; b]$ .

Donc  $A \subseteq \bigcup_{(a,b) \in A^2} [a; b] \subseteq A$ . ■

On en déduit alors le théorème suivant, dont il vaut mieux à mon avis, sur chaque exercice, présenter le détail des idées.

### Théorème 7.48

Soient  $A, I$  deux intervalles de  $\mathbb{R}$  et  $f : (x, t) \mapsto f(x, t)$  une fonction définie sur  $A \times I$ .

Soit  $\mathcal{F}$  une famille recouvrante de parties de  $A$ .

Si

- ▷ pour tout  $x \in A$ ,  $t \mapsto f(x, t)$  est continue par morceaux sur  $I$
- ▷ pour tout  $t \in I$ ,  $x \mapsto f(x, t)$  est continue sur  $A$
- ▷ pour toute partie  $F$  de  $\mathcal{F}$ , il existe une fonction  $\varphi_F$  intégrable sur  $I$  et à valeurs positives, telle que
 
$$\text{pour tout } (x, t) \in F \times I, |f(x, t)| \leq \varphi_F(t) \text{ (hypothèse de domination)}$$

alors pour tout  $x \in A$ ,  $t \mapsto f(x, t)$  est intégrable sur  $I$  et la fonction  $x \mapsto \int_I f(x, t) dt$  est continue sur  $A$ .

On a de même une version locale des théorèmes de dérivation sous le signe intégrale.

Autrement dit, au lieu de chercher à appliquer les théorèmes précédents directement sur  $A$ , on trouve une famille recouvrante de sous-intervalles sur chacun desquels on peut appliquer les théorèmes précédents, conclure à la continuité ou dérivabilité sur chaque sous-intervalle, puis signaler que par réunion, la propriété reste valable sur  $A$ .

### Exercice 7.49

Montrez que la fonction  $f : x \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt}}{\sqrt{t}} dt$  est définie et continue sur  $]0 ; +\infty[$ .

*Correction 7.50*

On pose  $\varphi : (x, t) \mapsto \frac{e^{-xt}}{\sqrt{t}}$  sur  $]0 ; +\infty[ \times ]0 ; +\infty[$ .

$\varphi$  est continue sur  $]0 ; +\infty[^2$ .

Pour  $t \in ]0 ; +\infty[$ ,  $x \in ]0 ; +\infty[$ ,  $|\varphi(x, t)| \leq \frac{1}{\sqrt{t}}$  est la meilleure majoration possible valable pour  $x > 0$ .

Soit  $a > 0$ .

Pour  $t > 0$ ,  $x \in [a ; +\infty[$ ,  $|\varphi(x, t)| \leq \frac{e^{-at}}{\sqrt{t}}$ .

Or  $\frac{e^{-at}}{\sqrt{t}} \underset{t \rightarrow 0}{\sim} \frac{1}{t^{1/2}}$  donc  $t \mapsto \frac{e^{-at}}{\sqrt{t}}$  est  $\mathcal{L}^1$  sur  $]0 ; 1]$ .

De plus,  $\frac{e^{-at}}{\sqrt{t}} \underset{t \rightarrow +\infty}{\sim} o\left(\frac{1}{t^2}\right)$  donc  $t \mapsto \frac{e^{-at}}{\sqrt{t}}$  est  $\mathcal{L}^1$  sur  $[1 ; +\infty[$ .



D'après le théorème de continuité sous le signe intégrale,  $f$  est continue sur  $[a ; +\infty[$ .

Donc  $f$  est continue sur  $]0 ; +\infty[ = \bigcup_{a>0} [a ; +\infty[$ .

### Exercice 7.51

Montrez que la fonction  $f : x \mapsto \int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+xt)}{t^2} dt$  est définie et continue sur  $[0 ; +\infty[$  et qu'elle est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $]0 ; +\infty[$ . Donnez une expression simple de  $f'(x)$  pour tout  $x > 0$ .

#### Correction 7.52

On pose  $\varphi : (x, t) \mapsto \frac{\ln(1+xt)}{t^2}$  sur  $[0 ; +\infty[ \times [1 ; +\infty[$ .

$\varphi$  est de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $[0 ; +\infty[ \times [1 ; +\infty[$ .

Soit  $a > 0$ .

Pour  $x \in [0 ; a]$ ,  $t \in [1 ; +\infty[$ ,  $\left| \frac{\ln(1+xt)}{t^2} \right| \leq \frac{\ln(1+at)}{t^2}$ .

Or  $t \mapsto \frac{\ln(1+at)}{t^2}$  est continue sur  $[1 ; +\infty[$  et  $\frac{\ln(1+at)}{t^2} \underset{t \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\ln t}{t^2} \underset{t \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{1}{t^{3/2}}\right)$ .

Donc  $t \mapsto \frac{\ln(1+at)}{t^2}$  est  $\mathcal{L}^1$  sur  $[1 ; +\infty[$ .

Donc  $f$  est continue sur  $[0 ; a]$  et donc sur  $[0 ; +\infty[ = \bigcup_{a>0} [0 ; a]$ .

On a  $\frac{\partial \varphi}{\partial x}(x, t) = \frac{t}{t^2(1+xt)} = \frac{1}{t(1+xt)}$ .

Soit  $a > 0$ .

Pour  $x \in [a ; +\infty[$ ,  $t \in [1 ; +\infty[$ ,  $\left| \frac{\partial \varphi}{\partial x}(x, t) \right| \leq \frac{1}{at^2}$ .

Or  $t \mapsto \frac{1}{at^2}$  est  $\mathcal{L}^1$  sur  $[1 ; +\infty[$ .

Donc  $f$  est  $\mathcal{C}^1$  sur  $[a ; +\infty[$  et donc sur  $]0 ; +\infty[ = \bigcup_{a>0} [a ; +\infty[$ .

Pour  $x > 0$ , calculons  $f'(x) = \int_1^{+\infty} \frac{1}{t(1+xt)} dt$ .

On a  $\frac{1}{t(1+xt)} = \frac{1}{t} - \frac{x}{1+xt}$ .

Donc

$$\begin{aligned}
 \int_1^X \frac{1}{t(1+xt)} dt &= \int_1^X \frac{1}{t} dt - x \int_1^X \frac{1}{1+xt} dt \\
 &= \ln X - \ln(1+xX) + \ln(1+x) \\
 &= \ln X - \ln X - \ln\left(x + \frac{1}{x}\right) + \ln(1+x) \\
 &= \ln \frac{1+x}{x}.
 \end{aligned}$$

Donc

$$f'(x) = \int_1^{+\infty} \frac{1}{t(1+xt)} dt = \lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{1+x}{x} = \frac{1+x}{x}.$$

## 7.6 Complément : la fonction $\Gamma$ d'Euler

Pour  $x \in \mathbb{R}$ , on pose, quand cela a un sens

$$\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt.$$

Cette fonction très courante a les propriétés suivantes :

- $\Gamma$  est définie sur  $]0 ; +\infty[$
- $\Gamma$  est de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $]0 ; +\infty[$
- pour tout  $x > 0$ ,  $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$
- pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\Gamma(n) = (n-1)!$
- $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$
- il existe un unique  $\alpha \in ]1 ; 2[$  tel que  $\Gamma'(\alpha) = 0$  et  $\Gamma$  est strictement décroissante sur  $]0 ; \alpha]$  et strictement croissante sur  $]\alpha ; +\infty[$
- $\Gamma$  est convexe sur  $]0 ; +\infty[$
- $\Gamma$  a des limites infinies en 0 et en  $+\infty$ .

---

*Démonstration 7.53*

On pose  $f : (x, t) \mapsto e^{(x-1)\ln t} e^{-t}$  sur  $]0 ; +\infty[ \times ]0 ; +\infty[$ .

$f$  est  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $]0 ; +\infty[^2$ .

Soient  $b > a > 0$ .

Pour  $n \in \mathbb{N}$ ,  $x \in [a ; b]$ ,  $t \in ]0 ; +\infty[$ , on a

$$\frac{\partial^n f}{\partial x^n}(x, t) = \ln^n(t) e^{(x-1)\ln t} e^{-t} = \ln^n(t) \frac{1}{t^{1-x}} e^{-t}.$$

$$\text{Donc } \left| \frac{\partial^n f}{\partial x^n}(x, t) \right| = |\ln^n t| e^{(x-1)\ln t} e^{-t}.$$

On a  $a - 1 \leq x - 1 \leq b - 1$ .

$$\text{Donc } \begin{cases} (x-1)\ln t \leq (b-1)\ln t & \text{si } t \geq 1 \\ (x-1)\ln t \leq (a-1)\ln t & \text{sinon} \end{cases}$$

$$\text{Donc } \left| \frac{\partial^n f}{\partial x^n}(x, t) \right| \leq \varphi(t) \text{ où } \varphi : t \mapsto \begin{cases} |\ln^n t| t^{b-1} e^{-t} & \text{si } t \geq 1 \\ |\ln^n t| t^{a-1} e^{-t} & \text{sinon} \end{cases}$$

Quand  $t \rightarrow +\infty$ ,  $|\ln^n t| t^{b-1} e^{-t} = o\left(\frac{1}{t^2}\right)$  donc  $\varphi$  est  $\mathcal{L}^1$  sur  $[1 ; +\infty[$ .

Quand  $t \rightarrow 0$ ,  $\varphi(t) \sim \frac{|\ln^n t|}{t^{1-a}} = o\left(\frac{1}{t^\alpha}\right)$  où  $1-a < \alpha < 1$  donc  $\varphi$  est  $\mathcal{L}^1$  sur  $]0 ; 1]$ .

Donc  $\varphi$  est  $\mathcal{L}^1$  sur  $]0 ; +\infty[$ .

Donc  $\Gamma$  est  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $[a ; b]$ .

Donc  $\Gamma$  est  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $]0 ; +\infty[ = \bigcup_{0 < a < b} [a ; b]$ . ■

# Chapitre 8

## Espaces préhilbertiens réels

### Sommaire

<b>8.1</b>	<b>Généralités</b>	<b>249</b>
8.1.1	Produit scalaire	249
8.1.2	Exemples fondamentaux	250
8.1.3	Norme euclidienne	251
8.1.4	Vecteurs orthogonaux	254
<b>8.2</b>	<b>Bases orthonormées</b>	<b>255</b>
8.2.1	Familles orthonormées	255
8.2.2	Existence de bases orthonormées	256
8.2.3	Calculs en base orthonormée	258
<b>8.3</b>	<b>Sous-espaces orthogonaux.</b>	<b>258</b>
8.3.1	Orthogonalité de deux sous-espaces vectoriels	258
8.3.2	Orthogonal d'un sous-espace vectoriel	259
<b>8.4</b>	<b>Projection orthogonale sur un sous-espace vectoriel de dimension finie</b>	<b>261</b>
8.4.1	Projection orthogonale	261
8.4.2	Distance à un sous-espace vectoriel	262

Dans tout ce chapitre,  $E$  désigne un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

### 8.1 Généralités

#### 8.1.1 Produit scalaire

##### Définition 8.1

On appelle produit scalaire sur  $E$  toute application  $\varphi$  de  $E^2$  dans  $\mathbb{R}$  qui est

- ▷ bilinéaire (linéaire par rapport à chacune de ses deux variables)
- ▷ symétrique : pour tout  $(x, y) \in E^2$ ,  $\varphi(x, y) = \varphi(y, x)$
- ▷ définie-positive : pour tout  $x \in E$ ,  $\varphi(x, x) \geq 0$  et  $\varphi(x, x) = 0 \iff x = 0$ .

---

### Remarque 8.2

Pour montrer que  $\varphi$  est un produit scalaire, on montre en général d'abord que  $\varphi$  est symétrique, puis qu'elle est linéaire à gauche, la linéarité à droite découlant alors de la symétrie.

---

### Définition 8.3

Quand  $E$  est muni d'un produit scalaire, on dit que  $E$  est un espace préhilbertien. Quand, de plus,  $E$  est de dimension finie, on dit que  $E$  est un espace euclidien.

En général, on note  $\langle \cdot | \cdot \rangle$  les produits scalaires.

## 8.1.2 Exemples fondamentaux

(1) Le produit scalaire de la géométrie vérifie toutes ces propriétés.

(2) Si  $E = \mathbb{R}^n$ , soit  $x = (x_1, \dots, x_n)$  et  $y = (y_1, \dots, y_n)$ , on pose  $\varphi(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i y_i$  :  $\varphi$  est appelé le produit scalaire canonique sur  $\mathbb{R}^n$ .

(3) Plus généralement, si  $E$  est un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension  $n$ , alors à toute base  $\mathcal{B}$  de  $E$ , on peut associer un produit scalaire : si  $x$  et  $y$  sont deux vecteurs de coordonnées  $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$

et  $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ , on pose  $\varphi(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i y_i$ . L'expression matricielle du produit scalaire est alors  $\varphi(x, y) = X^T Y$ .

(4) Si  $a, b$  sont deux réels tels que  $a < b$ ,  $I = [a ; b]$  et  $E = \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$ , alors pour  $f, g$  deux éléments de  $E$ , on pose  $\varphi(f, g) = \int_a^b fg$  :  $\varphi$  est un produit scalaire sur  $E$ .

(5) Si  $I$  est un intervalle et  $E = \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R}) \cap \mathcal{L}^2(I, \mathbb{R})$ , ensemble des fonctions  $f$  à valeurs réelles, continues sur  $I$  et telles que  $f^2$  soit intégrables sur  $I$ , alors pour  $f, g$  deux éléments de  $E$ , on pose  $\varphi(f, g) = \int_I fg$  :  $\varphi$  est un produit scalaire sur  $E$ .

(6) Dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ , l'application  $(A, B) \mapsto \text{tr}(A^T B)$  est un produit scalaire, c'est même le produit scalaire canonique.

---

### Démonstration 8.4 (5)

Montrons que si  $f, g \in \mathcal{L}^2(I, \mathbb{R})$  alors  $fg \in \mathcal{L}^1(I, \mathbb{R})$ .

Pour tout  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ , on a  $|ab| \leq \frac{a^2 + b^2}{2}$ .

Donc pour  $x \in I$ , on a  $0 \leq |f(x)g(x)| \leq \frac{f^2(x) + g^2(x)}{2}$ .

Or  $f^2$  et  $g^2$  sont intégrables sur  $I$  donc par comparaison de fonctions positives,  $|fg|$  est intégrable sur  $I$  et donc  $fg$  est intégrable sur  $I$ .

La fonction  $\varphi : (f, g) \mapsto \int_I fg$  est donc bien définie sur  $E^2$ .

La symétrie et la bilinéarité de  $\varphi$  sont évidentes.

Pour tout  $f \in E$ ,  $\varphi(f, f) = \int_I f^2 \geq 0$  et comme  $f^2$  est positive et continue sur  $I$ , on a

$$\begin{aligned} \int_I f^2 = 0 &\iff f^2 = 0 \\ &\iff f = 0. \end{aligned}$$

Donc  $\varphi$  est un produit scalaire sur  $E$ . ■

*Démonstration 8.5 (6)*

Pour  $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})^2$ , on a

$$\text{tr}(B^T A) = \text{tr}\left((A^T B)^T\right) = \text{tr}(A^T B)$$

donc on a la symétrie.

La bilinéarité est évidente par linéarité de la trace et de la transposition et par la bilinéarité du produit matriciel.

Pour  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ , on a  $\text{tr}(A^T A) = \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{i,j}^2$  donc il est clair que  $\text{tr}(A^T A) = 0 \iff A = 0_n$ . ■

### 8.1.3 Norme euclidienne

#### Définition 8.6

Soit  $E$  un espace préhilbertien. On note  $\langle \cdot | \cdot \rangle$  le produit scalaire sur  $E$ .

On appelle norme euclidienne associée au produit scalaire l'application de  $E$  dans  $\mathbb{R}_+$  définie par

$$\forall x \in E, \|x\| = \sqrt{\langle x | x \rangle}.$$

*Remarque 8.7*

Cette définition a bien un sens, car d'après les propriétés d'un produit scalaire, pour tout  $x \in E$ ,  $\langle x | x \rangle \geq 0$  donc  $\sqrt{\langle x | x \rangle}$  existe.

On vérifie alors les résultats suivants, inspirés par la géométrie habituelle dans un triangle ou un parallélogramme.

---

**Proposition 8.8**

Avec les mêmes notations, pour tout  $(x, y) \in E^2$ ,

- ▷  $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2 \langle x | y \rangle$  (égalité d'Al-Kashi)
- ▷  $\|x - y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 - 2 \langle x | y \rangle$  (égalité d'Al-Kashi)
- ▷  $\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2 \|x\|^2 + 2 \|y\|^2$  (identité du parallélogramme)
- ▷  $\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 = 4 \langle x | y \rangle$  (identité de polarisation).

Et encore

---

**Proposition 8.9**

Avec les mêmes notations,

- ▷  $|\langle x | y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$  (inégalité de Cauchy-Schwarz)
- ▷  $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$  (inégalité triangulaire)
- ▷ pour tout  $\lambda \in \mathbb{R}$ ,  $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$
- ▷  $\|x\| = 0 \iff x = 0$ .

---

*Remarque 8.10*

Il y a égalité dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz ssi  $x$  et  $y$  sont colinéaires.

Il y a égalité dans l'inégalité triangulaire ssi  $x$  et  $y$  sont colinéaires de même sens.

---

*Démonstration 8.11 (Inégalité de Cauchy-Schwarz)*

Soit  $(x, y) \in E^2$ .

Si l'un des deux vecteurs est nul, l'inégalité est vraie.

Supposons  $x \neq 0$  et  $y \neq 0$ .

On pose  $p : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$   
 $t \longmapsto \|tx + y\|^2$

$p$  est à valeurs positives et, pour  $t \in \mathbb{R}$ , on a

$$\begin{aligned} p(t) &= \|tx\|^2 + \|y\|^2 + 2 \langle tx | y \rangle \\ &= t^2 \langle x | x \rangle + \|y\|^2 + 2t \langle x | y \rangle. \end{aligned}$$

Or  $\langle x | x \rangle > 0$  car  $x \neq 0$ .

Donc  $p$  est un polynôme du second degré de signe constant, donc son discriminant est négatif ou nul, *i.e.*

$$(2 \langle x | y \rangle)^2 - 4 \|x\|^2 \|y\|^2 \leq 0.$$

Donc  $|\langle x | y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$ .

Il y a égalité ssi le trinôme  $p$  possède une unique racine réelle  $t_0$ .

Dans ce cas,  $p(t_0) = 0 = \|t_0 x + y\|^2 = \langle t_0 x + y | t_0 x + y \rangle$ .

Par définie-positivité de  $\langle \cdot | \cdot \rangle$ ,  $t_0 x + y = 0$  donc  $y = -t_0 x$  donc  $x$  et  $y$  sont colinéaires.

Et réciproquement. ■

*Démonstration 8.12 (Inégalité triangulaire)*

Pour  $(x, y) \in E^2$ , on a

$$\begin{aligned} \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\| &\iff \|x + y\|^2 \leq \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2 \|x\| \|y\| \\ &\iff \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2 \langle x | y \rangle \leq \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2 \|x\| \|y\| \\ &\iff \langle x | y \rangle \leq \|x\| \|y\| \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|} \right\} \text{Al-Kashi}$$

ce qui est vrai d'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz.

Il y a égalité ssi  $\langle x | y \rangle = \|x\| \|y\|$ , ce qui implique le cas d'égalité de l'inégalité de Cauchy-Schwarz, donc  $x$  et  $y$  sont colinéaires.

Or  $\langle x | y \rangle = \|x\| \|y\| \geq 0$  donc  $x$  et  $y$  sont positivement colinéaires.

Et réciproquement. ■

On dit qu'un vecteur de  $E$  est unitaire (ou normalisé) si sa norme vaut 1. À tout vecteur  $x \in E \setminus \{0\}$ , on associe deux vecteurs unitaires :  $\frac{x}{\|x\|}$  et  $-\frac{x}{\|x\|}$ .

### Exercice 8.13

Soit  $(a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n) \in \mathbb{R}^{2n}$ .

Donnez une inégalité liant  $\sum_{k=1}^n a_k b_k$ ,  $\sum_{k=1}^n a_k^2$  et  $\sum_{k=1}^n b_k^2$ .

*Correction 8.14*

On pose  $a = (a_1, \dots, a_n)$ ,  $b = (b_1, \dots, b_n) \in \mathbb{R}^n$ .

On note  $\langle \cdot | \cdot \rangle$  le produit scalaire canonique sur  $\mathbb{R}^n$ .

D'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on a  $|\langle a | b \rangle| \leq \|a\| \|b\|$  donc

$$\left| \sum_{i=1}^n a_i b_i \right| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n a_i^2 \sum_{i=1}^n b_i^2}.$$



---

**Exercice 8.15**

Soit  $f \in \mathcal{C}^0([a; b], \mathbb{R}_+^*)$ . Montrez que

$$(b-a)^2 \leq \left( \int_a^b f \right) \left( \int_a^b \frac{1}{f} \right).$$

---

**Correction 8.16**

On pose  $\langle \cdot | \cdot \rangle : \mathcal{C}^0([a; b], \mathbb{R}_+^*)^2 \longrightarrow \mathbb{R}$   
 $(f, g) \longmapsto \int_a^b fg$

D'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on a

$$\begin{aligned} \left| \left\langle \sqrt{f} \mid \sqrt{\frac{1}{f}} \right\rangle \right| &\leq \left\| \sqrt{f} \right\| \left\| \sqrt{\frac{1}{f}} \right\| \\ |b-a| &\leq \sqrt{\int_a^b f} \sqrt{\int_a^b \frac{1}{f}} \\ (b-a)^2 &\leq \left( \int_a^b f \right) \left( \int_a^b \frac{1}{f} \right). \end{aligned}$$

### 8.1.4 Vecteurs orthogonaux

---

**Définition 8.17**

Soit  $E$  un espace préhilbertien. On note  $\langle \cdot | \cdot \rangle$  le produit scalaire sur  $E$ .

On dit que deux vecteurs  $x, y$  sont orthogonaux (pour ce produit scalaire) quand  $\langle x | y \rangle = 0$ .

On peut alors noter  $x \perp y$  pour signifier que  $x$  et  $y$  sont orthogonaux.

Plus généralement, si  $x_1, \dots, x_n$  sont  $n$  vecteurs de  $E$ , on dit que la famille  $(x_1, \dots, x_n)$  est une famille orthogonale quand

$$\text{pour tout } (i, j) \in \llbracket 1; n \rrbracket^2 \text{ tel que } i \neq j, \quad \langle x_i | x_j \rangle = 0.$$

On retrouve alors le célèbre théorème de Pythagore.

---

**Proposition 8.18**

Avec les mêmes notations,

$$x \perp y \iff \|x+y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2.$$

---

**Exercice 8.19**

Soient  $E$  un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension au moins 2 et  $u, v$  deux vecteurs non-colinéaires de  $E$ .

Montrez qu'il existe un produit scalaire sur  $E$  pour lequel  $u$  et  $v$  sont orthogonaux.

---

*Correction 8.20*

On pose  $n \geq 2$  la dimension de  $E$ .

Comme  $u$  et  $v$  ne sont pas colinéaires,  $(u, v)$  est libre.

Donc d'après le théorème de la base incomplète, il existe une base  $(u, v, e_3, \dots, e_n)$  de  $E$ .

En posant  $\varphi$  le produit scalaire associé à cette base, on a

$$\varphi(u, v) = 1 \times 0 + 0 \times 1 + 0 \times 0 + \dots + 0 \times 0 = 0.$$

Donc  $u \perp v$  pour le produit scalaire  $\varphi$ .

## 8.2 Bases orthonormées

### 8.2.1 Familles orthonormées

---

**Définition 8.21**

Soit  $E$  un espace préhilbertien.

Une famille de vecteurs de  $E$  est dite orthonormée (ou orthonormale) quand elle est orthogonale et ses vecteurs sont unitaires.

---

**Proposition 8.22**

*Une famille orthogonale sans vecteur nul est libre. En particulier, une famille orthonormée est libre.*

*Une famille orthonormée génératrice de  $E$  est donc une base orthonormée de  $E$ .*

---

*Démonstration 8.23*

Soit  $(v_1, \dots, v_p) \in E^p$  une famille orthogonale sans vecteur nul.

Soit  $(\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in \mathbb{R}^p$  tel que  $\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_p v_p = 0$ .

Soit  $j \in \llbracket 1 ; p \rrbracket$ .

On a  $\langle \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_p v_p \mid v_j \rangle = \langle 0 \mid v_j \rangle = 0$ , or

$$\begin{aligned} \langle \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_p v_p \mid v_j \rangle &= \lambda_1 \langle v_1 \mid v_j \rangle + \dots + \lambda_p \langle v_p \mid v_j \rangle \\ &= \lambda_j \langle v_j \mid v_j \rangle. \end{aligned}$$

Or  $v_j \neq 0$  donc  $\langle v_j | v_j \rangle \neq 0$  donc  $\lambda_j = 0$ .

Donc  $\lambda_1 = \dots = \lambda_p = 0$ .

Donc  $(v_1, \dots, v_p)$  est libre. ■

---

**Exercice 8.24**

Généralisez l'exercice précédent.

---

*Correction 8.25*

Pour toute famille libre, il existe un produit scalaire tel que cette famille soit orthogonale.

---

**8.2.2 Existence de bases orthonormées**

---

**Théorème 8.26**

Soit  $E$  un espace euclidien.

Il existe dans  $E$  des bases orthonormées.

De plus, pour toute base  $(v_1, \dots, v_n)$  de  $E$ , il existe une base orthonormée  $(e_1, \dots, e_n)$  de  $E$  telle que

$$\text{pour tout } k \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, \text{ Vect}(v_1, \dots, v_k) = \text{Vect}(e_1, \dots, e_k).$$

La démonstration repose sur l'algorithme d'orthogonalisation/orthonormalisation de Schmidt.

---

*Démonstration 8.27*

Soit  $(v_1, \dots, v_n)$  une base de  $E$ .

(1) On pose  $u_1 = v_1$ .

(2) On choisit  $u_2 = v_2 - \lambda_1 u_1$  où  $\lambda_1$  est bien choisi pour que

$$u_1 \perp u_2 \text{ i.e. } \langle u_1 | u_2 \rangle = 0$$

$$\text{i.e. } \langle u_1 | v_2 - \lambda_1 u_1 \rangle = 0$$

$$\text{i.e. } \langle u_1 | v_2 \rangle - \lambda_1 \langle u_1 | u_1 \rangle = 0$$

$$\text{i.e. } \lambda_1 = \frac{\langle u_1 | v_2 \rangle}{\langle u_1 | u_1 \rangle}.$$

Par suite, si on a construit  $(u_1, \dots, u_k)$  une famille orthogonale telle que

$$\text{Vect}(u_1, \dots, u_k) = \text{Vect}(v_1, \dots, v_k) :$$

On pose  $u_{k+1} = v_{k+1} - \alpha_1 u_1 - \alpha_2 u_2 - \dots - \alpha_k u_k$  où  $\alpha_1, \dots, \alpha_k$  sont bien choisis pour obtenir  $u_{k+1} \perp u_i$  pour  $i \in \llbracket 1 ; k \rrbracket$ .

Alors

$$\begin{aligned}\langle u_{k+1} \mid u_i \rangle &= \langle v_{k+1} \mid u_i \rangle - \sum_{j=1}^k \alpha_j \langle u_j \mid u_i \rangle \\ &= \langle v_{k+1} \mid u_i \rangle - \alpha_i \langle u_i \mid u_i \rangle.\end{aligned}$$

Donc  $\alpha_i = \frac{\langle v_{k+1} \mid u_i \rangle}{\langle u_i \mid u_i \rangle}$ .

$u_{k+1}$  ainsi construit est orthogonal à  $u_1, \dots, u_k$  donc  $(u_1, \dots, u_{k+1})$  est orthogonale et  $u_{k+1} \in \text{Vect}(u_{k+1}, u_1, \dots, u_k) = \text{Vect}(v_1, \dots, v_{k+1})$ .

Ainsi,  $(u_1, \dots, u_n)$  est une base orthogonale de  $E$ . ■

*Remarque 8.28*

Si l'on souhaite obtenir une base orthonormée, on divise par les normes.

On en déduit le théorème de la base orthonormée incomplète.

### **Théorème 8.29**

*Soit  $E$  un espace euclidien.*

*Toute famille orthonormée de  $E$  peut être complétée en une base orthonormée de  $E$ .*

### **Exercice 8.30**

Dans  $\mathbb{R}^n$  muni du produit scalaire canonique, on pose  $u = (1, \dots, n)$ .

Complétez la famille  $u$  en une base orthonormée de  $\mathbb{R}^n$ .

*Correction 8.31*

$$\begin{array}{ccccc} 1 & 2 & 0 & \dots & 0 \\ 2 & -1 & 0 & & \vdots \\ \vdots & 0 & 4 & & \vdots \\ \vdots & \vdots & -3 & & \vdots \text{ puis Gram-Schmidt.} \\ \vdots & \vdots & 0 & & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & n \\ n & 0 & 0 & \dots & n-1 \end{array}$$

### 8.2.3 Calculs en base orthonormée

Soient  $E$  un espace euclidien et  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  une base orthonormée de  $E$ .

Soient  $x, y \in E$ , de coordonnées  $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$  et  $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ .

Alors

$$\langle x \mid y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i = X^\top Y \quad \|x\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} = \sqrt{X^\top X} \quad \forall i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, \quad x_i = \langle x \mid e_i \rangle.$$

*Démonstration 8.32*

On a

$$\begin{aligned} \langle x \mid y \rangle &= \sum_{i=1}^n x_i \langle e_i \mid y \rangle \\ &= \sum_{i=1}^n x_i \sum_{j=1}^n y_j \langle e_i \mid e_j \rangle \\ &= \sum_{1 \leq i, j \leq n} x_i y_j \langle e_i \mid e_j \rangle \\ &= \sum_{i=1}^n x_i y_i. \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \text{ } \\ \text{ } \end{array} \right\} \langle e_i \mid e_j \rangle = \delta_{i,j} \text{ car } \mathcal{B} \text{ est orthonormée$$

De même, on a  $\langle x \mid e_j \rangle = \sum_{i=1}^n x_i \langle e_i \mid e_j \rangle = x_j$ . ■

## 8.3 Sous-espaces orthogonaux

### 8.3.1 Orthogonalité de deux sous-espaces vectoriels

#### Définition 8.33

Soient  $E$  un espace préhilbertien,  $F, G$  deux sous-espaces vectoriels de  $E$  et  $u \in E$ .

On dit que  $u$  est orthogonal (ou normal) à  $F$  quand  $u$  est orthogonal à tous les vecteurs de  $F$ .

On dit que  $F$  et  $G$  sont orthogonaux quand tout vecteur de  $F$  et tout vecteur de  $G$  sont orthogonaux, autrement dit quand

$$\text{pour tout } (x, y) \in F \times G, \quad \langle x \mid y \rangle = 0.$$

---

**Proposition 8.34**

Si  $F$  est de dimension finie et a pour famille génératrice  $(v_1, \dots, v_k)$ , alors  $u$  est orthogonal à  $F$  ssi pour tout  $i \in \llbracket 1 ; k \rrbracket$ ,  $\langle u \mid v_i \rangle = 0$ .

---

**Proposition 8.35**

Si  $F$  et  $G$  sont orthogonaux, alors ils sont en somme directe :  $F \cap G = \{0\}$ .

---

*Démonstration 8.36*

Supposons  $F \perp G$ .

Soit  $x \in F \cap G$ .

Comme  $x \in F$  et  $x \in G$ , on a  $x \perp x$  i.e.  $\langle x \mid x \rangle = 0$  i.e.  $x = 0$ .

D'où  $F \cap G = \{0\}$ .

On peut généraliser à  $k$  sous-espaces vectoriels deux à deux orthogonaux  $F_1, \dots, F_k$ .

Soit  $(x_1, \dots, x_k) \in F_1 \times \dots \times F_k$  tel que  $x_1 + \dots + x_k = 0$ .

Pour  $i \in \llbracket 1 ; k \rrbracket$ , on a

$$\begin{aligned} \langle x_1 + \dots + x_k \mid x_i \rangle &= \langle x_1 \mid x_i \rangle + \dots + \langle x_k \mid x_i \rangle \\ &= \langle x_i \mid x_i \rangle \\ &= 0. \end{aligned}$$

Donc  $x_i = 0$ .

Donc  $F_1, \dots, F_k$  sont en somme directe orthogonale. ■

### 8.3.2 Orthogonal d'un sous-espace vectoriel

---

**Définition 8.37**

Soient  $E$  un espace préhilbertien et  $F$  un sous-espace vectoriel de  $E$ .

On note  $F^\perp$  l'ensemble des vecteurs normaux à  $F$  :

$$F^\perp = \{v \in E \mid \forall x \in F, \langle v \mid x \rangle = 0\}.$$

Avec cette notation, on a clairement l'équivalence :

$$F \text{ et } G \text{ sont orthogonaux} \iff F \subseteq G^\perp \text{ ou, ce qui revient au même, } G \subseteq F^\perp.$$

---

**Théorème 8.38**

Soient  $E$  un espace préhilbertien et  $F$  un sous-espace vectoriel de  $E$ .

Alors  $F^\perp$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ , orthogonal à  $F$  et donc en somme directe avec  $F$ .

---

**Démonstration 8.39**

Pour  $x \in E$ , on pose  $\varphi_x : E \longrightarrow \mathbb{R}$   
 $y \longmapsto \langle x \mid y \rangle$

Pour  $x \neq 0$ , on a  $\varphi_x \neq 0$  (car  $\varphi_x(x) = \langle x \mid x \rangle = \|x\|^2 > 0$ ).

Alors

$$\begin{aligned} F^\perp &= \{v \in E \mid \forall x \in F, \langle x \mid v \rangle = 0\} \\ &= \{v \in E \mid \forall x \in F, v \in \ker \varphi_x\} \\ &= \bigcap_{x \in F} \ker \varphi_x. \end{aligned}$$

Donc  $F^\perp$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ .

De plus, par définition de  $F^\perp$ , on a  $\forall x \in F, \forall y \in F^\perp, \langle x \mid y \rangle = 0$ .

Donc  $F$  et  $F^\perp$  sont orthogonaux (et donc en somme directe). ■

---

**Proposition 8.40**

Soient  $E$  un espace préhilbertien et  $F$  un sous-espace vectoriel de  $E$ .

Alors  $F \subseteq (F^\perp)^\perp$ .

---

**Remarque 8.41**

En général,  $F^\perp$  n'est pas supplémentaire à  $F$  et  $F$  n'est pas égal à  $(F^\perp)^\perp$ .

---

**Remarque 8.42**

Dans le cas où  $F$  est une droite vectorielle dirigée par un vecteur  $u$ , on note plutôt  $G = u^\perp$  l'orthogonal de  $F$ . Dans ce cas,  $u^\perp$  est un hyperplan et on dit alors que  $u$  est un vecteur normal à  $G$ .

---

**Exercice 8.43**

Montrez que si  $F$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ , alors  $\overline{F}$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ , que  $F^\perp = \overline{F}^\perp$  et que  $F^\perp$  est fermé.

## 8.4 Projection orthogonale sur un sous-espace vectoriel de dimension finie

### 8.4.1 Projection orthogonale

---

**Définition 8.44**

Soient  $E$  un espace préhilbertien et  $F$  un sous-espace vectoriel de  $E$  de dimension finie.

Alors  $F^\perp$  est un supplémentaire de  $F$ , appelé le supplémentaire orthogonal de  $F$ .

Le projecteur sur  $F$  parallèlement à  $F^\perp$  est appelé le projecteur orthogonal sur  $F$ .

La symétrie orthogonale par rapport à  $F$  est la symétrie par rapport à  $F$  parallèlement à  $F^\perp$ .

Si on connaît une base orthonormée  $(e_1, \dots, e_p)$  de  $F$ , alors il est facile de calculer la projection orthogonale de  $x$  sur  $F$  :

$$p_F(x) = \sum_{i=1}^p \langle x | e_i \rangle e_i.$$

---

**Démonstration 8.45**

On a  $\dim F = p$ .

$F$  possède une base orthonormée  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$ .

Soit  $x \in E$ . On cherche  $y \in F$  tel que  $x - y \perp F$ .

analyse

Si  $y$  existe alors  $y \in F = \text{Vect}(e_1, \dots, e_p)$  donc  $y = \sum_{i=1}^p y_i e_i$ .

On a  $x - y \perp F$  donc pour  $j \in \llbracket 1 ; p \rrbracket$ ,  $x - y \perp e_j$ , i.e.

$$\begin{aligned} \langle x - y | e_j \rangle &= 0 \\ \langle x | e_j \rangle - \langle y | e_j \rangle &= 0 \\ \langle x | e_j \rangle - y_j &= 0 \\ y_j &= \langle x | e_j \rangle. \end{aligned}$$

L'analyse prouve l'unicité de  $y$ .

synthèse

On pose  $y = \sum_{i=1}^p \underbrace{\langle x | e_i \rangle}_{y_i} e_i$ .

On a  $y \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_p) = F$ .



Pour  $j \in \llbracket 1 ; p \rrbracket$ , on a

$$\begin{aligned}\langle x - y \mid e_j \rangle &= \langle x \mid e_j \rangle - \langle y \mid e_j \rangle \\ &= \langle x \mid e_j \rangle - y_j \\ &= 0.\end{aligned}$$

Donc  $x - y \perp F$ .

conclusion

On a montré

$$\forall x \in E, \exists ! y \in F, x - y \in F^\perp$$

i.e.

$$\forall x \in E, \exists ! (y, z) \in F \times F^\perp, x = y + z$$

i.e.

$$E = F \oplus F^\perp.$$

■

On en déduit l'inégalité de Bessel.

### Proposition 8.46

Soient  $E$  un espace préhilbertien et  $F$  un sous-espace vectoriel de  $E$  de dimension finie.

Si  $p$  est le projecteur orthogonal sur  $F$ , alors pour tout  $x \in E$ ,  $\|p(x)\| \leq \|x\|$ .

Démonstration 8.47

Soit  $x \in E$ .

On pose  $y = p_F(x)$ .

On a  $x - y \perp F$  donc  $x - y \perp y$  donc

$$\begin{aligned}\|x\|^2 &= \|(x - y) + y\|^2 \\ &= \|x - y\|^2 + \|y\|^2 \\ &\geq \|y\|^2.\end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned}\|x\|^2 &= \|(x - y) + y\|^2 \\ &= \|x - y\|^2 + \|y\|^2 \\ &\geq \|y\|^2.\end{aligned}} \right\} \text{Pythagore}$$

D'où  $\forall x \in E, \|p_F(x)\| \leq \|x\|$ .

NB : on en déduit que  $p_F$  est continu.

■

## 8.4.2 Distance à un sous-espace vectoriel

---

**Proposition 8.48**

Soient  $E$  un espace préhilbertien,  $F$  un sous-espace vectoriel de  $E$  de dimension finie et  $x \in E$ .

Soit  $y$  la projection orthogonale de  $x$  sur  $F$ .

Pour tout  $z \in F$ ,  $\|x - y\| \leq \|x - z\|$ , avec égalité ssi  $z = y$ .

Autrement dit, le projeté orthogonal de  $x$  sur  $F$  est l'unique vecteur de  $F$  qui minimise la distance entre  $x$  et un point de  $F$ .

$\|x - y\|$  est appelé la distance de  $x$  à  $F$ , c'est la plus petite des distances entre  $x$  et un élément de  $F$ , notée  $d(x, F)$ .

---

*Démonstration 8.49*

Pour  $z \in F$ ,  $z - y \in F$  et  $y - x \in F^\perp$  donc  $z - y \perp y - x$ , donc

$$\begin{aligned} \|z - x\|^2 &= \|(z - y) + (y - x)\|^2 \\ &= \|z - y\|^2 + \|y - x\|^2 \quad \left. \vphantom{\|z - y\|^2} \right\} \text{Pythagore} \\ &\geq \|y - x\|^2. \end{aligned}$$

Si  $(e_1, \dots, e_p)$  est une base orthonormée de  $F$ , on a  $y = \sum_{i=1}^p \langle x | e_i \rangle e_i$ .

De plus, on a  $\|x\|^2 = \|y\|^2 + \|x - y\|^2$  donc  $\|x - y\|^2 = \|x\|^2 - \|y\|^2$ .

Or  $\|y\|^2 = \sum_{i=1}^p \langle x | e_i \rangle^2$ .

Donc  $d(x, F) = \|x - y\| = \sqrt{\|x\|^2 - \sum_{i=1}^p \langle x | e_i \rangle^2}$ . ■

---

*Remarque 8.50*

Tout ce qui précède est évidemment valable si  $E$  est de dimension finie.

Dans ce cas, pour tout sous-espace vectoriel  $F$  de  $E$ ,  $F^\perp$  est un supplémentaire de  $F$  dans  $E$ .

Par conséquent,  $\dim F^\perp = \dim E - \dim F$ .

# Chapitre 9

## Endomorphismes dans un espace euclidien

### Sommaire

---

<b>9.1</b>	<b>Adjoint d'un endomorphisme . . . . .</b>	<b>264</b>
9.1.1	Représentation des formes linéaires . . . . .	264
9.1.2	Adjoint . . . . .	265
9.1.3	Matrice de l'adjoint . . . . .	269
9.1.4	Stabilité de sous-espaces vectoriels . . . . .	271
<b>9.2</b>	<b>Orientation d'un <math>\mathbb{R}</math>-espace vectoriel de dimension finie. . . . .</b>	<b>271</b>
<b>9.3</b>	<b>Isométries vectorielles . . . . .</b>	<b>272</b>
<b>9.4</b>	<b>Matrices orthogonales . . . . .</b>	<b>275</b>
9.4.1	Déterminant d'une isométrie vectorielle . . . . .	278
9.4.2	Changements de bases orthonormées . . . . .	279
9.4.3	Produit mixte . . . . .	280
9.4.4	Produit vectoriel en dimension 3 . . . . .	281
<b>9.5</b>	<b>Étude en dimension 2 . . . . .</b>	<b>282</b>
<b>9.6</b>	<b>Réduction des isométries vectorielles ou des matrices orthogonales .</b>	<b>284</b>
9.6.1	Réduction des isométries vectorielles . . . . .	284
9.6.2	Réduction des matrices orthogonales . . . . .	289
9.6.3	Étude en dimension 3 . . . . .	289
<b>9.7</b>	<b>Endomorphismes auto-adjoints . . . . .</b>	<b>295</b>
9.7.1	Définition et propriétés . . . . .	295
9.7.2	Théorème spectral . . . . .	296
<b>9.8</b>	<b>Endomorphismes auto-adjoints positifs, définis-positifs . . . . .</b>	<b>299</b>
9.8.1	Endomorphismes auto-adjoints positifs . . . . .	299
9.8.2	Matrices symétriques positives . . . . .	301

---

Dans tout ce chapitre,  $E$  désigne un espace euclidien de dimension  $n$ , muni du produit scalaire  $\langle \cdot | \cdot \rangle$ .

### 9.1 Adjoint d'un endomorphisme

#### 9.1.1 Représentation des formes linéaires

Le théorème suivant est parfois appelé théorème de représentation de Riesz.

---

**Proposition 9.1**

Soit  $\varphi$  une forme linéaire sur  $E$ .

Il existe un unique vecteur  $v \in E$  tel que pour tout  $x \in E$ ,  $\varphi(x) = \langle v | x \rangle$ .

---

*Démonstration 9.2*

On choisit  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  une base orthonormée de  $E$ .

Soit  $x \in E$  tel que  $x = (x_1, \dots, x_n)_{\mathcal{B}}$ .

$$\text{On a } \varphi(x) = \varphi\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i\right) = \sum_{i=1}^n x_i \varphi(e_i).$$

On pose alors  $v = (\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_n))_{\mathcal{B}}$  de sorte que  $\varphi(x) = \langle v | x \rangle$ .

On a unicité par unicité des coordonnées d'un vecteur. ■

### 9.1.2 Adjoint

---

**Lemme 9.3**

Pour  $a, b \in E$ , on a

$$a = b \iff \forall x \in E, \langle a | x \rangle = \langle b | x \rangle.$$

---

*Démonstration 9.4*



Pour  $x \in E$ , on a  $\langle a - b | x \rangle = 0$  donc  $\langle a - b | a - b \rangle = 0$  donc  $a - b = 0$  donc  $a = b$ .



Clair. ■

---

**Proposition 9.5**

Soit  $f \in \mathcal{L}(E)$ .

Il existe un unique endomorphisme  $g \in \mathcal{L}(E)$  tel que pour tout  $(x, y) \in E^2$ ,  $\langle f(x) | y \rangle = \langle x | g(y) \rangle$ .

---

*Démonstration 9.6*

Pour tout  $y \in E$ , l'application  $E \longrightarrow \mathbb{R}$  est linéaire.  
$$x \longmapsto \langle f(x) \mid y \rangle$$

D'après la Proposition 9.1, il existe un unique vecteur  $g(y)$  tel que

$$\forall x \in E, \langle f(x) \mid y \rangle = \langle g(y) \mid x \rangle.$$

On a donc construit une application  $g : E \longrightarrow E$ .

Soient  $(y, z) \in E^2$  et  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

Pour tout  $x \in E$ , on a

$$\begin{aligned} \langle g(\lambda y + z) \mid x \rangle &= \langle f(x) \mid \lambda y + z \rangle \\ &= \lambda \langle f(x) \mid y \rangle + \langle f(x) \mid z \rangle \\ &= \lambda \langle g(y) \mid x \rangle + \langle g(z) \mid x \rangle \\ &= \langle \lambda g(y) + g(z) \mid x \rangle. \end{aligned}$$

On en déduit  $g(\lambda y + z) = \lambda g(y) + g(z)$  d'après le Lemme 9.3. ■

---

**Définition 9.7**

L'endomorphisme  $g$  est appelé l'adjoint de  $f$  est noté  $f^*$ .

Par bilinéarité et symétrie du produit scalaire, on en déduit les propriétés élémentaires de l'adjonction.

---

**Proposition 9.8**

- (1) L'application  $f \longmapsto f^*$  est linéaire.
- (2) Pour tout  $f \in \mathcal{L}(E)$ ,  $f^{**} = f$ .
- (3) Pour tout  $(f, g) \in \mathcal{L}(E)^2$ ,  $(f \circ g)^* = g^* \circ f^*$ .

---

*Démonstration 9.9 (2)*

Pour  $(x, y) \in E^2$ , on a

$$\langle f(x) \mid y \rangle = \langle x \mid f^*(y) \rangle = \langle f^{**}(x) \mid y \rangle.$$

D'après le Lemme 9.3, on a  $f(x) = f^{**}(x)$ .

Donc  $f = f^{**}$ . ■

---

*Démonstration 9.10 (3)*

Pour tout  $(x, y) \in E^2$ , on a

$$\begin{aligned}\langle f \circ g(x) \mid y \rangle &= \langle f(g(x)) \mid y \rangle \\ &= \langle g(x) \mid f^*(y) \rangle \\ &= \langle x \mid g^*(f^*(y)) \rangle \\ &= \langle x \mid g^* \circ f^*(y) \rangle.\end{aligned}$$

Par unicité de l'adjoint,  $(f \circ g)^* = g^* \circ f^*$ . ■

---

*Démonstration 9.11 (1)*

Soient  $(f, g) \in \mathcal{L}(E)^2$  et  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

Pour tout  $(x, y) \in E^2$ , on a

$$\begin{aligned}\langle (\lambda f + g)(x) \mid y \rangle &= \langle \lambda f(x) + g(x) \mid y \rangle \\ &= \lambda \langle f(x) \mid y \rangle + \langle g(x) \mid y \rangle \\ &= \lambda \langle x \mid f^*(y) \rangle + \langle x \mid g^*(y) \rangle \\ &= \langle x \mid \lambda f^*(y) + g^*(y) \rangle \\ &= \langle x \mid (\lambda f^* + g^*)(y) \rangle.\end{aligned}$$

Par unicité de l'adjoint,  $(\lambda f + g)^* = \lambda f^* + g^*$ . ■

---

### Exercice 9.12

Montrez que si  $f$  est un projecteur orthogonal, alors  $f^* = f$ .

---

*Correction 9.13*

Soit  $f$  un projecteur orthogonal.

Comme  $E$  est de dimension finie, on a  $E = \text{Im } f \oplus \ker f$ .

On choisit une base orthonormée de  $\ker f$  et de  $\text{Im } f$  : en les concaténant, on obtient une base orthonormée de  $E$

$$\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_r, e_{r+1}, \dots, e_n).$$

Soit  $(x, y) \in E^2$ . On a

$$f(x) = \sum_{i=1}^r \langle x \mid e_i \rangle e_i \quad \text{et} \quad f(y) = \sum_{i=1}^r \langle y \mid e_i \rangle e_i.$$

Alors

$$\begin{aligned}\langle f(x) | y \rangle &= \left\langle \sum_{i=1}^r \langle x | e_i \rangle e_i \middle| y \right\rangle \\ &= \sum_{i=1}^r \langle x | e_i \rangle \langle e_i | y \rangle \\ &= \left\langle x \middle| \sum_{i=1}^r \langle e_i | y \rangle e_i \right\rangle \\ &= \langle x | f(y) \rangle.\end{aligned}$$

Donc  $f = f^*$ .

---

**Exercice 9.14**

Premièrement,

Soit  $f \in \mathcal{L}(E)$ .

Montrez que  $\text{Im } f^* = (\ker f)^\perp$  et  $\ker f^* = (\text{Im } f)^\perp$ .

Comparez  $\text{rg } f$  et  $\text{rg } f^*$ .

---

*Correction 9.15*

Soit  $y \in \text{Im } f^*$ . Il existe  $a \in E$  tel que  $f^*(a) = y$ .

Alors pour  $x \in \ker f$ , on a

$$\langle x | y \rangle = \langle x | f^*(a) \rangle = \langle a | f(x) \rangle = 0.$$

Donc  $x \perp y$  et donc  $y \in (\ker f)^\perp$ .

Donc  $\text{Im } f^* \subseteq (\ker f)^\perp$ .

Deuxièmement,

Soient  $x \in \ker f^*$  et  $y \in \text{Im } f$ .

Il existe  $a \in E$  tel que  $f(a) = y$ .

Donc

$$\langle x | y \rangle = \langle x | f(a) \rangle = \langle f^*(x) | a \rangle = 0.$$

Donc  $x \perp y$ , donc  $x \in (\text{Im } f)^\perp$  et donc  $\ker f^* \subseteq (\text{Im } f)^\perp$ .

De plus, on a

$$\dim \text{Im } f^* \leq \dim (\ker f)^\perp = n - \dim \ker f = \dim \text{Im } f$$

et

$$\dim \ker f^* \leq \dim (\text{Im } f)^\perp = n - \dim \text{Im } f = \dim \ker f.$$

Or  $\dim \ker f^* = n - \dim \operatorname{Im} f^* \leq n - \dim \operatorname{Im} f$  donc

$$\dim \operatorname{Im} f^* \geq \dim \operatorname{Im} f.$$

D'où

$$\dim \operatorname{Im} f^* = \dim \operatorname{Im} f = n - \dim \ker f = \dim (\ker f)^\perp$$

et

$$\dim \ker f^* = \dim \ker f = n - \dim \operatorname{Im} f = \dim (\operatorname{Im} f)^\perp.$$

Donc on a

$$\operatorname{Im} f^* = (\ker f)^\perp$$

et

$$\ker f^* = (\operatorname{Im} f)^\perp$$

et

$$\operatorname{rg} f = \operatorname{rg} f^*.$$

---

### Exercice 9.16

Soit  $f \in \mathcal{L}(E)$ .

Montrez que  $\operatorname{rg} f = \operatorname{rg} (f^* \circ f)$ .

---

#### Correction 9.17

Pour tout  $(f, g) \in \mathcal{L}(E)^2$ , on a

$$\begin{cases} \operatorname{rg} (g \circ f) \leq \operatorname{rg} f & (1) \\ \operatorname{rg} (f \circ g) \leq \operatorname{rg} f & (2) \end{cases}$$

En effet, on a  $\operatorname{Im} (f \circ g) \subseteq \operatorname{Im} f$  donc (2) et on a  $\ker f \subseteq \ker (f \circ g)$  et le théorème du rang donc (1).

Pour avoir  $\operatorname{rg} (f^* \circ f) = \operatorname{rg} f$ , il suffit donc de montrer que  $\ker f = \ker (f^* \circ f)$ .

On a clairement  $\ker f \subseteq \ker (f^* \circ f)$ .

Soit  $x \in \ker (f^* \circ f)$ .

On a  $f^* \circ f(x) = 0$  donc  $\langle f^* \circ f(x) | x \rangle = 0$  donc  $\langle f(x) | f(x) \rangle = 0$  donc  $\|f(x)\| = 0$  donc  $f(x) = 0$ .

Donc  $x \in \ker f$  et donc  $\ker (f^* \circ f) \subseteq \ker f$ .

### 9.1.3 Matrice de l'adjoint



---

**Proposition 9.18**

Soient  $\mathcal{B}$  une base orthonormée de  $E$  et  $(f, g) \in \mathcal{L}(E)^2$ .

$$\text{On a } g = f^* \iff \text{Mat}_{\mathcal{B}}(g) = \left( \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) \right)^{\top}.$$

---

*Démonstration 9.19*

Soit  $\mathcal{B}$  une base orthonormée de  $E$ .

Soient  $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$  et  $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$ , et  $x, y$  de coordonnées  $X, Y$  dans  $\mathcal{B}$ .

On pose  $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ .

$f(x)$  a pour coordonnées  $AX$  dans  $\mathcal{B}$ .

Donc

$$\begin{aligned} \langle f(x) | y \rangle &= (AX)^{\top} Y \\ &= X^{\top} A^{\top} Y \\ &= \langle x | f^*(y) \rangle \\ &= X^{\top} (BY) \end{aligned}$$

où  $B = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f^*)$ .

Donc  $\forall (X, Y) \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})^2$ ,  $X^{\top} A^{\top} Y = X^{\top} B Y$ .

Donc  $B = A^{\top}$ .

Et réciproquement. ■

---

*Remarque 9.20*

Attention, ceci n'est valable qu'en base orthonormée. En base quelconque, c'est plus compliqué.

---

**Exercice 9.21**

Soit  $f \in \mathcal{L}(E)$  diagonalisable.

Montrez l'équivalence

$$f^* = f^2 \iff f \text{ est un projecteur orthogonal.}$$

---

*Correction 9.22*

$\Leftarrow$  Si  $f$  est un projecteur orthogonal, alors  $f = f^*$  (cf. Exercice 9.12) et  $f = f^2$  donc  $f^* = f^2$ .

$\Rightarrow$

En base orthonormée, la matrice  $A$  de  $f$  vérifie  $A^\top = A^2$ .

Donc  $A = (A^2)^\top = (A^\top)^2 = (A^2)^2 = A^4$ .

Donc  $X^4 - X$  est un polynôme annulateur de  $A$ .

Donc  $\mu_A$ , polynôme minimal de  $A$ , divise  $X^4 - X$  et est scindé à racines simples dans  $\mathbb{R}[X]$ .

Or  $X^4 - X = X(X-1)(X^2+X+1)$ .

Donc  $\mu_A = X$  ou  $\mu_A = X-1$  ou  $\mu_A = X(X-1)$  i.e.  $f = 0$  ou  $f = \text{id}_E$  ou  $f^2 = f$ .

Dans tous les cas,  $f$  est projecteur.

### 9.1.4 Stabilité de sous-espaces vectoriels

Une propriété remarquable et utile pour la suite du cours.

---

#### Proposition 9.23

Soient  $f \in \mathcal{L}(E)$  et  $F$  un sous-espace vectoriel de  $E$ .

Si  $F$  est stable par  $f$ , alors  $F^\perp$  est stable par  $f^*$ .

---

*Démonstration 9.24*

On veut montrer que pour tout  $x \in F^\perp$ ,  $f^*(x) \in F^\perp$ .

Soient  $x \in F^\perp$  et  $y \in F$ .

On a  $\langle f^*(x) | y \rangle = \langle x | f(y) \rangle$ .

Or  $y \in F$  et  $F$  est stable par  $f$  donc  $f(y) \in F$ .

Or  $x \in F^\perp$  donc  $\langle x | f(y) \rangle = 0$ .

Donc  $f^*(x) \perp y$  donc  $f^*(x) \in F^\perp$ . ■

## 9.2 Orientation d'un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie

Soit  $E$  un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie  $n \geq 1$ .

---

**Définition 9.25**

On dit que deux bases  $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$  de  $E$  ont la même orientation quand  $\det_{\mathcal{B}} \mathcal{B}' > 0$ , sinon on dit qu'elles sont d'orientations contraires.

Orienter  $E$ , c'est choisir une base de référence et déclarer directes toutes les bases qui ont la même orientation que cette base de référence. Les bases de l'autre classe d'équivalence sont dites indirectes (ou rétrogrades).

En géométrie classique, dans le plan ou l'espace, on convient systématiquement d'une orientation.

Dans toute la suite,  $E$  désigne un espace euclidien de dimension  $n$ . On suppose aussi que  $E$  est orienté.

## 9.3 Isométries vectorielles

---

**Définition 9.26**

On appelle isométrie vectorielle (ou automorphisme orthogonal) tout endomorphisme de  $E$  qui conserve la norme : pour tout  $x \in E$ ,  $\|f(x)\| = \|x\|$ .

---

*Remarque 9.27*

L'appellation « automorphisme » n'est pas usurpée.

---

*Démonstration 9.28*

Si  $f$  est une isométrie vectorielle, alors  $\ker f = \{0\}$  car si  $f(x) = 0$ , alors  $\|f(x)\| = 0$  donc  $\|x\| = 0$  donc  $x = 0$ .

Comme  $E$  est de dimension finie,  $f$  est un automorphisme. ■

L'ensemble des isométries vectorielles de  $E$  est noté  $\mathcal{O}(E)$ .

---

**Proposition 9.29**

$\mathcal{O}(E)$  est un sous-groupe de  $(\text{GL}(E), \circ)$ .

---

*Démonstration 9.30*

On vient de montrer que  $\mathcal{O}(E) \subseteq \text{GL}(E)$ .

De plus,  $\text{id}_E \in \mathcal{O}(E)$ .

Enfin, pour  $(f, g) \in \mathcal{O}(E)$  et  $x \in E$ , on a

$$\begin{aligned} \|g \circ f(x)\| &= \|g(f(x))\| \\ &= \|f(x)\| \\ &= \|x\|. \end{aligned} \quad \begin{array}{l} \left. \begin{array}{l} \phantom{=} \\ \phantom{=} \end{array} \right\} g \text{ conserve la norme} \\ \left. \phantom{=} \right\} f \text{ conserve la norme} \end{array}$$

Donc  $g \circ f \in \mathcal{O}(E)$ .

De plus, pour  $f \in \mathcal{O}(E)$ , on a

$$\|f^{-1}(x)\| = \|f(f^{-1}(x))\| = \|x\|$$

donc  $f^{-1} \in \mathcal{O}(E)$ .

Donc  $\mathcal{O}(E)$  est un sous-groupe de  $(\text{GL}(E), \circ)$ . ■

Les symétries orthogonales sont des isométries vectorielles. Parmi celles-ci, on distingue les symétries orthogonales par rapport à un hyperplan : on les appelle les réflexions.

On peut caractériser les isométries vectorielles de diverses façons.

### Proposition 9.31

Soit  $f \in \mathcal{L}(E)$ . Les propositions suivantes sont équivalentes :

- (1)  $f$  est une isométrie vectorielle
- (2)  $f$  conserve le produit scalaire : pour tout  $(x, y) \in E^2$ ,  $\langle f(x) | f(y) \rangle = \langle x | y \rangle$
- (3)  $f$  transforme toute base orthonormée en base orthonormée
- (4)  $f$  est un automorphisme et  $f^* = f^{-1}$ , ou, ce qui revient au même :  $f^* \circ f = \text{id}_E$ .

*Démonstration 9.32 ((1)  $\implies$  (2))*

Soient  $f \in \mathcal{O}(E)$  et  $(x, y) \in E^2$ .

On a, d'après Al-Kashi

$$\begin{aligned} \langle f(x) | f(y) \rangle &= \frac{\|f(x) + f(y)\|^2 - \|f(x)\|^2 - \|f(y)\|^2}{2} \\ &= \frac{\|x + y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2}{2} \\ &= \langle x | y \rangle. \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \downarrow f \text{ conserve la norme} \\ \downarrow \text{Al-Kashi} \end{array} \right\} \quad \text{■}$$

*Démonstration 9.33 ((2)  $\implies$  (1))*

On a  $\forall (x, y) \in E^2$ ,  $\langle f(x) | f(y) \rangle = \langle x | y \rangle$ .

Donc  $\forall x \in E$ ,  $\langle f(x) | f(x) \rangle = \langle x | x \rangle$ .

Donc  $\forall x \in E$ ,  $\|f(x)\|^2 = \|x\|^2$ .

Donc  $\forall x \in E$ ,  $\|f(x)\| = \|x\|$ .

Donc  $f$  est une isométrie vectorielle. ■

---

*Démonstration 9.34 ((1)  $\implies$  (3))*

Soient  $f \in \mathcal{O}(E)$  et  $(e_1, \dots, e_n)$  une base orthonormée de  $E$ .

$f$  conserve la norme donc pour tout  $i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$ ,  $\|f(e_i)\| = \|e_i\| = 1$ .

$f$  conserve le produit scalaire donc pour tout  $(i, j) \in \llbracket 1 ; n \rrbracket^2$ , si  $i \neq j$ , alors  $\langle f(e_i) | f(e_j) \rangle = \langle e_i | e_j \rangle = 0$ .

Donc  $(f(e_1), \dots, f(e_n))$  est une famille orthonormée de  $E$ , espace de dimension  $n$ , donc une base orthonormée de  $E$ . ■

---

*Démonstration 9.35 ((3)  $\implies$  (1))*

Soient  $f \in \mathcal{L}(E)$  et  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  une base orthonormée de  $E$  telle que  $\mathcal{B}' = (f(e_1), \dots, f(e_n))$  soit aussi une base orthonormée de  $E$ .

Soit  $x \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ . On a  $\|x\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$  car  $\mathcal{B}$  est orthonormée.

Or  $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$  donc  $f(x) = \sum_{i=1}^n x_i f(e_i)$ .

Donc  $f(x) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}$ .

Or  $\mathcal{B}'$  est orthonormée donc

$$\|f(x)\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} = \|x\|.$$

Donc  $f \in \mathcal{O}(E)$ . ■

---

*Démonstration 9.36 ((1)  $\iff$  (4))*

On a

$$\begin{aligned} f \in \mathcal{O}(E) &\iff \forall (x, y) \in E^2, \langle f(x) | f(y) \rangle = \langle x | y \rangle \\ &\iff \forall (x, y) \in E^2, \langle x | f^* \circ f(y) \rangle = \langle x | y \rangle \\ &\iff \forall y \in E, f^* \circ f(y) = y \\ &\iff f^* \circ f = \text{id}_E \\ &\iff f^* = f^{-1}. \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} f \in \mathcal{O}(E) &\iff \forall (x, y) \in E^2, \langle f(x) | f(y) \rangle = \langle x | y \rangle \\ &\iff \forall (x, y) \in E^2, \langle x | f^* \circ f(y) \rangle = \langle x | y \rangle \\ &\iff \forall y \in E, f^* \circ f(y) = y \end{aligned}} \right\} \text{Lemme 9.3}$$

■

---

**Exercice 9.37**

Soient  $E$  un espace euclidien,  $a \in E \setminus \{0\}$  et  $k \in \mathbb{R}$ . On pose  $f : x \mapsto x + k \langle x | a \rangle a$ .

Montrez que  $f$  est linéaire, puis déterminez les conditions sur  $a$  et  $k$  pour que  $f$  soit une isométrie vectorielle.

Dans ce cas, reconnaissez-la.

---

**Correction 9.38**

Soient  $(x, y) \in E^2$  et  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

On a

$$\begin{aligned} f(\lambda x + y) &= \lambda x + y + k \langle \lambda x + y | a \rangle a \\ &= \lambda (x + k \langle x | a \rangle a) + y + k \langle y | a \rangle a \\ &= \lambda f(x) + f(y). \end{aligned}$$

Si  $k = 0$ , alors  $f = \text{id}_E \in \mathcal{O}(E)$ .

Supposons  $k \neq 0$ .

Pour tout  $x \in a^\perp$ , on a  $f(x) = x$ .

On a  $f(a) = a + k \|a\|^2 a = (1 + k \|a\|^2) a$ .

Si  $f$  conserve la norme, alors  $\|f(a)\| = \|a\|$  donc  $1 + k \|a\|^2 = -1$  donc  $k = \frac{-2}{\|a\|^2}$ .

Réciproquement, si  $k = \frac{-2}{\|a\|^2}$  alors  $\begin{cases} \forall x \in a^\perp, f(x) = x \\ f(a) = -a \end{cases}$  donc  $f$  est la réflexion par rapport à  $a^\perp$ .

## 9.4 Matrices orthogonales

---

**Proposition 9.39**

Soient  $\mathcal{B}$  une base orthonormée de  $E$  et  $f \in \mathcal{L}(E)$ . On pose  $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ .

On a  $f \in \mathcal{O}(E) \iff A^\top A = I_n$ .

Attention ! Ceci n'est valable que si la base  $\mathcal{B}$  est orthonormée.

---

**Définition 9.40**

Une matrice carrée  $A$  est dite orthogonale quand  $A^\top A = I_n$ , ce qui est équivalent à  $AA^\top = I_n$  ou  $A$  est inversible et  $A^{-1} = A^\top$ .

---

**Proposition 9.41**

Une matrice de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  est orthogonale quand ses colonnes sont de norme 1 et deux à deux orthogonales pour le produit scalaire canonique de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ .

Cela est également valable pour les lignes de la matrice.

---

**Démonstration 9.42**

Soit  $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ .

On pose  $A^T A = (b_{i,j})$ , où  $\forall (i, j) \in \llbracket 1 ; n \rrbracket^2$ ,  $b_{i,j} = \sum_{k=1}^n a_{k,i} a_{k,j}$ .

Alors  $A$  est orthogonale ssi  $A^T A = I_n$ , i.e.

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1 ; n \rrbracket^2, \quad b_{i,j} = \begin{cases} 0 & \text{si } i \neq j \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$$

Or

$$\begin{aligned} b_{i,i} = 1 &\iff \sum_{k=1}^n a_{k,i}^2 = 1 \\ &\iff \text{la norme de la } i\text{-ème colonne est } 1. \end{aligned}$$

Pour  $i \neq j$ ,  $b_{i,j} = 0$  ssi le produit scalaire canonique des colonnes  $i$  et  $j$  est nul. ■

---

**Exercice 9.43**

Vérifiez que la matrice  $M = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} -2 & 6 & -3 \\ 6 & 3 & 2 \\ -3 & 2 & 6 \end{pmatrix}$  est une matrice orthogonale, puis montrez qu'elle est la matrice d'une symétrie orthogonale donc vous préciserez les éléments caractéristiques.

---

**Correction 9.44**

On a

$$\frac{1}{7} \left\| \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \\ -3 \end{pmatrix} \right\| = 1 \quad \frac{1}{7} \left\| \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} \right\| = 1 \quad \frac{1}{7} \left\| \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 6 \end{pmatrix} \right\| = 1$$

et

$$\left\langle \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \\ -3 \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle = -12 + 18 - 6 = 0 \quad \left\langle \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \\ -3 \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 6 \end{pmatrix} \right\rangle = 6 + 12 - 18 = 0 \quad \left\langle \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 6 \end{pmatrix} \right\rangle = -18 + 6 + 12 = 0.$$

Donc  $M$  est orthogonale : on a  $M^T = M^{-1}$ .

On remarque que  $M$  est symétrique :  $M^T = M$ .

Donc  $M = M^{-1}$  i.e.  $M^2 = I_3$ .

Si on note  $f$  l'endomorphisme de matrice  $M$  dans une base orthonormée,  $f$  est une isométrie vectorielle et une symétrie, donc  $f$  est une symétrie orthogonale.

Les valeurs propres de  $f$  sont 1 et  $-1$ .

$f$  est la symétrie orthogonale par rapport à  $\text{sep}(f, 1)$ .

Or  $n = 3$  et  $\text{tr } f = 1$  donc  $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ .

$f$  est donc une réflexion par rapport au plan d'équation  $3x - 2y + z = 0$ .

---

**Exercice 9.45**

Déterminez les réels  $a$  et  $b$  tels que la matrice  $A = \begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix}$  soit orthogonale. Reconnaissez la nature de l'isométrie vectorielle de matrice  $A$  dans une base orthonormée  $\mathcal{B}$ .

---

*Correction 9.46*

La matrice  $A$  est orthogonale ssi

$$\begin{cases} a^2 + 2b^2 = 1 \\ 2ab + b^2 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} a^2 + 2b^2 = 1 \\ b(b + 2a) = 0 \end{cases}$$

Les solutions sont les couples  $(1, 0)$ ,  $(-1, 0)$ ,  $(1/3, -2/3)$  et  $(-1/3, 2/3)$ .

On a donc  $A = I_3$  ou  $A = -I_3$  ou (1)  $A = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ -2 & 1 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$  ou (2)  $A = \frac{-1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ -2 & 1 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ .

Soit  $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ .

Dans le cas (1), on a  $AX = X \iff x + y + z = 0$  donc  $A$  est la matrice de la réflexion par rapport au plan d'équation  $x + y + z = 0$ .

Dans le cas (2), on a  $AX = X \iff \begin{cases} y = x \\ z = x \end{cases}$  donc  $A$  est la matrice de la symétrie orthogonale par rapport à la droite  $\text{Vect}((1, 1, 1))$ .

L'ensemble des matrices orthogonales est noté  $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ .

---

**Proposition 9.47**

$\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$  est un sous-groupe compact de  $(\text{GL}_n(\mathbb{R}), \times)$ .



---

*Démonstration 9.48*

Soient  $E$  un espace euclidien de dimension  $n$ ,  $\mathcal{B}$  une base orthonormée de  $E$  et  $f \in \mathcal{L}(E)$  de matrice  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  dans la base  $\mathcal{B}$ .

On a  $A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \iff f \in \mathcal{O}(E)$ .

Comme  $\mathcal{O}(E)$  est un groupe pour  $\circ$ ,  $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$  est un groupe pour  $\times$  via l'isomorphisme de groupes

$$\begin{array}{ccc} (\mathcal{O}(E), \circ) & \xrightarrow{\sim} & (\mathcal{O}_n(\mathbb{R}), \times) \\ f & \mapsto & A \end{array}$$

Si  $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ , on a

$$\forall j \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, \sum_{i=1}^n a_{i,j}^2 = 1$$

donc

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1 ; n \rrbracket^2, 0 \leq a_{i,j}^2 \leq 1 \text{ i.e. } |a_{i,j}| \leq 1$$

donc  $\|A\|_\infty \leq 1$ , donc  $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$  est borné.

De plus, on a  $\mathcal{O}_n(\mathbb{R}) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid M^\top M = I_n\}$ .

On pose  $\varphi : M \mapsto M^\top M$  continue sur  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ .

Or  $\mathcal{O}_n(\mathbb{R}) = \varphi^{-1}(\{I_n\})$  et  $\{I_n\}$  fermé donc  $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$  fermé.

Enfin, comme  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  est un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie,  $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$  est un compact de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ . ■

## 9.4.1 Déterminant d'une isométrie vectorielle

---

### Proposition 9.49

Si  $f \in \mathcal{O}(E)$ , alors  $\det f \in \{-1, 1\}$ .

---

*Démonstration 9.50*

Soit  $f \in \mathcal{O}(E)$ .

Dans une base orthonormée  $\mathcal{B}$  de  $E$ ,  $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$  est orthogonale.

Donc  $A^\top A = I_n$ .

Or  $\det A^\top = \det A$  donc

$$\det(A^\top A) = \det A^\top \times \det A = (\det A)^2 = 1.$$

Donc  $\det A \in \{-1, 1\}$ . ■

La réciproque est bien sûr fausse.

Les isométries vectorielles de déterminant 1 sont celles qui conservent l'orientation : les transforment les bases orthonormées directes en bases orthonormées directes. On les appelle les isométries vectorielles directes ou positives.

On note  $\mathcal{SO}_n(\mathbb{R})$  l'ensemble des matrices orthogonales de déterminant 1 et  $\mathcal{SO}(E)$  l'ensemble des isométries vectorielles positives.

### Proposition 9.51

$\mathcal{SO}(E)$  est un sous-groupe de  $\mathcal{O}(E)$ , appelé groupe spécial orthogonal de  $E$ .

$\mathcal{SO}_n(\mathbb{R})$  est un sous-groupe de  $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ , appelé groupe spécial orthogonal d'ordre  $n$ .

Les réflexions sont des isométries négatives.

## 9.4.2 Changements de bases orthonormées

### Proposition 9.52

Soient  $\mathcal{B}$  et  $\mathcal{B}'$  deux bases orthonormées de  $E$ .

La matrice de passage de  $\mathcal{B}$  à  $\mathcal{B}'$  est une matrice orthogonale.

*Démonstration 9.53*

On note  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  et  $\mathcal{B}' = (e'_1, \dots, e'_n)$ .

On note  $\mathcal{P}_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'} = (p_{i,j})$ .

Pour tout  $j \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$ , on a  $e'_j = \sum_{i=1}^n p_{i,j} e_i$ .

Les bases  $\mathcal{B}$  et  $\mathcal{B}'$  étant orthonormées, on a

$$\forall j \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, \quad \|e'_j\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n p_{i,j}^2} = 1$$

et

$$\forall (j, k) \in \llbracket 1 ; n \rrbracket^2, \quad j \neq k \implies \langle e'_j | e'_k \rangle = \sum_{i=1}^n p_{i,j} p_{i,k} = 0.$$

Donc  $\mathcal{P}_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'} \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ . ■

---

*Remarque 9.54*

De plus, si  $\mathcal{B}$  et  $\mathcal{B}'$  ont la même orientation, alors  $\det \mathcal{P}_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'} > 0$  donc  $\det \mathcal{P}_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'} = 1$ .

Si elles sont de sens contraires, alors  $\det \mathcal{P}_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'} < 0$  donc  $\det \mathcal{P}_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'} = -1$ .

L'intérêt de ce genre de changement de bases est que la difficulté liée au calcul de l'inverse de la matrice de passage disparaît :

$X = PX'$  est équivalent à  $X' = P^\top X$  donc  $A' = P^{-1}AP$  devient  $A' = P^\top AP$ .

### 9.4.3 Produit mixte

---

#### Proposition 9.55

Soit  $(v_1, \dots, v_n)$  une famille de  $n$  vecteurs de  $E$ .

Le déterminant de  $(v_1, \dots, v_n)$  dans une base orthonormée directe ne dépend pas du choix de cette base.

---

*Démonstration 9.56*

Soient  $\mathcal{B}$  et  $\mathcal{B}'$  deux bases orthonormées directes de  $E$ .

D'après la Remarque 9.54, on a  $\det_{\mathcal{B}} \mathcal{B}' = 1$ .

Donc

$$\begin{aligned} \det_{\mathcal{B}} (v_1, \dots, v_n) &= \det_{\mathcal{B}} \mathcal{B}' \times \det_{\mathcal{B}'} (v_1, \dots, v_n) \\ &= \det_{\mathcal{B}'} (v_1, \dots, v_n). \end{aligned}$$

■

Dans ce cas, on appelle produit mixte de  $(v_1, \dots, v_n)$  le déterminant de cette famille dans n'importe quelle base orthonormée directe : il est noté habituellement  $\text{Det}(v_1, \dots, v_n)$  ou  $[v_1, \dots, v_n]$ .

Une conséquence directe de la définition du produit mixte est la caractérisation des bases directes.

---

#### Proposition 9.57

Soit  $(v_1, \dots, v_n)$  une famille de  $n$  vecteurs de  $E$ .

La famille  $(v_1, \dots, v_n)$  est une base directe de  $E$  ssi  $[v_1, \dots, v_n] > 0$ .

### 9.4.4 Produit vectoriel en dimension 3

Dans ce paragraphe,  $n = 3$ .

---

**Proposition 9.58**

Soit  $(u, v) \in E^2$ .

Il existe un unique vecteur  $w \in E$  tel que pour tout  $x \in E$ ,  $[u, v, x] = \langle w | x \rangle$ .

Ce vecteur est appelé le produit vectoriel de  $u$  et  $v$  et est noté  $u \wedge v$  ou  $u \times v$ .

---

*Démonstration 9.59*

Pour  $(u, v) \in E^2$ , l'application  $x \mapsto [u, v, x]$  est une forme linéaire sur  $E$ .

Ainsi, d'après le théorème de représentation de Riesz, il existe un unique vecteur  $w$  tel que

$$\forall x \in E, [u, v, x] = \langle w | x \rangle.$$

■

En base orthonormée directe, les coordonnées du produit vectoriel se calculent facilement. En base quelconque, c'est beaucoup plus pénible.

Notons quelques propriétés algébriques et géométriques du produit vectoriel.

---

**Proposition 9.60**

- ▷ L'application  $\wedge$  est bilinéaire et antisymétrique.
- ▷  $u \wedge v = 0$  ssi  $u$  et  $v$  sont colinéaires.
- ▷ Si  $u$  et  $v$  ne sont pas colinéaires, alors  $u \wedge v$  est un vecteur normal au plan  $\text{Vect}(u, v)$  et la famille  $(u, v, u \wedge v)$  est une base directe de  $E$ .
- ▷ Si  $u$  et  $v$  sont unitaires et orthogonaux, alors la famille  $(u, v, u \wedge v)$  est une base orthonormée directe de  $E$ .

---

*Démonstration 9.61*

On reprend les mêmes notations.

- ▷ L'application  $\wedge$  est bilinéaire antisymétrique car le produit mixte est trilinéaire alterné.
- ▷ Si  $u$  et  $v$  sont colinéaires, on a  $\forall x \in E, [u, v, x] = 0$  donc  $u \wedge v = 0$ .

Réciproquement, si  $u$  et  $v$  ne sont pas colinéaires alors  $\text{Vect}(u, v)$  est un plan.

On choisit  $x \in E$  normal à ce plan et on obtient une base de  $E : (u, v, x)$ .

Alors  $[u, v, x] \neq 0$ , donc  $\langle u \wedge v | x \rangle \neq 0$  donc  $u \wedge v \neq 0$ .

► Si  $u$  et  $v$  ne sont pas colinéaires, on a

$$\langle u \wedge v \mid u \rangle = [u, v, u] = 0 \text{ donc } u \wedge v \perp u$$

et

$$\langle u \wedge v \mid v \rangle = [u, v, v] = 0 \text{ donc } u \wedge v \perp v$$

donc  $u \wedge v \perp \text{Vect}(u, v)$ .

De plus, on a

$$[u, v, u \wedge v] = \langle u \wedge v \mid u \wedge v \rangle = \|u \wedge v\|^2 > 0$$

donc  $(u, v, u \wedge v)$  est une base directe de  $E$ .

► Pour tout  $(u, v) \in E^2$ ,  $\|u \wedge v\|^2 + \langle u \mid v \rangle^2 = \|u\|^2 \|v\|^2$ .

On choisit une base orthonormée directe  $\mathcal{B}$  de  $E$ .

On note  $u \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$  et  $v \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ .

En posant  $X = \begin{vmatrix} y & y' \\ z & z' \end{vmatrix}$ ,  $Y = -\begin{vmatrix} x & x' \\ z & z' \end{vmatrix}$  et  $Z = \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix}$ , on a alors  $u \wedge v \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$  et

$$\begin{aligned} \|u \wedge v\|^2 + \langle u \mid v \rangle^2 &= (yz' - y'z)^2 + (xz' - x'z)^2 + (xy' - x'y)^2 + (xx' + yy' + zz')^2 \\ &= (x^2 + y^2 + z^2)(x'^2 + y'^2 + z'^2). \end{aligned}$$

■

## 9.5 Étude en dimension 2

### Proposition 9.62

$\mathcal{O}_2(\mathbb{R})$  contient exclusivement les matrices suivantes :

► les matrices de rotation  $R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$

► les matrices de réflexions  $\begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix}$

où  $\theta$  est un réel quelconque.

---

*Démonstration 9.63*

Soit  $A = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \in \mathcal{O}_2(\mathbb{R})$  de déterminant 1. On a

$$\begin{cases} a^2 + b^2 = 1 \\ c^2 + d^2 = 1 \\ ac + bd = 0 \\ ad - bc = 1 \end{cases}$$

donc il existe  $\theta, \alpha \in \mathbb{R}$  tels que

$$\begin{cases} a = \cos \theta \\ b = \sin \theta \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} c = \cos \alpha \\ d = \sin \alpha \end{cases}$$

On a alors

$$\begin{cases} ac + bd = 0 = \cos(\alpha - \theta) \\ ad - bc = 1 = \sin(\alpha - \theta) \end{cases}$$

Donc  $\alpha - \theta \equiv \frac{-\pi}{2} [2\pi]$  i.e.  $\alpha \equiv \frac{-\pi}{2} + \theta [2\pi]$ , d'où

$$\begin{cases} c = -\sin \theta \\ d = \cos \theta \end{cases}$$

$$\text{i.e. } A = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

De même, si  $\det A = -1$ , on obtient  $A = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix}$ .

Et réciproquement. ■

L'ensemble des matrices de rotation forme le sous-groupe  $\mathcal{SO}_2(\mathbb{R})$  : c'est l'ensemble des matrices orthogonales de déterminant 1.

Il est remarquable que ce groupe est commutatif, car en dimension  $n \geq 3$ , ce n'est plus le cas. En effet, il est facile de constater que l'application  $\theta \mapsto R(\theta)$  est un morphisme surjectif de groupes de  $(\mathbb{R}, +)$  dans  $(\mathcal{SO}_2(\mathbb{R}), \times)$  (dont le noyau est le sous-groupe  $2\pi\mathbb{Z}$  de  $(\mathbb{R}, +)$ ).

Autrement dit, l'application  $\begin{array}{ccc} \mathbb{U} & \longrightarrow & \mathcal{SO}_2(\mathbb{R}) \\ e^{i\theta} & \longmapsto & R(\theta) \end{array}$  est un isomorphisme de groupes.

---

*Démonstration 9.64*

On a donc bien

$$\mathcal{SO}_2(\mathbb{R}) = \left\{ R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \mid \theta \in \mathbb{R} \right\}$$

et on remarque

$$\begin{cases} R(\theta + \theta') = R(\theta) R(\theta') = R(\theta') R(\theta) \\ R(-\theta) = R(\theta)^{-1} \end{cases}$$

■

---

**Proposition 9.65**

En dimension 2, les isométries vectorielles sont :

- ▷ les rotations vectorielles
- ▷ les réflexions vectorielles.

---

*Remarque 9.66*

On pose, pour  $\theta \in \mathbb{R}$ ,  $S(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix}$ .

$S(\theta)$  est orthogonale et symétrique donc  $S(\theta)^2 = I_2$ , donc  $S(\theta)$  est la matrice d'une symétrie orthogonale.

Donc comme  $S(\theta)$  n'est ni  $I_2$  ni  $-I_2$ , il s'agit de la matrice d'une réflexion.

Or on a

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta/2 \\ \sin \theta/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\theta - \theta/2) \\ \sin(\theta - \theta/2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (\cos \theta)/2 \\ (\sin \theta)/2 \end{pmatrix}.$$

## 9.6 Réduction des isométries vectorielles ou des matrices orthogonales

### 9.6.1 Réduction des isométries vectorielles

D'abord, deux résultats généraux sur les isométries vectorielles.

---

**Proposition 9.67**

Soit  $f \in \mathcal{O}(E)$ . On a :

- ▷  $\text{Sp}(f) \subseteq \{-1, 1\}$
- ▷ Si  $F$  est un sous-espace vectoriel de  $E$  stable par  $f$ , alors  $F^\perp$  est aussi un sous-espace vectoriel de  $E$  stable par  $f$ .

---

*Démonstration 9.68*

► Soient  $\lambda$  une valeur propre de  $f$  (s'il en existe) et  $x$  un vecteur propre associé.

On a  $f(x) = \lambda x$  donc

$$\|f(x)\| = |\lambda| \|x\| = \|x\| \neq 0.$$

Donc  $|\lambda| = 1$  i.e.  $\lambda \in \{-1, 1\}$ .

► Soit  $F$  un sous-espace vectoriel de  $E$  stable par  $f$ .

D'après la Proposition 9.23,  $F^\perp$  est stable par  $f^*$ .

Or  $f \in \mathcal{O}(E)$  donc  $f^* = f^{-1}$ , donc  $f^{-1}(F^\perp) \subseteq F^\perp$ .

Or  $f^{-1}$  est un automorphisme de  $E$  donc  $f^{-1}$  conserve la dimension, donc  $\dim f^{-1}(F^\perp) = \dim F^\perp$ .

D'où  $f^{-1}(F^\perp) = F^\perp$  et donc  $F^\perp = f(F^\perp)$ . ■

---

**Lemme 9.69**

Si  $E$  est un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie  $n$  et  $f \in \mathcal{L}(E)$ , alors il existe une droite ou un plan de  $E$  stable par  $f$ .

---

*Démonstration 9.70*

Si  $f$  possède une valeur propre réelle, la droite vectorielle dirigée par n'importe quel vecteur propre associé est stable par  $f$ .

Sinon, on choisit une base  $\mathcal{B}$  de  $E$  et on pose  $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ .

$A$  ne possède aucune valeur propre réelle mais a au moins une valeur propre complexe  $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ .

On choisit  $Z \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$  un vecteur propre de  $A$  associé à  $\lambda$ .

On a  $Z = X + iY$  où  $(X, Y) \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})^2$ .

On pose  $x, y \in E$  tels que  $x$  et  $y$  aient pour coordonnées  $X$  et  $Y$  dans la base  $\mathcal{B}$ .

On veut montrer que  $\text{Vect}(x, y)$  est stable par  $f$  et est un plan de  $E$ .

On note  $\lambda = a + ib$  où  $(a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$ .

On a  $AZ = \lambda Z$  donc

$$A(X + iY) = (a + ib)(X + iY)$$

$$AX + iAY = aX - bY + i(aY + bX)$$

donc

$$\begin{cases} AX = aX - bY \\ AY = bX + aY \end{cases}$$



*i.e.*

$$\begin{cases} f(x) = ax - by \in \text{Vect}(x, y) \\ f(y) = bx + ay \in \text{Vect}(x, y) \end{cases}$$

Donc  $\text{Vect}(x, y)$  est stable par  $f$ .

Supposons maintenant par l'absurde que  $x$  et  $y$  sont colinéaires.

Comme  $Z \neq 0$ ,  $x$  ou  $y$  est non-nul.

Supposons, par exemple, que  $y = \alpha x$  où  $\alpha \in \mathbb{R}$  et  $x \neq 0$ .

On a  $AZ = \lambda Z$  donc

$$\begin{aligned} A(X + iY) &= A(X + i\alpha X) \\ &= (a + ib)(X + i\alpha X) \end{aligned}$$

donc

$$(1 + i\alpha)AX = (1 + i\alpha)(a + ib)X$$

$$AX = (a + ib)X$$

$$\text{donc } AX + 0i = AX + ibX \text{ donc } \begin{cases} AX = aX \\ 0 = bX \end{cases}$$

Or  $b \neq 0$  et  $x \neq 0$  : contradiction.

De même si  $x = \alpha y$  avec  $y \neq 0$ .

Donc  $x$  et  $y$  ne sont pas colinéaires *i.e.*  $\text{Vect}(x, y)$  est un plan. ■

De ces propriétés découlent le théorème suivant.

### **Théorème 9.71**

Soit  $f \in \mathcal{O}(E)$ .

*Il existe une base orthonormée de  $E$  dans laquelle la matrice de  $f$  est diagonale par blocs, les blocs étant des scalaires 1 ou  $-1$  ou des matrices  $(2, 2)$  de rotation.*

Les matrices diagonales par blocs sont donc du type suivant :

$$D = \begin{pmatrix} 1 & & & & & & & & \\ & \ddots & & & & & & & \\ & & 1 & & & & & & \\ & & & -1 & & & & & \\ & & & & \ddots & & & & \\ & & & & & -1 & & & \\ & & & & & & \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 \\ & & & & & & \sin \theta_1 & \cos \theta_1 \\ & & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & & & \cos \theta_k & -\sin \theta_k \\ & & & & & & & & \sin \theta_k & \cos \theta_k \end{pmatrix}.$$

*Démonstration 9.72*

On raisonne par récurrence sur  $n = \dim E$ .

On pose  $\mathcal{P}(n)$  : « si  $E$  est de dimension  $n$  et si  $f \in \mathcal{O}(E)$ , alors il existe une base orthonormée ... »

►  $n = 1$

Si  $f \in \mathcal{O}(E)$  alors  $f = \text{id}_E$  ou  $f = -\text{id}_E$  donc dans n'importe quelle base  $\mathcal{B}$ ,  $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = (1)$  ou  $(-1)$ .

Donc  $\mathcal{P}(1)$  est vraie.

►  $n = 2$

Si  $f \in \mathcal{O}(E)$ , d'après la Proposition 9.62,  $f$  est une rotation et il existe  $\theta \in \mathbb{R}$  tel que dans n'importe quelle base orthonormée directe,  $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = R(\theta)$ ; ou  $f$  est une réflexion, *i.e.* une symétrie orthogonale par rapport à une droite donc il existe une base orthonormée dans laquelle  $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ .

Donc  $\mathcal{P}(2)$  est vraie.

► Pour  $n \geq 3$ , supposons que  $\mathcal{P}(n-2)$  et  $\mathcal{P}(n-1)$  sont vraies, que  $\dim E = n$  et que  $f \in \mathcal{O}(E)$ .

D'après le Lemme 9.69,  $f$  possède une droite stable ou un plan stable et d'après la Proposition 9.67, l'orthogonal de ce sous-espace vectoriel stable est aussi stable par  $f$ .

— Si  $f$  possède une droite stable  $D$  :

Alors  $D$  est une droite propre associée à une valeur propre 1 ou  $-1$  de  $f$ .

$g$ , l'endomorphisme induit par  $f$  dans l'hyperplan  $D^\perp$ , est une isométrie vectorielle de  $D^\perp$ .

Or  $\dim D^\perp = n-1$  donc d'après  $\mathcal{P}(n-1)$ , il existe une base orthonormée  $\mathcal{B}^\perp$  de  $D^\perp$  dans laquelle

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}^\perp}(g) = \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & -1 & & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & -1 \\ & & & & & & R(\theta_1) & & \\ & & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & & & R(\theta_k) \end{pmatrix}.$$

En choisissant un vecteur directeur unitaire  $u$  de  $D$ , on obtient  $\mathcal{B} = (u, \mathcal{B}^\perp)$  une base

orthonormée de  $E$  telle que

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} \pm 1 & & & & & & & \\ & 1 & & & & & & \\ & & \ddots & & & & & \\ & & & 1 & & & & \\ & & & & -1 & & & \\ & & & & & \ddots & & \\ & & & & & & -1 & \\ & & & & & & & R(\theta_1) \\ & & & & & & & \ddots \\ & & & & & & & & R(\theta_k) \end{pmatrix}.$$

— Si  $f$  possède un plan stable  $P$  :

Alors  $P^\perp$  est stable par  $f$ .

L'endomorphisme induit par  $f$  dans  $P$  est une isométrie vectorielle de  $P$ .

Or  $\dim P = 2$  donc il existe une base orthonormée de  $P$  dans laquelle l'endomorphisme induit par  $f$  dans  $P$  a pour matrice  $R(\theta)$  ou  $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ .

L'endomorphisme induit par  $f$  dans  $P^\perp$  est une isométrie vectorielle de  $P^\perp$ , or  $\dim P^\perp = n-2$ .

D'après  $\mathcal{P}(n-2)$ , ...

En concaténant deux bases orthonormées de  $P$  et  $P^\perp$ , on obtient une base  $\mathcal{B}$  dans laquelle

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} R(\theta) & & & & & & & \\ & 1 & & & & & & \\ & & \ddots & & & & & \\ & & & 1 & & & & \\ & & & & -1 & & & \\ & & & & & \ddots & & \\ & & & & & & -1 & \\ & & & & & & & R(\theta_1) \\ & & & & & & & \ddots \\ & & & & & & & & R(\theta_k) \end{pmatrix}$$

ou

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & -1 & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & \ddots & & \\ & & & & 1 & \\ & & & & & -1 & \\ & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & & -1 & \\ & & & & & & & & R(\theta_1) & \\ & & & & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & & & & & R(\theta_k) \end{pmatrix}$$

Dans les deux cas,  $\mathcal{P}(n)$  est vraie. ■

## 9.6.2 Réduction des matrices orthogonales

### Définition 9.73

Soient  $A, B$  deux matrices de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ .

On dit que  $A$  et  $B$  sont orthogonalement semblables (ou orthosemblables) quand il existe  $P \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$  telle que  $B = P^{-1}AP = P^{\top}AP$ .

Deux matrices sont orthosemblables quand elles représentent le même endomorphisme dans des bases orthonormées différentes.

Le théorème de réduction précédent a une traduction matricielle.

### Théorème 9.74

*Toute matrice orthogonale est orthosemblable à une matrice diagonale par blocs du type ci-dessus.*

*Pour tout  $A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ , il existe  $P \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$  et  $D$  diagonale par blocs comme ci-dessus telles que  $A = P^{\top}DP$ .*

## 9.6.3 Étude en dimension 3

À l'aide de ce résultat, on peut classer les isométries vectorielles de  $E$  en dimension 3. Seule la réduction des rotations est au programme.

Dans la suite de cette section,  $E$  est un espace euclidien de dimension 3 et orienté.

---

**Proposition 9.75**

Soit  $f \in \mathcal{O}(E)$ . On pose  $F = \ker(f - \text{id}_E)$ . Alors

- ▷ si  $\dim F = 3$ , alors  $f = \text{id}_E$
- ▷ si  $\dim F = 2$ , alors  $f$  est la réflexion par rapport à  $F$
- ▷ si  $\dim F = 1$ , alors  $f$  est une rotation d'axe  $F$
- ▷ si  $\dim F = 0$ , alors  $f$  est une antirotation, c'est-à-dire la composée d'une rotation et d'une réflexion dont l'axe et le plan de base respectifs sont orthogonaux.

---

**Démonstration 9.76**

Si  $\dim F = 1$ , d'après le Théorème 9.71, il existe une base orthonormée  $\mathcal{B}$  telle que

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & ? \end{pmatrix}$$

où le bloc  $?$  est  $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = R(\pi)$  ou  $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} = R(\theta)$ .

On pose  $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ .

On a  $f(e_1) = e_1$ .

Dans le plan  $F^\perp$ , stable par  $f$ , l'endomorphisme induit par  $f$  est une rotation « d'angle  $\theta$  » (ou  $-\theta$  selon l'orientation choisie de  $F^\perp$ ).

On choisit l'orientation de  $F^\perp$  de sorte que  $\mathcal{B}$  soit directe.

Ce qui caractérise  $f$ , c'est le couple  $(e_1, \theta)$  :  $e_1$  dirige  $F$  et  $\theta$  est l'angle associé.

Pour déterminer  $e_1$ , on résout  $f(e_1) = e_1$  et on choisit une solution de norme 1.

Pour déterminer l'angle  $\theta$  associé, on choisit un vecteur  $v \neq 0$  orthogonal à  $e_1$  puis on calcule  $f(v)$  et  $e_1 \wedge v$ .

Comme  $\|e_1\| = 1$ , on a  $\|e_1 \wedge v\| = \|v\| = \|f(v)\|$ .

Alors  $f(v) = \cos(\theta)v + \sin(\theta)(e_1 \wedge v)$ .

On en déduit  $\cos \theta$  et  $\sin \theta$  et enfin  $\theta$  (modulo  $2\pi$ ). ■

En étudiant les différents cas, on constate un lien entre le type de  $f$  et son déterminant.

---

**Proposition 9.77**

Soit  $f \in \mathcal{O}(E)$  telle que  $f \neq \text{id}_E$ .

$f$  est une rotation ssi  $\det f = 1$ .

Dans le cas où  $\det f = -1$ , cette information ne suffit pas à connaître le type de  $f$ . Cependant, si on connaît la matrice  $A$  de  $f$  dans une base orthonormée, alors on peut distinguer les cas 1 et 3.

---

### Proposition 9.78

Soient  $f \in \mathcal{L}(E)$  et  $A$  la matrice de  $f$  dans une base orthonormée.

Si  $A$  est une matrice orthogonale et symétrique, alors  $f$  est une symétrie orthogonale.

- Si  $\det f = 1$ , alors  $A$  est un demi-tour (une rotation d'angle  $\pi$ ).
- Si  $\det f = -1$ , alors  $A$  est une réflexion.

Donc, si  $A$  est orthogonale de déterminant  $-1$  et non-symétrique, alors  $f$  est une antirotation.

---

### Exercice 9.79

Reconnaissez la nature de l'endomorphisme dont la matrice dans une base orthonormée  $\mathcal{B}$  est

$$\frac{1}{15} \begin{pmatrix} -11 & 10 & 2 \\ -2 & -5 & 14 \\ 10 & 10 & 5 \end{pmatrix} \text{ et précisez ses éléments caractéristiques.}$$

---

### Correction 9.80

On note  $A$  la matrice donnée et  $C_1, C_2, C_3$  ses colonnes.

On a

$$\|C_1\|^2 = \frac{1}{15^2} \left( (-11)^2 + (-2)^2 + 10^2 \right) = 1 = \|C_2\|^2 = \|C_3\|^2$$

et

$$\langle C_1 | C_2 \rangle = \langle C_1 | C_3 \rangle = \langle C_2 | C_3 \rangle = 0$$

donc  $A \in \mathcal{O}_3(\mathbb{R})$ .

Or  $\mathcal{B}$  est orthonormée donc  $f \in \mathcal{O}(E)$ .

On note  $u \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \in E$  et on a

$$\begin{aligned} f(u) = u &\iff \begin{cases} -11x + 10y + 2z = 15x \\ -2x - 5y + 14z = 15y \\ 10x + 10y + 5z = 15z \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} -13x + 5y + z = 0 \\ -x - 10y + 7z = 0 \\ x + y - z = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x + y - z = 0 \\ -9y + 6z = 0 \\ 18y - 12z = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x = \frac{1}{3}z \\ y = \frac{2}{3}z \end{cases} \end{aligned}$$

Donc  $\ker(f - \text{id}_E)$  est la droite vectorielle dirigée par  $e_1 \begin{pmatrix} 1/\sqrt{14} \\ 2/\sqrt{14} \\ 3/\sqrt{14} \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$  de norme 1, donc  $f$  est une rotation.

On pose  $v \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$  de sorte que  $v \perp e_1$ .

On a  $f(v) \begin{pmatrix} 32/15 \\ -1/15 \\ -10/15 \end{pmatrix}$  et  $e_1 \wedge v \begin{pmatrix} -3/\sqrt{14} \\ -6/\sqrt{14} \\ 5/\sqrt{14} \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ .

Alors

$$\begin{aligned} f(v) = \cos(\theta) v + \sin(\theta) (e_1 \wedge v) &\iff \begin{cases} -2 \cos \theta - \frac{3}{\sqrt{14}} \sin \theta = \frac{32}{15} \\ \cos \theta - \frac{6}{\sqrt{14}} \sin \theta = \frac{-1}{15} \\ \frac{5}{\sqrt{14}} \sin \theta = \frac{-10}{15} \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} \sin \theta = \frac{-2\sqrt{14}}{15} \\ \cos \theta = \frac{-1}{15} + \frac{6}{\sqrt{14}} \sin \theta = \frac{-13}{15} \end{cases} \end{aligned}$$

Enfin, on obtient

$$\theta \equiv \pi + \text{Arctan} \frac{2\sqrt{14}}{15} [2\pi] .$$

---

**Exercice 9.81**

Même exercice avec la matrice  $\frac{1}{7} \begin{pmatrix} 6 & -2 & -3 \\ 3 & 6 & 2 \\ 2 & -3 & 6 \end{pmatrix}$ .

---

*Correction 9.82*

On note  $A$  la matrice donnée et on vérifie aisément que  $A$  est orthogonale.

On a  $\det A = 1$  donc  $f$  est une rotation.

On pose  $u \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$  et on a

$$\begin{aligned} f(u) = u &\iff \begin{cases} 6x - 2y - 3z = 7x \\ 3x + 6y + 2z = 7y \\ 2x - 3y + 6z = 7z \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} -x - 2y - 3z = 0 \\ 3x - y + 2z = 0 \\ 2x - 3y - z = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x + 2y + 3z = 0 \\ -7y - 7z = 0 \\ -7y - 7z = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} y = -z \\ x = y \end{cases} \end{aligned}$$

$$\text{Donc } \ker(f - \text{id}_E) = \text{Vect} \left( \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right) = \text{Vect} \left( \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \\ -1/\sqrt{3} \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \right) = \text{Vect}(e_1).$$

On pose  $v \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \perp e_1$  et on a

$$f(v) \begin{pmatrix} -5/7 \\ 8/7 \\ 3/7 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \quad \text{et} \quad e_1 \wedge v \begin{pmatrix} 2/\sqrt{3} \\ -1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}.$$



Alors

$$f(v) = \cos(\theta)v + \sin(\theta)(e_1 \wedge v) \iff \begin{cases} \frac{2}{\sqrt{3}} \sin \theta = \frac{-5}{7} \\ \cos \theta - \frac{1}{\sqrt{3}} \sin \theta = \frac{8}{7} \\ \cos \theta + \frac{1}{\sqrt{3}} \sin \theta = \frac{3}{7} \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} \sin \theta = \frac{-5\sqrt{3}}{14} \\ \cos \theta = \frac{8}{7} + \frac{1}{\sqrt{3}} \left( \frac{-5\sqrt{3}}{14} \right) = \frac{8}{7} - \frac{5}{14} = \frac{11}{14} \end{cases}$$

Donc  $f$  est la rotation d'axe orienté par  $e_1$  et d'angle associé  $\theta = \text{Arctan} \frac{-5\sqrt{3}}{11}$ .

### Exercice 9.83

Même exercice avec la matrice  $\frac{1}{7} \begin{pmatrix} 6 & -3 & -2 \\ 3 & 2 & 6 \\ 2 & 6 & -3 \end{pmatrix}$ .

### Correction 9.84

On note  $A$  la matrice donnée. Comme ses colonnes sont de norme 1 et leurs produits scalaires deux à deux tous nuls,  $A$  est orthogonale et donc  $f$  est une isométrie vectorielle.

On a  $\det A = -1$  donc  $f$  est une antirotation.

### Exercice 9.85

Soit  $\mathcal{B} = (i, j, k)$  une base orthonormée directe de  $E$  de dimension 3.

Déterminez la matrice dans la base  $\mathcal{B}$  de la rotation d'axe orienté par  $i + j + k$  et d'angle  $\frac{\pi}{3}$ .

### Correction 9.86

$f$  est la rotation d'axe orienté par  $i + j + k$  et d'angle  $\frac{\pi}{3}$  donc il existe une base orthonormée  $\mathcal{B}' = (e_1, e_2, e_3)$  telle que

$$A' = \text{Mat}_{\mathcal{B}'}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \pi/3 & -\sin \pi/3 \\ 0 & \sin \pi/3 & \cos \pi/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & -\sqrt{3}/2 \\ 0 & \sqrt{3}/2 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

En notant  $P = \mathcal{P}_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'}$ , on a  $A' = P^{-1}AP$  donc

$$A = PA'P^{-1} = PA'P^{\top}.$$

On a  $e_1 = \frac{i+j+k}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \end{pmatrix}$  donc  $P = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} & ? & ? \\ 1/\sqrt{3} & ? & ? \\ 1/\sqrt{3} & ? & ? \end{pmatrix}$ .

On a  $e_2 \perp e_1$  et  $\|e_2\| = 1$ , par exemple  $e_2 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix}$ , donc  $P = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{2} & ? \\ 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{2} & ? \\ 1/\sqrt{3} & 0 & ? \end{pmatrix}$ .

Puis  $e_3 = e_1 \wedge e_2 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{6} \\ -2/\sqrt{6} \end{pmatrix}$  donc  $P = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & 0 & -2/\sqrt{6} \end{pmatrix}$ .

On en déduit  $A$ .

## 9.7 Endomorphismes auto-adjoints

### 9.7.1 Définition et propriétés

---

#### Définition 9.87

On dit qu'un endomorphisme  $f$  de  $E$  est auto-adjoint quand  $f^* = f$ , autrement dit quand

$$\forall (x, y) \in E^2, \langle f(x) | y \rangle = \langle x | f(y) \rangle.$$

On rencontre encore très souvent le mot « symétrique » pour « auto-adjoint ».

---

#### Exemple 9.88

- Les projecteurs orthogonaux sont des endomorphismes auto-adjoints (mais pas des endomorphismes orthogonaux!).
- Les symétries orthogonales sont aussi des endomorphismes auto-adjoints.

---

#### Démonstration 9.89

Soit  $s$  une symétrie orthogonale. On lui associe un projecteur  $p$  tel que  $s = 2p - \text{id}_E$ .

$p$  est un projecteur orthogonal donc auto-adjoint.

Pour tout  $(x, y) \in E^2$ , on a

$$\begin{aligned} \langle s(x) | y \rangle &= \langle 2p(x) - x | y \rangle \\ &= 2 \langle p(x) | y \rangle - \langle x | y \rangle \\ &= 2 \langle x | p(y) \rangle - \langle x | y \rangle \\ &= \langle x | 2p(y) - y \rangle \\ &= \langle x | s(y) \rangle. \end{aligned}$$

Donc  $s$  est auto-adjoint. ■

---

**Proposition 9.90**

Soient  $\mathcal{B}$  une base orthonormée de  $E$  et  $f \in \mathcal{L}(E)$ .

$f$  est un endomorphisme auto-adjoint ssi sa matrice dans la base  $\mathcal{B}$  est symétrique.

---

**Corollaire 9.91**

L'ensemble des endomorphismes auto-adjoints est un sous-espace vectoriel de  $\mathcal{L}(E)$ , de dimension  $\frac{n(n+1)}{2}$ .

Il est noté  $\mathcal{S}(E)$ .

### 9.7.2 Théorème spectral

Il y a essentiellement un seul résultat à connaître sur les endomorphismes auto-adjoints ! On commence par deux lemmes.

---

**Lemme 9.92**

Le polynôme caractéristique d'un endomorphisme auto-adjoint est scindé sur  $\mathbb{R}$ .

---

*Démonstration 9.93*

Soient  $f \in \mathcal{S}(E)$  et  $\mathcal{B}$  une base orthonormée de  $E$ .

Comme  $f$  est auto-adjoint, on a  $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ .

$\chi_A$  est scindé sur  $\mathbb{C}$  donc pour montrer que  $\chi_A$  est scindé sur  $\mathbb{R}$ , on montre que toutes les valeurs propres complexes de  $A$  sont en fait réelles.

Soient  $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(A)$  et  $Z$  un vecteur propre associé.

Comme  $A^T = A$ , on a  $(AZ)^T = Z^T A^T = Z^T A = (\lambda Z)^T = \lambda Z^T$ .

Alors

$$\begin{aligned} \overline{Z}^T AZ &= (\overline{Z}^T A) Z \\ &= \overline{Z^T A} Z \\ &= \overline{\lambda Z^T} Z \\ &= \overline{\lambda} \times \overline{Z^T} Z \end{aligned}$$

et  $\overline{Z}^T AZ = \overline{Z}^T (AZ) = \lambda \overline{Z}^T Z$  donc

$$\lambda \overline{Z}^T Z = \overline{\lambda} \times \overline{Z}^T Z.$$

Or, avec  $Z = \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix}$ , on a  $\overline{Z}^T Z = \sum_{i=1}^n z_i \overline{z_i} = \sum_{i=1}^n |z_i|^2 > 0$ .

Donc  $\overline{Z}^T Z \neq 0$  donc  $\lambda = \overline{\lambda}$  donc  $\lambda \in \mathbb{R}$ . ■

---

**Lemme 9.94**

Si un sous-espace vectoriel  $F$  est stable par un endomorphisme auto-adjoint, alors  $F^\perp$  l'est aussi.

---

**Théorème 9.95**

Les sous-espaces propres d'un endomorphisme auto-adjoint sont deux à deux orthogonaux et leur somme directe est  $E$ .

Autrement dit, tout endomorphisme auto-adjoint est diagonalisable en base orthonormée, c'est-à-dire qu'il existe une base orthonormée de vecteurs propres.

---

*Démonstration 9.96*

On pose  $\mathcal{P}(n)$  : l'énoncé du Théorème 9.95 avec  $\dim E = n$ .

►  $n = 1$

On a  $\mathcal{P}(1)$  car tout endomorphisme est auto-adjoint et tout vecteur non-nul est propre.

► Supposons  $\mathcal{P}(n-1)$  et soit  $f \in \mathcal{S}(E)$  où  $\dim E = n$ .

D'après le Lemme 9.92,  $f$  possède au moins une valeur propre  $\lambda$  et un vecteur propre associé  $u$ .

$D = \text{Vect}(u)$  est stable par  $f$  (c'est une droite propre) donc d'après le Lemme 9.94,  $D^\perp$  est stable par  $f$ .

Or  $\dim D^\perp = n - 1$  donc par hypothèse de récurrence, l'endomorphisme induit par  $f$  dans  $D^\perp$  est auto-adjoint et on peut donc trouver dans  $D^\perp$  une base orthonormée de vecteurs propres pour cet endomorphisme :  $(e_2, \dots, e_n)$ .

$\mathcal{B} = \left( \frac{u}{\|u\|}, e_2, \dots, e_n \right)$  est alors une base orthonormée de  $E$  dont tous les vecteurs sont propres pour  $f$ .

Donc  $\mathcal{P}(n)$  est vraie. ■

On dit que les endomorphismes auto-adjoints sont orthodiagonalisables.

---

*Remarque 9.97*

La réciproque est vraie et presque évidente : si un endomorphisme est orthodiagonalisable, alors il est auto-adjoint.

---

**Exercice 9.98 (Un grand classique à savoir refaire)**

Soit  $u$  un endomorphisme auto-adjoint de  $E$ ,  $B$  la boule-unité fermée de  $E$  et  $S$  la sphère-unité de  $E$ .

On pose  $\alpha$  la plus petite des valeurs propres de  $u$  et  $\beta$  la plus grande.

Montrez que  $\inf_{x \in S} \langle x | u(x) \rangle = \alpha$  et  $\sup_{x \in B} \langle x | u(x) \rangle = \sup_{x \in S} \langle x | u(x) \rangle = \beta$ .

---

*Correction 9.99*

$u$  est auto-adjoint donc orthodagonalisable : il existe une base orthonormée  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  de  $E$  telle que  $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$  soit diagonale.

On pose  $D = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ .

On peut choisir d'ordonner les valeurs propres par ordre croissant :

$$\alpha = \lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_n = \beta.$$

Soit  $x \in E$  de coordonnées  $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ .

On a  $\langle x | u(x) \rangle = X^T D X = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i^2$ .

Si  $x \in B$ , alors  $\|x\| \leq 1$ .

Pour tout  $i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$ , on a  $\lambda_i \leq \beta$  donc  $\lambda_i x_i^2 \leq \beta x_i^2$ , et donc

$$\begin{aligned} \langle x | u(x) \rangle &= \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i^2 \\ &\leq \sum_{i=1}^n \beta x_i^2 \\ &= \beta \|x\|^2 \\ &\leq \beta. \end{aligned}$$

On a montré  $\forall x \in B, \langle x | u(x) \rangle \leq \beta$ .

Pour  $x = e_n$ , on a  $u(e_n) = \lambda_n e_n = \beta e_n$  donc

$$\langle e_n | u(e_n) \rangle = \langle e_n | \beta e_n \rangle = \beta \|e_n\|^2 = \beta.$$

Ceci prouve  $\max_{x \in B} \langle x | u(x) \rangle = \beta$ .

Si on remplace  $B$  par  $S$ , idem.

De même, soit  $x \in S$ .

Pour tout  $i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$ , on a  $\lambda_i \geq \alpha$  donc  $\lambda_i x_i^2 \geq \alpha x_i^2$ .

Donc

$$\langle x | u(x) \rangle = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i^2 \geq \alpha \sum_{i=1}^n x_i^2 = \alpha \|x\|^2 = \alpha.$$

On a montré  $\forall x \in S, \langle x | u(x) \rangle \geq \alpha$ , avec égalité en  $x = e_1$ .

Donc  $\alpha = \min_{x \in S} \langle x | u(x) \rangle$ .

---

### Exercice 9.100 (Un prolongement de l'exercice précédent)

Montrez que l'application  $N : \mathcal{S}(E) \longrightarrow \mathbb{R}_+$  définie par  $N(u) = \sup_{x \in B} |\langle x | u(x) \rangle|$  est une norme sur  $\mathcal{S}(E)$ .

Le théorème précédent a une version matricielle.

---

### Théorème 9.101

*Une matrice réelle est orthosemblable à une matrice diagonale ssi elle est symétrique.*

On dit que les matrices symétriques réelles sont orthodiagonalisables.

---

### Exercice 9.102

Orthodiagonalisez la matrice suivante :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

---

### Remarque 9.103

La condition « réelle » est indispensable dans le théorème spectral !

## 9.8 Endomorphismes auto-adjoints positifs, définis-positifs

### 9.8.1 Endomorphismes auto-adjoints positifs

---

**Définition 9.104**

Soit  $f \in \mathcal{S}(E)$ .

On dit que  $f$  est un endomorphisme auto-adjoint positif quand pour tout  $x \in E$ ,  $\langle f(x) | x \rangle \geq 0$ .

On dit que  $f$  est un endomorphisme auto-adjoint défini-positif quand pour tout  $x \in E \setminus \{0\}$ ,  $\langle f(x) | x \rangle > 0$ .

On note  $\mathcal{S}^+(E)$  l'ensemble des endomorphismes auto-adjoints positifs et  $\mathcal{S}^{++}(E)$  celui des endomorphismes auto-adjoints définis positifs. Attention, ces deux ensembles ne sont pas des espaces vectoriels et ne sont pas stables par composition.

Ces endomorphismes sont couramment présents dans les théories physiques et sont l'objet de propriétés spécifiques.

---

*Remarque 9.105*

Si  $f \in \mathcal{S}^{++}(E)$ ,  $(x, y) \mapsto \langle x | f(y) \rangle$  est aussi un produit scalaire.

On donne par exemple une caractérisation simple à l'aide de valeurs propres.

---

**Proposition 9.106**

Soit  $f \in \mathcal{S}(E)$ .

On a  $f \in \mathcal{S}^+(E)$  ssi les valeurs propres de  $f$  sont positives.

De même,  $f \in \mathcal{S}^{++}(E)$  ssi les valeurs propres de  $f$  sont strictement positives.

---

*Démonstration 9.107*

Supposons  $f \in \mathcal{S}^+(E)$ .

Soient  $\lambda \in \text{Sp}(f)$  et  $x$  un vecteur propre associé.

Alors  $\langle x | f(x) \rangle = \langle x | \lambda x \rangle = \lambda \|x\|^2 \geq 0$ .

Or  $\|x\|^2 > 0$  donc  $\lambda \geq 0$ .

Réciproquement, si  $f \in \mathcal{S}(E)$  et  $\text{Sp}(f) \subseteq [0 ; +\infty[$ , on choisit une base  $\mathcal{B}$  orthonormée de diagonalisation de  $f$  telle que

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

Avec  $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ , on a  $\langle x | f(x) \rangle = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i^2 \geq 0$ .

Idem pour  $\mathcal{S}^{++}(E)$  en mettant des inégalités strictes. ■

En particulier,  $\mathcal{S}^{++}(E) = \mathcal{S}^+(E) \cap \text{GL}(E)$ .

## 9.8.2 Matrices symétriques positives

---

### Définition 9.108

Soit  $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ .

On dit que  $A$  est une matrice symétrique positive quand pour tout  $X \in \mathbb{R}^n$ ,  $X^\top A X \geq 0$ .

On dit que  $A$  est une matrice symétrique définie-positive quand pour tout  $X \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ ,  $X^\top A X > 0$ .

Les matrices symétriques positives (respectivement définies-positives) sont donc les matrices dans des bases orthonormées des endomorphismes auto-adjoints positifs (respectivement définis-positifs).

On note  $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$  l'ensemble des matrices symétriques positives et  $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$  celui des matrices symétriques définies-positives. Attention, ces deux ensembles ne sont pas des espaces vectoriels et ne sont pas stables par produit.

---

### Proposition 9.109

Soit  $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ .

On a  $A \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$  ssi les valeurs propres de  $A$  sont positives.

De même,  $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$  ssi les valeurs propres de  $A$  sont strictement positives.



# Chapitre 10

## Fonctions vectorielles

### Sommaire

---

<b>10.1</b>	<b>Dérivée en un point</b>	<b>. 302</b>
10.1.1	Dérivabilité en un point	302
10.1.2	Interprétation géométrique, développement limité d'ordre 1, continuité	303
10.1.3	Dérivées à gauche, dérivées à droite	304
10.1.4	Lien avec les coordonnées	304
10.1.5	Théorèmes opératoires	305
<b>10.2</b>	<b>Fonction dérivée</b>	<b>. 307</b>
<b>10.3</b>	<b>Dérivées successives</b>	<b>. 310</b>
10.3.1	Définitions et exemples	310
10.3.2	Théorèmes opératoires pour les dérivées successives	311
<b>10.4</b>	<b>Intégrales</b>	<b>. 312</b>
10.4.1	Définition	312
10.4.2	Propriétés	313
10.4.3	Primitives d'une fonction continue	314
10.4.4	Formules de Taylor	315

---

Dans tout le chapitre,  $I$  et  $J$  désignent des intervalles de  $\mathbb{R}$  contenant au moins deux points et  $n$  désigne un entier naturel non-nul.

$E$  et  $F$  désignent des espaces vectoriels normés de dimension finie. Par choix d'une base et sachant que les normes sont équivalentes, on peut se ramener à une étude sur  $\mathbb{R}^n$ .

## 10.1 Dérivée en un point

### 10.1.1 Dérivabilité en un point

---

#### Définition 10.1

Soient  $f : I \longrightarrow E$  et  $a \in I$ .

On appelle (fonction) taux d'accroissement de  $f$  en  $a$  l'application

$$\begin{array}{ccc} \tau_a : & I \setminus \{a\} & \longrightarrow \mathbb{R} \\ & x & \longmapsto \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \end{array} .$$

On dit que  $f$  est dérivable en  $a$  quand  $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$  tend vers une limite  $\ell \in E$  quand  $x \rightarrow a$ .

Si  $f$  est dérivable en  $a$ , on appelle dérivée de  $f$  en  $a$  le vecteur

$$f'(a) = \ell = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

---

*Remarque 10.2*

Lorsqu'on étudie « à la main » la limite du taux d'accroissement, on effectue très souvent le changement d'origine  $h = x - a$  et on étudie  $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$  quand  $h \rightarrow 0$  (ce qui permet d'utiliser les équivalents ou les développements limités usuels).

### 10.1.2 Interprétation géométrique, développement limité d'ordre 1, continuité

---

**Proposition 10.3 (Développement limité d'ordre 1 d'une fonction dérivable)**

Soient  $f : I \rightarrow E$  et  $a \in I$ .

$f$  est dérivable en  $a$  ssi il existe  $m \in E$  tel que  $f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} f(a) + (x - a)m + o(x - a)$ .

Lorsque ces énoncés sont vrais, on a  $f'(a) = m$ .

On peut utiliser un développement limité à un ordre au moins 1 en  $a$  pour montrer que la fonction est dérivable en  $a$ .

---

**Proposition 10.4**

Si une fonction est dérivable en  $a$ , alors elle est continue en  $a$ .

---

*Remarque 10.5*

Évidemment, la réciproque est fausse !

Dans le cas où  $f'(a) \neq 0$  : un vecteur directeur de la droite passant par  $f(a)$  et  $f(x)$  est par exemple  $f(x) - f(a)$ , mais aussi  $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$  quand  $x \neq a$ .

Autrement dit,  $f$  est dérivable en  $a$  quand ce vecteur directeur de la droite passant par  $f(a)$  et  $f(x)$  a une limite dans  $E$ , autrement dit, quand la courbe décrite par  $f$  a une tangente en  $a$  : c'est la droite passant par  $f(a)$  et dirigée par  $f'(a)$ .

Si  $x$  représente une variable de temps, le vecteur dérivée  $f'(a)$  est le vecteur vitesse instantanée au point  $a$ . Son sens donne le sens de parcours de la courbe.

### 10.1.3 Dérivées à gauche, dérivées à droite

---

#### Définition 10.6

Soient  $f : I \longrightarrow E$  et  $a \in I$ .

On dit que  $f$  est dérivable à droite (respectivement à gauche) en  $a$  quand  $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$  admet une limite à droite (respectivement à gauche) dans  $\mathbb{R}^n$  quand  $x$  tend vers  $a$ .

Lorsque  $f$  est dérivable à droite (respectivement à gauche) en  $a$ , on appelle cette limite la dérivée à droite (respectivement à gauche) de  $f$  en  $a$  et on la note  $f'_d(a)$  (respectivement  $f'_g(a)$ ).

---

#### Proposition 10.7

*Si  $f$  est dérivable à droite (respectivement à gauche) en  $a$ , alors  $f$  est continue à droite (respectivement à gauche) en  $a$ .*

*En outre,  $f$  est dérivable en  $a$  ssi  $f$  est dérivable à droite et à gauche en  $a$  et  $f'_d(a) = f'_g(a)$ .*

*Lorsque c'est le cas,  $f'(a)$  est égale à la valeur commune de  $f'_d(a)$  et  $f'_g(a)$ .*

On peut parler, dans le cas de vecteurs non-nuls, de demi-tangentes à gauche ou à droite.

### 10.1.4 Lien avec les coordonnées

$E$  étant de dimension finie, on choisit une base  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  de  $E$ . Soit  $f : I \longrightarrow E$ .

On a pour tout  $t \in I$ ,  $f(t) = \sum_{i=1}^n f_i(t) e_i$ .

On associe ainsi à  $f$  ses  $n$  fonctions-coordonnées dans la base  $\mathcal{B}$  (qui sont des fonctions à valeurs dans  $\mathbb{R}$ ).

---

#### Proposition 10.8

*Avec les mêmes notations, il y a équivalence entre «  $f$  est dérivable en  $a$  » et « les fonctions  $f_i$  sont dérivables en  $a$  ».*

*Dans ce cas, on a  $f'(a) = \sum_{i=1}^n f'_i(a) e_i$ .*

Autrement dit, travailler avec une fonction à valeurs dans  $E$  revient à travailler avec  $n$  fonctions numériques simultanément.

## 10.1.5 Théorèmes opératoires

---

### Proposition 10.9

Soient  $f : I \longrightarrow E$ ,  $g : I \longrightarrow E$ ,  $a \in I$  et  $\lambda \in \mathbb{K}$ .

Si  $f$  et  $g$  sont dérivables en  $a$ , alors  $f + g$  et  $\lambda f$  sont dérivables en  $a$  et

$$(f + g)'(a) = f'(a) + g'(a) \quad (\lambda f)'(a) = \lambda f'(a).$$

---

### Proposition 10.10

Soient  $\varphi : I \longrightarrow \mathbb{R}$  et  $f : J \longrightarrow E$  telles que  $\varphi(I) \subseteq J$  et  $a \in I$ .

Si  $\varphi$  est dérivable en  $a$  et  $f$  est dérivable en  $\varphi(a)$ , alors  $f \circ \varphi$  est dérivable en  $a$  et

$$(f \circ \varphi)'(a) = \varphi'(a) f'(\varphi(a)).$$

---

### Proposition 10.11

Soient  $f : I \longrightarrow E$ ,  $L \in \mathcal{L}(E, F)$  et  $a \in I$ .

Si  $f$  est dérivable en  $a$ , alors  $L \circ f$  l'est aussi et

$$(L \circ f)'(a) = L \circ f'(a).$$

---

### Démonstration 10.12

Par linéarité de  $L$ , pour  $t \in I$ , on a

$$\frac{L \circ f(t) - L \circ f(a)}{t - a} = \frac{L(f(t) - f(a))}{t - a} = L \left( \frac{f(t) - f(a)}{t - a} \right).$$

Comme  $E$  est de dimension finie,  $L$  est continue donc

$$\lim_{t \rightarrow a} \frac{L \circ f(t) - L \circ f(a)}{t - a} = L \left( \lim_{t \rightarrow a} \frac{f(t) - f(a)}{t - a} \right) = L(f'(a))$$

i.e.  $L \circ f$  est dérivable en  $a$  et  $(L \circ f)'(a) = L \circ f'(a)$ . ■

---

### Exemple 10.13

Si  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  et  $X$  est une fonction de  $I$  dans  $\mathcal{M}_{n1}(\mathbb{R})$  dérivable en  $a$ , alors  $Y : t \longmapsto AX(t)$  est dérivable en  $a$  et  $Y'(a) = AX'(a)$ .

---

### Proposition 10.14

Soient  $f, g : I \longrightarrow E$  et  $B : E^2 \longrightarrow F$  bilinéaire.

Si  $f$  et  $g$  sont dérivables en  $a$ , alors  $(f, g)$  l'est aussi et  $(B(f, g))'(a) = B(f', g)(a) + B(f, g')(a)$ .

---

*Démonstration 10.15*

Pour  $t \in I$ , on a

$$\begin{aligned}
B(f(t), g(t)) - B(f(a), g(a)) &= B(f(t) - f(a), g(t)) + B(f(a), g(t)) - B(f(a), g(a)) \\
&= B(f(t) - f(a), g(t)) + B(f(a), g(t) - g(a)).
\end{aligned}$$

Comme  $E$  est de dimension finie,  $B$  est continue donc

$$\begin{aligned}
\lim_{t \rightarrow a} \frac{B(f(t), g(t)) - B(f(a), g(a))}{t - a} &= \lim_{t \rightarrow a} \left[ B\left(\frac{f(t) - f(a)}{t - a}, g(t)\right) + B\left(f(a), \frac{g(t) - g(a)}{t - a}\right) \right] \\
&= B(f'(a), g(a)) + B(f(a), g'(a)). \quad \blacksquare
\end{aligned}$$

---

*Exemple 10.16*

- Si  $A$  et  $B$  sont deux fonctions de  $I$  dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  dérivables en  $a$ , alors  $M : t \mapsto A(t)B(t)$  est aussi dérivable en  $a$  et  $M'(a) = A'(a)B(a) + A(a)B'(a)$ .
- Si  $u$  et  $v$  sont deux fonctions à valeurs dans  $E$ , espace euclidien, et dérivables en  $a$ , alors  $p : t \mapsto \langle u(t) | v(t) \rangle$  est dérivable en  $a$  et  $p'(a) = \langle u'(a) | v(a) \rangle + \langle u(a) | v'(a) \rangle$ .

---

**Proposition 10.17**

Soient  $f_1, \dots, f_p : I \rightarrow E$ ,  $a \in I$  et  $M$  une application  $p$ -linéaire de  $E^p$  dans  $F$ .

Si  $f_1, \dots, f_p$  sont dérivables en  $a$ , alors  $M(f_1, \dots, f_p)$  l'est aussi et

$$(M(f_1, \dots, f_p))'(a) = \sum_{i=1}^p M(f_1, \dots, f_i', \dots, f_p)(a).$$

---

*Démonstration 10.18*

Si on considère  $f, g, h : I \rightarrow E$  dérivables en  $a$  et  $T : E^3 \rightarrow F$  trilinéaire, pour  $t \in I$ , on a

$$\begin{aligned}
&T(f(t), g(t), h(t)) - T(f(a), g(a), h(a)) \\
&= T(f(t) - f(a), g(t), h(t)) + T(f(a), g(t), h(t)) - T(f(a), g(a), h(a)) \\
&= T(f(t) - f(a), g(t), h(t)) + T(f(a), g(t) - g(a), h(t)) + T(f(a), g(a), h(t)) \\
&\quad - T(f(a), g(a), h(a)) \\
&= T(f(t) - f(a), g(t), h(t)) + T(f(a), g(t) - g(a), h(t)) + T(f(a), g(a), h(t) - h(a)).
\end{aligned}$$

On en déduit le cas général : pour  $t \in I$ , on a

$$\begin{aligned}
&M(f_1(t), \dots, f_p(t)) - M(f_1(a), \dots, f_p(a)) \\
&= \sum_{j=1}^p M(f_1(a), \dots, f_{j-1}(a), f_j(t) - f_j(a), f_{j+1}(a), \dots, f_p(a)).
\end{aligned}$$

Et il s'ensuit la conclusion, de la même manière que dans les cas linéaire et bilinéaire. ■

---

*Exemple 10.19*

Si  $M$  est une fonction de  $I$  dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  dérivable en  $a \in I$ , alors  $d : t \mapsto \det M(t)$  est aussi dérivable en  $a$  et  $d'(a) = \sum_{k=1}^n \det M_k^c(a)$  où  $M_k^c(a)$  est la matrice obtenue à partir de  $M(a)$  en remplaçant sa  $k$ -ème colonne par sa dérivée en  $a$ .

On a aussi  $d'(a) = \sum_{k=1}^n \det M_k^\ell(a)$  où  $M_k^\ell(a)$  est la matrice obtenue à partir de  $M(a)$  en remplaçant sa  $k$ -ème ligne par sa dérivée en  $a$ .

## 10.2 Fonction dérivée

---

### Définition 10.20

Soit  $f : I \longrightarrow E$ .

- On dit que  $f$  est dérivable sur  $I$  si  $f$  est dérivable en tout point  $a \in I$ , ce qui revient à dire, après choix d'une base, que les fonctions coordonnées de  $f$  sont dérivables sur  $I$ .
- Si  $f$  est dérivable sur  $I$ , on définit sa fonction dérivée par

$$\begin{aligned} f' : I &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto f'(x) \end{aligned}$$

---

### Proposition 10.21 (Théorèmes d'opérations sur les fonctions dérivables)

Soient  $f, g$  deux fonctions définies sur  $I$  et  $\lambda \in \mathbb{K}$ .

Si  $f$  et  $g$  sont dérivables sur  $I$ , alors  $f + g$  et  $\lambda f$  sont dérivables sur  $I$  et

$$(f + g)' = f' + g' \quad (\lambda f)' = \lambda f'.$$

---

### Proposition 10.22

Soient  $\varphi : I \longrightarrow \mathbb{R}$  et  $f : J \longrightarrow E$  telles que  $\varphi(I) \subseteq J$ .

Si  $\varphi$  est dérivable sur  $I$  et  $f$  est dérivable sur  $J$ , alors  $f \circ \varphi$  est dérivable sur  $I$  et

$$(f \circ \varphi)' = \varphi' \times f' \circ \varphi.$$

---

### Proposition 10.23

Soient  $f : I \longrightarrow E$  et  $L \in \mathcal{L}(E, F)$ .

Si  $f$  est dérivable sur  $I$ , alors  $L \circ f$  l'est aussi et  $(L \circ f)' = L \circ f'$ .

---

**Proposition 10.24**

Soient  $f, g : I \longrightarrow E$  et  $B : E^2 \longrightarrow F$  bilinéaire.

Si  $f$  et  $g$  sont dérivables sur  $I$ , alors  $B(f, g)$  l'est aussi et  $(B(f, g))' = B(f', g) + B(f, g')$ .

---

**Proposition 10.25**

Soient  $f_1, \dots, f_p : I \longrightarrow E$  et  $M : E^p \longrightarrow F$   $p$ -linéaire.

Si  $f_1, \dots, f_p$  sont dérivables sur  $I$ , alors  $M(f_1, \dots, f_p)$  l'est aussi et

$$(M(f_1, \dots, f_p))' = \sum_{k=1}^p M(f_1, \dots, f_k', \dots, f_p).$$

---

**Exercice 10.26**

Montrez que si un point  $M$  se déplace sur une sphère de centre  $A$ , sa vitesse est toujours orthogonale au vecteur  $\overrightarrow{AM}$ .

Montrez que la réciproque est vraie : si  $A$  est un point fixe et si la vitesse de  $M$  est toujours orthogonale au vecteur  $\overrightarrow{AM}$ , alors  $M$  se déplace sur une sphère.

---

**Correction 10.27**

$M : I \longrightarrow E$  est dérivable sur  $I$ .

On suppose  $t \longmapsto AM(t)$  constante i.e.  $t \longmapsto AM(t)^2$  constante.

Pour  $t \in I$ , on remarque

$$AM(t)^2 = \|\overrightarrow{AM(t)}\|^2 = \left\langle \overrightarrow{AM(t)} \mid \overrightarrow{AM(t)} \right\rangle$$

donc

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} (AM(t)^2) &= \left\langle \frac{d}{dt} (\overrightarrow{AM(t)}) \mid \overrightarrow{AM(t)} \right\rangle + \left\langle \overrightarrow{AM(t)} \mid \frac{d}{dt} (\overrightarrow{AM(t)}) \right\rangle \\ &= 2 \left\langle \overrightarrow{AM(t)} \mid \frac{d}{dt} (\overrightarrow{AM(t)}) \right\rangle. \end{aligned}$$

Or  $\frac{d}{dt} (AM(t)^2) = 0$ , d'où l'orthogonalité.

Et réciproquement en remontant les calculs.

---

**Exercice 10.28**

Soit  $S : I \longrightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  dérivable sur  $I$  telle que pour tout  $t \in I$ ,  $S(t)$  est une matrice de symétrie.

Montrez que pour tout  $t \in I$ ,  $\text{tr}(S(t)S'(t)) = 0$ .

---

*Correction 10.29*

Soit  $t \in I$ .

$S(t)$  est une matrice de symétrie donc  $S(t)^2 = I_n$ .

Donc  $S(t) S'(t) + S'(t) S(t) = 0$ .

Donc  $\text{tr}(S(t) S'(t)) + \text{tr}(S'(t) S(t)) = 0$ .

Donc  $2 \text{tr}(S(t) S'(t)) = 0$ .

Donc  $\text{tr}(S(t) S'(t)) = 0$ .

---

**Exercice 10.30**

Soit  $A : I \longrightarrow \text{GL}_n(\mathbb{R})$  dérivable sur  $I$ .

Montrez que  $B : t \longmapsto A^{-1}(t)$  est dérivable sur  $I$  et calculez sa dérivée en fonction de celle de  $A$ .

---

*Correction 10.31*

Pour  $t \in I$ , on a

$$A^{-1}(t) = \frac{1}{\det A(t)} (\text{Com } A(t))^{\top}.$$

$A$  étant dérivable sur  $I$ , ses coefficients le sont aussi, donc  $\text{Com } A$  et  $\det A$  sont dérivables sur  $I$ , et donc  $A^{-1}$  l'est aussi.

Sachant que  $A$  et  $A^{-1}$  sont dérivables sur  $I$  et pour tout  $t \in I$ ,  $A(t) B(t) = I_n$ , par dérivation, pour  $t \in I$ , on obtient

$$A'(t) B(t) + A(t) B'(t) = 0$$

donc

$$A^{-1}(t) A'(t) B(t) + B'(t) = 0.$$

D'où

$$(A^{-1})' = -A^{-1} A' A^{-1}.$$

---

**Exercice 10.32**

Soit  $M : I \longrightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  dérivable sur  $I$ , intervalle contenant 0. On pose  $f : t \longmapsto \det(I_n + tM(t))$ .

Justifiez que  $f$  est dérivable sur  $I$  et calculez  $f'(0)$ .



---

*Correction 10.33*

La fonction  $t \mapsto M(t)$  est dérivable sur  $I$  donc tous ses coefficients le sont aussi donc  $f$  est dérivable par sommes et produits de fonctions dérivables.

Si  $M$  est constante :  $M = (m_{i,j})$ , on a

$$f(t) = \begin{vmatrix} 1 + tm_{1,1} & tm_{1,2} & \dots & tm_{1,n} \\ tm_{2,1} & 1 + tm_{2,2} & \dots & tm_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ tm_{n,1} & \dots & tm_{n,n-1} & 1 + tm_{n,n} \end{vmatrix}.$$

On obtient donc  $f'(t)$  en sommant tous les déterminants obtenus en dérivant colonne après colonne.

On a donc  $f'(0) = m_{1,1} + \dots + m_{n,n} = \text{tr } M$ .

Plus généralement, on a donc  $f'(0) = \text{tr } M(0)$ .

## 10.3 Dérivées successives

### 10.3.1 Définitions et exemples

Si  $f$  est dérivable sur  $I$ ,  $f'$  est une fonction définie sur  $I$ . On peut donc essayer de la dériver : quand c'est possible, on obtient la dérivée seconde  $f''$ , et ainsi de suite...

---

**Définition 10.34**

Soit  $f : I \rightarrow E$ . On définit, par récurrence, les notions suivantes :

- Par convention, on dit que  $f$  est toujours dérivable 0 fois sur  $I$  et on définit la dérivée d'ordre 0 de  $f$  par  $f^{(0)} = f$ .
- Soit  $k \in \mathbb{N}^*$ .

On dit que  $f$  est dérivable  $k$  fois sur  $I$  si elle est dérivable  $(k-1)$  fois sur  $I$  et que sa dérivée d'ordre  $(k-1)$ , la fonction  $f^{(k-1)}$ , est dérivable sur  $I$ .

On définit alors la dérivée d'ordre  $k$  par

$$f^{(k)} = \left(f^{(k-1)}\right)'.$$

---

*Remarque 10.35*

$f^{(0)}$  désigne  $f$ ,  $f^{(1)}$  désigne  $f'$  et  $f^{(2)}$  est aussi notée  $f''$ . À partir de trois dérivations, on n'utilise plus de primes.

La dérivée d'ordre  $k$  de  $f$  est également notée  $\frac{d^k f}{dt^k}$ .

Enfin, il est facile de montrer que  $f$  est  $(p+q)$  fois dérivable sur  $I$  ssi  $f$  est  $p$  fois dérivable et  $f^{(p)}$  est  $q$  fois dérivable sur  $I$ . Dans ce cas, on a l'égalité

$$\left(f^{(p)}\right)^{(q)} = f^{(p+q)}.$$

---

**Définition 10.36**

Soit  $k \in \mathbb{N}$ .

On dit que  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^k$  sur  $I$  si  $f$  est dérivable  $k$  fois sur  $I$  et que  $f^{(k)}$  est une fonction continue sur  $I$ .

On dit que  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $I$  si  $f$  est dérivable  $k$  fois sur  $I$  quel que soit  $k \in \mathbb{N}$ .

Pour tout  $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ , on notera  $\mathcal{C}^k(I, E)$  l'ensemble des fonctions de classe  $\mathcal{C}^k$  sur  $I$ .

---

*Remarque 10.37*

«  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^0$  sur  $I$  » signifie «  $f$  est continue sur  $I$  ».

«  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $I$  » signifie «  $f$  est dérivable sur  $I$  et  $f'$  est continue sur  $I$  ».

---

**Proposition 10.38**

Soient  $f$  une fonction définie sur  $I$  et  $k \in \mathbb{N}^*$ .

- ▷ Si  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^k$  sur  $I$ , alors pour tout  $p \in \llbracket 0 ; k \rrbracket$ ,  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^p$  sur  $I$ .
- ▷  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^k$  sur  $I$  ssi  $f$  est dérivable sur  $I$  et  $f'$  est de classe  $\mathcal{C}^{k-1}$  sur  $I$ , ou, ce qui revient au même,  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^{k-1}$  sur  $I$  et  $f^{(k-1)}$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $I$ .

Les ensembles  $\mathcal{C}^k(I, E)$  forment donc une chaîne d'inclusions :

$$\mathcal{C}^\infty(I, E) \subseteq \dots \subseteq \mathcal{C}^{k+1}(I, E) \subseteq \mathcal{C}^k(I, E) \subseteq \dots \subseteq \mathcal{C}^1(I, E) \subseteq \mathcal{C}^0(I, E).$$

### 10.3.2 Théorèmes opératoires pour les dérivées successives

---

**Proposition 10.39**

Soient  $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ ,  $f, g : I \longrightarrow E$  deux fonctions de classe  $\mathcal{C}^k$  sur  $I$  et  $\lambda \in \mathbb{K}$ .

On a :

- ▷  $f + g$  est de classe  $\mathcal{C}^k$  sur  $I$  et  $(f + g)^{(k)} = f^{(k)} + g^{(k)}$
- ▷  $\lambda f$  est de classe  $\mathcal{C}^k$  sur  $I$  et  $(\lambda f)^{(k)} = \lambda f^{(k)}$ .

---

**Proposition 10.40**

Soient  $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ ,  $\varphi : I \longrightarrow \mathbb{R}$  et  $f : J \longrightarrow E$ .

Si  $\varphi(I) \subseteq J$  et  $\varphi$  et  $f$  sont de classe  $\mathcal{C}^k$  sur  $I$  et  $J$  respectivement, alors  $f \circ \varphi$  est de classe  $\mathcal{C}^k$  sur  $I$ .

---

**Proposition 10.41**

Soient  $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ ,  $f : I \longrightarrow E$  et  $L \in \mathcal{L}(E, F)$ .

Si  $f$  est une fonction de classe  $\mathcal{C}^k$  sur  $I$ , alors  $L \circ f$  l'est aussi et  $(L \circ f)^{(k)} = L \circ f^{(k)}$ .

---

**Proposition 10.42**

Soient  $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ ,  $f, g : I \longrightarrow E$  et  $B : E^2 \longrightarrow F$  bilinéaire.

Si  $f$  et  $g$  sont de classe  $\mathcal{C}^k$  sur  $I$ , alors  $B(f, g)$  l'est aussi et, d'après la formule de Leibniz :

$$(B(f, g))^{(k)} = \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} B(f^{(i)}, g^{(k-i)}).$$

## 10.4 Intégrales

### 10.4.1 Définition

---

**Définition 10.43**

Soit  $f : [a ; b] \longrightarrow E$  une fonction définie sur le segment  $[a ; b]$ .

On dit que  $f$  est continue par morceaux sur  $[a ; b]$  quand il existe une subdivision  $(c_0, \dots, c_n)$  de  $[a ; b]$  telle que :

- ▷ pour tout  $i \in \llbracket 0 ; n - 1 \rrbracket$ ,  $f$  est continue sur l'intervalle ouvert  $]c_i ; c_{i+1}[$
- ▷  $f$  a une limite réelle en  $a$  à droite, en  $b$  à gauche et des limites réelles à gauche et à droite en chaque point  $c_i$  tel que  $1 \leq i \leq n - 1$ .

Toute subdivision qui convient dans cette définition est dite adaptée à  $f$ .

On choisit une base  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  de  $E$ . Il est alors évident qu'une fonction à valeurs dans  $E$  est continue par morceaux ssi ses fonctions coordonnées dans la base  $\mathcal{B}$  le sont aussi.

---

**Définition 10.44**

Soit  $f : [a ; b] \longrightarrow E$  continue par morceaux sur  $[a ; b]$ .

On note  $f_1, \dots, f_n$  ses fonctions coordonnées dans la base  $\mathcal{B}$ , i.e.  $f = \sum_{i=1}^n f_i e_i$ .

On pose alors

$$\int_{[a;b]} f = \sum_{i=1}^n \left( \int_{[a;b]} f_i \right) e_i.$$

Bien sûr, les notations classiques pour les intégrales sont conservées :  $\int_a^b f$ ,  $\int_a^b f(t) dt$ , etc.

On pose encore  $\int_b^a f = - \int_a^b f$ .

Cette définition est *a priori* ambiguë car elle dépend de la base  $\mathcal{B}$  choisie. On montre aisément qu'en fait ce n'est pas le cas : on obtient toujours le même vecteur intégrale, indépendamment de la base choisie.

## 10.4.2 Propriétés

En se ramenant aux coordonnées dans une base, on retrouve les propriétés essentielles de l'intégrale.

---

**Proposition 10.45**

L'application  $\mathcal{C}_m^0([a ; b]) \longrightarrow E$  est linéaire.

$$f \longmapsto \int_a^b f$$


---

**Proposition 10.46**

La relation de Chasles reste valable : pour tout  $(a, b, c) \in I^3$ , si  $f$  est continue par morceaux sur  $I$ , alors  $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$ .

On retrouve une inégalité triangulaire avec la norme (n'importe laquelle!).

---

**Proposition 10.47**

Soit  $f : [a ; b] \longrightarrow E$  continue par morceaux sur  $[a ; b]$ .

La fonction  $t \longmapsto \|f(t)\|$  est continue par morceaux sur  $[a ; b]$  et à valeurs réelles.

De plus, on a

$$\left\| \int_a^b f \right\| \leq \int_a^b \|f\|.$$

On retrouve la notion de sommes de Riemann.

---

**Proposition 10.48**

Soit  $f : [a ; b] \longrightarrow E$  continue par morceaux.

Pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , on introduit les sommes de Riemann associées à la fonction  $f$  sur  $[a ; b]$  : pour  $k \in \llbracket 0 ; n \rrbracket$ , on pose  $c_k = a + k \frac{b-a}{n}$  et

$$S_n = \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(c_k) \quad S'_n = \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f(c_k) \quad S''_n = \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^n f(c_k).$$

Les suites  $(S_n)$ ,  $(S'_n)$  et  $(S''_n)$  tendent toutes les trois vers  $\int_{[a;b]} f(x) dx$ .

Enfin, une petite nouveauté.

---

**Proposition 10.49**

Soient  $f : [a ; b] \longrightarrow E$  continue par morceaux et  $L \in \mathcal{L}(E, F)$ .

La fonction  $L \circ f = L(f)$  est continue par morceaux et  $\int_a^b L(f) = L\left(\int_a^b f\right)$ .

### 10.4.3 Primitives d'une fonction continue

---

**Proposition 10.50**

Soient  $f : I \longrightarrow E$  continue et  $a \in I$ . On pose  $\Phi : x \longmapsto \int_a^x f(t) dt$ .

$\Phi$  est l'unique primitive de  $f$  sur  $I$  qui s'annule en  $a$ .

---

*Remarque 10.51*

On a donc montré que si  $f$  est continue sur  $I$ , alors la fonction  $\Phi : x \longmapsto \int_a^x f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $I$ , car pour tout  $x \in I$ ,  $\Phi'(x) = f(x)$ , et non pas  $\Phi'(x) = f(x) - f(a)$  !

---

**Corollaire 10.52**

Toute fonction continue sur un intervalle  $y$  admet des primitives.

On en déduit l'inégalité des accroissements finis pour une fonction de classe  $\mathcal{C}^1$  (dérivable ne suffit pas).

---

**Proposition 10.53**

Soit  $f : I \longrightarrow E$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $I$ .

Pour tout  $(a, b) \in I^2$ ,  $\|f(b) - f(a)\| \leq |b - a| \sup_{[a;b]} \|f'\|$ .

## 10.4.4 Formules de Taylor

On retrouve encore par utilisation des fonctions coordonnées les formules de Taylor usuelles.

La formule de Taylor avec reste intégral.

---

**Proposition 10.54**

Soient  $f$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^{n+1}$  sur un intervalle  $I$  et  $a, b \in I$ .

On a

$$f(b) = f(a) + f'(a)(b-a) + \frac{f''(a)}{2}(b-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(b-a)^n + \int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt.$$

L'inégalité de Taylor-Lagrange qui s'en déduit.

---

**Proposition 10.55**

Soient  $f$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^{n+1}$  sur un intervalle  $I$  et  $a, b \in I$ .

On a

$$\left\| f(b) - f(a) - f'(a)(b-a) - \frac{f''(a)}{2}(b-a)^2 - \cdots - \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(b-a)^n \right\| \leq \frac{|b-a|^{n+1}}{(n+1)!} \sup_{[a,b]} \|f^{(n+1)}\|.$$

Et la formule de Taylor-Young.

---

**Proposition 10.56**

Soit  $f : I \longrightarrow E$  de classe  $\mathcal{C}^n$  sur  $I$ .

Pour tout  $t_0 \in I$ ,  $f$  possède un développement limité en  $t_0$  à l'ordre  $n$  : il existe une fonction  $\varepsilon$  définie sur  $I$  et à valeurs dans  $E$  telle que

$$\begin{cases} \text{pour tout } t \in I, & f(t) = f(t_0) + f'(t_0)(t-t_0) + \frac{f''(t_0)}{2}(t-t_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(t_0)}{n!}(t-t_0)^n + (t-t_0)^n \varepsilon(t) \\ \varepsilon(t) \xrightarrow[t \rightarrow t_0]{} 0 \end{cases}$$

# Chapitre 11

## Suites et séries de fonctions

### Sommaire

---

<b>11.1</b>	<b>Convergence d'une suite de fonctions</b>	<b>. 316</b>
11.1.1	Convergence simple	317
11.1.2	Convergence uniforme	317
<b>11.2</b>	<b>Convergence d'une série de fonctions</b>	<b>. 324</b>
11.2.1	Convergence simple	324
11.2.2	Convergence uniforme	326
11.2.3	Convergence normale	328
<b>11.3</b>	<b>Propriétés de la fonction limite</b>	<b>. 332</b>
11.3.1	Monotonie	332
11.3.2	Continuité	333
11.3.3	Interversion de limite et d'intégrale	341
11.3.4	Interversion de limites	346
11.3.5	Dérivabilité	348
11.3.6	Dérivation à un ordre plus élevé	351
<b>11.4</b>	<b>Généralisation</b>	<b>. 352</b>
11.4.1	Convergence simple	352
11.4.2	Convergence uniforme	352
11.4.3	Convergence normale des séries	353
11.4.4	Résultats préservés	353
<b>11.5</b>	<b>Approximation uniforme</b>	<b>. 353</b>
11.5.1	Densité des fonctions en escaliers dans les fonctions continues par morceaux	353
11.5.2	Densité des polynômes sur un segment dans les fonctions continues	355

---

Dans ce chapitre,  $\mathbb{K}$  désigne  $\mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ . Toutes les fonctions considérées vont de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{K}$  dans un premier temps. Dans un second temps, on généralisera les définitions et résultats à des fonctions de  $E$  dans  $F$ , deux espaces vectoriels normés de dimension finies.

### 11.1 Convergence d'une suite de fonctions

Comme son nom l'indique, une suite de fonctions est une suite  $(f_n)$  où  $f_n$  est une fonction de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{K}$ .

### 11.1.1 Convergence simple

---

#### Définition 11.1

Soient  $A$  une partie de  $\mathbb{R}$  et  $(f_n)$  une suite de fonctions définies sur  $A$ .

On dit que la suite  $(f_n)$  converge simplement sur  $A$  quand pour tout  $x \in A$ , la suite numérique  $(f_n(x))$  converge.

Dans ce cas, on peut définir une fonction  $f$  sur  $A$  en posant pour tout  $x \in A$ ,  $f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x)$ .

La fonction  $f$  est alors appelée limite simple sur  $A$  de la suite  $(f_n)$  et on dit que la suite  $(f_n)$  converge simplement vers  $f$  sur  $A$ .

On observe la définition formelle de la convergence simple sur  $A$  :

$$\forall x \in A, \forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon.$$

Le rang  $n_0$  dépend à la fois de  $x$  et de  $\varepsilon$ .

---

#### Exercice 11.2

Étudiez la convergence simple de la suite de fonctions  $f_n : x \mapsto \frac{ne^{-x} + x^2}{n + x}$ , où  $n > 0$ , sur  $[0 ; +\infty[$ .

---

#### Exercice 11.3

Même question avec la suite de fonctions  $f_n : x \mapsto \frac{x^n}{1 + x^n}$ , où  $n > 0$ , sur  $[0 ; +\infty[$ .

---

#### Exercice 11.4

Même question avec la suite de fonctions  $f_n : x \mapsto n^\alpha x^n (1 - x)$ , où  $n > 0$  et  $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$ , sur  $[0 ; 1]$ .

---

### 11.1.2 Convergence uniforme

---

#### Rappel 11.5

Si  $g$  est une fonction bornée sur une partie  $A$  de  $\mathbb{R}$ , on pose  $\|g\|_\infty^A = \sup_{x \in A} |g(x)|$ .

$\|\cdot\|_\infty^A$  est une norme sur le  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel des fonctions bornées sur  $A$ , appelée norme infinie ou norme uniforme sur  $A$ .

Un résultat essentiel : la majoration de la norme uniforme.



---

**Proposition 11.6**

Soient  $f$  une fonction bornée sur une partie  $A$  de  $\mathbb{R}$  et  $K$  un réel positif.

On a

$$\|f\|_{\infty}^A \leq K \iff \forall x \in A, |f(x)| \leq K.$$

---

**Définition 11.7**

Soient  $A$  une partie de  $\mathbb{R}$ ,  $(f_n)$  une suite de fonctions définies sur  $A$  et  $f$  une fonction définie sur  $A$ .

On dit que la suite  $(f_n)$  converge uniformément vers  $f$  sur  $A$  quand pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , la fonction  $f - f_n$  est bornée sur  $A$  et la suite réelle  $(\|f - f_n\|_{\infty}^A)$  converge vers 0.

La fonction  $f$  est alors appelée limite uniforme sur  $A$  de la suite  $(f_n)$ .

On observe la définition formelle de la convergence uniforme sur  $A$  :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, \forall x \in A, |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon.$$

Le rang  $n_0$  dépend seulement de  $\varepsilon$  mais pas de  $x$  : c'est le même  $n_0$  pour toutes les valeurs de  $x$ , en ce sens, il est uniforme.

Souvent, on ne sait pas calculer les normes uniformes des fonctions  $f_n - f$ . Une simple majoration suffit, qu'on appelle majoration uniforme.

---

**Définition 11.8**

Soient  $A$  une partie de  $\mathbb{R}$  et  $(f_n)$  une suite de fonctions définies sur  $A$ .

On appelle majoration uniforme sur  $A$  toute proposition du type

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in A, |f_n(x)| \leq K_n$$

où  $K_n$  est une constante indépendante de  $x$ .

---

**Exemple 11.9**

► La proposition

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in \mathbb{R}, \left| \frac{\sin(nx)}{n} \right| \leq \frac{1}{n}$$

est une majoration uniforme des fonctions  $x \mapsto \frac{\sin(nx)}{n}$  sur  $\mathbb{R}$ .

► La proposition

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in \mathbb{R}, \left| \frac{\sin(nx)}{n+x^2} \right| \leq \frac{1}{n+x^2}$$

n'est pas une majoration uniforme des fonctions  $x \mapsto \frac{\sin(nx)}{n+x^2}$  sur  $\mathbb{R}$  car le majorant dépend de  $x$ .

---

**Exercice 11.10**

Donnez une majoration uniforme des fonctions  $x \mapsto \frac{\ln(1+nx)}{x}$  sur  $]0; +\infty[$ .

---

*Correction 11.11*

On a

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \forall x \in ]0; +\infty[, \quad 0 \leq \frac{\ln(1+nx)}{x} \leq \frac{nx}{x} = n.$$

---

**Exercice 11.12**

Même exercice avec les fonctions  $x \mapsto \frac{\sin(nx)}{\sin x}$  sur  $]-\pi; \pi[ \setminus \{0\}$ .

---

*Correction 11.13*

Pour  $n \in \mathbb{N}$ , on pose  $f_n : ]-\pi; \pi[ \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{R}$

$$x \longmapsto \frac{\sin(nx)}{\sin x}$$

Soit  $n \in \mathbb{N}$ .

Pour  $x \in \left[\frac{\pi}{6}; \frac{5\pi}{6}\right]$ , on a  $\frac{1}{2} \leq \sin x$  donc

$$|f_n| = \frac{|\sin(nx)|}{\sin x} \leq 2 |\sin x| \leq 2.$$

Pour  $x \in \left]0; \frac{\pi}{6}\right]$ , comme  $\sin$  est concave sur  $\left]0; \frac{\pi}{6}\right]$ , on a  $\frac{3}{\pi}x \leq \sin x$  et donc

$$|f_n(x)| = \frac{|\sin(nx)|}{\sin x} \leq \frac{|\sin(nx)|}{x} \times \frac{\pi}{3} \leq \frac{|nx|}{x} \times \frac{\pi}{3} = \frac{n\pi}{3}.$$

Pour  $x \in \left[\frac{5\pi}{6}; \pi\right]$ , on pose  $t = \pi - x \in \left]0; \frac{\pi}{6}\right]$  et on a

$$\frac{\sin(nx)}{\sin x} = \frac{\sin(n(\pi - t))}{\sin(\pi - t)} = \frac{(-1)^n \sin(-nt)}{\sin t} = \frac{(-1)^{n+1} \sin(nt)}{\sin t}$$

donc

$$|f_n(x)| = \left| \frac{\sin(nt)}{\sin t} \right| \leq \frac{n\pi}{3}.$$

Finalement, pour tout  $x \in ]0; \pi[$ ,  $|f_n(x)| \leq \max\left(2, \frac{n\pi}{3}\right)$ .

De plus,  $|f_n|$  est paire donc ceci reste vrai sur  $]-\pi; 0[$ .

---

**Proposition 11.14**

Avec les mêmes hypothèses, il y a équivalence entre

- (1) la suite  $(f_n)$  converge uniformément vers  $f$  sur  $A$
- (2) il existe une suite positive  $(\alpha_n)$  telle que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $\|f_n - f\|_\infty^A \leq \alpha_n$  et  $\alpha_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$
- (3) il existe une majoration uniforme des fonctions  $f_n - f$  sur  $A$  par les termes d'une suite numérique positive qui converge vers 0, i.e. on a une proposition du type

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in A, |f_n(x) - f(x)| \leq \alpha_n \quad \text{et} \quad \alpha_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

où  $\alpha_n$  ne dépend pas de  $x$ .

---

**Démonstration 11.15**

(1)  $\implies$  (2) : on prend  $\alpha_n = \|f_n - f\|_\infty^A$ .

(2)  $\implies$  (1) : théorème d'encadrement.

(2)  $\iff$  (3) :  $\|f_n - f\|_\infty^A \leq \alpha_n \iff \forall x \in A, |f_n(x) - f(x)| \leq \alpha_n$ . ■

Il y a un lien entre convergence simple et uniforme, dans un seul sens!

---

**Théorème 11.16**

Si une suite  $(f_n)$  converge uniformément vers  $f$  sur  $A$ , alors  $(f_n)$  converge simplement vers  $f$  sur  $A$ .

---

**Démonstration 11.17**

On a  $\forall x \in A, |f_n(x) - f(x)| \leq \|f_n - f\|_\infty^A$ .

Donc si  $(f_n)$  converge uniformément vers  $f$  sur  $A$ ,  $\|f_n - f\|_\infty^A \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ .

Donc  $|f_n(x) - f(x)| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$  par encadrement, i.e.  $f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(x)$  i.e.  $(f_n)$  converge simplement vers  $f$  sur  $A$ . ■

La réciproque est fausse! Contre-exemple : la suite de fonctions  $(x \mapsto x^n)$  sur  $[0 ; 1]$ .

---

**Démonstration 11.18**

On pose  $f_n : x \mapsto x^n$  sur  $[0 ; 1]$ .

$(f_n)$  converge simplement vers  $f : x \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } x \in [0 ; 1[ \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$

On a

$$\|f_n - f\|_\infty^{[0;1]} = \sup_{x \in [0;1]} |x^n - f(x)| = 1 \not\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Donc  $(f_n)$  ne converge pas uniformément sur  $[0 ; 1]$ . ■

Conséquence : pour étudier la convergence uniforme d'une suite de fonctions, on commence par étudier sa convergence simple, car d'abord on détermine sa limite simple  $f$ , puis on cherche à savoir si elle est limite uniforme.

### Exercice 11.19

Étudiez la convergence uniforme de la suite de fonctions  $f_n : x \mapsto \frac{ne^{-x} + x^2}{n+x}$ , où  $n > 0$ , sur  $[0 ; 1]$ .

#### Correction 11.20

Pour tout  $x \in [0 ; 1]$ ,  $f_n(x) = \frac{ne^{-x} + x^2}{n+x} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^{-x}$  donc  $(f_n)$  converge simplement vers  $f : x \mapsto e^{-x}$  sur  $[0 ; 1]$ .

Pour  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $x \in [0 ; 1]$ , on a

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f(x)| &= \left| \frac{ne^{-x} + x^2}{n+x} - e^{-x} \right| \\ &= \left| \frac{x^2 - xe^{-x}}{n+x} \right| \\ &\leq \frac{|x^2| + |xe^{-x}|}{n+x} \\ &= \frac{2}{n}. \end{aligned}$$

Donc  $\|f_n - f\|_{\infty}^{[0;1]} \leq \frac{2}{n}$  et, par encadrement, on a

$$\|f_n - f\|_{\infty}^{[0;1]} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

i.e.  $(f_n)$  converge uniformément vers  $f$  sur  $[0 ; 1]$ .

De même, on peut montrer la convergence uniforme sur  $[0 ; b]$  pour tout  $b > 0$ .

En revanche, il n'y a pas convergence uniforme sur  $[0 ; +\infty[$  car  $\lim_{x \rightarrow +\infty} |f_n(x) - f(x)| = +\infty$  donc  $f_n - f$  n'est pas bornée sur  $[0 ; +\infty[$  donc  $\|f_n - f\|_{\infty}^{[0;+\infty[}$  n'est pas défini.

#### Remarque 11.21

Cet exemple prouve que la convergence uniforme n'est pas préservée par réunion d'intervalles.

### Exercice 11.22

Même question avec la suite de fonctions  $f_n : x \mapsto \frac{x^n}{1+x^n}$ , où  $n > 0$ , sur  $[0 ; +\infty[$ .

Correction 11.23

$(f_n)$  converge simplement vers  $f : x \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } x < 1 \\ 1/2 & \text{si } x = 1 \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$  sur  $[0 ; +\infty[$ .

On a  $f_n - f : x \mapsto \begin{cases} \frac{x^n}{1+x^n} & \text{si } x < 1 \\ 0 & \text{si } x = 1 \\ \frac{-1}{1+x^n} & \text{sinon} \end{cases}$  donc  $|f_n - f| : x \mapsto \begin{cases} \frac{x^n}{1+x^n} & \text{si } x < 1 \\ 0 & \text{si } x = 1 \\ \frac{1}{1+x^n} & \text{sinon} \end{cases}$

On remarque  $\lim_{x \rightarrow 1^+} |f_n(x) - f(x)| = \frac{1}{2}$  donc  $\|f_n - f\|_{\infty}^{[0;+\infty[} \geq \frac{1}{2}$ .

Donc  $(f_n)$  ne converge pas uniformément sur  $[0 ; +\infty[$ .

### Exercice 11.24

Même question avec la suite de fonctions  $f_n : x \mapsto n^\alpha x^n (1-x)$ , où  $n > 0$  et  $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$ , sur  $[0 ; 1]$ .

Correction 11.25

Si  $x < 1$ , alors  $\frac{1}{x} > 1$  et donc  $n^\alpha = o\left(\frac{1}{x^n}\right)$ , donc  $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^\alpha x^n = 0$  et enfin  $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0$ .

Si  $x = 1$ , on a  $f_n(1) = 0 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ .

Donc  $(f_n)$  converge simplement vers la fonction nulle sur  $[0 ; 1]$ .

Comme  $f_n$  est continue sur le compact  $[0 ; 1]$ , on a

$$\|f_n\|_{\infty}^{[0;1]} = \sup_{[0;1]} |f_n| = \sup_{[0;1]} f_n = \max_{[0;1]} f_n.$$

De plus, pour  $x \in [0 ; 1]$ , on a

$$\begin{aligned} f'_n(x) &= n^\alpha (nx^{n-1} - (n+1)x^n) \\ &= n^\alpha x^{n-1} (n - (n+1)x). \end{aligned}$$

On a donc le tableau de variations suivant :

$x$	0	$\frac{n}{n+1}$	1
$f'_n(x)$	0	+	0
$f_n$	0		0

Donc

$$\|f_n\|_{\infty}^{[0;1]} = f_n\left(\frac{n}{n+1}\right) = n^{\alpha} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \left(\frac{1}{n+1}\right).$$

De plus, on a  $\left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \exp\left(n \ln \frac{n}{n+1}\right)$ .

Or

$$n \ln \frac{n}{n+1} = n \ln \frac{1}{1+1/n} = -n \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{-n}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -1.$$

Donc  $\exp\left(n \ln \frac{n}{n+1}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^{-1}$ .

Donc  $\|f_n\|_{\infty}^{[0;1]} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{n^{\alpha-1}}{e}$ .

Donc  $\|f_n\|_{\infty}^{[0;1]} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$  ssi  $\alpha < 1$ .

Enfin,  $(f_n)$  converge uniformément vers la fonction nulle sur  $[0 ; 1]$  ssi  $\alpha < 1$ .

Pour montrer la non-convergence uniforme, on dispose d'un critère simple suffisant dans bien des cas.

---

**Proposition 11.26**

Soit  $(f_n)$  une suite de fonctions qui converge simplement vers  $f$  sur une partie  $A$  de  $\mathbb{R}$ .

S'il existe une suite  $(x_n)$  à termes dans  $A$  telle que la suite  $(f(x_n) - f_n(x_n))$  ne converge pas vers 0, alors la suite  $(f_n)$  ne converge pas uniformément sur  $A$ .

---

*Démonstration 11.27*

On a  $\|f_n - f\|_{\infty}^A \geq |f(x_n) - f_n(x_n)|$ , d'où la proposition. ■

---

**Exercice 11.28**

Montrez que la suite de fonctions  $f_n : x \mapsto x^2 \cos \frac{x}{n}$  converge simplement sur  $\mathbb{R}$  vers une fonction  $f$  à préciser.

Montrez que la convergence n'est pas uniforme sur  $\mathbb{R}$ , mais qu'elle l'est sur tout segment  $[0 ; a]$ .

---

*Correction 11.29*

$(f_n)$  converge simplement vers  $f : x \mapsto x^2$  sur  $\mathbb{R}$ .

On pose  $x_n = n\pi$  et on a

$$f_n(x_n) - f(x_n) = (n\pi)^2 \cos(\pi) - (n\pi)^2 = -2n^2\pi^2 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -\infty.$$

Donc  $(f_n(x_n) - f(x_n))$  ne converge pas vers 0 et donc  $(f_n)$  ne converge pas uniformément vers  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .

Soit  $a > 0$ . Pour  $x \in [0 ; a]$ , on a

$$\begin{aligned} \left| x^2 \cos \frac{x}{n} - x^2 \right| &= \left| x^2 \left( \cos \frac{x}{n} - 1 \right) \right| \\ &= |x^2| \left| \cos \frac{x}{n} - 1 \right| \\ &\leq a^2 \left| \cos \frac{x}{n} - 1 \right|. \end{aligned}$$

Or  $\cos(0) = 1$  et  $|\cos'| = |-\sin| \leq 1$  donc d'après l'inégalité des accroissements finis, on a

$$\left| \cos \frac{x}{n} - \cos(0) \right| \leq 1 \left| \frac{x}{n} - 0 \right|.$$

Donc  $\left| \cos \frac{x}{n} - 1 \right| \leq \frac{x}{n} \leq \frac{a}{n}$  et donc

$$\left| x^2 \cos \frac{x}{n} - x^2 \right| \leq \frac{a^3}{n}.$$

Or  $\frac{a^3}{n} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$  donc  $\|f - f_n\|_{\infty}^{[0;a]} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$ .

Donc  $(f_n)$  converge uniformément vers  $f$  sur  $[0 ; a]$ .

## 11.2 Convergence d'une série de fonctions

### 11.2.1 Convergence simple

---

#### Définition 11.30

Soient  $A$  une partie de  $\mathbb{R}$  et  $(f_n)$  une suite de fonctions définies sur  $A$ .

On dit que la série  $\sum_{n \geq 0} f_n$  converge simplement sur  $A$  quand pour tout  $x \in A$ , la série numérique  $\sum_{n \geq 0} f_n(x)$  converge.

Autrement dit, la série de fonctions  $\sum_{n \geq 0} f_n$  converge simplement sur  $A$  quand la suite des sommes partielles  $\left( \sum_{k=0}^n f_k \right)$  converge simplement sur  $A$ .

Dans ce cas, on peut définir une fonction  $f$  sur  $A$  en posant pour tout  $x \in A$ ,  $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x)$ .

La fonction  $f$  est alors appelée (fonction) somme sur  $A$  de la série  $\sum_{n \geq 0} f_n$ .

---

**Exercice 11.31**

Étudiez la convergence simple de la série de fonctions  $f_n : x \mapsto \frac{nx^2}{n^3 + x^2}$ , où  $n \geq 0$ , sur  $[0 ; +\infty[$ .

---

*Correction 11.32*

On a  $f_n(x) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{x^2}{n^2}$  donc par théorème de comparaison des séries à termes positifs,  $\sum_n f_n(x)$  converge.

Donc  $\sum_n f_n$  converge simplement sur  $[0 ; +\infty[$ .

---

**Exercice 11.33**

Même question avec la série de fonctions  $f_n : x \mapsto \frac{x^n}{1 + x^n}$ , où  $n > 0$ , sur  $[0 ; +\infty[$ .

---

*Correction 11.34*

Si  $x \in [0 ; 1[$ , on a  $f_n(x) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} x^n$  donc par théorème de comparaison des séries à termes positifs,  $\sum_n f_n(x)$  converge et donc  $\sum_n f_n$  converge simplement.

Si  $x = 1$ ,  $\sum_n f_n(x) = \sum_n \frac{1}{2}$  diverge grossièrement.

Si  $x \in [1 ; +\infty[$ ,  $f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$  donc  $\sum_n f_n(x)$  diverge grossièrement.

---

**Exercice 11.35**

Même question avec la série de fonctions  $f_n : x \mapsto \frac{\sin(nx)}{n^3 + x^3}$ , où  $n > 0$ , sur  $[0 ; +\infty[$ .

---

*Correction 11.36*

On a

$$|f_n(x)| = \frac{|\sin(nx)|}{n^3 + x^3} \leq \frac{1}{n^3}$$

donc par théorème de comparaison des séries à termes positifs,  $\sum_n f_n(x)$  converge absolument et donc converge, donc  $\sum_n f_n$  converge simplement.



## 11.2.2 Convergence uniforme

On a la même définition en remplaçant « simple » par « uniforme ».

---

### Définition 11.37

Soient  $A$  une partie de  $\mathbb{R}$  et  $(f_n)$  une suite de fonctions définies sur  $A$ .

On dit que la série  $\sum_{n \geq 0} f_n$  converge uniformément sur  $A$  quand la suite des sommes partielles  $\left(\sum_{k=0}^n f_k\right)$  converge uniformément sur  $A$ .

La fonction somme  $f$  est alors appelée limite uniforme sur  $A$  de la série  $\sum_{n \geq 0} f_n$ .

Encore une fois, il y a un lien entre la convergence simple et uniforme, dans un seul sens !

---

### Théorème 11.38

Si une série de fonctions  $\sum_{n \geq 0} f_n$  converge uniformément sur  $A$ , alors  $\sum_{n \geq 0} f_n$  converge simplement sur  $A$ .

La réciproque est fausse ! Contre-exemple : la série de fonctions  $\sum_{n \geq 0} (x \mapsto x^n)$ .

---

*Démonstration 11.39*

On a  $\sum_{k=0}^n f_k(x) = \frac{1-x^{n+1}}{1-x}$  et  $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x) = \frac{1}{1-x} = f(x)$  donc

$$\sum_{k=0}^n f_k(x) - f(x) = \frac{-x^{n+1}}{1-x}$$

$$\left| \sum_{k=0}^n f_k(x) - f(x) \right| = \frac{x^{n+1}}{1-x}$$

$$\xrightarrow{x \rightarrow 1^-} +\infty.$$

Donc  $\sum_{k=0}^n f_k - f$  n'est pas bornée sur  $[0 ; 1[$ . ■

On peut réécrire la définition à l'aide des restes partiels.

---

**Proposition 11.40**

Soit  $A$  une partie de  $\mathbb{R}$ .

La série  $\sum_{n \geq 0} f_n$  converge uniformément sur  $A$  quand la série  $\sum_{n \geq 0} f_n$  converge simplement sur  $A$  et la suite des restes partiels  $\left( \sum_{k=n+1}^{+\infty} f_k \right)$  converge uniformément vers 0 sur  $A$ , i.e.  $\left\| \sum_{k=n+1}^{+\infty} f_k \right\|_{\infty}^A \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ .

Il suffit donc qu'il existe une suite positive  $(\alpha_n)$  telle que  $\left\| \sum_{k=n+1}^{+\infty} f_k \right\|_{\infty}^A \leq \alpha_n$  et  $\alpha_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$  pour que la série  $\sum_{n \geq 0} f_n$  converge uniformément vers  $f$  sur  $A$ .

Autrement dit, il suffit de trouver une majoration uniforme des restes partiels par les termes d'une suite positive qui converge vers 0.

---

**Exercice 11.41**

Étudiez la convergence uniforme de la série de fonctions  $f_n : x \mapsto \frac{(-1)^n}{x+n}$ , où  $n > 0$ , sur  $[0 ; +\infty[$ .

---

*Correction 11.42*

Pour  $x \in [0 ; +\infty[$ , la suite  $\left( \frac{1}{x+n} \right)_{n \geq 1}$  est positive, décroissante et converge vers 0 donc d'après le critère spécial des séries alternées,  $\sum_n f_n(x)$  converge et donc  $\sum_n f_n$  converge simplement.

Pour  $n \geq 1$ , on a

$$\left| \sum_{k=0}^{+\infty} f_k(x) - \sum_{k=0}^n f_k(x) \right| = \left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} f_k(x) \right| \leq \frac{1}{x+n+1} \leq \frac{1}{n+1}.$$

(Majoration uniforme par une suite convergente vers 0).

---

**Exercice 11.43**

Même question avec la série de fonctions  $f_n : x \mapsto \frac{(-1)^n e^{-nx}}{n}$ , où  $n > 0$ , sur  $[0 ; +\infty[$ .

---

*Correction 11.44*

Idem, pour  $x \in [0 ; +\infty[$ , la suite  $\left( \frac{e^{-nx}}{n} \right)$  est positive, décroissante et converge vers 0 donc d'après le critère spéciale des séries alternées,  $\sum_n f_n(x)$  converge.

De plus, on a

$$\left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(-1)^k e^{-kx}}{k} \right| \leq \frac{e^{-(n+1)x}}{n+1} \leq \frac{1}{n+1}.$$

De manière analogue aux séries numériques, on note le lien entre la convergence uniforme d'une série de fonctions  $\sum_{n \geq 0} u_n$  et la convergence uniforme de la suite  $(u_n)$ .

---

**Proposition 11.45**

Soient  $A$  une partie de  $\mathbb{R}$  et  $(u_n)$  une suite de fonctions définies sur  $A$ .

Si la série  $\sum_{n \geq 0} u_n$  converge uniformément sur  $A$ , alors la suite  $(u_n)$  converge uniformément vers 0.

---

*Démonstration 11.46*

On a  $u_n = \sum_{k=n}^{+\infty} f_k - \sum_{k=n+1}^{+\infty} f_k$  donc

$$\|u_n\|_\infty^A \leq \left\| \sum_{k=n}^{+\infty} f_k \right\|_\infty^A + \left\| \sum_{k=n+1}^{+\infty} f_k \right\|_\infty^A.$$

Donc si  $\sum_n f_n$  converge uniformément sur  $A$ , alors

$$\left\| \sum_{k=n}^{+\infty} f_k \right\|_\infty^A \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Donc, par encadrement,  $\|u_n\|_\infty^A \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$  i.e.  $(u_n)$  converge uniformément vers 0. ■

Évidemment, la réciproque est fausse.

### 11.2.3 Convergence normale

Ce dernier type de convergence est spécifique aux séries de fonctions.

---

**Définition 11.47**

Soient  $A$  une partie de  $\mathbb{R}$  et  $(f_n)$  une suite de fonctions définies sur  $A$ .

On dit que la série  $\sum_{n \geq 0} f_n$  converge normalement sur  $A$  quand la série numérique  $\sum_{n \geq 0} \|f_n\|_\infty^A$  converge.

Souvent, on ne sait pas calculer les normes uniformes des fonctions  $f_n$ . Une simple majoration suffit.

---

**Proposition 11.48**

Avec les mêmes hypothèses, il y a équivalence entre

- ▷ la série  $\sum_{n \geq 0} f_n$  converge normalement sur  $A$
- ▷ il existe une suite positive  $(\alpha_n)$  telle que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $\|f_n\|_\infty^A \leq \alpha_n$  et la série  $\sum_{n \geq 0} \alpha_n$  converge
- ▷ il existe une majoration uniforme des fonctions  $f_n$  sur  $A$  par les termes d'une série positive convergente.

Il y a un lien entre convergence uniforme et normale, dans un seul sens !

---

**Théorème 11.49**

Si une série de fonctions converge normalement sur  $A$ , alors elle converge uniformément sur  $A$ . Elle converge aussi absolument sur  $A$ .

---

*Démonstration 11.50*

Si  $\sum_n f_n$  converge normalement sur  $A$ , alors

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in A, |f_n(x)| \leq \|f_n\|_\infty^A.$$

Or  $\|f_n\|_\infty^A$  est le terme général d'une série convergente donc  $\sum_n f_n(x)$  converge absolument.

Donc  $\sum_n f_n$  converge simplement sur  $A$ .

De plus,

$$\left\| \sum_{k=n+1}^{+\infty} f_k \right\|_\infty^A \leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} \|f_k\|_\infty^A \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

$\left. \begin{array}{c} \text{reste partiel d'une série convergente} \\ \swarrow \end{array} \right\}$

Donc, par encadrement,  $\left\| \sum_{k=n+1}^{+\infty} f_k \right\|_\infty^A \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$  i.e.  $\sum_n f_n$  converge uniformément sur  $A$ . ■

La réciproque est fausse ! Contre-exemple : la série de fonctions  $\sum_{n \geq 2} \left( x \mapsto \frac{x^n}{\ln n} - \frac{x^{n+1}}{\ln(n+1)} \right)$  converge uniformément sur  $[0 ; 1]$  mais pas normalement.

En pratique, il est souvent plus simple de montrer la convergence normale que la convergence uniforme d'une série. On commence donc par étudier la convergence simple, puis la convergence normale et, en cas d'échec, la convergence uniforme.

**Exercice 11.51**

Étudiez la convergence uniforme de la série de fonctions  $f_n : x \mapsto \frac{nx^2}{n^3 + x^2}$ , où  $n > 0$ , sur  $[0 ; +\infty[$ .

*Correction 11.52*

D'après la Correction 11.32,  $\sum_n f_n$  converge simplement sur  $[0 ; +\infty[$ .

$\sum_n \|f_n\|_\infty^{[0;+\infty[}$  converge-t-elle ?

Pour  $n \geq 1$  et  $x \in [0 ; +\infty[$ , on a

$$f'_n(x) = \frac{2nx(n^3 + x^2) - nx^2(2x)}{(n^3 + x^2)^2} = \frac{2n^4x}{(n^3 + x^2)^2}.$$

Donc on a le tableau de variations suivant :

$x$	0	$+\infty$
$f'_n(x)$	0	+
$f_n$	0	$n$

Donc  $\|f_n\|_\infty^{[0;+\infty[} \geq n$  et donc on n'a pas convergence normale sur  $[0 ; +\infty[$ .

Soit  $a > 0$ .  $\sum_n \|f_n\|_\infty^{[0;a]}$  converge-t-elle ?

Pour  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $f_n$  est croissante sur  $[0 ; a]$  donc

$$\|f_n\|_\infty^{[0;a]} = f_n(a) = \frac{na^2}{n^3 + a^2}$$

donc  $\sum_n f_n$  converge normalement sur  $[0 ; a]$  et donc converge uniformément sur  $[0 ; a]$ .

En posant  $R_n(x) = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{kx^2}{k^3 + x^2}$  et  $S_n(x) = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{kx^2}{k^3 + x^2}$ , on a

$$R_n(x) \geq S_n(x).$$

De plus, on a

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{kx^2}{k^3 + x^2} &= \sum_{k=n+1}^{2n} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{kx^2}{k^3 + x^2} \\ &= \sum_{k=n+1}^{2n} k \\ &\geq n^2. \end{aligned}$$

On veut montrer  $\|R_n\|_\infty^{[0;+\infty[} \not\xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$ .

On a  $R_n(x) \geq S_n(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} S_n(x) \geq n^2$  donc il existe  $a_n > 0$  tel que

$$\forall x \in [a_n ; +\infty[ , \quad S_n(x) \geq \frac{n^2}{2}$$

donc

$$\forall x \in [a_n ; +\infty[ , \quad R_n(x) \geq \frac{n^2}{2}$$

donc

$$\|R_n\|_\infty^{[0;+\infty[} \geq \frac{n^2}{2}.$$

Donc la convergence n'est pas uniforme sur  $[0 ; +\infty[$ .

### Exercice 11.53

Même question avec la série de fonctions  $f_n : x \mapsto \frac{x^n}{1+x^n}$ , où  $n > 0$ , sur  $[0 ; +\infty[$ .

#### Correction 11.54

D'après la Correction 11.34,  $\sum_n f_n$  converge simplement sur  $[0 ; 1[$ .

On étudie d'abord la convergence normale de la série  $\sum_n f_n$ .

Pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , on a

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \frac{x^n}{x^n + 1} &= \frac{nx^{n-1}(1+x^n) - x^n(nx^{n-1})}{(1+x^n)^2} \\ &= \frac{nx^{n-1} + nx^{2n-1} - nx^{2n-1}}{(1+x^n)^2} \\ &= \frac{nx^{n-1}}{(1+x^n)^2}. \end{aligned}$$

On a donc le tableau de variations suivant :

$x$	0	1
$f_n$	0	$\frac{1}{2}$

Donc  $\|f_n\|_\infty^{[0;1]} = \frac{1}{2}$ .

Donc  $\sum_n \|f_n\|_\infty^{[0;1]}$  diverge grossièrement.

Donc  $\sum_n f_n$  ne converge pas normalement.

Pour  $a \in [0 ; 1[$ ,  $\|f_n\|_\infty^{[0;a]} = f_n(a)$  et  $\sum_n f_n(a)$  converge donc  $\sum_n f_n$  converge normalement sur  $[0 ; a]$  et donc uniformément sur  $[0 ; a]$ .

---

**Exercice 11.55**

Même question avec la série de fonctions  $f_n : x \mapsto \frac{x^2}{1+n^3x^3}$ , où  $n > 0$ , sur  $[0 ; +\infty[$ .

---

*Correction 11.56*

Si  $x = 0$ ,  $f_n(0) = 0$  donc  $\sum_n f_n(0)$  converge.

Si  $x > 0$ ,  $f_n(x) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n^3x}$  donc par théorème de comparaison des séries à termes positifs,  $\sum_n f_n(x)$  converge.

Donc  $\sum_n f_n$  converge simplement sur  $[0 ; +\infty[$ .

Pour  $x > 0$ ,  $|f_n(x)| = f_n(x) \leq \frac{1}{n^3x}$ .

Si  $a > 0$ , pour tout  $x \in [a ; +\infty[$ , on a  $|f_n(x)| \leq \frac{1}{an^3}$  donc

$$\|f_n\|_\infty^{[a;+\infty[} \leq \frac{1}{an^3}$$

donc  $\sum_n f_n$  converge normalement et donc uniformément sur  $[a ; +\infty[$ .

Pour tout  $x \geq 0$ , on a  $1 \leq 1 + n^3x^3$  donc  $\frac{1}{1+n^3x^3} \leq 1$  donc  $f_n(x) \leq x^2$ .

Donc pour tout  $x \in \left[0 ; \frac{1}{n}\right]$ ,  $0 \leq f_n(x) \leq x^2 \leq \frac{1}{n^2}$ , et pour tout  $x \geq \frac{1}{n}$ , idem.

Donc  $\|f_n\|_\infty^{[0;+\infty[} \leq \frac{1}{n^2}$ .

Donc  $\sum_n f_n$  converge normalement et donc uniformément sur  $[0 ; +\infty[$ .

## 11.3 Propriétés de la fonction limite

### 11.3.1 Monotonie

---

**Proposition 11.57**

Soient  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$  et  $(f_n)$  une suite de fonctions définies sur  $I$ .

Si la suite de fonctions  $(f_n)$  converge simplement vers une fonction  $f$  sur  $I$  et si pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $f_n$  est croissante sur  $I$ , alors  $f$  est croissante sur  $I$ .

---

**Démonstration 11.58**

Si les fonctions  $f_n$  sont croissantes sur  $I$  alors pour tout  $(x, y) \in I^2$  tel que  $x \leq y$ ,

$$\forall n \in \mathbb{N}, f_n(x) \leq f_n(y).$$

Or  $f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(x)$  et  $f_n(y) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(y)$  et, par passage à la limite, on a

$$f(x) \leq f(y).$$

Donc  $f$  est croissante sur  $I$ . ■

On a évidemment le même résultat avec l'hypothèse et la conclusion de décroissance.

### 11.3.2 Continuité

Soit  $(f_n)$  une suite de fonctions qui converge simplement vers  $f$  sur  $A$ .

En général, même si les fonctions  $f_n$  sont des fonctions continues, on ne peut rien affirmer à propos de la continuité de  $f$ . Contre-exemple : la suite de fonctions  $(x \mapsto x^n)$  sur  $[0 ; 1]$ .

Le théorème suivant donne une condition suffisante pour que  $f$  soit continue sur  $A$ .

---

**Théorème 11.59**

Soient  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$  et  $(f_n)$  une suite de fonctions définies sur  $I$ .

Si

- la suite de fonctions  $(f_n)$  converge uniformément vers une fonction  $f$  sur  $I$
- pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $f_n$  est continue sur  $I$

alors  $f$  est continue sur  $I$ .



---

*Démonstration 11.60*

On suppose que  $(f_n)$  converge uniformément vers  $f$  sur  $I$  et que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $f_n$  est continue sur  $I$ .

Soit  $x_0 \in I$ . On veut montrer  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ .

Soit  $\varepsilon > 0$ .

On a  $\|f_n - f\|_\infty^I \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$  donc il existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  tel que

$$\forall n \geq n_0, \|f_n - f\|_\infty^I \leq \varepsilon$$

i.e.

$$\forall n \geq n_0, \forall x \in I, |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon.$$

On choisit un entier  $n \geq n_0$ .

$f_n$  est continue en  $x_0$  donc il existe  $\alpha > 0$  tel que

$$|x - x_0| \leq \alpha \implies |f_n(x) - f_n(x_0)| \leq \varepsilon.$$

Donc

$$\begin{aligned} |f(x) - f(x_0)| &= |f(x) - f_n(x) + f_n(x) - f(x_0)| \\ &= |f(x) - f_n(x) + f_n(x) - f_n(x_0) + f_n(x_0) - f(x_0)| \\ &\leq \underbrace{|f(x) - f_n(x)|}_{\leq \|f_n - f\|_\infty^I \leq \varepsilon} + \underbrace{|f_n(x) - f_n(x_0)|}_{\leq \varepsilon \text{ si } |x - x_0| \leq \alpha} + \underbrace{|f_n(x_0) - f(x_0)|}_{\leq \|f - f_n\|_\infty^I \leq \varepsilon}. \end{aligned}$$

Donc si  $|x - x_0| \leq \alpha$ , alors  $|f(x) - f(x_0)| \leq 3\varepsilon$ .

Donc  $f$  est continue. ■

On en déduit la version correspondante de ce théorème sur les séries de fonctions.

---

**Corollaire 11.61**

Soient  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$  et  $(f_n)$  une suite de fonctions définies sur  $I$ .

Si

- ▷ la série de fonctions  $\sum_{n \geq 0} f_n$  converge uniformément sur  $I$
- ▷ pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $f_n$  est continue sur  $I$

alors  $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$  est continue sur  $I$ .

---

**Exercice 11.62**

Montrez que la fonction  $f : x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\text{Arctan}(nx)}{n^2}$  est définie sur  $\mathbb{R}$  et qu'elle y est continue.

---

*Correction 11.63*

On pose  $f_n : x \mapsto \frac{\text{Arctan}(nx)}{n^2}$  pour  $n \in \mathbb{N}^*$ .

On a  $|\text{Arctan}| \leq \frac{\pi}{2}$  sur  $\mathbb{R}$  donc  $\|f_n\|_{\infty}^{\mathbb{R}} \leq \frac{\pi}{2n^2}$ .

Donc  $\sum_n f_n$  converge normalement sur  $\mathbb{R}$

▷ donc  $\sum_n f_n$  converge simplement et absolument sur  $\mathbb{R}$  :  $f$  est définie sur  $\mathbb{R}$

▷ donc  $\sum_n f_n$  converge uniformément sur  $\mathbb{R}$  et les fonctions  $f_n$  sont continues donc  $f$  est continue sur  $\mathbb{R}$ .

---

**Exercice 11.64**

Même exercice avec  $f : x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{e^{-nx}}{n}$  sur  $\mathbb{R}_+$ .

---

*Correction 11.65*

Pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , on pose  $f_n : x \mapsto (-1)^n \frac{e^{-nx}}{n}$ .

Pour  $x \geq 0$ ,  $\left(\frac{e^{-nx}}{n}\right)_n$  est positive, décroissante et converge vers 0 donc d'après le critère spécial des séries alternées,  $\sum_n f_n(x)$  converge, donc  $\sum_n f_n$  converge simplement et donc  $f$  est définie sur  $\mathbb{R}_+$ .

On a  $\|f_n\|_{\infty}^{[0;+\infty[} = \frac{1}{n}$  donc  $\sum_n f_n$  ne converge pas normalement sur  $[0; +\infty[$ .

D'après le critère spécial des séries alternées, pour  $x \geq 0$  et  $n \in \mathbb{N}^*$ , on a

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} f_k(x) \right| &\leq |f_{n+1}(x)| \\ &= \frac{e^{-(n+1)x}}{n+1} \\ &\leq \frac{1}{n+1}. \end{aligned}$$

Donc  $\left\| \sum_{k=n+1}^{+\infty} f_k \right\|_{\infty}^{[0;+\infty[} \leq \frac{1}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ .

Donc  $\sum_n f_n$  converge uniformément sur  $[0 ; +\infty[$ .

Or les fonctions  $f_n$  sont continues sur  $\mathbb{R}_+$  donc  $f$  est continue sur  $\mathbb{R}_+$ .

### Exercice 11.66

Montrez que la fonction  $f : x \mapsto e^{-x} \sum_{n=1}^{+\infty} \operatorname{Arctan} \left( \frac{e^x}{n^2} \right)$  est bien définie et continue sur  $[0 ; +\infty[$ , que  $f$  est intégrable sur  $[0 ; +\infty[$ , et que  $\int_0^{+\infty} f = \sum_{n=1}^{+\infty} \left( \operatorname{Arctan} \frac{1}{n^2} + \frac{1}{2n^2} \ln(1+n^4) \right)$ .

### Correction 11.67

► Pour  $x \geq 0$ ,  $\frac{e^x}{n^2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$  et  $\operatorname{Arctan} u \underset{u \rightarrow 0}{\sim} u$  donc

$$\operatorname{Arctan} \frac{e^x}{n^2} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{e^x}{n^2}$$

donc, par théorème de comparaison des séries à termes positifs,  $\sum_n \operatorname{Arctan} \frac{e^x}{n^2}$  converge et donc  $f$  est définie sur  $\mathbb{R}_+$ .

De plus,  $\operatorname{Arctan}$  est concave sur  $\mathbb{R}_+$  donc pour tout  $x \in \mathbb{R}_+$ ,  $0 \leq \operatorname{Arctan} x \leq x$  donc

$$\text{pour tout } x \in \mathbb{R}_+, \quad 0 \leq \operatorname{Arctan} \frac{e^x}{n^2} \leq \frac{e^x}{n^2}$$

$$0 \leq e^{-x} \operatorname{Arctan} \frac{e^x}{n^2} \leq \frac{1}{n^2}.$$

On pose  $f_n : x \mapsto e^{-x} \operatorname{Arctan} \frac{e^x}{n^2}$ .

On a montré  $\|f_n\|_{\infty}^{[0;+\infty[} \leq \frac{1}{n^2}$ .

Donc  $\sum_n f_n$  converge normalement et donc uniformément.

Or les fonctions  $f_n$  sont continues donc  $f$  est continue.

► Pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , on a

$$\forall x \in [0 ; +\infty[, \quad |f_n(x)| \leq \frac{\pi}{2} e^{-x}$$

or  $x \mapsto e^{-x}$  est intégrable sur  $[0 ; +\infty[$  donc par comparaison de fonctions positives,  $f_n$  est intégrable sur  $[0 ; +\infty[$ .

Montrons que  $\sum_n \int_0^{+\infty} |f_n|$  converge.

Les fonctions  $f_n$  étant positives, on a  $\int_0^{+\infty} |f_n| = \int_0^{+\infty} f_n$ .

En faisant le changement de variable  $u = e^{-x}$  et en intégrant par parties (sous réserve de convergence), on a

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} e^{-x} \operatorname{Arctan} \left( \frac{e^x}{n^2} \right) dx &= \int_1^{+\infty} \frac{1}{u} \operatorname{Arctan} \left( \frac{u}{n^2} \right) \frac{1}{u} du \\ &= \int_1^{+\infty} \frac{1}{u^2} \operatorname{Arctan} \left( \frac{u}{n^2} \right) du \\ &= \left[ -\frac{1}{t} \operatorname{Arctan} \frac{t}{n^2} \right]_{t=1}^{+\infty} - \int_1^{+\infty} \frac{-1}{t} \times \frac{1}{n^2} \times \frac{1}{1 + (t/n^2)^2} dt. \end{aligned}$$

Or on a  $\left| \frac{-1}{t} \times \frac{1}{1 + (t/n^2)^2} \right| \underset{t \rightarrow +\infty}{\sim} \left| \frac{-n^4}{t^3} \right|$  et  $t \mapsto \frac{1}{t^3}$  est intégrable sur  $[1 ; +\infty[$  donc par comparaison de fonctions positives,  $\int_1^{+\infty} \frac{-1}{t} \times \frac{1}{n^2} \times \frac{1}{1 + (t/n^2)^2} dt$  converge et donc l'intégration par parties est licite.

On a donc

$$\int_0^{+\infty} f_n = \operatorname{Arctan} \frac{1}{n^2} + \frac{1}{n^2} \int_1^{+\infty} \frac{1}{t \left( 1 + (t/n^2)^2 \right)} dt.$$

En décomposant  $\frac{1}{t \left( 1 + (t/n^2)^2 \right)}$  en éléments simples, on obtient

$$\frac{1}{t \left( 1 + (t/n^2)^2 \right)} = \frac{1}{t} + \frac{(-1/n^4) t}{1 + (t/n^2)^2}.$$

Donc

$$\begin{aligned} \int_1^{+\infty} \frac{1}{t \left( 1 + (t/n^2)^2 \right)} dt &= \int_1^{+\infty} \left( \frac{1}{t} - \frac{1}{n^4} \times \frac{t}{1 + (t/n^2)^2} \right) dt \\ &= \left[ \ln t - \frac{1}{2} \ln (t^2 + n^4) \right]_{t=1}^{+\infty} \\ &= \left[ \frac{1}{2} \ln \frac{t^2}{n^4 + t^2} \right]_{t=1}^{+\infty} \\ &= \frac{1}{2} \ln (n^4 + 1). \end{aligned}$$

Finalement, on a

$$\int_0^{+\infty} f_n = \operatorname{Arctan} \frac{1}{n^2} + \frac{1}{2n^2} \ln (1 + n^4).$$

Or on a  $\operatorname{Arctan} \frac{1}{n^2} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n^2}$  donc  $\sum_n \operatorname{Arctan} \frac{1}{n^2}$  converge par théorème de comparaison des séries à termes positifs.

De plus, on a

$$\frac{1}{2n^2} \ln (1 + n^4) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\ln n^4}{2n^2} = \frac{2 \ln n}{n^2} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o \left( \frac{1}{n^{3/2}} \right)$$

donc  $\sum_n \frac{1}{2n^2} \ln (1 + n^4)$  converge.

On a donc  $\sum_n \int_0^{+\infty} |f_n|$  convergente.

Donc, d'après le théorème d'intégration terme à terme,  $f$  est intégrable sur  $[0 ; +\infty[$  et on a

$$\int_0^{+\infty} f = \sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^{+\infty} f_n$$

ce qui conclut.

La continuité étant une propriété locale, il est souvent inutile d'avoir une convergence uniforme globale pour conclure. En général, on peut se contenter de convergence uniforme sur des parties plus petites que  $I$ , en général les segments inclus dans  $I$  ou toute famille recouvrante de parties de  $I$ .

---

**Définition 11.68**

Soit  $I$  un intervalle.

Une famille  $\mathcal{F}$  de parties de  $I$  est dite recouvrante quand  $I = \bigcup_{X \in \mathcal{F}} X$ .

---

**Proposition 11.69**

Soit  $I$  un intervalle.

La famille des segments inclus dans  $I$  est recouvrante :  $I = \bigcup_{(a,b) \in I^2} [a ; b]$ .

On en déduit alors le théorème suivant, dont il vaut mieux, à mon avis, présenter le détail des idées sur chaque exercice.

---

**Théorème 11.70**

Soient  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$ ,  $(f_n)$  une suite de fonctions définies sur  $I$  et  $\mathcal{F}$  une famille d'intervalles recouvrant  $I$ .

Si

- pour toute partie  $X \in \mathcal{F}$ , la suite de fonctions  $(f_n)$  converge uniformément vers une fonction  $f$  sur  $X$
- pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $f_n$  est continue sur  $I$

alors  $f$  est continue sur  $I$ .

En pratique, on choisit pour  $\mathcal{F}$  une famille d'intervalles adaptés au problème (voir les nombreux exemples en exercice).

---

**Exercice 11.71**

Pour  $x > 0$ , on pose  $u_0(x) = x$  et pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+1}(x) = \text{Arctan}(x + u_n(x))$ .

Montrez que la suite  $(u_n(x))$  converge vers un réel  $\varphi(x)$ .

Montrez que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $|u_n(x) - \varphi(x)| \leq \frac{x + \pi/2}{(1+x^2)^n}$ .

Déduisez-en que  $\varphi$  est continue sur  $]0; +\infty[$ .

---

**Correction 11.72**

► Pour  $x > 0$ , on pose  $f_x : t \mapsto \text{Arctan}(x + t)$  et on a

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1}(x) = f_x(u_n(x)) \leq \frac{\pi}{2}.$$

La suite  $(u_n(x))_n$  est majorée par  $\frac{\pi}{2}$  à partir du rang 1 donc par récurrence immédiate,  $(u_n(x))_n$  est à termes positifs.

On veut montrer que l'équation  $f_x(t) = t$  d'inconnue  $t$  a une unique solution.

On pose  $g_x : t \mapsto f_x(t) - t$  et on a

$$\forall t \in \mathbb{R}_+, g'_x(t) = \frac{1}{1+(x+t)^2} - 1 = \frac{-(x+t)^2}{1+(x+t)^2} < 0.$$

On en déduit le tableau de variations suivant :

$t$	0	$\varphi(x)$	$+\infty$
$g_x(t)$	$\text{Arctan } x$	0	$-\infty$

On l'interprète ainsi :  $g_x$  est continue et strictement décroissante sur  $[0; +\infty[$  et change de signe donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique  $t \in [0; +\infty[$  tel que  $g_x(t) = 0$ . On pose  $\varphi(x)$  cette unique solution.

De plus, pour  $t \in \mathbb{R}_+$ , on a

$$0 \leq f'_x(t) \leq \frac{1}{1+x^2} < 1$$

donc d'après l'inégalité des accroissements finis, pour  $(t, t') \in [0; +\infty[$ , on a

$$|f_x(t) - f_x(t')| \leq \frac{1}{1+x^2} |t - t'|$$

et en particulier

$$\begin{aligned} \forall n \in \mathbb{N}, |f_x(u_n(x)) - f_x(\varphi(x))| &\leq \frac{1}{1+x^2} |u_n(x) - \varphi(x)| \\ |u_{n+1}(x) - \varphi(x)| &\leq \frac{1}{1+x^2} |u_n(x) - \varphi(x)|. \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} \forall n \in \mathbb{N}, |f_x(u_n(x)) - f_x(\varphi(x))| &\leq \frac{1}{1+x^2} |u_n(x) - \varphi(x)| \\ |u_{n+1}(x) - \varphi(x)| &\leq \frac{1}{1+x^2} |u_n(x) - \varphi(x)|. \end{aligned}} \right\} \varphi(x) \text{ point fixe}$$

Par récurrence immédiate, on a donc

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad |u_n(x) - \varphi(x)| \leq \left( \frac{1}{1+x^2} \right)^n |u_0(x) - \varphi(x)|.$$

Puis, par théorème d'encadrement, on a

$$u_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \varphi(x).$$

► De plus, on a

$$\begin{aligned} |u_0(x) - \varphi(x)| &\leq |x - \varphi(x)| \\ &\leq |x| + |\varphi(x)| \\ &= x + \varphi(x) \\ &\leq x + \operatorname{Arctan}(x + \varphi(x)) \\ &\leq x + \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

donc

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad |u_n(x) - \varphi(x)| \leq \frac{x + \pi/2}{(1+x^2)^n}.$$

► Pour  $n \in \mathbb{N}$ , on a

$$u_{n+1} = \operatorname{Arctan} \circ (u_n + \operatorname{id})$$

donc, par récurrence immédiate, les fonctions  $u_n$  sont continues sur  $]0; +\infty[$ .

Soit  $(a, b) \in ]0; +\infty[^2$  tel que  $0 < a < b$ .

Pour  $x \in [a; b]$ , on a la majoration uniforme

$$|u_n(x) - \varphi(x)| \leq \frac{b + \pi/2}{(1+a^2)^n}$$

donc

$$\|u_n - \varphi\|_{\infty}^{[a;b]} \leq \frac{b + \pi/2}{(1+a^2)^n}.$$

Or  $\frac{b + \pi/2}{(1+a^2)^n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$  donc  $(u_n)$  converge uniformément vers  $\varphi$  sur  $[a; b]$ .

D'après le Théorème 11.59,  $\varphi$  est donc continue sur  $[a; b]$ .

Enfin,  $\varphi$  est continue sur  $]0; +\infty[ = \bigcup_{0 < a < b} [a; b]$ .

### Exercice 11.73

Montrez que la fonction  $f : x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\ln(1+nx)}{n^2}$  est définie et continue sur  $[0; +\infty[$ .

---

Correction 11.74

► Pour  $x \in [0 ; +\infty[$ , on a

$$0 \leq \frac{\ln(1+nx)}{n^2} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\ln(nx)}{n^2} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{1}{n^{3/2}}\right)$$

donc  $\sum_n \frac{\ln(1+nx)}{n^2}$  converge.

► Soit  $a > 0$ . Pour  $x \in [0 ; a]$ , on a

$$\left| \frac{\ln(1+nx)}{n^2} \right| \leq \frac{\ln(1+na)}{n^2}$$

donc en posant  $f_n : x \mapsto \frac{\ln(1+nx)}{n^2}$ , on a

$$\|f_n\|_{\infty}^{[0;a]} \leq f_n(a).$$

Or  $\sum_n f_n(a)$  converge donc  $\sum_n f_n$  converge normalement et donc uniformément sur  $[0 ; a]$ .

De plus, les fonctions  $f_n$  sont continues donc  $f$  est continue sur  $[0 ; a]$ .

Enfin,  $f$  est continue sur  $[0 ; +\infty[ = \bigcup_{a>0} [0 ; a]$ .

### 11.3.3 Interversion de limite et d'intégrale

Soit  $(f_n)$  une suite de fonctions qui converge simplement vers  $f$  sur un segment  $[a ; b]$ .

En général, même si les fonctions  $f_n$  sont des fonctions continues par morceaux, on ne peut rien affirmer à propos de la continuité par morceaux de  $f$ . Et même si on le peut (*cf.* théorème précédent), il n'y a *a priori* aucun rapport entre  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f_n$  et  $\int_a^b f = \int_a^b \left( \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n \right)$  : on ne peut en général pas intervertir une limite et une intégrale.

---

#### Exercice 11.75

Pour  $n \in \mathbb{N}$  et  $x \in [0 ; 1]$ , on pose  $f_n(x) = n^2 x^n (1-x)$ .

Montrez que la suite de fonctions  $(f_n)$  converge simplement vers une fonction  $f$  et vérifiez que  $\int_0^1 f = \int_0^1 \left( \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n \right) \neq \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f_n$ .

Le théorème suivant donne une condition suffisante pour que cela soit faisable.



---

**Théorème 11.76**

Soient  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$ ,  $(f_n)$  une suite de fonctions définies qui converge simplement vers une fonction  $f$  sur  $I$  et  $a \in I$ .

Si

- ▷ la suite de fonctions  $(f_n)$  converge uniformément vers  $f$  sur tout segment inclus dans  $I$
- ▷ pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $f_n$  est continue sur  $I$

alors  $f$  est continue sur  $I$  et la suite des primitives qui s'annulent en  $a$ , i.e.  $\left(x \mapsto \int_a^x f_n\right)$ , converge uniformément sur tout segment inclus dans  $I$  vers la primitive de  $f$  qui s'annule en  $a$ , i.e.  $x \mapsto \int_a^x f$ .

---

*Démonstration 11.77*

Pour  $n \in \mathbb{N}$ , on pose  $F_n : x \mapsto \int_a^x f_n$  et  $F : x \mapsto \int_a^x f$ .

Soit  $(c, d) \in I^2$  tel que  $c < d$ . On veut montrer

$$\|F_n - F\|_\infty^{[c;d]} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Pour  $x \in [c ; d]$ , on a

$$|F_n(x) - F(x)| = \left| \int_a^x (f_n - f) \right| \leq s_x \int_a^x |f_n(t) - f(t)| dt$$

où  $s_x = 1$  si  $x \geq a$  et  $-1$  sinon.

Si on prend  $x \in [c ; d]$  et  $t$  tel que  $\begin{cases} a \leq t \leq x & \text{si } x \geq a \\ x \leq t \leq a & \text{sinon} \end{cases}$  on a  $\begin{cases} a \leq t \leq d & \text{si } x \geq a \\ c \leq t \leq a & \text{sinon} \end{cases}$  i.e.

$$\underbrace{\min(c, a)}_\alpha \leq t \leq \underbrace{\max(d, a)}_\beta.$$

Donc  $|f_n(t) - f(t)| \leq \|f_n - f\|_\infty^{[\alpha;\beta]}$ .

Donc

$$\begin{aligned} s_x \int_a^x |f_n(t) - f(t)| dt &\leq s_x \int_a^x \|f_n - f\|_\infty^{[\alpha;\beta]} dt \\ &= s_x (x - a) \|f_n - f\|_\infty^{[\alpha;\beta]}. \end{aligned}$$

De plus, comme  $x \in [c ; d]$ , on a  $|x - a| \leq K$  où  $K$  est une constante et donc

$$\begin{aligned} |F_n(x) - F(x)| &\leq |x - a| \|f_n - f\|_\infty^{[\alpha;\beta]} \\ &\leq \underbrace{K \|f_n - f\|_\infty^{[\alpha;\beta]}}_{\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0}. \end{aligned}$$

Donc  $(F_n)$  converge uniformément vers  $F$  sur  $[c ; d]$ . ■

On en déduit les corollaires sur l'interversion de limite et d'intégrale.

---

**Corollaire 11.78**

Soient  $a, b$  deux réels et  $(f_n)$  une suite de fonctions définies sur  $[a ; b]$ .

Si

- la suite de fonctions  $(f_n)$  converge uniformément vers une fonction  $f$  sur  $[a ; b]$
- pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $f_n$  est continue sur  $[a ; b]$

alors  $f$  est continue sur  $[a ; b]$  et

$$\int_a^b f = \int_a^b \left( \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f_n.$$

On rappelle qu'un symbole  $\sum_{+\infty}$  est une limite :  $\sum_{+\infty} = \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum^N$ . On ne peut donc pas intervertir sans précaution un symbole  $\sum_{+\infty}$  et une intégrale.

---

**Corollaire 11.79**

Soient  $a, b$  deux réels et  $(f_n)$  une suite de fonctions définies sur  $[a ; b]$ .

Si

- la série de fonctions  $\sum_{n \geq 0} f_n$  converge uniformément sur  $[a ; b]$
- pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $f_n$  est continue sur  $[a ; b]$

alors  $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$  est continue sur  $[a ; b]$ , la série des intégrales  $\sum_{n \geq 0} \int_a^b f_n$  est convergente et

$$\int_a^b f = \int_a^b \sum_{n=0}^{+\infty} f_n = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_a^b f_n.$$

On appelle aussi ce résultat le théorème d'intégration terme à terme sur un segment.

---

*Remarque 11.80*

Ces deux théorèmes ne sont valables que sur des segments, donc pour de vraies intégrales. Ils sont faux si on se place sur des intervalles autres et donc si on parle d'intégrales généralisées.

---

**Exercice 11.81**

Quelle est la limite de  $\int_0^1 \frac{n \cos x/n}{n + x^n} dx$  quand  $n \rightarrow +\infty$  ?

---

*Correction 11.82*

Pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , on pose  $f_n : x \mapsto \frac{n \cos x/n}{n + x^n}$  continue sur  $[0 ; 1]$ .

Pour  $x \in [0 ; 1]$ , on a  $\cos \frac{x}{n} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 1$  et  $n + x^n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n$  donc

$$f_n(x) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 1$$

i.e. la suite  $(f_n)$  converge simplement vers la fonction constante égale à 1 sur  $[0 ; 1]$ .

De plus, pour  $x \in [0 ; 1]$  et  $n \in \mathbb{N}^*$ , on a

$$|f_n(x)| = \frac{n |\cos x/n|}{n + x^n} \leq \frac{n}{n + x^n} \leq 1.$$

Or la fonction  $x \mapsto 1$  est intégrable sur  $[0 ; 1]$  donc d'après le théorème de convergence dominée, on a

$$\int_0^1 f_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \int_0^1 dt = 1.$$

---

**Exercice 11.83**

Montrez que la fonction  $f : x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n x^{n+1}}{n}$  est définie et continue sur  $[0 ; 1]$ , puis justifiez

$$\int_0^1 f = \frac{-1}{4}.$$

---

*Correction 11.84*

Pour  $x \in [0 ; 1]$ , la suite  $\left(\frac{x^{n+1}}{n}\right)_{n \geq 1}$  est positive, décroissante et converge vers 0 donc d'après le critère spécial des séries alternées, la série  $\sum_n \frac{(-1)^n x^{n+1}}{n}$  converge et donc la fonction  $f$  est définie sur  $[0 ; 1]$ .

Pour  $x \in [0 ; 1]$  et  $n \in \mathbb{N}^*$ , on a

$$\left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(-1)^k x^{k+1}}{k} \right| \leq \left| \frac{(-1)^{n+1} x^{n+2}}{n+1} \right| \leq \frac{1}{n+1}$$

$$\text{donc } \left\| \sum_{k=n+1}^{+\infty} f_k \right\|_{\infty}^{[0;1]} \leq \frac{1}{n+1} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0.$$

Donc  $\sum_n f_n$  converge uniformément sur  $[0 ; 1]$ .

Or les fonctions  $f_n$  sont continues sur  $[0 ; 1]$  donc  $f$  est continue sur  $[0 ; 1]$ .

De plus, d'après le théorème d'intégration terme à terme, on a

$$\begin{aligned} \int_0^1 f &= \sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^1 \frac{(-1)^n x^{n+1}}{n} dx \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n(n+2)} \\ &= s. \end{aligned}$$

La série  $\sum_n \frac{(-1)^n}{n(n+2)}$  est absolument convergente donc la famille  $\left(\frac{(-1)^n}{n(n+2)}\right)_{n \geq 1}$  est sommable.

Donc, d'après le théorème de sommation par paquets, on a

$$\begin{aligned} s &= \sum_{\substack{n=1 \\ n \text{ impair}}}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n(n+2)} + \sum_{\substack{n=1 \\ n \text{ pair}}}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n(n+2)} \\ &= - \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(2k+1)(2k+3)} + \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{2k(2k+2)}. \end{aligned}$$

Or on a

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{2k(2k+2)} &= \frac{1}{4} \sum_{k=1}^{+\infty} \left( \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\ &= \frac{1}{4} \left( 1 - \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{1}{k+1} \right) \quad \left. \vphantom{\sum_{k=1}^{+\infty}} \right\} \text{ série télescopique} \\ &= \frac{1}{4} \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(2k+1)(2k+3)} &= \sum_{k=0}^{+\infty} \left( \frac{1}{2(2k+1)} - \frac{1}{2(2k+3)} \right) \\ &= \frac{1}{2} - \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{1}{2(2k+3)} \quad \left. \vphantom{\sum_{k=0}^{+\infty}} \right\} \text{ série télescopique} \\ &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Enfin, on a bien  $\int_0^1 f = \frac{-1}{4}$ .

### Exercice 11.85

Montrez que  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n2^n} = \int_0^1 \frac{1}{2-x} dx$  et donnez-en une valeur concrète.

### Exercice 11.86

On pose  $f_n : x \mapsto \frac{x^n e^{-x}}{n!}$ .

Montrez que la suite de fonctions  $(f_n)$  converge uniformément sur  $[0 ; +\infty[$ .

Justifiez la convergence des intégrales  $\int_0^{+\infty} f_n$  et déterminez leur limite quand  $n \rightarrow +\infty$ .

### 11.3.4 Intersion de limites

De même, il est faux en général que  $\lim_{x \rightarrow a} \left( \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \lim_{x \rightarrow a} f_n(x) \right)$  : on ne peut en général pas intervertir deux limites.

---

*Exemple 11.87*

On pose, pour tout  $(x, n) \in [0 ; 1[ \times \mathbb{N}$ ,  $u_n(x) = \frac{x + x^n}{1 + nx^n}$ .

D'une part, pour tout  $x \in [0 ; 1[$ ,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n(x) = x$  donc  $\lim_{x \rightarrow 1} \left( \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n(x) \right) = 1$ .

D'autre part, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $\lim_{x \rightarrow 1} u_n(x) = \frac{2}{n+1}$  donc  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \lim_{x \rightarrow 1} u_n(x) \right) = 0$ .

Encore une fois, grâce à la convergence uniforme, c'est possible. Cependant, les résultats sont admis car plus difficiles à montrer : ce sont les théorèmes de double limite.

---

#### Théorème 11.88

Soient  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$ ,  $a$  une extrémité de  $I$  et  $(f_n)$  une suite de fonctions définies sur  $I$ .

Si

- la suite de fonctions  $(f_n)$  converge uniformément vers une fonction  $f$  sur  $I$
- pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $f_n$  a pour limite finie  $\ell_n$  en  $a$

alors la suite  $(\ell_n)$  a une limite finie  $\ell$  et  $f$  a pour limite  $\ell$  en  $a$  :

$$\lim_{x \rightarrow a} \left( \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \lim_{x \rightarrow a} f_n(x) \right) = \ell.$$

On en déduit la version correspondante sur les séries de fonctions.

---

#### Corollaire 11.89

Soient  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$ ,  $a$  une extrémité de  $I$  et  $(f_n)$  une suite de fonctions définies sur  $I$ .

Si

- la série de fonctions  $\sum_{n \geq 0} f_n$  converge uniformément sur  $I$
- pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $f_n$  a pour limite finie  $\ell_n$  en  $a$

alors la série  $\sum_{n \geq 0} \ell_n$  converge et, en notant  $\ell$  la somme de cette série, la fonction  $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$  a pour limite  $\ell$  en  $a$  :

$$\lim_{x \rightarrow a} \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \left( \lim_{x \rightarrow a} f_n(x) \right) = \sum_{n=0}^{+\infty} \ell_n.$$

---

**Exercice 11.90**

Montrez que la fonction  $f : x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n \operatorname{Arctan}(nx)}{n^4}$  est définie et continue sur  $\mathbb{R}$ , puis déterminez la valeur de sa limite en  $+\infty$  (on admettra que  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$ ).

---

*Correction 11.91*

Pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , on pose  $f_n : x \mapsto \frac{(-1)^n \operatorname{Arctan}(nx)}{n^4}$ .

Pour  $x \in \mathbb{R}$  et  $n \in \mathbb{N}^*$ , on a  $|f_n(x)| \leq \frac{\pi}{2n^4}$ .

Donc  $\|f_n\|_{\infty}^{\mathbb{R}} \leq \frac{\pi}{2n^4}$  donc  $\sum_n f_n$  converge normalement sur  $\mathbb{R}$ .

En particulier,  $\sum_n f_n$  converge simplement sur  $\mathbb{R}$  donc  $f$  est définie sur  $\mathbb{R}$ .

De plus,  $\sum_n f_n$  converge uniformément sur  $\mathbb{R}$  et les fonctions  $f_n$  sont continues donc  $f$  est continue sur  $\mathbb{R}$ .

Pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , on a  $f_n(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{(-1)^n \pi/2}{n^4}$  donc d'après le théorème de la double limite, on a

$$f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n \pi/2}{n^4} = \frac{\pi}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^4}.$$

Or la série  $\sum_n \frac{(-1)^n}{n^4}$  converge absolument donc

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^4} &= \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{(2k)^4} - \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(2k+1)^4} \\ &= \frac{1}{16} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^4} - \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(2k+1)^4} \\ &= \frac{\pi^4}{16 \times 90} - \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(2k+1)^4}. \end{aligned}$$

De même, on a  $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^4} = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{(2k)^4} + \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(2k+1)^4}$ .

Or  $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^4} = \frac{\pi^4}{90}$  et  $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{(2k)^4} = \frac{\pi^4}{16 \times 90}$  donc  $\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(2k+1)^4} = \frac{15\pi^4}{16 \times 90}$ .

Donc  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^4} = \frac{-7\pi^4}{720}$ .

Finalement, on a  $\lim_{+\infty} f = \frac{-7\pi^5}{1440}$ .

### 11.3.5 Dérivabilité

La situation est encore plus délicate : une dérivée étant une limite, intervertir une dérivation et une limite est en général impossible.

D'abord, la limite simple d'une suite de fonctions dérivables n'est pas forcément dérivable. Il est raisonnable de se dire que si on remplace la limite simple par une limite uniforme, comme dans les théorèmes précédents, on obtient le résultat.

Et bien non !

On peut montrer qu'il existe des suites de fonctions dérivables qui converge uniformément vers des fonctions non-dérivables (difficilement, car il faut construire des fonctions qui sont continues mais dérivables nulle part).

De même, il existe une suite de fonctions dérivables  $(f_n)$  qui converge uniformément vers une fonction dérivable  $f$ , mais la suite des dérivées  $(f'_n)$  ne converge pas vers la dérivée  $f'$  : par exemple la suite des fonctions  $x \mapsto \frac{\sin(nx)}{n}$  sur  $\left[\frac{\pi}{4}; \frac{3\pi}{4}\right]$ .

Pour obtenir un résultat vraiment utile, il faut supposer plus que dérivable, *i.e.* de classe  $\mathcal{C}^1$ , et imposer la convergence uniforme sur les dérivées.

---

#### **Théorème 11.92**

Soient  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$  et  $(f_n)$  une suite de fonctions définies sur  $I$ .

Si

- ▷ les fonctions  $f_n$  sont de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $I$
- ▷ la suite de fonctions  $(f_n)$  converge simplement sur  $I$
- ▷ la suite des dérivées  $(f'_n)$  converge uniformément sur  $I$

alors  $f = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $I$  et

$$f' = \lim_{n \rightarrow +\infty} f'_n.$$

---

#### *Démonstration 11.93*

La suite  $(f'_n)$  converge uniformément sur  $I$  vers une fonction  $g$ .

Les fonctions  $f'_n$  sont continues car les fonctions  $f_n$  sont de classe  $\mathcal{C}^1$ .

D'après le Théorème 11.76, la suite  $\left(x \mapsto \int_a^x f'_n\right)$  converge uniformément vers  $x \mapsto \int_a^x g$  sur tout segment *i.e.* la suite  $(f_n - f_n(a))$  converge uniformément vers  $x \mapsto \int_a^x g$  sur tout segment.

En notant  $f = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n$ , on obtient

$$f - f(a) = x \mapsto \int_a^x g$$

i.e.

$$\forall x \in I, \quad f(x) = f(a) + \int_a^x g.$$

Donc  $f$  est  $\mathcal{C}^1$  sur  $I$  et  $f' = g$  i.e.  $\left(\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n\right)' = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n'$ . ■

On en déduit la version correspondante sur les séries de fonctions.

### Corollaire 11.94

Soient  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$  et  $(f_n)$  une suite de fonctions définies sur  $I$ .

Si

- ▷ les fonctions  $f_n$  sont de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $I$
- ▷ la série de fonctions  $\sum_{n \geq 0} f_n$  converge simplement sur  $I$
- ▷ la série des dérivées  $\sum_{n \geq 0} f_n'$  converge uniformément sur  $I$

alors  $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $I$  et

$$\left(\sum_{n=0}^{+\infty} f_n\right)' = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n'.$$

On appelle aussi ce résultat le théorème de dérivation terme à terme.

### Exercice 11.95

Montrez que la fonction  $f : x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\ln(1+nx)}{n^2}$  est définie et de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $[1; +\infty[$ . Que vaut  $f'(1)$  ?

### Correction 11.96

- ▷ Pour  $x > 0$ , on a  $\ln(1+nx) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \ln(nx) = \ln n + \ln x \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \ln n$ .

$$\text{Donc } f_n(x) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\ln n}{n^2} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{1}{n^{3/2}}\right).$$

Donc  $\sum_n f_n(x)$  converge absolument.



► Les fonctions  $f_n$  sont  $\mathcal{C}^1$  sur  $[1 ; +\infty[$ .

► Pour  $x \in [1 ; +\infty[$  et  $n \in \mathbb{N}^*$ , on a

$$f'_n(x) = \frac{n}{(1+nx)n^2} = \frac{1}{n(1+nx)}.$$

On a donc  $|f'_n(x)| \leq \frac{1}{n(1+n)}$  et donc  $\sum_n f'_n$  converge normalement et donc uniformément sur  $[1 ; +\infty[$ .

D'après le théorème de dérivation terme à terme,  $f$  est donc  $\mathcal{C}^1$  sur  $[1 ; +\infty[$  et, pour  $x \in [1 ; +\infty[$ , on a

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(1+nx)}.$$

En particulier, on a

$$f'(1) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{+\infty} \left( \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 1.$$

---

#### Remarque 11.97

Là encore, le caractère  $\mathcal{C}^1$  d'une fonction est une propriété locale. Donc tout ce qui a été signalé à propos de la continuité sur des parties d'une famille recouvrante reste valable. En pratique, on choisit des intervalles adaptés au problème.

---

#### Exercice 11.98

Montrez que la fonction de l'exercice précédent est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $]0 ; +\infty[$ .

---

#### Correction 11.99

Soit  $a > 0$ .

Pour  $x \in [a ; +\infty[$ , on a

$$|f'_n(x)| \leq \frac{1}{n(1+na)}.$$

Or  $\frac{1}{n(1+na)} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{an^2}$  donc  $\sum_n \frac{1}{n(1+na)}$  converge.

Donc  $\sum_n f'_n$  converge normalement et donc uniformément sur  $[a ; +\infty[$ .

Donc  $f$  est  $\mathcal{C}^1$  sur  $[a ; +\infty[$ .

Finalement,  $f$  est  $\mathcal{C}^1$  sur  $]0 ; +\infty[ = \bigcup_{a>0} [a ; +\infty[$ .

### 11.3.6 Dérivation à un ordre plus élevé

---

#### Théorème 11.100

Soient  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$ ,  $k \in \mathbb{N}^*$  et  $(f_n)$  une suite de fonctions définies sur  $I$ .

Si

- ▷ les fonctions  $f_n$  sont de classe  $\mathcal{C}^k$  sur  $I$
- ▷ pour tout  $j \in \llbracket 0 ; k-1 \rrbracket$ , la suite de fonctions  $(f_n^{(j)})$  converge simplement sur  $I$
- ▷ la suite des dérivées  $k$ -èmes  $(f_n^{(k)})$  converge uniformément sur  $I$

alors  $f = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n$  est de classe  $\mathcal{C}^k$  sur  $I$  et pour tout  $j \in \llbracket 1 ; k \rrbracket$ ,

$$f^{(j)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n^{(j)}.$$

---

Démonstration 11.101

Par récurrence, en utilisant le Théorème 11.92. ■

On en déduit la version correspondante sur les séries de fonctions.

---

#### Corollaire 11.102

Soient  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$ ,  $k \in \mathbb{N}^*$  et  $(f_n)$  une suite de fonctions définies sur  $I$ .

Si

- ▷ les fonctions  $f_n$  sont de classe  $\mathcal{C}^k$  sur  $I$
- ▷ pour tout  $j \in \llbracket 0 ; k-1 \rrbracket$ , la série de fonctions  $\sum_{n \geq 0} f_n^{(j)}$  converge simplement sur  $I$
- ▷ la série des dérivées  $k$ -èmes  $\sum_{n \geq 0} f_n^{(k)}$  converge uniformément sur  $I$

alors  $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$  est de classe  $\mathcal{C}^k$  sur  $I$  et pour tout  $j \in \llbracket 1 ; k \rrbracket$ ,

$$\left( \sum_{n=0}^{+\infty} f_n \right)^{(j)} = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n^{(j)}.$$

## 11.4 Généralisation

Dans cette section,  $E$  et  $F$  sont deux espaces vectoriels normés de dimension finie et les fonctions considérées vont de  $E$  dans  $F$ .

On étend sans peine les définitions de convergence simple et uniforme. Il suffit de remplacer les valeurs absolues ou modules par les normes.

### 11.4.1 Convergence simple

---

#### Définition 11.103

Soient  $A$  une partie de  $E$  et  $(f_n)$  une suite de fonctions définies sur  $A$ .

On dit que la suite  $(f_n)$  converge simplement sur  $A$  quand pour tout  $x \in A$ , la suite vectorielle  $(f_n(x))$  converge dans  $F$ .

Dans ce cas, on peut définir une fonction  $f$  sur  $A$  en posant pour tout  $x \in A$ ,  $f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x)$ .

La fonction  $f$  est alors appelée limite simple sur  $A$  de la suite  $(f_n)$  et on dit que la suite  $(f_n)$  converge simplement vers  $f$  sur  $A$ .

On adapte de même la définition de convergence simple d'une série de fonctions à valeurs dans  $F$ .

### 11.4.2 Convergence uniforme

---

#### Rappel 11.104

Si  $g$  est une fonction bornée sur une partie  $A$  de  $E$ , on pose  $\|g\|_\infty^A = \sup_{x \in A} \|g(x)\|$ .

$\|\cdot\|_\infty^A$  est une norme sur le  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel des fonctions bornées sur  $A$ , appelée norme infinie ou norme uniforme sur  $A$ .

#### Définition 11.105

Soient  $A$  une partie de  $E$ ,  $(f_n)$  une suite de fonctions définies sur  $A$  et  $f$  une fonction définie sur  $A$ .

On dit que la suite  $(f_n)$  converge uniformément vers  $f$  sur  $A$  quand pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $f - f_n$  est bornée sur  $A$  et la suite réelle  $(\|f - f_n\|_\infty^A)$  converge vers 0.

La fonction  $f$  est alors appelée limite uniforme sur  $A$  de la suite  $(f_n)$ .

On adapte de même la définition de convergence uniforme d'une série de fonctions à valeurs dans  $F$ .

### 11.4.3 Convergence normale des séries

---

#### Définition 11.106

Soient  $A$  une partie de  $E$  et  $(f_n)$  une suite de fonctions définies sur  $A$ .

On dit que la série  $\sum_{n \geq 0} f_n$  converge normalement sur  $A$  quand la série numérique  $\sum_{n \geq 0} \|f_n\|_\infty^A$  converge.

---

#### Théorème 11.107

*Si une série de fonctions converge normalement sur  $A$ , alors elle converge uniformément (et donc simplement) sur  $A$ .*

### 11.4.4 Résultats préservés

Tous les résultats sur la continuité et la double limite restent valables pour des fonctions de  $E$  quand  $F$ .

Tous les résultats sur la primitivation, l'intégration sur des segments, la dérivation  $\mathcal{C}^1$  ou, plus généralement  $\mathcal{C}^k$ , restent valables pour des fonctions de  $\mathbb{R}$  dans  $F$ .

## 11.5 Approximation uniforme

### 11.5.1 Densité des fonctions en escaliers dans les fonctions continues par morceaux

On a déjà rencontré des exemples d'approximation uniforme en première année pour des fonctions à valeurs réelles. En travaillant sur les coordonnées, on peut généraliser ce résultat.

---

#### Théorème 11.108

*Toute fonction continue par morceaux sur un segment est approchable uniformément par des fonctions en escaliers.*

*Soit  $f$  une fonction continue par morceaux sur un segment  $[a ; b]$  et à valeurs dans  $F$ . Il existe une suite de fonctions en escaliers sur  $[a ; b]$  qui converge uniformément vers  $f$  sur  $[a ; b]$ .*

Avec le vocabulaire des espaces vectoriels normés, on peut retraduire ce résultat.

---

#### Proposition 11.109

*Dans l'espace des fonctions bornées  $\mathcal{B}([a ; b], F)$ , muni de la norme infinie, le sous-espace des fonctions en escaliers  $\text{Esc}([a ; b], F)$  est dense dans le sous-espace des fonctions continues par morceaux  $\mathcal{C}_m^0([a ; b], F)$ .*

*Autrement dit*

$$\forall f \in \mathcal{C}_m^0([a ; b], F), \quad \forall \varepsilon > 0, \quad \exists \varphi \in \text{Esc}([a ; b], F), \quad \|f - \varphi\|_\infty^{[a ; b]} \leq \varepsilon.$$

En application, un exercice classique : le lemme de Lebesgue (Centrale - Mines).

### Exercice 11.110

Soit  $f : [a ; b] \longrightarrow \mathbb{K}$  continue par morceaux. Montrez que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) \sin(nt) dt = 0$ .

### Correction 11.111

- Si  $f$  est en escaliers sur  $[a ; b]$ , il existe une subdivision  $a = c_0 < \dots < c_p = b$  du segment  $[a ; b]$  telle que

$$\text{pour tout } i \in \llbracket 0 ; p-1 \rrbracket, \quad f|_{]c_i; c_{i+1}[} = \lambda_i \text{ constante.}$$

Donc on a

$$\begin{aligned} \int_a^b f(t) \sin(nt) dt &= \sum_{i=0}^{p-1} \int_{c_i}^{c_{i+1}} \lambda_i \sin(nt) dt \\ &= \sum_{i=0}^{p-1} \lambda_i \left[ \frac{-\cos(nt)}{n} \right]_{c_i}^{c_{i+1}} \\ &\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0. \end{aligned} \quad \left( \left| \left[ \frac{-\cos(nt)}{n} \right]_{c_i}^{c_{i+1}} \right| \leq \frac{2}{n} \right)$$

- Si  $f$  est continue par morceaux sur  $[a ; b]$  :

Soit  $\varepsilon > 0$ . Il existe  $g$  une fonction en escaliers sur  $[a ; b]$  telle que

$$\|f - g\|_{\infty}^{[a;b]} < \varepsilon.$$

On a  $\int_a^b f(t) \sin(nt) dt = \int_a^b (f(t) - g(t)) \sin(nt) dt + \int_a^b g(t) \sin(nt) dt$  donc

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f(t) \sin(nt) dt \right| &\leq \int_a^b |f(t) - g(t)| dt + \left| \int_a^b g(t) \sin(nt) dt \right| \\ &\leq \varepsilon(b-a) + \left| \int_a^b g(t) \sin(nt) dt \right|. \end{aligned}$$

Or, d'après le cas précédent, on a  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b g(t) \sin(nt) dt = 0$  donc il existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  tel que

$$\forall n \geq n_0, \quad \left| \int_a^b g(t) \sin(nt) dt \right| \leq \varepsilon(b-a).$$

Donc

$$\forall n \geq n_0, \quad \left| \int_a^b f(t) \sin(nt) dt \right| \leq 2\varepsilon(b-a).$$

Donc  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) \sin(nt) dt = 0$ .

## 11.5.2 Densité des polynômes sur un segment dans les fonctions continues

Il s'agit du théorème de Stone-Weierstrass.

---

### Théorème 11.112

*Toute fonction continue sur un segment est approchable uniformément par des fonctions polynômes.*

*Soit  $f$  une fonction continue sur un segment  $[a ; b]$  et à valeurs dans  $\mathbb{K}$ . Il existe une suite de fonctions polynômes sur  $[a ; b]$  qui converge uniformément vers  $f$  sur  $[a ; b]$ .*

Avec le vocabulaire des espaces vectoriels normés, on peut retraduire ce résultat (en identifiant les polynômes et les fonctions polynômes sur un segment, ce qui est loisible car un segment est un ensemble infini).

---

### Proposition 11.113

*Dans l'espace des fonctions bornées  $\mathcal{B}([a ; b], \mathbb{K})$ , muni de la norme infinie, le sous-espace des fonctions polynômes  $\mathcal{P}([a ; b], \mathbb{K}) = \mathbb{K}[X]$  est dense dans le sous-espace des fonctions continues  $\mathcal{C}^0([a ; b], \mathbb{K})$ .*

*Autrement dit*

$$\forall f \in \mathcal{C}^0([a ; b], \mathbb{K}), \forall \varepsilon > 0, \exists P \in \mathbb{K}[X], \|f - P\|_{\infty}^{[a;b]} \leq \varepsilon.$$

En application, un exercice classique (CCP).

---

### Exercice 11.114

Soit  $f : [a ; b] \rightarrow \mathbb{K}$  continue telle que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $\int_a^b t^n f(t) dt = 0$ .

Montrez que  $f = 0$ .

---

### Correction 11.115

On a  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $\int_a^b t^n f(t) dt = 0$  donc par linéarité de l'intégrale, on a

$$\forall P \in \mathbb{K}[X], \int_a^b P(t) f(t) dt = 0.$$

$f$  étant continue sur  $[a ; b]$ , d'après le théorème de Stone-Weierstrass, il existe une suite de polynômes  $(P_k)_k$  qui converge uniformément vers  $f$  sur  $[a ; b]$ .

Donc pour tout  $k \in \mathbb{N}$ ,  $\int_a^b P_k(t) f(t) dt = 0$ .

Pour  $t \in [a ; b]$ , on a

$$\begin{aligned} |P_k(t) f(t) - f^2(t)| &= |f(t)| \times |P_k(t) - f(t)| \\ &\leq \sup_{[a;b]} |f| \times \|P_k - f\|_{\infty}^{[a;b]}. \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\int_a^b} \right\} \text{bornes atteintes}$$

Or  $\|P_k - f\|_\infty^{[a;b]} \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} 0$  donc, par encadrement, on a

$$\|P_k f - f^2\|_\infty^{[a;b]} \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} 0$$

*i.e.* la suite  $(P_k f)_k$  converge uniformément vers  $f^2$  sur  $[a ; b]$ .

Donc, d'après le Corollaire 11.78, on a

$$0 = \int_a^b P_k f \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} \int_a^b f^2.$$

Donc  $\int_a^b f^2 = 0$ , or  $f^2 \geq 0$  et continue donc, d'après le théorème de stricte positivité de l'intégrale,  $f^2 = 0$  sur  $[a ; b]$ .

D'où  $f = 0$ .

# Chapitre 12

## Séries entières

### Sommaire

---

<b>12.1</b>	<b>Convergence simple d'une série entière.</b>	<b>357</b>
12.1.1	Rayon de convergence	357
12.1.2	Détermination du rayon de convergence	359
12.1.3	Comparaison de séries entières	363
12.1.4	Opérations sur les séries entières	366
<b>12.2</b>	<b>Propriétés de la fonction somme d'une série entière.</b>	<b>368</b>
12.2.1	Convergence uniforme et continuité	368
12.2.2	Primitivation et dérivation	369
12.2.3	Convergence radiale	373
<b>12.3</b>	<b>Fonction développable en série entière.</b>	<b>374</b>
12.3.1	Généralités	374
12.3.2	Unicité du développement en série entière	377
12.3.3	Série de Taylor d'une fonction	378
12.3.4	Développements en série entière usuels	381

---

Dans ce chapitre, on s'intéresse aux séries de fonctions de la forme  $x \mapsto a_n x^n$ , qu'on appelle des séries entières.

Par abus de notations, on les note sous la forme  $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ .

Lorsque la variable est complexe, on la note systématiquement  $z$  et on parle des séries  $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ .

## 12.1 Convergence simple d'une série entière

### 12.1.1 Rayon de convergence

On commence par le lemme d'Abel.

---

#### Proposition 12.1

Soient  $(a_n)$  une suite de complexes et  $z_0$  un complexe.



Si la suite  $(a_n z_0^n)$  est bornée, alors pour  $z \in \mathbb{C}$  tel que  $|z| < |z_0|$ , la série numérique  $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$  converge absolument.

---

**Démonstration 12.2**

On suppose que  $(a_n z_0^n)_n$  est bornée et on se donne  $z \in \mathbb{C}$  tel que  $|z| < |z_0|$ .

On a  $a_n z^n = a_n z_0^n \left(\frac{z}{z_0}\right)^n$  et il existe  $M > 0$  tel que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad |a_n z_0^n| \leq M$$

donc

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad |a_n z^n| \leq M \left| \frac{z}{z_0} \right|^n.$$

Or  $\left| \frac{z}{z_0} \right| < 1$  donc  $\sum \left| \frac{z}{z_0} \right|^n$  converge.

Donc, par théorème de comparaison des séries à termes positifs,  $\sum a_n z^n$  converge absolument. ■

---

**Définition 12.3**

Soit  $(a_n)$  une suite de complexes. On pose  $M = \{r \in \mathbb{R}_+ \mid \text{la suite } (a_n r^n) \text{ est bornée}\}$ .

$M$  est une partie non-vide de  $\mathbb{R}$  car elle contient 0.

Si elle est majorée, on appelle rayon de convergence de la série entière  $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$  le réel  $R = \sup M$ .

Sinon, on pose  $R = +\infty$ .

On peut préciser la convergence simple d'une série entière.

---

**Proposition 12.4**

Soit  $(a_n)$  une suite de complexes. On pose  $R$  le rayon de convergence de la série entière  $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ .

Pour tout  $z \in \mathbb{C}$ ,

- ▷ si  $|z| < R$ , alors la série numérique  $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$  converge absolument
- ▷ si  $|z| > R$ , alors la série numérique  $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$  diverge grossièrement
- ▷ si  $|z| = R$ , alors on ne peut rien dire a priori.

---

### Démonstration 12.5

Supposons  $R \in \mathbb{R}_+$ .

- Si  $|z| < R$ , par définition de  $R$ ,  $|z|$  n'est pas un majorant de  $\{r \geq 0 \mid (a_n r^n) \text{ bornée}\}$ .

Donc il existe  $r \geq 0$  tel que  $(a_n r^n)$  est bornée et  $|z| < r$ .

Donc, d'après la Proposition 12.1,  $\sum a_n z^n$  converge (absolument).

Idem si  $R = +\infty$ .

- Si  $|z| > R$  alors  $(a_n z^n)$  n'est pas bornée et ne converge donc pas vers 0, donc  $\sum a_n z^n$  diverge grossièrement. ■

---

### Définition 12.6

Soit  $(a_n)$  une suite de complexes. On pose  $R$  le rayon de convergence de la série entière  $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ .

Si  $R > 0$ , on appelle disque ouvert de convergence l'ensemble  $D(0, R) \subseteq \mathbb{C}$  et intervalle ouvert de convergence l'ensemble  $] -R ; R[ \subseteq \mathbb{R}$ .

---

### Exemple 12.7

- Le rayon de convergence de la série entière  $\sum_{n \geq 0} z^n$  est égal à 1 et pour tout  $z \in D(0, 1)$ ,  $\sum_{n=0}^{+\infty} z^n = \frac{1}{1-z}$ .
- Le rayon de convergence de la série entière  $\sum_{n \geq 0} \frac{z^n}{n!}$  est égal à  $+\infty$  et pour tout  $z \in \mathbb{C}$ ,  $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!} = e^z$ .

## 12.1.2 Détermination du rayon de convergence

La réciproque de la Proposition 12.4 est vraie.

---

### Proposition 12.8

Soient  $(a_n)$  une suite de complexes et  $R$  un réel strictement positif.

Si

- pour tout  $z \in \mathbb{C}$  tel que  $|z| < R$ , la série numérique  $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$  converge
- pour tout  $z \in \mathbb{C}$  tel que  $|z| > R$ , la série numérique  $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$  diverge

alors  $R$  est le rayon de convergence de la série entière  $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ .

---

*Démonstration 12.9*

Soit  $R > 0$  tel que 
$$\begin{cases} \sum a_n z^n \text{ converge} & \text{si } |z| < R \\ \sum a_n z^n \text{ diverge} & \text{si } |z| > R \end{cases}$$

On note  $R_0$  le rayon de convergence de la série entière  $\sum a_n z^n$ .

Si  $|z| < R$ ,  $\sum a_n z^n$  converge donc  $a_n z^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ , donc  $(a_n z^n)$  est bornée, donc  $|z| \in \{r \geq 0 \mid (a_n z^n) \text{ bornée}\}$ , donc  $|z| \leq R_0$ , *i.e.*

$$D(0, R) \subseteq \overline{D}(0, R_0)$$

donc  $R \leq R_0$ .

Réciproquement, si  $R < R_0$ , alors on choisit  $z \in \mathbb{C}$  tel que  $R < |z| < R_0$ .

On a  $|z| < R_0$  donc d'après la Proposition 12.4,  $\sum a_n z^n$  converge.

Or  $R < |z|$  donc  $\sum a_n z^n$  diverge : contradiction.

Donc  $R = R_0$ . ■

De même, on peut donner quelques résultats pratiques découlant de la définition.

---

**Proposition 12.10**

*Soient  $(a_n)$  une suite de complexes et  $R$  un réel strictement positif.*

*Si*

► *pour tout  $z \in \mathbb{C}$  tel que  $|z| < R$ , la série numérique  $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$  converge*

► *il existe  $z_0 \in \mathbb{C}$  tel que  $|z_0| = R$  et la série  $\sum_{n \geq 0} a_n z_0^n$  diverge*

*alors  $R$  est le rayon de convergence de la série entière  $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ .*

---

*Démonstration 12.11*

Soit  $R > 0$  vérifiant les conditions énoncées.

On note  $R_0$  le rayon de convergence de la série entière  $\sum a_n z^n$ .

Si  $|z| < R$ ,  $\sum a_n z^n$  converge donc  $a_n z^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ , donc  $(a_n z^n)$  est bornée, donc  $|z| \in \{r \geq 0 \mid (a_n z^n) \text{ bornée}\}$ , donc  $|z| \leq R_0$ , *i.e.*

$$D(0, R) \subseteq \overline{D}(0, R_0)$$

donc  $R \leq R_0$ .

Réciproquement, si  $R < R_0$ , alors  $R = |z_0| < R_0$ .

On a  $|z_0| < R_0$  donc d'après la Proposition 12.4,  $\sum a_n z_0^n$  converge.

Or  $R = |z_0|$  donc  $\sum a_n z_0^n$  diverge : contradiction.

Donc  $R = R_0$ . ■

---

**Proposition 12.12**

Soient  $(a_n)$  une suite de complexes et  $R$  un réel strictement positif.

Si

► il existe  $z_0 \in \mathbb{C}$  tel que  $|z_0| = R$  et la série  $\sum_{n \geq 0} a_n z_0^n$  converge

► pour tout  $z \in \mathbb{C}$  tel que  $|z| > R$ , la série numérique  $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$  diverge

alors  $R$  est le rayon de convergence de la série entière  $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ .

---

*Démonstration 12.13*

Soit  $R > 0$  vérifiant les conditions énoncées.

On note  $R_0$  le rayon de convergence de la série entière  $\sum a_n z^n$ .

$\sum a_n z_0^n$  converge donc  $a_n z_0^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ , donc  $(a_n z_0^n)$  est bornée, donc

$$\forall z \in \mathbb{C}, |z| < |z_0| = R \implies \sum a_n z^n \text{ converge.}$$

Donc d'après la Proposition 12.8,  $R = R_0$ . ■

---

**Exercice 12.14**

Donnez le rayon de convergence des séries entières suivantes :

$$\sum_{n \geq 0} n z^n \quad \sum_{n \geq 1} \frac{z^n}{n} \quad \sum_{n \geq 0} n! z^n \quad \sum_{n \geq 0} 2^n z^{2n} \quad \sum_{n \geq 0} \cos^2(n) z^n.$$

Correction 12.15

▷  $(a_n) = (n)$

Si  $|z| > 1$ , on a  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $|a_n z^n| \geq n$  donc  $\sum n z^n$  diverge grossièrement.

Si  $|z| < 1$ , comme  $n^3 \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o\left(\left(\frac{1}{|z|}\right)^n\right)$ , on a  $n|z|^n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{1}{n^2}\right)$  donc  $\sum n z^n$  converge absolument par théorème de comparaison des séries à termes positifs.

Ainsi, d'après la Proposition 12.8,  $R = 1$ .

Remarque : si  $|z| = 1$ , de même,  $\sum n z^n$  diverge grossièrement donc

$$\left\{z \in \mathbb{C} \mid \sum n z^n \text{ converge} \right\} = D(0, 1).$$

▷  $(a_n) = \left(\frac{1}{n}\right)$

$\sum \frac{(-1)^n}{n}$  converge par critère spécial des séries alternées et

$$\forall z \in \mathbb{C}, |z| > 1 \implies \left| \frac{z^n}{n} \right| = \frac{|z|^n}{n} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(|z|^n) \underset{n \rightarrow +\infty}{\longrightarrow} +\infty$$

donc  $\sum \frac{z^n}{n}$  diverge.

Ainsi, d'après la Proposition 12.8,  $R = 1$ .

Remarque : on peut montrer que si  $z = e^{i\theta}$  et  $\theta \not\equiv 0 [2\pi]$ , alors  $\sum \frac{e^{in\theta}}{n}$  converge, donc

$$\left\{z \in \mathbb{C} \mid \sum \frac{z^n}{n} \text{ converge} \right\} = \overline{D}(0, 1) \setminus \{1\}.$$

▷  $(a_n) = (n!)$

$\sum n! z^n$  ne converge que si  $z = 0$  car pour tout  $a \in \mathbb{R}_+$ ,  $a^n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(n!)$  donc pour tout  $z \in \mathbb{C}^*$ ,  $|n! z^n| \underset{n \rightarrow +\infty}{\longrightarrow} +\infty$ .

Donc  $R = 0$ .

▷ On a  $\sum 2^n z^{2n} = \sum a_n z^n$  où  $\begin{cases} a_n = 0 & \text{si } n \text{ impair} \\ a_n = 2^{n/2} & \text{sinon} \end{cases}$

On a  $2^n z^{2n} = (2z^2)^n$  or

$$\sum (2z^2)^n \text{ converge} \iff |2z^2| < 1$$

$$\iff |z|^2 < \frac{1}{2}$$

$$\iff |z| < \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Donc  $R = \frac{1}{\sqrt{2}}$ .

Remarque : une telle série entière (où des termes sont nuls) est dite lacunaire.

▷  $(a_n) = (\cos^2 n)$

Pour tout  $z \in D(0, 1)$ ,  $|\cos^2(n) z^n| \leq |z|^n$  donc par théorème de comparaison des séries à termes positifs,  $\sum \cos^2(n) z^n$  converge (absolument).

La suite  $(a_n)$  diverge donc  $\sum a_n$  diverge grossièrement et donc  $\sum a_n z^n$  diverge quand  $z = 1$ .

Donc  $R = 1$ .

### 12.1.3 Comparaison de séries entières

#### Proposition 12.16

Soient  $(a_n), (b_n)$  deux suites de complexes.

On pose  $R_a, R_b$  les rayons de convergence des séries entières  $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$  et  $\sum_{n \geq 0} b_n z^n$ .

Si  $a_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \mathcal{O}(b_n)$ , alors  $R_a \geq R_b$ .

En particulier, si  $|a_n| \leq |b_n|$ , alors  $R_a \geq R_b$ .

Si  $a_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} b_n$ , alors  $R_a = R_b$ .

#### Démonstration 12.17

▷ Si  $a_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \mathcal{O}(b_n)$ , il existe  $K > 0$  et  $n_0 \in \mathbb{N}$  tels que

$$\forall n \geq n_0, |a_n| \leq K |b_n|.$$

Donc  $\forall n \geq n_0, \forall z \in \mathbb{C}, |a_n z^n| \leq K |b_n z^n|$ .

Si  $|z| < R_b$  alors  $\sum |b_n z^n|$  converge, donc par théorème de comparaison des séries à termes positifs,  $\sum |a_n z^n|$  converge, et donc  $|z| < R_a$ .

Donc  $D(0, R_b) \subseteq \overline{D}(0, R_a)$  i.e.  $R_b \leq R_a$ .

▷ Si  $a_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} b_n$ , alors  $a_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \mathcal{O}(b_n)$  et  $b_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \mathcal{O}(a_n)$ .

Donc  $R_a \geq R_b$  et  $R_b \geq R_a$ , i.e.  $R_a = R_b$ . ■

---

*Remarque 12.18*

Comme le rayon de convergence se calcule en référence à la convergence absolue de la série, il suffit que  $|a_n| \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} |b_n|$  pour avoir  $R_a = R_b$ .

---

**Exercice 12.19**

Donnez le rayon de convergence de la série entière  $\sum_{n \geq 0} \frac{n}{n^2 + 1} z^n$ .

---

*Correction 12.20*

On a  $\frac{n}{n^2 + 1} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n}$ , or  $R\left(\sum \frac{z^n}{n}\right) = 1$ .

Donc  $R\left(\sum \frac{n}{n^2 + 1} z^n\right) = 1$ .

---

**Exercice 12.21**

Même question avec la série entière  $\sum_{n \geq 0} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} z^n$ .

---

*Correction 12.22*

On a  $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} = e^{n^2 \ln(1+1/n)}$ .

Or  $\frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$  donc

$$\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

$$n^2 \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{=} n - \frac{1}{2} + o(1)$$

$$\exp\left(n^2 \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} e^n e^{-1/2}$$

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{e^n}{\sqrt{e}}.$$

Donc  $R\left(\sum a_n z^n\right) = R\left(\sum \frac{1}{\sqrt{e}} e^n z^n\right) = \frac{1}{e}$ .

Un cas favorable très courant qui permet de calculer le rayon de convergence par utilisation de la règle de D'Alembert, particulièrement utile quand le coefficient  $a_n$  s'écrit à l'aide de produits ou de quotients.

---

*Rappel 12.23 (Règle de D'Alembert)*

Soit  $(u_n) \in (\mathbb{R}^*)^{\mathbb{N}}$ . On suppose  $\frac{u_{n+1}}{u_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$ .

Si  $\ell < 1$ ,  $\sum u_n$  converge.

Si  $\ell > 1$ ,  $\sum u_n$  diverge grossièrement.

Si  $\ell = 1$ , on ne peut rien dire.

---

**Proposition 12.24**

*Soit  $(a_n)$  une suite de complexes qui ne s'annule pas.*

*Si la suite  $\left(\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}\right)$  converge*

▷ vers un réel  $\ell > 0$ , alors  $R_a = \frac{1}{\ell}$

▷ vers 0, alors  $R_a = +\infty$ .

---

*Démonstration 12.25*

Soit  $z \in \mathbb{C}^*$ .

La suite  $(|a_n z^n|)$  est à termes strictement positifs.

Donc si  $\frac{|a_{n+1} z^{n+1}|}{|a_n z^n|} = \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} |z| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} L < 1$ , alors  $\sum |a_n z^n|$  converge.

De plus, si  $\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} |z| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} L > 1$ , alors  $\sum |a_n z^n|$  diverge grossièrement.

Donc si  $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$ ,  $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| |z| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell |z|$ .

Donc si  $\ell |z| < 1$ ,  $\sum a_n z^n$  converge absolument et  $R = \frac{1}{\ell}$  (Proposition 12.8) et si  $\ell |z| > 1$ ,  $\sum a_n z^n$  diverge. ■

---

**Exercice 12.26**

Donnez le rayon de convergence de la série entière  $\sum_{n \geq 0} \frac{2^n + 1}{n^2 + 1} z^n$ .



On pose  $(a_n) = \left(\frac{2^n + 1}{n^2 + 1}\right)$ .

On a

$$\begin{aligned} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| &= \frac{(2^{n+1} + 1)(n^2 + 1)}{((n+1)^2 + 1)(2^n + 1)} \\ &\underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{2^{n+1}n^2}{(n+1)^2 2^n} \\ &\underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{2n^2}{(n+1)^2} \\ &\xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 2. \end{aligned}$$

Donc, d'après la Proposition 12.24,  $R = \frac{1}{2}$ .

---

### Exercice 12.28

Même question avec la série entière  $\sum_{n \geq 0} \binom{2n}{n} z^{2n}$ .

## 12.1.4 Opérations sur les séries entières

---

### Proposition 12.29

Soient  $(a_n), (b_n)$  deux suites de complexes et  $\lambda \in \mathbb{C}$ .

On pose  $R_a, R_b$  les rayons de convergence des séries entières  $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$  et  $\sum_{n \geq 0} b_n z^n$ .

On a

$$R_{a+b} \geq \min(R_a, R_b)$$

et

$$R_{\lambda a} \geq R_a$$

avec égalité si  $\lambda \neq 0$

---

### Démonstration 12.30

Pour tout  $z \in \mathbb{C}$  tel que  $|z| < \min(R_a, R_b)$ , les séries  $\sum a_n z^n$  et  $\sum b_n z^n$  convergent donc la série  $\sum (a_n + b_n) z^n$  converge.

Donc  $D(0, \min(R_a, R_b)) \subseteq \overline{D}(0, R_{a+b})$  i.e.  $\min(R_a, R_b) \leq R_{a+b}$ .

De même pour la multiplication par un scalaire. ■

Par conséquent, l'ensemble des séries entières qui convergent sur un disque  $D(0, R)$  est un  $\mathbb{C}$ -espace vectoriel.

---

**Proposition 12.31**

Soient  $(a_n), (b_n)$  deux suites de complexes.

On pose  $R_a, R_b$  les rayons de convergence des séries entières  $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$  et  $\sum_{n \geq 0} b_n z^n$ .

On pose  $(c_n)$  le produit de Cauchy des suites  $(a_n)$  et  $(b_n)$ .

Alors la série entière  $\sum_{n \geq 0} c_n z^n$  est le produit de Cauchy des séries  $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$  et  $\sum_{n \geq 0} b_n z^n$  et  $R_c \geq \min(R_a, R_b)$ .

---

*Démonstration 12.32*

$$\text{On a } \sum_{k=0}^n (a_k z^k) (b_{n-k} z^{n-k}) = \left( \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} \right) z^n.$$

Pour tout  $z \in \mathbb{C}$  tel que  $|z| \leq \min(R_a, R_b)$ , les séries  $\sum a_n z^n$  et  $\sum b_n z^n$  convergent absolument donc la série  $\sum c_n z^n$  où  $c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$  converge absolument, i.e.  $R_c \geq \min(R_a, R_b)$ . ■

---

**Exercice 12.33**

Calculez le produit de Cauchy de la série  $\sum_{n \geq 0} z^n$  avec elle-même.

Donnez la valeur de  $\sum_{n=0}^{+\infty} n z^n$  quand elle a un sens.

---

*Correction 12.34*

La série entière  $\sum z^n$  a pour rayon de convergence 1.

Le produit de Cauchy de cette série avec elle-même est la série  $\sum (n+1) z^n$  (car  $\sum_{k=0}^n 1 \times 1 = n+1$ ), qui a aussi pour rayon de convergence 1.

Pour  $z \in D(0, 1)$ , on a  $\sum_{n=0}^{+\infty} (n+1) z^n = \left( \sum_{n=0}^{+\infty} z^n \right)^2$ .

Donc

$$\sum_{n=0}^{+\infty} n z^n = \left( \frac{1}{1-z} \right)^2 - \frac{1}{1-z} = \frac{z}{(1-z)^2}.$$

---

*Remarque 12.35*

Le résultat énoncé ici est utilisable avec des séries  $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$  : on commence à  $n = 0$  !

Dans le cas général, on s'y ramène en ajoutant des termes nuls au début des séries : si on veut faire le produit de Cauchy de deux séries  $\sum_{n \geq n_1} a_n z^n$  et  $\sum_{n \geq n_2} b_n z^n$ , on pose  $a_0 = \dots = a_{n_1-1} = 0$  et  $b_0 = \dots = b_{n_2-1} = 0$ , puis on peut appliquer le résultat précédent : pour tout  $z \in \mathbb{C}$  tel que  $|z| < \min(R_a, R_b)$ ,

$$\sum_{n=n_1}^{+\infty} a_n z^n \times \sum_{n=n_2}^{+\infty} b_n z^n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n \times \sum_{n=0}^{+\infty} b_n z^n = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n z^n$$

où pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \dots + a_{n-1} b_1 + a_n b_0$ .

Maintenant on peut prendre en compte les termes nuls.

Si  $n < n_1 + n_2$ , alors dans cette somme qu'on coupe en deux, tous les termes sont nuls :

$$c_n = \underbrace{a_0 b_n + \dots + a_{n_1-1} b_{n+1-n_1}}_{\forall i \in \llbracket 0; n_1-1 \rrbracket, a_i=0} + \underbrace{a_{n_1} b_{n-n_1} + \dots + a_n b_0}_{\forall i \in \llbracket n_1; n \rrbracket, n-i \leq n-n_1 \text{ donc } b_{n-i}=0} = 0$$

donc  $\sum_{n=n_1}^{+\infty} a_n z^n \times \sum_{n=n_2}^{+\infty} b_n z^n = \sum_{n=n_1+n_2}^{+\infty} c_n z^n$  où pour tout  $n \geq n_1 + n_2$ ,  $c_n = \sum_{k=n_1}^{n-n_2} a_k b_{n-k}$ .

Ne retenons pas ça ! Retenons l'idée et ré-appliquons-la à chaque fois car, en pratique, on a très souvent  $(n_1, n_2) = (1, 0)$  ou  $(1, 1)$ .

## 12.2 Propriétés de la fonction somme d'une série entière

### 12.2.1 Convergence uniforme et continuité

---

#### **Théorème 12.36**

Soit  $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$  une série entière de rayon de convergence  $R > 0$ .

La série de fonctions  $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$  converge normalement (donc uniformément) sur tout compact inclus dans  $D(0, R)$ .

---

#### *Démonstration 12.37*

Soit  $K$  un compact non-vide inclus dans  $D(0, R)$ .

On veut montrer qu'il existe  $r \in [0 ; R[$  tel que  $K \subseteq \overline{D}(0, r) \subseteq D(0, R)$ .

La fonction  $z \mapsto |z|$  étant continue sur le compact  $K$ , d'après le théorème des bornes atteintes, elle possède un maximum  $r$  sur  $K$ .

Il existe donc  $z_0 \in K$  tel que  $r = |z_0|$ .

Or  $K \subseteq D(0, R)$  donc  $|z_0| = r < R$ .

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$  et  $z \in K$ , on a  $|a_n z^n| \leq |a_n| r^n = |a_n z_0^n|$ .

Donc  $\|z \mapsto a_n z^n\|_\infty^K \leq |a_n z_0^n|$ .

Or  $\sum a_n z_0^n$  converge absolument car  $|z_0| < R$ .

Donc, d'après le théorème de comparaison des séries à termes positifs,  $\sum \|z \mapsto a_n z^n\|_\infty^K$  converge, i.e.  $\sum a_n z^n$  converge normalement. ■

D'après le théorème de continuité des séries de fonctions, on en déduit la continuité de la fonction somme.

---

### **Théorème 12.38**

Soit  $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$  une série entière de rayon de convergence  $R > 0$ .

La fonction somme  $z \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$  est continue sur  $D(0, R)$ .

## **12.2.2 Primitivation et dérivation**

---

### **Lemme 12.39**

Soit  $(a_n)$  une suite de complexes.

Les séries entières  $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$  et  $\sum_{n \geq 0} n a_n z^n$  ont le même rayon de convergence.

Plus généralement, pour tout polynôme  $P$  non-nul, la série entière  $\sum_{n \geq 0} P(z) a_n z^n$  a le même rayon de convergence.

---

#### *Démonstration 12.40*

Soit  $\sum a_n z^n$  une série entière de rayon de convergence  $R$ .

On note  $R'$  le rayon de convergence de  $\sum n a_n z^n$ .

- Pour tout  $n \geq 1$ ,  $|a_n z^n| \leq |n a_n z^n|$  donc si  $|z| < R'$ , alors  $\sum n a_n z^n$  converge absolument et donc, par théorème de comparaison des séries à termes positifs,  $\sum a_n z^n$  converge. Donc  $|z| \leq R$ .

Donc  $D(0, R') \subseteq \overline{D}(0, R)$ , et donc  $R' \leq R$ .

► Si  $|z| < R$ , on choisit  $z'$  tel que  $|z| < |z'| < R$ .

On a

$$\begin{aligned} |na_n z^n| &= |na_n z'^n| \times \left| \frac{z}{z'} \right|^n \\ &= |a_n z'^n| \times n \left| \frac{z}{z'} \right|^n. \end{aligned}$$

Or  $\left| \frac{z}{z'} \right| < 1$  donc  $n \left| \frac{z}{z'} \right|^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$  et donc  $\left( n \left| \frac{z}{z'} \right|^n \right)$  est bornée : on choisit  $K$  un majorant.

On a alors  $\forall n \in \mathbb{N}, |na_n z^n| \leq K |a_n z'^n|$ .

Or  $|z'| < R$  donc  $\sum a_n z'^n$  est absolument convergente et donc, par théorème de comparaison des séries à termes positifs,  $\sum na_n z^n$  converge (absolument).

Donc  $|z| \leq R'$ .

Donc  $D(0, R) \subseteq \overline{D}(0, R')$  et donc  $R \leq R'$ .

► D'où  $R = R'$ .

Par récurrence immédiate, pour tout  $k \in \mathbb{N}$ , la série  $\sum n^k a_n z^n$  a pour rayon de convergence  $R$ .

Donc pour tout  $P \in \mathbb{C}[X]$ , comme  $P(n) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \lambda n^k$ , d'après la Proposition 12.16, le rayon de convergence de  $\sum P(n) a_n z^n$  est celui de  $\sum \lambda n^k a_n z^n$  i.e.  $R$ . ■

D'après le théorème de dérivabilité des séries de fonctions, on en déduit la dérivabilité de la fonction somme.

### **Théorème 12.41**

Soit  $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$  une série entière de rayon de convergence  $R > 0$ .

La fonction somme  $f : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$  est de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $] -R ; R[$ .

De plus, on a

$$\forall k \in \mathbb{N}, \forall x \in ] -R ; R[, f^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{+\infty} \frac{n!}{(n-k)!} a_n x^{n-k}.$$

On en déduit que pour tout  $k \in \mathbb{N}$ ,  $a_k = \frac{f^{(k)}(0)}{k!}$ .

---

*Démonstration 12.42*

Pour  $n \in \mathbb{N}$ , on pose  $u_n : x \mapsto a_n x^n$  et  $u_n$  est de classe  $\mathcal{C}^1$ .

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on a  $u'_n(x) = n a_n x^{n-1}$ .

D'après le Lemme 12.39, la série entière  $\sum n a_n x^{n-1}$  a pour rayon de convergence  $R$ .

Donc, pour tout  $r \in [0 ; R[$ , la série  $\sum u'_n$  converge normalement (et donc uniformément) sur  $[-r ; r]$  d'après le Théorème 12.36.

D'après le théorème de dérivation terme à terme, la fonction  $f : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $[-r ; r]$ .

Par réunion d'intervalles,  $f$  est  $\mathcal{C}^1$  sur  $] -R ; R[$  et pour tout  $x \in ] -R ; R[$ , on a  $f'(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} n a_n x^{n-1}$ .

Par récurrence,  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^\infty$  et on a

$$\begin{aligned} f^{(k)}(x) &= \sum_{n=0}^{+\infty} n(n-1)\dots(n-k+1) a_n x^{n-k} \\ &= \sum_{n=k}^{+\infty} \frac{n!}{(n-k)!} a_n x^{n-k}. \end{aligned}$$

En évaluant en 0, on a  $f^{(k)}(0) = \frac{k!}{0!} a_k$  et donc  $a_k = \frac{f^{(k)}(0)}{k!}$ . ■

On en déduit le théorème de primitivation.

---

**Théorème 12.43**

Soit  $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$  une série entière de rayon de convergence  $R > 0$ . On note  $f$  sa somme.

La fonction somme  $x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \frac{x^{n+1}}{n+1}$  est de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $] -R ; R[$  et est une primitive de  $f$  sur  $] -R ; R[$  (c'est d'ailleurs la primitive de  $f$  qui s'annule en 0).

---

**Exercice 12.44**

Donnez le rayon de convergence de la série entière  $\sum_{n \geq 0} n x^n$  et retrouvez la valeur de sa somme.

---

*Correction 12.45*

La série entière  $\sum nx^n$  a pour rayon de convergence 1.

On pose  $g : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} nx^n$ .

Pour  $x \in ]-1 ; 1[$ , on a

$$\begin{aligned} g(x) &= x \sum_{n=0}^{+\infty} nx^{n-1} \\ &= x \frac{d}{dx} \left( \sum_{n=0}^{+\infty} x^n \right) \\ &= x \frac{d}{dx} \left( \frac{1}{1-x} \right) \\ &= \frac{x}{(1-x)^2}. \end{aligned}$$

---

**Exercice 12.46**

Même exercice avec  $\sum_{n \geq 0} n^2 x^n$ .

---

*Correction 12.47*

On reprend la fonction  $g$  de la Correction 12.45.

La série entière  $\sum n^2 x^n$  a pour rayon de convergence 1 et pour  $x \in ]-1 ; 1[$ , on a

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{+\infty} n^2 x^n &= x \sum_{n=0}^{+\infty} n^2 x^{n-1} \\ &= x g'(x) \\ &= x \frac{(1-x)^2 - x(2x-2)}{(1-x)^4} \\ &= x \frac{1-2x+x^2-2x^2+2x}{(1-x)^4} \\ &= \frac{-x(x^2-1)}{(1-x)^4} \\ &= \frac{x(x+1)}{(1-x)^3}. \end{aligned}$$

---

**Exercice 12.48**

Même exercice avec  $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n} x^n$ .

---

*Correction 12.49*

La série entière  $\sum \frac{1}{n} x^n$  a pour rayon de convergence 1.

La fonction  $f : x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n}$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $] -1 ; 1[$  et pour  $x \in ] -1 ; 1[$ , on a

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} x^{n-1} = \frac{1}{1-x}.$$

On remarque  $f(0) = 0$ .

On a donc  $\forall x \in ] -1 ; 1[$ ,  $f(x) = -\ln(1-x)$ .

On pourra retenir :

$$\forall x \in ] -1 ; 1[, \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x).$$

### 12.2.3 Convergence radiale

Il existe plusieurs types de résultats concernant ce qui se passe au bord du disque ouvert de convergence. Le programme ne cite que le théorème de convergence radiale d'Abel.

---

**Théorème 12.50**

Soit  $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$  une série entière de rayon de convergence  $R > 0$ . On note  $f$  sa somme, définie sur  $[0 ; R[$ .

Si la série  $\sum a_n R^n$  converge, alors  $f$  est définie sur  $[0 ; R]$  et est continue à gauche en  $R$ , donc sur  $[0 ; R]$  tout entier :

$$\lim_{x \rightarrow R^-} \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n R^n.$$

La démonstration de ce théorème est hors-programme. Il y a deux cas particuliers faciles à démontrer : si les coefficients  $a_n$  sont tous positifs ou quand la série  $\sum a_n R^n$  converge absolument. Dans le cas général, c'est plus difficile à justifier.



---

*Démonstration 12.51 (Dans le cas où  $\sum a_n R^n$  converge absolument)*  
 Pour  $x \in [0 ; R]$ , on a  $|a_n x^n| \leq |a_n| R^n = |a_n R^n|$ .

Donc  $\|x \mapsto a_n x^n\|_{\infty}^{[0;R]} \leq |a_n R^n|$ .

Par théorème de comparaison des séries à termes positifs,  $\sum (x \mapsto a_n x^n)$  converge normalement et donc uniformément sur  $[0 ; R]$ .

NB : le cas  $(a_n) \geq 0$  est inclus dans celui-ci. ■

---

*Remarque 12.52*

Le théorème reste valable si  $\sum a_n (-R)^n$  converge : dans ce cas,  $f$  est continue sur  $[-R ; 0]$ .

## 12.3 Fonction développable en série entière

### 12.3.1 Généralités

---

#### Définition 12.53

Soient  $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{C}$  et  $r > 0$ .

On dit que  $f$  est développable en série entière sur  $] -r ; r[$  quand il existe une suite complexe  $(a_n)$  telle que la série entière  $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$  soit de rayon de convergence  $R \geq r$  et pour tout  $x \in ] -r ; r[$ ,  $f(x) =$

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n.$$

La somme  $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$  est appelée le développement en série entière de  $f$ .

On dispose d'un théorème d'opérations sur les fonctions développables en série entière.

---

#### Théorème 12.54

Soient  $f, g$  deux fonctions développables en série entière sur  $] -r ; r[$ , où  $r > 0$ .

- ▷ Les fonctions  $f + g$  et  $fg$  sont développables en série entière sur  $] -r ; r[$ .
- ▷ Si  $f(0) = 0$ , alors  $g \circ f$  est développable en série entière sur un intervalle  $] -r' ; r'[$ , où  $r' > 0$ .
- ▷ Si  $f(0) \neq 0$ , alors  $\frac{1}{f}$  est développable en série entière sur un intervalle  $] -r' ; r'[$  où  $r' > 0$ .

---

**Exemple 12.55**

Les fonctions rationnelles qui n'ont pas 0 comme pôle sont développables en série entière.

---

**Correction 12.56 (Prolongement de l'Exercice 12.48)**

On a

$$\forall x \in ]-1 ; 1[ , \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x)$$

donc

$$\forall x \in ]-1 ; 1[ , \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-x)^n}{n} = -\ln(1+x).$$

Donc

$$\forall x \in ]-1 ; 1[ , \quad \ln(1+x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}.$$

Or la série harmonique alternée  $\sum \frac{(-1)^n}{n}$  converge (CSSA) donc d'après le théorème de convergence radiale, la fonction  $x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}$  est continue sur  $]-1 ; 1]$ .

Or  $x \mapsto \ln(1+x)$  est aussi continue sur  $]-1 ; 1]$ .

On a donc ce résultat à connaître :

$$\forall x \in ]-1 ; 1] , \quad \ln(1+x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}.$$

En particulier, on a  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n} = -\ln 2$ .

---

**Exercice 12.57**

Développez en série entière la fonction  $x \mapsto \frac{1}{x^2 - 3x + 2}$  et précisez le rayon de convergence.

---

**Correction 12.58**

En effectuant la décomposition en éléments simples de la fraction  $\frac{1}{X^2 - 3X + 2}$ , on obtient

$$\frac{1}{X^2 - 3X + 2} = \frac{1}{1-X} - \frac{1}{2} \frac{1}{1-X/2}.$$

Sur  $]-1 ; 1[$ , les fonctions  $x \mapsto \frac{1}{1-x}$  et  $x \mapsto \frac{1}{1-x/2}$  sont développables en séries entières :

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n \quad \text{et} \quad \frac{1}{1-x/2} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2^n} x^n.$$

Ainsi, pour  $x \in ]-1 ; 1[$ , on a

$$\frac{1}{x^2 - 3x + 2} = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}}\right) x^n.$$

### Exercice 12.59

Même exercice avec la fonction  $x \mapsto \frac{1}{1+x+x^2}$ .

### Correction 12.60

En effectuant une décomposition en éléments simples, on obtient

$$\frac{1}{1+X+X^2} = \frac{1}{j-j^2} \left( \frac{1}{j^2-X} - \frac{1}{j-X} \right).$$

De plus, on a

$$j - j^2 = j(1-j) = e^{2i\pi/3} (1 - e^{2i\pi/3}) = e^{2i\pi/3} \times e^{i\pi/3} (e^{-i\pi/3} - e^{i\pi/3}) = - (e^{-i\pi/3} - e^{i\pi/3}) = 2i \sin \frac{\pi}{3}.$$

On a donc, pour  $x \in ]-1 ; 1[$  :

$$\begin{aligned} \frac{1}{1+x+x^2} &= \frac{1}{j-j^2} \sum_{n=0}^{+\infty} \left( \frac{1}{j^{2n+2}} - \frac{1}{j^{n+1}} \right) x^n \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n \sin((n+1)\pi/3)}{\sin \pi/3} x^n. \end{aligned}$$

### Exercice 12.61

Même exercice avec la fonction  $f : x \mapsto \ln(1+x+x^2)$ .

### Correction 12.62

En effectuant une décomposition en éléments simples, on obtient

$$\frac{2X+1}{1+X+X^2} = \frac{(2j+1)/(j^2-j)}{j-X} + \frac{(2j+1)/(j-j^2)}{j^2-X}.$$

Pour  $x \in ]-1 ; 1[$ , on a donc

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{j-j^2} \left( \frac{2j^2+1}{j^2} \sum_{n=0}^{+\infty} \left( \frac{x}{j^2} \right)^n - \frac{2j+1}{j} \sum_{n=0}^{+\infty} \left( \frac{x}{j} \right)^n \right) \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \underbrace{\left( \frac{2j^2+1}{1-j} \frac{1}{j^{2n}} + \frac{2j+1}{1-j^2} \frac{1}{j^n} \right)}_{a_n} x^n. \end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1} + f(0) \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}. \end{aligned}$$

Si une fonction  $f$  est développable en série entière sur un intervalle  $]-r ; r[$  (où  $r > 0$ ), alors, d'après ce qui précède,  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $]-r ; r[$  et pour tout  $x \in ]-r ; r[$ ,  $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$ .

La réciproque est fautive : une fonction de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur un intervalle  $]-r ; r[$  n'est pas forcément développable en série entière.

De même, si une fonction est développable en série entière sur un intervalle  $]-r ; r[$  (où  $r > 0$ ), alors elle possède un développement limité à tout ordre en 0, obtenu en tronquant le développement en série entière à l'ordre voulu.

Là encore, la réciproque est fautive.

---

#### Démonstration 12.63

Soient  $f$  une fonction développable en série entière sur  $]-r ; r[$  et  $N \in \mathbb{N}$ .

Montrons que  $f$  admet un développement limité en 0 à l'ordre  $N$ .

Pour  $x \in ]-r ; r[$ , on a

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n \\ &= \sum_{n=0}^N a_n x^n + \sum_{n=N+1}^{+\infty} a_n x^n \\ &= \sum_{n=0}^N a_n x^n + x^N \underbrace{\sum_{n=N+1}^{+\infty} a_n x^{n-N}}_{\xrightarrow{x \rightarrow 0} 0}. \end{aligned}$$

D'où le développement limité. ■

## 12.3.2 Unicité du développement en série entière

---

### Proposition 12.64

Soient  $(a_n)$  une suite de complexes et  $r > 0$ .

Si pour tout  $x \in ]-r ; r[$ ,  $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n = 0$ , alors  $(a_n) = 0$ .

---

Démonstration 12.65

La fonction  $x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$  est nulle donc ses dérivées sont nulles et donc

$$\forall n \in \mathbb{N}, a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!} = 0.$$

■

Le développement en série entière d'une fonction, s'il existe, est unique. Autrement dit, on peut identifier les coefficients de deux développements en série entière égaux.

---

**Corollaire 12.66**

Soient  $(a_n), (b_n)$  deux suites de complexes.

Si les deux séries entières  $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$  et  $\sum_{n \geq 0} b_n z^n$  ont un rayon de convergence au moins égal à  $r > 0$  et si pour tout  $x \in ]-r ; r[$ ,  $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n$ , alors  $(a_n) = (b_n)$ .

---

**Corollaire 12.67**

Soit  $f$  une fonction développable en série entière sur  $]-r ; r[$ , où  $r > 0$ .

Si  $f$  est paire, alors les coefficients d'indices impairs du développement en série entière de  $f$  sont nuls.

Si  $f$  est impaire, alors les coefficients d'indices pairs du développement en série entière de  $f$  sont nuls.

---

**Exercice 12.68**

On admet momentanément que  $f : x \mapsto \sqrt{1+x}$  est développable en série entière sur  $]-1 ; 1[$  et on note alors  $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$  pour  $x \in ]-1 ; 1[$ .

Déterminez une équation différentielle linéaire homogène du premier ordre dont  $f$  est solution.

Déduisez-en que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $a_{n+1} = \frac{2n+1}{2n+2} a_n$ , puis une expression de  $a_n$  en fonction de  $n$ .

### 12.3.3 Série de Taylor d'une fonction

---

**Définition 12.69**

Soient  $r > 0$  et  $f$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $] -r ; r[$ .

On appelle série de Taylor de  $f$  la série  $\sum_{n \geq 0} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$ .

Autrement dit,  $f$  est développable en série entière ssi  $f$  est égale à la somme de sa série de Taylor.

---

**Proposition 12.70**

Soient  $r > 0$  et  $f$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^\infty$  au voisinage de 0.

$f$  est égale à sa série de Taylor sur  $] -r ; r[$  ssi  $\forall x \in ] -r ; r[$ ,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt = 0$ .

La démonstration est élémentaire et repose sur l'égalité de Taylor avec reste intégral.

Comme l'inégalité de Taylor-Lagrange découle de cette égalité, on a une condition suffisante pour qu'une fonction soit développable en série entière.

---

**Proposition 12.71**

Soient  $r > 0$  et  $f$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $] -r ; r[$ .

Si  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{r^n}{n!} \sup_{[-r;r]} |f^{(n)}| = 0$ , alors  $f$  est développable en série entière sur  $] -r ; r[$ .

---

*Démonstration 12.72*

D'après l'inégalité de Taylor-Lagrange, on a

$$\begin{aligned} \left| f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k \right| &\leq \frac{|x-0|^{n+1}}{(n+1)!} \sup_{[-x;x]} |f^{(n+1)}| \\ &\leq \frac{r^{n+1}}{(n+1)!} \sup_{[-r;r]} |f^{(n+1)}|. \end{aligned}$$

Il s'ensuit le résultat énoncé. ■

---

**Exercice 12.73**

Soit  $a \in ]0 ; 1[$ . On pose  $f : x \mapsto (1+x)^a$ .

Montrez que  $f$  est développable en série entière sur  $\left] -\frac{1}{2} ; \frac{1}{2} \right[$ .

*Correction 12.74*

On a  $f(x) = (1+x)^a = e^{a \ln(1+x)}$  et  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $] -1 ; 1[$ .

Pour  $x \in ] -1 ; 1[$ , on a

$$f'(x) = a(1+x)^{a-1} \quad \text{et} \quad f''(x) = a(a-1)(1+x)^{a-2}.$$

Par récurrence immédiate, on a donc

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad f^{(k)}(x) = a(a-1)\dots(a-k+1)(1+x)^{a-k}.$$

Soient  $r \in ]0 ; 1[$  et  $x \in [-r ; r]$ .

$$\text{On a } \left| f^{(n)}(x) \right| \leq |a(a-1)\dots(a-n+1)(1+x)^{a-n}|.$$

Pour  $n > a$ , on a  $a-n < 0$  donc

$$\begin{aligned} 1-r &\leq 1+x \leq 1+r \\ \ln(1-r) &\leq \ln(1+x) \leq \ln(1+r) \\ (a-n)\ln(1+r) &\leq (a-n)\ln(1+x) \leq (a-n)\ln(1-r). \end{aligned}$$

Donc  $(1+x)^{a-n} \leq (1-r)^{a-n}$ .

$$\text{Donc } \sup_{[-r;r]} \left| f^{(n)} \right| \leq K_n (1-r)^{a-n} \text{ où } K_n = |a(a-1)\dots(a-n+1)|.$$

$$\text{Donc } \frac{r^n}{n!} \sup_{[-r;r]} \left| f^{(n)} \right| \leq \frac{K_n}{n!} r^n (1-r)^{a-n}.$$

$$\text{Or } \frac{K_n}{n!} = \frac{|a||1-a|\dots|n-a+1|}{1 \times 2 \times \dots \times n} \text{ donc}$$

$$\begin{aligned} \ln \frac{K_n}{n!} &= \sum_{k=0}^{n-1} \ln |a-k| - \sum_{k=0}^{n-1} \ln(k+1) \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \ln |1+a-(k+1)| - \sum_{k=0}^{n-1} \ln(k+1) \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \ln \left| 1 - \frac{1-a}{k+1} \right| \\ &\leq \sum_{k=0}^{n-1} \frac{|1+a|}{k+1} \\ &= |1+a| \underbrace{\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}}_{\sim \ln n \text{ quand } n \rightarrow +\infty}. \end{aligned}$$

Donc, à partir d'un certain rang,  $\ln \frac{K_n}{n!} \leq 2|1+a| \ln n$ .

Donc

$$\begin{aligned} \frac{r^n}{n!} \sup_{[-r;r]} |f^{(n)}| &\leq \frac{K_n}{n!} r^n (1-r)^{a-n} \\ &\leq Ln (1-r)^a \left(\frac{r}{1-r}\right)^n \end{aligned}$$

où  $L$  est une constante.

Or  $\frac{r}{1-r} < 1$  quand  $r < \frac{1}{2}$ .

Donc si  $r < \frac{1}{2}$ , on a  $n \left(\frac{r}{1-r}\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ .

D'où

$$r < \frac{1}{2} \implies \left[ \forall x \in [-r; r], (1+x)^a = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a(a-1)\dots(a-n+1)}{n!} x^n \right].$$

### 12.3.4 Développements en série entière usuels

Soient  $a$  un réel et  $n$  un entier naturel.

On pose  $\binom{a}{n} = \frac{a(a-1)(a-2)\dots(a-n+1)}{n!}$ .

Les fonctions usuelles suivantes sont développables en série entière avec un rayon de convergence  $R > 0$  :

- ▷  $e^x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} x^n$  avec  $R = +\infty$
- ▷  $\cos x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}$  avec  $R = +\infty$
- ▷  $\sin x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}$  avec  $R = +\infty$
- ▷  $\operatorname{ch} x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n)!} x^{2n}$  avec  $R = +\infty$
- ▷  $\operatorname{sh} x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)!} x^{2n+1}$  avec  $R = +\infty$
- ▷  $\operatorname{Arctan} x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}$  avec  $R = 1$
- ▷  $\ln(1+x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n$  avec  $R = 1$
- ▷  $(1+x)^a = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{a}{n} x^n$  avec  $R = 1$ .



---

**Exercice 12.75**

Développez en série entière la fonction  $x \mapsto \ln \frac{1-x}{1+x}$ .

---

**Exercice 12.76**

Même exercice avec  $x \mapsto (x+2) \operatorname{ch} x$ .

---

**Exercice 12.77**

Même exercice avec  $x \mapsto \sin^2 x$ .

---

**Exercice 12.78**

Même exercice avec  $x \mapsto e^x \ln(1+x)$ .

---

# Chapitre 13

## Probabilités

### Sommaire

---

<b>13.1</b>	<b>Dénombrabilité</b>	<b>.383</b>
13.1.1	Vocabulaire	383
13.1.2	Exemples	383
13.1.3	Quelques propriétés	386
<b>13.2</b>	<b>Espace probabilisé</b>	<b>.387</b>
13.2.1	Univers d'une expérience aléatoire	387
13.2.2	Tribu d'événements	388
13.2.3	Probabilité	389
13.2.4	Propriétés	390
13.2.4.1	Continuité	391
13.2.4.2	Sous-additivité	394
13.2.4.3	Événements négligeables ou presque sûrs	395
13.2.5	Probabilité discrète	396
<b>13.3</b>	<b>Probabilités conditionnelles</b>	<b>.398</b>
13.3.1	Généralités	398
13.3.2	Systèmes complets d'événements	401
13.3.3	Formule des probabilités totales	402
13.3.4	Formule de Bayes	403
<b>13.4</b>	<b>Indépendance</b>	<b>.406</b>
13.4.1	Indépendance de deux événements	406
13.4.2	Indépendance mutuelle	408

---

## 13.1 Dénombrabilité

### 13.1.1 Vocabulaire

---

#### Définition 13.1

On dit qu'un ensemble  $E$  est dénombrable quand il existe une bijection de  $\mathbb{N}$  dans  $E$ .

Dans ce cas, cela signifie qu'on peut numéroté les éléments de  $E$  par les entiers naturels et donc qu'on peut écrire  $E$  en extension sous une forme  $E = \{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$  sans jamais répéter deux fois le même élément : on dit qu'on a énuméré les éléments de  $E$ .

Un ensemble fini est de la forme  $\{x_0, \dots, x_n\}$  : on peut aussi l'écrire sous la forme  $\{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$  en répétant une infinité de fois au moins un élément. C'est pourquoi on voit souvent dans les raisonnements apparaître la locution « ensemble fini ou dénombrable » ou « ensemble au plus dénombrable ».

Évidemment, tout ensemble en bijection avec un ensemble dénombrable est aussi dénombrable, car une composée de bijections est une bijection.

## 13.1.2 Exemples

### Proposition 13.2

- ▷  $\mathbb{N}$ ,  $\mathbb{N}^*$ , plus généralement  $[n_0 ; +\infty[ \cap \mathbb{N}$  (pour tout  $n_0 \in \mathbb{N}$ ), et encore plus généralement toute partie infinie de  $\mathbb{N}$  sont dénombrables.
- ▷  $\mathbb{Z}$  est dénombrable.
- ▷ Pour tout  $p \in \mathbb{N}^*$ ,  $\mathbb{N}^p$  est dénombrable.
- ▷  $\mathbb{Q}$  est dénombrable.
- ▷ Si  $(u_i)_{i \in I}$  est une famille sommable de complexes, alors le support de la famille  $\{i \in I \mid u_i \neq 0\}$  est dénombrable.

### Démonstration 13.3

- ▷ Si  $A$  est une partie infinie de  $\mathbb{N}$ , on construit une énumération de  $A$  par « l'algorithme » suivant :

$$u_0 = \min A \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = \min (A \setminus \{u_0, \dots, u_n\}).$$

- ▷ On peut représenter  $\mathbb{Z}$  de la manière suivante, avec en bas les éléments de  $\mathbb{Z}$  et en haut les étiquettes :

$$\begin{array}{cccccccc} 6 & 4 & 2 & 0 & 1 & 3 & 5 & 7 \\ | & | & | & | & | & | & | & | \\ -3 & -2 & -1 & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \end{array}$$

On en déduit que  $\varphi : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{Z}$  est une bijection de  $\mathbb{N}$  dans  $\mathbb{Z}$  dont la bijection

$$n \longmapsto (-1)^{n+1} \left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor$$

réci-proque est  $\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{N}$

$$p \longmapsto \begin{cases} -2p & \text{si } p \leq 0 \\ 2p-1 & \text{sinon} \end{cases}$$

- ▷ On peut représenter  $\mathbb{N}^2$  de la manière suivante :

4	(0, 4) 14	(1, 4) 19	(2, 4) 25	(3, 4) 32
3	(0, 3) 9	(1, 3) 13	(2, 3) 18	(3, 3) 24
2	(0, 2) 5	(1, 2) 8	(2, 2) 12	(3, 2) 17
1	(0, 1) 2	(1, 1) 4	(2, 1) 7	(3, 1) 11
0	(0, 0) 0	(1, 0) 1	(2, 0) 3	(3, 0) 6
$\begin{array}{l} p \\ \hline n \end{array}$	0	1	2	3

On en déduit que  $\varphi : \mathbb{N}^2 \longrightarrow \mathbb{N}$  est une bijection de  $\mathbb{N}^2$  dans  $\mathbb{N}$   
 $(n, p) \longmapsto \frac{(n+p)(n+p+1)}{2} + p$   
dont la réciproque est définie comme suit.

Pour  $N \in \mathbb{N}$ , on pose  $k = \max \left\{ i \in \mathbb{N} \left| \frac{i(i+1)}{2} \leq N \right. \right\}$  puis  $p = N - k$  et  $n = k - p$ , et enfin  $N \longmapsto (n, p)$ .

Autre bijection possible : on a unicité de la décomposition  $\forall n \geq 1, n = 2^a (2b+1)$  où  $(a, b) \in \mathbb{N}^2$   
i.e.  $\psi : \mathbb{N}^* \longrightarrow \mathbb{N}^2$  est une bijection et donc  $\mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}^2$ .  
 $n \longmapsto (a, b) \qquad n \longmapsto \psi(n+1)$

► Si on considère  $\varphi_2$  une bijection de  $\mathbb{N}^2$  dans  $\mathbb{N}$ ,

$$\begin{array}{ccccccc} \mathbb{N}^3 & \xrightarrow{\sim} & \mathbb{N} \times \mathbb{N}^2 & \xrightarrow{\sim} & \mathbb{N} \times \mathbb{N} & \xrightarrow{\sim} & \mathbb{N} \\ (a, b, c) & \longmapsto & (a, (b, c)) & \longmapsto & (a, \varphi_2(b, c)) & \longmapsto & \varphi_2(a, \varphi_2(b, c)) \end{array}$$

est une bijection de  $\mathbb{N}^3$  dans  $\mathbb{N}$ .

Par récurrence, si  $\varphi_p$  est une bijection de  $\mathbb{N}^p$  dans  $\mathbb{N}$ , alors

$$\begin{array}{ccc} \varphi_{p+1} : & \mathbb{N}^{p+1} & \xrightarrow{\sim} \mathbb{N} \\ & (a_1, \dots, a_{p+1}) & \longmapsto \varphi_2(a_1, \varphi_p(a_2, \dots, a_{p+1})) \end{array}$$

est une bijection de  $\mathbb{N}^{p+1}$  dans  $\mathbb{N}$ .

► Tout  $x \in \mathbb{Q}^*$  s'écrit de façon unique sous forme irréductible  $x = \frac{p}{q}$  où  $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$  tel que  $p \wedge q = 1$ , donc

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^* & \longrightarrow & \mathbb{Q}^* \\ (p, q) & \longmapsto & \frac{p}{q} \end{array}$$

est bijective.

Donc  $\mathbb{Q} \simeq \mathbb{Q}^* \simeq \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^* \simeq \mathbb{N}^2 \simeq \mathbb{N}$  (où  $\simeq$  est la relation d'équipotence).

► Soit  $(u_i)_{i \in I}$  une famille sommable de complexes.

On pose  $S = \text{Supp}(u_i) = \{i \in I \mid u_i \neq 0\}$ .

— Si  $S$  est fini, alors  $S$  est au plus dénombrable.

— Si  $S$  est infini, pour  $k \in \mathbb{N}^*$ , on pose  $S_k = \left\{i \in I \mid |u_i| > \frac{1}{k}\right\}$  et on a  $S = \bigcup_{k \in \mathbb{N}^*} S_k$ .

Montrons que pour tout  $k \in \mathbb{N}^*$ ,  $S_k$  est fini.

Soient  $k \in \mathbb{N}^*$  et  $(i_1, \dots, i_p) \in S_k^p$  distincts.

Pour  $j \in \llbracket 1 ; p \rrbracket$ , on a  $|u_{i_j}| \geq \frac{1}{k}$  donc

$$\sum_{j=1}^p |u_{i_j}| \geq \frac{p}{k}.$$

Or  $(u_i)_{i \in I}$  est sommable donc il existe  $M > 0$  tel que pour tout  $J \in \mathcal{P}_f(I)$ ,  $\sum_{j \in J} |u_j| \leq M$ .

On a donc  $\frac{p}{k} \leq \sum_{j=1}^p |u_{i_j}| \leq M$ , et donc  $p \leq Mk$ .

Si  $S_k$  est infini, on peut choisir  $\lfloor Mk \rfloor + 1$  éléments distincts de  $S_k$  donc  $\lfloor Mk \rfloor + 1 \leq Mk$  d'après ce qui précède : contradiction.

Donc  $S_k$  est fini.

On peut donc numéroter les éléments de  $S_k$  via  $\varphi_k : S_k \longrightarrow \llbracket 0 ; N_k \rrbracket$ .

Pour  $i \in S$ , on pose  $m_i = \min \{k \in \mathbb{N}^* \mid i \in S_k\}$  et à  $i$  on peut associer le couple  $(m_i, \varphi_{m_i}(i))$ .

On construit ainsi une injection de  $S$  dans  $\mathbb{N}^2$ , donc par composition avec une bijection de  $\mathbb{N}^2$  dans  $\mathbb{N}$ , une injection de  $S$  dans  $\mathbb{N}$ , *i.e.*  $S$  est en bijection avec une partie infinie de  $\mathbb{N}$ .

Donc  $S$  est en bijection avec  $\mathbb{N}$ . ■

En revanche, il existe des ensembles infinis non-dénombrables, comme  $\mathbb{R}$  ou tout intervalle de longueur non-nulle. Un ensemble non-dénombrable est trop gros pour qu'on puisse ordonner ses éléments et les numéroter.

---

*Démonstration 13.4 ( $\mathbb{R}$  n'est pas dénombrable)*

Tout réel  $x$  peut s'écrire de manière unique sous la forme

$$x = p + \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{c_k}{10^k}$$

où  $p = \lfloor x \rfloor \in \mathbb{Z}$  et  $(c_k) \in \llbracket 0 ; 9 \rrbracket^{\mathbb{N}}$  n'est pas stationnaire en 9. On peut écrire  $x = p, c_1 c_2 \dots c_n \dots$

Par l'absurde, si  $[0 ; 1[$  est dénombrable, on peut numéroter les réels de  $[0 ; 1[ : x_0, x_1, \dots, x_n, \dots$

On a

$$x_0 = 0, c_{0,1}c_{0,2}c_{0,3} \dots$$

$$x_1 = 0, c_{1,1}c_{1,2}c_{1,3} \dots$$

$$\vdots$$

$$x_n = 0, c_{n,1}c_{n,2}c_{n,3} \dots c_{n,n+1}$$

$$\vdots$$

On choisit  $d_1 \in \llbracket 0 ; 8 \rrbracket$  tel que  $d_1 \neq c_{0,1}$ ,  $d_2 \in \llbracket 0 ; 8 \rrbracket$  tel que  $d_2 \neq c_{1,2}$ , etc.,  $d_n \in \llbracket 0 ; 8 \rrbracket$  tel que  $d_n \neq c_{n,n+1}$  puis on pose

$$y = 0, d_1 d_2 \dots d_n \dots = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{d_k}{10^k}.$$

Donc  $y \in [0 ; 1[$ .

Or, par construction,  $y \notin \{x_0, \dots, x_n, \dots\} = [0 ; 1[$  : contradiction. ■

### 13.1.3 Quelques propriétés

---

#### Proposition 13.5

*Toute partie infinie d'un ensemble dénombrable est dénombrable.*

*Si  $E$  est dénombrable, alors pour toute injection de  $F$  dans  $E$ ,  $F$  est au plus dénombrable.*

Pourvu qu'on ne considère pas trop d'ensembles, les réunions d'ensembles dénombrables le sont aussi.

---

#### Proposition 13.6

*Si  $E_1, \dots, E_n$  sont (au plus) dénombrables, alors  $E_1 \cup \dots \cup E_n$  l'est aussi.*

*Si  $(E_i)_{i \in I}$  est une famille (au plus) dénombrable d'ensembles (au plus) dénombrables, alors  $\bigcup_{i \in I} E_i$  l'est aussi.*

En revanche, pour les produits cartésiens, il faut se contenter d'un nombre fini d'ensembles.

---

#### Proposition 13.7

*Si  $E_1, \dots, E_n$  sont dénombrables, alors  $E_1 \times \dots \times E_n$  est dénombrable.*

En revanche, un produit cartésien quelconque d'ensembles dénombrables ne l'est pas en général : par exemple,  $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$  n'est pas dénombrable.

## 13.2 Espace probabilisé

### 13.2.1 Univers d'une expérience aléatoire

Une expérience aléatoire est une expérience dont on connaît les résultats possibles (les issues possibles) mais dont on ne peut pas connaître à l'avance le résultat. On modélise l'expérience par la donnée de l'ensemble  $\Omega$  des issues possibles.

---

**Définition 13.8**

L'ensemble des issues possibles est appelé univers des possibles (ou univers). Il est souvent noté  $\Omega$ .

---

*Exemple 13.9*

- ▶ On jette un dé non-truqué : les issues possibles sont les six entiers  $1, \dots, 6$  ; l'univers est donc  $\Omega = \{1, \dots, 6\}$ .
- ▶ On jette  $n$  fois un dé : les issues possibles sont les suites de  $n$  entiers de l'ensemble  $\{1, \dots, 6\}$  ; donc  $\Omega = \llbracket 1 ; 6 \rrbracket^n$ .
- ▶ On lance une pièce une infinité de fois : les issues possibles sont les suites infinies de 0 ou 1 ; donc  $\Omega = \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ .

### 13.2.2 Tribu d'événements

De manière informelle, un événement est une partie de l'univers  $\Omega$ . Mais cette définition est trop vague. Si on autorise toutes les parties de l'univers à être des événements, alors quand l'ensemble  $\Omega$  est infini non-dénombrable, les seules probabilités sur  $\Omega$  sont des probabilités discrètes (théorème d'Ulam), ce qui exclut tout un tas de probabilités intéressantes. Donc on doit en général restreindre la notion d'événement à certaines parties de  $\Omega$  : certaines parties n'ont donc pas le droit d'être nommées « événement ».

---

**Définition 13.10**

Soit  $\Omega$  un univers.

On appelle tribu sur  $\Omega$  une partie  $\mathcal{T}$  de  $\mathcal{P}(\Omega)$  telle que :

- ▶  $\Omega \in \mathcal{T}$
- ▶ pour tout  $A \in \mathcal{T}$ ,  $\bar{A} \in \mathcal{T}$
- ▶ pour toute suite  $(A_n) \in \mathcal{T}^{\mathbb{N}}$ ,  $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{T}$ .

Modéliser une expérience aléatoire, c'est choisir l'univers et une tribu : les éléments de la tribu sont appelés les événements. On dit qu'un événement est réalisé quand l'issue de l'expérience aléatoire appartient à cet événement. Le couple  $(\Omega, \mathcal{T})$  est appelé espace probabilisable.

---

*Exemple 13.11*

- ▶ L'ensemble  $\{\emptyset, \Omega\}$  est une tribu, c'est la plus petite tribu envisageable. Elle est inutilisable en pratique car elle ne comporte pas assez d'événements pour décrire des situations issues de la vie réelle.
- ▶ L'ensemble  $\mathcal{P}(\Omega)$  est une tribu : quand l'univers  $\Omega$  est fini ou dénombrable, c'est la tribu utilisée systématiquement, mais quand  $\Omega$  est infini non-dénombrable, c'est une tribu trop grosse pour pouvoir y définir une probabilité vraiment utile.
- ▶ En école d'ingénieur, vous entendrez parler de la tribu des boréliens : c'est celle qui est couramment utilisée quand  $\Omega = \mathbb{R}$ .

---

**Proposition 13.12**

Soient  $\Omega$  un ensemble et  $\mathcal{T}$  une tribu sur  $\Omega$ .

Alors on a :

- ▶  $\emptyset \in \mathcal{T}$
- ▶ pour toute suite  $(A_n) \in \mathcal{T}^{\mathbb{N}}$ ,  $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{T}$
- ▶ pour toute famille finie  $(A_1, \dots, A_n)$  d'événements,  $\bigcup_{k=0}^n A_k$  et  $\bigcap_{k=0}^n A_k$  sont des événements.

---

*Démonstration 13.13*

Soit  $(A_n) \in \mathcal{T}^{\mathbb{N}}$ .

On a  $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{T}$  car

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n = \overline{\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \overline{A_n}}.$$

■

---

**Définition 13.14**

$\Omega$  est appelé l'événement certain,  $\emptyset$  est appelé l'événement impossible.

Deux événements  $A$  et  $B$  sont dits incompatibles quand ils sont disjoints, *i.e.*  $A \cap B = \emptyset$ .



### 13.2.3 Probabilité

---

#### Définition 13.15

Soient  $\Omega$  un univers et  $\mathcal{T}$  une tribu sur  $\Omega$ .

On appelle probabilité sur  $(\Omega, \mathcal{T})$  toute application  $\mathbb{P} : \mathcal{T} \longrightarrow [0 ; 1]$  telle que :

- $\mathbb{P}(\Omega) = 1$
- pour toute suite  $(A_n) \in \mathcal{T}^{\mathbb{N}}$  d'événements deux à deux incompatibles, la série de terme général  $\mathbb{P}(A_n)$  est convergente et  $\mathbb{P}\left(\bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n)$ .

Le triplet  $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$  est appelé espace probabilisé.

En pratique, sauf dans certains cas où  $\Omega$  est fini ou dénombrable, nous postulerons toujours l'existence d'un espace probabilisé qui modélise la situation, car c'est hors de notre portée de construire concrètement un tel espace. Dès que les expériences aléatoires peuvent avoir une infinité non-dénombrable de résultats possibles, il est souvent difficile de reprendre les idées développées en première année et définir, par exemple, des probabilités à partir d'événements élémentaires  $\{\omega\}$  (définir  $\Omega$  est en général à notre portée, mais construire la tribu et la probabilité est inaccessible à nos moyens). Nous admettrons donc toujours l'existence d'un espace probabilisé représentant notre expérience.

Dans moult cas, nous définirons les événements à partir d'événements « primitifs » : par exemple, dans le cas d'une suite de lancer de pièce, l'univers est simple :  $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ , mais il n'est pas dénombrable ; les événements primitifs sont les événements  $P_i$ , où  $i \in \mathbb{N}$  et

$$P_i = \{\omega = (\omega_n) \in \{0, 1\}^{\mathbb{N}} \mid \omega_i = 1\}$$

modélise l'événement au sens concret « obtenir pile au  $i$ -ème lancer ».

---

#### Exercice 13.16

On lance une pièce une infinité de fois.

Exprimez par une phrase ce que représentent les événements suivants :

$$A_n = \bigcap_{i=0}^n P_i \quad B_n = \bigcup_{i=0}^n \left( P_i \cap \bigcap_{\substack{0 \leq j \leq n \\ j \neq i}} \overline{P_j} \right) \quad C = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} \bigcap_{j \geq i} P_j.$$

Réciproquement, définissez à l'aide des  $P_i$  les événements suivants :

- on obtient pile un nombre fini de fois
- on obtient pile une infinité de fois.

---

*Correction 13.17*

▷  $\omega \in A_n \iff$  « on obtient pile lors des  $n + 1$  premiers lancers ».

▷

$$\begin{aligned}\omega \in B_n &\iff \exists i \in \llbracket 0 ; n \rrbracket, \omega \in P_i \cap \bigcap_{\substack{0 \leq j \leq n \\ i \neq j}} \overline{P_j} \\ &\iff \exists i \in \llbracket 0 ; n \rrbracket, [\omega \in P_i \text{ et } \forall j \in \llbracket 0 ; n \rrbracket \setminus \{i\}, \omega \in \overline{P_j}] \\ &\iff \text{« parmi les } n + 1 \text{ premiers lancers, un seul donne pile ».}\end{aligned}$$

▷  $\omega \in C \iff$  « à partir d'un certain rang, on obtient uniquement pile ».

▷ « On obtient pile un nombre fini de fois »  $\iff \omega \in \bigcup_{i \in \mathbb{N}} \bigcap_{j \geq i} \overline{P_j} = D$ .

▷ « On obtient pile une infinité de fois »  $\iff \omega \in \overline{D} = \bigcap_{i \in \mathbb{N}} \bigcup_{j \geq i} P_j$ .

### 13.2.4 Propriétés

On retrouve les propriétés vues en première année.

---

#### Proposition 13.18

Soit  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  un espace probabilisé.

Alors  $\mathbb{P}$  vérifie les propriétés suivantes :

▷ pour tout  $A \in \mathcal{F}$ ,  $\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$  ; en particulier  $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$

▷ pour tout  $(A, B) \in \mathcal{F}^2$ ,  $A \subseteq B \implies \mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$

▷ pour tout  $(A, B) \in \mathcal{F}^2$ ,  $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$ .

Mais on en a d'autres, liées à la notion de suite dénombrable.

#### 13.2.4.1 Continuité

---

#### Proposition 13.19 (Continuité croissante)

Si  $(A_n)$  est une suite croissante d'événements, c'est-à-dire pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $A_n \subseteq A_{n+1}$ , alors

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(A_n).$$

---

*Démonstration 13.20*

Soit  $(A_n)$  une suite croissante d'événements.

On pose  $B_0 = A_0$  et pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $B_n = A_n \setminus A_{n-1}$ .

On vérifie d'abord que  $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} B_i = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i$  :

► Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $B_n \subseteq A_n$  donc  $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ .

► Soit  $\omega \in \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i$ .

Alors  $\{k \in \mathbb{N} \mid \omega \in A_k\}$  est une partie non-vide de  $\mathbb{N}$  et possède donc un minimum  $i \in \mathbb{N}$ .

Donc, si  $i \geq 1$ , alors  $i - 1$  n'appartient pas à cet ensemble.

Ainsi, ou bien  $i = 0$  et  $\omega \in B_0$ , ou bien  $i \neq 0$  et  $\omega \in A_i$  et  $\omega \notin A_{i-1}$  donc  $\omega \in B_i$ .

Donc  $\omega \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n$  et donc  $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n$ .

De plus, les événements  $B_i$  sont deux à deux incompatibles *i.e.*

$$\forall (i, j) \in \mathbb{N}^2, \quad i \neq j \implies B_i \cap B_j = \emptyset.$$

En effet, soit  $(i, j) \in \mathbb{N}^2$  tel que  $i > j$ .

Si  $\omega \in B_i \cap B_j$ , alors  $\omega \in B_j \subseteq A_j \subseteq \dots \subseteq A_{i-1}$ .

Or  $\omega \in B_i = A_i \setminus A_{i-1}$  donc  $\omega \notin A_{i-1}$  : contradiction.

Donc  $B_i \cap B_j = \emptyset$ .

D'après la deuxième propriété de  $\mathbb{P}$ ,  $\mathbb{P}\left(\bigsqcup_{i \in \mathbb{N}} B_i\right) = \sum_{i \in \mathbb{N}} \mathbb{P}(B_i)$  donc

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i\right) = \sum_{i \in \mathbb{N}} \mathbb{P}(B_i) = \sum_{i=0}^{+\infty} \mathbb{P}(B_i).$$

Or  $B_i = A_i \setminus A_{i-1}$  et  $A_{i-1} \subseteq A_i$  donc

$$A_i = A_{i-1} \sqcup B_i.$$

Donc  $\mathbb{P}(B_0) = \mathbb{P}(A_0)$  et pour  $i \geq 1$  on a

$$\mathbb{P}(A_i) = \mathbb{P}(A_{i-1}) + \mathbb{P}(B_i)$$

$$\mathbb{P}(A_i) - \mathbb{P}(A_{i-1}) = \mathbb{P}(B_i).$$

Donc

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}\left(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i\right) &= \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{i=0}^N \mathbb{P}(B_i) \\
&= \lim_{N \rightarrow +\infty} \left[ \sum_{i=1}^N (\mathbb{P}(A_i) - \mathbb{P}(A_{i-1})) + \mathbb{P}(A_0) \right] \\
&= \lim_{N \rightarrow +\infty} (\mathbb{P}(A_0) + \mathbb{P}(A_N) - \mathbb{P}(A_0)) \\
&= \lim_{N \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(A_N).
\end{aligned}$$

■

**Proposition 13.21 (Continuité décroissante)**

Si  $(A_n)$  est une suite décroissante d'événements, c'est-à-dire pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $A_{n+1} \subseteq A_n$ , alors

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(A_n).$$

*Démonstration 13.22*

Soit  $(A_n)$  une suite décroissante d'événements.

Alors  $(\overline{A_n})$  est croissante.

$$\text{Donc } \mathbb{P}\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \overline{A_n}\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(\overline{A_n}).$$

$$\text{Donc } 1 - \mathbb{P}\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \overline{A_n}\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} (1 - \mathbb{P}(\overline{A_n})).$$

$$\text{Donc } \mathbb{P}\left(\overline{\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \overline{A_n}}\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(A_n).$$

$$\text{Donc } \mathbb{P}\left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(A_n).$$

■

**Proposition 13.23**

Soit  $(A_n)$  une suite quelconque d'événements. On a

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n\right) = \lim_{N \rightarrow +\infty} \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=0}^N A_n\right) \quad \text{et} \quad \mathbb{P}\left(\bigcap_{n=0}^{+\infty} A_n\right) = \lim_{N \rightarrow +\infty} \mathbb{P}\left(\bigcap_{n=0}^N A_n\right).$$

---

*Démonstration 13.24*

Pour  $n \in \mathbb{N}$ , on pose  $A'_n = \bigcup_{k=0}^n A_k$ .

La suite  $(A'_n)$  est croissante et  $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A'_n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ .

D'après la proposition de continuité croissante, on a donc

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A'_n\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(A'_n).$$

Idem pour l'intersection avec la continuité décroissante. ■

---

### Exercice 13.25

On considère l'univers des suites infinies de lancers indépendants d'une pièce équilibrée :  $\Omega = \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ .

Montrez que les événements élémentaires  $\{\omega\}$  sont de probabilité nulle.

Déduisez-en que l'univers n'est pas dénombrable.

Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre fini de face ?

---

### Correction 13.26

► On considère par exemple l'événement « on n'obtient que des piles »  $= A$ .

$A = \bigcap_{i \in \mathbb{N}} P_i = \{(1, 1, 1, \dots, 1, \dots)\}$  est un événement élémentaire.

D'après la Proposition 13.23, on a  $\mathbb{P}(A) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=0}^n P_i\right)$ .

Or les événements  $P_i$  sont indépendants et  $\mathbb{P}(P_i) = \frac{1}{2}$  donc

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=0}^n P_i\right) = \prod_{i=0}^n \mathbb{P}(P_i) = \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}.$$

Donc  $\mathbb{P}(A) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2^{n+1}} = 0$ .

► Soient  $\omega \in \Omega$  et  $A = \{\omega\} = \{(\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_n, \dots)\} = \bigcap_{i \in \mathbb{N}} B_i$  où  $B_i = \begin{cases} P_i & \text{si } \omega_i = 1 \\ \overline{P_i} & \text{si } \omega_i = 0 \end{cases}$

D'après la Proposition 13.23, on a

$$\mathbb{P}(A) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=0}^n B_i\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2^{n+1}} = 0.$$

► Supposons  $\Omega = \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$  dénombrable.

On a  $\Omega = \bigsqcup_{\omega \in \Omega} \{\omega\}$ .

L'union étant dénombrable, on a

$$1 = \mathbb{P}(\Omega) = \sum_{\omega \in \Omega} \mathbb{P}(\{\omega\}) = 0$$

contradiction.

Donc  $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$  n'est pas dénombrable.

► Soit  $B$  l'événement « on obtient un nombre fini de face ». On a

$$B = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} \underbrace{\bigcap_{j \geq i} P_j}_{Q_i}.$$

$Q_i$  est l'événement « on obtient que des pile à partir du rang  $i$  ».

Si  $\omega \in Q_i$ ,  $\forall j \geq i$ ,  $\omega_j = 1$  donc  $\forall j \geq i+1$ ,  $\omega_j = 1$ , donc  $\omega \in Q_{i+1}$  i.e.  $Q_i \subseteq Q_{i+1}$ .

Donc  $(Q_i)$  est croissante et on a  $\mathbb{P}(B) = \lim_{i \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(Q_i)$ .

Or  $Q_i = \bigcap_{j \geq i} P_j$  donc

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Q_i) &= \lim_{N \rightarrow +\infty} \mathbb{P}\left(\bigcap_{j=i}^N P_j\right) \\ &= \lim_{N \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{N-i+1} \\ &= 0. \end{aligned}$$

Donc  $\mathbb{P}(B) = 0$ .

#### 13.2.4.2 Sous-additivité

##### Proposition 13.27 (Sous-additivité)

Si  $(A_n)$  est une suite d'événements, alors

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) \leq \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n).$$

---

*Démonstration 13.28*

D'après la Proposition 13.18, on a

$$\forall (A, B) \in \mathcal{T}^2, \mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B) \leq \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B).$$

Puis, par récurrence, on a

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall (A_1, \dots, A_n) \in \mathcal{T}^n, \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i).$$

Donc

$$\forall (A_n) \in \mathcal{T}^{\mathbb{N}}, \forall k \in \mathbb{N}, \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=0}^k A_i\right) \leq \sum_{i=0}^k \mathbb{P}(A_i) \leq \sum_{i=0}^{+\infty} \mathbb{P}(A_i).$$

Or, d'après la Proposition 13.23, on a  $\mathbb{P}\left(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i\right) = \lim_{k \rightarrow +\infty} \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=0}^k A_i\right)$ , donc par passage à la limite, on a

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i\right) \leq \sum_{i=0}^{+\infty} \mathbb{P}(A_i).$$

■

Dans ce résultat, le symbole  $\sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n)$  signifie  $\lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{n=0}^N \mathbb{P}(A_n)$  : c'est un réel si la série  $\sum \mathbb{P}(A_n)$  est convergente, et  $+\infty$  sinon (puisque la série est à termes positifs).

### 13.2.4.3 Événements négligeables ou presque sûrs

---

**Définition 13.29**

Un événement est dit négligeable quand sa probabilité est nulle.

Un événement est dit presque sûr quand sa probabilité est 1.

---

**Proposition 13.30**

*Toute réunion ou intersection au plus dénombrable d'événements négligeables est négligeable.*

*Toute réunion ou intersection au plus dénombrable d'événements presque sûrs est presque sûre.*

---

*Démonstration 13.31*

Application directe de la Proposition 13.27.

■

### 13.2.5 Probabilité discrète

---

**Définition 13.32**

Soit  $\Omega$  un univers.

On appelle distribution de probabilité discrète sur  $\Omega$  toute famille de réels positifs indexée par  $\Omega$ , sommable et de somme totale 1.

Si  $\Omega$  est un ensemble fini, on retrouve la définition de l'an dernier.

---

**Proposition 13.33**

Si  $(p_\omega)_{\omega \in \Omega}$  est une distribution de probabilité discrète sur  $\Omega$ , alors son support  $\{\omega \in \Omega \mid p_\omega > 0\}$  est au plus dénombrable.

À toute distribution de probabilité discrète sur  $\Omega$ , on peut associer une probabilité sur l'espace probabilisable  $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ .

---

**Proposition 13.34**

Si  $(p_\omega)_{\omega \in \Omega}$  est une distribution de probabilité discrète sur  $\Omega$ , alors il existe une unique probabilité  $\mathbb{P}$  sur la tribu  $\mathcal{P}(\Omega)$  telle que pour tout  $\omega \in \Omega$ ,  $\mathbb{P}(\{\omega\}) = p_\omega$ .

---

*Démonstration 13.35*

Soit  $(p_\omega)_{\omega \in \Omega}$  une distribution de probabilité discrète.

Pour  $A \in \mathcal{P}(\Omega)$ , on pose  $\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega \in A} p_\omega$  (au sens des familles sommables).

On a  $A \subseteq \Omega$  donc  $0 \leq \mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(\Omega) = \sum_{\omega \in \Omega} p_\omega = 1$ .

Donc  $\mathbb{P}$  est une application de  $\mathcal{P}(\Omega)$  dans  $[0 ; 1]$  qui vérifie  $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ .

Soit  $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une famille dénombrable de  $\mathcal{P}(\Omega)$  telle que pour tout  $(m, n) \in \mathbb{N}^2$ ,  $m \neq n \implies A_m \cap A_n = \emptyset$ .

On veut montrer  $\mathbb{P}\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{P}(A_n)$ .

D'après le théorème de sommation par paquets, on a

$$\begin{aligned} \sum_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{P}(A_n) &= \sum_{n \in \mathbb{N}} \sum_{\omega \in A_n} p_\omega \\ &= \sum_{\omega \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n} p_\omega \\ &= \mathbb{P}\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right). \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \text{ } \\ \text{ } \end{array} \right\} (A_n) \text{ partition de } \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$$



$\mathbb{P}$  est donc une probabilité sur  $\mathcal{P}(\Omega)$  telle que pour tout  $\omega \in \Omega$ ,  $\mathbb{P}(\{\omega\}) = p_\omega$ .

Ceci prouve donc l'existence de  $\mathbb{P}$ .

Pour montrer l'unicité, soit  $Q$  une probabilité qui vérifie les conditions de l'énoncé.

On pose  $S$  le support  $Q : S = \{\omega \in \Omega \mid p_\omega > 0\}$ .

Soit  $A \in \mathcal{P}(\Omega)$ .

On a  $A = (A \cap S) \sqcup (A \cap \bar{S})$  donc

$$\begin{aligned} Q(A) &= Q(A \cap S) + Q(A \cap \bar{S}) \\ &= Q\left(\bigsqcup_{\omega \in A \cap S} \{\omega\}\right) + Q(A \cap \bar{S}) \\ &= \sum_{\omega \in A \cap S} Q(\{\omega\}) + Q(A \cap \bar{S}) \\ &= \sum_{\omega \in A \cap S} p_\omega + Q(A \cap \bar{S}). \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} A \cap S \text{ dénombrable}$$

En particulier, si  $A = \Omega$ , on a

$$Q(\Omega) = 1 = \sum_{\omega \in S} p_\omega + Q(\bar{S}).$$

Or, d'après le théorème de sommation par paquets, on a

$$\sum_{\omega \in \Omega} p_\omega = 1 = \sum_{\omega \in S} p_\omega + \underbrace{\sum_{\omega \in \bar{S}} p_\omega}_{=0}.$$

Donc  $Q(\bar{S}) = 0$ .

Donc  $0 \leq Q(A \cap \bar{S}) \leq Q(\bar{S}) = 0$  et donc  $Q(A \cap \bar{S}) = 0$ .

Donc  $Q(A) = \sum_{\omega \in A \cap S} p_\omega$ .

Ceci est aussi valable pour la probabilité  $\mathbb{P}$  donc  $\mathbb{P}(A) = Q(A)$ .

Donc  $\mathbb{P} = Q$ . ■

Quand l'univers est infini non-dénombrable, le résultat précédent donne toutes les probabilités discrètes sur  $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ . Mais si on choisit des tribus plus petites (ce qui est très relatif : en général, ce sont des ensembles énormes, dont la puissance dépasse celle du continu !), alors on peut créer d'autres types de probabilités (comme les probabilités dites continues).

Quand l'univers  $\Omega$  est fini ou dénombrable, alors toutes les probabilités sont discrètes : on choisit toujours la tribu  $\mathcal{P}(\Omega)$ , ce qui est toujours sous-entendu.

---

**Proposition 13.36**

Soit  $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$  un ensemble fini.

Alors pour tout  $n$ -uplet  $(p_1, \dots, p_n) \in [0; 1]^n$  tel que  $\sum_{i=1}^n p_i = 1$ , il existe une unique probabilité  $\mathbb{P}$  sur  $\Omega$  telle que pour tout  $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$ ,  $\mathbb{P}(\{\omega_i\}) = p_i$ .

---

**Proposition 13.37**

Soit  $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n, \dots\}$  un ensemble dénombrable.

Alors pour toute suite  $(p_n) \in [0; 1]^{\mathbb{N}}$  telle que la série  $\sum_{n \geq 1} p_n$  converge et  $\sum_{n=1}^{+\infty} p_n = 1$ , il existe une unique probabilité  $\mathbb{P}$  sur  $\Omega$  telle que pour tout  $i \in \mathbb{N}^*$ ,  $\mathbb{P}(\{\omega_i\}) = p_i$ .

---

**Exercice 13.38**

Déterminez l'unique constante  $\lambda$  telle qu'on puisse définir une probabilité sur  $\mathbb{N}$  en posant

$$\text{pour tout } n \in \mathbb{N}, \quad \mathbb{P}(\{n\}) = \frac{\lambda}{n!}.$$

---

*Correction 13.39*

La famille  $\left(\frac{\lambda}{n!}\right)_{n \in \mathbb{N}}$  est une distribution de probabilité discrète sur  $\mathbb{N}$  si et seulement si

$$\begin{cases} \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{\lambda}{n!} = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad \frac{\lambda}{n!} \geq 0 \end{cases}$$

Or on a  $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{\lambda}{n!} = \lambda \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} = \lambda e$  donc la seule solution est  $\lambda = \frac{1}{e}$ .

Dans toute la suite, on suppose donné un espace probabilisé  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ .

## 13.3 Probabilités conditionnelles

### 13.3.1 Généralités

---

**Définition 13.40**

Soit  $A \in \mathcal{F}$  un événement non-négligeable.

Pour  $B \in \mathcal{F}$ , on pose  $\mathbb{P}_A(B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)}$ , appelé probabilité sachant  $A$  de  $B$ .

On voit aussi la notation  $\mathbb{P}(B | A)$ , mais attention, cette notation est trompeuse, elle peut laisser penser qu'il existe un événement qui s'appellerait «  $B$  sachant  $A$  », ce qui n'a aucun sens.

L'idée derrière la notion de probabilité conditionnelle est que lorsqu'on dispose d'une information partielle sur le résultat de l'expérience, notre perception des probabilités s'en trouve modifiée.

---

**Théorème 13.41**

*Sous les mêmes hypothèses,  $\mathbb{P}_A$  est une probabilité sur  $(\Omega, \mathcal{F})$ , appelée probabilité conditionnelle relative à  $A$ .*

---

*Démonstration 13.42*

On a  $\mathbb{P}_A(\Omega) = \frac{\mathbb{P}(A \cap \Omega)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(A)} = 1$ .

Pour toute famille  $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$  d'événements deux à deux incompatibles, on a

$$\begin{aligned}\mathbb{P}_A\left(\bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} B_n\right) &= \frac{1}{\mathbb{P}(A)} \mathbb{P}\left(A \cap \bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} B_n\right) \\ &= \frac{1}{\mathbb{P}(A)} \mathbb{P}\left(\bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} (A \cap B_n)\right) \\ &= \frac{1}{\mathbb{P}(A)} \sum_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{P}(A \cap B_n) \\ &= \sum_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{P}_A(B_n).\end{aligned}$$

Donc  $\mathbb{P}_A$  est une probabilité sur  $(\Omega, \mathcal{F})$ . ■

En général, on connaît plutôt  $\mathbb{P}(A)$  et  $\mathbb{P}_A(B)$ , ce qui permet de calculer  $\mathbb{P}(A \cap B)$  :

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \mathbb{P}_A(B).$$

On peut généraliser.

---

**Théorème 13.43 (Formule des probabilités composées)**

Soit  $(A_1, \dots, A_n)$  une famille d'événements tels que  $\mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) \neq 0$ .

Alors  $\mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1} \cap A_n) = \mathbb{P}(A_1) \mathbb{P}_{A_1}(A_2) \mathbb{P}_{A_1 \cap A_2}(A_3) \dots \mathbb{P}_{A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}}(A_n)$ .

En général, on utilise ce résultat lorsque des événements (au sens naturel) se succèdent et que la connaissance de chaque événement permet de déterminer l'état du système.

---

**Exercice 13.44**

On dispose d'une urne contenant une boule blanche et  $n$  boules noires (avec  $n \geq 1$ ).

On effectue une suite de tirages jusqu'à obtenir la boule blanche en respectant le protocole suivant : si on tire une boule noire, on la remplace par deux boules noires.

Calculez la probabilité d'obtenir la boule blanche à l'issue du  $k$ -ème tirage et la probabilité de ne jamais tirer la boule blanche.

---

*Correction 13.45*

Pour  $k \in \mathbb{N}^*$ , on note  $A_k$  l'événement « on tire une boule noire au  $k$ -ème tirage » et  $B_k$  l'événement « on tire la boule blanche au  $k$ -ème tirage ».

On a

$$B_k = \bigcap_{i=1}^{k-1} A_i \cap \overline{A_k}.$$

D'après la formule des probabilités composées, on a donc

$$\mathbb{P}(B_k) = \mathbb{P}(A_1) \times \mathbb{P}_{A_1}(A_2) \times \dots \times \mathbb{P}_{A_1 \cap \dots \cap A_{k-2}}(A_{k-1}) \times \mathbb{P}_{A_1 \cap \dots \cap A_{k-1}}(\overline{A_k}).$$

En faisant l'hypothèse que les tirages dans l'urne sont, à chaque étape, équiprobables, on a

$$\mathbb{P}(A_1) = \frac{n}{n+1} \quad \mathbb{P}_{A_1}(A_2) = \frac{n+1}{n+2} \quad \dots \quad \mathbb{P}_{A_1 \cap \dots \cap A_{k-2}}(A_{k-1}) = \frac{n+k-2}{n+k-1}$$

et

$$\mathbb{P}_{A_1 \cap \dots \cap A_{k-1}}(\overline{A_k}) = \frac{1}{n+k}.$$

On en déduit

$$\mathbb{P}(B_k) = \frac{n}{(n+k-1)(n+k)}.$$

De plus, en notant  $C$  l'événement « ne jamais tirer la boule blanche », on a  $C = \bigcap_{n \in \mathbb{N}^*} A_n$  et donc

$$\mathbb{P}(C) = \lim_{N \rightarrow +\infty} \mathbb{P}\left(\bigcap_{k=1}^N A_k\right) = \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{n}{n+1} \times \dots \times \frac{n+N-1}{n+N} = \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{n}{n+N} = 0.$$

### 13.3.2 Systèmes complets d'événements

---

#### Définition 13.46

Soit  $(A_i)_{i \in I}$  une famille d'événements.

On dit que la famille  $(A_i)_{i \in I}$  est un système complet d'événements si, et seulement si :

- $I$  est fini ou dénombrable (en pratique, on a souvent  $I = \llbracket 1 ; n \rrbracket$  ou  $I = \mathbb{N}$ )
- les événements sont deux à deux incompatibles :

$$\text{pour tout } (i, j) \in I^2, \ i \neq j \implies A_i \cap A_j = \emptyset$$

$$\text{▸ } \bigcup_{i \in I} A_i = \Omega.$$

---

#### Exemple 13.47

- Si  $A$  est un événement, le couple  $(A, \overline{A})$  est un système complet d'événements.
- Si  $\Omega$  est fini ou dénombrable, la famille de tous les événements élémentaires est un système complet d'événements.

Les systèmes complets d'événements interviennent lorsqu'on est tenté de faire une disjonction de cas : on est dans un cas, ou alors dans un autre, etc., mais sans que jamais deux cas soient simultanément possibles.

Si  $(A_i)_{i \in I}$  est un système complet d'événements, alors  $\sum_{i \in I} \mathbb{P}(A_i) = 1$ .

---

#### Remarque 13.48

D'une manière générale, dans toute la suite du cours, si on voit apparaître une somme  $\sum_{i \in I} \dots$ , alors elle signifiera :

- une vraie somme quand  $I$  est fini
- une somme d'une famille sommable quand  $I$  est infini
- cas particulier : dans le cas de réels positifs, on peut oublier la condition de sommabilité et prendre les sommes dans  $[0 ; +\infty]$  (c'est presque toujours le cas tant qu'on ne manipule que des probabilités, qui sont des réels positifs).

---

**Définition 13.49**

Pour définir un système quasi-complet d'événements, on remplace la condition  $\bigcup_{i \in I} A_i = \Omega$  par la condition  $\sum_{i \in I} \mathbb{P}(A_i) = 1$ .

Un système complet d'événements est donc un système quasi-complet d'événements.

Réciproquement, si  $(A_i)_{i \in I}$  est un système quasi-complet d'événements, on pose  $B = \overline{\bigcup_{i \in I} A_i}$  :  $B$  est alors un événement négligeable et le système d'événements constitué des événements  $A_i$  auxquels on ajoute l'événement  $B$  est alors un système complet.

Conclusion : à un événement négligeable près, les deux notions sont identiques. La suite du cours montre que la différence entre les deux notions n'est pas fondamentale en pratique.

---

*Démonstration 13.50*

Si  $(A_i)_{i \in I}$  est un système quasi-complet d'événements, alors  $\Omega = \bigsqcup_{i \in I} A_i \sqcup \overline{\bigsqcup_{i \in I} A_i}$  donc

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\Omega) = 1 &= \mathbb{P}\left(\bigsqcup_{i \in I} A_i\right) + \mathbb{P}\left(\overline{\bigsqcup_{i \in I} A_i}\right) \\ &= \underbrace{\sum_{i \in I} \mathbb{P}(A_i)}_{=1} + \mathbb{P}\left(\overline{\bigsqcup_{i \in I} A_i}\right). \end{aligned} \quad \begin{array}{l} \curvearrowright \\ I \text{ dénombrable} \end{array}$$

Donc  $\mathbb{P}\left(\overline{\bigsqcup_{i \in I} A_i}\right) = 0$ . ■

### 13.3.3 Formule des probabilités totales

---

**Théorème 13.51**

Soit  $(A_i)_{i \in I}$  un système complet d'événements.

Alors pour tout événement  $B$ ,  $\mathbb{P}(B) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}(B \cap A_i)$ .

Si, de plus, tous les événements  $A_i$  sont de probabilité non-nulle, alors  $\mathbb{P}(B) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}_{A_i}(B) \mathbb{P}(A_i)$ .

Si  $A$  est un événement négligeable, alors  $A \cap B$  en est un aussi : formellement, la probabilité conditionnelle  $\mathbb{P}_A(B)$  n'est pas définie ; on lui donne alors une valeur arbitraire (souvent 0, en fait peu importe) et on accepte quand même l'égalité  $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}_A(B) \mathbb{P}(A) = 0$ , car, dans ce cas, cette égalité est vraie puisque  $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) = 0$ .

Avec cette convention, on peut étendre la formule des probabilités totales à tout système quasi-complet d'événements.

---

**Théorème 13.52**

Soit  $(A_i)_{i \in I}$  un système complet d'événements.

Alors pour tout événement  $B$ ,  $\mathbb{P}(B) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}_{A_i}(B) \mathbb{P}(A_i)$ .

---

**Exercice 13.53**

Soit  $p \in ]0 ; 1[$ .

Dans  $\mathbb{N}$ , on définit la probabilité  $\mathbb{P}$  par  $\mathbb{P}(\{n\}) = (1-p)p^n$ .

Justifiez que cette égalité définit effectivement une probabilité sur  $\mathbb{N}$ .

On tire un entier  $N$  au hasard selon cette probabilité, puis on remplit une urne avec une boule noire et  $N$  boules blanches. On prélève enfin une boule dans l'urne.

Quelle est la probabilité d'obtenir une boule noire dans cette expérience ?

---

*Correction 13.54*

On a  $\sum_{n \in \mathbb{N}} (1-p)p^n = (1-p) \sum_{n \in \mathbb{N}} p^n = \frac{1-p}{1-p} = 1$  donc d'après la Proposition 13.37,  $\mathbb{P}$  est bien une probabilité sur  $\mathbb{N}$ .

Pour  $n \in \mathbb{N}$ , on note  $A_n$  l'événement « on a choisi  $n \in \mathbb{N}$  à la première étape » et on note  $B$  l'événement « on obtient la boule noire à la deuxième étape ».

$(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est un système complet d'événements donc d'après la formule des probabilités totales, on a

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(B) &= \sum_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{P}_{A_n}(B) \mathbb{P}(A_n) \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n+1} p^n (1-p) \\ &= (1-p) \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{p^n}{n+1} \\ &= \frac{1-p}{p} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{p^n}{n} \\ &= \frac{p-1}{p} \ln(1-p). \end{aligned}$$

### 13.3.4 Formule de Bayes

---

**Proposition 13.55**

Soient  $A$  et  $B$  deux événements de probabilité non-nulle.

$$\text{Alors } \mathbb{P}_B(A) = \frac{\mathbb{P}(A) \mathbb{P}_A(B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Cette formule est appelée la formule de probabilité des causes.

On déduit de cela et de la formule des probabilités totales la formule de Bayes.

---

**Théorème 13.56**

Soit  $(A_i)_{i \in I}$  un système quasi-complet d'événements.

$$\text{Alors pour tout événement } B \text{ tel que } \mathbb{P}(B) \neq 0, \text{ on a } \mathbb{P}_B(A_i) = \frac{\mathbb{P}(A_i) \mathbb{P}_{A_i}(B)}{\sum_{j \in I} \mathbb{P}(A_j) \mathbb{P}_{A_j}(B)}.$$

---

*Remarque 13.57*

L'énoncé est donné ici dans sa pleine version mais, en pratique, on retrouve la formule à chaque fois en refaisant la démonstration dans le cas qui nous préoccupe.

---

**Exercice 13.58**

Une proportion  $p$  d'une population est atteinte d'une maladie donnée (*prévalence* de la maladie) pour laquelle un test de dépistage existe.

Appliqué à un individu atteint, le test donne un résultat positif avec une probabilité  $s$  (*sensibilité* du test).

Appliqué à un individu indemne, il donne un résultat négatif avec une probabilité  $s'$  (*spécificité* du test).

Calculez la probabilité qu'un patient soit effectivement atteint lorsque son test est positif (*valeur prédictive positive*) ; qu'il soit effectivement indemne lorsque son test est négatif (*valeur prédictive négative*).

---

*Correction 13.59*

On note  $M$  l'événement « l'individu est malade » et  $T$  l'événement « le test est positif ».

On a  $\mathbb{P}(M) = p$ ,  $\mathbb{P}_M(T) = s$  et  $\mathbb{P}_{\overline{M}}(\overline{T}) = s'$ .

On a  $\mathbb{P}(M \cap T) = \mathbb{P}_T(M) \mathbb{P}(T) = \mathbb{P}_M(T) \mathbb{P}(M)$  donc

$$\mathbb{P}_T(M) = \frac{\mathbb{P}(T \cap M)}{\mathbb{P}(T)}.$$



Or  $(M, \overline{M})$  est un système complet d'événements donc

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(T) &= \mathbb{P}_M(T) \mathbb{P}(M) + \mathbb{P}(\overline{M}) \mathbb{P}_{\overline{M}}(T) \\ &= sp + \left(1 - \mathbb{P}_{\overline{M}}(\overline{T})\right) (1 - \mathbb{P}(M)) \\ &= sp + (1 - s') (1 - p) .\end{aligned}$$

Donc

$$\mathbb{P}_T(M) = \frac{sp}{sp + (1 - s') (1 - p)} .$$

Idem pour l'autre probabilité.

### Exercice 13.60

Jean-Eudes lance une pièce équilibrée jusqu'à obtenir pile, il compte le nombre de lancers nécessaires, noté  $k$ , puis il remplit une urne avec  $k$  boules numérotées de 1 à  $k$ . Enfin, il tire une boule dans l'urne.

Il nous annonce qu'il a obtenu 1, mais ne nous donne pas la valeur de  $k$ .

Déterminez la probabilité qu'il n'ait fait qu'un seul lancer de pièce.

#### Correction 13.61

Pour  $k \in \mathbb{N}^*$ , on note  $A_k$  l'événement « nécessiter  $k$  lancers pour obtenir pile » et  $B$  l'événement « tirer la boule 1 ».

On cherche  $\mathbb{P}_B(A_1)$ .

D'après la formule de probabilité des causes, on a

$$\mathbb{P}_B(A_1) = \frac{\mathbb{P}_{A_1}(B) \mathbb{P}(A_1)}{\mathbb{P}(B)} .$$

On a  $\mathbb{P}(A_1) = \frac{1}{2}$  (pièce équilibrée) et  $\mathbb{P}_{A_1}(B) = 1$ .

La famille  $(A_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$  est un système quasi-complet d'événements car  $((A_k)_{k \in \mathbb{N}^*}, \{\omega_F\})$ , où  $\omega_F = (F, F, \dots, F, \dots)$ , est une partition de  $\Omega$  telle que  $\mathbb{P}(\{\omega_F\}) = 0$ , donc  $\sum_{k \in \mathbb{N}^*} \mathbb{P}(A_k) = 1$ .

On note  $F_k$  l'événement « obtenir face au  $k$ -ème lancer » et on a

$$A_k = \bigcap_{i=1}^{k-1} F_i \cap \overline{F_k} .$$

Les  $F_i$  étant supposés indépendants, on a

$$\mathbb{P}(A_k) = \prod_{i=1}^{k-1} \mathbb{P}(F_i) \times \mathbb{P}(\overline{F_k}) = \frac{1}{2^k}$$

et on remarque  $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{2^k} = 1$ .

D'après la formule des probabilités totales, on a donc

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{k=1}^{+\infty} \mathbb{P}(A_k) \mathbb{P}_{A_k}(B) = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{2^k k} = \ln 2.$$

Finalement,  $\mathbb{P}_B(A_1) = \frac{1}{2 \ln 2}$ .

## 13.4 Indépendance

### 13.4.1 Indépendance de deux événements

---

#### Définition 13.62

Soient  $A$  et  $B$  deux événements.

On dit que  $A$  et  $B$  sont indépendants (pour la probabilité  $\mathbb{P}$ ) ssi  $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B)$ .

---

#### Proposition 13.63

Si  $A$  et  $B$  sont deux événements indépendants, alors les événements  $A$  et  $\overline{B}$  sont indépendants, les événements  $\overline{A}$  et  $B$  sont indépendants et les événements  $\overline{A}$  et  $\overline{B}$  sont indépendants.

---

#### Remarque 13.64

- Attention ! Ne pas confondre « événements indépendants » et « événements incompatibles » !
- Le fait que deux événements soient indépendants ou pas n'est pas seulement lié aux événements eux-mêmes, mais dépend aussi de la probabilité. Quand plusieurs probabilités sont utilisées (par exemple des probabilités conditionnelles), il est essentiel de préciser pour quelle probabilité les événements sont indépendants.

---

#### Proposition 13.65

Soient  $A$  et  $B$  deux événements tels que  $A$  n'est pas négligeable.

Alors  $A$  et  $B$  sont indépendants ssi  $\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}_A(B)$ .

Intuitivement, deux événements sont indépendants si le fait de savoir que l'un des deux est réalisé n'apporte aucune information sur le fait de savoir que l'autre le soit ou non : dans le cas où  $A$  et  $B$  sont deux événements tels que  $\mathbb{P}(A) \neq 0$  et  $\mathbb{P}(B) \neq 0$ , alors  $\mathbb{P}_B(A) = \mathbb{P}(A)$  et  $\mathbb{P}_A(B) = \mathbb{P}(B)$ . Et non pas, comme c'est souvent indiqué dans la littérature, le fait qu'un événement n'influe pas sur un autre ! Mais tout ça n'est que baratin. **Il faut se méfier de l'intuition quand on fait des calculs de probabilités.**

---

**Exercice 13.66**

Une famille a  $n$  enfants (avec  $n \geq 2$ ).

Quelle est la probabilité qu'il n'y ait que des enfants du même sexe ?

Quelle est la probabilité qu'il y ait au moins deux filles ?

Montrez que ces deux événements sont indépendants ssi  $n = 3$ .

---

**Correction 13.67**

Pour  $i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$ , on note  $F_i$  l'événement « le  $i$ -ème enfant est une fille ».

► On note  $A$  l'événement « il n'y a que des enfants du même sexe » *i.e.*

$$A = \bigcap_{i=1}^n F_i \sqcup \bigcap_{i=1}^n \overline{F_i}.$$

On a

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A) &= \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^n F_i\right) + \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^n \overline{F_i}\right) \\ &= \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(F_i) + \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(\overline{F_i}) \\ &= \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^n} \\ &= \frac{1}{2^{n-1}}. \end{aligned}$$

► On note  $B$  l'événement « il y a au plus une fille » *i.e.*

$$B = \bigcap_{i=1}^n \overline{F_i} \sqcup \bigsqcup_{i=1}^n \left( F_i \cap \bigcap_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq i}} \overline{F_j} \right).$$

Donc

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(B) &= \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^n \overline{F_i}\right) + \sum_{i=1}^n \mathbb{P}\left(F_i \cap \bigcap_{\substack{1 \leq j \leq n \\ i \neq j}} \overline{F_j}\right) \\ &= \frac{1}{2^n} + \frac{n}{2^n} \\ &= \frac{n+1}{2^n}. \end{aligned}$$

► On a  $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^n \overline{F_i}\right) = \frac{1}{2^n}.$

On a alors

$$\begin{aligned} A \text{ et } \overline{B} \text{ indépendants} &\iff A \text{ et } B \text{ indépendants} \\ &\iff \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B) \\ &\iff \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2^{n-1}} \times \frac{n+1}{2^n} \\ &\iff 2^{n-1} = n+1. \end{aligned}$$

$n = 3$  est une solution évidente et on montre que  $x \mapsto 2^{x-1} - x - 1$  est strictement croissante sur  $[3 ; +\infty[$  donc l'équation  $2^{n-1} = n+1$  n'a pas de solution dans  $\llbracket 4 ; +\infty \rrbracket$ .

De plus,  $n = 2$  n'est pas solution.

Donc  $A$  et  $\overline{B}$  sont indépendants ssi  $n = 3$ .

### 13.4.2 Indépendance mutuelle

---

**Définition 13.68**

Soit  $(A_i)_{i \in I}$  une famille finie ou dénombrable d'événements.

On dit que les événements  $(A_i)_{i \in I}$  sont (mutuellement) indépendants ssi pour tout sous-ensemble fini

$$J \subseteq I, \quad \mathbb{P}\left(\bigcap_{j \in J} A_j\right) = \prod_{j \in J} \mathbb{P}(A_j).$$

Le résultat précédent peut être généralisé.

---

**Proposition 13.69**

Si  $(A_i)_{i \in I}$  est une famille d'événements (mutuellement) indépendants, alors toute famille d'événements  $(C_i)_{i \in I}$  où pour tout  $i \in I$ , on choisit  $C_i = A_i$  ou  $C_i = \overline{A_i}$ , est aussi une famille d'événements mutuellement indépendants.

---

*Remarque 13.70*

On s'intéresse rarement (pour ne pas dire jamais!) à des familles d'événements deux à deux indépendants seulement : cette notion n'implique pas l'indépendance mutuelle, qui est la seule notion vraiment utile.

---

*Remarque 13.71*

L'indépendance mutuelle d'un grand nombre d'événements est presque toujours une propriété postulée lors de la modélisation et rarement une propriété démontrée car c'est une preuve difficile en général.

On finit par le lemme des coalitions sur les événements.

---

**Théorème 13.72**

*Soit  $(A_i)_{i \in I}$  une famille d'événements mutuellement indépendants.*

*Si l'événement  $B$  est le résultat d'opérations ensemblistes sur une sous-famille  $(A_j)_{j \in J}$  (où  $J \subseteq I$ ) et  $C$  est le résultat d'opérations ensemblistes sur la sous-famille complémentaire  $(A_i)_{i \in I \setminus J}$ , alors  $B$  et  $C$  sont indépendants.*

# Chapitre 14

## Variables aléatoires discrètes

★★ À venir ★★

# Chapitre 15

## Équations différentielles linéaires

★★ À venir ★★

# Chapitre 16

## Calcul différentiel

★★ À venir ★★



# Chapitre 17

## Structures algébriques

★★ À venir ★★

# Deuxième partie

## Exercices

# Chapitre 1

## Espaces vectoriels normés

★★ À venir ★★

# Chapitre 2

## Séries numériques et vectorielles : révisions et compléments

★★ À venir ★★

# Chapitre 3

## Familles sommables

★★ À venir ★★

# Chapitre 4

## Rappels et compléments d'algèbre linéaire

★★ À venir ★★

# Chapitre 5

## Réduction des endomorphismes

★★ À venir ★★

# Chapitre 6

## Intégrales généralisées

★★ À venir ★★



# Chapitre 7

## Intégrales à paramètre

★★ À venir ★★

# Chapitre 8

## Espaces préhilbertiens réels

★★ À venir ★★

# Chapitre 9

## Endomorphismes dans un espace euclidien

★★ À venir ★★

# Chapitre 10

## Fonctions vectorielles

★★ À venir ★★

# Chapitre 11

## Suites et séries de fonctions

★★ À venir ★★

# Chapitre 12

## Séries entières

★★ À venir ★★

# Chapitre 13

## Probabilités

★★ À venir ★★

# Chapitre 14

## Variables aléatoires discrètes

★★ À venir ★★



# Chapitre 15

## Équations différentielles linéaires

★★ À venir ★★

# Chapitre 16

## Calcul différentiel

★★ À venir ★★

# Chapitre 17

## Structures algébriques

★★ À venir ★★

