

Maths – MPI

Romain Bricout

10 mars 2024

## Introduction

Ce document réunit l'ensemble de mes cours de Mathématiques de MPI, ainsi que les exercices les accompagnant. Le professeur était M. Walbron. J'ai adapté certaines formulations me paraissant floues ou ne me plaisant pas mais le contenu pur des cours est strictement équivalent.

Les éléments des tables des matières initiale et présentes au début de chaque chapitre sont cliquables (amenant directement à la partie cliquée). C'est également le cas des références à des éléments antérieurs de la forme, par exemple, « Démonstration 5.22 ».

Cette version ne contient que le contenu des cours imprimés distribués au fil de l'année. Voir l'autre version pour les annotations.

# Table des matières

<b>I</b>	<b>Cours</b>	<b>13</b>
<b>1</b>	<b>Espaces vectoriels normés</b>	<b>14</b>
1.1	Bornes supérieures, bornes inférieures . . . . .	15
1.1.1	Borne supérieure d'une partie de $\mathbb{R}$ . . . . .	15
1.1.2	Borne supérieure d'une application à valeurs dans $\mathbb{R}$ . . . . .	16
1.1.3	Règles pratiques . . . . .	16
1.2	Normes. . . . .	17
1.2.1	Définition . . . . .	17
1.2.2	Exemples fondamentaux . . . . .	18
1.2.3	Normes équivalentes . . . . .	18
1.2.4	Boules . . . . .	19
1.2.5	Parties bornées . . . . .	20
1.3	Convergence des suites . . . . .	22
1.3.1	Définition . . . . .	22
1.3.2	Propriétés usuelles . . . . .	22
1.3.3	Cas particulier en dimension finie . . . . .	23
1.3.4	Point adhérent à une partie . . . . .	24
1.4	Limites de fonctions . . . . .	25
1.4.1	Définition . . . . .	25
1.4.2	Caractérisation séquentielle de la limite . . . . .	25
1.4.3	Propriétés usuelles . . . . .	25
1.4.4	Cas particulier de la dimension finie . . . . .	26
1.4.5	Composition des limites . . . . .	27

1.4.6	Extensions des définitions . . . . .	27
1.5	Fonctions continues . . . . .	28
1.5.1	Continuité en un point . . . . .	28
1.5.2	Continuité sur une partie . . . . .	29
1.5.3	Cas particulier de la dimension finie . . . . .	29
1.5.4	Fonctions lipschitziennes . . . . .	30
1.5.5	Continuité des applications linéaires et $n$ -linéaires . . . . .	30
1.5.6	Norme subordonnée . . . . .	32
1.6	Topologie d'un espace vectoriel normé. . . . .	33
1.6.1	Intérieur d'une partie, voisinage d'un point . . . . .	34
1.6.2	Parties ouvertes . . . . .	34
1.6.3	Parties fermées . . . . .	35
1.6.4	Ouverts ou fermés relatifs à une partie . . . . .	37
1.6.5	Image réciproque d'un ouvert ou d'un fermé par une fonction continue . . . . .	37
1.6.6	Frontière d'une partie . . . . .	38
1.7	Compacité . . . . .	38
1.7.1	Valeurs d'adhérence d'une suite . . . . .	38
1.7.2	Théorème de Bolzano-Weierstrass . . . . .	39
1.7.3	Parties compactes . . . . .	40
1.7.4	Théorème des bornes atteintes . . . . .	41
1.8	Connexité par arcs . . . . .	43
1.8.1	Chemin . . . . .	43
1.8.2	Parties connexes par arcs . . . . .	44
1.8.3	Théorème des valeurs intermédiaires . . . . .	44

## 2 Séries numériques et vectorielles : révisions et compléments 46

2.1	Rappels . . . . .	46
2.1.1	Définitions et notations . . . . .	46
2.1.2	Convergence d'une série . . . . .	47
2.1.3	Lien entre convergence de suites et convergence de séries . . . . .	48

2.2	Séries réelles à termes positifs . . . . .	49
2.2.1	Théorème de Cesàro . . . . .	50
2.2.2	Théorème de comparaison par domination de séries à termes positifs . . . . .	50
2.2.3	Théorème de comparaison par équivalence de séries à termes positifs . . . . .	51
2.2.4	Théorème de comparaison série - intégrale . . . . .	51
2.3	Séries absolument convergentes . . . . .	52
2.3.1	Lien entre absolue convergence et convergence . . . . .	52
2.3.2	Un exemple fondamental : l'exponentielle de matrice . . . . .	53
2.3.3	Extension des résultats par comparaison . . . . .	53
2.3.4	Produit de Cauchy de deux séries absolument convergentes . . . . .	54
2.4	Séries alternées . . . . .	54
<b>3</b>	<b>Familles sommables</b>	<b>56</b>
3.1	Sommes finies . . . . .	56
3.1.1	Définition . . . . .	56
3.1.2	Propriétés . . . . .	59
3.2	Conventions de calcul dans $\mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$ . . . . .	60
3.3	Somme d'une famille de réels positifs . . . . .	62
3.3.1	Propriétés . . . . .	62
3.3.2	Théorème de sommation par paquets . . . . .	63
3.3.3	Théorème de Fubini . . . . .	63
3.4	Familles sommables dans un espace vectoriel normé de dimension finie . . . . .	64
3.4.1	Définitions . . . . .	64
3.4.2	Propriétés . . . . .	65
3.4.3	Théorème de sommation par paquets . . . . .	66
3.4.4	Théorème de Fubini . . . . .	66
3.4.5	Produit de Cauchy de deux séries . . . . .	67
<b>4</b>	<b>Rappels et compléments d'algèbre linéaire</b>	<b>69</b>

4.1	Sommes de sous-espaces vectoriels . . . . .	70
4.1.1	Généralités . . . . .	70
4.1.2	Sommes directes . . . . .	70
4.1.3	Sous-espaces supplémentaires . . . . .	71
4.1.4	Cas particulier de deux sous-espaces . . . . .	72
4.1.5	Applications linéaires et sommes directes . . . . .	72
4.2	Somme de sous-espaces vectoriels en dimension finie. . . . .	73
4.2.1	Base adaptée à un sous-espace . . . . .	73
4.2.2	Sommes directes et bases . . . . .	73
4.2.3	Dimension d'une somme de sous-espaces vectoriels . . . . .	74
4.2.4	Sous-espaces supplémentaires . . . . .	74
4.2.5	Dimension d'une somme de deux sous-espaces vectoriels . . . . .	75
4.3	Polynômes d'endomorphismes et de matrices. . . . .	75
4.3.1	$\mathbb{K}$ -algèbres . . . . .	75
4.3.2	Cas particulier des algèbres $\mathcal{L}(E)$ ou $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ . . . . .	77
4.3.3	Polynôme annulateur d'une matrice ou d'un endomorphisme . . . . .	77
4.3.4	Utilisation pratique d'un polynôme annulateur . . . . .	79
4.4	Matrices semblables, trace. . . . .	80
4.4.1	Trace d'une matrice . . . . .	80
4.4.2	Matrices semblables . . . . .	81
4.4.3	Trace d'un endomorphisme . . . . .	81
4.5	Opérations par blocs . . . . .	82
4.5.1	Cas général . . . . .	82
4.5.2	Cas particuliers des matrices carrées . . . . .	83
4.5.3	Interprétation des blocs . . . . .	83

## 5 Réduction des endomorphismes 85

5.1	Éléments propres d'un endomorphisme . . . . .	86
5.1.1	Valeurs propres et vecteurs propres . . . . .	86
5.1.2	Lien avec les polynômes annulateurs . . . . .	87

5.1.3	Sous-espaces propres . . . . .	88
5.2	Polynôme caractéristique d'un endomorphisme . . . . .	89
5.2.1	Caractérisation des valeurs propres en dimension finie . . . . .	89
5.2.2	Définition et lien avec les valeurs propres . . . . .	89
5.2.3	Ordre de multiplicité et dimension du sous-espace propre . . . . .	90
5.2.4	Endomorphisme scindé . . . . .	91
5.3	Éléments propres d'une matrice carrée . . . . .	91
5.3.1	Valeurs propres et vecteurs propres . . . . .	92
5.3.2	Lien avec les polynômes annulateurs . . . . .	92
5.3.3	Sous-espaces propres . . . . .	93
5.4	Polynôme caractéristique d'une matrice carrée . . . . .	94
5.4.1	Définition et lien avec les valeurs propres . . . . .	94
5.4.2	Ordre de multiplicité et dimension du sous-espace propre . . . . .	94
5.4.3	Matrice scindée . . . . .	95
5.5	Endomorphismes diagonalisables, matrices diagonalisables . . . . .	95
5.5.1	Définition . . . . .	95
5.5.2	Caractérisations équivalentes . . . . .	97
5.5.3	Lien avec le polynôme caractéristique . . . . .	98
5.6	Lien entre diagonalisabilité et polynômes annulateurs . . . . .	99
5.6.1	Racines du polynôme minimal . . . . .	99
5.6.2	Lemme des noyaux . . . . .	99
5.6.3	Application à la diagonalisabilité . . . . .	100
5.6.4	Diagonalisabilité d'un endomorphisme induit . . . . .	101
5.7	Quelques applications de la diagonalisation . . . . .	102
5.7.1	Puissances d'une matrice, suites récurrentes linéairement . . . . .	102
5.7.2	Systèmes d'équations différentielles . . . . .	103
5.8	Endomorphismes trigonalisables, matrices trigonalisables . . . . .	103
5.8.1	Définition et propriétés . . . . .	103
5.8.2	Caractérisation équivalente . . . . .	104

5.8.3	Théorème de Cayley-Hamilton . . . . .	105
5.8.4	Sous-espaces caractéristiques . . . . .	105
5.9	Endomorphismes nilpotents, matrices nilpotentes . . . . .	106
5.9.1	Généralités . . . . .	106
5.9.2	Éléments propres d'un nilpotent . . . . .	106
5.9.3	Application aux sous-espaces caractéristiques d'un endomorphisme . . . . .	107
<b>6</b>	<b>Intégrales généralisées</b>	<b>108</b>
	Fonctions continues par morceaux sur un intervalle . . . . .	109
6.1	Intégrales généralisées sur $[a ; +\infty[$ . . . . .	109
6.1.1	Définition et exemples fondamentaux . . . . .	109
6.1.2	Propriétés . . . . .	110
6.1.3	Cas des fonctions réelles positives . . . . .	111
6.1.4	Théorème de comparaison entre fonctions positives . . . . .	111
6.1.5	Lien avec les séries . . . . .	112
6.2	Intégrales généralisées sur d'autres types d'intervalles . . . . .	113
6.2.1	Intégrales généralisées sur $[a ; b[$ . . . . .	113
6.2.2	Intégrales généralisées sur $]a ; b]$ . . . . .	113
6.2.3	Intégrales généralisées sur $]a ; b[$ . . . . .	115
6.2.4	Propriétés communes à toutes ces intégrales . . . . .	115
6.3	Résumé pour étudier la convergence d'une intégrale . . . . .	118
6.4	Fonctions intégrables sur un intervalle. . . . .	118
6.4.1	Intégrales absolument convergentes . . . . .	119
6.4.2	Fonctions intégrables . . . . .	120
6.4.3	Théorème de comparaison des fonctions intégrables . . . . .	120
6.5	Intégration des relations de comparaison . . . . .	121
6.5.1	Théorème de comparaison par domination . . . . .	122
6.5.2	Théorème de comparaison par équivalence . . . . .	122
<b>7</b>	<b>Intégrales à paramètre</b>	<b>123</b>



7.1	Introduction . . . . .	123
7.2	Convergence simple . . . . .	124
7.2.1	Convergence simple d'une suite de fonctions . . . . .	124
7.2.2	Convergence simple d'une série de fonctions . . . . .	125
7.3	Suites et séries de fonctions intégrables . . . . .	125
7.3.1	Théorème de convergence dominée . . . . .	125
7.3.2	Théorème d'intégration terme à terme . . . . .	127
7.4	Fonctions définies par une intégrale à paramètre . . . . .	127
7.4.1	Continuité . . . . .	127
7.4.2	Dérivabilité . . . . .	128
7.5	Domination sur des sous-intervalles . . . . .	129
7.6	Complément : la fonction $\Gamma$ d'Euler. . . . .	131
<b>8</b>	<b>Espaces préhilbertiens réels</b>	<b>132</b>
<b>9</b>	<b>Endomorphismes dans un espace euclidien</b>	<b>133</b>
<b>10</b>	<b>Fonctions vectorielles</b>	<b>134</b>
<b>11</b>	<b>Suites et séries de fonctions</b>	<b>135</b>
<b>12</b>	<b>Séries entières</b>	<b>136</b>
<b>13</b>	<b>Probabilités</b>	<b>137</b>
13.1	Dénombrabilité . . . . .	137
13.1.1	Vocabulaire . . . . .	137
13.1.2	Exemples . . . . .	138
13.1.3	Quelques propriétés . . . . .	138
13.2	Espace probabilisé . . . . .	139
13.2.1	Univers d'une expérience aléatoire . . . . .	139
13.2.2	Tribu d'événements . . . . .	139
13.2.3	Probabilité . . . . .	141

13.2.4	Propriétés . . . . .	142
13.2.5	Probabilité discrète . . . . .	143
13.3	Probabilités conditionnelles . . . . .	144
13.3.1	Généralités . . . . .	144
13.3.2	Systèmes complets d'événements . . . . .	145
13.3.3	Formule des probabilités totales . . . . .	147
13.3.4	Formule de Bayes . . . . .	148
13.4	Indépendance . . . . .	149
13.4.1	Indépendance de deux événements . . . . .	149
13.4.2	Indépendance mutuelle . . . . .	150
<b>14</b>	<b>Variables aléatoires discrètes</b>	<b>151</b>
14.1	Variables aléatoires discrètes. . . . .	152
14.1.1	Définition . . . . .	152
14.1.2	Probabilité-image d'une variable aléatoire discrète . . . . .	152
14.1.3	Loi d'une variable aléatoire discrète . . . . .	153
14.1.4	Cas des variables aléatoires discrètes réelles ou complexes . . . . .	154
14.2	Espérance. . . . .	155
14.2.1	Définitions . . . . .	155
14.2.2	Propriétés . . . . .	156
14.2.3	Théorème de transfert . . . . .	157
14.2.4	Inégalité de Markov . . . . .	158
14.3	Variance d'une variable réelle . . . . .	158
14.3.1	Moments d'ordre 2 . . . . .	158
14.3.2	Variance et écart-type . . . . .	159
14.3.3	Inégalité de Bienaymé-Tchebychev . . . . .	160
14.3.4	Généralisation . . . . .	160
14.4	Lois classiques. . . . .	160
14.4.1	Loi uniforme . . . . .	160
14.4.2	Loi de Bernoulli . . . . .	161

14.4.3	Loi binomiale . . . . .	161
14.4.4	Loi géométrique . . . . .	162
14.4.5	Loi de Poisson . . . . .	163
14.5	Couples de variables aléatoires . . . . .	163
14.5.1	Généralités . . . . .	163
14.5.2	Lois marginales . . . . .	164
14.5.3	Lois conditionnelles . . . . .	165
14.5.4	Covariance . . . . .	166
14.6	Indépendance de variables aléatoires . . . . .	167
14.6.1	Généralités . . . . .	167
14.6.2	Espérance et indépendance . . . . .	168
14.6.3	Généralisation . . . . .	168
14.6.4	Théorème de réalisation . . . . .	170
14.6.5	Somme de variables indépendantes identiquement distribuées . . . . .	170
14.7	Loi faible des grands nombres . . . . .	171
14.8	Fonction génératrice d'une variable aléatoire à valeurs entières . . . . .	171
14.8.1	Généralités . . . . .	171
14.8.2	Lien entre espérance et fonction génératrice . . . . .	173
14.8.3	Fonction génératrice d'une somme de variables indépendantes . . . . .	173

## **15 Équations différentielles linéaires 174**

15.1	Équations et systèmes différentiels linéaires du premier ordre . . . . .	174
15.1.1	Généralités . . . . .	174
15.1.2	Problème de Cauchy . . . . .	176
15.1.3	Équation différentielle linéaire homogène . . . . .	177
15.1.4	Cas général . . . . .	178
15.2	Exponentielle d'un endomorphisme, d'une matrice . . . . .	178
15.2.1	Définition . . . . .	178
15.2.2	Propriétés algébriques . . . . .	179
15.2.3	Propriétés fonctionnelles . . . . .	180

15.3	Équations linéaires homogènes à coefficients constants . . . . .	180
15.3.1	Forme générale de la solution . . . . .	180
15.3.2	Cas praticable . . . . .	180
15.4	Équations différentielles linéaires scalaires d'ordre $n$ . . . . .	181
15.4.1	Généralités . . . . .	181
15.4.2	Représentation matricielle . . . . .	182
15.4.3	Équation différentielle linéaire homogène . . . . .	182
15.4.4	Cas général . . . . .	183
15.4.5	Diverses idées pour résoudre une équation différentielle linéaire d'ordre $n$ . . .	184
<b>II</b>	<b>Exercices</b>	<b>186</b>
<b>1</b>	<b>Espaces vectoriels normés</b>	<b>187</b>
<b>2</b>	<b>Séries numériques et vectorielles : révisions et compléments</b>	<b>196</b>
<b>3</b>	<b>Familles sommables</b>	<b>207</b>
<b>4</b>	<b>Rappels et compléments d'algèbre linéaire</b>	<b>210</b>
<b>5</b>	<b>Réduction des endomorphismes</b>	<b>219</b>
	Exercices . . . . .	219
	Problème – Matrices réelles sans valeur propre réelle . . . . .	233
	Un cas particulier simple . . . . .	234
	$(\beta) \implies (\alpha)$ . . . . .	234
	$(\alpha) \implies (\beta)$ . . . . .	234
	Un exemple . . . . .	235
	Application . . . . .	236
<b>6</b>	<b>Intégrales généralisées</b>	<b>238</b>
	Exercices . . . . .	238

Problème 1 – Calculs d'intégrales . . . . .	247
Intégrale de Gauss . . . . .	247
Des intégrales avec des logarithmes . . . . .	248
Problème 2 – Des inégalités entre intégrales . . . . .	248
Partie 1 . . . . .	248
Partie 2 . . . . .	249
Partie 3 . . . . .	249
<b>7 Intégrales à paramètre</b>	<b>251</b>
Exercices . . . . .	251
Problème 1 – CCINP 2013 – PC . . . . .	262
Étude de quelques suites d'intégrales . . . . .	263
Étude de séries de fonctions . . . . .	263
Problème 2 – CCINP 2022 – MP – Math 1. . . . .	265
Intégrales fonctions de leur borne . . . . .	265
Calcul des intégrales de Fresnel . . . . .	267
Étude d'une série de fonctions . . . . .	268
<b>8 Espaces préhilbertiens réels</b>	<b>270</b>
<b>9 Endomorphismes dans un espace euclidien</b>	<b>271</b>
Exercices . . . . .	271
Problème . . . . .	284
Notations . . . . .	284
Une norme sur $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ . . . . .	284
Sur les valeurs propres de $H_n$ . . . . .	286
Sur le déterminant de $H_n$ . . . . .	288
<b>10 Fonctions vectorielles</b>	<b>290</b>
<b>11 Suites et séries de fonctions</b>	<b>297</b>

<b>12 Séries entières</b>	<b>298</b>
<b>13 Probabilités</b>	<b>299</b>
<b>14 Variables aléatoires discrètes</b>	<b>300</b>
<b>15 Équations différentielles linéaires</b>	<b>301</b>

# Première partie

## Cours

# Chapitre 1

## Espaces vectoriels normés

### Sommaire

---

<b>1.1</b>	<b>Bornes supérieures, bornes inférieures</b>	<b>15</b>
1.1.1	Borne supérieure d'une partie de $\mathbb{R}$	15
1.1.2	Borne supérieure d'une application à valeurs dans $\mathbb{R}$	16
1.1.3	Règles pratiques	16
<b>1.2</b>	<b>Normes</b>	<b>17</b>
1.2.1	Définition	17
1.2.2	Exemples fondamentaux	18
1.2.3	Normes équivalentes	18
1.2.4	Boules	19
1.2.5	Parties bornées	20
<b>1.3</b>	<b>Convergence des suites</b>	<b>22</b>
1.3.1	Définition	22
1.3.2	Propriétés usuelles	22
1.3.3	Cas particulier en dimension finie	23
1.3.4	Point adhérent à une partie	24
<b>1.4</b>	<b>Limites de fonctions</b>	<b>25</b>
1.4.1	Définition	25
1.4.2	Caractérisation séquentielle de la limite	25
1.4.3	Propriétés usuelles	25
1.4.4	Cas particulier de la dimension finie	26
1.4.5	Composition des limites	27
1.4.6	Extensions des définitions	27
<b>1.5</b>	<b>Fonctions continues.</b>	<b>28</b>
1.5.1	Continuité en un point	28
1.5.2	Continuité sur une partie	29
1.5.3	Cas particulier de la dimension finie	29
1.5.4	Fonctions lipschitziennes	30
1.5.5	Continuité des applications linéaires et $n$ -linéaires	30
1.5.6	Norme subordonnée	32
<b>1.6</b>	<b>Topologie d'un espace vectoriel normé</b>	<b>33</b>
1.6.1	Intérieur d'une partie, voisinage d'un point	34
1.6.2	Parties ouvertes	34
1.6.3	Parties fermées	35
1.6.4	Ouverts ou fermés relatifs à une partie	37



1.6.5	Image réciproque d'un ouvert ou d'un fermé par une fonction continue . . .	37
1.6.6	Frontière d'une partie . . . . .	38
<b>1.7</b>	<b>Compacité.</b> . . . . .	<b>38</b>
1.7.1	Valeurs d'adhérence d'une suite . . . . .	38
1.7.2	Théorème de Bolzano-Weierstrass . . . . .	39
1.7.3	Parties compactes . . . . .	40
1.7.4	Théorème des bornes atteintes . . . . .	41
<b>1.8</b>	<b>Connexité par arcs</b> . . . . .	<b>43</b>
1.8.1	Chemin . . . . .	43
1.8.2	Parties connexes par arcs . . . . .	44
1.8.3	Théorème des valeurs intermédiaires . . . . .	44

---

Dans ce chapitre, la lettre  $\mathbb{K}$  désigne  $\mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ .

## 1.1 Bornes supérieures, bornes inférieures

### 1.1.1 Borne supérieure d'une partie de $\mathbb{R}$

On rappelle le théorème fondamental, dit « théorème (ou axiome) de la borne supérieure ».

---

#### Théorème 1.1

*Toute partie  $A$  de  $\mathbb{R}$ , non-vide et majorée, possède une borne supérieure, notée  $\sup A$ .*

*Toute partie  $A$  de  $\mathbb{R}$ , non-vide et minorée, possède une borne inférieure, notée  $\inf A$ .*

On dispose de caractérisations équivalentes de la borne supérieure.

---

#### Proposition 1.2

*Soient  $A$  une partie de  $\mathbb{R}$ , non-vide et majorée, et  $s$  un réel.*

*Alors il y a équivalence entre les propositions suivantes :*

- ▷  $s = \sup A$
- ▷  $\begin{cases} \forall a \in A, & a \leq s \\ \forall \varepsilon > 0, & \exists x \in A, & s - \varepsilon < x \leq s \end{cases}$
- ▷  $\begin{cases} \forall a \in A, & a \leq s \\ \exists (x_n) \in A^{\mathbb{N}}, & x_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} s \end{cases}$

On a évidemment les caractérisations associées à la borne inférieure.

### 1.1.2 Borne supérieure d'une application à valeurs dans $\mathbb{R}$

---

#### Définition 1.3

Soient  $X$  un ensemble non-vide et  $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$ .

Si  $f$  est majorée sur  $X$ , alors on appelle borne supérieure de  $f$  sur  $X$  le réel  $\sup f(X) = \sup_X f = \sup_{x \in X} f(x)$ .

Si  $f$  est minorée sur  $X$ , alors on appelle borne inférieure de  $f$  sur  $X$  le réel  $\inf f(X) = \inf_X f = \inf_{x \in X} f(x)$ .

On déduit de la Proposition 1.2 les caractérisations suivantes.

---

#### Proposition 1.4

Soient  $X$  un ensemble non-vide,  $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$  majorée sur  $X$  et  $s$  un réel.

Alors il y a équivalence entre les propositions suivantes :

- ▷  $s = \sup_X f$
- ▷  $\begin{cases} \forall x \in X, f(x) \leq s \\ \forall \varepsilon > 0, \exists x \in X, s - \varepsilon < f(x) \leq s \end{cases}$
- ▷  $\begin{cases} \forall x \in X, f(x) \leq s \\ \exists (x_n) \in X^{\mathbb{N}}, f(x_n) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} s \end{cases}$

### 1.1.3 Règles pratiques

D'abord, des évidences auxquelles on ne pense pas toujours.

---

#### Proposition 1.5

Soit  $A$  une partie de  $\mathbb{R}$ , non-vide et majorée. Alors  $\forall a \in A, a \leq \sup A$ .

Soient  $X$  un ensemble non-vide et  $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$  majorée sur  $X$ . Alors  $\forall x \in X, f(x) \leq \sup_X f$ .

En pratique, on n'a pas souvent besoin de connaître la valeur exacte d'une borne supérieure, on a plus souvent besoin de la majorer.

---

#### Proposition 1.6

- ▷ Soient  $A$  une partie de  $\mathbb{R}$ , non-vide et majorée, et  $M$  un réel.  
Pour montrer  $\sup A \leq M$ , il suffit de montrer  $\forall a \in A, a \leq M$ .
- ▷ Soient  $X$  un ensemble non-vide,  $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$  majorée sur  $X$  et  $M$  un réel.  
Pour montrer  $\sup_X f \leq M$ , il suffit de montrer  $\forall x \in X, f(x) \leq M$ .

Multiplication par un réel positif.

---

**Proposition 1.7**

Soient  $X$  un ensemble non-vide et  $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$  majorée sur  $X$ .

Alors pour tout  $\lambda \geq 0$ ,  $\sup_X (\lambda f) = \lambda \sup_X f$ .

Attention ! C'est bien sûr faux si  $\lambda < 0$ .

## 1.2 Normes

### 1.2.1 Définition

---

**Définition 1.8**

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

On appelle norme sur  $E$  toute application  $N : E \longrightarrow \mathbb{R}_+$  telle que :

- ▷ pour tout  $x \in E$ ,  $N(x) = 0 \iff x = 0$  (séparation)
- ▷ pour tout  $x \in E$ , pour tout  $\lambda \in \mathbb{K}$ ,  $N(\lambda x) = |\lambda| N(x)$  (homogénéité)
- ▷ pour tout  $(x, y) \in E^2$ ,  $N(x + y) \leq N(x) + N(y)$  (inégalité triangulaire).

Un espace vectoriel est dit espace vectoriel normé quand on lui associe une norme.

On déduit de l'inégalité triangulaire une inégalité classique (souvent appelée aussi inégalité triangulaire) :

$$\text{pour tout } (x, y) \in E^2, \quad |N(x) - N(y)| \leq N(x - y).$$

Si  $N$  est une norme sur  $E$ , alors on peut définir une distance entre deux vecteurs de  $E$  :  $d(u, v) = N(u - v)$ .

On définit ainsi une application  $d : E^2 \longrightarrow \mathbb{R}_+$  telle que :

- ▷ pour tout  $(x, y) \in E^2$ ,  $d(y, x) = d(x, y)$  (symétrie)
- ▷ pour tout  $(x, y) \in E^2$ ,  $d(x, y) = 0 \iff x = y$  (séparation)
- ▷ pour tout  $(x, y, z) \in E^3$ ,  $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$  (inégalité triangulaire).

## 1.2.2 Exemples fondamentaux

- La valeur absolue dans  $\mathbb{R}$  et le module dans  $\mathbb{C}$  sont des normes.
- La norme euclidienne habituelle en géométrie plane ou spatiale est une norme.
- Plus généralement, si  $\langle \cdot | \cdot \rangle$  est un produit scalaire sur  $E$ , la norme euclidienne associée  $x \mapsto \sqrt{\langle x | x \rangle}$  est une norme au sens précédent.
- Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie. On choisit une base de  $E$   $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ . Si  $v$  est un vecteur de  $E$ , on note  $(v_1, \dots, v_n)$  les coordonnées de  $v$  dans la base  $\mathcal{B}$ . On définit classiquement trois normes sur  $E$  :

$$\|v\|_\infty = \max_{i \in \llbracket 1; n \rrbracket} |v_i| \quad \|v\|_1 = \sum_{i=1}^n |v_i| \quad \|v\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n |v_i|^2}$$

appelées respectivement norme infinie ou norme sup, norme 1 et norme 2.

Cas particulier :  $E = \mathbb{R}^n$  muni de la base canonique.

Cas particulier :  $E = \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$  muni de la base canonique. Si  $A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$  est une matrice de  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ , alors

$$\|A\|_\infty = \max_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} |a_{ij}| \quad \|A\|_1 = \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} |a_{ij}| \quad \|A\|_2 = \sqrt{\sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} |a_{ij}|^2}$$

- Soient  $X$  un ensemble et  $E$  l'ensemble des applications bornées de  $X$  dans  $\mathbb{K}$ . La norme sup sur  $E$  est définie par  $\|f\|_\infty = \sup_{x \in X} |f(x)|$ .  
Cas particulier : si  $X = \mathbb{N}$ ,  $E$  est l'ensemble des suites bornées et  $\|u\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |u_n|$ .

---

### Proposition 1.9

Soient  $E, F$  deux espaces vectoriels normés.

L'application de  $E \times F$  dans  $\mathbb{R}_+$  qui à  $(x, y)$  associe  $\max(\|x\|_E, \|y\|_F)$  est une norme.

Autrement dit, le produit de deux espaces vectoriels normés est encore un espace vectoriel normé, résultat qui se généralise par récurrence à un nombre quelconque (fini) d'espaces vectoriels normés.

## 1.2.3 Normes équivalentes

---

### Définition 1.10

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $N_1, N_2$  deux normes sur  $E$ .

On dit que  $N_1$  et  $N_2$  sont équivalentes quand il existe deux constantes strictement positives  $a, b$  telles que pour tout  $v \in E$ ,  $aN_1(v) \leq N_2(v) \leq bN_1(v)$ .

---

**Exercice 1.11**

Montrez que si  $E$  est de dimension finie, les trois normes  $\|\cdot\|_\infty$ ,  $\|\cdot\|_1$  et  $\|\cdot\|_2$  sont équivalentes.

---

**Exercice 1.12**

Soient  $E = \mathbb{R}[X]$  et  $P = \sum_{i=0}^n a_i X^i \in E$ . On pose  $N_1(P) = \sum_{i=0}^n |a_i|$  et  $N_\infty(P) = \max_{0 \leq i \leq n} |a_i|$ .

Montrez que  $N_1$  et  $N_\infty$  sont des normes sur  $E$ .

Montrez qu'elles ne sont pas équivalentes en considérant la suite des polynômes  $P_n = \sum_{i=0}^n X^i$ .

Le résultat suivant est fondamental.

---

**Théorème 1.13**

Si  $E$  est un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie, alors toutes les normes sur  $E$  sont équivalentes.

Quand on est en dimension finie, cela signifie que tous les résultats qu'on peut démontrer pour une norme sont à facteurs près valables pour n'importe quelle norme, autrement dit cela nous permettra de choisir la norme que l'on préfère si on ne nous l'impose pas.

Dans toute la suite,  $E$  est un espace vectoriel normé par la norme  $\|\cdot\|$ .

## 1.2.4 Boules

---

**Définition 1.14**

Soient  $a \in E$  et  $r \in \mathbb{R}_+^*$ .

On appelle boule ouverte de centre  $a$  et de rayon  $r$  l'ensemble noté  $B(a, r)$  défini de la façon suivante :

$$B(a, r) = \{v \in E \mid \|v - a\| < r\}.$$

On appelle boule fermée de centre  $a$  et de rayon  $r$  l'ensemble noté (généralement)  $\overline{B}(a, r)$  :

$$\overline{B}(a, r) = \{v \in E \mid \|v - a\| \leq r\}.$$

On appelle sphère de centre  $a$  et de rayon  $r$  l'ensemble (généralement) noté  $S(a, r)$  :

$$S(a, r) = \{v \in E \mid \|v - a\| = r\}.$$

On appelle boule-unité la boule de centre 0 et de rayon 1, sphère-unité la sphère de centre 0 et de rayon 1.

---

**Exercice 1.15**

Que sont les boules dans  $\mathbb{R}$  ? Que sont les sphères dans  $\mathbb{R}$  ?

---

**Exercice 1.16**

On prend  $E = \mathbb{R}^2$  et on définit les normes infinie, 1 et 2 relativement à la base canonique.

Représentez graphiquement les boules-unités pour chacune de ces trois normes.

---

**Exercice 1.17**

Montrez que toute boule ouverte est contenue dans une boule fermée et contient une boule fermée de mêmes centres.

Montrez la même chose en inversant les mots « ouverte » et « fermée ».

---

**Définition 1.18**

Soit  $(x, y) \in E^2$ . On note  $[xy] = \{tx + (1 - t)y \mid t \in [0 ; 1]\}$ , appelé segment (géométrique) d'extrémités  $x$  et  $y$ .

Une partie  $A$  de  $E$  est dite convexe quand pour tout  $(x, y) \in A^2$ ,  $[xy] \subseteq A$ .

On a :

$$A \text{ est convexe} \iff \forall (x, y) \in A^2, \forall t \in [0 ; 1], tx + (1 - t)y \in A.$$

---

**Proposition 1.19**

*Les boules (ouvertes ou fermées) sont des parties convexes.*

*Les sphères ne sont jamais convexes.*

*Dans  $\mathbb{R}$ , les convexes sont les intervalles.*

## 1.2.5 Parties bornées

---

**Définition 1.20**

On dit qu'une partie  $A$  de  $E$  est bornée quand il existe une boule qui la contient.

---

**Exercice 1.21**

Montrez que  $A$  est bornée ssi  $A$  est contenue dans une boule de centre 0.

Plus généralement, on choisit arbitrairement un point de  $E$ , noté  $x$ . Montrez l'équivalence  $A$  est bornée ssi  $A$  est contenue dans une boule de centre  $x$ .

---

**Exercice 1.22**

Montrez qu'en dimension finie, cette définition ne dépend pas de la norme.

---

**Proposition 1.23**

Une partie  $A$  de  $E$  n'est pas bornée ssi il existe une suite  $(v_n)$  à termes dans  $A$  telle que  $\|v_n\| \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$ .

---

**Exercice 1.24**

Dans  $E = \mathbb{R}^2$ , on pose  $A = \{(x, y) \mid x^4 + y^4 = 20\}$  :  $A$  est-elle bornée ? Si oui, pour chacune des normes infinie, 1 et 2, donnez un rayon d'une boule centrée en 0 qui contient  $A$ .

---

**Exercice 1.25**

Même question avec  $E = \mathbb{C}^2$ .

---

**Exercice 1.26**

Dans  $E = \mathbb{R}^3$ , on pose  $B = \{(x, y, z) \mid x^2 + 3y^2 + 4z^2 + 2xy + 2xz - 2yz \leq 42\}$  :  $B$  est-elle bornée ? Si oui, pour chacune des normes infinie, 1 et 2, donnez un rayon d'une boule centrée en 0 qui contient  $B$ .

---

**Exercice 1.27**

Dans  $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ , on note  $\mathcal{P}$  l'ensemble des matrices de projecteurs :  $\mathcal{P}$  est-il borné ?

---

**Définition 1.28**

On dit qu'une suite  $v$  à termes dans  $E$  est bornée quand l'ensemble de ses valeurs est borné, autrement dit quand il existe  $M > 0$  tel que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $\|v_n\| \leq M$ .

On dit qu'une fonction  $f$  d'un ensemble  $X$  dans  $E$  est bornée quand l'ensemble de ses valeurs prises sur  $X$  est borné, autrement dit quand il existe  $M > 0$  tel que pour tout  $x \in X$ ,  $\|f(x)\| \leq M$ .

---

**Exercice 1.29**

Soit  $u$  une suite complexe arithmético-géométrique de raison  $a$ . À quelle condition est-elle bornée ?

---

**Exercice 1.30**

Soient  $B, B'$  deux boules de  $E$ . Si  $(x, x') \in E^2$ , on pose  $f(x, x') = d(x, x')$ . Montrez que  $f$  est bornée sur  $B \times B'$ .

---

## 1.3 Convergence des suites

Dans cette section,  $E$  désigne un espace vectoriel normé par la norme  $\| \cdot \|$ .

### 1.3.1 Définition

---

**Définition 1.31**

Soient  $u = (u_n)$  une suite à termes dans  $E$  et  $\ell \in E$ .

On dit que la suite  $u$  converge vers  $\ell$  quand toute boule ouverte de centre  $\ell$  contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, u_n \in B(\ell, \varepsilon).$$

---

**Proposition 1.32**

Dans la définition, on peut remplacer les boules ouvertes par des boules fermées.

On peut réécrire la définition sous deux formes équivalentes :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, \|u_n - \ell\| < \varepsilon$$

ou

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, \|u_n - \ell\| \leq \varepsilon.$$

On peut donc se ramener aux suites réelles positives : la suite vectorielle  $u$  converge vers  $\ell$  ssi la suite réelle  $(\|u_n - \ell\|)$  converge vers 0.

Une suite qui ne converge vers aucun élément de  $E$  est dite divergente.

### 1.3.2 Propriétés usuelles

---

**Proposition 1.33 (Unicité de la limite)**

Si une suite  $u \in E^{\mathbb{N}}$  converge vers  $\ell \in E$ , elle ne peut converger vers un autre point de  $E$ .

On peut donc noter classiquement  $\ell = \lim u = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$  ou  $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell$ .

---

**Proposition 1.34**

Si une suite  $u \in E^{\mathbb{N}}$  converge, alors elle est bornée.



---

**Théorème 1.35 (Opérations sur les suites convergentes)**

Soient  $u, v \in E^{\mathbb{N}}$  convergeant respectivement vers  $\ell$  et  $m$  deux éléments de  $E$ .

Alors pour tout  $(a, b) \in \mathbb{K}^2$ , la suite  $au + bv$  converge vers  $a\ell + bm$ .

Soit  $\alpha \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$  convergeant vers  $\lambda \in \mathbb{K}$ .

Alors la suite  $\alpha u$  converge vers  $\lambda\ell$ .

---

**Proposition 1.36**

Toute suite extraite d'une suite convergente converge vers la même limite.

Quasi-réciproque : si  $u$  est une suite telle que les deux suites extraites  $(u_{2n})$  et  $(u_{2n+1})$  convergent vers la même limite  $\ell$ , alors  $u$  converge vers  $\ell$ .

---

**Proposition 1.37**

Dans un produit de deux espaces vectoriels normés  $E \times F$ , une suite  $(u_n) = ((a_n, b_n))$  converge ssi les suites  $(a_n)$  et  $(b_n)$  convergent dans  $E$ , respectivement  $F$ .

Dans ce cas,  $\lim (a_n, b_n) = (\lim a_n, \lim b_n)$ .

Ce résultat se généralise sans difficulté par récurrence à un nombre quelconque (fini) d'espaces vectoriels normés.

---

### 1.3.3 Cas particulier en dimension finie

Dans cette partie, on suppose que  $E$  est de dimension finie.

---

**Définition 1.38**

Soit  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  une base de  $E$ .

Pour  $i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$ , on appelle  $i$ -ème forme coordonnée (relative à la base  $\mathcal{B}$ ), notée souvent  $d_i$ , la forme linéaire qui à un vecteur associe sa  $i$ -ème coordonnée dans la base  $\mathcal{B}$  :

$$\text{pour tout } v \in E, \quad v = \sum_{i=1}^n d_i(v) e_i.$$

---

**Théorème 1.39**

Soit  $\mathcal{B}$  une base de  $E$ .

Une suite  $u \in E^{\mathbb{N}}$  converge vers  $\ell \in E$  ssi pour toute forme coordonnée  $d$  relative à  $\mathcal{B}$ , la suite  $(d(u_n))$  converge vers  $d(\ell)$ .

Autrement dit, une suite converge ssi ses suites-coordonnées dans n'importe quelle base convergent.

Dans ce cas, la limite de la suite  $u$  est le vecteur  $\ell$  tel que pour toute forme coordonnée  $d$ ,  $d(\ell) = \lim_{n \rightarrow +\infty} d(u_n)$ .

---

Exemple 1.40

Si  $M_n = \begin{pmatrix} 1 & e^{-n} \\ 1/n & n \sin(1/n) \end{pmatrix}$ , alors la suite de matrices  $(M_n)$  converge vers la matrice  $I_2$ .

---

**Corollaire 1.41**

*Si  $E$  est de dimension finie, la convergence d'une suite ne dépend pas du choix de la norme. On peut donc choisir la norme qu'on veut.*

### 1.3.4 Point adhérent à une partie

---

**Définition 1.42**

Soient  $A$  une partie de  $E$  et  $x \in E$ .

On dit que  $x$  est un point adhérent à  $A$  quand il existe une suite  $u \in A^{\mathbb{N}}$  qui converge vers  $x$ .

L'adhérence de  $A$  est l'ensemble de ses points adhérents, noté  $\overline{A}$ .

Intuitivement, l'adhérence d'une partie est elle-même à laquelle on ajoute tous les points qui se trouvent sur son bord.

---

**Exercice 1.43**

Quelle est l'adhérence d'une boule ouverte ?

---

**Exercice 1.44**

Quelle est l'adhérence de  $\mathbb{Z}$  dans  $\mathbb{R}$  ?

---

**Proposition 1.45**

*Soient  $A$  une partie de  $E$  et  $x \in E$ .*

*Alors  $x$  est adhérent à  $A$  ssi toute boule centrée en  $x$  rencontre  $A$ .*

*De manière formalisée :  $x \in \overline{A} \iff \forall r > 0, \exists y \in A, y \in B(x, r)$ .*

On peut donner la définition de la densité d'une partie.

---

**Définition 1.46**

On dit qu'une partie  $A$  est dense dans  $E$  quand  $\overline{A} = E$ , c'est-à-dire qu'on peut trouver des éléments de  $A$  aussi proches de n'importe quel point.

---

Exemple 1.47

- ▷ Dans  $\mathbb{R}$ ,  $\mathbb{Q}$  et  $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$  sont denses (cf. cours de première année).
- ▷  $GL_n(\mathbb{K})$  est dense dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  (démonstration ultérieure).

## 1.4 Limites de fonctions

Dans cette section,  $E$  et  $F$  sont deux espaces vectoriels normés par les normes  $\|\cdot\|_E$  et  $\|\cdot\|_F$ .

### 1.4.1 Définition

---

**Définition 1.48**

Soient  $f$  une fonction de  $E$  dans  $F$ ,  $D$  son ensemble de définition,  $a \in \overline{D}$  et  $\ell \in F$ .

On dit que  $f$  a pour limite  $\ell$  en  $a$  quand

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in D, \|x - a\|_E < \eta \implies \|f(x) - \ell\|_F < \varepsilon.$$

---

*Remarque 1.49*

On peut remplacer les inégalités strictes sur les normes par des inégalités larges.

On peut réécrire la définition à l'aide de boules ouvertes (ou fermées) :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in D \cap B(a, \eta), f(x) \in B(\ell, \varepsilon).$$

Si  $E$  et  $F$  sont de dimension finie, cette définition ne dépend pas du choix des normes.

### 1.4.2 Caractérisation séquentielle de la limite

---

**Théorème 1.50**

Soient  $f$  une fonction de  $E$  dans  $F$ ,  $D$  son ensemble de définition,  $a \in \overline{D}$  et  $\ell \in F$ .

$f$  a pour limite  $\ell$  en  $a$  ssi pour toute suite  $u$  à termes dans  $D$  convergeant vers  $a$ , la suite  $f \circ u = (f(u_n))$  converge vers  $\ell$ .

En pratique, on utilise beaucoup plus souvent le sens direct de l'équivalence précédente.

### 1.4.3 Propriétés usuelles

---

**Proposition 1.51 (Unicité de la limite)**

Soient  $f$  une fonction de  $E$  dans  $F$ ,  $D$  son ensemble de définition,  $a \in \overline{D}$  et  $\ell \in F$ .

Si  $f$  a pour limite  $\ell$  en  $a$ , alors elle ne peut avoir d'autre limite que  $\ell$  en  $a$ .

On peut donc noter classiquement  $\ell = \lim_a f = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$  ou  $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$ .

---

**Proposition 1.52**

*Si  $f$  a pour limite  $\ell$  en  $a$ , alors elle est bornée au voisinage de  $a$ .*

---

**Théorème 1.53 (Opérations sur les limites)**

*Soient  $f$  et  $g$  deux fonctions de  $E$  dans  $F$ , définies sur la même partie  $D$  et ayant respectivement pour limites  $\ell$  et  $m$  deux éléments de  $F$  en  $a \in \overline{D}$ .*

*Alors pour tout  $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$ , la fonction  $\lambda f + \mu g$  a pour limite  $\lambda \ell + \mu m$  en  $a$ .*

*Soient  $\alpha$  une fonction de  $E$  dans  $\mathbb{K}$  et  $f$  une fonction définie de  $E$  dans  $F$ , définies sur la même partie  $D$  et ayant respectivement pour limites  $\beta \in \mathbb{K}$  et  $\ell \in F$  en  $a \in \overline{D}$ .*

*Alors  $\alpha f$  a pour limite  $\beta \ell$  en  $a$ .*

---

**Proposition 1.54**

*Une fonction  $f = (g, h)$  à valeurs dans un produit d'espaces vectoriels normés a une limite ssi  $g$  et  $h$  ont chacune une limite.*

*Dans ce cas,  $\lim_a f = \left( \lim_a g, \lim_a h \right)$ .*

*Ce résultat se généralise sans difficulté par récurrence à un nombre quelconque (fini) d'espaces vectoriels normés.*

---

### 1.4.4 Cas particulier de la dimension finie

---

**Théorème 1.55**

*On suppose que  $F$  est de dimension finie. Soit  $\mathcal{B}$  une base de  $F$ .*

*Soit  $f$  une fonction de  $E$  dans  $F$ ,  $D$  son ensemble de définition,  $a \in \overline{D}$  et  $\ell \in F$ .*

*La fonction  $f$  a pour limite  $\ell$  en  $a$  ssi pour toute forme coordonnée  $d$  relative à  $\mathcal{B}$ , la fonction  $d \circ f$  a pour limite  $d(\ell)$  en  $a$ .*

*Autrement dit, une fonction a une limite en  $a$  ssi ses fonctions-coordonnées dans n'importe quelle base ont chacune une limite en  $a$ .*

*Dans ce cas, la limite de la fonction  $f$  en  $a$  est le vecteur  $\ell$  tel que pour tout forme coordonnée  $d$ ,  $d(\ell) = \lim_{x \rightarrow a} d(f(x))$ .*

### 1.4.5 Composition des limites

$G$  désigne un troisième espace vectoriel normé.

---

**Théorème 1.56**

Soient  $f$  une fonction de  $E$  dans  $F$  et  $D_f$  son ensemble de définition. Soient  $g$  une fonction de  $F$  dans  $G$  et  $D_g$  son ensemble de définition. On suppose que  $f(D_f) \subseteq D_g$  (condition qui permet de définir la composée  $g \circ f$  sur  $D_f$ ).

Soient  $a \in \overline{D_f}$ ,  $b \in \overline{D_g}$  et  $\ell \in G$ .

Si  $f$  a pour limite  $b$  en  $a$  et  $g$  a pour limite  $\ell$  en  $b$ , alors  $g \circ f$  a pour limite  $\ell$  en  $a$ .

Autrement dit, si  $\begin{cases} f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} b \\ g(y) \xrightarrow{y \rightarrow b} \ell \end{cases}$  alors  $g \circ f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$ .

### 1.4.6 Extensions des définitions

D'abord les limites infinies en un point dans le cas où l'espace d'arrivée est  $\mathbb{R}$ .

---

**Définition 1.57**

Soient  $f$  une fonction de  $E$  dans  $\mathbb{R}$ ,  $D$  son ensemble de définition et  $a \in \overline{D}$ .

On dit que  $f$  a pour limite  $+\infty$  en  $a$  quand

$$\forall M > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in D, \|x - a\|_E \leq \eta \implies f(x) \geq M.$$

On dit que  $f$  a pour limite  $-\infty$  en  $a$  quand

$$\forall M < 0, \exists \eta > 0, \forall x \in D, \|x - a\|_E \leq \eta \implies f(x) \leq M.$$

Puis les limites en « l'infini ».

---

**Définition 1.58**

Soient  $f$  une application de  $E$  dans  $F$  et  $\ell \in F$ .

On dit que  $f$  a pour limite  $\ell$  quand  $\|x\|$  tend vers l'infini quand

$$\forall \varepsilon > 0, \exists B > 0, \forall x \in E, \|x\|_E \geq B \implies \|f(x) - \ell\|_F \leq \varepsilon.$$

Dans le cas où  $F = \mathbb{R}$ , on dit que  $f(x)$  a pour limite  $+\infty$  quand  $\|x\|$  tend vers l'infini quand

$$\forall M > 0, \exists B > 0, \forall x \in E, \|x\|_E \geq B \implies f(x) \geq M.$$

(Définition semblable pour la limite  $-\infty$ ).

Enfin, dans le cas où l'espace de départ est  $\mathbb{R}$ , on peut parler de limite en l'infini au sens habituel.

---

**Définition 1.59**

Soient  $f$  une fonction de  $\mathbb{R}$  dans  $F$ , définie sur un ouvert  $]B; +\infty[$  et  $\ell \in F$ .

On dit que  $f(x)$  a pour limite  $\ell$  quand  $x$  tend vers  $+\infty$  quand

$$\forall \varepsilon > 0, \exists B > 0, \forall x \geq B, \|f(x) - \ell\| \leq \varepsilon.$$

(Définition semblable pour la limite  $x$  tend vers  $-\infty$ ).

## 1.5 Fonctions continues

Dans cette section,  $E$  et  $F$  sont des espaces vectoriels normés par les normes  $\|\cdot\|_E$  et  $\|\cdot\|_F$ .

### 1.5.1 Continuité en un point

---

**Proposition 1.60**

Soient  $f$  une fonction de  $E$  dans  $F$ ,  $D$  son ensemble de définition,  $a \in \overline{D}$  et  $\ell \in F$ .

Si  $f$  a pour limite  $\ell$  en  $a$  et si  $a \in D$ , alors  $\ell = f(a)$ .

Dans ce cas, on dit que la fonction  $f$  est continue en  $a$ .

---

**Définition 1.61**

Soient  $f$  une fonction de  $E$  dans  $F$ ,  $D$  son ensemble de définition et  $a \in D$ .

On dit que  $f$  est continue en  $a$  quand  $f$  a pour limite  $f(a)$  en  $a$ .

On déduit de cette définition et des théorèmes précédents

- la caractérisation séquentielle de la continuité en un point ;
- le fait qu'une fonction continue en un point est bornée au voisinage de ce point ;
- les théorèmes d'opérations et de compositions des fonctions continues en un point ;
- l'équivalence entre la continuité d'une fonction et celle de ses fonctions-coordonnées dans une certaine base de  $F$  dans le cas où  $F$  est de dimension finie.

## 1.5.2 Continuité sur une partie

---

### Définition 1.62

Soient  $f$  une fonction de  $E$  dans  $F$ ,  $D$  son ensemble de définition et  $A \subseteq D$ .

On dit que  $f$  est continue sur  $A$  quand  $f$  est continue en tout point de  $A$ .

On déduit de cette définition et des théorèmes précédents

- les théorèmes d'opérations et de compositions des fonctions continues sur une partie ;
  - l'équivalence entre la continuité d'une fonction et celle de ses fonctions-coordonnées dans une certaine base de  $F$  dans le cas où  $F$  est de dimension finie.
- 

### Proposition 1.63

Soient  $f$  et  $g$  deux fonctions de  $E$  dans  $F$  définies sur  $D$  et  $A \subseteq D$ .

Si  $A$  est dense dans  $D$ ,  $f$  et  $g$  sont continues sur  $D$  et  $f = g$  sur  $A$ , alors  $f = g$  sur  $D$ .

## 1.5.3 Cas particulier de la dimension finie

On suppose que  $E$  et  $F$  sont de dimensions finies.

Dans une base donnée, les formes coordonnées relatives à cette base sont en particulier des applications continues.

Donc toute fonction  $f$  de  $E$  dans  $F$  dont les fonctions-coordonnées  $(f_1, \dots, f_n)$  dans une base de  $F$  sont définies polynomialement à partir des formes coordonnées dans une base de  $E$  est continue.

---

### Exemple 1.64

- La fonction  $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$  telle que  $f(x, y) = (x^2 + y^2, xy - (1 + x)^3)$  est continue sur  $\mathbb{R}^2$ .
  - Les applications trace et déterminant définies sur  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  sont continues.
- 

### Exercice 1.65

Montrez que l'application  $A \longmapsto A^2$  est continue de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  dans lui-même.

---

### Exercice 1.66

En admettant (momentanément) que  $\text{GL}_n(\mathbb{K})$  est un ouvert, montrez que l'application  $A \longmapsto A^{-1}$  est continue de  $\text{GL}_n(\mathbb{K})$  dans lui-même.

### 1.5.4 Fonctions lipschitziennes

---

#### Définition 1.67

Soient  $f$  une application de  $E$  dans  $F$ ,  $A$  une partie de  $E$  et  $K \in \mathbb{R}_+$ .

On dit que  $f$  est  $K$ -lipschitzienne sur  $A$  (ou lipschitzienne de rapport  $K$ ) quand

$$\forall (x, y) \in A^2, \quad \|f(y) - f(x)\|_F \leq K \|y - x\|_E.$$

On dit que  $f$  est lipschitzienne sur  $A$  quand il existe  $K \in \mathbb{R}_+$  tel que  $f$  soit  $K$ -lipschitzienne sur  $A$ .

---

#### Remarque 1.68

Si  $f$  est  $K$ -lipschitzienne sur  $A$ , alors le rapport  $K$  n'est pas unique, puisque pour tout  $L \geq K$ , on a encore  $f$   $L$ -lipschitzienne sur  $A$ .

---

#### Proposition 1.69

*Toute fonction lipschitzienne est continue.*

Mais la réciproque est fausse (contre-exemple : la fonction  $\sqrt{\cdot}$  sur  $[0 ; +\infty[$ ).

Un exemple fondamental : la fonction  $x \mapsto d(x, A)$ .

---

#### Définition 1.70

Soit  $A$  une partie de  $E$ .

Pour  $x \in E$ , on appelle distance de  $x$  à  $A$  le réel  $\inf_{a \in A} d(x, a)$ .

---

#### Proposition 1.71

*Pour toute partie  $A$  de  $E$ , la fonction  $x \mapsto d(x, A)$  est 1-lipschitzienne.*

*L'adhérence de  $A$  est l'ensemble des points à distance nulle de  $A$ , i.e. tels que  $d(x, A) = 0$ .*

### 1.5.5 Continuité des applications linéaires et $n$ -linéaires



---

**Proposition 1.72**

Soit  $f \in \mathcal{L}(E, F)$ .

Il y a équivalence entre les propositions suivantes :

- ▷  $f$  est continue en 0 ;
- ▷  $f$  est continue en un point  $x$  ;
- ▷  $f$  est continue sur  $E$  ;
- ▷  $f$  est lipschitzienne sur  $E$  ;
- ▷ il existe  $K \geq 0$  tel que pour tout  $x \in E$ ,  $\|f(x)\|_F \leq K \|x\|_E$  ;
- ▷  $f$  est bornée sur la boule-unité ;
- ▷  $f$  est bornée sur une boule.

---

**Exercice 1.73**

On pose  $E = \mathcal{C}^0([0; 1], \mathbb{R})$  muni de la norme infinie.

L'application  $f \mapsto \int_0^1 f(t) dt$  est-elle continue sur  $E$  ?

---

**Exercice 1.74**

$E$  désigne le même espace et on pose  $\|f\|_1 = \int_0^1 |f(t)| dt$ .

Montrez que  $\|\cdot\|_1$  est une norme sur  $E$ .

L'application  $f \mapsto f(1)$  est-elle continue sur  $E$  ?

---

**Définition 1.75**

On note  $\mathcal{L}_c(E, F)$  l'ensemble des applications linéaires continues de  $E$  dans  $F$ .

---

**Proposition 1.76**

$\mathcal{L}_c(E, F)$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathcal{L}(E, F)$ , en général distinct de  $\mathcal{L}(E, F)$ .

Cas particulier en dimension finie.

---

**Théorème 1.77**

*On suppose que  $E$  est de dimension finie.*

*Toute application linéaire de  $E$  dans  $F$  est lipschitzienne sur  $E$ , donc continue.*

*Autrement dit, si  $E$  est de dimension finie, alors  $\mathcal{L}_c(E, F) = \mathcal{L}(E, F)$ .*

---

**Remarque 1.78**

L'hypothèse de dimension finie de  $E$  est indispensable. Dans le cas contraire, c'est faux en général.

Le résultat précédent s'étend aux applications multilinéaires.

---

**Théorème 1.79**

*Soient  $E_1, \dots, E_n$  des espaces vectoriels normés de dimensions finies et  $f : E_1 \times \dots \times E_n \longrightarrow F$  une application  $n$ -linéaire.*

*Il existe alors une constante  $K \geq 0$  telle que*

$$\text{pour tout } (x_1, \dots, x_n) \in E_1 \times \dots \times E_n, \quad \|f(x_1, \dots, x_n)\| \leq K \|x_1\|_{E_1} \dots \|x_n\|_{E_n}.$$

---

**Corollaire 1.80**

*Soient  $E_1, \dots, E_n$  des espaces vectoriels normés de dimensions finies.*

*Toute application  $f : E_1 \times \dots \times E_n \longrightarrow F$  qui est  $n$ -linéaire est continue sur  $E_1 \times \dots \times E_n$ .*

---

**Exemple 1.81**

- Le produit matriciel de  $\mathcal{M}_{np}(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_{pq}(\mathbb{K})$  dans  $\mathcal{M}_{nq}(\mathbb{K})$  est bilinéaire, donc continu.
- Un produit scalaire dans un espace euclidien est bilinéaire, donc continu.
- Le déterminant dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  est  $n$ -linéaire par rapport aux colonnes, donc il est continu.

## 1.5.6 Norme subordonnée

On définit sur l'espace vectoriel  $\mathcal{L}_c(E, F)$  des applications linéaires continues de  $E$  dans  $F$  la notion de norme subordonnée (relative aux deux normes sur  $E$  et  $F$ ) ou norme triple.

---

**Définition 1.82**

Soit  $f \in \mathcal{L}_c(E, F)$ .

On pose  $\|f\| = \sup_{x \in B(0,1)} \|f(x)\|$ , appelée la norme subordonnée de  $f$ .

---

**Proposition 1.83**

Soit  $f \in \mathcal{L}_c(E, F)$ .

Alors  $\|f\|$  est

- ▷ égal à  $\sup_{x \neq 0} \frac{\|f(x)\|}{\|x\|}$ , mais aussi à  $\sup_{x \in S(0,1)} \|f(x)\|$  ;
- ▷ le plus petit réel positif  $M$  tel que pour tout  $x \in E$ ,  $\|f(x)\| \leq M \|x\|$ .

---

**Proposition 1.84**

Les normes subordonnées sont des normes sur les espaces  $\mathcal{L}_c(E, F)$ .

Elles sont dites sous-multiplicatives : pour toutes applications linéaires continues et composables  $f$  et  $g$ ,

$$\|f \circ g\| \leq \|f\| \times \|g\|.$$

Comme en dimension finie, on peut représenter par choix de bases les applications linéaires par des matrices, on définit de manière semblable la notion de norme sous-multiplicative de matrices (relativement aux normes) ou norme triple.

---

**Définition 1.85**

Soit  $(n, p) \in (\mathbb{N}^*)^2$ . On choisit deux normes sur  $\mathbb{K}^p$  et  $\mathbb{K}^n$  (espaces identifiés à ceux des matrices-colonnes).

Pour toute matrice  $A \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$ , on pose  $\|A\| = \sup_{\|X\|=1} \|AX\|$ .

---

**Proposition 1.86**

Des normes étant choisies sur les espaces  $\mathbb{K}^p$  et  $\mathbb{K}^n$ , les normes subordonnées sont des normes sur tous les espaces  $\mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$ .

Elles sont dites sous-multiplicatives : pour toutes matrices multipliables  $A$  et  $B$ ,

$$\|AB\| \leq \|A\| \times \|B\|.$$

---

*Remarque 1.87*

Dans le cas où un espace vectoriel normé  $E$  est aussi une  $\mathbb{K}$ -algèbre, on dit qu'il est une algèbre normée quand la norme vérifie en plus la propriété de sous-multiplicativité :  $\forall (x, y) \in E^2$ ,  $\|xy\| \leq \|x\| \cdot \|y\|$ .

## 1.6 Topologie d'un espace vectoriel normé

Dans cette section,  $E$  est un espace vectoriel normé.

## 1.6.1 Intérieur d'une partie, voisinage d'un point

---

### Définition 1.88

Soient  $A$  une partie de  $E$  et  $a \in A$ .

On dit que  $a$  est un point intérieur à  $A$  quand on peut trouver un rayon  $r > 0$  tel que  $B(a, r)$  soit incluse dans  $A$ . On dit aussi dans ce cas que  $A$  est un voisinage de  $a$ .

L'intérieur de  $A$  est l'ensemble de ses points intérieurs, noté  $\overset{\circ}{A}$ .

On a :

$$a \in \overset{\circ}{A} \iff \exists r > 0, B(a, r) \subseteq A.$$

---

### Exercice 1.89

Dans  $\mathbb{R}$ , quels sont les intérieurs des parties suivantes :  $[0 ; 1]$ ,  $[0 ; +\infty[$ ,  $\mathbb{Q}$  ?

---

### Exercice 1.90

Quel est l'intérieur d'une boule de centre  $a$  et de rayon  $r > 0$  ?

---

### Remarque 1.91

Cette notion dépend a priori de la norme utilisée. En dimension finie, ce n'est pas le cas : l'intérieur d'une partie d'un espace vectoriel normé de dimension finie ne dépend pas du choix de la norme (pourquoi?).

---

### Proposition 1.92

Soient  $u \in E^{\mathbb{N}}$  et  $\ell \in E$ .

La suite  $u$  converge vers  $\ell$  ssi tout voisinage de  $\ell$  contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang.

---

## 1.6.2 Parties ouvertes

---

### Définition 1.93

On dit qu'une partie  $A$  de  $E$  est ouverte (ou est un ouvert) quand à tout point de  $a \in A$ , on peut associer un rayon  $r > 0$  tel que la boule de centre  $a$  et de rayon  $r$  soit incluse dans  $A$  :

$$\forall a \in A, \exists r > 0, B(a, r) \subseteq A.$$

Autrement dit,  $A$  est ouverte quand tout point de  $A$  est intérieur à  $A$  :  $A = \overset{\circ}{A}$ , ou, autrement dit, quand  $A$  est un voisinage de chacun de ses points.

---

**Proposition 1.94**

*L'ensemble vide et  $E$  sont des parties ouvertes. Toute boule ouverte est une partie ouverte. Tout produit (fini) de parties ouvertes est ouvert.*

La topologie de  $E$  est l'ensemble de tous les ouverts de  $E$ .

---

**Remarque 1.95**

La topologie dépend a priori de la norme utilisée. En dimension finie, ce n'est pas le cas : dans un espace vectoriel normé de dimension finie, le fait d'être un ouvert ne dépend pas du choix de la norme.

### 1.6.3 Parties fermées

On rappelle la notion de point adhérent à une partie.

---

**Définition 1.96**

Soient  $A$  une partie de  $E$  et  $x \in E$ .

On dit que  $x$  est un point adhérent à  $A$  quand il existe une suite  $u \in A^{\mathbb{N}}$  qui converge vers  $x$ , ou, ce qui revient au même, quand toute boule centrée en  $x$  rencontre  $A$ , ou encore quand  $d(x, A) = 0$ .

L'adhérence de  $A$  est l'ensemble de ses points adhérents, noté  $\overline{A}$ .

On a montré

---

**Définition 1.97**

On dit qu'une partie  $A$  de  $E$  est fermée (ou est un fermé) quand tout point adhérent à  $A$  est dans  $A$ , autrement dit quand la propriété suivante est vraie :

si une suite quelconque à termes dans  $A$  converge vers un point  $x$  de  $E$ , alors  $x \in A$ .

Ou encore :  $A$  est fermée quand  $A = \overline{A}$ .

---

**Proposition 1.98**

*L'ensemble vide et  $E$  sont des parties fermées. Toute boule fermée est une partie fermée. Tout produit (fini) de parties fermées est fermé.*

On note le lien avec les parties ouvertes.

---

**Proposition 1.99**

Soit  $A$  une partie de  $E$ .

Alors  $A$  est une partie ouverte ssi son complémentaire est une partie fermée.

Encore une fois, le fait d'être un fermé en dimension finie ne dépend pas de la norme.

---

**Proposition 1.100**

- ▷ Toute réunion de parties ouvertes est ouverte. Toute intersection finie de parties ouvertes est ouverte.
- ▷ Toute intersection de parties fermées est fermée. Toute réunion finie de parties fermées est fermée.

---

**Exercice 1.101**

Montrez que pour tout  $a \in E$ ,  $E \setminus \{a\}$  est un ouvert. Déduez-en que si  $A$  est une partie finie de  $E$ , alors  $E \setminus A$  est un ouvert.

---

**Exercice 1.102**

Quels sont les sous-espaces vectoriels de  $E$  qui sont ouverts ?

---

**Exercice 1.103**

Montrez que  $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0 \text{ et } xy = 1\}$  est un fermé de  $\mathbb{R}^2$ .

---

**Exercice 1.104**

On note  $S$  l'ensemble des matrices de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  telles que tous les coefficients soient positifs et sur chaque ligne la somme des coefficients vaut 1.

Montrez que  $S$  est un fermé.

NB :  $S$  est l'ensemble des matrices dites stochastiques.

---

*Remarque 1.105*

A priori, une partie de  $E$  n'est ni ouverte ni fermée : par exemple, dans  $\mathbb{R}$ , l'ensemble  $]0 ; 1]$  n'est ni ouvert ni fermé.

Donc ne pas confondre « complémentaire » et « contraire » : on peut dire qu'une partie est un fermé quand son complémentaire est un ouvert, mais pas que le contraire d'être un ouvert c'est être un fermé.

---

*Remarque 1.106*

Il est souvent assez facile de montrer qu'une partie est un fermé grâce à la caractérisation séquentielle. Donc pour montrer qu'une partie est un ouvert, on montre souvent de cette façon que son complémentaire est un fermé.

Les fermés sont souvent définis par des égalités ou des inégalités larges. Par complémentaire, les ouverts sont souvent définis par des inégalités strictes ou des différences.

### 1.6.4 Ouverts ou fermés relatifs à une partie

Les définitions précédentes parlent d'ouverts et de fermés de  $E$ . On peut définir ces notions relativement à une partie.

---

**Définition 1.107**

Soient  $A$  une partie de  $E$  et  $U$  un sous-ensemble de  $A$ .

On dit que  $U$  est un ouvert de  $A$  quand il existe un ouvert  $V$  de  $E$  tel que  $U = A \cap V$ .

On dit que  $U$  est un fermé de  $A$  quand il existe un fermé  $V$  de  $E$  tel que  $U = A \cap V$ .

On remarque que les fermés de  $A$  sont les complémentaires dans  $A$  des ouverts de  $A$ . On peut caractériser de même une partie  $U$  fermée de  $A$  par l'égalité entre  $U$  et l'ensemble de ses points adhérents dans  $A$ .

### 1.6.5 Image réciproque d'un ouvert ou d'un fermé par une fonction continue

---

*Rappel 1.108*

Si  $f$  est une fonction de  $E$  dans  $F$  définie sur  $D_f$  et  $B \subseteq F$ , l'image réciproque de  $B$  par  $f$  est

$$f^{-1}(B) = \{x \in D_f \mid f(x) \in B\}.$$

---

**Théorème 1.109**

Soit  $f$  une fonction de  $E$  dans  $F$  définie sur  $D$ .

Alors on a équivalence entre les propositions suivantes :

- ▷  $f$  est continue sur  $D$  ;
- ▷ pour tout fermé  $B$  de  $F$ , son image réciproque  $f^{-1}(B)$  est un fermé de  $D$  ;
- ▷ pour tout ouvert  $B$  de  $F$ , son image réciproque  $f^{-1}(B)$  est un ouvert de  $D$ .

Ceci est valable en particulier quand  $f$  est une application continue de  $E$  dans  $F$ , auquel cas on peut se passer des notions d'ouvert ou fermé relatif.

---

*Exemple 1.110 (Cas particuliers fondamentaux)*

Si  $f$  est continue sur  $E$  et à valeurs réelles, alors pour tout  $a \in \mathbb{R}$ , les ensembles suivants sont des fermés de  $E$  :

$$\{x \in E \mid f(x) \geq a\} \quad \{x \in E \mid f(x) \leq a\} \quad \{x \in E \mid f(x) = a\}.$$

---

*Exemple 1.111*

- Les courbes de fonctions continues de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  sont des fermés de  $\mathbb{R}^2$ .
- L'ensemble des matrices de trace nulle est un fermé de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

Par passage au complémentaire, si  $f$  est continue sur  $E$  et à valeurs réelles, alors pour tout  $a \in \mathbb{R}$ , les ensembles suivants sont des ouverts de  $E$  :

$$\{x \in E \mid f(x) < a\} \quad \{x \in E \mid f(x) > a\} \quad \{x \in E \mid f(x) \neq a\}.$$

---

*Exemple 1.112*

- L'ensemble des couples  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$  tels que  $x > 0$  et  $y > x$  est un ouvert de  $\mathbb{R}^2$ .
- $\text{GL}_n(\mathbb{K})$  est un ouvert de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  : si une matrice  $A$  est inversible, alors toutes les matrices proches de  $A$  le sont aussi.

## 1.6.6 Frontière d'une partie

---

**Définition 1.113**

Soit  $A$  une partie de  $E$ . On appelle frontière de  $A$  l'ensemble  $\overline{A} \setminus \overset{\circ}{A}$ .

---

*Exemple 1.114*

- Si  $B$  est une boule, alors son intérieur est la boule ouverte de même centre et de même rayon, son adhérence est la boule fermée et sa frontière est la sphère.
- L'ensemble des rationnels est d'intérieur vide, d'adhérence égale à  $\mathbb{R}$  et donc de frontière  $\mathbb{R}$ .

## 1.7 Compacité

Dans cette section,  $E$  est un espace vectoriel normé.

### 1.7.1 Valeurs d'adhérence d'une suite



---

**Définition 1.115**

Soient  $u = (u_n) \in E^{\mathbb{N}}$  et  $a \in E$ .

On dit que  $a$  est une valeur d'adhérence de la suite  $u$  quand il existe une extractrice  $\varphi$  telle que la suite extraite  $(u_{\varphi(n)})$  converge vers  $a$ .

Une suite peut avoir une ou plusieurs valeurs d'adhérence ou ne pas avoir de valeur d'adhérence :

- la suite  $(n)_{n \in \mathbb{N}}$  n'a pas de valeur d'adhérence ;
- toute suite convergente possède une seule valeur d'adhérence : sa limite ;
- la suite  $u$  définie par  $u_{2n} = \frac{1}{n+1}$  et  $u_{2n+1} = 1 - \frac{1}{n+1}$  possède deux valeurs d'adhérence : 0 et 1 ;
- il est possible de numéroter les rationnels, autrement dit de créer une suite  $u$  qui prend exactement toutes les valeurs rationnelles dans  $\mathbb{R}$  : cette suite a pour valeurs d'adhérence tous les réels.

On peut donner une caractérisation équivalente sans passer par la notion de suite extraite.

---

**Proposition 1.116**

Soient  $u = (u_n) \in E^{\mathbb{N}}$  et  $a \in E$ .

Alors  $a$  est une valeur d'adhérence de  $u$  ssi pour tout  $\varepsilon > 0$ ,  $\{n \in \mathbb{N} \mid u_n \in B(a, \varepsilon)\}$  est infini.

Ceci peut encore être réécrit de la façon suivante.

---

**Proposition 1.117**

Soient  $u = (u_n) \in E^{\mathbb{N}}$  et  $a \in E$ .

Alors  $a$  est une valeur d'adhérence de  $u$  ssi  $\forall \varepsilon > 0, \forall N \in \mathbb{N}, \exists n \geq N, \|u_n - a\| < \varepsilon$ .

---

**Exercice 1.118**

Soit  $u = (u_n) \in E^{\mathbb{N}}$ . Montrez que l'ensemble  $V$  des valeurs d'adhérence de la suite  $u$  est un fermé de  $E$  en utilisant les ensembles  $U_p = \{u_n \mid n \geq p\}$ .

## 1.7.2 Théorème de Bolzano-Weierstrass

---

**Théorème 1.119**

Si  $E$  est de dimension finie, alors toute suite bornée de  $E$  possède une valeur d'adhérence.

---

*Remarque 1.120*

Ce théorème est faux en dimension infinie donc il faut bien mettre en valeur la dimension finie.

On peut ajouter une précision au théorème précédent.

---

**Proposition 1.121**

*Si  $E$  est de dimension finie, alors toute suite bornée de  $E$  qui ne possède qu'une seule valeur d'adhérence est convergente vers cette valeur d'adhérence.*

### 1.7.3 Parties compactes

---

**Définition 1.122**

Soit  $A$  une partie de  $E$ .

On dit que  $A$  est une partie compacte de  $E$  (ou un compact de  $E$ ) quand toute suite à termes dans  $A$  possède une valeur d'adhérence dans  $A$  (propriété dite de Bolzano-Weierstrass).

---

*Exemple 1.123*

▷ Tout segment  $[a ; b]$  de  $\mathbb{R}$  est un compact et ce sont les seuls intervalles compacts.  $[0 ; 1] \cup [2 ; 3]$  est compact.

▷ Dans  $\mathbb{K}^n$ , tout pavé  $\prod_{i=1}^n [a_i ; b_i]$  est un compact. Plus généralement, un produit (fini) de compacts est compact.

Les parties compactes sont donc celles dont on peut extraire des sous-suites convergentes. Un résultat précédent se généralise alors.

---

**Proposition 1.124**

*Si  $A$  est une partie compacte, alors toute suite de  $A$  qui ne possède qu'une seule valeur d'adhérence est convergente vers cette valeur d'adhérence.*

Un compact étant connu, il est facile d'en construire d'autres.

---

**Proposition 1.125**

*Si  $A$  est une partie compacte de  $E$ , alors toute partie  $B$  fermée dans  $A$  est aussi compacte.*

Reconnaître si une partie est compacte n'est pas toujours facile. On dispose d'une condition nécessaire, qui est suffisante en dimension finie.

---

**Proposition 1.126**

*Soit  $A$  une partie de  $E$ .*

*Si  $A$  est compacte, alors  $A$  est une partie fermée et bornée.*

La réciproque est hélas fausse en général. Néanmoins, en dimension finie, elle est vraie.

---

**Proposition 1.127**

*Si  $E$  est de dimension finie, alors une partie de  $E$  est compacte ssi elle est fermée et bornée.*

---

*Remarque 1.128*

En fait, il n'y a qu'en dimension finie que ce résultat est vrai. Un théorème de Riesz affirme que la boule-unité fermée d'un espace vectoriel normé est compacte ssi l'espace est de dimension finie, ce qui revient à dire que l'équivalence précédente n'est valable que dans un espace de dimension finie.

En dimension infinie, il se passe des choses vraiment étranges : les compacts sont des parties très petites et plates, par exemple, un compact est forcément d'intérieur vide. Heureusement, il est plus courant de travailler à notre niveau en dimension finie.

---

*Exemple 1.129*

- L'ensemble des matrices stochastiques de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  est un compact.
- La boule-unité fermée de  $E = \mathcal{C}^0([0; 1], \mathbb{R})$  pour la norme infinie n'est pas compacte, car la suite des fonctions  $(x \mapsto x^n)$  a pour seule valeur d'adhérence possible la fonction  $x \mapsto 0$  si  $x \neq 1$  et  $1 \mapsto 1$ , qui n'est même pas dans l'espace  $E$ .

Une application importante de la notion de compacité est le théorème suivant.

---

**Théorème 1.130**

*Tout sous-espace vectoriel de dimension finie de  $E$  est fermé.*

En dimension infinie, là encore il peut se passer des choses étranges : un sous-espace de  $E$  de dimension infinie peut être dense (et donc non-fermé s'il est différent de  $E$ ).

## 1.7.4 Théorème des bornes atteintes

Le principal intérêt des compacts est de pouvoir généraliser un théorème de première année.

---

**Théorème 1.131**

Soient  $E, F$  deux espaces vectoriels normés,  $A$  une partie de  $E$  et  $f : A \longrightarrow F$ .

Si  $f$  est continue sur  $A$  et  $A$  est compacte, alors  $f(A)$  est compacte.

On résume en disant que l'image continue d'un compact est un compact.

En particulier, toute fonction continue sur un compact est donc bornée. Dans le cas des fonctions numériques (*i.e.* à valeurs dans  $\mathbb{R}$ ), on peut même être plus précis.

---

**Théorème 1.132**

Toute fonction continue sur un compact et à valeurs réelles est bornée et atteint ses bornes.

Autrement dit, si  $f : A \longrightarrow \mathbb{R}$  est continue sur  $A$  et  $A$  est une partie compacte de  $E$ , alors il existe  $(a, b) \in A^2$  tel que pour tout  $x \in A$ ,  $f(a) \leq f(x) \leq f(b)$ , ce qui revient à dire que  $f$  possède un minimum et un maximum sur  $A$ .

---

**Remarque 1.133**

Ce théorème est à rapprocher du théorème vu en première année : toute fonction de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  continue sur un segment est bornée et atteint ses bornes.

Néanmoins, le théorème de l'an dernier donnait un résultat un peu plus précis que celui de cette année car il donnait aussi l'image du segment, en précisant qu'il s'agissait aussi d'un segment, car il faisait aussi intervenir le théorème des valeurs intermédiaires.

Ici, dans la version proposée cette année, on ne peut rien dire de plus.

---

**Exercice 1.134**

Un exercice classique, à savoir refaire ! C'est la base de nombreux exercices.

Soient  $E$  de dimension finie et  $f : E \longrightarrow \mathbb{R}$  continue et telle que  $f(x)$  tende vers  $+\infty$  quand  $\|x\|$  tend vers  $+\infty$ . Montrez que  $f$  possède un minimum.

Exemple : dans le plan euclidien géométrique, on choisit trois points  $A, B, C$  ; montrez alors qu'il existe un point  $M$  du plan tel que la somme  $AM + BM + CM$  soit minimale.

---

**Exercice 1.135**

Soit  $f : (x, y) \longmapsto xy\sqrt{1-x^2-2y^2}$ .

Justifiez que l'ensemble de définition  $D$  de  $f$  est un compact de  $\mathbb{R}^2$ .

Déterminez les points critiques de  $f$  dans l'ouvert  $\overset{\circ}{D}$ , puis les maxima et minima de  $f$ .

On retrouve aussi le théorème de Heine en conséquence de la compacité.

---

**Définition 1.136**

Soient  $E, F$  deux espaces vectoriels normés,  $A$  une partie de  $E$  et  $f : A \longrightarrow F$ .

On dit que  $f$  est uniformément continue sur  $A$  quand

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall (x, y) \in A^2, \|x - y\| \leq \eta \implies \|f(x) - f(y)\| \leq \varepsilon.$$

---

**Théorème 1.137**

Soient  $E, F$  deux espaces vectoriels normés,  $A$  une partie de  $E$  et  $f : A \longrightarrow F$ .

Si  $f$  est continue sur  $A$  et  $A$  est compacte, alors  $f$  est uniformément continue sur  $A$ .

## 1.8 Connexité par arcs

Dans cette section,  $E$  est un espace vectoriel normé.

### 1.8.1 Chemin

---

**Définition 1.138**

Soient  $A$  une partie de  $E$  et  $a, b \in A$ .

On appelle chemin (ou arc) dans  $A$  de  $a$  à  $b$  toute application continue  $\varphi : [0 ; 1] \longrightarrow A$  telle que  $\varphi(0) = a$  et  $\varphi(1) = b$ . Le support du chemin est l'image de  $\varphi$ .

On peut définir une relation d'équivalence sur une partie de  $E$  en mettant en relation les points joignables par un chemin.

---

**Définition 1.139**

Soient  $A$  une partie de  $E$  et  $a, b \in A$ .

On pose  $a\mathcal{R}b$  quand il existe un chemin dans  $A$  de  $a$  à  $b$ .

---

**Proposition 1.140**

Avec les notations précédentes, la relation  $\mathcal{R}$  est une relation d'équivalence sur  $A$ .

## 1.8.2 Parties connexes par arcs

---

### Définition 1.141

Soit  $A$  une partie de  $E$ .

On dit que  $A$  est connexe par arcs quand tout couple de points  $(a, b) \in A^2$  est joignable par un chemin.

---

### Exemple 1.142

- Les parties convexes de  $E$  sont connexes par arcs.
- Les parties étoilées de  $E$  sont connexes par arcs.
- $\mathbb{C}^*$  et  $\mathbb{C} \setminus D$  où  $D$  est la demi-droite des réels négatifs sont connexes par arcs.

Les classes d'équivalences de la relation notée  $\mathcal{R}$  précédemment s'appellent les composantes connexes par arcs de  $A$  : ce sont par définition des parties connexes par arcs.

---

### Proposition 1.143

*Les seules parties connexes par arcs de  $\mathbb{R}$  sont les intervalles.*

---

### Remarque 1.144

Il existe une notion plus générale, celle de partie connexe : une partie  $A$  de  $E$  est dite connexe quand les seules parties de  $A$  à la fois ouvertes et fermées sont  $\emptyset$  et  $A$ . Elle est plus délicate à aborder et est hors-programme, c'est pourquoi on s'en tient à la notion de connexité par arcs (toute partie connexe par arcs est connexe).

## 1.8.3 Théorème des valeurs intermédiaires

Là encore, la notion de connexité par arcs permet de généraliser des résultats de première année.

---

### Théorème 1.145

Soient  $E, F$  deux espaces vectoriels normés,  $A$  une partie de  $E$  et  $f : A \longrightarrow F$ .

*Si  $f$  est continue par  $A$  et  $A$  est connexe par arcs, alors  $f(A)$  est connexe par arcs.*

On résume en disant que l'image continue d'un connexe par arcs est un connexe par arcs.

Dans le cas des fonctions numériques (*i.e.* à valeurs dans  $\mathbb{R}$ ), on peut même être plus précis.

---

**Théorème 1.146**

*Toute fonction continue sur un connexe par arcs et à valeurs réelles vérifie la propriété des valeurs intermédiaires.*

*Autrement dit, si  $f : A \longrightarrow F$  est continue sur  $A$  une partie connexe par arcs de  $E$ , alors  $f(A)$  est un intervalle.*

*Ou encore :*

$$\forall (y, z) \in f(A)^2, \forall w \in [yz], \exists t \in A, f(t) = w.$$

# Chapitre 2

## Séries numériques et vectorielles : révisions et compléments

### Sommaire

<b>2.1</b>	<b>Rappels . . . . .</b>	<b>46</b>
2.1.1	Définitions et notations . . . . .	46
2.1.2	Convergence d'une série . . . . .	47
2.1.3	Lien entre convergence de suites et convergence de séries . . . . .	48
<b>2.2</b>	<b>Séries réelles à termes positifs . . . . .</b>	<b>49</b>
2.2.1	Théorème de Cesàro . . . . .	50
2.2.2	Théorème de comparaison par domination de séries à termes positifs . . . . .	50
2.2.3	Théorème de comparaison par équivalence de séries à termes positifs . . . . .	51
2.2.4	Théorème de comparaison série - intégrale . . . . .	51
<b>2.3</b>	<b>Séries absolument convergentes . . . . .</b>	<b>52</b>
2.3.1	Lien entre absolue convergence et convergence . . . . .	52
2.3.2	Un exemple fondamental : l'exponentielle de matrice . . . . .	53
2.3.3	Extension des résultats par comparaison . . . . .	53
2.3.4	Produit de Cauchy de deux séries absolument convergentes . . . . .	54
<b>2.4</b>	<b>Séries alternées . . . . .</b>	<b>54</b>

Dans ce chapitre,  $E$  désigne un espace vectoriel normé (qui peut être  $\mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ ) et  $\|\cdot\|$  la norme associée (qui est dans ces cas la valeur absolue ou le module).

## 2.1 Rappels

### 2.1.1 Définitions et notations

#### Définition 2.1 (Série vectorielle)

Soit  $u$  une suite de  $E$ .

On associe à cette suite la suite  $s$  définie de la façon suivante : pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $s_n = \sum_{k=0}^n u_k$ .



La suite  $s$  est appelée série de terme général  $u_n$  et notée  $\sum_{n \geq 0} u_n$  ou  $\sum u$ .

Chaque nombre  $s_n$  est appelé somme partielle d'indice  $n$  de la série.

L'adjectif « numérique » associé au mot « série » signifie que les termes généraux de la série sont en fait des nombres réels ou complexes.

## 2.1.2 Convergence d'une série

### Définition 2.2

Soit  $u$  une suite de  $E$ .

On dit que la série  $\sum u$  converge ssi la suite des sommes partielles  $(s_n) = \left( \sum_{k=0}^n u_k \right)$  converge.

Dans ce cas, si  $\ell = \lim_{n \rightarrow +\infty} s_n$ , alors  $\ell$  est appelée somme de la série  $\sum u$  et on note  $\ell = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ .

On appelle aussi reste partiel d'indice  $n$  de la série le nombre  $r_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k$ , de sorte que  $r_n + s_n = \ell$ .

La suite des restes partiels converge donc vers 0.

Dans le cas contraire, on dit que la série  $\sum u$  diverge.

### Exemple 2.3

► Soit  $x \in \mathbb{C}$ . La série  $\sum_{n \geq 0} x^n$  converge ssi  $|x| < 1$  et, dans ce cas,  $\sum_{n=0}^{+\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$ . Cette série est appelée série géométrique de raison  $x$ .

► Les séries de Riemann :  $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$  converge ssi  $\alpha > 1$ .

► Pour tout  $z \in \mathbb{C}$ , la série  $\sum \frac{z^n}{n!}$  converge et  $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!} = e^z$ .

On peut bien sûr généraliser aux séries quelques théorèmes d'opérations.

### Proposition 2.4

Soient  $u, v$  deux suites de  $E$  et  $\lambda$  un scalaire.

Si les séries  $\sum u$  et  $\sum v$  convergent, alors la série  $\sum (u + \lambda v)$  converge et  $\sum_{n=0}^{+\infty} (u_n + \lambda v_n) = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n + \lambda \sum_{n=0}^{+\infty} v_n$ .

*Ceci prouve aussi que l'ensemble des séries convergentes est un espace vectoriel.*

---

*Remarque 2.5*

La somme d'une série divergente et d'une série convergente est une série divergente.

En revanche, il n'y a rien à dire a priori à propos de la somme de deux séries divergentes.

### 2.1.3 Lien entre convergence de suites et convergence de séries

---

**Proposition 2.6**

*Soit  $u$  une suite de  $E$ .*

*Si la série  $\sum u$  converge, alors la suite  $u$  converge vers 0.*

---

*Remarque 2.7*

► La réciproque est fausse.

► Par contraposition, si une suite  $u$  ne tend pas vers 0, alors la série associée diverge : on dit que la série  $\sum u$  diverge grossièrement.

---

*Exemple 2.8*

On appelle série harmonique la série  $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$ .

Cette série diverge, pourtant son terme général tend vers 0.

---

**Définition 2.9**

Soit  $u$  une suite de  $E$ . On pose  $v_n = u_{n+1} - u_n$ .

La série  $\sum v$  est appelée la série télescopique (ou série domino, ou série différence) associée à  $u$ .

---

**Proposition 2.10**

*Une suite converge ssi sa série télescopique associée converge.*

---

**Exercice 2.11**

On pose  $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n$ . Montrez que la suite  $u$  converge.

## 2.2 Séries réelles à termes positifs

Dans cette section, on s'intéresse uniquement aux séries dont le terme général est un réel positif.

On appelle un premier théorème issu du cours de première année.

---

### Théorème 2.12

Soient  $u$  et  $v$  deux suites réelles positives.

- ▷ Si  $0 \leq u \leq v$  et si la série  $\sum v$  converge, alors la série  $\sum u$  converge.
- ▷ Si  $0 \leq u \leq v$  et si la série  $\sum u$  diverge, alors la série  $\sum v$  diverge.
- ▷ Si  $u \sim v$ , alors les séries  $\sum u$  et  $\sum v$  sont de même nature.

Une application classique : la règle de d'Alembert.

---

### Proposition 2.13

Soit  $u$  une suite réelle strictement positive telle que  $\frac{u_{n+1}}{u_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$ . Alors

- ▷ si  $\ell < 1$ , la série  $\sum u$  converge ;
- ▷ si  $\ell > 1$ , la série  $\sum u$  diverge ;
- ▷ si  $\ell = 1$ , on ne peut rien conclure.

---

### Exercice 2.14

Soient  $x, y > 0$ . Représentez graphiquement l'ensemble des couples  $(x, y)$  tels que la série  $\sum \frac{x^n}{y^n + n^x}$  converge.

---

### Exercice 2.15

Montrez que la suite  $(u_n)$  définie par  $u_0 \in [0 ; 1]$  et  $u_{n+1} = \frac{1}{2} (u_n + u_n^2)$  converge vers 0 et donnez la nature de la série  $\sum u_n$ .

On donne quelques versions plus élaborées du théorème de comparaison.

## 2.2.1 Théorème de Cesàro

### Théorème 2.16

Soit  $u$  une suite numérique qui converge vers  $\ell$ . Alors  $\frac{u_0 + \cdots + u_n}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$ .

Dans le cas où  $\ell \neq 0$ , la série  $\sum u$  diverge grossièrement et  $\sum_{k=0}^n u_k \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n\ell$ .

Dans le cas où  $\ell = 0$ , on peut juste dire  $\sum_{k=0}^n u_k = o(n)$ .

### Exercice 2.17

Soit  $u$  la suite définie par récurrence par  $u_0 > 0$  et pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+1} = u_n + \frac{u_n + 1}{u_n + 2}$ .

Étudiez la convergence ou divergence de la suite  $u$ , puis donnez un équivalent simple de  $u_n$  quand  $n$  tend vers  $+\infty$ .

## 2.2.2 Théorème de comparaison par domination de séries à termes positifs

Dans le cas convergent d'abord, les restes partiels suivent la même relation de comparaison.

### Théorème 2.18

Soient  $u, v$  deux suites réelles positives.

Si  $u = \mathcal{O}(v)$  et la série  $\sum v$  converge, alors la série  $\sum u$  converge. De plus,  $\sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k = \mathcal{O}\left(\sum_{k=n+1}^{+\infty} v_k\right)$ .

Si  $u = o(v)$  et la série  $\sum v$  converge, alors la série  $\sum u$  converge. De plus,  $\sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k = o\left(\sum_{k=n+1}^{+\infty} v_k\right)$ .

Dans le cas divergent ensuite, les sommes partielles suivent aussi la même relation de comparaison.

### Théorème 2.19

Soient  $u, v$  deux suites réelles positives.

Si  $u = \mathcal{O}(v)$  et la série  $\sum u$  diverge, alors la série  $\sum v$  diverge. De plus,  $\sum_{k=0}^n u_k = \mathcal{O}\left(\sum_{k=0}^n v_k\right)$ .

Si  $u = o(v)$  et la série  $\sum u$  diverge, alors la série  $\sum v$  diverge. De plus,  $\sum_{k=0}^n u_k = o\left(\sum_{k=0}^n v_k\right)$ .

### 2.2.3 Théorème de comparaison par équivalence de séries à termes positifs

---

#### Théorème 2.20

Soient  $u, v$  deux suites réelles positives.

Si  $u \sim v$ , alors les séries  $\sum u$  et  $\sum v$  sont de même nature ; l'une converge ssi l'autre converge.

De plus,

- ▷ si les séries convergent, alors les restes partiels sont équivalents :  $\sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sum_{k=n+1}^{+\infty} v_k ;$
- ▷ si les séries divergent, alors les sommes partielles divergent vers  $+\infty$  et sont équivalentes :  $\sum_{k=0}^n u_k \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sum_{k=0}^n v_k .$

---

#### Exercice 2.21

Soit  $a > 0$ . On pose  $u_n = \sin \frac{a^n}{n}$  pour  $n \in \mathbb{N}^*$ . Selon la valeur de  $a$ , déterminez la nature de la série  $\sum_{n \geq 1} u_n$ .

Montrez que si  $a = 1$ , alors  $\sum_{k=1}^n u_k \sim \ln n$  et si  $a < 1$ ,  $\sum_{k=n}^{+\infty} u_k = o(a^n)$ .

### 2.2.4 Théorème de comparaison série - intégrale

---

#### Proposition 2.22

Soit  $f$  une fonction continue, positive et décroissante sur  $\mathbb{R}_+$ .

Alors la série de terme général  $f(n)$  et la suite de terme général  $\int_0^n f$  sont de même nature.

---

#### Méthode 2.23 (À retenir)

La technique d'encadrement des sommes partielles d'une série  $\sum f(n)$  (ou des restes partiels) par des intégrales quand  $f$  est continue, positive et monotone.

---

### Exemple 2.24

▷  $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \ln n$  (à connaître).

▷ Si  $\alpha > 1$ , un équivalent simple de  $\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha}$  quand  $n \rightarrow +\infty$  est  $\frac{1}{(\alpha-1)n^{\alpha-1}}$ .

---

### Exercice 2.25

Pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , on pose  $u_n = \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{\ln k}{k^2}$ .

Justifiez l'existence de  $u_n$ , puis montrez la divergence de la série  $\sum u_n$ .

Montrez que  $\sum_{k=1}^n u_k \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\ln^2 n}{2}$ .

## 2.3 Séries absolument convergentes

---

### Définition 2.26

Soit  $u$  une suite de  $E$ .

On dit que la série  $\sum u$  est absolument convergente ssi la série à termes positifs  $\sum \|u\|$  est convergente.

### 2.3.1 Lien entre absolue convergence et convergence

---

### Théorème 2.27

Si  $E$  est de dimension finie, alors toute série absolument convergente est convergente.

---

### Remarque 2.28

▷ La réciproque est fautive : la série  $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n}$  converge (on l'appelle la série harmonique alternée) mais ne converge pas absolument.

▷ L'hypothèse de la dimension finie est indispensable. En dimension infinie, ce résultat est faux en général.

---

### Exercice 2.29

Soit  $x > 0$ . Montrez que les séries suivantes convergent :

$$\sum_{n \geq 2} \frac{\ln(n^2 + (-1)^n n)}{n^2 + (-1)^n x^n} \quad \sum_{n \geq 0} \sqrt{n} \cos(x) \sin^n(x) \quad \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n \sqrt{n+x}}{x^n + n^{2/x}}.$$

### 2.3.2 Un exemple fondamental : l'exponentielle de matrice

Soit  $p \in \mathbb{N}^*$ .

On choisit comme norme sur  $E = \mathcal{M}_p(\mathbb{C})$  une norme sous-multiplicative.

Alors pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\|A^n\| \leq \|A\|^n$ , donc  $\left\| \frac{A^n}{n!} \right\| \leq \frac{\|A\|^n}{n!}$ .

Or la série  $\sum \frac{\|A\|^n}{n!}$  converge (et sa somme vaut  $\exp \|A\|$ ), donc par comparaison de séries à termes positifs, la série  $\sum \frac{A^n}{n!}$  est absolument convergente.

On pose alors  $\exp A = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{A^n}{n!}$ .

### 2.3.3 Extension des résultats par comparaison

---

#### Définition 2.30

Soit  $u$  une suite de  $E$  et  $v$  une suite réelle positive.

On dit que  $u = \mathcal{O}(v)$  quand  $\exists M > 0$ ,  $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ ,  $\forall n \geq n_0$ ,  $\|u_n\| \leq M v_n$ .

On dit que  $u = o(v)$  quand  $\forall \varepsilon > 0$ ,  $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ ,  $\forall n \geq n_0$ ,  $\|u_n\| \leq \varepsilon v_n$ .

---

#### Proposition 2.31

Soient  $u$  une suite de  $E$  et  $v$  une suite réelle positive.

Si  $E$  est de dimension finie,  $u_n = \mathcal{O}(v_n)$  quand  $n$  tend vers  $+\infty$  et la série  $\sum v$  converge, alors la série  $\sum u$  est absolument convergente.

De plus,  $\sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k = \mathcal{O} \left( \sum_{k=n+1}^{+\infty} v_k \right)$ .

Ceci est encore valable si  $u_n = o(v_n)$ .

---

#### Proposition 2.32

Soient  $u$  une suite de  $E$  et  $v$  une suite réelle positive.

Si  $E$  est de dimension finie,  $u_n = o(v_n)$  quand  $n$  tend vers  $+\infty$  et la série  $\sum v$  converge, alors la série  $\sum u$  est absolument convergente.

De plus,  $\sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k = o \left( \sum_{k=n+1}^{+\infty} v_k \right)$ .

### 2.3.4 Produit de Cauchy de deux séries absolument convergentes

---

#### Définition 2.33

Soient  $E$  une algèbre normée de dimension finie,  $\sum_{n \geq 0} a_n$  et  $\sum_{n \geq 0} b_n$  deux séries à termes dans  $E$ .

On appelle produit de Cauchy des deux séries la série  $\sum_{n \geq 0} c_n$  où pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$ .

---

#### Remarque 2.34

Quand les séries ne commencent pas à partir du rang 0, il faut se méfier ! Une idée simple est de se ramener au cas précédent en décalant les indices.

Exemple très courant : les séries commencent au rang 1. Dans ce cas, le produit de Cauchy des séries

$\sum_{n \geq 1} a_n$  et  $\sum_{n \geq 1} b_n$  est la série  $\sum_{n \geq 1} c_n$  où pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $c_n = \sum_{k=1}^n a_k b_{n+1-k}$ .

---

#### Théorème 2.35

Avec les mêmes hypothèses sur  $E$ .

Si les séries  $\sum_{n \geq 0} a_n$  et  $\sum_{n \geq 0} b_n$  convergent absolument, alors leur produit de Cauchy est aussi absolument convergent et

$$\sum_{n=0}^{+\infty} c_n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \times \sum_{k=0}^{+\infty} b_k.$$

## 2.4 Séries alternées

---

#### Définition 2.36

Une série alternée est une série réelle  $\sum u_n$  telle que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+1}$  est de signe opposé à  $u_n$ .

En général, les séries alternées sont reconnaissables à la présence d'un facteur  $(-1)^n$  dans l'expression du terme général.

On dispose d'une condition suffisante de convergence d'une série alternée qu'on appelle le critère spécial des séries alternées.



---

**Théorème 2.37**

Soit  $\sum (-1)^n u_n$  une série alternée.

Si la suite  $u$

- ▷ est positive,
- ▷ est décroissante,
- ▷ et converge vers 0,

alors la série  $\sum (-1)^n u_n$  converge.

Dans ce cas, la somme de la série est positive, et si on note  $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} (-1)^k u_k$  le reste partiel d'indice  $n$ , alors pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $R_n$  est du signe de son premier terme (i.e. du signe de  $(-1)^{n+1}$ ) et  $|R_n| \leq u_{n+1} \leq u_n$ .

---

**Exemple 2.38**

- ▷ La série harmonique alternée  $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n}$  converge.
- ▷ La série  $\sum_{n \geq 2} \frac{(-1)^n}{\ln n}$  converge.

---

**Remarque 2.39**

- ▷ Si  $\sum_{n \geq n_0} (-1)^n u_n$  est une série alternée convergente, sa somme a le signe du premier terme de la série (ici le signe de  $(-1)^{n_0} u_{n_0}$ ).
- ▷ La condition de décroissance de la suite  $u$  est essentielle ! Contre-exemple : la série  $\sum_{n \geq 2} \frac{(-1)^n}{(-1)^n + \sqrt{n}}$  est une série alternée divergente.  
De plus, cela fournit un contre-exemple au théorème de comparaison par équivalents si on ne tient pas compte de la condition sur le signe, qui doit être constant.

---

**Exercice 2.40**

Soit  $\alpha > 1$ . Pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , on pose  $u_n = \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k^\alpha + k}$ .

Justifiez l'existence de  $u_n$ . Montrez que la série  $\sum_{n \geq 1} u_n$  converge.

# Chapitre 3

## Familles sommables

### Sommaire

---

<b>3.1</b>	<b>Sommes finies</b>	<b>56</b>
3.1.1	Définition	56
3.1.2	Propriétés	59
<b>3.2</b>	<b>Conventions de calcul dans <math>\mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}</math></b>	<b>60</b>
<b>3.3</b>	<b>Somme d'une famille de réels positifs</b>	<b>62</b>
3.3.1	Propriétés	62
3.3.2	Théorème de sommation par paquets	63
3.3.3	Théorème de Fubini	63
<b>3.4</b>	<b>Familles sommables dans un espace vectoriel normé de dimension finie</b>	<b>64</b>
3.4.1	Définitions	64
3.4.1.1	Cas réel	64
3.4.1.2	Cas complexe	64
3.4.1.3	Cas général	65
3.4.2	Propriétés	65
3.4.3	Théorème de sommation par paquets	66
3.4.4	Théorème de Fubini	66
3.4.5	Produit de Cauchy de deux séries	67

---

Dans ce chapitre,  $E$  désigne un espace vectoriel normé de dimension finie (qui peut être  $\mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ ) et  $\|\cdot\|$  la norme associée (qui est dans ce cas la valeur absolue ou le module).

Si  $A, B$  sont deux ensembles, alors on note  $A \subseteq_f B$  pour indiquer que  $A$  est un sous-ensemble fini de  $B$ .

### 3.1 Sommes finies

#### 3.1.1 Définition

D'abord un rappel : on définit par récurrence la somme de  $n$  éléments de  $E$  notés  $x_1, \dots, x_n$  par :

- ▷ si  $n = 0$ , alors  $\sum_{k=1}^n x_k = 0$  (une somme vide a pour valeur 0 par convention) ;
- ▷ pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $\sum_{k=1}^{n+1} x_k = x_{n+1} + \sum_{k=1}^n x_k$ .

On définit de même par récurrence les sommes de la forme  $\sum_{k=p}^q x_k$  quand  $p - 1 \leq q$  (si  $q = p - 1$ , la somme est vide donc vaut 0).

---

### Proposition 3.1

Soient  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $x_1, \dots, x_n \in E$ .

Alors :

- (1) pour tout  $(p, q) \in \llbracket 1 ; n \rrbracket^2$  tel que  $p \leq q$ ,  $\sum_{k=p}^n x_k = \sum_{k=p}^q x_k + \sum_{k=q+1}^n x_k$  ;
- (2) pour tout  $\varphi \in \mathfrak{S}_n$ ,  $\sum_{k=1}^n x_k = \sum_{k=1}^n x_{\varphi(k)}$ .

---

*Démonstration 3.2 (1)*

On pose  $\mathcal{P}(n)$  la proposition «  $\forall (p, q) \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, p \leq q \implies \sum_{k=p}^n x_k = \sum_{k=p}^q x_k + \sum_{k=q+1}^n x_k$  ».

Si  $n = 1$ , alors pour tout  $(p, q) \in \llbracket 1 ; n \rrbracket^2$ ,  $p = q = 1$  donc  $\sum_{k=p}^n x_k = x_1 + 0 = \sum_{k=p}^q x_k + \sum_{k=q+1}^n x_k$  donc  $\mathcal{P}(1)$  est vraie.

Si  $\mathcal{P}(n)$  est vraie, alors soient  $(x_1, \dots, x_{n+1}) \in E^{n+1}$  et  $(p, q) \in \llbracket 1 ; n+1 \rrbracket^2$  tel que  $p \leq q$  :

- ▷ si  $q \leq n$ , alors par définition,  $\sum_{k=p}^{n+1} x_k = \sum_{k=p}^n x_k + x_{n+1}$ , donc d'après l'hypothèse de récurrence,
$$\sum_{k=p}^{n+1} x_k = \sum_{k=p}^q x_k + \sum_{k=q+1}^n x_k + x_{n+1} = \sum_{k=p}^q x_k + \sum_{k=q+1}^{n+1} x_k ;$$
- ▷ si  $q = n+1$ , alors  $\sum_{k=p}^{n+1} x_k = \sum_{k=p}^q x_k + 0 = \sum_{k=p}^q x_k + \sum_{k=q+1}^{n+1} x_k$ .

Dans les deux cas, on a montré  $\sum_{k=p}^{n+1} x_k = \sum_{k=p}^q x_k + \sum_{k=q+1}^{n+1} x_k$ . Autrement dit,  $\mathcal{P}(n+1)$  est vraie.

D'après le principe de récurrence, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\mathcal{P}(n)$  est vraie. ■

---

*Démonstration 3.3 (2)*

On pose  $\mathcal{P}(n)$  la proposition «  $\forall \varphi \in \mathfrak{S}_n, \sum_{k=1}^n x_k = \sum_{k=1}^n x_{\varphi(k)}$  ».

$\mathcal{P}(1)$  est vraie car le seul élément de  $\mathfrak{S}_1$  est l'application  $1 \mapsto 1$ .

Si  $\mathcal{P}(n)$  est vraie, alors soient  $(x_1, \dots, x_{n+1}) \in E^{n+1}$  et  $\varphi \in \mathfrak{S}_{n+1}$  :

- ▷ si  $\varphi(n+1) = n+1$  alors  $\varphi$  induit une bijection de  $\llbracket 1 ; n \rrbracket$  dans lui-même donc d'après l'hypothèse de récurrence,  $\sum_{k=1}^n x_k = \sum_{k=1}^n x_{\varphi(k)}$  donc  $\sum_{k=1}^{n+1} x_{\varphi(k)} = \sum_{k=1}^n x_{\varphi(k)} + x_{\varphi(n+1)} = \sum_{k=1}^n x_k + x_{n+1} = \sum_{k=1}^{n+1} x_k$  ;
- ▷ si  $\varphi(n+1) = m \neq n+1$ , alors on pose  $\psi = (m \ n+1)\varphi$  et  $a = \varphi^{-1}(n+1)$ . On a alors  $\psi(n+1) = n+1$ ,  $\psi(a) = m$  et pour tout  $k \in \llbracket 1 ; n+1 \rrbracket \setminus \{a, n+1\}$ ,  $\psi(k) = \varphi(k)$ . D'après le cas précédent,  $\sum_{k=1}^{n+1} x_k = \sum_{k=1}^{n+1} x_{\psi(k)}$ , donc en utilisant le résultat précédent :

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} x_k &= \sum_{k=1}^{a-1} x_{\psi(k)} + x_{\psi(a)} + \sum_{k=a+1}^n x_{\psi(k)} + x_{\psi(n+1)} \\ &= \sum_{k=1}^{a-1} x_{\varphi(k)} + x_m + \sum_{k=a+1}^n x_{\varphi(k)} + x_{n+1} \\ &= \sum_{k=1}^{a-1} x_{\varphi(k)} + x_{\varphi(n+1)} + \sum_{k=a+1}^n x_{\varphi(k)} + x_{\varphi(a)} \\ &= \sum_{k=1}^{n+1} x_{\varphi(k)}. \end{aligned}$$

Dans les deux cas, on a montré  $\sum_{k=1}^{n+1} x_{\varphi(k)} = \sum_{k=1}^{n+1} x_k$ . Autrement dit,  $\mathcal{P}(n+1)$  est vraie.

D'après le principe de récurrence, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\mathcal{P}(n)$  est vraie. ■

---

### Proposition 3.4

Soient  $I$  un ensemble fini et non-vidé d'indices,  $n$  son cardinal et  $f, g$  deux bijections de  $\llbracket 1 ; n \rrbracket$  dans  $I$  (des énumérations de  $I$ ).

Alors pour tout  $(x_i)_{i \in I} \in E^I$ ,  $\sum_{k=1}^n x_{f(k)} = \sum_{k=1}^n x_{g(k)}$ .

---

*Démonstration 3.5*

On remarque que  $g^{-1} \circ f$  est une bijection de  $\llbracket 1 ; n \rrbracket$  dans lui-même donc d'après la Proposition 3.1 :

$$\sum_{k=1}^n x_{g(k)} = \sum_{k=1}^n x_{g(g^{-1} \circ f(k))} = \sum_{k=1}^n x_{f(k)}.$$

■

Autrement dit, quel que soit l'ordre dans lequel on numérote les éléments de la famille  $(x_i)_{i \in I}$ , on obtient toujours la même somme en les additionnant.

---

### Définition 3.6

Si  $I$  est un ensemble fini d'indices et  $(x_i)_{i \in I}$  une famille d'éléments de  $E$ , alors on pose  $\sum_{i \in I} x_i$  la valeur d'une somme  $\sum_{k=1}^n x_{f(k)}$ , où  $f$  est une bijection de  $\llbracket 1 ; n \rrbracket$  dans  $I$  quelconque.

Cette définition est cohérente, puisque la valeur de la somme  $\sum_{k=1}^n x_{f(k)}$  ne dépend pas du choix de  $f$  d'après la proposition précédente. Autrement dit, il est inutile de connaître l'énumération choisie pour additionner les éléments de la famille, on peut considérer cette somme comme une somme « en vrac » de tous les éléments.

### 3.1.2 Propriétés

---

#### Proposition 3.7

Soient  $I$  un ensemble fini d'indices de cardinal  $n$  et  $(x_i)_{i \in I}$  une famille d'éléments de  $E$ .

Alors :

- (1) pour toute bijection  $f$  d'un ensemble  $J$  dans  $I$ ,  $\sum_{i \in I} x_i = \sum_{j \in J} x_{f(j)}$  (changement d'indice dans une somme) ;
- (2) pour toute bijection  $f$  de  $I$  dans lui-même,  $\sum_{i \in I} x_i = \sum_{i \in I} x_{f(i)}$  (propriété de commutativité) ;
- (3) pour tout couple  $(J, J')$  de parties de  $I$  disjointes et de réunion  $I$ ,  $\sum_{i \in I} x_i = \sum_{i \in J} x_i + \sum_{i \in J'} x_i$  (propriété d'associativité) ;
- (4) plus généralement, pour toute partition  $(I_k)_{k \in K}$  de l'ensemble  $I$ ,  $\sum_{i \in I} x_i = \sum_{k \in K} \sum_{i \in I_k} x_i$ .

---

#### Démonstration 3.8 (1)

Soit  $f$  une bijection de  $J$  dans  $I$ . On choisit une énumération  $\psi$  de  $J$ . Alors  $f \circ \psi$  est une énumération de  $I$ .

Alors, par définition,  $\sum_{i \in I} x_i = \sum_{k=1}^n x_{f \circ \psi(k)}$  et  $\sum_{j \in J} x_{f(j)} = \sum_{k=1}^n x_{f \circ \psi(k)}$  donc  $\sum_{i \in I} x_i = \sum_{j \in J} x_{f(j)}$ . ■

---

*Démonstration 3.9 (2)*

Cas particulier  $I = J$  du point précédent. ■

---

*Démonstration 3.10 (3)*

Soit  $(J, J')$  un couple de parties de  $I$  disjointes et de réunion  $I$ . On note  $q$  le cardinal de  $J$ , de sorte que  $n - q$  est le cardinal de  $J'$ .

On choisit une énumération  $\varphi$  de  $J$  et une énumération  $\psi$  de  $J'$ . Alors l'application

$$\begin{aligned} \theta : \llbracket 1 ; n \rrbracket &\longrightarrow I \\ k &\longmapsto \begin{cases} \varphi(k) & \text{si } k \leq q \\ \psi(k - q) & \text{sinon} \end{cases} \end{aligned}$$

est une énumération de  $I$ .

Donc

$$\begin{aligned} \sum_{i \in I} x_i &= \sum_{k=1}^n x_{\theta(k)} \\ &= \sum_{k=1}^q x_{\theta(k)} + \sum_{k=q+1}^n x_{\theta(k)} \\ &= \sum_{k=1}^q x_{\varphi(k)} + \sum_{k=q+1}^n x_{\psi(k-q)} \\ &= \sum_{k=1}^q x_{\varphi(k)} + \sum_{k=1}^{n-q} x_{\psi(k)} \\ &= \sum_{i \in J} x_i + \sum_{i \in J'} x_i. \end{aligned}$$
■

---

*Démonstration 3.11 (4)*

Si  $(I_k)_{k \in K}$  est une partition de l'ensemble  $I$ , l'ensemble  $K$  est fini donc par récurrence sur le cardinal  $b$  de  $K$ , on montre  $\sum_{i \in I} x_i = \sum_{k \in K} \sum_{i \in I_k} x_i$  en utilisant le cas  $b = 2$  démontré précédemment (il suffit de choisir un élément  $a$  de  $K$ , poser  $J = I_a$  et  $J' = \bigsqcup_{k \in K \setminus \{a\}} I_k$  et remarquer que la famille  $(I_k)_{k \in K \setminus \{a\}}$  est une partition de l'ensemble  $J'$  et que le cardinal de  $K \setminus \{a\}$  est  $b - 1$ ). ■

## 3.2 Conventions de calcul dans $\mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$

L'ensemble  $\mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$  est muni d'une addition : pour tout  $(x, y) \in (\mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\})^2$ ,

- si  $x$  et  $y$  sont réels,  $x + y$  est la somme habituelle de deux réels positifs ;
- si  $x = +\infty$  ou  $y = +\infty$  alors on pose  $x + y = +\infty$

et d'une multiplication :

- si  $x$  et  $y$  sont réels,  $xy$  est le produit habituel de deux réels positifs ;
- si  $x = 0$  ou  $y = 0$  alors on pose  $xy = 0$  ;
- si  $x = y = +\infty$  alors on pose  $xy = +\infty$ .

Il est aussi muni d'une relation d'ordre :

- si  $x$  et  $y$  sont deux réels, alors  $x \leq y$  ou  $x < y$  désignent les relations habituelles ;
- si  $x$  est réel et  $y = +\infty$ , alors on pose  $x \leq +\infty$  et  $x < +\infty$  ;
- si  $x = y = +\infty$  alors  $+\infty \leq +\infty$ .

### **Proposition 3.12**

*L'addition dans  $\mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$  est associative, commutative et admet pour neutre 0.*

*La relation  $\leq$  est une relation d'ordre total dans  $\mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$ .*

*De plus, l'addition et la multiplication sont compatibles avec la relation d'ordre : on peut additionner ou multiplier deux inégalités membre à membre.*

### **Définition 3.13**

Soit  $A$  une partie non-vide de  $\mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$ .

Si  $A$  ne contient pas  $+\infty$ , alors :

- si  $A$  est majorée, elle possède une borne supérieure dans  $\mathbb{R}$  ;
- sinon on pose  $\sup A = +\infty$ .

Si  $A$  contient  $+\infty$ , on pose  $\sup A = +\infty$ .

Cette définition prolonge la notion de borne supérieure à toutes les parties de  $\mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$ , au sens où pour toute partie  $A$  de  $\mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$ ,  $\sup A$  est le plus petit majorant dans  $\mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$  de la partie  $A$ .

## 3.3 Somme d'une famille de réels positifs

---

### Définition 3.14

Soit  $(x_i)_{i \in I}$  une famille d'éléments de  $\mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$ .

On pose  $\sum_{i \in I} x_i = \sup \left\{ \sum_{i \in J} x_i \mid J \subseteq_f I \right\}$ .

---

### Remarque 3.15

Cette définition est sensée, car l'ensemble  $\left\{ \sum_{i \in J} x_i \mid J \subseteq_f I \right\}$  est une partie de  $\mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$ , donc possède toujours une borne supérieure dans  $\mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$ .

---

### Définition 3.16

Soit  $(x_i)_{i \in I}$  une famille d'éléments de  $\mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$ .

On dit que la famille  $(x_i)_{i \in I}$  est sommable quand  $\sum_{i \in I} x_i < +\infty$ .

Évidemment, une famille sommable positive ne peut pas prendre la valeur  $+\infty$ , autrement dit, une famille sommable est nécessairement une famille de réels positifs.

### 3.3.1 Propriétés

---

#### Proposition 3.17

La somme d'une famille  $(x_i)_{i \in I}$  d'éléments de  $\mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$  est invariante par permutation : si  $\sigma$  est une permutation de  $I$ , alors  $\sum_{i \in I} x_i = \sum_{i \in I} x_{\sigma(i)}$ .

En particulier, si  $(x_i)_{i \in I}$  est une famille sommable, toute permutation de la famille est encore une famille sommable de même somme.

En particulier, dans le cas où  $I = \mathbb{N}$ , si une série à termes positifs  $\sum u_n$  est convergente, alors on dit qu'elle est commutativement convergente : changer l'ordre des termes change bien sûr les valeurs des sommes partielles mais ne change pas la valeur de la limite de ces sommes partielles.

---

#### Proposition 3.18

Soient  $(x_i)_{i \in I}, (y_i)_{i \in I}$  deux familles d'éléments de  $\mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$  et  $\lambda$  un réel positif.

Alors  $\sum_{i \in I} (x_i + y_i) = \sum_{i \in I} x_i + \sum_{i \in I} y_i$  et  $\sum_{i \in I} \lambda x_i = \lambda \sum_{i \in I} x_i$ .



---

**Corollaire 3.19**

*La somme de deux familles positives est sommable ssi les deux familles sont sommables.*

*Le produit par un réel strictement positif d'une famille positive est sommable ssi la famille est sommable.*

---

**Proposition 3.20**

*Soient  $(x_i)_{i \in I}$ ,  $(y_i)_{i \in I}$  deux familles d'éléments de  $\mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$ .*

*Si pour tout  $i \in I$ ,  $0 \leq x_i \leq y_i$  et si la famille  $(y_i)_{i \in I}$  est sommable, alors la famille  $(x_i)_{i \in I}$  l'est aussi et  $\sum_{i \in I} x_i \leq \sum_{i \in I} y_i$ .*

### 3.3.2 Théorème de sommation par paquets

---

**Théorème 3.21**

*Soit  $(x_i)_{i \in I}$  une famille de réels positifs.*

*Si  $I$  est partitionné en une famille  $(I_p)_{p \in P}$  de parties, alors*

$$\sum_{p \in P} \sum_{i \in I_p} x_i = \sum_{i \in I} x_i.$$

### 3.3.3 Théorème de Fubini

---

**Théorème 3.22**

*Soit  $(x_{ij})_{(i,j) \in I \times J}$  une famille de réels positifs. Alors*

$$\sum_{(i,j) \in I \times J} x_{ij} = \sum_{j \in J} \sum_{i \in I} x_{ij} = \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} x_{ij}.$$

Ce résultat se généralise par récurrence dans le cas d'un produit cartésien  $I_1 \times \cdots \times I_k$ .

Un cas particulier courant.

---

**Proposition 3.23**

*Soient  $(a_i)_{i \in I}$ ,  $(b_j)_{j \in J}$  deux familles de réels positifs.*

*Alors la famille  $(a_i b_j)_{(i,j) \in I \times J}$  est sommable ssi les familles  $(a_i)_{i \in I}$  et  $(b_j)_{j \in J}$  sont sommables et dans ce cas, on a*

$$\sum_{(i,j) \in I \times J} a_i b_j = \sum_{i \in I} a_i \times \sum_{j \in J} b_j.$$

## 3.4 Familles sommables dans un espace vectoriel normé de dimension finie

### 3.4.1 Définitions

---

#### Définition 3.24

Soit  $(x_i)_{i \in I}$  une famille de vecteurs de  $E$ .

On dit que la famille  $(x_i)_{i \in I}$  est sommable quand la famille  $(\|x_i\|)_{i \in I}$  est sommable, c'est-à-dire quand  $\sum_{i \in I} \|x_i\| < +\infty$ .

Cette définition est indépendante du choix de la norme, car en dimension finie, toutes les normes sont équivalentes.

#### 3.4.1.1 Cas réel

---

#### Définition 3.25

Soit  $x$  un réel.

On appelle partie positive de  $x$  le réel  $x^+ = \max(0, x)$  et partie négative de  $x$  le réel  $x^- = -\min(x, 0)$ .

On remarque les égalités suivantes :  $|x| = x^+ + x^-$  et  $x = x^+ - x^-$ .

#### Proposition 3.26

Soit  $(x_i)_{i \in I}$  une famille sommable de nombre réels.

Alors les familles positives  $(x_i^+)_{i \in I}$  et  $(x_i^-)_{i \in I}$  sont sommables et on a bien sûr  $\sum_{i \in I} |x_i| = \sum_{i \in I} x_i^+ + \sum_{i \in I} x_i^-$ .

On pose alors  $\sum_{i \in I} x_i = \sum_{i \in I} x_i^+ - \sum_{i \in I} x_i^-$ , qui est un réel tel que  $\left| \sum_{i \in I} x_i \right| \leq \sum_{i \in I} |x_i|$ .

#### 3.4.1.2 Cas complexe

---

#### Proposition 3.27

Soit  $(a_k)_{k \in I}$  une famille sommable de nombres complexes.

Alors les deux familles réelles  $(\operatorname{Re} a_k)_{k \in I}$  et  $(\operatorname{Im} a_k)_{k \in I}$  sont sommables.

On pose alors  $\sum_{k \in I} a_k = \sum_{k \in I} \operatorname{Re} a_k + \sum_{k \in I} \operatorname{Im} a_k$  qui est un complexe tel que  $\left| \sum_{k \in I} a_k \right| \leq \sum_{k \in I} |a_k|$ .

---

*Exemple 3.28*

- ▷ Toute famille finie est sommable et sa somme au sens des familles sommables est sa somme habituelle.
- ▷ Une suite  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est sommable ssi la série  $\sum_n a_n$  est absolument convergente.

---

**Exercice 3.29**

Soit  $\theta \in ]0 ; 2\pi[$ . Montrez que la famille  $\left( \frac{e^{i\ell\theta}}{(k+\ell)^3} \right)_{(k,\ell) \in (\mathbb{N}^*)^2}$  est sommable.

### 3.4.1.3 Cas général

Comme  $E$  est de dimension finie, on en choisit une base  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$ .

Pour toute famille sommable  $(x_i)_{i \in I} \in E^I$ , on note  $(x_{i1}, \dots, x_{ip})$  les coordonnées de  $x_i$  dans la base  $\mathcal{B}$ .

Alors pour tout  $k \in \llbracket 1 ; p \rrbracket$ , la famille de réels ou de complexes  $(x_{ik})_{i \in I}$  est sommable.

On pose alors  $\sum_{i \in I} x_i$  le vecteur qui a pour coordonnées  $\left( \sum_{i \in I} x_{i1}, \dots, \sum_{i \in I} x_{ip} \right)$  dans la base  $\mathcal{B}$ .

On note  $\ell^1(I, E)$  l'ensemble des familles sommables de  $E$  indicées par  $I$ .

## 3.4.2 Propriétés

---

**Proposition 3.30**

*Toute sous-famille d'une famille sommable de  $E$  est elle-même sommable.*

*Toute permutation d'une famille sommable de  $E$  est encore sommable et de même somme.*

En particulier, les séries absolument convergentes sont commutativement convergentes.

Les familles sommables sont celles qui sont approchables par des familles finies à  $\varepsilon$  près au sens de la proposition suivante.

Comme pour les séries, on dispose d'un théorème de comparaison entre familles sommables.

---

**Proposition 3.31**

*Soient  $(a_i)_{i \in I}, (b_i)_{i \in I}$  deux familles d'éléments indicées par  $I$ .*

*Si pour tout  $i \in I$ ,  $0 \leq \|a_i\| \leq b_i$  et si la famille  $(b_i)_{i \in I}$  est une famille sommable de réels positifs,*

*alors la famille  $(a_i)_{i \in I}$  est sommable et on a  $\left\| \sum_{i \in I} a_i \right\| \leq \sum_{i \in I} \|a_i\| \leq \sum_{i \in I} b_i$ .*

La linéarité est encore vérifiée, mais n'est pas évidente au regard des définitions.

---

### Proposition 3.32

L'ensemble  $\ell^1(I, E)$  est un espace vectoriel et l'application  $(a_i)_{i \in I} \mapsto \sum_{i \in I} a_i$  est une forme linéaire : si  $(a_i), (b_i) \in \ell^1(I, E)$  et  $\lambda$  est un scalaire, alors  $\sum_{i \in I} (a_i + b_i) = \sum_{i \in I} a_i + \sum_{i \in I} b_i$  et  $\sum_{i \in I} \lambda a_i = \lambda \sum_{i \in I} a_i$ .

### 3.4.3 Théorème de sommation par paquets

---

#### Théorème 3.33

Soit  $(a_i)_{i \in I}$  une famille sommable de  $E$ .

Si  $I$  est partitionné en une famille  $(I_p)_{p \in P}$  de parties, alors pour tout  $p \in P$ ,  $(a_i)_{i \in I_p}$  est sommable et

$$\sum_{i \in I} a_i = \sum_{p \in P} \sum_{i \in I_p} a_i.$$

---

#### Exercice 3.34

Montrez que pour tout complexe  $z$  tel que  $0 < |z| < 1$ , la famille  $(z^{|n|})_{n \in \mathbb{Z}}$  est sommable et calculez sa somme.

---

#### Exercice 3.35

Montrez que la famille  $\left( \frac{(-1)^n}{\max(m, n)^3} \right)_{m, n \geq 1}$  est sommable et calculez sa somme en fonction de  $\zeta(2)$  et  $\zeta(3)$ .

### 3.4.4 Théorème de Fubini

---

#### Théorème 3.36

Soit  $(a_{ij})_{(i,j) \in I \times J}$  une famille sommable de  $E$ .

Alors pour tout  $i \in I$ , la famille  $(a_{ij})_{j \in J}$  est sommable ; pour tout  $j \in J$ , la famille  $(a_{ij})_{i \in I}$  est sommable et

$$\sum_{(i,j) \in I \times J} a_{ij} = \sum_{j \in J} \sum_{i \in I} a_{ij} = \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} a_{ij}.$$

Ce résultat se généralise par récurrence dans le cas d'un produit cartésien  $I_1 \times \cdots \times I_k$ .

---

**Exercice 3.37**

Montrez que la famille  $\left(\frac{(-1)^p}{q^p}\right)_{p,q \geq 2}$  est sommable et calculez sa somme.

Un cas particulier courant.

---

**Proposition 3.38**

Soient  $(a_i) \in \ell^1(I, E)$  et  $(b_j) \in \ell^1(J, E)$ .

Alors la famille  $(a_i b_j)_{(i,j) \in I \times J}$  est sommable et

$$\sum_{(i,j) \in I \times J} a_i b_j = \sum_{i \in I} a_i \times \sum_{j \in J} b_j.$$

### 3.4.5 Produit de Cauchy de deux séries

---

**Définition 3.39**

Soient  $\sum_{n \geq 0} a_n$  et  $\sum_{n \geq 0} b_n$  deux séries à termes dans  $E$ .

On appelle produit de Cauchy des deux séries la série  $\sum_{n \geq 0} c_n$  où pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$ .

---

*Remarque 3.40*

Quand les séries ne commencent pas à partir du rang 0, il faut se méfier ! Une idée simple est de se ramener au cas précédent en décalant les indices.

Exemple très courant : les séries commençant au rang 1. Dans ce cas, le produit de Cauchy des séries

$\sum_{n \geq 1} a_n$  et  $\sum_{n \geq 1} b_n$  est la série  $\sum_{n \geq 1} c_n$  où pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $c_n = \sum_{k=1}^n a_k b_{n-k+1}$ .

---

**Théorème 3.41**

Si les séries  $\sum_{n \geq 0} a_n$  et  $\sum_{n \geq 0} b_n$  sont absolument convergentes, alors leur produit de Cauchy est aussi absolument convergent et

$$\sum_{n=0}^{+\infty} c_n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \times \sum_{n=0}^{+\infty} b_n.$$

Un exemple fondamental.

---

**Proposition 3.42**

Soit  $z \in \mathbb{C}$ . La série de terme général  $\frac{z^n}{n!}$  est absolument convergente et

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!} = e^z.$$

---

**Remarque 3.43**

L'absolue convergence des séries est indispensable ! Si on ne suppose que la convergence des séries, alors le produit de Cauchy peut très bien être une série divergente (voir exercice suivant).

---

**Exercice 3.44**

Soit  $x > 0$ . On pose  $b_n$  la somme partielle de la série  $\sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{n!}$  et  $c_n = \frac{b_n}{x^n}$ .

Donnez une CNS sur  $x$  pour que la série  $\sum_{n \geq 0} c_n$  converge. Dans le cas où elle converge, donnez la valeur de sa somme en fonction de  $x$ .

---

**Exercice 3.45**

Pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , on pose  $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ .

Montrez que la série  $\sum_{n \geq 1} a_n$  converge, mais que son produit de Cauchy avec elle-même diverge

(indication : pour tout  $b > 0$ , pour tout  $x \in [0 ; b]$ ,  $x(b-x) \leq \frac{b^2}{4}$ ).

# Chapitre 4

## Rappels et compléments d'algèbre linéaire

### Sommaire

---

<b>4.1</b>	<b>Sommes de sous-espaces vectoriels . . . . .</b>	<b>70</b>
4.1.1	Généralités . . . . .	70
4.1.2	Sommes directes . . . . .	70
4.1.3	Sous-espaces supplémentaires . . . . .	71
4.1.4	Cas particulier de deux sous-espaces . . . . .	72
4.1.5	Applications linéaires et sommes directes . . . . .	72
<b>4.2</b>	<b>Somme de sous-espaces vectoriels en dimension finie. . . . .</b>	<b>73</b>
4.2.1	Base adaptée à un sous-espace . . . . .	73
4.2.2	Sommes directes et bases . . . . .	73
4.2.3	Dimension d'une somme de sous-espaces vectoriels . . . . .	74
4.2.4	Sous-espaces supplémentaires . . . . .	74
4.2.5	Dimension d'une somme de deux sous-espaces vectoriels . . . . .	75
<b>4.3</b>	<b>Polynômes d'endomorphismes et de matrices . . . . .</b>	<b>75</b>
4.3.1	$\mathbb{K}$ -algèbres . . . . .	75
4.3.1.1	Définition . . . . .	75
4.3.1.2	Polynômes d'éléments dans une $\mathbb{K}$ -algèbre . . . . .	76
4.3.2	Cas particulier des algèbres $\mathcal{L}(E)$ ou $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ . . . . .	77
4.3.3	Polynôme annulateur d'une matrice ou d'un endomorphisme . . . . .	77
4.3.4	Utilisation pratique d'un polynôme annulateur . . . . .	79
4.3.4.1	Calcul de l'inverse . . . . .	79
4.3.4.2	Calcul de puissances . . . . .	79
<b>4.4</b>	<b>Matrices semblables, trace . . . . .</b>	<b>80</b>
4.4.1	Trace d'une matrice . . . . .	80
4.4.2	Matrices semblables . . . . .	81
4.4.3	Trace d'un endomorphisme . . . . .	81
<b>4.5</b>	<b>Opérations par blocs . . . . .</b>	<b>82</b>
4.5.1	Cas général . . . . .	82
4.5.2	Cas particuliers des matrices carrées . . . . .	83
4.5.3	Interprétation des blocs . . . . .	83

---

Dans tout ce chapitre,  $\mathbb{K}$  désigne un sous-corps de  $\mathbb{C}$ , en général  $\mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ .

## 4.1 Sommes de sous-espaces vectoriels

### 4.1.1 Généralités

---

**Définition 4.1**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $F_1, \dots, F_n$  des sous-espaces vectoriels de  $E$ .

On appelle somme de  $F_1, \dots, F_n$  l'ensemble noté  $F_1 + \dots + F_n$  :

$$F_1 + \dots + F_n = \left\{ \sum_{i=1}^n x_i \mid (x_1, \dots, x_n) \in F_1 \times \dots \times F_n \right\}.$$

---

**Proposition 4.2**

Soit  $(u_1, \dots, u_p, u_{p+1}, \dots, u_n) \in E^n$ .

Alors  $\text{Vect}(u_1, \dots, u_p, u_{p+1}, \dots, u_n) = \text{Vect}(u_1, \dots, u_p) + \text{Vect}(u_{p+1}, \dots, u_n)$ .

---

**Proposition 4.3**

Avec les mêmes notations :  $F_1 + \dots + F_n$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ .

De plus, c'est le plus petit sous-espace vectoriel qui contient  $F_1, \dots, F_n$ .

Si on connaît des familles génératrices de chacun des sous-espaces vectoriels  $F_1, \dots, F_n$ , alors en concaténant ces familles, on obtient une famille génératrice de  $F_1 + \dots + F_n$ .

Conséquence : en fractionnant une famille génératrice de  $E$  en sous-familles, on décompose l'espace  $E$  en une somme de sous-espaces vectoriels.

### 4.1.2 Sommes directes

---

**Définition 4.4**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $F_1, \dots, F_n$  des sous-espaces vectoriels de  $E$ .

On dit que la somme  $F_1 + \dots + F_n$  est directe quand tout vecteur de  $F_1 + \dots + F_n$  a une unique écriture  $\sum_{i=1}^n x_i$  où  $(x_1, \dots, x_n) \in F_1 \times \dots \times F_n$ .

On dit aussi que les sous-espaces sont en somme directe. Dans ce cas, quand on veut insister sur cette propriété, on note la somme sous la forme  $F_1 \oplus \dots \oplus F_n = \bigoplus_{i=1}^n F_i$ .



---

**Proposition 4.5**

*Avec les mêmes hypothèses.*

La somme  $F_1 + \dots + F_n$  est directe ssi le vecteur nul a une unique décomposition  $\sum_{i=1}^n x_i$  où  $(x_1, \dots, x_n) \in F_1 \times \dots \times F_n$ , qui est la décomposition triviale.

Autrement dit, la somme  $F_1 + \dots + F_n$  est directe ssi la seule solution de l'équation  $\sum_{i=1}^n x_i = 0$  d'inconnue  $(x_1, \dots, x_n) \in F_1 \times \dots \times F_n$  est le  $n$ -uplet nul.

Un exemple fondamental : si  $(v_1, \dots, v_n)$  est une famille libre, alors les droites vectorielles  $\text{Vect}(v_i)$  sont en somme directe.

---

**Proposition 4.6**

*Avec les mêmes hypothèses.*

Si la somme  $F_1 + \dots + F_n$  est directe, alors en concaténant des familles libres de chacun des sous-espaces vectoriels, on obtient une famille libre.

### 4.1.3 Sous-espaces supplémentaires

---

**Définition 4.7**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $F_1, \dots, F_n$  des sous-espaces vectoriels de  $E$ .

On dit que les sous-espaces  $F_1, \dots, F_n$  sont supplémentaires (dans  $E$ ) quand  $E = \bigoplus_{i=1}^n F_i$ .

On déduit des deux parties précédentes le résultat de la décomposition d'un vecteur.

---

**Proposition 4.8**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $F_1, \dots, F_n$  des sous-espaces vectoriels de  $E$ .

Il y a équivalence entre :

- ▷ les sous-espaces  $F_1, \dots, F_n$  sont supplémentaires
- ▷ tout vecteur de  $E$  peut s'écrire de façon unique comme somme de vecteurs des sous-espaces vectoriels  $F_1, \dots, F_n$  :

$$\forall v \in E, \exists! (v_1, \dots, v_n) \in F_1 \times \dots \times F_n, \quad v = \sum_{i=1}^n v_i.$$

Dans ce cas, soit  $v$  un vecteur de  $E$ . Il existe un unique  $n$ -uplet  $(v_1, \dots, v_n) \in F_1 \times \dots \times F_n$  tel que  $v = \sum_{i=1}^n v_i$ .

Pour tout  $j \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$ , on définit  $p_j : E \longrightarrow E$  en posant  $p_j(v) = v_j$ .

Alors les applications  $p_j$  sont des projecteurs qui vérifient les propriétés :

$$\triangleright \sum_{i=1}^n p_i = \text{id}_E$$

$\triangleright$  pour tout  $(i, j) \in \llbracket 1 ; n \rrbracket^2$ ,  $p_i \circ p_j = \delta_{ij} p_i$  où  $\delta_{xy}$  est le symbole de Kronecker.

La réciproque est vraie : si  $(p_1, \dots, p_n)$  sont  $n$  projecteurs vérifiant les deux propriétés précédentes, alors les sous-espaces  $(\text{Im } p_i)_{1 \leq i \leq n}$  sont supplémentaires.

#### Exercice 4.9

Soit  $E = \mathcal{F}(\mathbb{C}, \mathbb{C})$ . Pour  $k \in \{0, 1, 2\}$ , on pose  $E_k = \{f \in E \mid \forall x \in \mathbb{C}, f(jx) = j^k f(x)\}$ .

Montrez que  $E_0, E_1, E_2$  sont trois sous-espaces vectoriels de  $E$  supplémentaires.

#### Proposition 4.10

*Avec les mêmes hypothèses.*

*Si les sous-espaces  $F_1, \dots, F_n$  sont supplémentaires, alors en concaténant des bases de chacun des sous-espaces vectoriels, on obtient une base de  $E$ .*

### 4.1.4 Cas particulier de deux sous-espaces

#### Proposition 4.11

*Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $F, G$  deux sous-espaces vectoriels de  $E$ .*

*La somme  $F + G$  est directe ssi  $F \cap G = \{0\}$ .*

Attention ! Il ne faut pas généraliser à trois ou plus sous-espaces. Même si  $F_1 \cap F_2 \cap F_3$  est le sous-espace nul, on ne peut pas conclure que la somme  $F_1 + F_2 + F_3$  est directe.

### 4.1.5 Applications linéaires et sommes directes

---

**Proposition 4.12**

Soient  $E, F$  deux  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels,  $E_1, \dots, E_n$  des sous-espaces vectoriels supplémentaires dans  $E$  et  $f_1, \dots, f_n$  des applications linéaires de  $E_1, \dots, E_n$  dans  $F$  respectivement.

Alors il existe une unique application linéaire  $f$  de  $E$  dans  $F$  telle que pour tout  $i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$ ,  $f|_{E_i} = f_i$ .

Autrement dit, pour définir une application linéaire sur une somme directe de sous-espaces vectoriels, il suffit de la définir sur chacun des sous-espaces vectoriels.

---

**Exercice 4.13**

Soient  $E_1, \dots, E_n$  des sous-espaces vectoriels supplémentaires. Quelles sont les applications qui induisent l'application identité sur un des  $E_i$  et l'application nulle sur les autres  $E_j$  ?

## 4.2 Somme de sous-espaces vectoriels en dimension finie

### 4.2.1 Base adaptée à un sous-espace

---

**Définition 4.14**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension  $n$  et  $F$  un sous-espace vectoriel de  $E$  de dimension  $p$ .

On appelle base de  $E$  adaptée à  $F$  toute base de  $E$  qui contient une base de  $F$ . Quitte à changer l'ordre des vecteurs, on peut supposer dans une base adaptée à  $F$  que les  $p$  premiers vecteurs de la base forment une base de  $F$ .

---

**Définition 4.15**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension  $n$  et  $(F_1, \dots, F_p)$  une famille de sous-espaces vectoriels supplémentaires dans  $E$ .

On appelle base adaptée à la somme  $E = \bigoplus_{i=1}^p F_i$  la concaténation de bases de chacun des sous-espaces  $F_1, \dots, F_p$  (dans cet ordre).

Si  $\mathcal{B}$  est une base de  $E$ , alors en fractionnant la base en sous-familles, les sous-espaces vectoriels engendrés par chacune de ces sous-familles sont supplémentaires et la base est alors adaptée à la somme des sous-espaces.

### 4.2.2 Sommes directes et bases

On donne un moyen simple de vérifier qu'une somme est directe, voire plus.

---

**Proposition 4.16**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension  $n$  et  $(F_1, \dots, F_p)$  une famille de sous-espaces vectoriels de  $E$ .

Si en concaténant des bases de chacun des sous-espaces vectoriels  $F_1, \dots, F_p$  on obtient une famille libre, alors les sous-espaces vectoriels sont en somme directe.

Si en concaténant des bases de chacun des sous-espaces vectoriels  $F_1, \dots, F_p$  on obtient une base de  $E$ , alors les sous-espaces vectoriels sont supplémentaires.

### 4.2.3 Dimension d'une somme de sous-espaces vectoriels

---

**Proposition 4.17**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et  $F_1, \dots, F_n$  des sous-espaces vectoriels de  $E$ .

$$\text{Alors } \dim \sum_{i=1}^n F_i \leq \sum_{i=1}^n \dim F_i.$$

Il y a égalité quand la somme est directe.

---

**Théorème 4.18**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et  $F_1, \dots, F_n$  des sous-espaces vectoriels de  $E$ .

$$\text{Alors } F_1, \dots, F_n \text{ sont en somme directe ssi } \dim \sum_{i=1}^n F_i = \sum_{i=1}^n \dim F_i.$$

### 4.2.4 Sous-espaces supplémentaires

En dimension finie, on a une façon plus simple de prouver que des sous-espaces vectoriels sont supplémentaires.

---

**Proposition 4.19 (Trois pour le prix de deux)**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et  $F_1, \dots, F_n$  des sous-espaces vectoriels de  $E$ .

Quand deux propriétés parmi les trois suivantes sont vraies, alors la troisième l'est aussi :

$$\triangleright E = \sum_{i=1}^n F_i$$

$$\triangleright \dim \sum_{i=1}^n F_i = \sum_{i=1}^n \dim F_i$$

$$\triangleright \dim E = \sum_{i=1}^n \dim F_i$$

Donc dans ce cas, les sous-espaces vectoriels  $F_1, \dots, F_n$  sont supplémentaires.

En pratique, le cas le plus utile est le suivant : si  $\dim \sum_{i=1}^n F_i = \sum_{i=1}^n \dim F_i = \dim E$ , alors les sous-espaces vectoriels  $F_1, \dots, F_n$  sont supplémentaires.

#### Exercice 4.20

Dans  $\mathbb{R}^4$ , soient  $H = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + z + t = 0 \text{ et } x - y - z + t = 0\}$ ,  $F = \text{Vect}((-1, 0, 1, 1))$  et  $G = \text{Vect}((2, -1, 1, 0))$ .

$F$ ,  $G$  et  $H$  sont-ils supplémentaires ?

### 4.2.5 Dimension d'une somme de deux sous-espaces vectoriels

Rappel : la formule de Grassmann.

#### Proposition 4.21

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et  $F, G$  deux sous-espaces vectoriels de  $E$ .

Alors  $\dim(F + G) = \dim F + \dim G - \dim(F \cap G)$ .

## 4.3 Polynômes d'endomorphismes et de matrices

### 4.3.1 $\mathbb{K}$ -algèbres

#### 4.3.1.1 Définition

#### Définition 4.22

Un ensemble  $A$  est appelé  $\mathbb{K}$ -algèbre quand  $A$  est à la fois un anneau et un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, dont les multiplications sont compatibles.

Il y a donc trois lois dans une  $\mathbb{K}$ -algèbre :

- ▷ une addition classique + ;
- ▷ une multiplication externe . ;

- une multiplication interne, compatible avec la précédente :

$$\forall (\lambda, a, b) \in \mathbb{K} \times A^2, \quad \lambda.(ab) = (\lambda.a)b = a(\lambda.b).$$

On qualifie les  $\mathbb{K}$ -algèbres par du vocabulaire des anneaux (algèbres intègres, algèbres principales, etc) ou des espaces vectoriels (algèbres de dimension finie, etc).

#### Exemple 4.23

- $\mathbb{K}$  est lui-même une  $\mathbb{K}$ -algèbre, où les deux multiplications sont confondues ;  $\mathbb{C}$  est aussi une  $\mathbb{R}$ -algèbre de dimension 2.
- $\mathbb{K}[X]$  est une  $\mathbb{K}$ -algèbre intègre, commutative et de dimension finie.
- Si  $I$  est un intervalle,  $\mathcal{F}(I, \mathbb{K})$  est une  $\mathbb{K}$ -algèbre commutative, non-intègre et de dimension finie.
- Si  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  est une  $\mathbb{K}$ -algèbre de dimension  $n^2$  qui n'est ni intègre ni commutative.
- Si  $E$  est un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, alors  $\mathcal{L}(E)$  est une  $\mathbb{K}$ -algèbre de dimension finie ssi  $E$  l'est aussi qui n'est ni intègre ni commutative.

#### 4.3.1.2 Polynômes d'éléments dans une $\mathbb{K}$ -algèbre

##### Proposition 4.24

Soient  $A$  une  $\mathbb{K}$ -algèbre et  $a \in A$ .

Pour  $P = \sum_{i=0}^n c_i X^i \in \mathbb{K}[X]$ , on pose  $P(a) = \sum_{i=0}^n c_i a^i$ .

L'application  $\begin{array}{ccc} \mathbb{K}[X] & \longrightarrow & A \\ P & \longmapsto & P(a) \end{array}$  est alors un morphisme d'algèbres :

$$\forall (P, Q) \in \mathbb{K}[X]^2, \quad \forall \lambda \in \mathbb{K}, \quad \begin{cases} (P+Q)(a) = P(a) + Q(a) \\ (PQ)(a) = P(a)Q(a) \\ (\lambda P)(a) = \lambda P(a) \end{cases}$$

De plus, on note  $\mathbb{K}[a]$  l'ensemble  $\{P(a) \mid P \in \mathbb{K}[X]\}$  : cet ensemble est stable par les lois de  $A$ , on dit que c'est une sous-algèbre de  $A$ .

### 4.3.2 Cas particulier des algèbres $\mathcal{L}(E)$ ou $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$

$E$  étant un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, l'ensemble  $\mathcal{L}(E)$  est une  $\mathbb{K}$ -algèbre. De même,  $n$  étant un entier non-nul,  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  est une  $\mathbb{K}$ -algèbre. Dans ces algèbres, on définit naturellement la notion de polynôme d'endomorphisme ou de matrice. Bien sûr, ces notions sont liées par choix d'une base de l'espace.

---

**Proposition 4.25**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension  $n$ ,  $\mathcal{B}$  une base de  $E$  et  $f \in \mathcal{L}(E)$  tel que  $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = A$ .

Alors pour tout polynôme  $P \in \mathbb{K}[X]$ ,  $P(f)$  a pour matrice  $P(A)$  dans la base  $\mathcal{B}$ .

---

*Remarque 4.26*

- La « multiplication » dans  $\mathcal{L}(E)$  est la composition  $\circ$ . Donc la deuxième propriété de la Proposition 4.24 doit être comprise comme suit : si  $f \in \mathcal{L}(E)$ , alors  $(PQ)(f) = P(f) \circ Q(f)$ .
- Même si les multiplications dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  ou  $\mathcal{L}(E)$  ne sont pas commutatives en général, on peut intervertir l'ordre des polynômes car la multiplication dans  $\mathbb{K}[X]$  est commutative : si  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ,  $(PQ)(A) = P(A)Q(A) = Q(A)P(A)$  ; si  $u \in \mathcal{L}(E)$ ,  $(PQ)(u) = P(u) \circ Q(u) = Q(u) \circ P(u)$ .
- Attention aux notations ! Si  $f \in \mathcal{L}(E)$ ,  $x \in E$  et  $P \in \mathbb{K}[X]$ , alors l'application de  $P(f)$  au vecteur  $x$  se note  $P(f)(x)$  et pas  $P(f(x))$ , notation qui n'a aucun sens.

### 4.3.3 Polynôme annulateur d'une matrice ou d'un endomorphisme

---

**Définition 4.27**

Soient  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ . On appelle polynôme annulateur de  $A$  tout polynôme non-nul  $P \in \mathbb{K}[X]$  tel que  $P(A) = 0$ .

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $u \in \mathcal{L}(E)$ . On appelle polynôme annulateur de  $u$  tout polynôme non-nul  $P \in \mathbb{K}[X]$  tel que  $P(u) = 0$ .

---

*Remarque 4.28*

Attention à ne pas confondre les notions : si  $P$  est un polynôme annulateur de la matrice  $A$  (on dit aussi que  $P$  annule  $A$  par abus de langage), on ne dit pas que  $A$  est une racine de  $P$  !

Une racine d'un polynôme est un nombre...

De même, si  $P(u) = 0$ , on ne dit pas que  $u$  est une racine de  $P$ , ça n'a aucun sens.

---

**Définition 4.29**

Si  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ , alors l'ensemble  $\text{Ann}(A) = \{P \in \mathbb{K}[X] \mid P(A) = 0\}$  est appelé idéal annulateur de  $A$ .

Si  $u$  est un endomorphisme d'un espace vectoriel  $E$ , alors l'ensemble  $\text{Ann}(u) = \{P \in \mathbb{K}[X] \mid P(u) = 0\}$  est appelé idéal annulateur de  $u$ .

---

**Théorème 4.30**

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ . Alors  $\text{Ann}(A)$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{K}[X]$  stable par  $\times$ . De plus, il existe un unique polynôme unitaire  $\mu_A$  tel que  $\text{Ann}(A) = \mu_A \mathbb{K}[X]$ .

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et  $u \in \mathcal{L}(E)$ . Alors  $\text{Ann}(u)$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{K}[X]$  stable par  $\times$ . De plus, il existe un unique polynôme unitaire  $\mu_u$  tel que  $\text{Ann}(u) = \mu_u \mathbb{K}[X]$ .

---

*Remarque 4.31*

Ce dernier résultat est faux en dimension infinie. Contre-exemple : l'endomorphisme  $u : \mathbb{K}[X] \rightarrow \mathbb{K}[X]$  défini par  $u(P) = XP$ .

---

**Définition 4.32**

On appelle polynôme minimal d'une matrice carrée  $A$  le polynôme  $\mu_A$  précédent (noté aussi parfois  $\pi_A$ ). C'est le polynôme unitaire de degré minimal qui annule  $A$ .

On appelle polynôme minimal d'un endomorphisme  $u$  en dimension finie le polynôme  $\mu_u$  précédent (noté aussi parfois  $\pi_u$ ). C'est le polynôme unitaire de degré minimal qui annule  $u$ .

Autrement dit, on a l'équivalence : pour tout  $P \in \mathbb{K}[X]$ ,

$$P(u) = 0 \iff \mu_u \mid P.$$

De même, on a l'équivalence : pour tout  $P \in \mathbb{K}[X]$ ,

$$P(A) = 0 \iff \mu_A \mid P.$$

Les polynômes annulateurs sont donc les multiples des polynômes minimaux.

On verra plus tard qu'on peut trouver des polynômes annulateurs de plus petits degrés que ceux donnés par le théorème précédent.

En général, il est souvent pénible de calculer le polynôme minimal. En pratique, on se contente de trouver des polynômes annulateurs de degrés pas trop grands (et souvent, il s'agit du polynôme minimal).

---

*Remarque 4.33*

Si  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  et  $\mathbb{K}'$  est un sous-corps de  $\mathbb{C}$  qui contient  $\mathbb{K}$  (on dit que  $\mathbb{K}'$  est une extension de  $\mathbb{K}$ ), alors le polynôme minimal de  $A$ , vue comme matrice de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K}')$ , est a priori différent de celui de  $A$  vue comme matrice de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ . On peut seulement affirmer pour l'instant que  $\mu_A \mathbb{K}'$  divise  $\mu_A \mathbb{K}$ .

En fait, on montre plus loin que le polynôme minimal ne dépend pas du corps  $\mathbb{K}$ .



## 4.3.4 Utilisation pratique d'un polynôme annulateur

### 4.3.4.1 Calcul de l'inverse

---

**Proposition 4.34**

Soient  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

Alors  $A$  est inversible ssi  $A$  possède un polynôme annulateur  $P$  tel que  $0$  ne soit pas racine de  $P$ . Dans ce cas,  $A^{-1}$  est un polynôme en  $A$ .

De même, soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $f \in \mathcal{L}(E)$ .

Alors si  $f$  possède un polynôme annulateur  $P$  tel que  $0$  ne soit pas racine de  $P$ ,  $f$  est un automorphisme de  $E$ . Dans ce cas,  $f^{-1}$  est un polynôme en  $f$ . La réciproque est vraie si  $E$  est de dimension finie.

---

**Exercice 4.35**

On pose  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ . Déterminez un polynôme annulateur de  $A$ , montrez que  $A$  est inversible et calculez  $A^{-1}$ .

---

**Exercice 4.36**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $p \in \mathcal{L}(E)$  un projecteur. Déterminez un polynôme annulateur de  $p$ .

Soit  $\lambda \in \mathbb{K}$ . On pose  $f = p - \lambda \text{id}_E$ . Déterminez un polynôme annulateur de  $f$  et vérifiez que  $f$  est un automorphisme pour presque toutes les valeurs de  $\lambda$ ; dans ce cas, calculez son inverse.

### 4.3.4.2 Calcul de puissances

---

**Proposition 4.37**

Soient  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ . On choisit un polynôme annulateur  $P$  de la matrice  $A$ .

Alors pour tout  $p \in \mathbb{N}$ ,  $A^p = R_p(A)$  où  $R_p$  est le reste de la division euclidienne de  $X^p$  par  $P$ .

De même, soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $f \in \mathcal{L}(E)$  qui possède un polynôme annulateur  $P$ .

Alors pour tout  $p \in \mathbb{N}$ ,  $f^p = R_p(f)$  où  $R_p$  est le reste de la division euclidienne de  $X^p$  par  $P$ .

Conséquence :

- si  $A$  possède un polynôme annulateur de degré  $a$ , alors  $\mathbb{K}[A] = \{P(A) \mid P \in \mathbb{K}_{a-1}[X]\}$  ;
- si  $f$  possède un polynôme annulateur de degré  $a$ , alors  $\mathbb{K}[f] = \{P(f) \mid P \in \mathbb{K}_{a-1}[X]\}$ .

---

**Proposition 4.38**

Si  $p$  est le degré du polynôme minimal d'une matrice  $A$ , alors  $\dim \mathbb{K}[A] = p$  et  $(I_n, A, \dots, A^{p-1})$  est une base de  $\mathbb{K}[A]$ .

Si  $p$  est le degré du polynôme minimal d'un endomorphisme  $f$  d'un espace vectoriel  $E$ , alors  $\dim \mathbb{K}[f] = p$  et  $(\text{id}_E, f, \dots, f^{p-1})$  est une base de  $\mathbb{K}[f]$ .

---

**Exercice 4.39**

Soient  $E$  un espace vectoriel et  $(p, q) \in \mathcal{L}(E)^2$  deux projecteurs tels que  $p + q = \text{id}_E$ . Vérifiez que  $p \circ q = q \circ p = 0$ . Déterminez un polynôme annulateur de  $f = 2p + 3q$ . Donnez une expression générale de  $f^k$  en fonction de  $f$  et  $k$ .

---

**Exercice 4.40**

On pose  $A = \begin{pmatrix} 2 & -4 & -5 \\ -1 & 2 & 2 \\ 1 & -2 & -2 \end{pmatrix}$ . Vérifiez que  $P = X^3 - 2X^2 + X$  est un polynôme annulateur de  $A$ . Donnez une expression générale de  $A^p$  en fonction de  $A$  et  $p$ .

---

**Corollaire 4.41**

Si  $\mathbb{K}'$  est une extension de  $\mathbb{K}$ , alors pour toute matrice  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ , ses polynômes minimaux relativement à  $\mathbb{K}$  et  $\mathbb{K}'$  sont égaux :  $\mu_{A\mathbb{K}} = \mu_{A\mathbb{K}'}$ .

Autrement dit, le polynôme minimal ne dépend pas du corps  $\mathbb{K}$ .

## 4.4 Matrices semblables, trace

### 4.4.1 Trace d'une matrice

---

**Définition 4.42**

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ . On appelle trace de  $A$  la somme de ses coefficients diagonaux :

$$\text{tr } A = \sum_{i=1}^n a_{ii}.$$

L'application trace vérifie de remarquables propriétés.

---

**Proposition 4.43**

- ▷ La trace est une forme linéaire sur  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .
- ▷ Pour tout  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ,  $\text{tr } ({}^t A) = \text{tr } A$ .
- ▷ Pour tout  $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2$ ,  $\text{tr } (AB) = \text{tr } (BA)$ .

## 4.4.2 Matrices semblables

---

### Définition 4.44

Soient  $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

On dit que  $A$  et  $B$  sont semblables quand il existe  $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$  telle que  $B = P^{-1}AP$ .

---

### Proposition 4.45

La relation de similitude entre matrices de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  est une relation d'équivalence.

La relation de similitude est une relation très contraignante. Il n'existe pas de caractérisation simple de la similitude entre deux matrices carrées : savoir si deux matrices sont semblables est un problème difficile.

D'après la formule de changement de base, on a immédiatement le résultat suivant.

---

### Proposition 4.46

Deux matrices de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  sont semblables ssi elle représentent un même endomorphisme dans des bases différentes. La matrice  $P$  est la matrice de passage d'une base à l'autre.

---

### Corollaire 4.47

Deux matrices semblables ont même rang, même trace et même déterminant.

---

Mais c'est loin d'être suffisant pour être semblables.

---

### Proposition 4.48

Si  $A$  et  $B$  sont deux matrices semblables, alors pour tout polynôme  $P \in \mathbb{K}[X]$ ,  $P(A)$  et  $P(B)$  sont semblables avec la même matrice de passage.

---

## 4.4.3 Trace d'un endomorphisme

---

### Proposition 4.49

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et  $f \in \mathcal{L}(E)$ .

Toutes les matrices carrées représentant  $f$  ont la même trace. Cette trace ne dépend donc pas du choix de la base dans laquelle on écrit la matrice de  $f$ , elle ne dépend que de  $f$  : on l'appelle trace de  $f$  et on la note  $\text{tr } f$ .

On peut alors reformuler les résultats sur la trace d'une matrice.

---

### Proposition 4.50

► La trace est une forme linéaire sur  $\mathcal{L}(E)$ .

► Pour tout  $(u, v) \in \mathcal{L}(E)^2$ ,  $\text{tr}(u \circ v) = \text{tr}(v \circ u)$ .

## 4.5 Opérations par blocs

### 4.5.1 Cas général

Soit  $(n, p) \in (\mathbb{N}^*)^2$ . On fixe deux entiers  $k, \ell$  tels que  $1 \leq k \leq n-1$  et  $1 \leq \ell \leq p-1$ .

À toute matrice  $M \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$ , on associe quatre matrices obtenues en découpant la matrice en blocs :

$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$$

où  $A = (m_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq k \\ 1 \leq j \leq \ell}}$ ,  $B = (m_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq k \\ \ell+1 \leq j \leq p}}$ ,  $C = (m_{ij})_{\substack{k+1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq \ell}}$  et  $D = (m_{ij})_{\substack{k+1 \leq i \leq n \\ \ell+1 \leq j \leq p}}$ .

Cette décomposition par blocs permet de faire des calculs formellement comme s'il s'agissait de nombres.

---

#### Proposition 4.51

Soient  $M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$  et  $M' = \begin{pmatrix} A' & B' \\ C' & D' \end{pmatrix}$  deux matrices de même taille décomposées de la même façon en blocs et  $\lambda \in \mathbb{K}$ .

Alors  $M + M' = \begin{pmatrix} A + A' & B + B' \\ C + C' & D + D' \end{pmatrix}$  et  $\lambda M = \begin{pmatrix} \lambda A & \lambda B \\ \lambda C & \lambda D \end{pmatrix}$ .

---

#### Proposition 4.52

Soient  $M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$  et  $M' = \begin{pmatrix} A' & B' \\ C' & D' \end{pmatrix}$  deux matrices telles que le produit  $MM'$  existe et décomposées en blocs.

Alors, sous réserve que les blocs soient de tailles compatibles pour la multiplication, on a

$$MM' = \begin{pmatrix} AA' + BC' & AB' + BD' \\ CA' + DC' & CB' + DD' \end{pmatrix}.$$

---

#### Remarque 4.53

- Comme les symboles mis en jeu ne sont pas des nombres mais des matrices, il est indispensable de respecter l'ordre dans les produits.
- On peut généraliser à un nombre quelconque de blocs, pas forcément deux en ligne ou en colonne.

### 4.5.2 Cas particuliers des matrices carrées

Si  $M$  est une matrice de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ , alors avec les mêmes notations, on choisit toujours  $A$  et  $D$  carrées elles aussi. Dans ce paragraphe, on suppose que c'est le cas.

---

**Définition 4.54**

On dit que  $M$  est triangulaire supérieure par blocs quand il existe des matrices carrées  $A_1, \dots, A_k$  telles que  $M$  soit de la forme

$$M = \begin{pmatrix} A_1 & ? & ? & \dots & ? \\ 0 & A_2 & ? & \dots & ? \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & A_{k-1} & ? \\ 0 & \dots & 0 & 0 & A_k \end{pmatrix}.$$

On définit de même la notion de matrice triangulaire inférieure par blocs.

---

**Définition 4.55**

On dit que  $M$  est diagonale par blocs quand il existe des matrices carrées  $A_1, \dots, A_k$  telles que  $M$  soit de la forme

$$M = \begin{pmatrix} A_1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & A_2 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & A_{k-1} & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & A_k \end{pmatrix}.$$

Les résultats sur les matrices triangulaires ou diagonales restent valables par blocs : la somme et le produit de deux matrices triangulaires supérieures par blocs de mêmes tailles l'est encore, et de même pour les matrices triangulaires inférieures par blocs et les matrices diagonales par blocs.

Une conséquence est qu'une matrice  $M$  triangulaire par blocs est inversible ssi tous les blocs diagonaux sont inversibles.

Dans ce cas, l'inverse de  $M$  est triangulaire par blocs et ses blocs diagonaux sont les inverses des blocs diagonaux de  $M$ .

En particulier, l'inverse d'une matrice  $M$  diagonale par blocs est la matrice diagonale par blocs dont les blocs diagonaux sont les inverses de ceux de  $M$ .

De plus, le déterminant d'une matrice triangulaire par blocs est le produit des déterminants des blocs diagonaux.

### 4.5.3 Interprétation des blocs

---

**Définition 4.56**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel,  $f \in \mathcal{L}(E)$  et  $F$  un sous-espace vectoriel de  $E$ .

On dit que  $F$  est stable par  $f$  quand  $f(F) \subseteq F$ , *i.e.* pour tout  $x \in F$ ,  $f(x) \in F$ .

Dans ce cas, on peut définir une application  $\varphi$  de  $F$  dans  $F$  en posant pour tout  $x \in F$ ,  $\varphi(x) = f(x)$ .

Il est facile de vérifier que  $\varphi$  est un endomorphisme de  $F$ , appelé endomorphisme induit par  $f$  dans  $F$ .

*Exemple 4.57*

Si  $g$  est un endomorphisme de  $E$  qui commute avec  $f$  (i.e.  $fg = gf$ ), alors  $\ker g$  et  $\operatorname{Im} g$  sont stables par  $f$ .

### Proposition 4.58

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension  $n$ ,  $f \in \mathcal{L}(E)$  et  $F$  un sous-espace vectoriel de  $E$  de dimension  $p$ .

Si  $F$  est stable par  $f$ , alors il existe une base de  $E$  dans laquelle la matrice de  $f$  est triangulaire supérieure par bloc, le premier bloc étant de taille  $(p, p)$  :

$$\operatorname{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix} \text{ et } A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K}).$$

Réciproquement, si  $f$  possède une matrice de cette forme, alors le sous-espace vectoriel engendré par les  $p$  premiers vecteurs est stable par  $f$ .

### Proposition 4.59

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension  $n$  et  $f \in \mathcal{L}(E)$ .

Si  $F_1, \dots, F_k$  sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires stables par  $f$  de dimensions respectives  $p_1, \dots, p_k$ , alors il existe une base de  $E$  dans laquelle la matrice de  $f$  est diagonale par blocs, la taille du  $i$ -ème bloc étant  $(p_i, p_i)$  :

$$\operatorname{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} A_1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & A_2 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & A_{k-1} & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & A_k \end{pmatrix}.$$

Réciproquement, si  $f$  possède une matrice dans une certaine base qui est diagonale par blocs et contenant  $k$  blocs carrés, alors il existe  $k$  sous-espaces vectoriels  $F_1, \dots, F_k$  stables par  $f$  et supplémentaires dans  $E$ .

# Chapitre 5

## Réduction des endomorphismes

### Sommaire

---

<b>5.1</b>	<b>Éléments propres d'un endomorphisme . . . . .</b>	<b>86</b>
5.1.1	Valeurs propres et vecteurs propres . . . . .	86
5.1.2	Lien avec les polynômes annulateurs . . . . .	87
5.1.3	Sous-espaces propres . . . . .	88
<b>5.2</b>	<b>Polynôme caractéristique d'un endomorphisme . . . . .</b>	<b>89</b>
5.2.1	Caractérisation des valeurs propres en dimension finie . . . . .	89
5.2.2	Définition et lien avec les valeurs propres . . . . .	89
5.2.3	Ordre de multiplicité et dimension du sous-espace propre . . . . .	90
5.2.4	Endomorphisme scindé . . . . .	91
<b>5.3</b>	<b>Éléments propres d'une matrice carrée . . . . .</b>	<b>91</b>
5.3.1	Valeurs propres et vecteurs propres . . . . .	92
5.3.2	Lien avec les polynômes annulateurs . . . . .	92
5.3.3	Sous-espaces propres . . . . .	93
<b>5.4</b>	<b>Polynôme caractéristique d'une matrice carrée . . . . .</b>	<b>94</b>
5.4.1	Définition et lien avec les valeurs propres . . . . .	94
5.4.2	Ordre de multiplicité et dimension du sous-espace propre . . . . .	94
5.4.3	Matrice scindée . . . . .	95
<b>5.5</b>	<b>Endomorphismes diagonalisables, matrices diagonalisables . . . . .</b>	<b>95</b>
5.5.1	Définition . . . . .	95
5.5.2	Caractérisations équivalentes . . . . .	97
5.5.3	Lien avec le polynôme caractéristique . . . . .	98
<b>5.6</b>	<b>Lien entre diagonalisabilité et polynômes annulateurs . . . . .</b>	<b>99</b>
5.6.1	Racines du polynôme minimal . . . . .	99
5.6.2	Lemme des noyaux . . . . .	99
5.6.3	Application à la diagonalisabilité . . . . .	100
5.6.4	Diagonalisabilité d'un endomorphisme induit . . . . .	101
<b>5.7</b>	<b>Quelques applications de la diagonalisation . . . . .</b>	<b>102</b>
5.7.1	Puissances d'une matrice, suites récurrentes linéairement . . . . .	102
5.7.2	Systèmes d'équations différentielles . . . . .	103
<b>5.8</b>	<b>Endomorphismes trigonalisables, matrices trigonalisables . . . . .</b>	<b>103</b>
5.8.1	Définition et propriétés . . . . .	103
5.8.2	Caractérisation équivalente . . . . .	104
5.8.3	Théorème de Cayley-Hamilton . . . . .	105
5.8.4	Sous-espaces caractéristiques . . . . .	105

<b>5.9</b>	<b>Endomorphismes nilpotents, matrices nilpotentes . . . . .</b>	<b>106</b>
5.9.1	Généralités . . . . .	106
5.9.2	Éléments propres d'un nilpotent . . . . .	106
5.9.3	Application aux sous-espaces caractéristiques d'un endomorphisme . . . . .	107

---

Dans ce chapitre,  $\mathbb{K}$  désigne un sous-corps de  $\mathbb{C}$ , en général  $\mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ .

## 5.1 Éléments propres d'un endomorphisme

Dans cette section,  $E$  est un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension quelconque, finie ou non.

### 5.1.1 Valeurs propres et vecteurs propres

---

#### Définition 5.1

Soient  $f \in \mathcal{L}(E)$  et  $\lambda \in \mathbb{K}$ .

On dit que  $\lambda$  est une valeur propre de  $f$  quand il existe un vecteur  $v$  non-nul tel que  $f(v) = \lambda v$ .

Si  $\lambda$  est une valeur propre de  $f$ , alors tout vecteur non-nul  $v$  tel que  $f(v) = \lambda v$  est appelé vecteur propre associé à la valeur propre  $\lambda$ .

---

#### Exemple 5.2

- Pour tout  $\alpha \in \mathbb{K}$ ,  $\alpha \text{id}_E$  a pour unique valeur propre  $\alpha$  et tout vecteur non-nul de  $E$  est un vecteur propre associé.
- Si  $p$  est un projecteur non-trivial (*i.e.*  $p \neq 0$  et  $p \neq \text{id}_E$ ), alors  $p$  a pour seules valeurs propres 0 et 1.
- De même, si  $s$  est une symétrie non-triviale (*i.e.*  $s \neq \text{id}_E$  et  $s \neq -\text{id}_E$ ), alors les valeurs propres de  $s$  sont 1 et  $-1$ .
- L'endomorphisme de  $\mathbb{K}[X]$   $P \mapsto XP$  n'a pas de valeur propre.

L'ensemble des valeurs propres d'un endomorphisme  $f$  est appelé le spectre de  $f$  et est noté  $\text{Sp}_{\mathbb{K}}(f)$  ou plus simplement  $\text{Sp}(f)$  (en toute rigueur, cette définition est fautive en dimension infinie, mais à notre niveau, cette approximation est acceptable).

---

#### Définition 5.3

On appelle droite propre d'un endomorphisme toute droite dirigée par un vecteur propre.



---

**Proposition 5.4**

*Les droites propres d'un endomorphisme sont exactement les droites stables par cet endomorphisme.*

---

**Exercice 5.5**

Soit  $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^{\mathbb{N}})$  défini par : si  $(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ , on pose  $f(u) = (u_{n+1})$ . Quelles sont les valeurs propres de  $f$  et les vecteurs propres associés ?

---

**Exercice 5.6**

Même question avec  $d$  l'opérateur de dérivation dans  $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ .

---

**Exercice 5.7**

Même question avec  $D$  l'opérateur de dérivation dans  $\mathbb{R}[X]$ .

---

### 5.1.2 Lien avec les polynômes annulateurs

En dimension quelconque, il est souvent difficile de trouver les valeurs propres d'un endomorphisme. La connaissance d'un polynôme annulateur peut aider.

---

**Lemme 5.8**

Soient  $f \in \mathcal{L}(E)$  et  $P \in \mathbb{K}[X]$ . Si  $\lambda$  est une valeur propre de  $f$  et  $v$  un vecteur propre associé, alors  $P(f)(v) = P(\lambda)v$ .

---

Si  $P \in \mathbb{K}[X]$ , on note  $Z_{\mathbb{K}}(P)$  l'ensemble des racines de  $P$  dans  $\mathbb{K}$ .

---

**Proposition 5.9**

Soit  $f \in \mathcal{L}(E)$ .

Si  $P$  est un polynôme annulateur de  $f$ , alors  $\text{Sp}(f) \subseteq Z_{\mathbb{K}}(P)$ .

---

**Remarque 5.10**

Attention ! La réciproque est fautive. Contre-exemple : le polynôme  $P = X^2 - 1$  est annulateur de  $\text{id}_E$  et pourtant  $-1$ , qui est racine de  $P$ , n'est pas valeur propre de  $\text{id}_E$ .

---

**Exercice 5.11**

Soit  $n \geq 2$ . Pour  $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ , on pose  $f(M) = M + {}^tM + \text{tr}(M)I_n$  :  $f$  est clairement un endomorphisme de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

Déterminez un polynôme annulateur de  $f$  de degré 3 et déduisez-en les valeurs propres de  $f$ .

### 5.1.3 Sous-espaces propres

---

**Proposition 5.12**

Soient  $f \in \mathcal{L}(E)$  et  $\lambda \in \mathbb{K}$ .

Alors  $\lambda$  est valeur propre de  $f$  ssi  $\ker(f - \lambda \text{id}_E) \neq \{0\}$ , autrement dit ssi  $f - \lambda \text{id}_E$  n'est pas injectif.

---

**Définition 5.13**

Soit  $f \in \mathcal{L}(E)$ .

Si  $\lambda \in \text{Sp}(f)$ , le noyau  $\ker(f - \lambda \text{id}_E)$  est appelé le sous-espace propre associé à la valeur propre  $\lambda$ . Il est souvent noté  $\text{sep}(f, \lambda)$ .

Par conséquent,  $\text{sep}(f, \lambda)$  est l'ensemble des vecteurs propres associés à la valeur propre  $\lambda$  auquel on ajoute le vecteur nul.

---

*Remarque 5.14*

Un cas particulier important : 0 est valeur propre ssi  $f$  n'est pas injective.

---

**Exercice 5.15**

Soit  $u$  un endomorphisme ayant pour matrice  $M = \begin{pmatrix} -3 & 4 & -4 \\ 4 & -3 & 3 \\ 4 & -4 & 4 \end{pmatrix}$  dans une certaine base  $\mathcal{B}$ .

Calculez  $M^3 + 2M^2 - 3M$ . Déduisez-en les valeurs propres de  $u$  puis déterminez les sous-espaces propres associés.

---

**Proposition 5.16**

Tout sous-espace propre d'un endomorphisme est stable par cet endomorphisme. L'endomorphisme induit sur un sous-espace propre est alors une homothétie.

---

**Théorème 5.17**

Soient  $f \in \mathcal{L}(E)$  et  $\lambda_1, \dots, \lambda_p$  des valeurs propres distinctes de  $f$ .

Alors les sous-espaces propres  $(\text{sep}(f, \lambda_i))_{1 \leq i \leq p}$  sont en somme directe.

Autrement dit, toute famille de vecteurs propres associés à des valeurs propres distinctes est libre.

---

*Remarque 5.18*

Quand on demande de déterminer les éléments propres d'un endomorphisme, on demande de déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres associés, i.e. les sous-espaces propres.

---

À partir de maintenant, il est toujours supposé que  $E$  est de dimension finie  $n$

## 5.2 Polynôme caractéristique d'un endomorphisme

### 5.2.1 Caractérisation des valeurs propres en dimension finie

---

#### Proposition 5.19

Soient  $f \in \mathcal{L}(E)$  et  $\lambda \in \mathbb{K}$ . Alors

$$\lambda \in \text{Sp}(f) \iff \text{rg}(f - \lambda \text{id}_E) < n.$$

Dans ce cas,  $\dim \text{sep}(f, \lambda) = n - \text{rg}(f - \lambda \text{id}_E)$ .

### 5.2.2 Définition et lien avec les valeurs propres

---

#### Définition 5.20

Soit  $f \in \mathcal{L}(E)$ .

On appelle polynôme caractéristique de  $f$  le polynôme  $\chi_f = \det(X \text{id}_E - f)$ .

La notation  $\chi_f$  est très courante : elle est à connaître.

---

#### Théorème 5.21

Soit  $f \in \mathcal{L}(E)$ .

Alors  $\chi_f$  est un polynôme unitaire de degré  $n$  de  $\mathbb{K}[X]$  et les valeurs propres de  $f$  sont exactement les racines dans  $\mathbb{K}$  de  $\chi_f$  :  $Z_{\mathbb{K}}(\chi_f) = \text{Sp}(f)$ .

Par conséquent, un endomorphisme d'un espace de dimension  $n$  a au plus  $n$  valeurs propres distinctes.

---

#### Exercice 5.22

Montrez que si  $\dim E = 2$ , alors pour tout  $f \in \mathcal{L}(E)$ ,  $\chi_f = X^2 - \text{tr}(f)X + \det f$ .

---

#### Exercice 5.23

Calculez le polynôme caractéristique d'un endomorphisme de matrice  $\begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$  et donnez ses valeurs propres.

---

**Exercice 5.24**

Soient  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  une base de  $E$ ,  $s = \sum_{i=1}^n e_i$  et  $f \in \mathcal{L}(E)$  tel que pour tout  $j \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$ ,  $f(e_j) = e_j + s$ .

Calculez son polynôme caractéristique et ses éléments propres.

On peut noter un lien avec la trace et le déterminant.

---

**Proposition 5.25**

Soit  $f \in \mathcal{L}(E)$ .

Alors  $\chi_f = X^n - \text{tr}(f) X^{n-1} + \dots + (-1)^n \det f$ .

### 5.2.3 Ordre de multiplicité et dimension du sous-espace propre

---

**Définition 5.26**

Soient  $f \in \mathcal{L}(E)$  et  $\lambda \in \text{Sp}(f)$ .

On appelle ordre de multiplicité de la valeur propre  $\lambda$  son ordre de multiplicité en tant que racine de  $\chi_f$ .

---

**Proposition 5.27**

Soient  $f \in \mathcal{L}(E)$ ,  $F$  un sous-espace vectoriel de  $E$  stable par  $f$  et  $g$  l'endomorphisme induit par  $f$  dans  $F$ .

Alors  $\chi_g$  divise  $\chi_f$ .

Une conséquence très importante de ce résultat est le théorème suivant.

---

**Théorème 5.28**

Soient  $f \in \mathcal{L}(E)$  et  $\lambda \in \text{Sp}(f)$ .

Si  $\lambda$  est une valeur propre d'ordre  $\alpha$ , alors  $1 \leq \dim \text{sep}(f, \lambda) \leq \alpha$ .

---

**Exercice 5.29**

Soit  $f$  un endomorphisme de matrice  $\begin{pmatrix} 3 & -4 & -5 \\ -1 & 3 & 2 \\ 1 & -2 & -1 \end{pmatrix}$ . Déterminez les valeurs propres de  $f$ , leur multiplicité et la dimension des sous-espaces propres associés.

## 5.2.4 Endomorphisme scindé

---

### Définition 5.30

On dit qu'un endomorphisme de  $E$  est scindé quand son polynôme caractéristique est scindé dans  $\mathbb{K}[X]$ .

Dans le cas d'un endomorphisme scindé, on connaît alors la somme et le produit des valeurs propres.

---

### Proposition 5.31

Si  $f \in \mathcal{L}(E)$  est scindé et a pour valeurs propres  $\lambda_1, \dots, \lambda_p$  avec les ordres de multiplicité  $\alpha_1, \dots, \alpha_p$ , alors

$$\operatorname{tr} f = \sum_{k=1}^p \alpha_k \lambda_k \quad \text{et} \quad \det f = \prod_{k=1}^p \lambda_k^{\alpha_k}.$$

Si  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$  alors on est dans ce cas, car tous les polynômes de  $\mathbb{C}[X]$  sont scindés dans  $\mathbb{C}[X]$  d'après le théorème de d'Alembert-Gauss.

Mais si  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ , alors il faut se méfier des raisonnements hâtifs : comme un  $\mathbb{R}$ -endomorphisme peut ne pas avoir de valeurs propres réelles, la trace et le déterminant peuvent ne pas avoir de rapport avec les valeurs propres.

---

### Exercice 5.32

Soit  $f$  un endomorphisme d'un  $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension  $n \geq 2$  dont la matrice dans une base est remplie par ligne de 1, ligne de 2, etc. Sans calculer le polynôme caractéristique, déterminez les valeurs propres complexes de  $f$ , leur multiplicité et la dimension des sous-espaces propres associés.

---

### Remarque 5.33

Dans le langage courant, on dit souvent que la trace est la somme des valeurs propres. Cette phrase est correcte seulement si l'on sous-entend que l'on parle de la somme des valeurs propres comptées chacune avec son ordre de multiplicité.

On rencontre en fait deux types de résultats à propos des valeurs propres :

- ceux où l'on parle des valeurs propres distinctes (comme le Théorème 5.21) ;
- ceux où l'on parle des valeurs propres comptées selon leur multiplicité (comme la Proposition 5.31).

Il faut donc être très attentif à la façon dont on considère les valeurs propres.

## 5.3 Éléments propres d'une matrice carrée

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . Les matrices-colonnes d'ordre  $n$  sont les matrices de  $\mathcal{M}_{n1}(\mathbb{K})$ , espace souvent identifié avec  $\mathbb{K}^n$ .

### 5.3.1 Valeurs propres et vecteurs propres

---

#### Définition 5.34

Soient  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  et  $\lambda \in \mathbb{K}$ .

On dit que  $\lambda$  est valeur propre de  $A$  quand il existe une matrice-colonne  $X$  non-nulle telle que  $AX = \lambda X$ .

Si  $\lambda$  est une valeur propre de  $A$ , alors toute matrice-colonne non-nulle  $X$  telle que  $AX = \lambda X$  est appelée vecteur propre associé à la valeur propre  $\lambda$ .

---

#### Exemple 5.35

- Pour tout  $\alpha \in \mathbb{K}$ ,  $\alpha I_n$  a pour unique valeur propre  $\alpha$  et toute matrice-colonne non-nulle est un vecteur propre associé.
- Si  $A$  est une matrice diagonale, alors ses valeurs propres sont les coefficients diagonaux et des vecteurs propres associés sont les colonnes remplies de 0 sauf un seul coefficient égal à 1.

L'ensemble des valeurs propres d'une matrice  $A$  est appelé le spectre de  $A$  et est noté  $\text{Sp}_{\mathbb{K}}(A)$  ou plus simplement  $\text{Sp}(A)$ .

Mais comme une matrice à coefficients réels est aussi une matrice à coefficients complexes, il vaut mieux savoir si on parle des valeurs propres réelles ou complexes. Il est donc préférable d'indiquer clairement le corps de base, comme le montre le résultat suivant.

---

#### Proposition 5.36

Soient  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  et  $\mathbb{K}'$  une extension de  $\mathbb{K}$  dans  $\mathbb{C}$ .

Alors  $\text{Sp}_{\mathbb{K}}(A) \subseteq \text{Sp}_{\mathbb{K}'}(A)$ .

---

#### Proposition 5.37

Soient  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ,  $f \in \mathcal{L}(E)$  et  $\mathcal{B}$  une base de  $E$ .

Si  $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ , alors  $\text{Sp}_{\mathbb{K}}(A) = \text{Sp}(f)$ .

Par conséquent, deux matrices semblables ont les mêmes valeurs propres (mais attention, pas forcément les mêmes vecteurs propres).

### 5.3.2 Lien avec les polynômes annulateurs

---

#### Proposition 5.38

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

Si  $P$  est un polynôme annulateur de  $A$ , alors  $\text{Sp}_{\mathbb{K}}(A) \subseteq Z_{\mathbb{K}}(P)$ .

Attention ! La réciproque est fausse. Contre-exemple : le polynôme  $P = X^2 - 1$  est annulateur de  $I_n$  et pourtant  $-1$ , qui est racine de  $P$ , n'est pas valeur propre de  $I_n$ .

### 5.3.3 Sous-espaces propres

---

#### Proposition 5.39

Soient  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  et  $\lambda \in \mathbb{K}$ .

Alors  $\lambda$  est valeur propre de  $A$  ssi  $A - \lambda I_n$  n'est pas inversible, autrement dit ssi  $\text{rg}(A - \lambda I_n) < n$  ou  $\det(A - \lambda I_n) = 0$ .

Si  $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(A)$ , le sous-espace propre associé à la valeur propre  $\lambda$  est l'ensemble des vecteurs propres associés à la valeur propre  $\lambda$  auquel on ajoute le vecteur nul. Il est souvent noté  $\text{sep}_{\mathbb{K}}(A, \lambda)$  :

$$\text{sep}_{\mathbb{K}}(A, \lambda) = \{X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) \mid AX = \lambda X\}.$$

---

#### Proposition 5.40

Soient  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  et  $\lambda \in \mathbb{K}$ . Alors

$$\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(A) \iff \text{rg}(A - \lambda I_n) < n.$$

Dans ce cas,  $\dim \text{sep}_{\mathbb{K}}(A, \lambda) = n - \text{rg}(A - \lambda I_n)$ .

Attention ! Dans la relation  $\dim \text{sep}_{\mathbb{K}}(A, \lambda) = n - \text{rg}(A - \lambda I_n)$ , c'est  $n$ , pas  $n^2$  ! Il s'agit de la dimension de  $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ , pas celle de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

---

#### Remarque 5.41

Un cas particulier important : 0 est valeur propre ssi  $A$  n'est pas inversible, c'est-à-dire ssi  $\text{rg} A < n$ .

---

#### Théorème 5.42

Soient  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  et  $\lambda_1, \dots, \lambda_p$  des valeurs propres distinctes de  $A$ .

Alors les sous-espaces propres  $(\text{sep}_{\mathbb{K}}(A, \lambda_i))_{1 \leq i \leq p}$  sont en somme directe.

Autrement dit, toute famille de vecteurs propres associés à des valeurs propres distinctes est libre.

---

#### Remarque 5.43

Quand on demande de déterminer les éléments propres d'une matrice, on demande de déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres associés, *i.e.* les sous-espaces propres.

## 5.4 Polynôme caractéristique d'une matrice carrée

### 5.4.1 Définition et lien avec les valeurs propres

---

**Définition 5.44**

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

On appelle polynôme caractéristique de  $A$  le polynôme  $\chi_A = \det(XI_n - A)$ .

---

**Proposition 5.45**

Soient  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ,  $f \in \mathcal{L}(E)$  et  $\mathcal{B}$  une base de  $E$ .

Si  $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ , alors  $\chi_A = \chi_f$ .

Par conséquent, deux matrices semblables ont le même polynôme caractéristique.

---

**Théorème 5.46**

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

Alors  $\chi_A$  est un polynôme unitaire de degré  $n$  de  $\mathbb{K}[X]$  et les valeurs propres de  $A$  sont exactement les racines de  $\chi_A$  dans  $\mathbb{K}$ .

Par conséquent, une matrice carrée de taille  $(n, n)$  a au plus  $n$  valeurs propres distinctes.

---

**Corollaire 5.47**

L'ensemble  $\text{GL}_n(\mathbb{K})$  est dense dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

On peut noter un lien avec la trace et le déterminant.

---

**Proposition 5.48**

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

Alors  $\chi_A = X^n - \text{tr}(A)X^{n-1} + \cdots + (-1)^n \det A$ .

### 5.4.2 Ordre de multiplicité et dimension du sous-espace propre

---

**Définition 5.49**

Soient  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  et  $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(A)$ .

On appelle ordre de multiplicité de la valeur propre  $\lambda$  son ordre de multiplicité en tant que racine de  $\chi_A$ .



---

**Théorème 5.50**

Soient  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  et  $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(A)$ .

Si  $\lambda$  est une valeur propre d'ordre  $\alpha$ , alors  $1 \leq \dim \text{sep}_{\mathbb{K}}(A, \lambda) \leq \alpha$ .

---

**Proposition 5.51**

Soient  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ,  $f \in \mathcal{L}(E)$  et  $\mathcal{B}$  une base de  $E$ .

Si  $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ , alors  $\dim \text{sep}_{\mathbb{K}}(A, \lambda) = \dim \text{sep}(f, \lambda)$ .

Par conséquent, deux matrices semblables ont des sous-espaces propres de même dimension (mais pas les mêmes vecteurs propres).

### 5.4.3 Matrice scindée

---

**Définition 5.52**

On dit qu'une matrice de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  est scindée quand son polynôme caractéristique est scindé dans  $\mathbb{K}[X]$ .

Dans le cas d'une matrice scindée, on connaît alors la somme et le produit des valeurs propres.

---

**Proposition 5.53**

Si  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  est scindée et a pour valeurs propres  $\lambda_1, \dots, \lambda_p$  avec les ordres de multiplicité  $\alpha_1, \dots, \alpha_p$ , alors

$$\text{tr } A = \sum_{k=1}^p \alpha_k \lambda_k \quad \text{et} \quad \det A = \prod_{k=1}^p \lambda_k^{\alpha_k}.$$

Si  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ , alors on est dans ce cas, car tous les polynômes de  $\mathbb{C}[X]$  sont scindés dans  $\mathbb{C}[X]$  d'après le théorème de d'Alembert-Gauss.

Mais si  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ , alors il faut se méfier des raisonnements hâtifs : comme un polynôme à coefficients réels peut ne pas avoir de racines réelles, la trace et le déterminant peuvent ne pas avoir de rapport avec les valeurs propres.

## 5.5 Endomorphismes diagonalisables, matrices diagonalisables

### 5.5.1 Définition

---

**Définition 5.54**

Soient  $f \in \mathcal{L}(E)$  et  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

On dit que  $f$  est diagonalisable quand il existe une base de  $E$  constituée de vecteurs propres de  $f$ .

On dit que  $A$  est diagonalisable dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  (ou  $\mathbb{K}$ -diagonalisable) quand il existe une base de  $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$  constituée de vecteurs propres de  $A$ .

D'après le lien entre les endomorphismes et les matrices carrées, un endomorphisme est diagonalisable ssi sa matrice dans n'importe quelle base est diagonalisable.

---

**Exercice 5.55**

La matrice  $\begin{pmatrix} 1 & \sqrt{3} \\ -\sqrt{3} & 1 \end{pmatrix}$  est-elle  $\mathbb{R}$ -diagonalisable ?  $\mathbb{C}$ -diagonalisable ?

---

**Exercice 5.56**

Montrez que la matrice  $A = \begin{pmatrix} 5 & -8 & -4 \\ 8 & -15 & -8 \\ -10 & 20 & 11 \end{pmatrix}$  est diagonalisable.

---

**Exercice 5.57**

Même exercice avec  $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 4 & -2 & 4 \end{pmatrix}$ .

---

**Exercice 5.58**

La matrice  $C = \begin{pmatrix} 11 & 7 & -3 \\ 11 & 7 & -3 \\ 66 & 42 & -18 \end{pmatrix}$  est-elle diagonalisable ?

---

**Proposition 5.59**

*Si un endomorphisme (une matrice) est diagonalisable, alors il (elle) est scindé(e).*

Mais la réciproque est fausse.

## 5.5.2 Caractérisations équivalentes

On note  $\mathcal{D}_n(\mathbb{K})$  l'ensemble des matrices diagonales de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

---

### Proposition 5.60

Soient  $f \in \mathcal{L}(E)$  et  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

$f$  est diagonalisable ssi il existe une base  $\mathcal{B}$  de  $E$  telle que  $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) \in \mathcal{D}_n(\mathbb{K})$ . Dans ce cas, les valeurs propres de  $f$  sont les éléments diagonaux de cette matrice.

$A$  est  $\mathbb{K}$ -diagonalisable ssi elle est  $\mathbb{K}$ -semblable à une matrice diagonale, i.e. il existe  $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$  et  $D \in \mathcal{D}_n(\mathbb{K})$  tel que  $A = PDP^{-1}$ . Dans ce cas, les valeurs propres de  $A$  sont les éléments diagonaux de  $D$ .

---

### Exemple 5.61

- Toute matrice diagonale est diagonalisable, car elle est semblable à elle-même.
- Les projecteurs et les symétries sont diagonalisables.

---

### Remarque 5.62

Quitte à changer l'ordre des vecteurs dans la base, on peut ranger les valeurs propres sur la diagonale dans l'ordre qu'on veut.

---

### Exemple 5.63

Si  $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ ,  $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 3 \end{pmatrix}$  et  $D = P^{-1}AP$ , alors la colonne 1 de  $P$  est un vecteur propre de  $A$  pour la valeur propre 1 et les deux autres sont des vecteurs propres pour la valeur propre 3, donc en posant  $Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ , on a  $Q^{-1}AQ = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ .

---

### Lemme 5.64

Soit  $f \in \mathcal{L}(E)$  diagonalisable : il existe une base de  $E$  dans laquelle la matrice  $D$  de  $f$  est diagonale.

Les valeurs propres de  $f$  sont les éléments diagonaux de  $D$  et si  $\lambda$  est un tel nombre, alors la dimension de  $\text{sep}(f, \lambda)$  est le nombre d'occurrences de  $\lambda$  dans la diagonale de  $D$ .

On en déduit les théorèmes suivants.

---

**Théorème 5.65**

Soit  $f \in \mathcal{L}(E)$ .

Il y a équivalence entre les propositions suivantes :

- ▷  $f$  est diagonalisable
- ▷ les sous-espaces propres de  $f$  sont supplémentaires dans  $E$
- ▷  $\sum_{\lambda \in \text{Sp}(f)} \dim \text{sep}(f, \lambda) = n$

Et sa version matricielle.

---

**Théorème 5.66**

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

Il y a équivalence entre les propositions suivantes :

- ▷  $A$  est diagonalisable dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$
- ▷ les sous-espaces propres de  $A$  dans  $\mathcal{M}_{n1}(\mathbb{K})$  sont supplémentaires dans  $\mathcal{M}_{n1}(\mathbb{K})$
- ▷  $\sum_{\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(A)} \dim \text{sep}_{\mathbb{K}}(A, \lambda) = n$

---

**Exercice 5.67**

On pose  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 4 & -2 & 4 \end{pmatrix}$ . On a vu à l'Exercice 5.57 que  $A$  est diagonalisable. Diagonalisez  $A$ .

### 5.5.3 Lien avec le polynôme caractéristique

---

**Théorème 5.68**

Soit  $f \in \mathcal{L}(E)$ .

Il y a équivalence entre les propositions suivantes :

- ▷  $f$  est diagonalisable
- ▷  $f$  est scindé et pour tout  $\lambda \in \text{Sp}(f)$ , la dimension de  $\text{sep}(f, \lambda)$  est égale à l'ordre de multiplicité de  $\lambda$

Et sa version matricielle.

---

**Théorème 5.69**

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

Il y a équivalence entre les propositions suivantes :

- ▷  $A$  est diagonalisable dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$
- ▷  $A$  est scindée et pour tout  $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(A)$ , la dimension de  $\text{sep}_{\mathbb{K}}(A, \lambda)$  est égale à l'ordre de multiplicité de  $\lambda$

Dans le cas où  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ , la condition « être scindé » est automatiquement satisfaite.

Un cas particulier très courant.

---

**Proposition 5.70**

Si un endomorphisme de  $E$  possède exactement  $n$  valeurs propres distinctes, alors il est diagonalisable.

Si une matrice de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  possède exactement  $n$  valeurs propres distinctes dans  $\mathbb{K}$ , alors elle est diagonalisable dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

---

**Exercice 5.71**

Montrez que la matrice  $\begin{pmatrix} -4 & 8 & 22 \\ -2 & 3 & 4 \\ -1 & 2 & 7 \end{pmatrix}$  est diagonalisable.

## 5.6 Lien entre diagonalisabilité et polynômes annulateurs

### 5.6.1 Racines du polynôme minimal

---

**Proposition 5.72**

Soit  $f \in \mathcal{L}(E)$ . Les racines de  $\mu_f$  sont exactement les valeurs propres de  $f$  :  $Z_{\mathbb{K}}(\mu_f) = \text{Sp}(f)$ .

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ . Les racines dans  $\mathbb{K}$  de  $\mu_A$  sont exactement les valeurs propres dans  $\mathbb{K}$  de  $A$  :  $Z_{\mathbb{K}}(\mu_A) = \text{Sp}_{\mathbb{K}}(A)$ .

### 5.6.2 Lemme des noyaux

---

**Proposition 5.73**

Soient  $f \in \mathcal{L}(E)$  et  $P, Q \in \mathbb{K}[X]$  tels que  $P \wedge Q = 1$ .

Alors  $\ker(PQ)(f) = \ker P(f) \oplus \ker Q(f)$ .

---

**Proposition 5.74**

Soient  $f \in \mathcal{L}(E)$  et  $P_1, \dots, P_k \in \mathbb{K}[X]$  premiers entre eux deux à deux. On pose  $P = \prod_{i=1}^k P_i$ .

Alors  $\ker P(f) = \bigoplus_{i=1}^k \ker P_i(f)$ .

### 5.6.3 Application à la diagonalisabilité

---

**Définition 5.75**

Un polynôme est dit simplement scindé quand il est scindé et à racines simples.

---

**Théorème 5.76**

Soit  $f \in \mathcal{L}(E)$ .

Il y a équivalence entre les propositions suivantes :

- ▷  $f$  est diagonalisable
- ▷  $\mu_f$  est simplement scindé
- ▷ il existe un polynôme annulateur de  $f$  simplement scindé
- ▷ le polynôme  $\prod_{\lambda \in \text{Sp}(f)} (X - \lambda)$  est un polynôme annulateur de  $f$

Et sa version matricielle.

---

**Théorème 5.77**

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

Il y a équivalence entre les propositions suivantes :

- ▷  $A$  est diagonalisable dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$

- ▷  $\mu_A$  est simplement scindé
- ▷ il existe un polynôme annulateur de  $A$  simplement scindé dans  $\mathbb{K}[X]$
- ▷ le polynôme  $\prod_{\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(A)} (X - \lambda)$  est un polynôme annulateur de  $A$

### Exercice 5.78

On pose  $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ . Calculez  $(A + I_3)^3$ .  $A$  est-elle diagonalisable ?

### Exercice 5.79

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  telle que  $A^3 = I_n$ . Selon que  $\mathbb{K}$  soit égal à  $\mathbb{C}$  ou  $\mathbb{R}$ , à quelle condition  $A$  est-elle  $\mathbb{K}$ -diagonalisable ?

## 5.6.4 Diagonalisabilité d'un endomorphisme induit

### Proposition 5.80

Soient  $f \in \mathcal{L}(E)$ ,  $F$  un sous-espace vectoriel de  $E$  stable par  $f$  et  $g$  l'endomorphisme induit par  $f$  dans  $F$ .

Alors  $\mu_g$  divise  $\mu_f$ .

### Corollaire 5.81

Soient  $f \in \mathcal{L}(E)$  et  $F$  un sous-espace vectoriel de  $E$  stable par  $f$ .

Si  $f$  est diagonalisable, alors l'endomorphisme induit par  $f$  dans  $F$  est aussi diagonalisable.

### Exercice 5.82

Soit  $f$  un endomorphisme de matrice  $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$  dans une base  $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ . Déterminez les sous-espaces vectoriels de  $E$  stables par  $f$ .

### Exercice 5.83 (Codiagonalisation ou diagonalisation simultanée)

Soient  $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  diagonalisables et qui commutent.

Montrez qu'il existe  $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$  telle que  $P^{-1}AP$  et  $P^{-1}BP$  sont diagonales.

## 5.7 Quelques applications de la diagonalisation

### 5.7.1 Puissances d'une matrice, suites récurrentes linéairement

Un petit lemme déjà rencontré.

---

**Lemme 5.84**

Soient  $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  et  $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$  telles que  $A = PBP^{-1}$ .

Alors pour tout  $k \in \mathbb{N}$ ,  $A^k = PB^kP^{-1}$ .

Le lemme précédent est particulièrement utile si  $A$  est diagonalisable et si on choisit  $B = D$ , matrice diagonale semblable à  $A$ , car calculer les puissances d'une matrice diagonale est très facile.

Grâce à la diagonalisation de  $A$ , on peut espérer exprimer la forme générale des suites récurrentes linéaires (voir le chapitre précédent, section sur les polynômes annulateurs).

---

**Exercice 5.85**

Soient  $u, v, w$  les trois suites réelles telles que  $u_0 = v_0 = w_0 = 1$  et

$$\text{pour tout } n \in \mathbb{N}, \begin{cases} u_{n+1} = u_n - v_n \\ v_{n+1} = -4u_n + 4v_n - 6w_n \\ w_{n+1} = -3u_n + 3v_n - 4w_n \end{cases}$$

Déterminez des expressions de  $u_n, v_n, w_n$  en fonction de  $n$ .

Cette technique s'applique en particulier aux suites  $u$  vérifiant une relation de récurrence linéaire de la forme : pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+d} = a_{d-1}u_{n+d-1} + \dots + a_2u_{n+2} + a_1u_{n+1} + a_0u_n$ .

On pose alors  $X_n = \begin{pmatrix} u_n \\ u_{n+1} \\ \vdots \\ u_{n+d-1} \end{pmatrix}$  et  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ a_0 & a_1 & a_2 & \dots & a_{d-1} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_d(\mathbb{K})$ .

Alors pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $X_{n+1} = AX_n$  et on est ramené au cas précédent.

La matrice  $A$  s'appelle la matrice-compagnon du polynôme  $P = X^d - a_{d-1}X^{d-1} - \dots - a_1X - a_0$  : elle a la propriété remarquable que son polynôme caractéristique est  $P$ , son polynôme minimal est aussi  $P$  et donc que ses valeurs propres sont les racines de  $P$ . C'est pourquoi le polynôme  $P$  est appelé polynôme caractéristique associé à la suite  $u$  (cas déjà étudié en première année :  $d = 2$ ).

On en déduit que  $A$  est diagonalisable ssi  $P$  est simplement scindé et dans ce cas,  $A$  possède  $d$  valeurs propres distinctes. Dans ce cas, en notant  $\lambda_1, \dots, \lambda_p$  les valeurs propres distinctes, la suite  $u$  est combinaison linéaire des suites géométriques  $(\lambda_1^n), \dots, (\lambda_d^n)$ .

---

**Exercice 5.86**

Explicitez l'unique suite  $(u_n)$  vérifiant

$$u_0 = 0, u_1 = 1, u_2 = 5 \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+3} = 6u_{n+2} - 11u_{n+1} + 6u_n.$$



## 5.7.2 Systèmes d'équations différentielles

Ce point sera traité dans le chapitre sur les équations différentielles linéaires.

## 5.8 Endomorphismes trigonalisables, matrices trigonalisables

### 5.8.1 Définition et propriétés

---

#### Définition 5.87

Un endomorphisme est dit trigonalisable quand il existe une base dans laquelle sa matrice est triangulaire supérieure.

Une matrice carrée de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  est dite trigonalisable dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  quand elle est semblable à une matrice triangulaire dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

---

#### Remarque 5.88

- Si un endomorphisme (une matrice) est diagonalisable, alors il (elle) est trigonalisable.
- Si une matrice est trigonalisable, ses valeurs propres sont les nombres sur la diagonale de toute matrice triangulaire semblable.

---

#### Exercice 5.89

On considère la matrice  $M = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 7 \\ 5 & 4 & -8 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$  et  $f$  un endomorphisme de matrice  $M$ . Déterminez les éléments propres de  $M$ . Est-elle diagonalisable ? En complétant une famille libre de vecteurs propres, déterminez une base  $\mathcal{B}$  de l'espace où la matrice de  $f$  est triangulaire supérieure, puis trigonalisez  $M$ .

---

#### Exercice 5.90

Soit  $f$  un endomorphisme de matrice  $A = \begin{pmatrix} 2 & -4 & -5 \\ -1 & 2 & 2 \\ 1 & -2 & -2 \end{pmatrix}$ . Montrez que  $f$  n'est pas diagonalisable mais est trigonalisable et donnez une base de trigonalisation de  $f$ . Donnez une forme générale pour  $A^n$ .

Quand un endomorphisme ou une matrice n'est pas diagonalisable, on peut espérer qu'il ou elle est trigonalisable : faute de grives, on se contente de merles !

---

#### Remarque 5.91

On ne confondra pas la trigonalisation d'une matrice carrée et la transformation par lignes (ou colonnes) des matrices vue en première année ! Seule la trigonalisation fournit des matrices semblables ! La transformation par lignes ne conserve que le rang !

## 5.8.2 Caractérisation équivalente

La trigonalisabilité est beaucoup plus courante que la diagonalisabilité, comme on le voit grâce aux résultats suivants.

---

### Proposition 5.92

*Un endomorphisme (une matrice) est trigonalisable ssi il (elle) est scindé(e).*

En particulier, quand  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ , tous les endomorphismes sont trigonalisables, toutes les matrices de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  sont trigonalisables dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ .

En pratique, quand on cherche à trigonaliser un endomorphisme, on peut chercher une base dans laquelle la matrice est triangulaire supérieure avec des 1 ou des 0 sur la sur-diagonale et des 0 sur les diagonales partielles encore au-dessus (c'est démontrable, mais c'est difficile à démontrer, cela s'appelle le théorème de Jordan – hors-programme –).

---

### Théorème 5.93

*Soit  $f \in \mathcal{L}(E)$ .*

*Il y a équivalence entre les propositions suivantes :*

- ▷  *$f$  est trigonalisable*
- ▷  *$\chi_f$  est scindé*
- ▷  *$\mu_f$  est scindé*
- ▷ *il existe un polynôme annulateur de  $f$  scindé*

Et sa version matricielle.

---

### Théorème 5.94

*Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .*

*Il y a équivalence entre les propositions suivantes :*

- ▷  *$A$  est trigonalisable dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$*
- ▷  *$\chi_A$  est scindé*
- ▷  *$\mu_A$  est scindé*
- ▷ *il existe un polynôme annulateur de  $A$  qui est scindé dans  $\mathbb{K}[X]$*

---

### Exercice 5.95

Soit  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ . Calculez  $A^2$ , puis  $A^3$ . La matrice  $A$  est-elle diagonalisable ? trigonalisable ? Dans l'affirmative, diagonalisez ou trigonalisez la.

### 5.8.3 Théorème de Cayley-Hamilton

---

#### Théorème 5.96

Le polynôme caractéristique d'un endomorphisme (d'une matrice carrée) est un polynôme annulateur.

---

#### Corollaire 5.97

Le polynôme minimal divise le polynôme caractéristique. Donc en dimension  $n$ , le polynôme minimal est de degré au plus  $n$ .

Les polynômes minimal et caractéristique partagent les mêmes racines dans  $\mathbb{C}$  (en fait dans tout corps  $\mathbb{K}$ ) mais pas avec les mêmes ordres de multiplicité : si  $f$  est scindé, alors en notant  $\lambda_1, \dots, \lambda_k$  les  $k$  valeurs propres distinctes de  $f$ , on peut écrire

$$\chi_f = \prod_{i=1}^k (X - \lambda_i)^{\alpha_i} \quad \text{et} \quad \mu_f = \prod_{i=1}^k (X - \lambda_i)^{\beta_i}$$

où pour tout  $i \in \llbracket 1 ; k \rrbracket$ ,  $1 \leq \beta_i \leq \alpha_i$ .

### 5.8.4 Sous-espaces caractéristiques

---

#### Définition 5.98

Soit  $f \in \mathcal{L}(E)$  un endomorphisme scindé. On écrit  $\chi_f = \prod_{i=1}^k (X - \lambda_i)^{\alpha_i}$  où  $\lambda_1, \dots, \lambda_k$  sont les  $k$  valeurs propres distinctes de  $f$ .

Les sous-espaces caractéristiques de  $f$  sont les noyaux  $\ker (f - \lambda_i \text{id}_E)^{\alpha_i}$ .

#### Proposition 5.99

Les sous-espaces caractéristiques d'un endomorphisme scindé sont supplémentaires et stables par  $f$ .

---

#### Théorème 5.100

Tout endomorphisme scindé possède une base dans laquelle sa matrice est diagonale par blocs telle que :

- il y a autant de blocs que de valeurs propres : à chaque valeur propre, on associe un unique bloc ;
- chaque bloc est de la forme  $\lambda I_r + U$  où  $\lambda$  est la valeur propre associée au bloc,  $r$  est l'ordre de multiplicité de  $\lambda$  et  $U$  est une matrice strictement triangulaire supérieure de  $\mathcal{M}_r(\mathbb{K})$

Toute matrice scindée est semblable à une matrice diagonale par blocs vérifiant les conditions précédentes.

---

#### Corollaire 5.101

La dimension d'un sous-espace caractéristique est l'ordre de multiplicité de la valeur propre associée.

## 5.9 Endomorphismes nilpotents, matrices nilpotentes

### 5.9.1 Généralités

---

**Définition 5.102**

Soit  $u \in \mathcal{L}(E)$ . On dit que  $u$  est nilpotent quand il existe  $p \in \mathbb{N}$  tel que  $u^p = 0$ .

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ . On dit que  $A$  est nilpotente quand il existe  $p \in \mathbb{N}$  tel que  $A^p = 0$ .

Le plus petit indice  $p$  satisfaisant à la condition précédente s'appelle l'indice de nilpotence de  $u$  (de  $A$ ).

---

**Proposition 5.103**

*Toute matrice strictement triangulaire (supérieure ou inférieure) est nilpotente. Par conséquent, les matrices semblables à une matrice strictement triangulaire sont nilpotentes.*

Dans la décomposition en sous-espaces caractéristiques, on a vu apparaître des matrices  $\lambda I_r + U$  : les matrices  $U$  sont nilpotentes.

L'ensemble des matrices nilpotentes n'a pas de structure particulière : en général, la somme et le produit de deux matrices nilpotentes ne sont pas nilpotents. Néanmoins, avec une condition de commutation supplémentaire, on a quelques résultats.

---

**Proposition 5.104**

*Soient  $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  deux matrices nilpotentes.*

*Si  $A$  et  $B$  commutent, alors  $A + B$  et  $AB$  sont nilpotentes.*

On a bien sûr les mêmes résultats concernant les endomorphismes nilpotents.

### 5.9.2 Éléments propres d'un nilpotent

---

**Proposition 5.105**

*Un endomorphisme en dimension  $n$  est nilpotent ssi son polynôme caractéristique est  $X^n$ , i.e. s'il est scindé et admet 0 comme unique valeur propre.*

*Une matrice de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  est nilpotente ssi son polynôme caractéristique est  $X^n$ , i.e. si elle est scindée et admet 0 comme unique valeur propre.*

*L'indice de nilpotence dans ces deux cas est alors le degré du polynôme minimal ; il est donc inférieur ou égal à  $n$ .*

Mis à part la matrice nulle, aucune matrice nilpotente n'est diagonalisable : c'est une idée parfois utile pour prouver qu'une matrice est nulle (diagonalisable et nilpotente implique nulle).

---

**Proposition 5.106**

*Tout endomorphisme nilpotent est trigonalisable : il existe une base dans laquelle sa matrice est triangulaire supérieure stricte. Réciproquement, si un endomorphisme est trigonalisable et n'a que 0 pour valeur propre, alors il est nilpotent.*

*Toute matrice nilpotente est trigonalisable : elle est semblable à une matrice triangulaire supérieure stricte. La réciproque est vraie.*

### 5.9.3 Application aux sous-espaces caractéristiques d'un endomorphisme

---

**Proposition 5.107**

*Soit  $f \in \mathcal{L}(E)$ .*

*Pour toute valeur propre  $\lambda$  de  $f$ , si  $\alpha$  est l'ordre de multiplicité de  $\lambda$  dans le polynôme minimal de  $f$ , le sous-espace caractéristique associé est aussi le noyau  $\ker(f - \lambda \text{id}_E)^\alpha$ .*

On peut même démontrer mieux.

---

**Proposition 5.108**

*Soient  $f \in \mathcal{L}(E)$ ,  $\lambda \in \text{Sp}(f)$  et  $\alpha$  l'ordre de multiplicité de  $\lambda$  dans le polynôme minimal de  $f$ .*

*Alors la suite des noyaux  $\left(\ker(f - \lambda \text{id}_E)^k\right)_{k \in \mathbb{N}}$  est strictement croissante jusqu'au rang  $\alpha$ , puis constante à partir du rang  $\alpha$  :*

$$\{0\} \subsetneq \ker(f - \lambda \text{id}_E) \subsetneq \ker(f - \lambda \text{id}_E)^2 \subsetneq \dots \subsetneq \ker(f - \lambda \text{id}_E)^\alpha = \ker(f - \lambda \text{id}_E)^{\alpha+1} = \dots$$

# Chapitre 6

## Intégrales généralisées

### Sommaire

---

<b>Fonctions continues par morceaux sur un intervalle</b>	<b>.109</b>
<b>6.1 Intégrales généralisées sur <math>[a ; +\infty[</math></b>	<b>.109</b>
6.1.1 Définition et exemples fondamentaux	109
6.1.2 Propriétés	110
6.1.3 Cas des fonctions réelles positives	111
6.1.4 Théorème de comparaison entre fonctions positives	111
6.1.5 Lien avec les séries	112
<b>6.2 Intégrales généralisées sur d'autres types d'intervalles</b>	<b>.113</b>
6.2.1 Intégrales généralisées sur $[a ; b[$	113
6.2.2 Intégrales généralisées sur $]a ; b]$	113
6.2.3 Intégrales généralisées sur $]a ; b[$	115
6.2.4 Propriétés communes à toutes ces intégrales	115
6.2.4.1 Changement de variable	116
6.2.4.2 Intégration par parties	116
6.2.4.3 Primitives	117
<b>6.3 Résumé pour étudier la convergence d'une intégrale</b>	<b>.118</b>
<b>6.4 Fonctions intégrables sur un intervalle</b>	<b>.118</b>
6.4.1 Intégrales absolument convergentes	119
6.4.2 Fonctions intégrables	120
6.4.3 Théorème de comparaison des fonctions intégrables	120
<b>6.5 Intégration des relations de comparaison</b>	<b>.121</b>
6.5.1 Théorème de comparaison par domination	122
6.5.2 Théorème de comparaison par équivalence	122

---

Dans ce chapitre,  $\mathbb{K}$  désigne l'ensemble  $\mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ . Les fonctions considérées dans ce chapitre sont à valeurs dans  $\mathbb{K}$ .

On suppose connue la notion d'intégrale sur un segment d'une fonction continue par morceaux à valeurs réelles ou complexes (*cf.* cours de première année).

Si  $f$  est une fonction continue sur un segment  $[a ; b]$  (ou  $[b ; a]$ ), on note  $\int_a^b f = \int_a^b f(t) dt$  (ou toute autre lettre à la place de  $t$ ) l'intégrale de  $f$  entre  $a$  et  $b$  : quand on a pas besoin de nommer la variable d'intégration, on ne la note pas, mais si on la note alors on n'oublie pas l'élément différentiel.

En préambule, on généralise la notion de fonction continue par morceaux sur un intervalle quelconque.

# Fonctions continues par morceaux sur un intervalle

---

## Définition 6.1

Soit  $I$  un intervalle quelconque.

On dit qu'une fonction est continue par morceaux sur  $I$  quand elle est continue par morceaux sur tout segment inclus dans  $I$ .

---

### Exemple 6.2

- La fonction  $t \mapsto \begin{cases} -\ln t & \text{si } t \in ]0 ; 1] \\ e^{-t} & \text{si } t \in [1 ; +\infty[ \end{cases}$  est continue par morceaux sur  $]0 ; +\infty]$ .
- La fonction  $t \mapsto \left\lfloor \frac{1}{t} \right\rfloor$  est continue par morceaux sur  $]0 ; +\infty]$ .

Dans toute la suite, on note  $\mathcal{C}_m^0(I, \mathbb{K})$  l'ensemble des fonctions continues par morceaux sur  $I$  et à valeurs dans  $\mathbb{K}$ .

---

## Proposition 6.3

L'ensemble  $\mathcal{C}_m^0(I, \mathbb{K})$  est une  $\mathbb{K}$ -algèbre.

## 6.1 Intégrales généralisées sur $[a ; +\infty[$

Dans cette section,  $a$  est un réel.

### 6.1.1 Définition et exemples fondamentaux

---

#### Définition 6.4

Soit  $f \in \mathcal{C}_m^0([a ; +\infty[, \mathbb{K})$ .

On dit que l'intégrale  $\int_a^{+\infty} f$  converge (ou qu'elle est convergente, ou simplement qu'elle existe) quand  $\int_a^x f$  a une limite finie quand  $x$  tend vers  $+\infty$ .

Dans ce cas, on pose  $\int_a^{+\infty} f = \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_a^x f$ .

Dans le cas contraire, on dit que l'intégrale  $\int_a^{+\infty} f$  diverge (ou qu'elle est divergente).

---

**Remarque 6.5**

Une intégrale généralisée  $\int_a^{+\infty}$  est une limite et une limite n'existe pas toujours. Avant d'utiliser une telle intégrale dans un raisonnement ou un calcul, on doit donc toujours justifier son existence !

Les résultats ci-dessous sont à connaître.

---

**Exemple 6.6**

- Soit  $\alpha$  un réel. L'intégrale  $\int_0^{+\infty} e^{-\alpha t} dt$  converge ssi  $\alpha > 0$ .
- Soit  $\alpha$  un réel. L'intégrale  $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^\alpha} dt$  converge ssi  $\alpha > 1$  (intégrale dite de Riemann).

---

**Exercice 6.7**

Quelle est la nature de l'intégrale  $\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+t^2} dt$  ?

---

**Exercice 6.8**

Quelle est la nature de l'intégrale  $\int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{t} dt$ .

## 6.1.2 Propriétés

La convergence de l'intégrale ne dépend pas de la borne  $a$ , ce qui généralise la relation de Chasles.

---

**Proposition 6.9**

Soient  $f \in \mathcal{C}_m^0([a; +\infty[, \mathbb{K})$  et  $b \in [a; +\infty[$ .

Alors l'intégrale  $\int_a^{+\infty} f$  converge ssi  $\int_b^{+\infty} f$  converge.

Dans ce cas, on a  $\int_a^{+\infty} f = \int_a^b f + \int_b^{+\infty} f$ .

Dans le cas convergent, on retrouve la linéarité.

---

**Proposition 6.10**

Soient  $(f, g) \in \mathcal{C}_m^0([a; +\infty[, \mathbb{K})^2$  et  $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$ .

Si les intégrales  $\int_a^{+\infty} f$  et  $\int_a^{+\infty} g$  convergent, alors  $\int_a^{+\infty} (\lambda f + \mu g)$  converge.

Dans ce cas, on a  $\int_a^{+\infty} (\lambda f + \mu g) = \lambda \int_a^{+\infty} f + \mu \int_a^{+\infty} g$ .

---

**Remarque 6.11**

- « La somme d'une intégrale convergente et d'une divergente est divergente ».
- Il n'y a rien à dire *a priori* sur la « somme de deux intégrales divergentes ».



### 6.1.3 Cas des fonctions réelles positives

Quand une fonction  $f$  est positive et continue par morceaux, dans le cas où l'intégrale  $\int_a^{+\infty} f$  diverge, on pose par convention  $\int_a^{+\infty} f = +\infty$ , ce qui permet de donner un sens à toutes les intégrales de fonctions positives.

---

#### Proposition 6.12

Soit  $f \in \mathcal{C}_m^0([a; +\infty[, \mathbb{R})$ .

Si  $f \geq 0$ , alors  $\int_a^{+\infty} f \geq 0$ .

Si, de plus,  $f$  est continue et prend au moins une valeur strictement positive, alors  $\int_a^{+\infty} f > 0$ .

Ceci est vrai en particulier quand  $f$  est continue et strictement positive sur  $[a; +\infty[$ .

On en déduit la propriété de croissance des intégrales.

---

#### Proposition 6.13

Soit  $(f, g) \in \mathcal{C}_m^0([a; +\infty[, \mathbb{R})^2$  tel que  $f$  et  $g$  soient positives.

Si  $f \leq g$ , alors  $\int_a^{+\infty} f \leq \int_a^{+\infty} g$ .

### 6.1.4 Théorème de comparaison entre fonctions positives

D'abord une condition nécessaire et suffisante de convergence dans le cas d'une fonction positive.

---

#### Proposition 6.14

Soit  $f \in \mathcal{C}_m^0([a; +\infty[, \mathbb{R})$ .

Si  $f \geq 0$ , alors l'intégrale  $\int_a^{+\infty} f$  converge ssi la fonction  $x \mapsto \int_a^x f$  est majorée.

On en déduit un théorème de comparaison du même type que celui sur les séries.

---

#### Théorème 6.15

Soit  $(f, g) \in \mathcal{C}_m^0([a; +\infty[, \mathbb{R})^2$  tel que  $f$  et  $g$  soient positives.

- ▷ Si  $f \leq g$  et  $\int_a^{+\infty} g$  converge, alors  $\int_a^{+\infty} f$  converge.
- ▷ Si  $f \leq g$  et  $\int_a^{+\infty} f$  diverge, alors  $\int_a^{+\infty} g$  diverge.

- Si  $f \underset{+\infty}{\sim} g$  alors les intégrales  $\int_a^{+\infty} f$  et  $\int_a^{+\infty} g$  sont de même nature : l'une converge ssi l'autre converge.

---

**Remarque 6.16**

- Dans ce théorème, il suffit que les inégalités soient vraies au voisinage de  $+\infty$  seulement.
- Si les fonctions sont à valeurs négatives, on se ramène à ce théorème en travaillant avec les fonctions opposées. Ce qui compte est donc qu'elles soient de signe constant.
- Avec des fonctions dont le signe n'est pas constant, ce théorème est faux. Il faut donc bien s'assurer et mettre en valeur que les fonctions sont positives (ou négatives).
- On compare les fonctions, pas les intégrales ! N'écrivez pas des symboles  $\int_a^{+\infty} \dots$  partout.

---

**Exercice 6.17**

Montrez que  $\int_1^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t} dt$  converge.

---

**Exercice 6.18**

Montrez que  $\int_2^{+\infty} \frac{1}{\ln t} dt$  diverge.

---

**Exercice 6.19**

Montrez que pour tout  $\alpha > 1$ ,  $\int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{t^\alpha} dt$  converge.

### 6.1.5 Lien avec les séries

Le théorème de comparaison série-intégrale peut se réécrire comme suit.

---

**Proposition 6.20**

Soit  $f \in \mathcal{C}_m^0(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$  positive et décroissante.

La série  $\sum f(n)$  et l'intégrale  $\int_0^{+\infty} f$  sont de même nature.

Dans le même genre, on peut étudier la convergence d'une intégrale d'une fonction positive par l'intermédiaire d'une série.

---

**Proposition 6.21**

Soient  $f \in \mathcal{C}_m^0(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$  positive et  $u$  une suite positive et strictement croissante qui diverge vers  $+\infty$ .

L'intégrale  $\int_0^{+\infty} f$  converge ssi la série  $\sum_{n \geq 0} \int_{u_n}^{u_{n+1}} f$  converge.

---

**Exercice 6.22**

Montrez que l'intégrale  $\int_1^{+\infty} \frac{|\sin t|}{t} dt$  diverge.

---

**Exercice 6.23**

En utilisant l'inégalité  $\sin t \geq \frac{2}{\pi}t$ , valable pour tout  $t \in \left[0 ; \frac{\pi}{2}\right]$ , montrez que l'intégrale  $\int_0^{+\infty} \frac{1}{1 + e^x |\sin x|} dx$  converge.

---

## 6.2 Intégrales généralisées sur d'autres types d'intervalles

### 6.2.1 Intégrales généralisées sur $[a ; b[$

Dans cette partie,  $a$  est un réel et  $b$  est un réel ou  $+\infty$ , de sorte que  $a < b$ .

---

**Définition 6.24**

Soit  $f \in \mathcal{C}_m^0([a ; b[, \mathbb{K})$ .

On dit que l'intégrale  $\int_a^b f$  converge quand  $\int_a^x f$  a une limite finie quand  $x$  tend vers  $b^-$ .

Dans ce cas, on pose  $\int_a^b f = \lim_{x \rightarrow b^-} \int_a^x f$ .

Dans le cas contraire, on dit que l'intégrale  $\int_a^b f$  diverge (ou qu'elle est divergente).

### 6.2.2 Intégrales généralisées sur $]a ; b]$

Dans cette partie,  $a$  est un réel ou  $-\infty$  et  $b$  un réel, de sorte que  $a < b$ .

---

**Définition 6.25**

Soit  $f \in \mathcal{C}_m^0([a; b], \mathbb{K})$ .

On dit que l'intégrale  $\int_a^b f$  converge quand  $\int_x^b f$  a une limite finie quand  $x$  tend vers  $a^+$ .

Dans ce cas, on pose  $\int_a^b f = \lim_{x \rightarrow a^+} \int_x^b f$ .

Dans le cas contraire, on dit que l'intégrale  $\int_a^b f$  diverge (ou qu'elle est divergente).

Les résultats suivants sont à connaître.

---

*Exemple 6.26*

- ▷  $\int_0^1 \ln(t) dt$  converge.
- ▷ Soit  $\alpha$  un réel. L'intégrale  $\int_0^1 \frac{1}{t^\alpha} dt$  converge ssi  $\alpha < 1$  (intégrale dite de Riemann).

---

**Exercice 6.27**

Montrez que l'intégrale  $\int_1^2 \frac{1}{\ln t} dt$  diverge.

À quelle condition sur  $\alpha$  l'intégrale  $\int_1^2 \frac{(t-1)^\alpha}{\ln t} dt$  converge-t-elle ?

On peut remarquer que par changement de variable  $x \mapsto -x$ , l'intégrale  $\int_a^b f(t) dt$  est de même nature (et, dans le cas convergent, a la même valeur) que  $\int_{-b}^{-a} f(-u) du$ . Les résultats valables en un point réel ne dépendent donc pas du côté du point où on se place.

---

*Exemple 6.28*

- ▷ Si  $a$  est un réel, alors  $\int_a^{a+1} \frac{1}{(t-a)^\alpha} dt$  converge ssi  $\alpha < 1$ .
- ▷ Si  $a$  est un réel, alors  $\int_{a-1}^a \frac{1}{(a-t)^\alpha} dt$  converge ssi  $\alpha < 1$ .
- ▷  $\int_0^1 \ln(1-t) dt$  converge.

### 6.2.3 Intégrales généralisées sur $]a ; b[$

Dans cette partie,  $a$  et  $b$  sont des réels ou des infinis tels que  $a < b$ .

---

**Définition 6.29**

Soit  $f \in \mathcal{C}_m^0(]a ; b[, \mathbb{K})$ .

On dit que l'intégrale  $\int_a^b f$  converge quand il existe  $c \in ]a ; b[$  tel que  $\int_a^c f$  et  $\int_c^b f$  convergent.

Dans ce cas, on pose  $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f = \lim_{x \rightarrow a^+} \int_x^c f + \lim_{y \rightarrow b^-} \int_c^y f$ .

Dans le cas contraire, on dit que l'intégrale  $\int_a^b f$  diverge (ou qu'elle est divergente).

---

*Remarque 6.30*

Grâce à la relation de Chasles, on constate que la valeur de  $c$  n'est finalement pas importante : si ça marche pour un certain réel  $c \in ]a ; b[$ , alors ça marche pour toute autre valeur prise dans  $]a ; b[$ .

---

**Exercice 6.31**

Montrez que l'intégrale de Gauss  $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt$  converge.

---

**Exercice 6.32**

Même chose avec l'intégrale  $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{t(1-t)}} dt$ .

---

**Exercice 6.33**

Même chose avec l'intégrale  $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} dt$ .

---

**Exercice 6.34**

Montrez que pour tout  $\alpha > 0$ ,  $\int_0^{+\infty} \frac{1}{t^\alpha} dt$  diverge.

### 6.2.4 Propriétés communes à toutes ces intégrales

Toutes les propriétés vues dans la première section sont préservées : linéarité, positivité, croissance, relation de Chasles.

En voici trois autres.

### 6.2.4.1 Changement de variable

#### Proposition 6.35

Soient  $a, b, \alpha, \beta$  des réels ou des infinis tels que  $a < b$  et  $\alpha < \beta$  et  $f \in \mathcal{C}_m^0(]a ; b[, \mathbb{K})$ .

Si  $\varphi$  est une bijection de classe  $\mathcal{C}^1$  et strictement croissante de  $] \alpha ; \beta [$  dans  $] a ; b [$ , alors les intégrales  $\int_a^b f(t) dt$  et  $\int_\alpha^\beta f \circ \varphi(u) du$  sont de même nature et, si elles sont convergentes, sont égales.

#### Remarque 6.36

On a évidemment un résultat analogue avec un changement de variable strictement décroissant et des bornes inversées.

Comme une bijection de classe  $\mathcal{C}^1$  entre deux intervalles est forcément strictement monotone, l'hypothèse de stricte monotonie est redondante ; mais comme elle est explicitement dans le programme de MPI, il vaut mieux la préciser (de toute façon, elle sera évidente dans les cas pratiques et ne nécessitera pas de longues preuves).

#### Exercice 6.37

Montrez que  $\int_0^{\pi/2} \sqrt{\tan t} dt$  converge et qu'on a l'égalité  $\int_0^{\pi/2} \sqrt{\tan t} dt = \int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{u}}{1+u^2} du$ .

#### Exercice 6.38

Montrez que  $\int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{1+t^2} dt$  converge et vaut 0.

Déduisez-en la valeur de  $\int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{a^2+t^2} dt$  où  $a > 0$ .

### 6.2.4.2 Intégration par parties

Si  $f$  est une fonction définie sur  $]a ; b[$  et a des limites finies en  $a^+$  et en  $b^-$ , on note  $[f]_a^b = \lim_{b^-} f - \lim_{a^+} f$ .

#### Proposition 6.39

Soient  $a, b$  des réels ou des infinis tels que  $a < b$  et  $(f, g) \in \mathcal{C}^1(]a ; b[, \mathbb{K})$ .

Si parmi les trois quantités suivantes

$$\int_a^b f'g \quad \int_a^b fg' \quad [fg]_a^b$$

deux existent, alors la troisième existe aussi et, dans ce cas, on a l'égalité habituelle

$$\int_a^b f'g = [fg]_a^b - \int_a^b fg'$$

En pratique, pour éviter d'écrire des choses qui n'ont pas de sens, il vaut mieux revenir à une vraie intégration par parties sur un segment  $[x ; y] \subseteq ]a ; b[$ , s'assurer qu'on peut faire tendre  $x$  vers  $a$  et  $y$  vers  $b$ , puis le faire effectivement pour obtenir la relation entre les intégrales.

#### Exercice 6.40

Pour  $n \in \mathbb{N}$ , on pose  $u_n = \int_0^{+\infty} t^n e^{-t} dt$ .

Montrez que les intégrales  $u_n$  convergent, donnez une relation de récurrence simple entre  $u_n$  et  $u_{n+1}$ , puis donnez la valeur de  $u_n$  en fonction de  $n$ .

#### Exercice 6.41

Montrez que l'intégrale  $\int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos t}{t^2} dt$  converge, puis déduisez-en que l'intégrale  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$  converge.

### 6.2.4.3 Primitives

#### Proposition 6.42

Soient  $f \in \mathcal{C}_m^0(]a ; b[, \mathbb{K})$  et  $c \in ]a ; b[$  tel que l'intégrale  $\int_a^c f$  converge.

Alors la fonction  $x \mapsto \int_a^x f$  est l'unique primitive de  $f$  sur  $]a ; b[$  qui a pour limite 0 en  $a^+$ .

#### Proposition 6.43

Soient  $f \in \mathcal{C}_m^0(]a ; b[, \mathbb{K})$  et  $c \in ]a ; b[$  tel que  $\int_c^b f$  converge.

Alors la fonction  $x \mapsto \int_x^b f$  est l'opposée de l'unique primitive de  $f$  sur  $]a ; b[$  qui a pour limite 0 en  $b^-$ .

#### Exemple 6.44

► La fonction  $x \mapsto \int_0^x \ln(t) dt$  est la primitive de  $\ln$  qui a pour limite 0 en 0.

► La fonction  $x \mapsto \int_x^{+\infty} \frac{e^{it}}{t^2} dt$  est définie sur  $]0 ; +\infty[$ , de classe  $\mathcal{C}^1$  sur cet intervalle, et sa dérivée est la fonction  $x \mapsto -\frac{e^{ix}}{x^2}$ .

## 6.3 Résumé pour étudier la convergence d'une intégrale

On veut savoir si une intégrale  $\int_a^b f$  existe, où  $a$  et  $b$  sont des réels ou des infinis tels que  $a < b$ .

D'abord, on détermine le plus grand sous-ensemble de  $[a ; b]$  sur lequel  $f$  est continue par morceaux :

- si c'est  $[a ; b]$ , alors il n'y a aucun problème d'existence de l'intégrale : c'est une bête intégrale classique ;
- si c'est  $[a ; b[$  (avec  $a$  réel) ou  $]a ; b]$  (avec  $b$  réel), alors il faut étudier le comportement de  $f$  au voisinage du point ouvert ;
- si c'est  $]a ; b[$ , alors on choisit arbitrairement un point  $c \in ]a ; b[$  et on se ramène deux fois au cas précédent.

Un petit résultat qui supprime parfois le problème en un point ouvert réel : pensez à étudier la limite de la fonction : si elle est réelle, c'est réglé. On dit qu'on a une fausse singularité en ce point réel.

---

### Proposition 6.45

Soient  $a$  et  $b$  deux réels tels que  $a < b$  et  $f \in \mathcal{C}_m^0([a ; b], \mathbb{K})$ .

Si  $f$  a une limite réelle en  $a$  par valeurs supérieures, alors on peut prolonger  $f$  par continuité en  $a$ , le prolongement  $\bar{f}$  est une fonction continue par morceaux sur  $[a ; b]$  et l'intégrale  $\int_a^b f$  converge et vaut  $\int_a^b \bar{f}$ .

---

### Exercice 6.46

Justifiez que l'intégrale  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 t}{t^2} dt$  converge.

---

### Exercice 6.47

Montrez que l'intégrale  $\int_0^{+\infty} \frac{t \ln t}{1+t^3} dt$  converge.

## 6.4 Fonctions intégrables sur un intervalle

Dans cette section,  $a$  et  $b$  sont des réels ou des infinis tels que  $a < b$ . On note  $I = ]a ; b[$ .



## 6.4.1 Intégrales absolument convergentes

---

### Définition 6.48

Soit  $f \in \mathcal{C}_m^0(I, \mathbb{K})$ .

On dit que l'intégrale  $\int_a^b f$  converge absolument (ou est absolument convergente) quand l'intégrale  $\int_a^b |f|$  converge.

Le théorème suivant est primordial pour la suite du cours.

---

### Théorème 6.49

Soit  $f \in \mathcal{C}_m^0(I, \mathbb{K})$ .

Si l'intégrale  $\int_a^b f$  converge absolument, alors l'intégrale  $\int_a^b f$  converge.

Dans ce cas, on a  $\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|$ .

---

### Exercice 6.50

Montrez que l'intégrale  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^3 t}{t^3} dt$  est absolument convergente et donc convergente.

---

### Exercice 6.51

Montrez que si  $m$  est un complexe de partie réelle strictement positive, alors l'intégrale  $\int_0^{+\infty} e^{-mt} dt$  converge et donnez sa valeur.

Déduisez-en l'existence et la valeur des intégrales  $\int_0^{+\infty} \sin(t) e^{-t} dt$  et  $\int_0^{+\infty} \cos(t) e^{-t} dt$ .

---

### Remarque 6.52

La réciproque est fautive ! On a montré que  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$  converge et qu'elle ne converge pas absolument.

## 6.4.2 Fonctions intégrables

---

### Définition 6.53

Soit  $f \in \mathcal{C}_m^0(I, \mathbb{K})$ .

On dit que  $f$  est intégrable sur  $I$  quand l'intégrale  $\int_a^b f$  converge absolument.

On note alors aussi  $\int_I f = \int_I f(t) dt = \int_a^b f$ .

L'ensemble des fonctions intégrables sur  $I$  est souvent noté  $\mathcal{L}^1(I, \mathbb{K})$ , L comme Lebesgue, mathématicien français de la fin du 19ème et début du 20ème siècle. Par abus de notation, on écrit parfois «  $f$  est  $\mathcal{L}^1$  » pour «  $f$  est intégrable sur  $I$  ».

---

### Exemple 6.54

Soient  $a \in \mathbb{R}$  et  $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$ .

- ▶ La fonction  $t \mapsto e^{-t}$  est intégrable sur  $[\varepsilon ; +\infty[$ .  
Plus généralement, la fonction  $t \mapsto t^a e^{-t}$  est intégrable sur  $[\varepsilon ; +\infty[$  (voire  $[0 ; +\infty[$  si  $a > -1$ ).
  - ▶ La fonction  $t \mapsto \frac{1}{t^\alpha}$  est intégrable sur  $[\varepsilon ; +\infty[$  ssi  $\alpha > 1$  et sur  $]0 ; \varepsilon]$  ssi  $\alpha < 1$ .
  - ▶ La fonction  $\ln$  est intégrable sur  $]0 ; \varepsilon]$ .
- 

### Proposition 6.55

$\mathcal{L}^1(I, \mathbb{K})$  est un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

---

### Proposition 6.56 (Stricte positivité de l'intégrale)

Si  $f$  est continue, intégrable sur  $I$  et  $\int_I |f| = 0$ , alors  $f = 0$ .

Par contraposée, si  $f$  est continue, intégrable sur  $I$  et  $f \neq 0$ , alors  $\int_I |f| > 0$ .

## 6.4.3 Théorème de comparaison des fonctions intégrables

---

### Rappel 6.57

Soient  $f$  et  $g$  deux fonctions définies au voisinage d'un point  $p \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ .

- $f = \mathcal{O}(g)$  au voisinage de  $p$  signifie qu'il existe  $K > 0$  et  $V$  un voisinage de  $p$  tels que

$$\forall x \in V, |f(x)| \leq K |g(x)|.$$

- $f = o(g)$  au voisinage de  $p$  signifie qu'il existe une fonction  $\varepsilon > 0$  et  $V$  un voisinage de  $p$  tels que

$$\forall x \in V, |f(x)| \leq \varepsilon(x) |g(x)| \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow p} \varepsilon(x) = 0.$$

Dans le cas où  $g$  ne s'annule pas (ce qui, en pratique, est toujours le cas) :

- $f = \mathcal{O}(g)$  au voisinage de  $p$  signifie que  $\frac{f}{g}$  est bornée au voisinage de  $p$ .
- $f = o(g)$  au voisinage de  $p$  signifie que  $\frac{f}{g}$  a pour limite 0 en  $p$ .

---

### Théorème 6.58

Soit  $(f, g) \in \mathcal{C}_m^0(I, \mathbb{K})^2$ .

- Si  $|f| \leq |g|$  sur  $I$  et si  $g$  est intégrable, alors  $f$  est intégrable.
- Si  $f = \mathcal{O}(g)$  au voisinage des bornes ouvertes de  $I$  et  $g$  est intégrable, alors  $f$  est intégrable. C'est vrai en particulier si  $f = o(g)$ .
- Si  $f \sim g$  au voisinage des bornes ouvertes de  $I$ , alors il y a équivalence entre l'intégrabilité de  $f$  et l'intégrabilité de  $g$ .

---

### Exercice 6.59

Montrez que la fonction  $t \mapsto \frac{\cos t}{\sqrt{t}} e^{-t}$  est intégrable sur  $]0 ; +\infty[$ .

---

### Exercice 6.60

La fonction  $t \mapsto \frac{\ln t}{\cos t + t^2}$  est-elle intégrable sur  $]0 ; +\infty[$  ?

## 6.5 Intégration des relations de comparaison

Les résultats présentés portent sur des fonctions intégrables sur  $[a ; +\infty[$ . On obtient évidemment des résultats analogues sur les autres types d'intervalles.

### 6.5.1 Théorème de comparaison par domination

Dans le cas convergent d'abord, les « restes partiels » suivent la même relation de comparaison.

---

**Théorème 6.61**

Soient  $f, g$  deux fonctions définies sur  $[a ; +\infty[$  avec  $g$  à valeurs dans  $\mathbb{R}_+$ .

Si  $f = \mathcal{O}(g)$  et  $g$  est intégrable sur  $[a ; +\infty[$ , alors  $f$  est intégrable sur  $[a ; +\infty[$ .

De plus,  $\int_x^{+\infty} f = \mathcal{O}\left(\int_x^{+\infty} g\right)$  quand  $x \rightarrow +\infty$ .

Si  $f = o(g)$  et  $g$  est intégrable sur  $[a ; +\infty[$ , alors  $f$  est intégrable sur  $[a ; +\infty[$ .

De plus,  $\int_x^{+\infty} f = o\left(\int_x^{+\infty} g\right)$  quand  $x \rightarrow +\infty$ .

Dans le cas divergent ensuite, les « intégrales partielles » suivent aussi la même relation de comparaison.

---

**Théorème 6.62**

Soient  $f, g$  deux fonctions définies sur  $[a ; +\infty[$  avec  $g$  à valeurs dans  $\mathbb{R}_+$ .

Si  $f = \mathcal{O}(g)$  et  $f$  n'est pas intégrable sur  $[a ; +\infty[$ , alors  $g$  n'est pas intégrable sur  $[a ; +\infty[$ .

De plus,  $\int_a^x f = \mathcal{O}\left(\int_a^x g\right)$  quand  $x \rightarrow +\infty$ .

Si  $f = o(g)$  et  $f$  n'est pas intégrable sur  $[a ; +\infty[$ , alors  $g$  n'est pas intégrable sur  $[a ; +\infty[$ .

De plus,  $\int_a^x f = o\left(\int_a^x g\right)$  quand  $x \rightarrow +\infty$ .

### 6.5.2 Théorème de comparaison par équivalence

---

**Théorème 6.63**

Soient  $f, g$  deux fonctions définies sur  $[a ; +\infty[$  avec  $g$  à valeurs dans  $\mathbb{R}_+$ .

Si  $f \sim g$ , alors l'intégrabilité de  $f$  est équivalente à l'intégrabilité de  $g$ .

De plus :

- ▷ si les fonctions sont intégrables, alors les restes partiels sont équivalents :

$$\int_x^{+\infty} f \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \int_x^{+\infty} g$$

- ▷ si les fonctions ne sont pas intégrables, alors les intégrales partielles divergent et sont équivalentes :

$$\int_a^x f \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \int_a^x g.$$

# Chapitre 7

## Intégrales à paramètre

### Sommaire

---

<b>7.1</b>	<b>Introduction . . . . .</b>	<b>123</b>
<b>7.2</b>	<b>Convergence simple . . . . .</b>	<b>124</b>
7.2.1	Convergence simple d'une suite de fonctions . . . . .	124
7.2.2	Convergence simple d'une série de fonctions . . . . .	125
<b>7.3</b>	<b>Suites et séries de fonctions intégrables. . . . .</b>	<b>125</b>
7.3.1	Théorème de convergence dominée . . . . .	125
7.3.2	Théorème d'intégration terme à terme . . . . .	127
<b>7.4</b>	<b>Fonctions définies par une intégrale à paramètre . . . . .</b>	<b>127</b>
7.4.1	Continuité . . . . .	127
7.4.2	Dérivabilité . . . . .	128
<b>7.5</b>	<b>Domination sur des sous-intervalles . . . . .</b>	<b>129</b>
<b>7.6</b>	<b>Complément : la fonction <math>\Gamma</math> d'Euler . . . . .</b>	<b>131</b>

---

Dans ce chapitre,  $\mathbb{K}$  désigne l'ensemble  $\mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ . Les fonctions dans ce chapitre sont à valeurs dans  $\mathbb{K}$ .

On considère dans ce chapitre des intégrales de la forme  $\int_a^b f(p, t) dt$  où  $f(p, t)$  est une expression qui dépend de deux variables  $p$  et  $t$ ,  $p$  pouvant être de n'importe quel type mais  $t$  bien sûr réelle. Par habitude, on distingue dans le vocabulaire ces deux variables :  $t$  est appelée la variable d'intégration (notez le  $dt$  qui le signale) et  $p$  est appelée le paramètre.

L'intégrale  $\int_a^b f(p, t) dt$  est donc une intégrale qui dépend du paramètre  $p$  (mais qui ne dépend bien entendu pas de  $t$ ) et l'objet de ce chapitre est d'étudier des résultats concernant cette dépendance vis-à-vis de  $p$  ; en somme, d'étudier des propriétés de l'application  $p \mapsto \int_a^b f(p, t) dt$ .

Les sections 2 et 3 étudient surtout le cas où  $p$  est un paramètre entier naturel, les suivantes le cas où  $p$  est un paramètre réel.

### 7.1 Introduction

Pour commencer, un exercice d'intervention de symboles, qui marque le début de l'étude de ce problème général et qui va nous occuper durant quelques chapitres.

---

**Exercice 7.1**

Pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , on pose  $f_n(x) = n^2 e^{-nx} (1 - e^{-x})$ .

Pour  $x \geq 0$ , que vaut  $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x)$  ?

Montrez la convergence de l'intégrale  $\int_0^{+\infty} f_n(x) dx$  et donnez sa valeur en fonction de  $n$ .

Comparez  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} f_n(x) dx$  et  $\int_0^{+\infty} \left( \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) \right) dx$ .

Quelle conclusion peut-on en tirer ?

## 7.2 Convergence simple

### 7.2.1 Convergence simple d'une suite de fonctions

---

**Définition 7.2**

Soient  $A$  une partie de  $\mathbb{R}$  et  $(f_n)$  une suite de fonctions définies sur  $A$ .

On dit que la suite  $(f_n)$  converge simplement sur  $A$  quand pour tout  $x \in A$ , la suite numérique  $(f_n(x))$  converge.

Dans ce cas, on peut définir une fonction  $f$  sur  $A$  en posant, pour tout  $x \in A$ ,  $f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x)$ .

La fonction  $f$  est alors appelée limite simple sur  $A$  de la suite  $(f_n)$  et on dit que la suite  $(f_n)$  converge simplement vers  $f$  sur  $A$ .

---

**Exercice 7.3**

Étudiez, pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , la convergence simple de la suite de fonctions  $f_n : x \mapsto \frac{ne^{-x} + x^2}{n+x}$  sur  $[0 ; +\infty[$

---

**Exercice 7.4**

Même question avec la suite de fonctions  $f_n : x \mapsto \frac{x^n}{1+x^n}$  sur  $[0 ; +\infty[$ .

---

**Exercice 7.5**

Même question avec la suite de fonctions  $f_n : x \mapsto n^\alpha x^n (1-x)$  où  $\alpha$  est un réel strictement positif.

## 7.2.2 Convergence simple d'une série de fonctions

---

### Définition 7.6

Soient  $A$  une partie de  $\mathbb{R}$  et  $(f_n)$  une suite de fonctions définies sur  $A$ .

On dit que la série  $\sum_{n \geq 0} f_n$  converge simplement sur  $A$  quand pour tout  $x \in A$ , la série numérique  $\sum_{n \geq 0} f_n(x)$  converge.

Autrement dit, la série de fonctions  $\sum_{n \geq 0} f_n$  converge simplement sur  $A$  quand la suite des sommes partielles  $\left(\sum_{k=0}^n f_k\right)$  converge simplement sur  $A$ .

Dans ce cas, on peut définir une fonction  $f$  sur  $A$  en posant, pour tout  $x \in A$ ,  $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x)$ .

La fonction  $f$  est alors appelée (fonction) somme sur  $A$  de la série  $\sum_{n \geq 0} f_n$ .

---

### Exercice 7.7

Étudiez, pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , la convergence simple de la série de fonctions  $f_n : x \mapsto \frac{nx^2}{n^3 + x^2}$  sur  $[0 ; +\infty[$ .

---

### Exercice 7.8

Même question avec la série de fonctions  $f_n : x \mapsto \frac{x^n}{1 + x^n}$  sur  $[0 ; +\infty[$ .

---

### Exercice 7.9

Même question avec la série de fonctions  $f_n : x \mapsto \frac{\sin(nx)}{n^3 + x^3}$  sur  $[0 ; +\infty[$ .

## 7.3 Suites et séries de fonctions intégrables

Dans cette section, tous les théorèmes sont admis (démonstrations très difficiles!).

### 7.3.1 Théorème de convergence dominée

---

**Théorème 7.10**

Soient  $I$  un intervalle et  $(f_n)$  une suite de fonctions continues par morceaux sur  $I$ .

Si

- ▷ la suite  $(f_n)$  converge simplement sur  $I$  vers une fonction  $f$  qui est continue par morceaux sur  $I$
- ▷ il existe une fonction  $\varphi$ , intégrable sur  $I$  et à valeurs positives, telle que

pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $|f_n| \leq \varphi$  sur  $I$  (hypothèse de domination)

alors les fonctions  $f$  et  $f_n$  sont toutes intégrables sur  $I$  et  $\int_I f_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_I f$ .

L'hypothèse de domination est essentielle ! Il s'agit donc de trouver une fonction  $\varphi$  (dont on dit qu'elle domine la suite  $(f_n)$ ) intégrable et, surtout, qui ne dépend pas de  $n$  !

---

**Exercice 7.11**

Montrez que la suite d'intégrales  $\left( \int_0^{+\infty} \cos(t) e^{-nt^2} dt \right)_{n \geq 1}$  est bien définie et qu'elle converge vers 0.

---

**Exercice 7.12**

Montrez que la suite d'intégrales  $\left( \int_0^{\pi/2} \sin^n t dt \right)$  converge vers 0.

---

**Exercice 7.13**

Montrez que pour tout  $n \geq 2$ ,  $t \mapsto \frac{1}{1+t^n}$  est intégrable sur  $[0 ; +\infty[$ , puis donnez la limite des intégrales quand  $n \rightarrow +\infty$ .

Quitte à utiliser la caractérisation séquentielle de la limite, on peut étendre le théorème précédent à des fonctions paramétrées par un réel.

---

**Théorème 7.14**

Soient  $I, A$  deux intervalles,  $\alpha \in \overline{A}$  et  $(f_a)_{a \in A}$  une famille de fonctions continues par morceaux sur  $I$ .

Si

- ▷ pour tout  $x \in I$ ,  $f_a(x) \xrightarrow{a \rightarrow \alpha} f(x)$  où  $f$  est une fonction continue par morceaux sur  $I$
- ▷ il existe une fonction  $\varphi$  intégrable sur  $I$  et à valeurs positives, telle que

pour tout  $a \in A$ ,  $|f_a| \leq \varphi$  sur  $I$  (hypothèse de domination)

alors les fonctions  $f$  et  $f_a$  sont toutes intégrables sur  $I$  et  $\int_I f_a \xrightarrow{a \rightarrow \alpha} \int_I f$ .



### 7.3.2 Théorème d'intégration terme à terme

---

#### Théorème 7.15

Soient  $I$  un intervalle et  $(f_n)$  une suite de fonctions continues par morceaux sur  $I$ .

Si

▷ la série  $\sum_{n \geq 0} f_n$  converge simplement sur  $I$  vers une fonction continue par morceaux sur  $I$

▷ pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $f_n$  est intégrable sur  $I$

▷ la série numérique  $\sum_{n \geq 0} \int_I |f_n|$  converge

alors la fonction somme  $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$  est intégrable sur  $I$  et  $\int_I \sum_{n=0}^{+\infty} f_n = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n$ .

L'hypothèse de convergence de la série des intégrales est essentielle, mais hélas très contraignante. Il arrive souvent qu'il soit plus facile d'utiliser le théorème de convergence dominée sur les sommes partielles de la série de fonctions.

---

#### Exercice 7.16

Justifiez l'existence et calculez  $\int_0^{+\infty} \frac{t}{e^t - 1} dt$ .

## 7.4 Fonctions définies par une intégrale à paramètre

On s'intéresse aux propriétés des fonctions définies par des intégrales du type  $x \mapsto \int_I f(x, t) dt$ . On dit que  $x$  est un paramètre de l'intégrale  $\int_I f(x, t) dt$ .

### 7.4.1 Continuité

---

#### Théorème 7.17

Soient  $A, I$  deux intervalles de  $\mathbb{R}$  et  $f : (x, t) \mapsto f(x, t)$  une fonction définie sur  $A \times I$ .

Si

▷ pour tout  $x \in A$ ,  $t \mapsto f(x, t)$  est continue par morceaux sur  $I$

▷ pour tout  $t \in I$ ,  $x \mapsto f(x, t)$  est continue sur  $A$

► il existe une fonction  $\varphi$  intégrable sur  $I$  et à valeurs positives, telle que

pour tout  $(x, t) \in A \times I$ ,  $|f(x, t)| \leq \varphi(t)$  (hypothèse de domination)

alors pour tout  $x \in A$ ,  $t \mapsto f(x, t)$  est intégrable sur  $I$  et la fonction  $x \mapsto \int_I f(x, t) dt$  est continue sur  $A$ .

### Exercice 7.18

Montrez que la fonction  $g : x \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{\cos(xt^2)}{1+t^2} dt$  est définie et continue sur  $\mathbb{R}$ .

### Exercice 7.19

Montrez que la fonction  $h : u \mapsto \int_0^1 \text{Arctan}(u + x \ln x) dx$  est définie et continue sur  $\mathbb{R}$ .

## 7.4.2 Dérivabilité

### Théorème 7.20

Soient  $A, I$  deux intervalles de  $\mathbb{R}$  et  $f : (x, t) \mapsto f(x, t)$  une fonction définie sur  $A \times I$ .

Si

► pour tout  $x \in A$ ,  $t \mapsto f(x, t)$  est continue par morceaux et intégrable sur  $I$

► pour tout  $t \in I$ ,  $x \mapsto f(x, t)$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $A$

► pour tout  $x \in A$ ,  $t \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, t)$  est continue par morceaux sur  $I$

► il existe une fonction  $\varphi$  intégrable et à valeurs positives, telle que

pour tout  $(x, t) \in A \times I$ ,  $\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| \leq \varphi(t)$  (hypothèse de domination)

alors la fonction  $g : x \mapsto \int_I f(x, t) dt$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $A$  et pour tout  $x \in A$ ,  $g'(x) = \int_I \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt$ .

### Exercice 7.21

Montrez que la fonction  $g : x \mapsto \int_0^\pi \cos(x \sin t) dt$  est définie et de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}$ .

---

**Exercice 7.22**

Montrez que la fonction  $g : x \mapsto \int_0^{+\infty} \cos(xt^2) e^{-t} dt$  est définie et de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}$ .

Ce théorème est généralisable pour des dérivations d'ordre plus élevé.

---

**Théorème 7.23**

Soient  $A, I$  deux intervalles de  $\mathbb{R}$  et  $f : (x, t) \mapsto f(x, t)$  une fonction définie sur  $A \times I$ .

Si

- ▷ pour tout  $x \in A$ ,  $t \mapsto f(x, t)$  est continue par morceaux et intégrable sur  $I$
- ▷ pour tout  $t \in I$ ,  $x \mapsto f(x, t)$  est de classe  $\mathcal{C}^k$  sur  $A$
- ▷ pour tout  $x \in A$ , pour tout  $j \in \llbracket 1 ; k-1 \rrbracket$ ,  $t \mapsto \frac{\partial^j f}{\partial x^j}(x, t)$  est continue par morceaux et intégrable sur  $I$
- ▷ il existe une fonction  $\varphi$  intégrable sur  $I$  et à valeurs positives, telle que

$$\text{pour tout } (x, t) \in A \times I, \quad \left| \frac{\partial^k f}{\partial x^k}(x, t) \right| \leq \varphi(t) \quad (\text{hypothèse de domination})$$

alors la fonction  $g : x \mapsto \int_I f(x, t) dt$  est de classe  $\mathcal{C}^k$  sur  $A$  et pour tout  $x \in A$ , pour tout  $j \in \llbracket 1 ; k \rrbracket$ ,  $g^{(j)}(x) = \int_I \frac{\partial^j f}{\partial x^j}(x, t) dt$ .

---

**Exercice 7.24**

Montrez que la fonction  $g : x \mapsto \int_0^{+\infty} \cos(xt^2) e^{-t} dt$  est définie et de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $\mathbb{R}$ .

## 7.5 Domination sur des sous-intervalles

La continuité étant une propriété locale, il est souvent inutile d'avoir une domination globale sur  $A$  pour conclure. En général, on peut se contenter de domination sur des parties plus petites que  $A$ , en général les segments inclus dans  $A$ , ou toute famille recouvrante de parties de  $A$ .

---

**Définition 7.25**

Soit  $A$  un intervalle.

Une famille  $\mathcal{F}$  de parties de  $A$  est dite recouvrante quand sa réunion est  $A$  :  $A = \bigcup_{X \in \mathcal{F}} X$ .

---

**Proposition 7.26**

Soit  $A$  un intervalle.

La famille des segments inclus dans  $A$  est recouvrante :  $A = \bigcup_{(a,b) \in A^2} [a ; b]$ .

On en déduit alors le théorème suivant, dont il vaut mieux à mon avis, sur chaque exercice, présenter le détail des idées.

---

**Théorème 7.27**

Soient  $A, I$  deux intervalles de  $\mathbb{R}$  et  $f : (x, t) \mapsto f(x, t)$  une fonction définie sur  $A \times I$ .

Soit  $\mathcal{F}$  une famille recouvrante de parties de  $A$ .

Si

- ▷ pour tout  $x \in A$ ,  $t \mapsto f(x, t)$  est continue par morceaux sur  $I$
- ▷ pour tout  $t \in I$ ,  $x \mapsto f(x, t)$  est continue sur  $A$
- ▷ pour toute partie  $F$  de  $\mathcal{F}$ , il existe une fonction  $\varphi_F$  intégrable sur  $I$  et à valeurs positives, telle que  
pour tout  $(x, t) \in F \times I$ ,  $|f(x, t)| \leq \varphi_F(t)$  (hypothèse de domination)

alors pour tout  $x \in A$ ,  $t \mapsto f(x, t)$  est intégrable sur  $I$  et la fonction  $x \mapsto \int_I f(x, t) dt$  est continue sur  $A$ .

On a de même une version locale des théorèmes de dérivation sous le signe intégrale.

Autrement dit, au lieu de chercher à appliquer les théorèmes précédents directement sur  $A$ , on trouve une famille recouvrante de sous-intervalles sur chacun desquels on peut appliquer les théorèmes précédents, conclure à la continuité ou dérivabilité sur chaque sous-intervalle, puis signaler que par réunion, la propriété reste valable sur  $A$ .

---

**Exercice 7.28**

Montrez que la fonction  $f : x \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt}}{\sqrt{t}} dt$  est définie et continue sur  $]0 ; +\infty[$ .

---

**Exercice 7.29**

Montrez que la fonction  $f : x \mapsto \int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+xt)}{t^2} dt$  est définie et continue sur  $[0 ; +\infty[$  et qu'elle est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $]0 ; +\infty[$ . Donnez une expression simple de  $f'(x)$  pour tout  $x > 0$ .

## 7.6 Complément : la fonction $\Gamma$ d'Euler

Pour  $x \in \mathbb{R}$ , on pose, quand cela a un sens

$$\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt.$$

Cette fonction très courante a les propriétés suivantes :

- $\Gamma$  est définie sur  $]0 ; +\infty[$
- $\Gamma$  est de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $]0 ; +\infty[$
- pour tout  $x > 0$ ,  $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$
- pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\Gamma(n) = (n-1)!$
- $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$
- il existe un unique  $\alpha \in ]1 ; 2[$  tel que  $\Gamma'(\alpha) = 0$  et  $\Gamma$  est strictement décroissante sur  $]0 ; \alpha]$  et strictement croissante sur  $]\alpha ; +\infty[$
- $\Gamma$  est convexe sur  $]0 ; +\infty[$
- $\Gamma$  a des limites infinies en 0 et en  $+\infty$ .

# Chapitre 8

## Espaces préhilbertiens réels

★★ À venir ★★

# Chapitre 9

## Endomorphismes dans un espace euclidien

★★ À venir ★★

# Chapitre 10

## Fonctions vectorielles

★★ À venir ★★



# Chapitre 11

## Suites et séries de fonctions

★★ À venir ★★

# Chapitre 12

## Séries entières

★★ À venir ★★

# Chapitre 13

## Probabilités

### Sommaire

---

<b>13.1</b>	<b>Dénombrabilité</b>	<b>. 137</b>
13.1.1	Vocabulaire	137
13.1.2	Exemples	138
13.1.3	Quelques propriétés	138
<b>13.2</b>	<b>Espace probabilisé</b>	<b>. 139</b>
13.2.1	Univers d'une expérience aléatoire	139
13.2.2	Tribu d'événements	139
13.2.3	Probabilité	141
13.2.4	Propriétés	142
13.2.4.1	Continuité	142
13.2.4.2	Sous-additivité	143
13.2.4.3	Événements négligeables ou presque sûrs	143
13.2.5	Probabilité discrète	143
<b>13.3</b>	<b>Probabilités conditionnelles</b>	<b>. 144</b>
13.3.1	Généralités	144
13.3.2	Systèmes complets d'événements	145
13.3.3	Formule des probabilités totales	147
13.3.4	Formule de Bayes	148
<b>13.4</b>	<b>Indépendance</b>	<b>. 149</b>
13.4.1	Indépendance de deux événements	149
13.4.2	Indépendance mutuelle	150

---

## 13.1 Dénombrabilité

### 13.1.1 Vocabulaire

---

#### Définition 13.1

On dit qu'un ensemble  $E$  est dénombrable quand il existe une bijection de  $\mathbb{N}$  dans  $E$ .

Dans ce cas, cela signifie qu'on peut numéroté les éléments de  $E$  par les entiers naturels et donc qu'on peut écrire  $E$  en extension sous une forme  $E = \{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$  sans jamais répéter deux fois le même élément : on dit qu'on a énuméré les éléments de  $E$ .

Un ensemble fini est de la forme  $\{x_0, \dots, x_n\}$  : on peut aussi l'écrire sous la forme  $\{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$  en répétant une infinité de fois au moins un élément. C'est pourquoi on voit souvent dans les raisonnements apparaître la locution « ensemble fini ou dénombrable » ou « ensemble au plus dénombrable ».

Évidemment, tout ensemble en bijection avec un ensemble dénombrable est aussi dénombrable, car une composée de bijections est une bijection.

### 13.1.2 Exemples

---

#### Proposition 13.2

- ▷  $\mathbb{N}, \mathbb{N}^*$ , plus généralement  $[n_0; +\infty[ \cap \mathbb{N}$  (pour tout  $n_0 \in \mathbb{N}$ ), et encore plus généralement toute partie infinie de  $\mathbb{N}$  sont dénombrables.
- ▷  $\mathbb{Z}$  est dénombrable.
- ▷ Pour tout  $p \in \mathbb{N}^*$ ,  $\mathbb{N}^p$  est dénombrable.
- ▷  $\mathbb{Q}$  est dénombrable.
- ▷ Si  $(u_i)_{i \in I}$  est une famille sommable de complexes, alors le support de la famille  $\{i \in I \mid u_i \neq 0\}$  est dénombrable.

En revanche, il existe des ensembles infinis non-dénombrables, comme  $\mathbb{R}$  ou tout intervalle de longueur non-nulle. Un ensemble non-dénombrable est trop gros pour qu'on puisse ordonner ses éléments et les numéroté.

### 13.1.3 Quelques propriétés

---

#### Proposition 13.3

Toute partie infinie d'un ensemble dénombrable est dénombrable.

Si  $E$  est dénombrable, alors pour toute injection de  $F$  dans  $E$ ,  $F$  est au plus dénombrable.

Pourvu qu'on ne considère pas trop d'ensembles, les réunions d'ensembles dénombrables le sont aussi.

---

#### Proposition 13.4

Si  $E_1, \dots, E_n$  sont (au plus) dénombrables, alors  $E_1 \cup \dots \cup E_n$  l'est aussi.

Si  $(E_i)_{i \in I}$  est une famille (au plus) dénombrable d'ensembles (au plus) dénombrables, alors  $\bigcup_{i \in I} E_i$  l'est aussi.

En revanche, pour les produits cartésiens, il faut se contenter d'un nombre fini d'ensembles.

---

**Proposition 13.5**

*Si  $E_1, \dots, E_n$  sont dénombrables, alors  $E_1 \times \dots \times E_n$  est dénombrable.*

En revanche, un produit cartésien quelconque d'ensembles dénombrables ne l'est pas en général : par exemple,  $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$  n'est pas dénombrable.

## 13.2 Espace probabilisé

### 13.2.1 Univers d'une expérience aléatoire

Une expérience aléatoire est une expérience dont on connaît les résultats possibles (les issues possibles) mais dont on ne peut pas connaître à l'avance le résultat. On modélise l'expérience par la donnée de l'ensemble  $\Omega$  des issues possibles.

---

**Définition 13.6**

L'ensemble des issues possibles est appelé univers des possibles (ou univers). Il est souvent noté  $\Omega$ .

---

*Exemple 13.7*

- ▶ On jette un dé non-truqué : les issues possibles sont les six entiers  $1, \dots, 6$  ; l'univers est donc  $\Omega = \{1, \dots, 6\}$ .
- ▶ On jette  $n$  fois un dé : les issues possibles sont les suites de  $n$  entiers de l'ensemble  $\{1, \dots, 6\}$  ; donc  $\Omega = \llbracket 1 ; 6 \rrbracket^n$ .
- ▶ On lance une pièce une infinité de fois : les issues possibles sont les suites infinies de 0 ou 1 ; donc  $\Omega = \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ .

### 13.2.2 Tribu d'événements

De manière informelle, un événement est une partie de l'univers  $\Omega$ . Mais cette définition est trop vague. Si on autorise toutes les parties de l'univers à être des événements, alors quand l'ensemble  $\Omega$  est infini non-dénombrable, les seules probabilités sur  $\Omega$  sont des probabilités discrètes (théorème d'Ulam), ce qui exclut tout un tas de probabilités intéressantes. Donc on doit en général restreindre la notion d'événement à certaines parties de  $\Omega$  : certaines parties n'ont donc pas le droit d'être nommées « événement ».

---

**Définition 13.8**

Soit  $\Omega$  un univers.

On appelle tribu sur  $\Omega$  une partie  $\mathcal{T}$  de  $\mathcal{P}(\Omega)$  telle que :

- ▷  $\Omega \in \mathcal{T}$
- ▷ pour tout  $A \in \mathcal{T}$ ,  $\bar{A} \in \mathcal{T}$
- ▷ pour toute suite  $(A_n) \in \mathcal{T}^{\mathbb{N}}$ ,  $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{T}$ .

Modéliser une expérience aléatoire, c'est choisir l'univers et une tribu : les éléments de la tribu sont appelés les événements. On dit qu'un événement est réalisé quand l'issue de l'expérience aléatoire appartient à cet événement. Le couple  $(\Omega, \mathcal{T})$  est appelé espace probabilisable.

---

*Exemple 13.9*

- ▷ L'ensemble  $\{\emptyset, \Omega\}$  est une tribu, c'est la plus petite tribu envisageable. Elle est inutilisable en pratique car elle ne comporte pas assez d'événements pour décrire des situations issues de la vie réelle.
- ▷ L'ensemble  $\mathcal{P}(\Omega)$  est une tribu : quand l'univers  $\Omega$  est fini ou dénombrable, c'est la tribu utilisée systématiquement, mais quand  $\Omega$  est infini non-dénombrable, c'est une tribu trop grosse pour pouvoir y définir une probabilité vraiment utile.
- ▷ En école d'ingénieur, vous entendrez parler de la tribu des boréliens : c'est celle qui est couramment utilisée quand  $\Omega = \mathbb{R}$ .

---

**Proposition 13.10**

Soient  $\Omega$  un ensemble et  $\mathcal{T}$  une tribu sur  $\Omega$ .

Alors on a :

- ▷  $\emptyset \in \mathcal{T}$
- ▷ pour toute suite  $(A_n) \in \mathcal{T}^{\mathbb{N}}$ ,  $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{T}$
- ▷ pour toute famille finie  $(A_1, \dots, A_n)$  d'événements,  $\bigcup_{k=0}^n A_k$  et  $\bigcap_{k=0}^n A_k$  sont des événements.

---

**Définition 13.11**

$\Omega$  est appelé l'événement certain,  $\emptyset$  est appelé l'événement impossible.

Deux événements  $A$  et  $B$  sont dits incompatibles quand ils sont disjoints, i.e.  $A \cap B = \emptyset$ .

### 13.2.3 Probabilité

---

#### Définition 13.12

Soient  $\Omega$  un univers et  $\mathcal{T}$  une tribu sur  $\Omega$ .

On appelle probabilité sur  $(\Omega, \mathcal{T})$  toute application  $\mathbb{P} : \mathcal{T} \longrightarrow [0 ; 1]$  telle que :

- ▷  $\mathbb{P}(\Omega) = 1$
- ▷ pour toute suite  $(A_n) \in \mathcal{T}^{\mathbb{N}}$  d'événements deux à deux incompatibles, la série de terme général  $\mathbb{P}(A_n)$  est convergente et  $\mathbb{P}\left(\bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n)$ .

Le triplet  $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$  est appelé espace probabilisé.

En pratique, sauf dans certains cas où  $\Omega$  est fini ou dénombrable, nous postulons toujours l'existence d'un espace probabilisé qui modélise la situation, car c'est hors de notre portée de construire concrètement un tel espace. Dès que les expériences aléatoires peuvent avoir une infinité non-dénombrable de résultats possibles, il est souvent difficile de reprendre les idées développées en première année et définir, par exemple, des probabilités à partir d'événements élémentaires  $\{\omega\}$  (définir  $\Omega$  est en général à notre portée, mais construire la tribu et la probabilité est inaccessible à nos moyens). Nous admettons donc toujours l'existence d'un espace probabilisé représentant notre expérience.

Dans moult cas, nous définirons les événements à partir d'événements « primitifs » : par exemple, dans le cas d'une suite de lancer de pièce, l'univers est simple :  $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ , mais il n'est pas dénombrable ; les événements primitifs sont les événements  $P_i$ , où  $i \in \mathbb{N}$  et

$$P_i = \{\omega = (\omega_n) \in \{0, 1\}^{\mathbb{N}} \mid \omega_i = 1\}$$

modélise l'événement au sens concret « obtenir pile au  $i$ -ème lancer ».

---

#### Exercice 13.13

On lance une pièce une infinité de fois.

Exprimez par une phrase ce que représentent les événements suivants :

$$A_n = \bigcap_{i=0}^n P_i \quad B_n = \bigcup_{i=0}^n \left( P_i \cap \bigcap_{\substack{0 \leq j \leq n \\ j \neq i}} \overline{P_j} \right) \quad C = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} \bigcap_{j \geq i} P_j.$$

Réciproquement, définissez à l'aide des  $P_i$  les événements suivants :

- ▷ on obtient pile un nombre fini de fois
- ▷ on obtient pile une infinité de fois.

## 13.2.4 Propriétés

On retrouve les propriétés vues en première année.

---

### Proposition 13.14

Soit  $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$  un espace probabilisé.

Alors  $\mathbb{P}$  vérifie les propriétés suivantes :

- ▷ pour tout  $A \in \mathcal{T}$ ,  $\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$  ; en particulier  $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$
- ▷ pour tout  $(A, B) \in \mathcal{T}^2$ ,  $A \subseteq B \implies \mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$
- ▷ pour tout  $(A, B) \in \mathcal{T}^2$ ,  $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$ .

Mais on en a d'autres, liées à la notion de suite dénombrable.

### 13.2.4.1 Continuité

---

#### Proposition 13.15 (Continuité croissante)

Si  $(A_n)$  est une suite croissante d'événements, c'est-à-dire pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $A_n \subseteq A_{n+1}$ , alors

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(A_n).$$

---

#### Proposition 13.16 (Continuité décroissante)

Si  $(A_n)$  est une suite décroissante d'événements, c'est-à-dire pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $A_{n+1} \subseteq A_n$ , alors

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(A_n).$$

---

#### Proposition 13.17

Soit  $(A_n)$  une suite quelconque d'événements. On a

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n\right) = \lim_{N \rightarrow +\infty} \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=0}^N A_n\right) \quad \text{et} \quad \mathbb{P}\left(\bigcap_{n=0}^{+\infty} A_n\right) = \lim_{N \rightarrow +\infty} \mathbb{P}\left(\bigcap_{n=0}^N A_n\right).$$

---

#### Exercice 13.18

On considère l'univers des suites infinies de lancers indépendants d'une pièce équilibrée :  $\Omega = \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ .

Montrez que les événements élémentaires  $\{\omega\}$  sont de probabilité nulle.

Déduisez-en que l'univers n'est pas dénombrable.

Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre fini de face ?



### 13.2.4.2 Sous-additivité

---

#### Proposition 13.19 (Sous-additivité)

Si  $(A_n)$  est une suite d'événements, alors

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) \leq \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n).$$

Dans ce résultat, le symbole  $\sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n)$  signifie  $\lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{n=0}^N \mathbb{P}(A_n)$  : c'est un réel si la série  $\sum \mathbb{P}(A_n)$  est convergente, et  $+\infty$  sinon (puisque la série est à termes positifs).

### 13.2.4.3 Événements négligeables ou presque sûrs

---

#### Définition 13.20

Un événement est dit négligeable quand sa probabilité est nulle.

Un événement est dit presque sûr quand sa probabilité est 1.

---

#### Proposition 13.21

Toute réunion ou intersection au plus dénombrable d'événements négligeables est négligeable.

Toute réunion ou intersection au plus dénombrable d'événements presque sûrs est presque sûre.

## 13.2.5 Probabilité discrète

---

#### Définition 13.22

Soit  $\Omega$  un univers.

On appelle distribution de probabilité discrète sur  $\Omega$  toute famille de réels positifs indexée par  $\Omega$ , sommable et de somme totale 1.

Si  $\Omega$  est un ensemble fini, on retrouve la définition de l'an dernier.

---

#### Proposition 13.23

Si  $(p_\omega)_{\omega \in \Omega}$  est une distribution de probabilité discrète sur  $\Omega$ , alors son support  $\{\omega \in \Omega \mid p_\omega > 0\}$  est au plus dénombrable.

À toute distribution de probabilité discrète sur  $\Omega$ , on peut associer une probabilité sur l'espace probabilisable  $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ .

---

**Proposition 13.24**

Si  $(p_\omega)_{\omega \in \Omega}$  est une distribution de probabilité discrète sur  $\Omega$ , alors il existe une unique probabilité  $\mathbb{P}$  sur la tribu  $\mathcal{P}(\Omega)$  telle que pour tout  $\omega \in \Omega$ ,  $\mathbb{P}(\{\omega\}) = p_\omega$ .

Quand l'univers est infini non-dénombrable, le résultat précédent donne toutes les probabilités discrètes sur  $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ . Mais si on choisit des tribus plus petites (ce qui est très relatif : en général, ce sont des ensembles énormes, dont la puissance dépasse celle du continu!), alors on peut créer d'autres types de probabilités (comme les probabilités dites continues).

Quand l'univers  $\Omega$  est fini ou dénombrable, alors toutes les probabilités sont discrètes : on choisit toujours la tribu  $\mathcal{P}(\Omega)$ , ce qui est toujours sous-entendu.

---

**Proposition 13.25**

Soit  $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$  un ensemble fini.

Alors pour tout  $n$ -uplet  $(p_1, \dots, p_n) \in [0; 1]^n$  tel que  $\sum_{i=1}^n p_i = 1$ , il existe une unique probabilité  $\mathbb{P}$  sur  $\Omega$  telle que pour tout  $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$ ,  $\mathbb{P}(\{\omega_i\}) = p_i$ .

---

**Proposition 13.26**

Soit  $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n, \dots\}$  un ensemble dénombrable.

Alors pour toute suite  $(p_n) \in [0; 1]^{\mathbb{N}}$  telle que la série  $\sum_{n \geq 1} p_n$  converge et  $\sum_{n=1}^{+\infty} p_n = 1$ , il existe une unique probabilité  $\mathbb{P}$  sur  $\Omega$  telle que pour tout  $i \in \mathbb{N}^*$ ,  $\mathbb{P}(\{\omega_i\}) = p_i$ .

---

**Exercice 13.27**

Déterminez l'unique constante  $\lambda$  telle qu'on puisse définir une probabilité sur  $\mathbb{N}$  en posant

$$\text{pour tout } n \in \mathbb{N}, \quad \mathbb{P}(\{n\}) = \frac{\lambda}{n!}.$$

Dans toute la suite, on suppose donné un espace probabilisé  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ .

## 13.3 Probabilités conditionnelles

### 13.3.1 Généralités

---

**Définition 13.28**

Soit  $A \in \mathcal{T}$  un événement non-négligeable.

Pour  $B \in \mathcal{T}$ , on pose  $\mathbb{P}_A(B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)}$ , appelé probabilité sachant  $A$  de  $B$ .

On voit aussi la notation  $\mathbb{P}(B | A)$ , mais attention, cette notation est trompeuse, elle peut laisser penser qu'il existe un événement qui s'appellerait «  $B$  sachant  $A$  », ce qui n'a aucun sens.

L'idée derrière la notion de probabilité conditionnelle est que lorsqu'on dispose d'une information partielle sur le résultat de l'expérience, notre perception des probabilités s'en trouve modifiée.

---

**Théorème 13.29**

*Sous les mêmes hypothèses,  $\mathbb{P}_A$  est une probabilité sur  $(\Omega, \mathcal{T})$ , appelée probabilité conditionnelle relative à  $A$ .*

En général, on connaît plutôt  $\mathbb{P}(A)$  et  $\mathbb{P}_A(B)$ , ce qui permet de calculer  $\mathbb{P}(A \cap B)$  :

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \mathbb{P}_A(B).$$

On peut généraliser.

---

**Théorème 13.30 (Formule des probabilités composées)**

*Soit  $(A_1, \dots, A_n)$  une famille d'événements tels que  $\mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) \neq 0$ .*

*Alors  $\mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1} \cap A_n) = \mathbb{P}(A_1) \mathbb{P}_{A_1}(A_2) \mathbb{P}_{A_1 \cap A_2}(A_3) \dots \mathbb{P}_{A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}}(A_n)$ .*

En général, on utilise ce résultat lorsque des événements (au sens naturel) se succèdent et que la connaissance de chaque événement permet de déterminer l'état du système.

---

**Exercice 13.31**

On dispose d'une urne contenant une boule blanche et  $n$  boules noires (avec  $n \geq 1$ ).

On effectue une suite de tirages jusqu'à obtenir la boule blanche en respectant le protocole suivant : si on tire une boule noire, on la remplace par deux boules noires.

Calculez la probabilité d'obtenir la boule blanche à l'issue du  $k$ -ème tirage et la probabilité de ne jamais tirer la boule blanche.

### 13.3.2 Systèmes complets d'événements

---

**Définition 13.32**

Soit  $(A_i)_{i \in I}$  une famille d'événements.

On dit que la famille  $(A_i)_{i \in I}$  est un système complet d'événements si, et seulement si :

- $I$  est fini ou dénombrable (en pratique, on a souvent  $I = \llbracket 1 ; n \rrbracket$  ou  $I = \mathbb{N}$ )
- les événements sont deux à deux incompatibles :

$$\text{pour tout } (i, j) \in I^2, \ i \neq j \implies A_i \cap A_j = \emptyset$$

- $\bigcup_{i \in I} A_i = \Omega.$

---

*Exemple 13.33*

- Si  $A$  est un événement, le couple  $(A, \overline{A})$  est un système complet d'événements.
- Si  $\Omega$  est fini ou dénombrable, la famille de tous les événements élémentaires est un système complet d'événements.

Les systèmes complets d'événements interviennent lorsqu'on est tenté de faire une disjonction de cas : on est dans un cas, ou alors dans un autre, etc, mais sans que jamais deux cas soient simultanément possibles.

Si  $(A_i)_{i \in I}$  est un système complet d'événements, alors  $\sum_{i \in I} \mathbb{P}(A_i) = 1.$

---

*Remarque 13.34*

D'une manière générale, dans toute la suite du cours, si on voit apparaître une somme  $\sum_{i \in I} \dots$ , alors elle signifiera :

- une vraie somme quand  $I$  est fini
- une somme d'une famille sommable quand  $I$  est infini
- cas particulier : dans le cas de réels positifs, on peut oublier la condition de sommabilité et prendre les sommes dans  $[0 ; +\infty]$  (c'est presque toujours le cas tant qu'on ne manipule que des probabilités, qui sont des réels positifs).

---

**Définition 13.35**

Pour définir un système quasi-complet d'événements, on remplace la condition  $\bigcup_{i \in I} A_i = \Omega$  par la condition  $\sum_{i \in I} \mathbb{P}(A_i) = 1$ .

Un système complet d'événements est donc un système quasi-complet d'événements.

Réciproquement, si  $(A_i)_{i \in I}$  est un système quasi-complet d'événements, on pose  $B = \overline{\bigcup_{i \in I} A_i}$  :  $B$  est alors un événement négligeable et le système d'événements constitué des événements  $A_i$  auxquels on ajoute l'événement  $B$  est alors un système complet.

Conclusion : à un événement négligeable près, les deux notions sont identiques. La suite du cours montre que la différence entre les deux notions n'est pas fondamentale en pratique.

### 13.3.3 Formule des probabilités totales

---

**Théorème 13.36**

*Soit  $(A_i)_{i \in I}$  un système complet d'événements.*

*Alors pour tout événement  $B$ ,  $\mathbb{P}(B) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}(B \cap A_i)$ .*

*Si, de plus, tous les événements  $A_i$  sont de probabilité non-nulle, alors  $\mathbb{P}(B) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}_{A_i}(B) \mathbb{P}(A_i)$ .*

Si  $A$  est un événement négligeable, alors  $A \cap B$  en est un aussi : formellement, la probabilité conditionnelle  $\mathbb{P}_A(B)$  n'est pas définie ; on lui donne alors une valeur arbitraire (souvent 0, en fait peu importe) et on accepte quand même l'égalité  $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}_A(B) \mathbb{P}(A) = 0$ , car, dans ce cas, cette égalité est vraie puisque  $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) = 0$ .

Avec cette convention, on peut étendre la formule des probabilités totales à tout système quasi-complet d'événements.

---

**Théorème 13.37**

*Soit  $(A_i)_{i \in I}$  un système complet d'événements.*

*Alors pour tout événement  $B$ ,  $\mathbb{P}(B) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}_{A_i}(B) \mathbb{P}(A_i)$ .*

---

**Exercice 13.38**

Soit  $p \in ]0 ; 1[$ .

Dans  $\mathbb{N}$ , on définit la probabilité  $\mathbb{P}$  par  $\mathbb{P}(\{n\}) = (1 - p) p^n$ .

Justifiez que cette égalité définit effectivement une probabilité sur  $\mathbb{N}$ .

On tire un entier  $N$  au hasard selon cette probabilité, puis on remplit une urne avec une boule noire et  $N$  boules blanches. On prélève enfin une boule dans l'urne.

Quelle est la probabilité d'obtenir une boule noire dans cette expérience ?

### 13.3.4 Formule de Bayes

---

**Proposition 13.39**

Soient  $A$  et  $B$  deux événements de probabilité non-nulle.

$$\text{Alors } \mathbb{P}_B(A) = \frac{\mathbb{P}(A) \mathbb{P}_A(B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Cette formule est appelée la formule de probabilité des causes.

On déduit de cela et de la formule des probabilités totales la formule de Bayes.

---

**Théorème 13.40**

Soit  $(A_i)_{i \in I}$  un système quasi-complet d'événements.

$$\text{Alors pour tout événement } B \text{ tel que } \mathbb{P}(B) \neq 0, \text{ on a } \mathbb{P}_B(A_i) = \frac{\mathbb{P}(A_i) \mathbb{P}_{A_i}(B)}{\sum_{j \in I} \mathbb{P}(A_j) \mathbb{P}_{A_j}(B)}.$$

---

*Remarque 13.41*

L'énoncé est donné ici dans sa pleine version mais, en pratique, on retrouve la formule à chaque fois en refaisant la démonstration dans le cas qui nous préoccupe.

---

**Exercice 13.42**

Une proportion  $p$  d'une population est atteinte d'une maladie donnée (*prévalence* de la maladie) pour laquelle un test de dépistage existe.

Appliqué à un individu atteint, le test donne un résultat positif avec une probabilité  $s$  (*sensibilité* du test).

Appliqué à un individu indemne, il donne un résultat négatif avec une probabilité  $s'$  (*spécificité* du test).

Calculez la probabilité qu'un patient soit effectivement atteint lorsque son test est positif (*valeur prédictive positive*) ; qu'il soit effectivement indemne lorsque son test est négatif (*valeur prédictive négative*).

---

**Exercice 13.43**

Jean-Eudes lance une pièce équilibrée jusqu'à obtenir pile, il compte le nombre de lancers nécessaires, noté  $k$ , puis il remplit une urne avec  $k$  boules numérotées de 1 à  $k$ . Enfin, il tire une boule dans l'urne.

Il nous annonce qu'il a obtenu 1, mais ne nous donne pas la valeur de  $k$ .

Déterminez la probabilité qu'il n'ait fait qu'un seul lancer de pièce.

## 13.4 Indépendance

### 13.4.1 Indépendance de deux événements

---

**Définition 13.44**

Soient  $A$  et  $B$  deux événements.

On dit que  $A$  et  $B$  sont indépendants (pour la probabilité  $\mathbb{P}$ ) ssi  $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B)$ .

---

**Proposition 13.45**

Si  $A$  et  $B$  sont deux événements indépendants, alors les événements  $A$  et  $\overline{B}$  sont indépendants, les événements  $\overline{A}$  et  $B$  sont indépendants et les événements  $\overline{A}$  et  $\overline{B}$  sont indépendants.

---

*Remarque 13.46*

- Attention ! Ne pas confondre « événements indépendants » et « événements incompatibles » !
- Le fait que deux événements soient indépendants ou pas n'est pas seulement lié aux événements eux-mêmes, mais dépend aussi de la probabilité. Quand plusieurs probabilités sont utilisées (par exemple des probabilités conditionnelles), il est essentiel de préciser pour quelle probabilité les événements sont indépendants.

---

**Proposition 13.47**

Soient  $A$  et  $B$  deux événements tels que  $A$  n'est pas négligeable.

Alors  $A$  et  $B$  sont indépendants ssi  $\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}_A(B)$ .

Intuitivement, deux événements sont indépendants si le fait de savoir que l'un des deux est réalisé n'apporte aucune information sur le fait de savoir que l'autre le soit ou non : dans le cas où  $A$  et  $B$  sont deux événements tels que  $\mathbb{P}(A) \neq 0$  et  $\mathbb{P}(B) \neq 0$ , alors  $\mathbb{P}_B(A) = \mathbb{P}(A)$  et  $\mathbb{P}_A(B) = \mathbb{P}(B)$ . Et non pas, comme c'est souvent indiqué dans la littérature, le fait qu'un événement n'influe pas sur un autre ! Mais tout ça n'est que baratin. **Il faut se méfier de l'intuition quand on fait des calculs de probabilités.**

---

**Exercice 13.48**

Une famille a  $n$  enfants (avec  $n \geq 2$ ).

Quelle est la probabilité qu'il n'y ait que des enfants du même sexe ?

Quelle est la probabilité qu'il y ait au moins deux filles ?

Montrez que ces deux événements sont indépendants ssi  $n = 3$ .

## 13.4.2 Indépendance mutuelle

---

**Définition 13.49**

Soit  $(A_i)_{i \in I}$  une famille finie ou dénombrable d'événements.

On dit que les événements  $(A_i)_{i \in I}$  sont (mutuellement) indépendants ssi pour tout sous-ensemble fini

$$J \subseteq I, \quad \mathbb{P}\left(\bigcap_{j \in J} A_j\right) = \prod_{j \in J} \mathbb{P}(A_j).$$

Le résultat précédent peut être généralisé.

---

**Proposition 13.50**

Si  $(A_i)_{i \in I}$  est une famille d'événements (mutuellement) indépendants, alors toute famille d'événements  $(C_i)_{i \in I}$  où pour tout  $i \in I$ , on choisit  $C_i = A_i$  ou  $C_i = \overline{A_i}$ , est aussi une famille d'événements mutuellement indépendants.

---

*Remarque 13.51*

On s'intéresse rarement (pour ne pas dire jamais !) à des familles d'événements deux à deux indépendants seulement : cette notion n'implique pas l'indépendance mutuelle, qui est la seule notion vraiment utile.

---

*Remarque 13.52*

L'indépendance mutuelle d'un grand nombre d'événements est presque toujours une propriété postulée lors de la modélisation et rarement une propriété démontrée car c'est une preuve difficile en général.

On finit par le lemme des coalitions sur les événements.

---

**Théorème 13.53**

Soit  $(A_i)_{i \in I}$  une famille d'événements mutuellement indépendants.

Si l'événement  $B$  est le résultat d'opérations ensemblistes sur une sous-famille  $(A_j)_{j \in J}$  (où  $J \subseteq I$ ) et  $C$  est le résultat d'opérations ensemblistes sur la sous-famille complémentaire  $(A_i)_{i \in I \setminus J}$ , alors  $B$  et  $C$  sont indépendants.



# Chapitre 14

## Variables aléatoires discrètes

### Sommaire

---

<b>14.1</b>	<b>Variables aléatoires discrètes . . . . .</b>	<b>152</b>
14.1.1	Définition . . . . .	152
14.1.2	Probabilité-image d'une variable aléatoire discrète . . . . .	152
14.1.3	Loi d'une variable aléatoire discrète . . . . .	153
14.1.4	Cas des variables aléatoires discrètes réelles ou complexes . . . . .	154
<b>14.2</b>	<b>Espérance . . . . .</b>	<b>155</b>
14.2.1	Définitions . . . . .	155
14.2.2	Propriétés . . . . .	156
14.2.3	Théorème de transfert . . . . .	157
14.2.4	Inégalité de Markov . . . . .	158
<b>14.3</b>	<b>Variance d'une variable réelle . . . . .</b>	<b>158</b>
14.3.1	Moments d'ordre 2 . . . . .	158
14.3.2	Variance et écart-type . . . . .	159
14.3.3	Inégalité de Bienaymé-Tchebychev . . . . .	160
14.3.4	Généralisation . . . . .	160
<b>14.4</b>	<b>Lois classiques . . . . .</b>	<b>160</b>
14.4.1	Loi uniforme . . . . .	160
14.4.2	Loi de Bernoulli . . . . .	161
14.4.3	Loi binomiale . . . . .	161
14.4.4	Loi géométrique . . . . .	162
14.4.5	Loi de Poisson . . . . .	163
<b>14.5</b>	<b>Couples de variables aléatoires . . . . .</b>	<b>163</b>
14.5.1	Généralités . . . . .	163
14.5.2	Lois marginales . . . . .	164
14.5.3	Lois conditionnelles . . . . .	165
14.5.4	Covariance . . . . .	166
<b>14.6</b>	<b>Indépendance de variables aléatoires . . . . .</b>	<b>167</b>
14.6.1	Généralités . . . . .	167
14.6.2	Espérance et indépendance . . . . .	168
14.6.3	Généralisation . . . . .	168
14.6.4	Théorème de réalisation . . . . .	170
14.6.5	Somme de variables indépendantes identiquement distribuées . . . . .	170
<b>14.7</b>	<b>Loi faible des grands nombres . . . . .</b>	<b>171</b>
<b>14.8</b>	<b>Fonction génératrice d'une variable aléatoire à valeurs entières . . . . .</b>	<b>171</b>
14.8.1	Généralités . . . . .	171

14.8.2 Lien entre espérance et fonction génératrice . . . . .	173
14.8.3 Fonction génératrice d'une somme de variables indépendantes . . . . .	173

---

Dans tout ce chapitre, même si ce n'est pas rappelé à chaque fois, on suppose que  $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$  est un espace probabilisé.

Dans ce chapitre, si  $E$  est un ensemble fini ou dénombrable et  $(u_x)_{x \in E}$  une famille de réels indexée par  $E$ , la notation  $\sum_{x \in E} u_x$  désigne la somme au sens des familles sommables ou des familles positives selon les cas.

## 14.1 Variables aléatoires discrètes

### 14.1.1 Définition

#### Définition 14.1

On appelle variable aléatoire discrète toute application  $X$  de  $\Omega$  dans un ensemble quelconque telle que son ensemble-image  $X(\Omega)$  soit fini ou dénombrable et telle que pour tout  $x \in X(\Omega)$ ,  $X^{-1}(\{x\}) \in \mathcal{T}$ .

On appelle variable aléatoire discrète réelle (respectivement complexe) toute variable aléatoire discrète à valeurs dans  $\mathbb{R}$  (respectivement  $\mathbb{C}$ ).

En général, on note avec des lettres majuscules droites les variables aléatoires :  $X, Y, S$ , etc.

Si  $U \subseteq X(\Omega)$ , on note plutôt  $X^{-1}(U)$  sous la forme préférée des probabilistes  $\{X \in U\}$  ou même  $(X \in U)$ .

#### Remarque 14.2

- Comme son nom ne l'indique pas, une variable aléatoire n'est pas une variable, mais une fonction ! La terminologie a été fixée à une époque ancienne où la notion n'était pas encore parfaitement claire.
- Toute fonction constante est une variable aléatoire, appelée variable aléatoire certaine.
- Si  $A$  est un événement, la variable aléatoire  $\mathbb{1}_A$  est appelée fonction indicatrice de  $A$ .

### 14.1.2 Probabilité-image d'une variable aléatoire discrète

#### Proposition 14.3

Soit  $X$  une variable aléatoire discrète à valeurs dans  $E$ .

À toute partie  $U$  de  $X(\Omega)$ , on associe  $\mathbb{P}_X(U) = \mathbb{P}(\{X \in U\}) = \mathbb{P}(X \in U)$ .

Alors  $\mathbb{P}_X$  est une probabilité sur  $(X(\Omega), \mathcal{P}(X(\Omega)))$ , appelée probabilité-image de  $X$  ou loi de  $X$ .

---

*Remarque 14.4*

L'intérêt de la notion de variable aléatoire est de déplacer les calculs de probabilité dans l'univers  $\Omega$  souvent inconnu, muni d'une tribu inconnue, dans un ensemble fini ou dénombrable  $X(\Omega)$  bien plus agréable, muni de la tribu simple  $\mathcal{P}(X(\Omega))$ .

Dans notre pratique des probabilités, nous supposerons toujours l'existence des variables aléatoires qu'on considère ! Voyons néanmoins un résultat de réalisation effective.

### 14.1.3 Loi d'une variable aléatoire discrète

On rappelle qu'une distribution discrète (de probabilités) est une famille de réels positifs  $(p_x)_{x \in L}$  où  $L$  est un ensemble fini ou dénombrable (non vide) telle que  $\sum_{x \in L} p_x = 1$ .

Les exemples suivants sont fondamentaux et sont à connaître.

---

*Exemple 14.5*

Avec  $L$  un ensemble fini :

- ▷ Distribution uniforme sur  $L$  :  $\mathcal{U}(L) = (p_x)_{x \in L}$  où  $p_x = \frac{1}{\text{Card } L}$ .
- ▷ Distribution de Bernoulli de paramètre  $p \in [0 ; 1]$  :  $\mathcal{B}(p) = (p_0, p_1)$  où  $p_1 = p$  et  $p_0 = 1 - p$ .
- ▷ Distribution binomiale de paramètre  $(n, p) \in \mathbb{N} \times [0 ; 1]$  :  $\mathcal{B}(n, p) = (p_k)_{k \in \llbracket 0; n \rrbracket}$  où  $p_k = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$ .

Avec  $L$  dénombrable :

- ▷ Distribution géométrique de paramètre  $p \in ]0 ; 1[$  :  $\mathcal{G}(p) = (p_x)_{x \in \mathbb{N}^*}$  où  $p_x = (1 - p)^{x-1} p$ .
- ▷ Distribution de Poisson de paramètre  $\lambda > 0$  :  $\mathcal{P}(\lambda) = (p_k)_{k \in \mathbb{N}}$  où  $p_k = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$ .

---

**Définition 14.6**

On dit qu'une variable aléatoire discrète  $X$  sur  $\Omega$  suit la loi discrète  $\mathcal{L}$  quand

$$X(\Omega) \subseteq L \quad \text{et} \quad \forall x \in L, \quad \mathbb{P}(X = x) = p_x$$

où  $(p_x)_{x \in L}$  est la distribution de probabilités nommée par le même nom que  $\mathcal{L}$ .

Quand on demande la loi d'une variable aléatoire  $X$ , on demande donc de déterminer un ensemble  $L$  tel que  $X(\Omega) \subseteq L$  et pour chaque  $a \in L$ , la valeur de  $\mathbb{P}(X = a)$ . En général, on a souvent  $X(\Omega) = L$ , mais parfois ce n'est pas ce qui est le plus simple.

Par abus de langage, on confond la loi et la distribution de probabilité associée.

---

**Proposition 14.7**

Soit  $X$  une variable aléatoire qui suit la loi  $\mathcal{L} = (p_x)_{x \in L}$ .

La famille d'événements  $(\{X = x\})_{x \in L}$  est un système quasi-complet d'événements, appelé système quasi-complet d'événements associé à  $X$ .

En particulier, on a  $\sum_{x \in L} \mathbb{P}(X = x) = 1$ .

---

**Exercice 14.8**

Une urne contient  $n + 1$  boules numérotées de 0 à  $n$ .

On procède à deux tirages avec remise et on note  $S$  la somme des numéros des deux boules.

Déterminez la loi de  $S$ .

---

**Exercice 14.9**

On lance une infinité de fois une pièce dont la probabilité de tomber sur pile vaut  $p \in ]0 ; 1[$ .

On note  $X$  la variable aléatoire qui compte le nombre de lancers nécessaires pour obtenir une première fois pile.

Déterminez la loi de  $X$  en faisant des hypothèses raisonnables sur les lancers.

Théorème de réalisation.

---

**Théorème 14.10**

Soit  $\mathcal{L}$  une distribution discrète de probabilités.

Il existe un espace probabilisé  $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$  et une variable aléatoire  $X$  sur  $\Omega$  tels que  $X$  suive la loi  $\mathcal{L}$ .

On note  $X \sim \mathcal{L}$  pour signifier que  $X$  suit la loi  $\mathcal{L}$ , ou  $X \sim Y$  pour signifier que  $X$  et  $Y$  suivent la même loi (ce qui ne présuppose rien sur les univers de départ de  $X$  et  $Y$  : on a seulement  $X(\Omega) = Y(\Omega')$  et les égalités numériques  $\forall x \in X(\Omega), \mathbb{P}(X = x) = \mathbb{P}(Y = x)$ ).

### 14.1.4 Cas des variables aléatoires discrètes réelles ou complexes

---

**Proposition 14.11**

L'ensemble des variables aléatoires discrètes réelles sur l'espace probabilisé  $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$  est une  $\mathbb{R}$ -algèbre : on peut donc additionner ou multiplier par un scalaire des variables aléatoires discrètes réelles, ou les additionner entre elles.

Si  $X$  est une variable aléatoire discrète réelle sur  $\Omega$  et si  $f$  est une fonction de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  définie sur  $X(\Omega)$ , alors la composée  $f \circ X$  est une variable aléatoire discrète réelle définie sur  $\Omega$ , qu'on note plutôt  $f(X)$ .

On a bien sûr le même résultat avec les variables complexes.

La loi de  $f(X)$  est donc théoriquement donnée par :

$$\forall y \in f(X)(\Omega), \mathbb{P}(f(X) = y) = \sum_{x \in f^{-1}(\{y\}) \cap X(\Omega)} \mathbb{P}(X = x).$$

En pratique, cette loi est souvent difficilement calculable.

---

### Exercice 14.12

Soient  $X$  une variable aléatoire discrète suivant une loi de Poisson  $\mathcal{P}(\lambda)$  et  $p \in \mathbb{N}^*$ .

On pose  $Y = X^2 - (2p + 1)X$ .

Déterminez la loi de  $Y$ .

## 14.2 Espérance

### 14.2.1 Définitions

---

#### Définition 14.13

Soit  $X$  une variable aléatoire discrète à valeurs dans  $[0; +\infty]$ .

On appelle alors espérance de  $X$  le nombre  $\mathbb{E}(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} x \mathbb{P}(X = x)$  (au sens des familles positives) : c'est un réel si la famille  $(x \mathbb{P}(X = x))_{x \in X(\Omega)}$  est sommable et  $+\infty$  sinon.

Une variable aléatoire réelle positive possède donc toujours une espérance, éventuellement infinie. Dans le cas général, on ne peut pas toujours définir l'espérance.

---

#### Définition 14.14

Soit  $X$  une variable aléatoire discrète complexe.

On dit que  $X$  possède une espérance finie quand la famille  $(x \mathbb{P}(X = x))_{x \in X(\Omega)}$  est sommable. Dans ce cas, on appelle espérance de  $X$  le nombre  $\mathbb{E}(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} x \mathbb{P}(X = x)$  (au sens des familles sommables).

On note  $L^1$  l'ensemble des variables à espérance finie. On voit souvent écrit  $X \in L^1$  pour signifier en abrégé que la variable  $X$  possède une espérance finie.

L'espérance de  $X$  est donc la moyenne de ses valeurs possibles, pondérées par leurs probabilités respectives, quand cela a un sens.

---

*Exemple 14.15*

- L'espérance d'une variable aléatoire certaine égale à  $a$  est  $a$ .
- Si  $A$  est un événement, l'espérance de son indicatrice est sa probabilité :  $\mathbb{E}(1_A) = \mathbb{P}(A)$ .

---

**Exercice 14.16**

Soient  $\lambda \in \mathbb{R}$  et  $\alpha > 0$ .

Déterminez une CNS sur  $\lambda$  et  $\alpha$  pour qu'existe une variable aléatoire  $X$  qui suit une loi  $\left(\frac{\lambda}{n^\alpha}\right)_{n \in \mathbb{N}^*}$ .

À quelle condition  $X$  possède-t-elle une espérance finie ?

---

**Exercice 14.17**

Calculez l'espérance d'une variable  $X$  qui suit une loi géométrique de paramètre  $p \in ]0 ; 1[$ .

---

**Proposition 14.18**

*Toute variable aléatoire finie possède une espérance finie.*

*Toute variable aléatoire discrète complexe bornée possède une espérance finie.*

## 14.2.2 Propriétés

Une propriété qui découle des théorèmes de comparaison classiques sur les familles sommables.

---

**Proposition 14.19**

*Soient  $X$  et  $Y$  deux variables aléatoires discrètes complexes.*

*Si  $|X| \leq |Y|$  et  $Y \in L^1$ , alors  $X \in L^1$ .*

*Si  $X \in L^1$ , alors  $|X| \in L^1$  et  $|\mathbb{E}(X)| \leq \mathbb{E}(|X|)$  (inégalité triangulaire).*

La linéarité découle encore de la théorie des familles sommables.

---

**Proposition 14.20**

Soient  $X, Y$  deux variables aléatoires discrètes complexes admettant chacune une espérance finie et  $\lambda$  un complexe.

Alors  $X + Y$  et  $\lambda X$  admettent une espérance finie et

$$\mathbb{E}(X + Y) = \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y) \quad \text{et} \quad \mathbb{E}(\lambda X) = \lambda \mathbb{E}(X).$$

En particulier :  $\forall (a, b) \in \mathbb{C}^2, \mathbb{E}(aX + b) = a \mathbb{E}(X) + b$ .

Si  $X$  est une variable aléatoire réelle positive, alors  $\mathbb{E}(X) \geq 0$ .

Si  $X$  et  $Y$  sont deux variables aléatoires réelles telles que  $X \leq Y$ , alors  $\mathbb{E}(X) \leq \mathbb{E}(Y)$ .

---

**Proposition 14.21**

Soit  $X$  une variable aléatoire discrète réelle positive.

Alors  $X$  a une espérance nulle ssi  $X$  est presque sûrement nulle, i.e.  $\mathbb{P}(X = 0) = 1$ .

---

**Définition 14.22**

On dit qu'une variable aléatoire discrète complexe  $X$  est centrée ssi  $\mathbb{E}(X) = 0$ .

À toute variable aléatoire discrète complexe  $X$ , on associe une variable aléatoire discrète complexe centrée :  $X - \mathbb{E}(X)$ .

### 14.2.3 Théorème de transfert

---

**Théorème 14.23**

Soient  $X$  une variable aléatoire discrète complexe et  $f$  une fonction de  $\mathbb{C}$  dans  $\mathbb{C}$  définie sur  $X(\Omega)$ .

La variable aléatoire discrète complexe  $f(X)$  possède une espérance finie ssi la famille  $(f(x) \mathbb{P}(X = x))_{x \in X(\Omega)}$  est sommable et, dans ce cas, on a

$$\mathbb{E}(f(X)) = \sum_{x \in X(\Omega)} f(x) \mathbb{P}(X = x).$$

Ce théorème permet de calculer directement l'espérance de  $f(X)$  sans devoir calculer la loi de  $f(X)$  : il suffit de connaître celle de  $X$ .

---

**Exercice 14.24**

Soient  $p \in ]0 ; 1[$  et  $X \sim \mathcal{G}(p)$ .

Calculez  $\mathbb{E}(e^{-X})$ .

Enfin, un petit résultat utile.

---

**Proposition 14.25**

Soit  $X$  une variable aléatoire discrète à valeurs dans  $\mathbb{N}$ .

$$\text{On a } \mathbb{E}(X) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(X \geq n).$$

## 14.2.4 Inégalité de Markov

---

**Proposition 14.26**

Soit  $X$  une variable aléatoire discrète réelle positive admettant une espérance finie.

On a

$$\forall a > 0, \quad \mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}(X)}{a}.$$

Cette inégalité n'a d'intérêt que pour  $a > \mathbb{E}(X)$ , sinon on majore une probabilité par un nombre plus grand que 1.

Il arrive souvent qu'on ne sache pas calculer explicitement la loi d'une variable aléatoire, mais qu'on arrive à calculer son espérance (par exemple comme somme de variables aléatoires simples). Les inégalités de ce type permettent quand même parfois d'obtenir des résultats à propos des probabilités de certains événements.

---

**Corollaire 14.27**

Soit  $X$  une variable aléatoire discrète complexe admettant une espérance finie.

On a

$$\forall a > 0, \quad \mathbb{P}(|X| \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}(|X|)}{a}.$$

## 14.3 Variance d'une variable réelle

### 14.3.1 Moments d'ordre 2

---

**Proposition 14.28**

Soit  $X$  une variable aléatoire discrète réelle.

Si  $X^2$  possède une espérance finie (on dit aussi que  $X$  possède un moment d'ordre 2), alors  $X$  possède une espérance finie.

Dans ce cas, pour tout  $a \in \mathbb{R}$ ,  $(X + a)^2$  possède une espérance finie.

On note  $L^2$  l'ensemble des variables aléatoires discrètes réelles  $X$  telles que  $X^2$  est d'espérance finie, i.e.  $\mathbb{E}(X^2) < +\infty$ .



---

**Proposition 14.29**

Soient  $X, Y \in L^2$ .

On a  $XY \in L^1$  et  $\mathbb{E}(XY)^2 \leq \mathbb{E}(X^2) \mathbb{E}(Y^2)$ .

Il s'agit bien sûr de l'inégalité de Cauchy-Schwarz.

### 14.3.2 Variance et écart-type

---

**Définition 14.30**

Soit  $X$  une variable aléatoire discrète réelle telle que  $X \in L^2$ .

On appelle variance de  $X$  le nombre  $\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}\left((X - \mathbb{E}(X))^2\right)$ .

On appelle écart-type de  $X$  le réel  $\sigma(X) = \sqrt{\mathbb{V}(X)}$ .

La variance (ou l'écart-type) mesure la dispersion de  $X$  autour de sa moyenne. Une variable de variance 1 est dite réduite.

---

**Proposition 14.31**

Soit  $X$  une variable aléatoire discrète réelle telle que  $X \in L^2$ .

On a  $\mathbb{V}(X) = 0$  ssi  $X$  est presque sûrement constante.

En général, on calcule la variance par la formule suivante.

---

**Proposition 14.32 (Formule de Huyghens)**

Soit  $X$  une variable aléatoire discrète réelle telle que  $X \in L^2$ . On a

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2.$$

---

**Exercice 14.33**

Calculez la variance d'une variable suivant une loi géométrique de paramètre  $p \in ]0 ; 1[$ .

---

**Proposition 14.34**

Soient  $X$  une variable aléatoire discrète réelle telle que  $X \in L^2$  et  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ .

On a  $aX + b \in L^2$  et  $\mathbb{V}(aX + b) = a^2 \mathbb{V}(X)$ .

---

**Remarque 14.35**

Si  $X$  est une variable aléatoire discrète réelle d'espérance  $m$  et de variance  $v$ , on pose  $X' = \frac{1}{\sqrt{v}}(X - m)$ .

$X'$  est alors une variable aléatoire discrète réelle centrée dont la variance vaut 1 : on l'appelle la variable aléatoire discrète réelle centrée réduite associée à  $X$ .

### 14.3.3 Inégalité de Bienaymé-Tchebychev

---

#### Proposition 14.36

Soit  $X$  une variable aléatoire discrète réelle possédant un moment d'ordre 2. On a

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{\mathbb{V}(X)}{\varepsilon^2}.$$

La même remarque que pour l'inégalité de Markov s'applique : cette inégalité n'a d'intérêt que pour des valeurs assez grandes de  $\varepsilon$ , sinon on majore une probabilité par 1.

---

#### Exercice 14.37

On lance  $n$  fois un dé à six faces.

Comment choisir  $n$  pour que la probabilité d'obtenir moins d'une fois sur deux le nombre 6 soit au moins égale à  $\frac{3}{4}$  ?

### 14.3.4 Généralisation

---

#### Définition 14.38

Soient  $X$  une variable aléatoire discrète réelle et  $k \in \mathbb{N}^*$ .

On dit que  $X$  admet un moment d'ordre  $k$  quand  $X^k$  a une espérance finie.

---

#### Proposition 14.39

Soient  $X$  une variable aléatoire discrète réelle et  $k \in \mathbb{N}^*$ .

Si  $X$  possède un moment d'ordre  $k$ , alors pour tout  $\ell \in \llbracket 1 ; k \rrbracket$ ,  $X$  possède un moment d'ordre  $\ell$ .

## 14.4 Lois classiques

### 14.4.1 Loi uniforme

---

#### Définition 14.40

Soit  $L$  un ensemble fini non-vide.

On dit qu'une variable aléatoire  $X$  suit la loi uniforme sur  $L$  quand  $X(\Omega) = L$  et  $\mathbb{P}_X$  est la probabilité uniforme sur  $L$ , autrement dit si pour tout  $x \in L$ ,  $\mathbb{P}(X = x) = \frac{1}{\text{Card } L}$ .

On note alors  $X \sim \mathcal{U}(L)$ .

Le cas le plus courant est celui des variables à valeurs entières.

---

**Définition 14.41**

Soit  $(a, b) \in \mathbb{N}^2$  tel que  $a \leq b$ .

On dit qu'une variable aléatoire suit la loi uniforme sur  $\llbracket a ; b \rrbracket$  quand  $X(\Omega) = \llbracket a ; b \rrbracket$  et  $\mathbb{P}_X$  est la probabilité uniforme sur  $\llbracket a ; b \rrbracket$ , i.e. si pour tout  $k \in \llbracket a ; b \rrbracket$ ,  $\mathbb{P}(X = k) = \frac{1}{b - a + 1}$ .

On note alors  $X \sim \mathcal{U}(\llbracket a ; b \rrbracket)$ .

Dans ce cas, on a  $\mathbb{E}(X) = \frac{a+b}{2}$  et  $\mathbb{V}(X) = \frac{(b-a)(b-a+1)}{12}$ .

Souvent, on a  $a = 1$  et  $b = n$  donc, dans ce cas, on a  $\mathbb{E}(X) = \frac{n+1}{2}$  et  $\mathbb{V}(X) = \frac{n^2-1}{12}$ .

---

*Exemple 14.42*

Si on note  $X$  le nombre obtenu après un lancer d'un dé non-truqué,  $X$  suit la loi uniforme sur  $\llbracket 1 ; 6 \rrbracket$ .

## 14.4.2 Loi de Bernoulli

---

**Définition 14.43**

Soit  $p \in [0 ; 1]$ .

On dit qu'une variable aléatoire  $X$  suit la loi de Bernoulli de paramètre  $p$  quand  $X(\Omega) \subseteq \{0, 1\}$  et  $\mathbb{P}(X = 1) = p$ .

On note alors  $X \sim \mathcal{B}(p)$ .

Dans ce cas, on note souvent  $q = 1 - p$  et on a  $\mathbb{E}(X) = p$  et  $\mathbb{V}(X) = pq$ .

---

*Exemple 14.44*

- Toute expérience aléatoire à deux issues peut être représentée par une variable de Bernoulli en notant 0 et 1 les deux issues. Le cas typique est le lancer d'une pièce (équilibrée si  $p = 1/2$ , non-équilibrée sinon).
- En particulier, toute expérience dont seul la réussite ou l'échec importe peut être représentée par une variable de Bernoulli : 1 représente la réussite, 0 l'échec.

## 14.4.3 Loi binomiale

---

**Définition 14.45**

Soit  $p \in [0 ; 1]$ .

On dit qu'une variable aléatoire  $X$  suit la loi binomiale de paramètre  $(n, p)$  quand  $X(\Omega) \subseteq \llbracket 0 ; n \rrbracket$  et pour tout  $k \in \llbracket 0 ; n \rrbracket$ ,  $\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$ .

On note alors  $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ .

En notant  $q = 1 - p$ , on a  $\mathbb{E}(X) = np$  et  $\mathbb{V}(X) = npq$ .

---

**Proposition 14.46**

*On considère une suite de  $n$  expériences aléatoires indépendantes qui suivent une loi de Bernoulli de même paramètre  $p$ .*

*On note  $X$  le nombre de réussites dans cette répétition d'expériences, appelée schéma de Bernoulli.*

*Alors  $X$  suit la loi binomiale de paramètre  $(n, p)$ .*

---

**Exemple 14.47**

- ▷ On lance  $n$  fois une pièce dont la probabilité de tomber sur pile vaut  $p$ . Alors si  $X$  est le nombre de fois où on tombe sur pile, on a  $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ .
- ▷ On fait  $n$  tirages successifs avec remise dans une urne contenant une proportion  $p$  de boules blanches. Le nombre de boules blanches tirées suit la loi binomiale de paramètre  $(n, p)$ .

## 14.4.4 Loi géométrique

---

**Définition 14.48**

Soit  $p \in ]0 ; 1[$ .

On dit qu'une variable aléatoire  $X$  suit la loi géométrique de paramètre  $p$  quand  $X(\Omega) \subseteq \mathbb{N}^* \cup \{+\infty\}$  et pour tout  $k \in \mathbb{N}^* \cup \{+\infty\}$ ,  $\mathbb{P}(X = k) = (1 - p)^{k-1} p$ .

On note alors  $X \sim \mathcal{G}(p)$ .

En notant  $q = 1 - p$ , on a  $\mathbb{P}(X = +\infty) = 0$ ,  $\mathbb{E}(X) = \frac{1}{p}$  et  $\mathbb{V}(X) = \frac{q}{p^2}$ .

---

**Proposition 14.49**

*La loi géométrique de paramètre  $p$  est la loi du rang du premier succès dans un schéma de Bernoulli infini de paramètre  $p$ .*

---

*Exemple 14.50*

- ▶ On lance une pièce dont la probabilité de tomber sur pile vaut  $p$ . Alors si  $X$  est le premier rang pour lequel le lancer donne pile, on a  $X \sim \mathcal{G}(p)$ .
- ▶ On fait des tirages successifs avec remise dans une urne contenant une proportion  $p$  de boules blanches. Le premier rang où on tire une boule blanche suit la loi géométrique de paramètre  $p$ .

## 14.4.5 Loi de Poisson

---

**Définition 14.51**

Soit  $\lambda > 0$ .

On dit qu'une variable aléatoire  $X$  suit la loi de Poisson de paramètre  $\lambda$  quand  $X(\Omega) = \mathbb{N}$  et pour tout  $k \in \mathbb{N}$ ,  $\mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$ .

On note alors  $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$ .

On a  $\mathbb{E}(X) = \lambda$  et  $\mathbb{V}(X) = \lambda$ .

La loi de Poisson est la loi qui compte le nombre d'événements dans un intervalle de temps fixé, quand ces événements se produisent à une certaine fréquence connue et indépendamment du temps écoulé depuis le précédent. Le paramètre  $\lambda$  est alors le nombre moyen d'événements se produisant durant la durée fixée et  $X$  compte le nombre d'événements qui se sont effectivement produits durant la durée fixée.

Par exemple, si des statistiques montrent que le passage à une borne de péage se fait à une fréquence de  $f$  véhicules par heure, alors on choisit souvent la loi de Poisson  $\mathcal{P}(f \times h)$  pour compter le nombre de véhicules qui passent dans une durée de  $h$  heures :  $\mathbb{P}(X = k) = e^{-fh} \frac{(fh)^k}{k!}$  est la probabilité pour que sur un intervalle de temps de  $h$  heures,  $k$  voitures soient effectivement passées à la borne.

Souvent, la fréquence  $f$  est faible : on utilise cette loi pour l'étude des événements dits « rares ».

## 14.5 Couples de variables aléatoires

### 14.5.1 Généralités

---

**Définition 14.52**

Soient  $X$  et  $Y$  deux variables aléatoires discrètes.

La fonction  $\omega \mapsto (X(\omega), Y(\omega))$  est appelée couple de variables aléatoires.

Si  $X$  et  $Y$  sont réelles, le couple est dit couple de variables aléatoires discrètes réelles.

On peut reprendre le même schéma de présentation que pour une seule variable aléatoire discrète.

---

**Proposition 14.53**

Soit  $(X, Y)$  un couple de variables aléatoires discrètes.

La famille d'événements  $(\{X = x\} \cap \{Y = y\})_{(x,y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)}$  est un système quasi-complet d'événements appelé système quasi-complet d'événements associé au couple  $(X, Y)$ .

La probabilité  $\mathbb{P}(\{X = x\} \cap \{Y = y\})$  est souvent notée  $\mathbb{P}(X = x, Y = y)$ .

---

**Définition 14.54**

Soient  $X$  et  $Y$  deux variables aléatoires discrètes.

La loi conjointe de  $X$  et  $Y$  est la loi du couple  $(X, Y)$ .

Dans le cas d'un univers fini, on la représente souvent par un tableau à double entrée : si  $X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_m\}$  et  $Y(\Omega) = \{y_1, \dots, y_n\}$ , alors on place  $\mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j)$  sur la  $i$ -ème ligne et la  $j$ -ème colonne.

## 14.5.2 Lois marginales

---

**Définition 14.55**

Soient  $X$  et  $Y$  deux variables aléatoires discrètes.

Les lois marginales du couple  $(X, Y)$  sont les lois de  $X$  et de  $Y$ .

---

**Proposition 14.56**

Soient  $X$  et  $Y$  deux variables aléatoires discrètes. On a :

- ▷ pour tout  $x \in X(\Omega)$ ,  $\mathbb{P}(X = x) = \sum_{y \in Y(\Omega)} \mathbb{P}(X = x, Y = y)$
- ▷ pour tout  $y \in Y(\Omega)$ ,  $\mathbb{P}(Y = y) = \sum_{x \in X(\Omega)} \mathbb{P}(X = x, Y = y)$ .

Si on a représenté la loi conjointe de  $(X, Y)$  sous forme d'un tableau, on obtient les lois marginales en additionnant les probabilités sur chaque ligne ou chaque colonne (d'où le nom « lois marginales » : celles qu'on note en marge du tableau).

---

**Exercice 14.57**

Une urne contient  $n$  boules numérotées de 1 à  $n$ .

On tire une boule avec remise et on note  $X$  le numéro de la boule.

Puis, on tire  $X$  boules et on note  $Y$  le maximum des numéros des boules tirées.

Déterminez la loi de  $X$  et la loi conjointe de  $(X, Y)$ , déduisez-en la loi de  $Y$ .

---

*Remarque 14.58*

La loi d'une variable aléatoire ne peut pas dépendre d'une autre variable aléatoire !

Écrire par exemple que  $Y(\Omega) = \llbracket X ; n \rrbracket$  dans l'exercice précédent est un non-sens car  $X$  n'est pas un nombre mais une variable aléatoire (*i.e.* une fonction!).

Écrire  $Y(\Omega) = \llbracket i ; n \rrbracket$  où  $i$  est la valeur de  $X$  après le premier tirage est tout aussi absurde !

Il faut imaginer que l'expérience a lieu dans un lieu qui vous est caché et que l'opérateur ne vous donne que la valeur de  $Y$ . On laisse l'opérateur répéter son expérience un grand nombre de fois et on attend qu'il vous donne les valeurs de  $Y$  pour chacune des expériences. Qu'allez-vous obtenir ? Toutes les valeurs possibles de  $Y$ , qui peut varier de 1 à  $n$ . Certainement pas quelque chose qui dépend de  $X$ , puisque vous ne savez même pas quelle expérience réelle a lieu dans le lieu caché : pour vous, observateur extérieur,  $X$  n'existe pas.

### 14.5.3 Lois conditionnelles

---

**Définition 14.59**

Soient  $X$  et  $Y$  deux variables aléatoires discrètes.

Pour tout  $y \in Y(\Omega)$  tel que  $\mathbb{P}(Y = y) \neq 0$ , la loi de  $X$  sachant  $(Y = y)$  est la loi de  $X$  dans l'espace probabilisé  $(\Omega, \mathbb{P}_{(Y=y)})$  :

$$\forall x \in X(\Omega), \quad \mathbb{P}_{(Y=y)}(X = x) = \frac{\mathbb{P}(X = x, Y = y)}{\mathbb{P}(Y = y)}.$$

On déduit de toutes les définitions précédentes les relations suivantes.

---

**Proposition 14.60**

Soient  $X$  et  $Y$  deux variables aléatoires discrètes.

On suppose que pour tout  $(x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)$ ,  $\mathbb{P}(X = x) \neq 0$  et  $\mathbb{P}(Y = y) \neq 0$ .

Pour tout  $(x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)$ , on a :

$$\triangleright \mathbb{P}(X = x, Y = y) = \mathbb{P}(Y = y) \times \mathbb{P}_{(Y=y)}(X = x) = \mathbb{P}(X = x) \times \mathbb{P}_{(X=x)}(Y = y)$$

$$\triangleright \mathbb{P}(X = x) = \sum_{y \in Y(\Omega)} \mathbb{P}(Y = y) \times \mathbb{P}_{(Y=y)}(X = x)$$

$$\triangleright \mathbb{P}(Y = y) = \sum_{x \in X(\Omega)} \mathbb{P}(X = x) \times \mathbb{P}_{(X=x)}(Y = y).$$

## 14.5.4 Covariance

---

### Définition 14.61

Soient  $X$  et  $Y$  deux variables aléatoires discrètes réelles ayant une variance finie.

On appelle covariance du couple  $(X, Y)$  le nombre

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))(Y - \mathbb{E}(Y))).$$

Si, de plus,  $\mathbb{V}(X)$  et  $\mathbb{V}(Y)$  sont non-nulles, on appelle coefficient de corrélation du couple  $(X, Y)$  le nombre

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)}.$$

Comme pour la variance, on a une expression plus simple.

---

### Proposition 14.62

*Avec les mêmes hypothèses :*

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y).$$

L'application  $\text{Cov}$  a des propriétés classiques de bilinéarité.

---

### Proposition 14.63

*Cov est une application bilinéaire.*

*De plus, pour tout couple de variables aléatoires discrètes réelles  $(X, Y)$  ayant une variance finie, on a*

$$\mathbb{V}(X + Y) = \mathbb{V}(X) + \mathbb{V}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y).$$

---

### Proposition 14.64 (Inégalité de Cauchy-Schwarz)

*Pour tout couple de variables aléatoires discrètes réelles  $(X, Y)$  ayant une variance finie, on a*

$$|\text{Cov}(X, Y)| \leq \sigma(X)\sigma(Y).$$

*Si, de plus,  $\sigma(X)$  et  $\sigma(Y)$  sont non-nuls, on a  $\rho(X, Y) \in [-1; 1]$  et  $|\rho(X, Y)| = 1$  ssi il existe  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$  tel que  $Y = aX + b$  presque sûrement.*



## 14.6 Indépendance de variables aléatoires

### 14.6.1 Généralités

---

**Définition 14.65**

Soient  $X$  et  $Y$  deux variables aléatoires discrètes.

On dit que  $X$  et  $Y$  sont indépendantes quand pour toute partie  $A$  de  $X(\Omega)$  et toute partie  $B$  de  $Y(\Omega)$ , les événements  $\{X \in A\}$  et  $\{Y \in B\}$  sont indépendants, *i.e.* quand

$$\mathbb{P}(X \in A, Y \in B) = \mathbb{P}(X \in A) \times \mathbb{P}(Y \in B).$$

Dans ce cas, on note  $X \perp Y$  pour signaler que  $X$  et  $Y$  sont indépendantes.

On peut se restreindre aux événements des systèmes quasi-complets d'événements associés à  $X$  et  $Y$  (résultat admis).

---

**Proposition 14.66**

Soient  $X$  et  $Y$  deux variables aléatoires discrètes.

$X$  et  $Y$  sont indépendantes ssi pour tout  $(x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)$ , les événements  $\{X = x\}$  et  $\{Y = y\}$  sont indépendants, *i.e.* si

$$\mathbb{P}(X = x, Y = y) = \mathbb{P}(X = x) \times \mathbb{P}(Y = y).$$

---

*Remarque 14.67*

En général, la connaissance des lois marginales de  $(X, Y)$  ne permet pas de retrouver la loi conjointe de  $(X, Y)$ .

Dans le cas où les variables aléatoires  $X$  et  $Y$  sont indépendantes, c'est possible.

Donc pour montrer que deux variables  $X$  et  $Y$  ne sont pas indépendantes, il suffit de trouver deux valeurs  $x, y$  de  $X, Y$  respectivement telles que  $\mathbb{P}(X = x, Y = y) \neq \mathbb{P}(X = x) \times \mathbb{P}(Y = y)$ .

On a un résultat sur les composées de variables indépendantes.

---

**Proposition 14.68**

Soient  $X$  et  $Y$  deux variables aléatoires discrètes.

Si  $X$  et  $Y$  sont indépendantes, alors pour toute fonction  $f$  définie sur  $X(\Omega)$  et toute fonction  $g$  définie sur  $Y(\Omega)$ , les variables aléatoires  $f(X)$  et  $g(Y)$  sont indépendantes.

## 14.6.2 Espérance et indépendance

On a un résultat remarquable sur les espérances de variables aléatoires discrètes indépendantes (résultat admis).

---

### Proposition 14.69

Soient  $X$  et  $Y$  deux variables aléatoires discrètes.

Si  $X$  et  $Y$  sont indépendantes, alors on a :

$$\triangleright \mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X) \mathbb{E}(Y)$$

et dans le cas de variables réelles :

$$\triangleright \text{Cov}(X, Y) = 0$$

$$\triangleright \mathbb{V}(X + Y) = \mathbb{V}(X) + \mathbb{V}(Y).$$

---

### Remarque 14.70

La réciproque est fausse.

Deux variables aléatoires discrètes réelles de covariance nulle sont dites non-corrélées, mais c'est un renseignement très faible sur les variables, à la différence de l'indépendance, qui est une contrainte extrêmement forte.

## 14.6.3 Généralisation

Tous les résultats sont admis.

---

### Définition 14.71

Soit  $(X_i)_{i \in I}$  une famille finie ou dénombrable de variables aléatoires discrètes.

On dit que les variables aléatoires  $(X_i)_{i \in I}$  sont mutuellement indépendantes quand pour toute partie finie  $J \subseteq I$ , pour toute famille de parties  $(A_j)_{j \in J}$  de  $\prod_{j \in J} \mathcal{P}(X_j(\Omega))$ , les événements  $(\{X_j \in A_j\})_{j \in J}$  sont indépendants.

On retrouve la même caractérisation à l'aide des événements des systèmes quasi-complets d'événements associés aux différentes variables aléatoires et on peut même faire plus simple.

---

**Proposition 14.72**

Soit  $(X_i)_{i \in I}$  une famille finie ou dénombrable de variables aléatoires discrètes.

Les variables aléatoires  $(X_i)_{i \in I}$  sont mutuellement indépendantes quand pour toute partie finie  $J \subseteq I$ , pour toute famille  $(x_j)_{j \in J}$  de  $\prod_{j \in J} X_j(\Omega)$ , on a

$$\mathbb{P} \left( \bigcap_{j \in J} \{X_j = x_j\} \right) = \prod_{j \in J} \mathbb{P}(X_j = x_j).$$

---

**Exercice 14.73**

Soient  $(X_1, X_2)$  et  $(Y_1, Y_2)$  deux couples de variables indépendantes telles que pour tout  $i \in \{1, 2\}$ ,  $X_i \sim Y_i$ .

Montrez que  $X_1 + X_2 \sim Y_1 + Y_2$ .

Le résultat est-il encore valable en supprimant l'hypothèse d'indépendance ?

Enfin, un petit lemme classique : le lemme des coalitions.

---

**Proposition 14.74**

Soit  $(X_i)_{i \in I}$  une famille finie de variables aléatoires discrètes réelles indépendantes.

Soient  $J, K$  deux parties de  $I$  non-vides et disjointes,  $f$  une fonction de  $\mathbb{R}^{\text{Card } J}$  dans  $\mathbb{R}$  et  $g$  une fonction de  $\mathbb{R}^{\text{Card } K}$  dans  $\mathbb{R}$ .

Alors les deux variables aléatoires discrètes réelles  $f(X_j, j \in J)$  et  $g(X_k, k \in K)$  sont indépendantes.

En clair, si on partage des variables aléatoires discrètes réelles indépendantes en deux sous-ensembles n'ayant aucune variable en commun, alors n'importe quoi qui dépend uniquement des variables du premier ensemble est indépendant de n'importe quoi qui dépend uniquement des variables du deuxième ensemble.

Le résultat se généralise à toute famille dénombrable de variables aléatoires discrètes réelles indépendantes, puisque la définition même de l'indépendance impose de ne considérer que des sous-familles finies.

---

*Exemple 14.75*

Un cas très courant : si  $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est une famille de variables aléatoires discrètes réelles indépendantes, alors :

▷ pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $\sum_{k=0}^n X_k$  est indépendante de  $X_{n+1}$

▷ pour tout  $(n, p) \in \mathbb{N}^2$  tel que  $n < p$ ,  $\sum_{k=0}^n X_k$  est indépendante de  $\sum_{k=n+1}^p X_k$ .

On en déduit la généralisation du résultat sur les variances.

---

**Proposition 14.76**

*Soient  $X_1, \dots, X_n$  des variables aléatoires discrètes réelles indépendantes.*

*On a  $\mathbb{V}(X_1 + \dots + X_n) = \mathbb{V}(X_1) + \dots + \mathbb{V}(X_n)$ .*

### 14.6.4 Théorème de réalisation

Le théorème de Kolmogorov est un théorème de réalisation sur les familles de variables aléatoires indépendantes (admis et jamais utilisé en pratique).

---

**Théorème 14.77**

*Soit  $(\mathcal{L}_i)_{i \in I}$  une famille finie ou dénombrable de lois de probabilités.*

*Il existe un espace probabilisé  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  et des variables aléatoires  $(X_i)_{i \in I}$  indépendantes telles que pour tout  $i \in I$ ,  $X_i \sim \mathcal{L}_i$ .*

Un cas particulier très courant.

---

**Définition 14.78**

On dit qu'une famille finie ou dénombrable de variables aléatoires discrètes est identiquement distribuée quand toutes les variables aléatoires suivent la même loi.

---

**Théorème 14.79**

*Soit  $\mathcal{L}$  une loi de probabilités.*

*Il existe un espace probabilisé  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  et des variables aléatoires  $(X_i)_{i \in I}$  indépendantes et identiquement distribuées qui suivent la loi  $\mathcal{L}$ .*

Dans ce cas, on voit parfois écrit que la famille de variables aléatoires discrètes est une famille de variables indépendantes identiquement distribuées.

L'exemple typique est l'étude des suites infinies de lancers d'une pièce : on modélise cette expérience aléatoire par une suite de variables de Bernoulli indépendantes identiquement distribuées de même paramètre  $p$ .

### 14.6.5 Somme de variables indépendantes identiquement distribuées

Plusieurs résultats classiques.

---

**Proposition 14.80**

Soient  $X_1, \dots, X_n$  des variables aléatoires réelles.

Si ces  $n$  variables aléatoires sont mutuellement indépendantes et suivent la même loi de Bernoulli de paramètre  $p$ , alors la somme  $X_1 + \dots + X_n$  suit la loi binomiale de paramètre  $(n, p)$ .

---

**Proposition 14.81**

Soient  $X, Y$  deux variables aléatoires réelles indépendantes suivant une loi de Poisson de paramètres  $\lambda > 0$  et  $\mu > 0$ .

Alors  $X + Y$  suit une loi de Poisson de paramètre  $\lambda + \mu$ .

## 14.7 Loi faible des grands nombres

---

**Proposition 14.82**

Soit  $(X_n)_{n \geq 1}$  une suite de variables aléatoires discrètes réelles indépendantes identiquement distribuées admettant une variance finie.

En posant  $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$ ,  $m = \mathbb{E}(X_1)$  et  $\sigma^2 = \mathbb{V}(X_1)$ , on a

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \mathbb{P} \left( \left| \frac{S_n}{n} - m \right| \geq \varepsilon \right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Plus précisément, on a

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \mathbb{P} \left( \left| \frac{S_n}{n} - m \right| \geq \varepsilon \right) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}.$$

## 14.8 Fonction génératrice d'une variable aléatoire à valeurs entières

### 14.8.1 Généralités

---

**Définition 14.83**

Soit  $X$  une variable aléatoire discrète à valeurs dans  $\mathbb{N} \cup \{+\infty\}$ .

On appelle série génératrice de  $X$  la série entière  $\sum_{n \geq 0} \mathbb{P}(X = n) z^n$ .

Quand cette série converge, on appelle  $G_X(z)$  sa somme : la fonction  $z \mapsto G_X(z)$  est appelée fonction génératrice de  $X$ .

On peut écrire sa somme comme une espérance :  $G_X(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} z^n \mathbb{P}(X = n) = \mathbb{E}(z^X)$ , à condition que la série  $\sum_{n \geq 0} \mathbb{P}(X = n) z^n$  converge absolument.

---

**Proposition 14.84**

*La série génératrice d'une variable aléatoire  $X$  à valeurs dans  $\mathbb{N} \cup \{+\infty\}$  est de rayon de convergence au moins 1 et converge normalement sur  $[0 ; 1]$ .*

*La fonction  $G_X$  est donc continue sur  $[0 ; 1]$ .*

*De plus, on a  $G_X(1) = \mathbb{P}(X \neq +\infty) = 1 - \mathbb{P}(X = +\infty)$ .*

---

**Exercice 14.85**

Déterminez la fonction génératrice associée à une variable de Bernoulli.

---

**Exercice 14.86**

Même question avec une variable qui suit une loi binomiale.

---

**Exercice 14.87**

Même question avec une variable qui suit une loi uniforme sur  $\llbracket 1 ; n \rrbracket$ .

---

**Exercice 14.88**

Même question avec une variable qui suit une loi géométrique.

---

**Exercice 14.89**

Même question avec une variable qui suit une loi de Poisson.

---

La fonction génératrice caractérise parfaitement la variable aléatoire.

---

**Proposition 14.90**

*Soient  $X, Y$  deux variables aléatoires discrètes à valeurs dans  $\mathbb{N} \cup \{+\infty\}$ .*

*Si  $G_X = G_Y$  sur un intervalle  $[0 ; \alpha]$  où  $\alpha > 0$ , alors  $X \sim Y$ .*

## 14.8.2 Lien entre espérance et fonction génératrice

Quand  $\mathbb{P}(X = +\infty) = 0$ , on dit que la variable est presque sûrement à valeurs dans  $\mathbb{N}$  (exemple typique : les variables suivant des lois géométriques). C'est évidemment le cas quand  $X$  est à valeurs dans  $\mathbb{N}$ .

---

### **Théorème 14.91**

*Soit  $X$  une variable aléatoire discrète presque sûrement à valeurs dans  $\mathbb{N}$ .*

*$X$  admet une espérance finie ssi  $G_X$  est dérivable en 1 et, dans ce cas,  $\mathbb{E}(X) = G'_X(1)$ .*

*$X$  admet une variance finie ssi  $G_X$  est deux fois dérivable en 1 et, dans ce cas,  $\mathbb{E}(X(X-1)) = G''_X(1)$ .*

Quand  $\mathbb{P}(X = +\infty) > 0$ ,  $X$  n'est pas d'espérance finie (on a  $\mathbb{E}(X) = +\infty$  dans ce cas).

## 14.8.3 Fonction génératrice d'une somme de variables indépendantes

### **Proposition 14.92**

*Soient  $X, Y$  deux variables aléatoires discrètes à valeurs dans  $\mathbb{N} \cup \{+\infty\}$ .*

*Si  $X$  et  $Y$  sont indépendantes, alors  $G_{X+Y} = G_X G_Y$ .*

Plus généralement, si  $X_1, \dots, X_n$  sont indépendantes, alors  $G_{X_1+\dots+X_n} = \prod_{k=1}^n G_{X_k}$ .

---

### *Exemple 14.93*

Si  $X$  et  $Y$  sont indépendantes et suivent des lois de Poisson de paramètres  $\lambda > 0$  et  $\mu > 0$ , alors  $X+Y$  suit la loi de Poisson de paramètre  $\lambda + \mu$ .

# Chapitre 15

## Équations différentielles linéaires

### Sommaire

---

<b>15.1</b>	<b>Équations et systèmes différentiels linéaires du premier ordre . . .</b>	<b>174</b>
15.1.1	Généralités . . . . .	174
15.1.2	Problème de Cauchy . . . . .	176
15.1.3	Équation différentielle linéaire homogène . . . . .	177
15.1.4	Cas général . . . . .	178
<b>15.2</b>	<b>Exponentielle d'un endomorphisme, d'une matrice . . . . .</b>	<b>178</b>
15.2.1	Définition . . . . .	178
15.2.2	Propriétés algébriques . . . . .	179
15.2.3	Propriétés fonctionnelles . . . . .	180
<b>15.3</b>	<b>Équations linéaires homogènes à coefficients constants . . . . .</b>	<b>180</b>
15.3.1	Forme générale de la solution . . . . .	180
15.3.2	Cas praticable . . . . .	180
<b>15.4</b>	<b>Équations différentielles linéaires scalaires d'ordre <math>n</math> . . . . .</b>	<b>181</b>
15.4.1	Généralités . . . . .	181
15.4.2	Représentation matricielle . . . . .	182
15.4.3	Équation différentielle linéaire homogène . . . . .	182
15.4.4	Cas général . . . . .	183
15.4.5	Diverses idées pour résoudre une équation différentielle linéaire d'ordre $n$ . .	184

---

Dans tout le cours,  $I$  désigne un intervalle de  $\mathbb{R}$  contenant au moins deux points,  $n$  désigne un entier naturel non-nul,  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ , et  $E$  est un espace vectoriel normé de dimension finie  $n$ .

Si  $f$  est un endomorphisme de  $E$  et  $v$  un vecteur de  $E$ , on note  $f.v$  l'image de  $v$  par  $f$ , au lieu de la traditionnelle notation  $f(v)$ . Sans cette notation, on rencontrerait des notations lourdes comme  $f(t)(v)$  ou  $f(t)(v(t))$ , qui seront donc avantageusement remplacées par  $f(t).v$  ou  $f(t).v(t)$ .

### 15.1 Équations et systèmes différentiels linéaires du premier ordre

#### 15.1.1 Généralités



---

**Définition 15.1**

On appelle équation différentielle linéaire (du premier ordre) toute équation différentielle de la forme

$$x' = a(t) \cdot x + b(t)$$

où

- ▷  $a$  est une fonction continue de  $I$  dans  $\mathcal{L}(E)$
- ▷  $b$  est une fonction continue de  $I$  dans  $E$  (appelée second membre)
- ▷  $x$  est la fonction inconnue dérivable de  $I$  dans  $E$  et  $x'$  sa dérivée.

---

**Définition 15.2**

Avec les notations précédentes, on appelle solution (sur  $I$ ) de l'équation différentielle toute application  $x$  dérivable sur  $I$  qui vérifie  $\forall t \in I, x'(t) = a(t) \cdot x(t) + b(t)$ .

---

*Remarque 15.3*

Si le second membre  $b$  peut s'écrire sous la forme  $b = b_1 + b_2$ , alors en additionnant les solutions de l'équation  $x' = a(t) \cdot x + b_1(t)$  avec celles de l'équation  $x' = a(t) \cdot x + b_2(t)$ , on obtient des solutions de  $x' = a(t) \cdot x + b(t)$ .

On appelle cette idée le principe de superposition.

Comme  $E$  est de dimension finie  $n$ , si on choisit une base  $\mathcal{B}$ , alors en exprimant les coordonnées des vecteurs et les matrices des endomorphismes dans la base  $\mathcal{B}$ , on obtient une traduction matricielle de l'équation différentielle précédente.

---

**Définition 15.4**

On appelle système différentiel linéaire (du premier ordre) toute équation différentielle de la forme

$$X' = A(t) X + B(t)$$

où

- ▷  $A$  est une fonction continue de  $I$  dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$
- ▷  $B$  est une fonction continue de  $I$  dans  $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) = \mathbb{K}^n$
- ▷  $X$  est la fonction inconnue dérivable de  $I$  dans  $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$  et  $X'$  sa dérivée.

---

**Exemple 15.5**

► Le système  $\begin{cases} x' = 2x + 3y \\ y' = -x + 4y \end{cases}$  est un système différentiel linéaire où  $A$  est la fonction constante égale à  $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$  et  $B = 0$ .

► Le système  $\begin{cases} x' = t^2x + e^t y + \sin t \\ y' = -tx + \cos(t) y - 1 \end{cases}$  est un système différentiel linéaire où  $A$  est la fonction  $t \mapsto \begin{pmatrix} t^2 & e^t \\ -t & \cos t \end{pmatrix}$  et  $B$  est la fonction  $t \mapsto \begin{pmatrix} \sin t \\ -1 \end{pmatrix}$ .

---

### Définition 15.6

Avec les notations précédentes, on appelle solution (sur  $I$ ) du système différentiel toute application  $X$  dérivable sur  $I$  qui vérifie  $\forall t \in I, X'(t) = A(t)X(t) + B(t)$ .

---

### Proposition 15.7

*Les solutions d'une telle équation différentielle ou d'un tel système différentiel linéaire sont au moins de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $I$ .*

---

À partir de maintenant, le cours portera sur les équations différentielles, mais tout ce qui est énoncé à leur propos est valable pour les systèmes différentiels.

## 15.1.2 Problème de Cauchy

---

### Définition 15.8

Soit  $(*) : x' = a(t) \cdot x + b(t)$  une équation différentielle linéaire qui respecte les conditions ci-dessus. On choisit un réel  $t_0 \in I$  et un vecteur  $v_0 \in E$ .

Le problème d'existence et d'unicité d'une solution de  $(*)$  qui satisfait la condition initiale  $x(t_0) = v_0$  est appelé un problème de Cauchy.

Le problème de Cauchy

$$(1) : \begin{cases} x' = a(t) \cdot x + b(t) \\ x(t_0) = v_0 \end{cases}$$

est équivalent au problème intégral

$$(2) : x(t) = \int_{t_0}^t (a(\tau) \cdot x(\tau) + b(\tau)) d\tau + v_0$$

*i.e.*  $x$  est solution de (1) ssi  $x$  est solution de (2).

### 15.1.3 Équation différentielle linéaire homogène

---

#### Définition 15.9

On appelle équation différentielle linéaire homogène (du premier ordre) toute équation différentielle de la forme

$$x' = a(t) \cdot x$$

où  $a$  est une fonction continue de  $I$  dans  $\mathcal{L}(E)$ .

Il y a un seul résultat à connaître sur de telles équations : le théorème de Cauchy-Lipschitz (ou théorème de Cauchy linéaire).

---

#### Théorème 15.10

*L'ensemble des solutions d'une équation différentielle linéaire homogène  $x' = a(t) \cdot x$  est un sous-espace vectoriel de dimension  $n$  de  $\mathcal{F}(I, \mathbb{K})$ .*

*Plus précisément, en notant  $S$  l'ensemble des solutions, pour tout  $t_0 \in I$ , l'application*

$$\begin{array}{ccc} S & \longrightarrow & E \\ x & \longmapsto & x(t_0) \end{array}$$

*est un isomorphisme.*

*Autrement dit, pour tout  $t_0 \in I$  et  $v_0 \in E$  (appelé vecteur des conditions initiales), il existe une unique solution telle que  $x(t_0) = v_0$ .*

La conjonction d'une équation différentielle linéaire homogène et d'une condition initiale s'appelle un problème de Cauchy linéaire.

Ce qui précède signifie que n'importe quel problème de Cauchy linéaire possède une unique solution.

Une base de l'ensemble des solutions est appelé un système fondamental de solutions.

---

#### Exercice 15.11

Montrez que les fonctions  $t \mapsto \begin{pmatrix} t \cos t \\ t \sin t \end{pmatrix}$  et  $t \mapsto \begin{pmatrix} -t \sin t \\ t \cos t \end{pmatrix}$  forment un système fondamental de solutions du système différentiel sur  $\mathbb{R}_+^*$  
$$\begin{cases} x' = \frac{1}{t}x - y \\ y' = x + \frac{1}{t}y \end{cases}$$

#### Exercice 15.12

Déterminez un système fondamental de solutions polynomiales du système différentiel 
$$\begin{cases} x' = \frac{t}{1+t^2}x + \frac{1}{1+t^2}y \\ y' = \frac{-1}{1+t^2}x + \frac{t}{1+t^2}y \end{cases}$$

## 15.1.4 Cas général

### Proposition 15.13

Soit  $x' = a(t)x + b(t)$  une équation différentielle linéaire sur  $I$ .

Si on connaît une solution  $p$  dite particulière de l'équation, alors on connaît la forme générale des solutions : elles sont toutes de la forme

$$t \mapsto g(t) + p(t)$$

où  $g$  est la solution générale de l'équation différentielle linéaire homogène associée.

Autrement dit, l'ensemble des solutions est un sous-espace affine de  $\mathcal{F}(I, \mathbb{K}) : p + S$  où  $S$  est l'ensemble des solutions de l'équation homogène associée.

Le théorème de Cauchy-Lipschitz est encore valable sous une forme amenuisée.

### Théorème 15.14

Pour tout  $t_0 \in I$  et  $v_0 \in E$ , il existe une unique solution telle que  $x(t_0) = v_0$ .

### Remarque 15.15

Il n'existe pas de méthode simple pour résoudre concrètement de telles équations différentielles linéaires, à part dans le cas où  $a$  est une constante.

## 15.2 Exponentielle d'un endomorphisme, d'une matrice

### 15.2.1 Définition

#### Proposition 15.16

Soit  $u \in \mathcal{L}(E)$ . La série  $\sum_{k \geq 0} \frac{u^k}{k!}$  converge absolument dans  $\mathcal{L}(E)$ .

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ . La série  $\sum_{k \geq 0} \frac{A^k}{k!}$  converge absolument dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

#### Définition 15.17

Avec les mêmes hypothèses, on pose

$$\exp(u) = e^u = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{u^k}{k!} \quad \text{et} \quad \exp(A) = e^A = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{A^k}{k!}.$$

Il est bien sûr évident que si  $u$  a pour matrice  $A$  dans une base  $\mathcal{B}$ , alors  $e^u$  a pour matrice  $e^A$  dans cette même base.

## 15.2.2 Propriétés algébriques

L'exponentielle d'endomorphismes ou de matrices a de nombreuses propriétés communes avec l'exponentielle de nombres, mais pas toutes, car les algèbres  $\mathcal{L}(E)$  et  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  ne sont pas commutatives.

---

### Proposition 15.18

Pour tout  $u \in \mathcal{L}(E)$ ,  $u$  et  $e^u$  commutent. De même avec les matrices.

---

### Proposition 15.19

Soient  $u, v$  deux endomorphismes de  $E$  qui commutent. On a  $e^{u+v} = e^u e^v = e^v e^u$ .

De même avec des matrices de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  qui commutent.

Attention ! Sans hypothèse de commutation, ce résultat est faux en général.

Une conséquence immédiate est que pour tout  $u \in \mathcal{L}(E)$ ,  $e^u$  est inversible (donc non nul) et son inverse est  $e^{-u}$ . De même pour les matrices.

Si  $A$  et  $B$  sont semblables, alors  $e^A$  et  $e^B$  le sont aussi avec la même matrice de passage : si  $B = PAP^{-1}$  alors  $e^B = Pe^A P^{-1}$ .

En général, il est difficile de calculer une exponentielle d'endomorphisme ou de matrice. Deux cas simples :

Dans le cas diagonalisable, c'est faisable, car l'exponentielle d'une matrice diagonale est très simple.

---

### Proposition 15.20

Soit  $A = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

On a  $e^A = \text{diag}(e^{\lambda_1}, \dots, e^{\lambda_n})$ .

Si une matrice  $A$  est nilpotente, alors son exponentielle est en fait un polynôme en  $A$ .

Dans le cas général, le calcul est souvent pénible. Néanmoins, on a quelques résultats généraux simples.

---

### Proposition 15.21

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  scindée.

On a  $\text{Sp}(e^A) = e^{\text{Sp}(A)}$ .

En particulier, on a  $\det e^A = e^{\text{tr} A}$ .

### 15.2.3 Propriétés fonctionnelles

La convergence absolue de la série définissant l'exponentielle entraîne quelques résultats simples à propos de la continuité et de la dérivabilité.

---

**Proposition 15.22**

*Les fonctions  $u \mapsto e^u$  et  $A \mapsto e^A$  sont continues sur  $\mathcal{L}(E)$  et  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  respectivement.*

---

**Proposition 15.23**

*Soit  $u \in \mathcal{L}(E)$ .*

*La fonction de variable réelle  $t \mapsto e^{tu}$  est dérivable et sa dérivée est  $t \mapsto ue^{tu} = ue^{tu}$ .*

## 15.3 Équations linéaires homogènes à coefficients constants

### 15.3.1 Forme générale de la solution

---

**Proposition 15.24**

*Soient  $a \in \mathcal{L}(E)$ ,  $t_0 \in I$  et  $v_0 \in E$ .*

*L'unique solution au problème de Cauchy  $\begin{cases} x' = a.x \\ x(t_0) = v_0 \end{cases}$  est la fonction  $t \mapsto e^{(t-t_0)a}.v_0$ .*

On a bien sûr l'équivalent matriciel.

---

**Proposition 15.25**

*Soient  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ,  $t_0 \in I$  et  $V_0 \in \mathbb{K}^n$ .*

*L'unique solution au problème de Cauchy  $\begin{cases} X' = AX \\ X(t_0) = V_0 \end{cases}$  est la fonction  $t \mapsto e^{(t-t_0)A}V_0$ .*

### 15.3.2 Cas praticable

---

**Proposition 15.26**

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

On suppose que  $A$  est diagonalisable : on note  $a_1, \dots, a_n$  les valeurs propres non-distinctes de  $A$  et  $(V_1, \dots, V_n)$  une base de l'espace  $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$  constituée de vecteurs propres associés.

Les solutions du système différentiel linéaire homogène  $X' = AX$  sont les fonctions

$$t \mapsto \sum_{i=1}^n \lambda_i e^{a_i t} V_i$$

où  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  sont des constantes dites d'intégration.

En pratique, on diagonalise la matrice  $A$  en donnant une matrice de passage  $P$  et une matrice diagonale  $D$  telles que  $A = PDP^{-1}$ , on pose  $X = PY$  et on résout le système différentiel  $Y' = DY$ , ce qui donne la forme générale de  $Y$  puis celle de  $X = PY$ . Ce qui est remarquable, c'est qu'il est inutile de calculer  $P^{-1}$ .

Quand la matrice  $A$  n'est pas diagonalisable mais seulement trigonalisable, alors en notant  $T$  une matrice triangulaire semblable à  $A$ , la même stratégie peut être appliquée, moyennant une résolution un peu plus difficile du système différentiel  $Y' = TY$ .

---

**Exercice 15.27**

Résoudre le système différentiel 
$$\begin{cases} x' = 2x + y - z \\ y' = x + 2y - z \\ z' = -x - y + 2z \end{cases}$$

---

**Exercice 15.28**

Résoudre le système différentiel 
$$\begin{cases} x' = -2x - y + 7z \\ y' = 5x + 4y - 8z \\ z' = x + y + z \end{cases}$$

Dans la suite, on s'intéresse à d'autres types d'équations différentielles linéaires, où les inconnues sont à valeurs réelles ou complexes.

## 15.4 Équations différentielles linéaires scalaires d'ordre $n$

### 15.4.1 Généralités

---

**Définition 15.29**

On appelle équation différentielle linéaire scalaire d'ordre  $n$  toute équation différentielle de la forme

$$y^{(n)} = a_{n-1}(t) y^{(n-1)} + \dots + a_1(t) y' + a_0(t) y + b(t)$$

où  $a_0, \dots, a_{n-1}, b$  sont  $n+1$  fonctions continues de  $I$  dans  $\mathbb{K}$  et  $y$  est la fonction inconnue de  $I$  dans  $\mathbb{K}$ .

---

**Définition 15.30**

Avec les notations précédentes, on appelle solution (sur  $I$ ) de l'équation différentielle toute application  $f$   $n$  fois dérivable sur  $I$  et telle que

$$\forall t \in I, \quad f^{(n)}(t) = a_{n-1}(t) f^{(n-1)}(t) + \cdots + a_1(t) f'(t) + a_0(t) f(t) + b(t).$$

---

**Exemple 15.31**

▷  $y'' - (t-1)y' + ty = 0$  a pour solution sur  $\mathbb{R}$  la fonction  $\exp$ .

▷  $y'' + \frac{1}{t}y' + 4t^2y = 1 + t^4$  a pour solution sur  $\mathbb{R}^*$  la fonction  $t \mapsto \cos(t^2) + \frac{t^2}{4}$ .

---

**Proposition 15.32**

Les solutions d'une telle équation différentielle linéaire sont au moins de classe  $\mathcal{C}^n$  sur  $I$ .

### 15.4.2 Représentation matricielle

On considère une équation différentielle linéaire scalaire d'ordre  $n$

$$(1) : y^{(n)} = a_{n-1}(t) y^{(n-1)} + \cdots + a_1(t) y' + a_0(t) y + b(t)$$

On pose  $X = \begin{pmatrix} y \\ y' \\ \vdots \\ y^{(n-1)} \end{pmatrix}$ ,  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-2} & a_{n-1} \end{pmatrix}$  et  $B = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ b \end{pmatrix}$ .

On définit ainsi trois fonctions vectorielles (matricielles)  $X \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{K}^n)$ ,  $A \in \mathcal{C}^0(I, \mathcal{M}_n(\mathbb{K}))$  et  $B \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{K}^n)$ .

L'équation (1) est alors équivalente au système différentiel  $X' = AX + B$ .

Par conséquent, tous les résultats précédents sont applicables dans ce cas particulier.

### 15.4.3 Équation différentielle linéaire homogène

---

**Définition 15.33**

On appelle équation différentielle linéaire scalaire homogène d'ordre  $n$  toute équation différentielle de la forme

$$y^{(n)} = a_{n-1}(t) y^{(n-1)} + \cdots + a_1(t) y' + a_0(t) y$$

où  $a_0, \dots, a_{n-1}$  sont  $n$  fonctions continues sur  $I$  à valeurs dans  $\mathbb{K}$  et  $y$  est la fonction inconnue de  $I$  dans  $\mathbb{K}$ .

Là encore, il y a un seul résultat à connaître sur de telles équations : le théorème de Cauchy-Lipschitz.



---

**Théorème 15.34**

*L'ensemble des solutions d'une équation différentielle linéaire scalaire homogène d'ordre  $n$  est un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension  $n$ .*

*Plus précisément, en notant  $S$  l'ensemble des solutions, pour tout  $t_0 \in I$ , l'application*

$$\begin{aligned} S &\longrightarrow \mathbb{K}^n \\ f &\longmapsto \left( f(t_0), f'(t_0), \dots, f^{(n-1)}(t_0) \right) \end{aligned}$$

*est un isomorphisme.*

*Autrement dit, pour tout  $t_0 \in I$  et  $(v_0, v_1, \dots, v_{n-1}) \in \mathbb{K}^n$  (appelé vecteur des conditions initiales), il existe une unique solution telle que pour tout  $k \in \llbracket 0 ; n-1 \rrbracket$ ,  $f^{(k)}(t_0) = v_k$ .*

Là encore, toute base de l'ensemble des solutions est appelée système fondamental de solutions. Il n'y a hélas pas de méthode générale pour en calculer concrètement.

### 15.4.4 Cas général

---

**Proposition 15.35**

*Soit*

$$(1) : y^{(n)} = a_{n-1}(t) y^{(n-1)} + \dots + a_1(t) y' + a_0(t) y + b(t)$$

*une équation différentielle linéaire scalaire d'ordre  $n$  sur l'intervalle  $I$ .*

*Si on connaît une solution  $p$  dite particulière de l'équation, alors on connaît la forme générale des solutions : elles sont de la forme*

$$t \longmapsto g(t) + p(t)$$

*où  $g$  est la solution générale de l'équation différentielle linéaire homogène associée.*

Le théorème de Cauchy-Lipschitz est encore valable sous une forme amenuisée.

---

**Théorème 15.36**

*Pour tout choix des conditions initiales  $(v_0, \dots, v_{n-1}) \in \mathbb{K}^n$ , le problème de Cauchy*

$$\left\{ \begin{array}{l} y^{(n)} = a_{n-1}(t) y^{(n-1)} + \dots + a_1(t) y' + a_0(t) y + b(t) \\ y(t_0) = v_0 \\ y'(t_0) = v_1 \\ \vdots \\ y^{(n-1)}(t_0) = v_{n-1} \end{array} \right.$$

*possède toujours une unique solution.*

---

**Remarque 15.37**

La recherche d'une solution particulière est un problème difficile. Sauf cas évidents, des indications seront données.

### 15.4.5 Diverses idées pour résoudre une équation différentielle linéaire d'ordre $n$

En pratique, on a souvent  $n = 2$ .

- ▶ Chercher des solutions sous une forme *a priori* raisonnable (polynomiale, exponentielle, etc.).
- ▶ Chercher des solutions développables en série entière.
- ▶ Faire un changement de variable ou un changement de fonction inconnue en suivant les indications de l'énoncé.
- ▶ Quand on connaît une solution non-nulle  $z$ , en chercher une autre sous la forme  $uz$  où  $u$  est une fonction inconnue à déterminer (c'est la méthode de variation de la constante!), qui transforme le problème différentiel d'ordre  $n$  en un problème d'ordre  $n - 1$  plus une intégration.

---

#### Exercice 15.38

Résolvez l'équation différentielle suivante sur  $\left]-\frac{1}{2}; +\infty\right[ : (2t + 1)y''(t) + (4t - 2)y'(t) - 8y(t) = 0$  en cherchant une solution polynomiale et une solution exponentielle.

---

#### Exercice 15.39

Même exercice sur  $\mathbb{R}_+^*$  avec :  $y''(t) + 2t(1+t)y'(t) - 2(1+t)y(t) = 0$  en cherchant une première solution de la forme  $t \mapsto t^\alpha$  où  $\alpha \in \mathbb{R}$ .

---

#### Exercice 15.40

Même exercice sur  $\mathbb{R}$  avec :  $(1 + t^2)y''(t) + 4ty'(t) + 2y(t) = 1$  en cherchant des solutions développables en série entière.

---

#### Exercice 15.41

Même exercice sur  $\mathbb{R}_+^*$  avec :  $t^2y''(t) + 4ty'(t) - (t^2 - 2)y(t) = e^t$  en effectuant le changement de fonction inconnue  $z(t) = t^2y(t)$ .

Dans le cas  $n = 2$ , pour trouver une solution particulière de l'équation  $y'' = a(t)y' + b(t)y + c(t)$ , si on connaît un système fondamental de solutions de l'équation homogène associée  $y'' = a(t)y' + b(t)y$ , alors on peut parfois réussir à trouver une solution particulière par variations des constantes : en notant  $(s_1, s_2)$  un système fondamental de solutions de l'équation homogène associée, on pose  $p = u_1s_1 + u_2s_2$  où  $u_1$  et  $u_2$  sont deux fonctions inconnues deux fois dérivables. Comme on a deux inconnues pour une seule équation, on impose une condition supplémentaire :  $u_1's_1 + u_2's_2 = 0$ , afin que la recherche de solutions particulières aboutisse au système suivant :

$$\begin{cases} u_1's_1 + u_2's_2 = 0 \\ u_1's_1' + u_2's_2' = c \end{cases}$$

Comme dans le cas de la méthode de variation de la constante vue en première année, la détermination explicite de  $u_1$  et  $u_2$  est parfois empêchée par les calculs de primitives non-explicitables.

---

**Exercice 15.42**

Résolvez l'équation  $y'' + 3y' + 2y = \frac{t-1}{t^2}e^{-t}$  sur  $]0 ; +\infty[$ .

---

**Exercice 15.43**

Résolvez l'équation  $y'' + 4y = \tan t$  sur  $\left]-\frac{\pi}{2} ; \frac{\pi}{2}\right[$ .

## Deuxième partie

### Exercices

# Chapitre 1

## Espaces vectoriels normés

- ★ Exercice proche du cours
- ★★ Exercice de difficulté normale
- ★★★ Exercice difficile (voire très difficile)
- + Exercice à faire en priorité

---

### ★★★ Exercice 1.1 (Exercice 1)

Soit  $u$  une suite réelle bornée. Pour  $n \in \mathbb{N}$ , on pose  $U_n = \{u_p \mid p \geq n\}$ ,  $a_n = \inf U_n$  et  $b_n = \sup U_n$ .

- (1) Justifiez l'existence des suites  $a$  et  $b$  et étudiez leur monotonie, ainsi que leur convergence.
- (2) Montrez que  $u$  converge ssi  $a$  et  $b$  ont la même limite.

Note culturelle : la limite de  $a$  s'appelle la limite inférieure de  $u$ , notée  $\underline{\lim} u$  et celle de  $b$  est la limite supérieure, notée  $\overline{\lim} u$ .

---

### ★★ Exercice 1.2 (Exercice 2)

Montrez que les applications  $N$  introduites ci-dessous sont des normes :

- (1) si  $A \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ , l'application  $N$  définie sur  $\mathbb{R}^n$  par  $N(X) = \|AX\|_2$  ;
- (2) sur  $E = \mathcal{C}^1([a; b], \mathbb{K})$ ,  $N(f) = |f(a)| + \int_a^b |f'(t)| dt$  ;
- (3) pour des réels  $\alpha_0 < \dots < \alpha_n$  fixés, l'application  $N$  définie sur  $\mathbb{R}_n[X]$  par  $N(P) = \max_{k \in \llbracket 0; n \rrbracket} |P(\alpha_k)|$ .

---

### ★ Exercice 1.3 (Exercice 3)

Sur  $E = \mathbb{R}^2$ , on définit

$$\|(x, y)\| = \max(|x|, |x + 2y|).$$

Démontrez que  $\|\cdot\|$  définit une norme sur  $\mathbb{R}^2$ . Représentez graphiquement la boule-unité.

---

**+ ★ ★ Exercice 1.4 (Exercice 4)**

Les normes définies dans l'exercice 2 sont-elles équivalentes à la norme  $\|\cdot\|_\infty$ , la norme  $\|\cdot\|_1$ , la norme  $\|\cdot\|_2$  ?

---

**+ ★ Exercice 1.5 (Exercice 5)**

Soit  $\theta \neq 0 [\pi]$ . Montrez que  $(\sin(n\theta))$  et  $(\cos(n\theta))$  divergent.

---

**+ ★ Exercice 1.6 (Exercice 6)**

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ . On suppose que la suite  $(A^k)$  converge. Montrez que sa limite est la matrice d'un projecteur.

---

**★ ★ Exercice 1.7 (Exercice 7)**

Cet exercice prolonge le premier.

Soit  $u$  une suite vérifiant la propriété

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall (n, p) \in \mathbb{N}^2, p \geq n \geq N \implies |u_n - u_p| \leq \varepsilon.$$

Montrez que  $u$  est bornée, puis en vous servant des suites  $a$  et  $b$  définies comme ci-dessus, montrez que  $u$  converge.

Note culturelle : on dit que  $u$  est une suite de Cauchy et on a donc montré que toute suite de Cauchy converge.

---

**+ ★ ★ Exercice 1.8 (Exercice 8)**

On note  $\ell_1$  l'ensemble des suites réelles  $(u_n)$  telles que la série  $\sum u_k$  soit absolument convergente, et on pose :

$$\forall u = (u_k) \in \ell_1, N(u) = \sum_{k=0}^{+\infty} |u_k|.$$

- (1) Justifiez que  $\ell_1$  est un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.
- (2) Montrez que  $N$  est une norme sur  $\ell_1$ . On notera désormais  $\|u\|_1$  pour  $N(u)$ .
- (3) Justifiez que, si  $(u^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$  est une suite d'éléments de  $\ell_1$  convergeant vers la suite  $a \in \ell_1$  pour la norme 1, alors

$$\forall k \in \mathbb{N}, u_k^{(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} a_k.$$

- (4) Montrez que la réciproque est fausse.

*Indication* : on pourra étudier l'exemple où, pour tout  $(n, k) \in \mathbb{N}^2$ ,  $u_k^{(n)} = \exp\left(\frac{-k}{n+1}\right)$ .

---

**+★ Exercice 1.9 (Exercice 9)**

Soit  $E$  le  $\mathbb{C}$ -espace vectoriel des suites bornées muni de la norme infinie.

Montrez que les applications  $u \mapsto (u_{n+1} - u_n)$  et  $u \mapsto \frac{u_0 + \dots + u_n}{n+1}$  sont des applications continues de  $E$  dans  $E$ .

---

**+★★ Exercice 1.10 (Exercice 10)**

Soit  $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ . Pour  $A = (a_{ij})$  on pose  $\|A\| = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$ .

- (1) Montrez que  $\|\cdot\|$  est une norme sur  $E$ .
- (2) Montrez que l'application  $A \mapsto {}^t A$  est un endomorphisme continu et déterminez sa norme subordonnée.

---

**★★ Exercice 1.11 (Exercice 11)**

Soit  $E = \mathcal{C}^0([0; 1], \mathbb{R})$ . On pose  $A = \{f \in E \mid f \geq 0\}$  et pour  $f \in E$ ,  $\|f\|_1 = \int_0^1 |f|$ .

- (1) Montrez que  $\|\cdot\|_1$  est une norme sur  $E$ .
- (2) Déterminez  $\overset{\circ}{A}$  dans  $(E, \|\cdot\|_\infty)$ , puis dans  $(E, \|\cdot\|_1)$ .
- (3) On pose  $D = \mathcal{D}^1([0; 1], \mathbb{R})$  le sous-espace des fonctions dérivables et  $P$  le sous-espace des fonctions polynômes.  
Déterminez les intérieurs de  $P$  et  $D$  dans  $(E, \|\cdot\|_\infty)$ .

---

**★★ Exercice 1.12 (Exercice 12)**

Cet exercice prolonge le précédent, les notations sont reprises.

Soit  $u : E \longrightarrow E$  qui à toute fonction  $f$  de  $E$  associe sa primitive qui s'annule en 0. Vérifiez que  $u$  est un endomorphisme de  $E$ .

Est-il continu de  $(E, \|\cdot\|_?)$  dans  $(E, \|\cdot\|_?)$  (vous étudierez les quatre possibilités)? Quand c'est le cas, déterminez la norme subordonnée de  $u$ .

---

**+★★ Exercice 1.13 (Exercice 13)**

Soit  $E = \{f \in \mathcal{C}^1([0; 1], \mathbb{R}) \mid f(0) = f(1) = 0\}$ . Pour  $f \in E$ , on pose  $\|f\| = \sup_{[0;1]} |f'|$ .

- (1) Montrez que  $\|\cdot\|$  est une norme sur  $E$ .
- (2) Soit  $\varphi : E \longrightarrow \mathbb{R}$  définie par  $\varphi(f) = \int_0^1 f$ . Montrez que  $\varphi$  est continue et déterminez  $\|\varphi\|$ .

---

**+ ★ ★ Exercice 1.14 (Exercice 14)**

Soient  $E$  un espace vectoriel normé et  $F$  un sous-espace vectoriel de  $E$ .

- (1) Montrez que si  $F \neq E$ , alors  $\overset{\circ}{F} = \emptyset$  et  $\overline{F}$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ .
- (2) Montrez que si  $F$  est un hyperplan, alors  $F$  est fermé ou dense dans  $E$ .

---

**+ ★ Exercice 1.15 (Exercice 15)**

Soient  $E$  un espace vectoriel normé et  $A$  une partie de  $E$ .

Montrez que  $\overset{\circ}{A}$  est le plus grand ouvert inclus dans  $A$  et  $\overline{A}$  est le plus petit fermé contenant  $A$ . Montrez que la frontière de  $A$  est un fermé d'intérieur vide.

---

**★ Exercice 1.16 (Exercice 16)**

Une intersection d'ouverts est-elle toujours un ouvert ? Une réunion de fermés est-elle toujours un fermé ?

---

**+ ★ Exercice 1.17 (Exercice 17)**

Montrez que si  $A$  est une partie convexe d'un espace vectoriel normé  $E$ , alors il en est de même pour  $\overline{A}$  et  $\overset{\circ}{A}$ .

---

**★★ Exercice 1.18 (Exercice 18)**

Soient  $E$  un espace vectoriel normé,  $A$  une partie de  $E$  et  $x \in E$ . On dit que  $x$  est un point d'accumulation de  $A$  quand il existe une suite injective de  $A^{\mathbb{N}}$  qui converge vers  $x$ . On dit que  $x$  est un point isolé de  $A$  quand il existe  $r > 0$  tel que  $B(x, r) \cap A = \{x\}$ .

- (1) Exemples. On pose  $A = \left\{ \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^* \right\}$  dans  $\mathbb{R}$  : montrez que tous les points de  $A$  sont isolés, que le seul point d'accumulation de  $A$  est 0 et que  $A$  n'est pas fermé. On pose  $B = \left\{ \frac{1}{n} + \frac{1}{p} \mid (n, p) \in (\mathbb{N}^*)^2 \right\}$  : quels sont les points d'accumulation de  $B$  ?
- (2) Montrez que  $x$  est un point d'accumulation ssi pour tout  $r > 0$ ,  $B(x, r) \cap A$  est un ensemble infini.
- (3) On note  $A'$  l'ensemble des points d'accumulation de  $A$  et  $A^d$  l'ensemble des points isolés dans  $A$ . Montrez que  $\overline{A} = A' \sqcup A^d$ .
- (4) Montrez que  $A'$  est un fermé.



---

**★★ Exercice 1.19 (Exercice 19)**

Soient  $E, F$  deux espaces vectoriels normés et  $f : E \longrightarrow F$ . Montrez l'équivalence entre les propositions :

- (1)  $f$  est continue
- (2)  $\forall A \in \mathcal{P}(E), f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)}$
- (3)  $\forall B \in \mathcal{P}(F), f^{-1}(\overset{\circ}{B}) \subseteq \overline{f^{-1}(B)}$

---

**+ ★ ★ Exercice 1.20 (Exercice 20)**

Soient  $A, B$  deux fermés disjoints d'un espace vectoriel normé  $E$ .

- (1) Montrez que  $\{x \in E \mid d(x, A) > d(x, B)\}$  est un ouvert.
- (2) Montrez qu'il existe deux ouverts disjoints  $U$  et  $V$  tels que  $A \subseteq U$  et  $B \subseteq V$ .

---

**+ ★ ★ Exercice 1.21 (Exercice 21)**

Soit  $A$  une partie d'un espace vectoriel normé  $E$ . Pour  $r > 0$ , on pose  $V(A, r) = \{x \in E \mid d(x, A) < r\}$ .

Montrez que  $V(A, r)$  est un ouvert de  $E$  et  $\bigcap_{r>0} V(A, r) = \overline{A}$ .

---

**+ ★ ★ Exercice 1.22 (Exercice 22)**

Soient  $E$  un espace vectoriel normé,  $K$  un compact de  $E$ ,  $k \in [0 ; 1[$  et  $f : K \longrightarrow K$  telle que

$$\forall (x, y) \in K^2, \|f(x) - f(y)\| \leq k \|x - y\|.$$

Soit  $u$  la suite définie par  $u_0$  quelconque dans  $K$  et  $u_{n+1} = f(u_n)$ .

Montrez que  $u$  converge et que sa limite est l'unique point fixe de  $f$ .

---

**★★ Exercice 1.23 (Exercice 23)**

Soient  $E$  un espace vectoriel normé et  $A$  une partie non-vidée de  $E$ . On appelle diamètre de  $A$ , noté  $\delta(A)$ , la borne supérieure dans  $\mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$  des  $\|x - y\|$  quand  $(x, y) \in A^2$ .

- (1) Montrez que  $\delta(A) < +\infty$  ssi  $A$  est bornée.
- (2) Quel est le diamètre d'une boule ?
- (3) Montrez que si  $A$  est compacte, alors il existe  $(a, b) \in A^2$  tel que  $\delta(A) = \|a - b\|$ . Est-ce encore vrai si on suppose seulement  $A$  bornée ?  $A$  fermée ?

---

**+ ★ ★ Exercice 1.24 (Exercice 24)**

Soient  $E$  un espace vectoriel normé et  $A, B$  deux parties non-vides de  $E$ . On pose  $d(A, B) = \inf_{(a,b) \in A \times B} \|a - b\|$ , appelé distance de  $A$  à  $B$ .

- (1) Montrez que si  $d(A, B) > 0$ , alors  $A$  et  $B$  sont disjointes, mais que la réciproque est fausse.
- (2) Montrez que si  $A$  et  $B$  sont compactes, alors  $d(A, B)$  est en fait un minimum plutôt qu'une borne inférieure.
- (3) Montrez que ce résultat reste vrai si  $E$  est de dimension finie, l'une des deux parties est compacte et l'autre fermée.
- (4) Est-ce encore vrai si on suppose seulement  $A$  et  $B$  fermées ?

---

**+ ★ ★ Exercice 1.25 (Exercice 25)**

Soient  $E$  un espace vectoriel normé de dimension finie et  $(B_n = \overline{B}(a_n, r_n))$  une suite de boules fermées, décroissantes pour l'inclusion, telle que  $r_n \rightarrow 0$ .

- (1) Montrez que la suite  $(a_n)$  admet une sous-suite convergeant vers un vecteur  $a$ .
- (2) Montrez que  $a_n \rightarrow a$ .
- (3) Montrez que  $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} B_n = \{a\}$ .

---

**★★ Exercice 1.26 (Exercice 26)**

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie. Montrez que l'ensemble des projecteurs est fermé dans  $\mathcal{L}(E)$ . Est-il borné ? Compact ? Connexe par arcs ?

---

**★★ Exercice 1.27 (Exercice 27)**

Soient  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  continue et  $\varepsilon > 0$ . On pose  $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |f(x) - y| \leq \varepsilon\}$ .

- (1) Montrez que  $E$  est connexe par arcs.
- (2) Montrez que si  $f$  est une fonction affine, alors  $E$  est une partie convexe.
- (3) Montrez que la réciproque est vraie.

---

**★★ Exercice 1.28 (Exercice 28)**

Soient  $E$  un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie et  $H$  un hyperplan de  $E$ .

- (1) Montrez que  $E \setminus H$  possède deux composantes connexes par arcs qui sont ouvertes.
- (2) Soit  $B$  une partie de  $H$  telle que  $H \neq B$ . Montrez que  $E \setminus B$  est connexe par arcs.

---

**★★ Exercice 1.29 (Exercice 29)**

Soient  $E$  un espace vectoriel normé et  $A, B$  deux parties de  $E$  telles que  $B$  est connexe par arcs et  $B$  rencontre à la fois  $A$  et  $E \setminus A$ .

Montrez que  $B$  rencontre la frontière de  $A$ .

---

**★★ Exercice 1.30 (Exercice 30)**

Deux parties d'un espace vectoriel normé sont dites homéomorphes quand il existe une bijection continue de l'une dans l'autre telle que la réciproque soit aussi continue.

- (1) Montrez que tout intervalle ouvert est homéomorphe à  $\mathbb{R}$ .
- (2) Montrez qu'un intervalle qui contient l'une de ses bornes réelles ne peut pas être homéomorphe à  $\mathbb{R}$ .
- (3) Montrez que toute boule ouverte d'un espace vectoriel normé  $E$  est homéomorphe à  $E$ .
- (4) Montrez qu'aucune boule fermée de  $E$  n'est homéomorphe à  $E$ .

---

**★★★ Exercice 1.31 (Exercice 31)**

Soit  $G$  un sous-groupe de  $(\mathbb{R}, +)$ , autre que  $\{0\}$ .

- (1) Montrez que  $a = \inf G \cap \mathbb{R}_+^*$  existe.
- (2) Montrez que  $G = a\mathbb{Z}$  si  $a > 0$  ou  $G$  est dense dans  $\mathbb{R}$  si  $a = 0$ .
- (3) On pose  $G = \mathbb{Z} + \sqrt{2}\mathbb{Z}$  ( $G$  est le sous-groupe de  $(\mathbb{R}, +)$  engendré par 1 et  $\sqrt{2}$ ) et  $r = \sqrt{2} - 1$ . En considérant la suite  $(r^n)$ , montrez que  $G$  est dense dans  $\mathbb{R}$ .  
Soit  $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$  continue et périodique de périodes 1 et  $\sqrt{2}$ . Que peut-on dire de  $f$  ?
- (4) Soient  $a, b$  deux réels distincts et non-nuls, on pose  $G = a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$ . Montrez que  $G$  est un sous-groupe de  $(\mathbb{R}, +)$ , puis que  $G$  est dense dans  $\mathbb{R}$  ssi  $\frac{a}{b}$  est un rationnel.  
Application : montrez que les ensembles  $\{\cos n \mid n \in \mathbb{N}\}$  et  $\{\sin n \mid n \in \mathbb{N}\}$  sont denses dans  $[-1 ; 1]$ .

---

**★★★ Exercice 1.32 (Exercice 32)**

Soit  $E = \mathcal{C}^0([0; 1], \mathbb{R})$  muni de la norme infinie  $\|f\| = \sup_{[0;1]} |f|$ . On note  $\overline{B}(0, 1)$  la boule-unité fermée.

Soit  $(t_n)$  une suite injective à valeurs dans  $[0; 1]$ . Pour  $f \in E$ , on pose  $L(f) = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{f(t_n)}{2^n}$ .

- (1) Montrez que  $L$  est une forme linéaire continue sur  $E$ .
- (2) Déterminez  $K = \sup_{f \in \overline{B}(0,1)} |L(f)|$ .
- (3) Montrez que si la suite  $(t_n)$  converge ou si elle est dense dans  $[0; 1]$ ,  $K$  n'est pas atteinte.
- (4) Donnez un exemple de suite  $(t_n)$  pour laquelle  $K$  est atteinte. Donnez une condition nécessaire et suffisante sur la suite  $t$  pour que  $K$  soit atteinte.

---

**★★★ Exercice 1.33 (Exercice 33)**

Soient  $E$  un espace vectoriel normé et  $u$  une forme linéaire non-nulle et continue sur  $E$ . On pose

$$H = \ker u \text{ et } K = \sup_{x \in E \setminus \{0\}} \frac{|u(x)|}{\|x\|}.$$

- (1) Justifiez l'existence de  $K$ .
- (2) Montrez que pour tout  $a \in E$ ,  $d(a, H) = \frac{|u(a)|}{K}$ .

---

**Exercice 1.34 (Oral CCMP, 1)**

Soient  $E$  un espace vectoriel normé réel et  $B$  sa boule-unité ouverte. Montrez que  $E$  et  $B$  sont homéomorphes (*i.e.* il existe une bijection de  $E$  dans  $B$  qui est continue et dont la réciproque est aussi continue).

---

**Exercice 1.35 (Oral CCMP, 2)**

Soient  $E$  un espace vectoriel normé réel et  $C, D$  deux parties de  $E$  telles que  $C \subseteq D \subseteq \overline{C}$  et  $C$  convexe. Montrez que  $D$  est connexe par arcs.

---

**Exercice 1.36 (Oral CCMP, 3)**

Soient  $E$  un espace vectoriel normé réel,  $K$  un compact de  $E$  et  $f : K \rightarrow K$  telle que

$$\forall (x, y) \in K^2, x \neq y \implies \|f(x) - f(y)\| < \|x - y\|.$$

- (1) Montrez que  $f$  possède un unique point fixe.
- (2) Soit  $u$  la suite définie par  $u_0$  quelconque dans  $K$  et  $u_{n+1} = f(u_n)$ . Montrez que  $u$  converge vers le point fixe de  $f$ .

---

**Exercice 1.37 (Oral CCMP, 4)**

Soit  $u$  une suite réelle bornée telle que  $u_{n+1} - u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ . Montrez que l'ensemble de ses valeurs d'adhérence est un intervalle.

---

**Exercice 1.38 (Oral Centrale, 5)**

Soit  $G$  un sous-groupe de  $(\mathbb{C}^*, \times)$  tel que pour tout  $g \in G$  il existe un voisinage  $V$  de  $g$  tel que  $G \cap V = \{g\}$ .

- (1) Montrez que pour tout compact  $K$  de  $\mathbb{C}^*$ ,  $G \cap K$  est fini.
- (2) Montrez que  $G \cap \mathbb{U}$  est un groupe cyclique.
- (3) On suppose que  $G$  n'est pas contenu dans  $\mathbb{U}$ . Soit  $A = \{|x| \mid x \in G \text{ et } |x| > 1\}$ . Montrez que  $A$  possède un plus petit élément. Déduisez-en  $G$ .

---

**Exercice 1.39 (Oral Centrale, 6)**

Soient  $E, F$  deux espaces vectoriels normés de dimensions finies et  $f : E \rightarrow F$ . On dit que  $f$  est propre quand pour tout compact  $K$  de  $F$ ,  $f^{-1}(K)$  est un compact de  $E$ .

- (1) Montrez que si  $f$  est propre, alors l'image d'un fermé de  $E$  est un fermé de  $F$ .
- (2) Montrez que  $f$  est propre ssi  $\|f(x)\| \xrightarrow{\|x\| \rightarrow +\infty} +\infty$ .

---

**Exercice 1.40 (Oral X, 7)**

Soient  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $U_n$  l'ensemble des polynômes réels unitaires de degré  $n$  et  $A_n$  l'ensemble des polynômes de  $U_n$  qui sont simplement scindés (*i.e.* ayant  $n$  racines réelles distinctes).

- (1) Montrez que  $A_n$  est un ouvert de  $U_n$ .
- (2) Déterminez l'adhérence de  $A_n$ .

# Chapitre 2

## Séries numériques et vectorielles : révisions et compléments

- ★ Exercice proche du cours
- ★★ Exercice de difficulté normale
- ★★★ Exercice difficile (voire très difficile)
- + Exercice à faire en priorité

---

### ★ Exercice 2.1 (Exercice 1)

(1) Montrez que la série de terme général  $u_n = \operatorname{Arctan} \frac{1}{2n^2}$  est convergente.

(2) Montrez que pour tout  $n \geq 1$ ,  $u_n = \operatorname{Arctan} \frac{n}{n+1} - \operatorname{Arctan} \frac{n-1}{n}$ .

(3) Déduisez-en la somme  $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ .

---

### ★ Exercice 2.2 (Exercice 2)

Justifiez que la série  $\sum_{n \geq 2} \frac{2n-1}{n^3-n}$  converge et déterminez sa somme (indication : décomposition en éléments simples).

---

### ★★ Exercice 2.3 (Exercice 3)

Donnez la nature des séries suivantes ( $\alpha$  désigne une constante strictement positive,  $x$  un réel dans  $] -1 ; 1[$ ) :

(1)  $\sum_{n \geq 2} \frac{\ln^n n}{n^{\ln n}}$

(2)  $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$

- (3)  $\sum \frac{(-1)^n}{n^\alpha}$
- (4)  $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n n^\alpha}{n!}$
- (5)  $\sum \frac{(-1)^n \ln n}{n^\alpha}$
- (6)  $\sum \ln(1 + x^n)$
- (7)  $\sum \frac{\sin n}{2^n}$
- (8)  $\sum 2 \ln(n^3 + 1) - 3 \ln(n^2 + 1)$
- (9)  $\sum \frac{\sin n \sin \frac{1}{n}}{n}$
- (10)  $\sum_{n \geq 2} \frac{(-1)^n}{(-1)^n + n}$
- (11)  $\sum_{n \geq 0} \sin(\pi \sqrt{n^2 + 1})$
- (12)  $\sum {}^{n+1}\sqrt{n+1} - \sqrt[n]{n}$
- (13)  $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{\ln n + \sin \frac{2\pi n}{3}}$
- (14)  $\sum_{n \geq 1} \left( \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n - e \right)$
- (15)  $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{\ln n \ln(\operatorname{ch} n)}$
- (16)  $\sum \int_0^{\pi/2} \frac{\cos^2 t}{n^2 + \cos^2 t} dt$

### ★★ Exercice 2.4 (Exercice 4)

Soit  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ .

- (1) Déterminez  $a$  et  $b$  pour que la série de terme général  $\ln n + a \ln(n+1) + b \ln(n+2)$  converge. Dans ce cas, donnez la valeur de sa somme.
- (2) Faites de même avec la série de terme général  $\sqrt{n} + a\sqrt{n+1} + b\sqrt{n+2}$ .

### ★★ Exercice 2.5 (Exercice 5)

Pour quelles valeurs de  $\alpha > 0$  la série de terme général  $u_n = \operatorname{ch}^\alpha n - \operatorname{sh}^\alpha n$  converge-t-elle ? Dans ce cas, donnez un équivalent de  $\sum_{k=n}^{+\infty} u_k$ .

---

**★★ Exercice 2.6 (Exercice 6)**

On pose  $u_n = \frac{1}{n^\alpha} \sum_{k=1}^n k^{3/2}$ . Pour quelles valeurs de  $\alpha > 0$  la série  $\sum_{n \geq 1} u_n$  converge-t-elle ? Dans ce cas, donnez un équivalent de  $\sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k$ .

---

**★★ Exercice 2.7 (Exercice 7, séries associées à des suites définies par récurrence)**

- (1) Soit  $u$  la suite définie par récurrence par  $u_1 \in \mathbb{R}$  et pour tout  $n \geq 1$ ,  $u_{n+1} = \frac{1}{ne^{u_n}}$ .

Quelle est la nature de la série  $\sum_{n \geq 1} u_n$  ?

- (2) Soit  $u$  la suite définie par récurrence par  $u_0 \in \mathbb{R}_+^*$  et pour tout  $n \geq 0$ ,  $u_{n+1} = \ln(1 + u_n)$ .

Quelle est la nature de la série  $\sum \left( \frac{1}{u_{n+1}} - \frac{1}{u_n} \right)$  ? Puis celle de  $\sum u_n$  ? Donnez un équivalent de

$$\sum_{k=0}^n u_k.$$

- (3) Soit  $u$  la suite définie par récurrence par  $u_0 \in ]0 ; \pi[$  et pour tout  $n \geq 0$ ,  $u_{n+1} = \sin u_n$ .

Quelle est la nature de la série  $\sum \left( \frac{1}{u_{n+1}^2} - \frac{1}{u_n^2} \right)$  ? Puis celle de  $\sum u_n$  ? Donnez un équivalent de

$$\sum_{k=0}^n.$$

---

**★★ Exercice 2.8 (Exercice 8)**

Soit  $P \in \mathbb{R}[X]$  tel que pour tout  $x \in \mathbb{R}_+$ ,  $P(x) \geq 0$ . Pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , on pose  $u_n = \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{e^k + P(k)}$ .

- (1) Justifiez l'existence de  $u_n$ .

- (2) Montrez que la série  $\sum_{n \geq 1} u_n$  converge.

---

**★★ Exercice 2.9 (Exercice 9)**

Pour  $n \geq 1$ , on pose  $u_n = \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{\sqrt{k}}$ .

- (1) Justifiez l'existence de  $u_n$ .



(2) Montrez que  $\frac{u_n + u_{n+1}}{2}$  est le reste d'une série alternée absolument convergente.

(3) Déduisez-en la nature de la série  $\sum u_n$ .

---

★★ Exercice 2.10 (Exercice 10, utilisation de développements limités ou asymptotiques)

(1) Montrez que la série  $\sum_{n \geq 2} \frac{(-1)^n}{n - \sqrt{n}}$  converge.

(2) Montrez que la série  $\sum_{n \geq 2} \ln \left( 1 + \frac{(-1)^n}{n} \right)$  converge.

(3) Montrez que la série  $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{1 + (-1)^n n}$  converge.

(4) Montrez que la série  $\sum_{n \geq 0} \sin \left( \pi \sqrt{n^2 + 1} \right)$  converge.

(5) Déterminez la nature de la série  $\sum_{n \geq 2} (-1)^n \frac{\ln \left( n + (-1)^n \sqrt{n} \right)}{n}$ .

(6) Déterminez la nature de la série  $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{1 + (-1)^n \sqrt{n}}$ .

---

★★ Exercice 2.11 (Exercice 11)

Pour quelles valeurs de  $\alpha > 0$  la série  $\sum_{n \geq 2} \frac{(-1)^n}{\sqrt{(-1)^n + n^\alpha}}$  converge-t-elle ?

---

★★ Exercice 2.12 (Exercice 12, formule de Stirling)

Montrez que la suite de terme général  $\frac{n!}{\sqrt{n}} \left( \frac{e}{n} \right)^n$  converge vers un réel strictement positif  $L$  (indication : passer au logarithme et penser à une série).

Soit  $u_n = \int_0^{\pi/2} \cos^n t \, dt$ . On montre que  $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$  et que  $u_{2n} = \frac{\pi (2n)!}{2^{2n+1} (n!)^2}$ . En admettant ces résultats, montrez la formule de Stirling :

$$n! \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{2\pi n} \left( \frac{n}{e} \right)^n.$$

---

**★★ Exercice 2.13 (Exercice 13)**

Soient  $a \in \mathbb{R}$  et  $u_n = \frac{(-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}}{n^a}$ .

- (1) Dans le cas où  $a \leq 0$  ou  $a > 1$ , quelle est la nature de la série  $\sum_{n \geq 1} u_n$  ?
- (2) On suppose désormais que  $0 < a \leq 1$  et on pose  $v_n = u_{2n-1} + u_{2n}$ . Montrez que la série  $\sum v_n$  converge. Déduisez-en la nature de la série  $\sum u_n$ .

---

**★★ Exercice 2.14 (Exercice 14)**

Soient  $u$  une suite strictement positive et  $\alpha > 0$ .

Montrez que les séries de termes généraux  $u_n$ ,  $v_n = \frac{u_n}{1+u_n}$ ,  $w_n = \ln(1+u_n)$  et  $x_n = \int_0^{u_n} \frac{1}{1+x^\alpha} dx$  sont de même nature.

---

**★★ Exercice 2.15 (Exercice 15)**

Soit  $u$  une suite réelle qui ne s'annule pas telle que  $\frac{u_{2n+1}}{u_{2n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} a$  et  $\frac{u_{2n}}{u_{2n-1}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} b$ .

Montrez que si  $|ab| < 1$ , alors la série  $\sum u_n$  converge.

---

**★★ Exercice 2.16 (Exercice 16)**

Soit  $u$  une suite réelle positive décroissante.

Montrez que si  $\sum u_n$  converge, alors  $u_n = o\left(\frac{1}{n}\right)$  quand  $n$  tend vers  $+\infty$ .

La réciproque est-elle vraie ?

---

**★★ Exercice 2.17 (Exercice 17)**

Soit  $(u_n)_{n \geq 1}$  une suite réelle strictement positive et bornée telle que la série  $\sum_{n \geq 1} u_n$  diverge. Pour

$n \in \mathbb{N}^*$ , on pose  $S_n$  la somme partielle d'indice  $n$  de la série  $\sum_{n \geq 1} u_n$ .

- (1) Montrez que  $\frac{u_n}{S_n} \sim \ln \frac{S_n}{S_{n+1}}$ . Déduisez-en la nature de la série  $\sum_{n \geq 1} \frac{u_n}{S_n}$ .
- (2) Étudiez la série  $\sum_{n \geq 1} \frac{u_n}{S_n^\alpha}$  quand  $\alpha \in ]0 ; 1[$ .
- (3) Soit  $\alpha > 1$ . Montrez que  $\frac{u_n}{S_n^\alpha} \leq \int_{S_{n-1}}^{S_n} \frac{1}{x^\alpha} dx$ . Déduisez-en la nature de la série  $\sum_{n \geq 1} \frac{u_n}{S_n^\alpha}$ .

---

**★★ Exercice 2.18 (Exercice 18)**

Soit  $u$  une suite strictement positive. Pour  $n \in \mathbb{N}$ , on pose  $s_n = \sum_{k=0}^n u_k$ .

On suppose que  $u_n s_n$  tend vers 1 quand  $n$  tend vers  $+\infty$ . Déterminez un équivalent simple de  $u_n$ .

---

**★★ Exercice 2.19 (Exercice 19)**

Soit  $u$  la suite définie par récurrence par  $u_0 > 0$  et pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+1} = u_n + u_n^2$ . On pose  $v_n = \frac{1}{2^n} \ln u_n$ , puis  $w_n = v_{n+1} - v_n$ .

- (1) Montrez que la suite  $(u_n)$  diverge vers  $+\infty$ .
  - (2) Montrez que la suite  $(v_n)$  converge vers un réel  $\ell > 0$ . On pose alors  $A = e^\ell > 1$ .
  - (3) Montrez que  $u_n \sim A^{2^n}$ .
- 

**★★★ Exercice 2.20 (Exercice 20, transformation d'Abel)**

Soient  $u$  une suite réelle et  $v$  une suite complexe. Pour  $n \in \mathbb{N}$ , on pose  $V_n = \sum_{k=0}^n v_k$ .

On suppose que la suite  $u$  est positive et décroissante de limite nulle et que la suite  $V$  est bornée.

- (1) Montrez que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $\sum_{k=0}^n u_k v_k = u_n V_n - \sum_{k=0}^{n-1} (u_{k+1} - u_k) V_k$ .
- (2) Dédisez-en que la série  $\sum u_n v_n$  converge.

Applications :

- (3) Soit  $w$  une suite complexe telle que  $\sum w_n$  converge. Montrez que pour tout  $a > 0$ ,  $\sum \frac{w_n}{n^a}$  converge aussi.
- (4) Soient  $a > 0$  et  $\theta \in \mathbb{R}$ . Donnez la nature des séries  $\sum \frac{e^{in\theta}}{n^a}$ ,  $\sum \frac{\cos(n\theta)}{n^a}$  et  $\sum \frac{\sin(n\theta)}{n^a}$ .
- (5) Montrez que pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $|\sin x| \geq \frac{1 - \cos(2x)}{2}$ . Déterminez la nature des séries  $\sum \frac{|\cos(n\theta)|}{n^a}$  et  $\sum \frac{|\sin(n\theta)|}{n^a}$ .

---

**★★★ Exercice 2.21 (Exercice 21)**

Soit  $u$  une suite positive de limite nulle. On appelle  $U_n$  la somme partielle d'indice  $n$  de la série  $\sum u_n$  et on suppose qu'il existe une constante  $M > 0$  telle que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $|U_n - nu_n| \leq M$ .

- (1) Montrez que pour tout  $n \geq 2$ ,  $\left| \frac{U_n}{n} - \frac{U_{n-1}}{n-1} \right| \leq M \left( \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \right)$ .
- (2) Montrez que la série  $\sum u_n$  converge.

---

**★★★ Exercice 2.22 (Exercice 22)**

Soit  $\sum_{n \geq 1} u_n$  une série convergente à termes positifs.

- (1) Montrez que  $\frac{u_1 + 2u_2 + \cdots + nu_n}{n}$  tend vers 0 quand  $n$  tend vers  $+\infty$ .
- (2) Montrez que la série  $\sum \frac{u_1 + 2u_2 + \cdots + nu_n}{n(n+1)}$  converge et montrez que sa somme est la même que celle de la série  $\sum_{n \geq 1} u_n$ .

---

**Exercice 2.23 (Oral Saint-Cyr, 1)**

Pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , on pose  $u_n = \frac{\ln n}{n}$ . Déterminez la nature de la série  $\sum u_n$ . Donnez un équivalent de  $\sum_{k=1}^n u_k$  quand  $n \rightarrow +\infty$ .

---

**Exercice 2.24 (Oral IMT, 2)**

Soit  $\alpha > 0$ . Donnez un équivalent de  $\sum_{k=1}^n \ln^\alpha k$  quand  $n \rightarrow +\infty$ .

---

**Exercice 2.25 (Oral CCINP, 3)**

Soit  $u$  la suite définie par récurrence par  $u_0 > 0$  et pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+1} = u_n e^{-u_n}$ .

- (1) Montrez que  $(u_n)$  converge et déterminez sa limite.
- (2) Déterminez la limite de  $\frac{1}{u_{n+1}} - \frac{1}{u_n}$ . Déduisez-en un équivalent de  $u_n$ .

---

**Exercice 2.26 (Oral CCINP, 4)**

Montrez que pour  $n \geq 1$ , l'équation  $x^n + \sqrt{n}x - 1 = 0$  admet une unique solution  $x_n$  dans  $[0 ; 1]$ .

Étudiez la suite  $(x_n)$  et montrez qu'elle converge vers 0.

Trouvez un équivalent de  $x_n$  et étudiez la convergence de la série  $\sum_{n \geq 1} x_n$ .

---

**Exercice 2.27 (Oral CCINP, 5)**

Montrez que la suite  $(u_n)$  définie par  $u_0 \in [0 ; 1[$  et  $u_{n+1} = \frac{1}{2} (u_n + u_n^2)$  converge vers 0 et donnez la nature de la série  $\sum u_n$ .

---

**Exercice 2.28 (Oral CCINP, 6)**

Quelle est la nature de la série de terme général  $\ln \left( 1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n(n+1)}} \right)$  ?

---

**Exercice 2.29 (Oral CCINP, 7)**

Soient  $x, y > 0$ . Représentez graphiquement l'ensemble des couples  $(x, y)$  tels que la série  $\sum \frac{x^n}{y^n + n^x}$  converge.

---

**Exercice 2.30 (Oral CCMP, 8)**

Étudiez la convergence de la suite  $(a_n)$  définie par  $a_0 > 0$  et  $a_{n+1} = 1 - e^{-a_n}$ .

Déterminez la nature des séries  $\sum (-1)^n a_n$  et  $\sum a_n^2$ .

Déterminez la nature de la série  $\sum a_n$  (on pourra étudier la série  $\sum \ln \frac{a_{n+1}}{a_n}$ ).

---

**Exercice 2.31 (Oral CCINP, 9)**

Soient  $(a_n)$  une suite positive et  $(u_n)$  définie par  $u_0 > 0$  et pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+1} = \frac{u_n + \sqrt{u_n^2 + a_n^2}}{2}$ .

(1) Montrez que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+1} - u_n \leq \frac{a_n}{2}$ .

(2) Montrez que si la série  $\sum a_n$  converge, alors la suite  $(u_n)$  converge.

(3) La réciproque est-elle vraie ? Indication : considérer  $u_n = \frac{n}{n+1}$ .

---

**Exercice 2.32 (Oral IMT, 10)**

Soit  $(u_n)$  la suite définie par  $u_0 > 0$  et pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+1} = \frac{n+1}{n+3}u_n$ . On pose  $(v_n) = (n^2 u_n)$ .

- (1) Déterminez la nature de la série de terme général  $\ln \frac{v_{n+1}}{v_n}$ .
- (2) Déduisez-en la nature de la série de terme général  $u_n$ .

---

**Exercice 2.33 (Oral Centrale, 11)**

Montrez que la série  $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n^2 - 1}$  converge et donnez la valeur de sa somme.

Montrez que la série  $\sum_{n \geq 2} \frac{n^2}{(n^2 + 1)^2}$  converge et donnez une valeur de  $n$  pour que sa somme partielle soit une valeur approchée de sa somme à  $10^{-4}$  près.

---

**Exercice 2.34 (Oral Centrale, 12)**

- (1) Pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , on pose  $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ . Montrez que la suite  $(H_n - \ln n)_{n \geq 1}$  converge.
- (2) Déduisez de la question précédente la valeur de  $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k}$ .
- (3) Pour  $s > 1$ , on pose  $\zeta(s) = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^s}$ . Calculez  $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{\zeta(n) - 1}{n}$ .

---

**Exercice 2.35 (Oral Centrale, 13)**

Si  $(u_n)$  est une suite réelle telle que  $u_0 = 0$ , on pose alors  $(v_n)_{n \geq 1}$  la suite définie par : pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $v_n = n(u_n - u_{n-1})$ .

On note  $P_1$  la propriété « la série  $\sum_{n \geq 1} v_n$  converge » et  $P_2$  la propriété « il existe  $\ell$  tel que  $u_n \rightarrow \ell$  et  $\sum (\ell - u_n)$  converge ».

- (1) Si  $\alpha \in \mathbb{R}$  et  $u_n = \text{Arctan } n^\alpha$  pour  $n \geq 1$ , étudiez la véracité des propositions  $P_1$  et  $P_2$ .
- (2) Soit  $(a_n)_{n \geq 1}$  une suite réelle telle que  $\sum a_n$  converge. Montrez que  $\sum \frac{a_n}{n}$  converge et que  $\sum_{k=n}^{+\infty} \frac{a_k}{k} = o\left(\frac{1}{n}\right)$ .
- (3) Comparez les propriétés  $P_1$  et  $P_2$ .

---

**Exercice 2.36 (Oral CCMP, 14)**

Soit  $\alpha \in \mathbb{R}_+^* \setminus \left\{\frac{1}{2}\right\}$ . La série  $\sum_{n \geq 2} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n n^\alpha}$  converge-t-elle ?

---

**Exercice 2.37 (Oral CCMP, 15)**

Soient  $\alpha > 0$  et  $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k^\alpha}$ .

- (1) On suppose  $\alpha > 1$ . Montrez que  $\sum_{k=1}^n R_k = (n+1) R_n + \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{k^{\alpha-1}}$ . Dédisez-en la convergence de la série  $\sum R_n$ .
- (2) Étudiez le cas  $\alpha \leq 1$ .

---

**Exercice 2.38 (Oral CCMP, 16)**

Soit  $(a_n) \in (\mathbb{R}_+^*)^{\mathbb{N}^*}$ .

- (1) On suppose que la série  $\sum a_n^{1-1/n}$  converge. Montrez que la série  $\sum a_n$  converge.
- (2) On suppose que la série  $\sum a_n$  converge. Montrez que la série  $\sum a_n^{1-1/n}$  converge.  
Vous introduirez, pour  $\lambda > 1$ , l'ensemble  $\left\{n \in \mathbb{N}^* \mid a_n^{1-1/n} \leq \lambda a_n\right\}$  et son complémentaire.
- (3) Généralisez en remplaçant  $a_n^{1-1/n}$  par  $a_n^{1-b_n}$  avec une hypothèse adéquate sur la suite  $(b_n)$ .

---

**Exercice 2.39 (Oral CCMP, 17)**

Soit  $f$  une permutation de  $\mathbb{N}^*$ . On pose  $E(f) = \left\{\alpha \in \mathbb{R} \mid \sum \frac{f(n)}{n^\alpha} \text{ converge}\right\}$ .

- (1) Montrez que  $E(f)$  peut être vide. Montrez dans le cas contraire que  $E(f)$  est un intervalle minoré par 2 et non-majoré.
- (2) Soit  $B \geq 2$ . Montrez l'existence de  $f$  telle que  $E(f) = ]B ; +\infty[$ .

---

**Exercice 2.40 (Oral X, 18)**

Pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , on pose  $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} - 2\sqrt{n}$ .

(1) Montrez que la suite  $(u_n)_{n \geq 1}$  converge. On note  $\ell$  sa limite.

(2) Montrez que  $\ell = -\left(1 + \sqrt{2}\right) \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{\sqrt{k}}$ .

---

**Exercice 2.41 (Oral X, 19)**

Soit  $\sum x_n$  une série absolument convergente de réels.

(1) Montrez que pour tout réel  $p \geq 1$ , la série  $\sum |x_n|^p$  converge.

(2) Déterminez la limite de  $\sum_{n=0}^{+\infty} |x_n|^p$  quand  $p \rightarrow +\infty$ .

---

**Exercice 2.42 (Oral X, 20)**

Soient  $\alpha > 0$  et  $(u_n)$  une suite de réels strictement positifs telle que  $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{\alpha}{n} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)$ .

Étudiez la convergence de la série  $\sum u_n$ .



# Chapitre 3

## Familles sommables

- ★ Exercice proche du cours
- ★★ Exercice de difficulté normale
- ★★★ Exercice difficile (voire très difficile)
- + Exercice à faire en priorité

---

### ★★ Exercice 3.1 (Exercice 23)

La famille  $\left(\frac{1}{pq(p+q)}\right)_{p,q \geq 1}$  est-elle sommable ?

---

### ★★ Exercice 3.2 (Exercice 24)

(1) Soit  $\alpha > 0$ . Montrez que la série  $\sum_{n \geq 0} \frac{n^\alpha}{2^n}$  est convergente. On note  $S(\alpha)$  sa somme.

(2) Dans cette question, on pose  $\alpha = 1$  et on note  $s = S(1) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n}{2^n}$ . En effectuant le changement d'indice  $m = n - 1$ , montrez que  $s = 2 \left( s - \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{1}{2^m} \right)$  et donnez la valeur de  $S(1)$ .

(3) En vous inspirant de ce qui précède, donnez une expression de  $S(2)$  en fonction de  $S(1)$  et  $S(0)$ , puis sa valeur.

(4) Montrez que la famille  $\left(\frac{(-1)^{m+n} m}{2^{m+n}}\right)_{m,n \geq 0}$  est sommable et calculez sa somme.

---

### ★★ Exercice 3.3 (Exercice 25)

Soit  $a$  un complexe tel que  $|a| < 1$ .

En utilisant un produit de Cauchy, montrez que  $\sum_{n=0}^{+\infty} (n+1) a^n = \left(\frac{1}{1-a}\right)^2$ .

---

**★★ Exercice 3.4 (Exercice 26)**

(1) Pour  $z \in \mathbb{C}$  tel que  $|z| < 1$  et  $N \in \mathbb{N}$ , que vaut  $\sum_{n=N}^{+\infty} z^n$  ?

(2) Soit  $x \in \mathbb{C}$  tel que  $|x| < 1$ . Montrez que  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{1-x^{2n}} = \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{x^{2p+1}}{1-x^{2p+1}}$ .

---

**★★ Exercice 3.5 (Exercice 27)**

Pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , on pose  $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ . On rappelle que  $H_n = \ln n + \gamma + o(1)$ .

(1) Soit  $m \in \mathbb{N}^*$ . Montrez que  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+m)} \underset{m \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\ln m}{m}$ .

(2) Montrez que la famille  $\left( \frac{(-1)^m}{m(m+n^2)} \right)_{m,n \geq 1}$  est sommable.

(3) Montrez que la famille  $\left( \frac{(-1)^m}{(m+n)(m+n-1)} \right)_{m,n \geq 1}$  est sommable et donnez la valeur de sa somme.

---

**★★ Exercice 3.6 (Exercice 28)**

Pour  $n \geq 2$ , on note  $P(n)$  le plus grand diviseur premier de  $n$ . On note  $p_1 = 2, p_2 = 3, \dots$  la suite croissante des nombres premiers.

(1) Montrez que pour tout  $k \geq 3$ ,  $p_{k-1} \leq p_k - 2$ , puis  $\frac{p_k}{p_k - 1} \leq \sqrt{\frac{p_k}{p_{k-1}}}$ .

(2) Montrez que la série  $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{nP(n)}$  converge (indication : pensez à une sommation par paquets).

---

**★★ Exercice 3.7 (Exercice 29)**

Soit  $u$  une suite complexe.

Pour  $x \in \mathbb{R}$ , on pose  $H_x = \{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re} z > x\}$ , son adhérence est  $\overline{H_x} = \{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re} z \geq x\}$ .

(1) Montrez que s'il existe  $s_0 \in \mathbb{C}$  tel que la famille  $\left( \frac{u_n}{n^{s_0}} \right)_{n \geq 1}$  est sommable, alors pour tout  $s \in \mathbb{C}$  tel que  $\operatorname{Re} s > \operatorname{Re} s_0$ , la famille  $\left( \frac{u_n}{n^s} \right)_{n \geq 1}$  est sommable.

(2) Quand la famille  $\left( \frac{u_n}{n^s} \right)_{n \geq 1}$  est sommable, on pose  $f_u(s) = \sum_{n \in \mathbb{N}^*} \frac{u_n}{n^s}$ .

Montrez que l'ensemble de définition de  $f_u$  est, s'il est non-vide,  $\mathbb{C}$ , un ensemble  $H_x$  ou un ensemble  $\overline{H_x}$ .

- (3) Pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , on pose  $D_n = \left\{ (d, d') \in (\mathbb{N}^*)^2 \mid dd' = n \right\}$ . Montrez que  $(\mathbb{N}^*)^2 = \bigsqcup_{n \in \mathbb{N}^*} D_n$ .
- (4) Soient  $(a_n), (b_n)$  deux suites complexes et  $s \in \mathbb{C}$  tels que les familles  $\left(\frac{a_n}{n^s}\right)_{n \geq 1}$  et  $\left(\frac{b_n}{n^s}\right)_{n \geq 1}$  soient sommables.
- On pose, pour  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $c_n = \sum_{d|n} a_d b_{n/d}$ . Montrez que la famille  $\left(\frac{c_n}{n^s}\right)_{n \geq 1}$  est sommable et que  $f_c(s) = f_a(s) \times f_b(s)$ .

### ★★ Exercice 3.8 (Exercice 30)

Cet exercice prolonge le précédent.

On rappelle la définition de l'indicatrice d'Euler : pour  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\varphi_n$  est le cardinal de l'ensemble  $\{k \in \llbracket 1 ; n \rrbracket \mid k \wedge n = 1\}$ .

On définit par récurrence la suite de Möbius :  $\mu_1 = 1$  et pour tout  $n \geq 2$ ,  $\mu_n = - \sum_{\substack{d|n \\ d < n}} \mu_d$ .

Enfin, on note  $\delta_n$  le nombre de diviseurs de  $n$  et  $\sigma_n$  la somme des diviseurs de  $n$ .

On pose  $\zeta = f_1$ ,  $\xi = f_\varphi$  et  $M(s) = f_\mu$ .

- (1) Montrez que l'ensemble de définition (au sens précédent) de  $\zeta$  est  $H_1$ . Montrez que  $\xi$  est définie sur  $H_2$ .
- (2) On admet la relation suivante : pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $n = \sum_{d|n} \varphi_d$ . Donnez une relation valable sur  $H_2$  liant les fonctions  $\xi$  et  $\zeta$ . Justifiez alors que l'ensemble de définition de  $\xi$  est  $H_2$ .
- (3) On admet que pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $|\mu_n| \leq 1$ . Donnez une relation entre  $M$  et  $\zeta$  et précisez l'ensemble de définition de  $M$ .
- (4) Déduisez-en la relation : pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\frac{\varphi_n}{n} = \sum_{d|n} \frac{\mu_d}{d}$  en admettant l'unicité des coefficients  $u_n$  d'une fonction  $f_u$ .
- (5) Exprimez  $f_\delta$  et  $f_\sigma$  en fonction de  $\zeta$  et précisez leurs ensembles de définition.

# Chapitre 4

## Rappels et compléments d'algèbre linéaire

- ★ Exercice proche du cours
- ★★ Exercice de difficulté normale
- ★★★ Exercice difficile (voire très difficile)
- + Exercice à faire en priorité

---

### ★★★ Exercice 4.1 (Exercice 1)

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $(u_1, \dots, u_n)$  une famille libre de  $E$ .

- (1) Pour  $i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$ , on pose  $c_i = \sum_{\substack{1 \leq k \leq n \\ k \neq i}} u_k$ . Montrez que la famille  $(c_i)_{1 \leq i \leq n}$  est libre.
- (2) Soit  $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n$ . On pose  $s = \sum_{i=1}^n \lambda_i u_i$  et pour tout  $i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$ ,  $v_i = s + u_i$ . Montrez que la famille  $(v_1, \dots, v_n)$  est liée ssi  $\sum_{i=1}^n \lambda_i = -1$ .
- (3) Soit  $\lambda \in \mathbb{K}$ . On pose  $s = \sum_{i=1}^n u_i$  et pour tout  $i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$ ,  $v_i = s + \lambda u_i$ . Montrez qu'il existe exactement deux valeurs de  $\lambda$  pour lesquelles la famille  $(v_1, \dots, v_n)$  est liée.

---

### ★★★ Exercice 4.2 (Exercice 2)

Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Pour  $k \in \llbracket 0 ; n \rrbracket$ , on pose  $P_k = X^k (1 - X)^{n-k}$ . Montrez que la famille  $\mathcal{F}_n = (P_0, \dots, P_n)$  est une base de  $\mathbb{C}_n[X]$ .

---

### ★★★ Exercice 4.3 (Exercice 3)

Soit  $f$  une application d'un ensemble  $\Omega$  dans  $\mathbb{C}$  qui prend une infinité de valeurs.

Montrez que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , la famille  $(1, f, f^2, \dots, f^n)$  est libre dans l'espace  $\mathcal{F}(\Omega, \mathbb{C})$ .

---

**+ ★ ★ Exercice 4.4 (Exercice 4)**

Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Pour  $k \in \llbracket 0 ; n \rrbracket$ , on pose  $P_k = (X + k)^n$ . Montrez que la famille  $\mathcal{F}_n = (P_0, \dots, P_n)$  est libre.

---

**★ Exercice 4.5 (Exercice 5)**

Soit  $a \in \mathbb{C}^*$ .  $\mathbb{C}$  est vu comme un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. Soit  $f$  l'application de  $\mathbb{C}$  dans  $\mathbb{C}$  qui à  $z$  associe  $z + a\bar{z}$ .

- (1) Montrez que  $f$  est linéaire.
- (2) Montrez que si  $|a| \neq 1$ , alors  $f$  est un automorphisme de  $\mathbb{C}$ .
- (3) Déterminez le noyau et l'image de  $f$  dans le cas où  $a = e^{i\alpha}$  (on pourra utiliser l'écriture trigonométrique des complexes).

---

**+ ★ Exercice 4.6 (Exercice 6)**

Soit  $f$  un endomorphisme de  $\mathbb{K}[X]$  qui conserve le degré : pour tout  $P \in \mathbb{K}[X]$ ,  $\deg f(P) = \deg P$ .

Montrez que  $f$  est un automorphisme de  $\mathbb{K}[X]$  (on pourra étudier les restrictions de  $f$  à  $\mathbb{K}_n[X]$ ).

---

**+ ★ ★ Exercice 4.7 (Exercice 7)**

Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Pour  $P \in \mathbb{K}_n[X]$ , on pose  $f(P) = (X^2 - 1)P' - nXP$ .

- (1) Montrez que  $f$  est un endomorphisme de  $\mathbb{K}_n[X]$ .
- (2) Montrez que si  $P \in \ker f$ , alors  $X^2 - 1$  divise  $P$ , puis justifiez qu'il existe  $\alpha \in \mathbb{N}^*$  et  $Q \in \mathbb{K}[X]$  tels que  $P = (X^2 - 1)^\alpha Q$  et  $(Q(1) \neq 0$  ou  $Q(-1) \neq 0)$ .
- (3) Montrez que si  $n$  est impair, alors  $f$  est un automorphisme.
- (4) Montrez que si  $n$  est pair, alors  $\ker f$  est une droite vectorielle. Déduisez-en la dimension de  $\operatorname{Im} f$ .

---

**★★ Exercice 4.8 (Exercice 8)**

On pose  $E = \mathbb{C}[X]$ . Pour  $P \in E$ , on pose  $f(P) = (X^2 - 1)P' - 2XP(X)$ .

- (1) Montrez que  $f \in \mathcal{L}(E)$ .
- (2) Déterminez  $\ker f$ .
- (3) Montrez que  $\operatorname{Im} f = \{Q \in \mathbb{C}[X] \mid Q'(1) = Q(1) \text{ et } Q'(-1) = -Q(-1)\}$ . Indication : restreindre à  $\mathbb{C}_n[X]$ .

---

**★ Exercice 4.9 (Exercice 9)**

Soient  $E, F, G$  trois  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels,  $f \in \mathcal{L}(E, F)$  et  $g \in \mathcal{L}(F, G)$ .

Montrez que  $f(\ker(g \circ f)) = \ker g \cap \operatorname{Im} f$ .

---

**+ ★ ★ Exercice 4.10 (Exercice 10)**

Soient  $E, F, G$  trois  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et  $(f, g) \in \mathcal{L}(E, F) \times \mathcal{L}(F, G)$ .

- (1) Montrez que  $\ker(g \circ f) = \ker f \iff \ker g \cap \operatorname{Im} f = \{0\}$ .
  - (2) Montrez que  $\operatorname{Im}(g \circ f) = \operatorname{Im} g \iff \ker g + \operatorname{Im} f = F$ .
- 

**★ ★ ★ Exercice 4.11 (Exercice 11)**

Soient  $E, F$  deux  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et  $f \in \mathcal{L}(E, F)$ . On dit que  $g \in \mathcal{L}(F, E)$  est un inverse à droite de  $f$  quand  $f \circ g = \operatorname{id}_F$ .

- (1) Montrez que si  $f$  possède deux inverses à droite différents, alors  $f$  en possède une infinité.
  - (2) Montrez que si  $f$  possède un unique inverse à droite, alors  $f$  est un isomorphisme (vous admettrez l'existence d'un supplémentaire de tout sous-espace vectoriel).
- 

**+ ★ ★ Exercice 4.12 (Exercice 12)**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $p, q$  deux projecteurs de  $E$ .

- (1) Montrez que  $p + q$  est un projecteur ssi  $p \circ q = q \circ p = 0$ .
  - (2) Dans ce cas, montrez alors que  $\operatorname{Im}(p + q) = \operatorname{Im} p \oplus \operatorname{Im} q$  et  $\ker(p + q) = \ker p \cap \ker q$ .
- 

**★ ★ Exercice 4.13 (Exercice 13)**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $p, q$  deux projecteurs de  $E$  tels que  $p \circ q = 0$ . Soit  $r = p + q - q \circ p$ .

Montrez que  $r$  est un projecteur et précisez ses éléments caractéristiques.

---

**★ ★ Exercice 4.14 (Exercice 14)**

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. On suppose qu'il existe  $(f, g) \in \mathcal{L}(E)^2$  tel que  $f \circ g - g \circ f = \operatorname{id}_E$ .

- (1) Démontrez que pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $f \circ g^n - g^n \circ f = n g^{n-1}$ .
- (2) Déduisez-en que pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , la famille  $(g^k)_{0 \leq k \leq n}$  est libre dans  $\mathcal{L}(E)$ .
- (3) Si  $E$  est de dimension finie  $p \geq 1$ , que pouvez-vous conclure ?

---

**★★ Exercice 4.15 (Exercice 15)**

Soient  $E$  un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel et  $f$  un endomorphisme de  $E$  tel que  $f^3 = \text{id}_E$ . Pour  $a \in \mathbb{R}$  et  $u \in E$ , on veut résoudre l'équation  $x + af(x) = u$  d'inconnue  $x \in E$ .

- (1) Montrez que pour toutes les valeurs de  $a$ , sauf une seule  $a_0$ , l'équation a une unique solution que vous calculerez.
- (2) Dans le cas où  $a = a_0$ , donnez une condition nécessaire sur  $u$  pour qu'il existe une solution, puis si cette condition est satisfaite, déterminez une solution particulière de l'équation qui soit combinaison linéaire de  $u$  et  $f(u)$ . Concluez.

---

**+★★ Exercice 4.16 (Exercice 16)**

Soient  $E$  un espace vectoriel de dimension finie  $n$  et  $f \in \mathcal{L}(E)$ .

- (1) Montrez que  $\text{Im } f = \ker f$  et, ssi  $n$  est pair,  $\text{rg } f = \frac{n}{2}$  et  $f^2 = 0$ .
- (2) Donnez un exemple d'une telle application linéaire  $f$ .
- (3) Si les conditions de la question (1) sont satisfaites, alors on pose  $r = \frac{n}{2}$  : montrez qu'il existe une base de  $E$  dans laquelle la matrice de  $f$  est  $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ I_r & 0 \end{pmatrix}$  (matrice par blocs).

---

**+★★ Exercice 4.17 (Exercice 17)**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et  $f \in \mathcal{L}(E)$ . Montrez l'équivalence

$$E = \ker f \oplus \text{Im } f \iff \ker f^2 = \ker f \iff \text{Im } f = \text{Im } f^2.$$

---

**★ Exercice 4.18 (Exercice 18)**

Soient  $E, F$  deux  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimensions finies et  $(f, g) \in \mathcal{L}(E, F)^2$ . Montrez que  $|\text{rg } f - \text{rg } g| \leq \text{rg } (f + g) \leq \text{rg } f + \text{rg } g$ .

---

**★★ Exercice 4.19 (Exercice 19)**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et  $(u, v) \in \mathcal{L}(E)^2$ . On suppose que  $u \circ v = 0$  et  $u + v \in \text{GL}(E)$ . Démontrez que  $\text{rg } u + \text{rg } v = \dim E$ .

---

**★★ Exercice 4.20 (Exercice 20)**

Soient  $E, F$  deux  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimensions finies.

- (1) Soit  $U$  un sous-espace vectoriel de  $E$ . On pose  $\mathcal{A} = \{u \in \mathcal{L}(E, F) \mid U \subseteq \ker u\}$ . Montrez que  $\mathcal{A}$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathcal{L}(E, F)$  tel que pour tout  $(f, u) \in \mathcal{L}(E) \times \mathcal{A}$ ,  $fu \in \mathcal{A}$  et calculez sa dimension.
- (2) Montrez que la réciproque est vraie : si  $\mathcal{A}$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathcal{L}(E, F)$  tel que pour tout  $(f, u) \in \mathcal{L}(E) \times \mathcal{A}$ ,  $fu \in \mathcal{A}$ , alors il existe  $U$  un sous-espace vectoriel de  $E$  tel que  $\mathcal{A} = \{u \in \mathcal{L}(E, F) \mid U \subseteq \ker u\}$ .

---

**+★★ Exercice 4.21 (Exercice 21)**

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  une matrice de rang 1. Montrez que  $A$  peut s'écrire comme le produit d'une matrice colonne par une matrice ligne. Déduisez-en  $A^2 = \text{tr}(A)A$ .

---

**+★★★ Exercice 4.22 (Exercice 22)**

Soit  $f$  une forme linéaire sur  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  telle que pour tout  $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})^2$ ,  $f(AB) = f(BA)$ . Montrez que  $f$  est proportionnelle à la trace (indication : faire intervenir la base canonique de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ ).

---

**★★★★ Exercice 4.23 (Exercice 23)**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et  $G$  un sous-groupe de cardinal  $n$  de  $\text{GL}(E)$ .

On pose  $F = \{x \in E \mid \forall g \in G, g(x) = x\}$ .

Montrez que  $\dim F = \frac{1}{n} \sum_{g \in G} \text{tr } g$ . Indication : on pourra utiliser  $p = \frac{1}{n} \sum_{g \in G} g$ .

---

**★ Exercice 4.24 (Exercice 24)**

Montrez qu'il n'existe pas de couple de matrices  $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2$  tels que  $AB - BA = I_n$ .

---

**+★★ Exercice 4.25 (Exercice 25)**

Soient  $A$  et  $B$  deux matrices carrées d'ordre  $n$ . On suppose que pour tout  $X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ,  $\text{tr}(AX) = \text{tr}(BX)$ . Montrez que  $A = B$ .

---

**★ Exercice 4.26 (Exercice 26)**

Soient  $u, v$  les deux suites réelles telles que  $u_0 = 1$ ,  $v_0 = -1$  et pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+1} = -3u_n + 10v_n$  et  $v_{n+1} = -3u_n + 8v_n$ .

Donnez des expressions de  $u_n$  et  $v_n$  en fonction de  $n$ .



---

**★★ Exercice 4.27 (Exercice 27)**

Soient  $u, v, w$  les trois suites réelles telles que  $u_0 = v_0 = w_0 = 1$  et

$$\text{pour tout } n \in \mathbb{N}, \quad \begin{cases} u_{n+1} = \frac{3}{2}u_n - \frac{1}{2}v_n + \frac{1}{2}w_n \\ v_{n+1} = 5u_n - \frac{5}{2}v_n + 2w_n \\ w_{n+1} = 4u_n - \frac{5}{2}v_n + 2w_n \end{cases}$$

Donnez des expressions de  $u_n, v_n$  et  $w_n$  en fonction de  $n$  et leurs limites quand  $n$  tend vers  $+\infty$ .

---

**+ ★ ★ Exercice 4.28 (Exercice 28)**

Soient  $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$ ,  $B \in \mathcal{M}_q(\mathbb{K})$  et  $C \in \mathcal{M}_{pq}(\mathbb{K})$ . On suppose connaître  $P$  un polynôme annulateur de  $A$  et  $Q$  un polynôme annulateur de  $B$ .

On pose  $M = \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{p+q}(\mathbb{K})$ .

- (1) Montrez que  $PQ$  est un polynôme annulateur de  $M$  dans le cas où  $C = 0$ .
  - (2) Montrez que ce résultat reste vrai même si  $C$  n'est pas nulle. Indication : penser à un produit par blocs.
- 

**+ ★ ★ Exercice 4.29 (Exercice 29)**

Soient  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  et  $P$  un polynôme annulateur de  $A$ . On définit  $B \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{K})$  par blocs :  $B = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ A & 0 \end{pmatrix}$ .

- (1) Calculez pour  $k \in \mathbb{N}$  la matrice  $B^k$  en distinguant les cas  $k$  pair et  $k$  impair.
  - (2) On pose  $Q(X) = P(X^2)$ . Montrez que  $Q$  est un polynôme annulateur de  $B$ .
- 

**+ ★ ★ Exercice 4.30 (Exercice 30)**

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ . On définit  $B \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{K})$  par blocs :  $B = \begin{pmatrix} A & A \\ A & A \end{pmatrix}$ .

- (1) Calculez pour  $k \in \mathbb{N}$  la matrice  $B^k$ .
- (2) Déterminez un polynôme annulateur de  $B$ .

---

**+ ★ ★ Exercice 4.31 (Exercice 31)**

Soient  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $E = \mathbb{K}_n[X]$ . On pose  $d : P \mapsto P'$ , endomorphisme de  $E$ , et  $f : P \mapsto P + P'$ .

- (1) Donnez un polynôme annulateur de  $d$ . Déduisez-en un polynôme annulateur de  $f$ .
- (2) Montrez que  $f$  est un automorphisme, puis exprimez son inverse à l'aide de  $f$ .
- (3) Vérifiez que  $f^{-1} = \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k d^k$ .

---

**+ ★ ★ Exercice 4.32 (Exercice 32)**

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ . Pour tout  $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ , on pose  $f(M) = M + \text{tr}(M)A$ .

- (1) Montrez que  $f$  est un endomorphisme de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .
- (2) Déterminez un polynôme annulateur de  $f$  de degré 2.
- (3) Dans quels cas  $f$  est-il un automorphisme ? Calculez  $f^{-1}$  quand c'est possible.
- (4) Dans le cas contraire, vérifiez que  $f$  est un projecteur et déterminez ses éléments caractéristiques.

---

**+ ★ ★ Exercice 4.33 (Exercice 33)**

Soient  $E$  un espace vectoriel réel de dimension finie et  $f \in \mathcal{L}(E)$ .

On suppose que  $f$  possède un polynôme annulateur  $P$  vérifiant  $P(0) = 0$  et  $P'(0) \neq 0$ .

Montrez qu'on a alors  $\text{Im } f \oplus \ker f = E$ .

---

**Exercice 4.34 (Oral CCINP, 1)**

Soient  $E$  un espace vectoriel de dimension finie et  $p, q$  deux endomorphismes de  $E$ .

On suppose que  $p + q = \text{id}_E$  et  $\text{rg } p + \text{rg } q \leq \dim E$ .

Montrez que  $p$  et  $q$  sont deux projecteurs.

---

**Exercice 4.35 (Oral IMT, 2)**

Soient  $E$  un espace vectoriel de dimension supérieure à 2 et  $f, g$  deux endomorphismes de  $E$  tels que  $f \circ g \circ f = f$ .

- (1) Montrez que  $f \circ g$  et  $g \circ f$  sont des projecteurs.

- (2) Que peut-on dire des rangs de  $f$ ,  $f \circ g$  et  $g \circ f$  ?
- (3) Montrez que  $f \circ g$  est un projecteur sur  $\text{Im } f$ , parallèlement à un sous-espace contenant  $\ker g$ .
- (4) On suppose désormais qu'on a aussi  $g \circ f \circ g = g$ . Que dire des rangs de  $f$  et  $g$  ?
- (5) Montrez que  $E = \text{Im } f \oplus \ker g$ .

### Exercice 4.36 (Oral TPE, 3)

Soient  $E$  un espace vectoriel de dimension  $n$  et  $f \in \mathcal{L}(E)$ .

- (1) Montrez que pour tout  $k \in \mathbb{N}$ ,  $\text{Im } f^{k+1} \subseteq \text{Im } f^k$ .
- (2) Montrez que s'il existe un entier  $p$  tel que  $\text{Im } f^{p+1} = \text{Im } f^p$ , alors pour tout  $k \in \mathbb{N}$ ,  $\text{Im } f^{p+k} \subseteq \text{Im } f^p$ .
- (3) Déduisez-en que  $\text{Im } f^{n+1} = \text{Im } f^n$ .

### Exercice 4.37 (Oral TPE, 4)

Montrez que  $P \mapsto P - P'$  est un automorphisme de  $\mathbb{R}[X]$  et donnez son endomorphisme réciproque.

### Exercice 4.38 (Oral Centrale, 5)

Soient  $E$  un espace vectoriel de dimension finie non-nulle et  $u, v$  deux endomorphismes de  $E$ .

- (1) Montrez que  $|\text{rg } u - \text{rg } v| \leq \text{rg } (u + v) \leq \text{rg } u + \text{rg } v$ .
- (2) Soient  $F$  un sous-espace de  $E$  et  $G, H$  deux supplémentaires de  $F$  dans  $E$ . On pose  $p$  le projecteur sur  $F$  parallèlement à  $G$  et  $q$  celui sur  $H$  parallèlement à  $F$ . Montrez que  $\text{rg } (p + q) = \text{rg } p + \text{rg } q$ .

### Exercice 4.39 (Oral Centrale, 6)

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie,  $(\varphi_1, \dots, \varphi_p)$  une famille libre de  $E^*$  (note :  $E^*$  est le  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel des formes linéaires sur  $E$ ) et  $\psi \in E^*$ .

- (1) Montrez que  $\psi \in \text{Vect}(\varphi_1, \dots, \varphi_p) \iff \bigcap_{i=1}^p \ker \varphi_i \subseteq \ker \psi$ .
- (2) On suppose que  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  ou  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ . Montrez que les conditions de la question précédente sont encore équivalentes à l'existence d'un réel  $M > 0$  tel que  $\forall x \in E, |\psi(x)| \leq M \max_{1 \leq i \leq p} |\varphi_i(x)|$ .

---

**Exercice 4.40 (Oral CCMP, 7)**

Soient  $n, k$  deux entiers tels que  $2 \leq k \leq n$ . On pose  $A_k = (a_{ij}^{(k)})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  telle que  $a_{ij}^{(k)} = 1$  si  $i - j = k - 1$ , les autres coefficients étant nuls.

(1) Calculez  ${}^t A_k A_k$ .

Soit  $p$  un projecteur de  $\mathbb{R}^n$  tel que  $p \neq \text{id}$ .

(2) Justifiez que  $\text{rg } p < n$ .

(3) Montrez que  $p$  est la composée de deux endomorphismes nilpotents.

---

**Exercice 4.41 (Oral CCMP, 8)**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et  $f, g$  deux endomorphismes de  $E$ .

On suppose  $f$  inversible et  $g$  de rang 1.

Montrez que  $f + g$  est inversible ssi  $\text{tr}(g \circ f^{-1}) \neq -1$ .

---

**Exercice 4.42 (Oral CCMP, 9)**

Soient  $(n, p) \in (\mathbb{N}^*)^2$ ,  $A \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{R})$  et  $B \in \mathcal{M}_{pn}(\mathbb{R})$ .

Montrez que  $p + \text{rg}(I_n + AB) = n + \text{rg}(I_p + BA)$ .

---

**Exercice 4.43 (Oral CCMP, 10)**

Soient  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ . On pose  $E = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid AMB = 0\}$ .

Montrez que  $E$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  et donnez sa dimension.

---

**Exercice 4.44 (Oral CCMP, 11)**

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . Résolvez dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  l'équation  $M = \text{Com } M$ .

# Chapitre 5

## Réduction des endomorphismes

### Sommaire

Exercices. . . . .	219
Problème – Matrices réelles sans valeur propre réelle. . . . .	233
Un cas particulier simple . . . . .	234
$(\beta) \Rightarrow (\alpha)$ . . . . .	234
$(\alpha) \Rightarrow (\beta)$ . . . . .	234
Un exemple . . . . .	235
Application . . . . .	236

### Exercices

- ★ Exercice proche du cours
- ★★ Exercice de difficulté normale
- ★★★ Exercice difficile (voire très difficile)
- + Exercice à faire en priorité

---

#### ★★ Exercice 5.1 (Exercice 1)

- (1) Soit  $P \in \mathbb{C}[X]$  tel que  $P$  ne soit pas constant. On note  $a_1, \dots, a_m$  les racines distinctes de  $P$  et  $\alpha_1, \dots, \alpha_m$  leurs ordres de multiplicité. Rappelez la décomposition en éléments simples de  $\frac{P'}{P}$ .
- (2) Application : déterminez les éléments propres de l'endomorphisme de  $\mathbb{C}[X]$  défini par  $f(P) = (2X + 1)P - (X^2 - 1)P'$ . On rappelle que la décomposition en éléments simples est unique.
- (3) Même question avec  $f(P) = (X^3 + X)P' - (3X^2 - 1)P$ .

---

#### ★★ Exercice 5.2 (Exercice 2)

Soit  $E = \mathcal{C}^0([0; 1], \mathbb{R})$ . Pour  $f \in E$ , on définit l'application  $\varphi(f) : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$  de la façon suivante :  $\varphi(f)(0) = f(0)$  et pour tout  $x \in ]0; 1]$ ,  $\varphi(f)(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$ .

- (1) Montrez que  $\varphi$  est un endomorphisme de  $E$ .
- (2) Montrez que 0 n'est pas valeur propre de  $\varphi$ .
- (3) Montrez que 1 est valeur propre de  $\varphi$  et donnez le sous-espace propre associé.
- (4) Déterminez les autres valeurs propres de  $\varphi$ .

### ★★ Exercice 5.3 (Exercice 3)

Soient  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \setminus \{0\}$  et  $\lambda \in \mathbb{K}$ . Pour  $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ , on pose  $f(M) = \lambda M + \text{tr}(M) A$ .

- (1) Justifiez rapidement que  $f$  est un endomorphisme de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .
- (2) Déterminez un polynôme annulateur de  $f$  de degré 2.
- (3) Déduisez-en les éléments propres de  $f$ .
- (4) À quelle condition l'endomorphisme  $f$  est-il inversible ?

### ★★ Exercice 5.4 (Exercice 4)

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ . Pour  $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ , on pose  $f(M) = AM$ .

Montrez que  $\text{Sp}(f) = \text{Sp}(A)$ . Pour tout  $\lambda$  valeur propre de  $f$ , donnez une relation entre les dimensions des sous-espaces propres  $\text{sep}(f, \lambda)$  et  $\text{sep}(A, \lambda)$ .

### ★★ Exercice 5.5 (Exercice 5, matrices stochastiques)

Soit  $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  une matrice stochastique, c'est-à-dire vérifiant :

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1 ; n \rrbracket^2, \quad a_{ij} \geq 0 \text{ et } \forall i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, \quad \sum_{j=1}^n a_{ij} = 1.$$

- (1) Montrez que 1 est valeur propre de  $A$ .
- (2) Montrez que toutes les valeurs propres complexes de  $A$  sont de module inférieur ou égal à 1.
- (3) On suppose que  $A$  est strictement stochastique, c'est-à-dire que  $A$  est stochastique et que ses coefficients sont strictement positifs. Montrez que 1 est la seule valeur propre de  $A$  de module 1.

---

**★★ Exercice 5.6 (Exercice 6)**  
 Soient  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$  tel que  $a \neq b$  et  $A = \begin{pmatrix} 0 & a & \dots & a \\ b & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & a \\ b & \dots & b & 0 \end{pmatrix}$ .

- (1) On pose  $J$  la matrice remplie de 1. Montrez que  $t \mapsto \det(XI_n - A - tJ)$  est une fonction polynôme en  $t$  de degré au plus 1, puis calculez  $\det(XI_n - A - tJ)$  en fonction de  $t$ .
- (2) Montrez que le polynôme caractéristique de  $A$  est  $\frac{1}{b-a} (b(X+a)^n - a(X+b)^n)$ .
- (3) Montrez que si  $b = -a$ , alors les images dans  $\mathbb{C}$  des valeurs propres de  $A$  sont sur une droite que vous préciserez, sinon elles sont sur un cercle.

---

**★★ Exercice 5.7 (Exercice 7)**

Soient  $n \geq 2$ ,  $U \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$  et  $A = U^t U$ . On note  ${}^t U U = (s)$  qui est une matrice carrée à un seul élément.

- (1) Montrez que le polynôme  $X^2 - sX$  est annulateur de  $A$ . Déduisez-en que  $A$  a au plus deux valeurs propres.
- (2) Quel est le rang de  $A$ ? Précisez les valeurs propres de  $A$ .
- (3) Déterminez le polynôme caractéristique de  $A$ .
- (4) Déterminez les sous-espaces propres de  $A$ .

---

**★ Exercice 5.8 (Exercice 8)**

Soit  $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -3 & 4 & -3 \\ -4 & 4 & -4 \end{pmatrix}$ .

- (1) Déterminez le polynôme caractéristique de  $A$ .
- (2) Déduisez-en sans calcul supplémentaire que  $A$  est diagonalisable.
- (3) Déterminez les sous-espaces propres de  $A$ .
- (4) Diagonalisez  $A$ , c'est-à-dire explicitiez une matrice  $P$  inversible et une matrice  $D$  diagonale telles que  $A = PDP^{-1}$ .
- (5) Calculez  $A^n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

---

★ **Exercice 5.9 (Exercice 9, réduction en élégance)**

Soit  $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 4 & -6 \\ 4 & 8 & -12 \end{pmatrix}$ .

- (1) Calculez efficacement le rang de  $B$ . Déduisez-en une valeur propre de  $B$  ainsi que la dimension du sous-espace propre associé.
- (2) Démontrez sans calculer le polynôme caractéristique que  $B$  admet une autre valeur propre et qu'elle est simple.
- (3) Déduisez-en le polynôme caractéristique de  $B$ . Vérifiez le résultat en le calculant grâce à sa définition.
- (4) La matrice  $B$  est-elle diagonalisable ?

---

★ **Exercice 5.10 (Exercice 10)**

Les matrices suivantes sont-elles diagonalisables ?

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad E = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 6 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 7 & 3 \\ 4 & 4 & 4 & 8 \end{pmatrix}$$

---

★ **Exercice 5.11 (Exercice 11)**

Les matrices suivantes sont-elles diagonalisables ?

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & -8 \\ 0 & 1 & 5 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

---

★ **Exercice 5.12 (Exercice 12)**

Déterminez une condition nécessaire et suffisante sur le triplet  $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$  pour que la matrice

$$M = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix} \text{ soit diagonalisable.}$$



---

★ Exercice 5.13 (Exercice 13)

Soit  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$  une matrice de  $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$  qui n'est pas de la forme  $\lambda I_2$ .

Montrez que  $A$  est diagonalisable dans  $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$  ssi  $(a-d)^2 + 4bc \neq 0$ .

À quelle condition  $A$  est-elle diagonalisable dans  $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$  ?

---

★★ Exercice 5.14 (Exercice 14)

Soit  $A = \begin{pmatrix} 11 & -5 & -5 \\ -5 & 3 & 3 \\ -5 & 3 & 3 \end{pmatrix}$ . On recherche les éventuelles racines carrées de  $A$ , c'est-à-dire les matrices  $R \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$  telles que  $R^2 = A$ .

- (1) Montrez que  $A$  est diagonalisable et déterminez une matrice  $D$  diagonale semblable à  $A$  avec le moins de calculs possible.
  - (2) Soit  $S \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$  une racine carrée de  $D$ . Montrez que  $S$  et  $D$  commutent puis montrez que  $S$  est diagonale.
  - (3) Déterminez les racines carrées  $S$  de  $D$ .
  - (4) Déduisez-en toutes les racines carrées  $R$  de  $A$ . Combien y en a-t-il ? Pourquoi ?
  - (5) Énoncez des conjectures quant au nombre de racines carrées d'une matrice  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  plus générale, en discutant selon la nature de ses éléments propres.
- 

★★ Exercice 5.15 (Exercice 15)

Soit  $u$  l'endomorphisme canoniquement associé à la matrice  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & -1 \end{pmatrix}$ .

- (1) Diagonalisez la matrice  $A$ .
- (2) On suppose que  $F$  est un sous-espace de  $\mathbb{R}^3$  stable par  $u$ . Montrez que  $F$  est engendré par une famille de vecteurs propres de  $u$ .
- (3) Déterminez tous les sous-espaces de  $\mathbb{R}^3$  stables par  $u$ .

---

★ Exercice 5.16 (Exercice 16)

Même exercice avec  $A = \begin{pmatrix} -1 & -6 & -2 \\ 2 & 7 & 2 \\ -6 & -18 & -5 \end{pmatrix}$ .

---

★ Exercice 5.17 (Exercice 17)

Montrez que les suites  $(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  vérifiant la relation de récurrence suivante sont combinaisons linéaires de trois suites géométriques réelles  $(\alpha^n)$ ,  $(\beta^n)$  et  $(\gamma^n)$  :  $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+3} = -\frac{5}{12}u_{n+2} + \frac{1}{2}u_{n+1} - \frac{1}{12}u_n$ .

Déterminez à quelle condition sur  $(u_0, u_1, u_2)$  ces suites sont convergentes.

---

★ Exercice 5.18 (Exercice 18)

Même exercice avec  $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+3} = \frac{3}{2}u_{n+2} - \frac{3}{4}u_{n+1} + \frac{1}{4}u_n$  en prenant des suites géométriques complexes.

Montrez que les suites  $(u_n)$  sont combinaisons linéaires de trois suites réelles simples que l'on précisera. Déterminez à quelle condition sur  $(u_0, u_1, u_2)$  ces suites sont convergentes.

---

★ Exercice 5.19 (Exercice 19)

Les matrices suivantes sont-elles trigonalisables ? Donnez alors, quand c'est possible, une matrice triangulaire supérieure semblable.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 0 & 6 & -3 \\ -1 & 4 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & -2 \\ 3 & -1 & -2 \end{pmatrix}$$

---

★ Exercice 5.20 (Exercice 20)

Soient  $C = \begin{pmatrix} 2 & -3 & -1 \\ 1 & -2 & -1 \\ -2 & 6 & 3 \end{pmatrix}$  et  $T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ .

- (1) Déterminez le polynôme caractéristique de  $C$ . Est-elle diagonalisable ? Trigonalisable ?
- (2) Déterminez les éléments propres de  $C$ .
- (3) Montrez que la matrice  $C$  est semblable à la matrice  $T$ . On pourra considérer l'endomorphisme  $u$  canoniquement associé à  $C$  et construire, par analyse-synthèse, une base  $\mathcal{B}$  où la matrice de  $u$  est  $T$ .

- (4) Montrez que  $T$  peut s'écrire  $D + N$  où  $D$  est diagonale,  $N$  est nilpotente et  $D$  et  $N$  commutent. Déduisez-en, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $T^n$  puis  $C^n$ .
- (5) On considère trois suites  $(x_n), (y_n), (z_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  telles que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \begin{cases} x_{n+1} = 2x_n - 3y_n - z_n \\ y_{n+1} = x_n - 2y_n - z_n \\ z_{n+1} = -2x_n + 6y_n + 3z_n \end{cases}$$

Explicitez  $x_n, y_n, z_n$  en fonction de  $n$  et de  $x_0, y_0, z_0$ .

### ★★ Exercice 5.21 (Exercice 21)

Soit  $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$  tel que  $u^2 + u + \text{id}_{\mathbb{R}^n} = 0$ .

- (1) Soient  $F$  un sous-espace stable par  $u$  et  $x \notin F$ . Montrez que  $\Pi_x = \text{Vect}(x, u(x))$  est un plan, qu'il est stable par  $u$  et qu'il est en somme directe avec  $F$ .
- (2) Montrez qu'il existe une base de  $\mathbb{R}^n$  dans laquelle la matrice de  $u$  est diagonale par blocs, de blocs  $R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ . Qu'en déduisez-vous concernant  $n$ ?
- (3) Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  la matrice de  $u$  dans la base canonique. Réduisez  $A$  dans  $\mathbb{C}$ .
- (4) Retrouvez que  $A$  est  $\mathbb{R}$ -semblable à une matrice diagonale par blocs, de blocs  $R$ .

### ★★ Exercice 5.22 (Exercice 22)

Soient  $p \in \mathbb{N}^*$ ,  $E$  un  $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension finie et  $f \in \text{GL}(E)$ .

Montrez que  $f$  est diagonalisable ssi  $f^p$  est diagonalisable.

Est-ce encore vrai si on remplace  $\mathbb{C}$  par  $\mathbb{R}$ ?

### ★★ Exercice 5.23 (Exercice 23)

Soient  $E$  un  $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension finie et  $f \in \mathcal{L}(E)$ .

- (1) Montrez que si  $f$  est diagonalisable, alors  $f^2$  est diagonalisable et  $\text{rg } f^2 = \text{rg } f$ .
- (2) Montrez que si  $\lambda$  est une valeur propre de  $f^2$  non-nulle et  $\mu$  est une racine carrée de  $\lambda$ , alors  $\text{sep}(f^2, \lambda) = \ker(f - \mu \text{id}) \oplus \ker(f + \mu \text{id})$ .
- (3) Montrez que la réciproque de la proposition de la question (1) est vraie.

---

**★★ Exercice 5.24 (Exercice 24, spectre du polynôme d'une matrice)**

Soient  $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  diagonalisable et  $Q \in \mathbb{K}[X]$ .

- (1) Montrez que la matrice  $Q(M)$  est également diagonalisable. Exprimez le spectre de  $Q(M)$  en fonction des valeurs propres de  $M$ .
- (2) Précisez les sous-espaces propres de  $Q(M)$ .
- (3) Ces résultats restent-ils valables si  $M$  est seulement trigonalisable ? Sans hypothèse sur  $M$  ?

---

**★★★ Exercice 5.25 (Exercice 25)**

Soit  $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{Z})$ . On suppose qu'il existe  $p \in \mathbb{N}^*$  tel que  $A^p = I_2$ . Montrez que  $A^{12} = I_2$ .

---

**★★ Exercice 5.26 (Exercice 26)**

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ . Montrez que  $A$  est nilpotente ssi pour tout  $k \in \mathbb{N}^*$ ,  $\text{tr } A^k = 0$ .

---

**★★ Exercice 5.27 (Exercice 27)**

Soit  $f$  un endomorphisme diagonalisable d'un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel  $E$  de dimension finie. On note  $C(f)$  le sous-espace vectoriel des endomorphismes de  $E$  qui commutent avec  $f$ .

- (1) Démontrez que  $g \in C(f)$  ssi les sous-espaces propres de  $f$  sont stables par  $g$ .
- (2) Déduisez-en que  $\dim C(f) = \sum_{\lambda \in \text{Sp}(f)} \omega_\lambda^2$  où  $\omega_\lambda$  désigne la multiplicité de la valeur propre  $\lambda$ .
- (3) On suppose que les valeurs propres de  $f$  sont simples. Démontrez que  $(\text{id}, f, \dots, f^{n-1})$  est une base de  $C(f)$ .

---

**★★ Exercice 5.28 (Exercice 28)**

- (1) Montrez que  $\text{GL}_n(\mathbb{K})$  est un ouvert dense de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .
- (2) Montrez que  $\text{GL}_n(\mathbb{C})$  est connexe par arcs et que  $\text{GL}_n(\mathbb{R})$  ne l'est pas. Déterminez alors les composantes connexes par arcs de  $\text{GL}_n(\mathbb{R})$ .
- (3) Montrez que l'ensemble  $D_n(\mathbb{C})$  des matrices diagonalisables de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  est dense dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ . Montrez la même chose avec l'ensemble  $D_n^+(\mathbb{C})$  des matrices de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  dont toutes les valeurs propres sont distinctes. Montrez que l'intérieur de  $D_n(\mathbb{C})$  est  $D_n^+(\mathbb{C})$ .
- (4) Montrez que  $D_2(\mathbb{R})$  n'est pas dense dans  $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ .

- (5) Montrez que l'ensemble des matrices trigonalisables de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  est un fermé et qu'il est l'adhérence de  $\mathcal{D}_n(\mathbb{R})$ .
- (6) Soit  $r \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$ . Montrez que l'ensemble des matrices de rang inférieur à  $r$  est un fermé et qu'il est l'adhérence de l'ensemble des matrices de rang  $r$ .

★★★ Exercice 5.29 (Exercice 29)

Soient  $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

- (1) Montrez que si l'une des deux matrices est inversible, alors  $AB$  et  $BA$  ont les mêmes valeurs propres avec les mêmes ordres de multiplicité.
- (2) Montrez que ce résultat reste vrai même sans suppose l'une des deux matrices inversible.

Exercice 5.30 (Oral IMT, 1)

Soient  $u, v, w$  trois suites vérifiant

$$\forall n \in \mathbb{N}, \begin{cases} u_{n+1} = 4u_n - 3v_n - 3w_n \\ v_{n+1} = 3u_n - 2v_n - 3w_n \\ w_{n+1} = 3u_n - 3v_n - 2w_n \end{cases}$$

Exprimez  $u_n, v_n, w_n$  en fonction de  $n, u_0, v_0, w_0$ .

Exercice 5.31 (Oral IMT, 2)

Déterminez les matrices  $M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$  telles que  $M^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ .

Exercice 5.32 (Oral St-Cyr, 3)

Montrez que la matrice  $A = \begin{pmatrix} a & 0 & b \\ 0 & a+b & 0 \\ b & 0 & a \end{pmatrix}$  est diagonalisable et donnez ses éléments propres.

Exercice 5.33 (Oral TPE, 4)

Soient  $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$  et  $A = \begin{pmatrix} 0 & -a & -b \\ a & 0 & -c \\ b & c & 0 \end{pmatrix}$ .

- (1) Déterminez un polynôme annulateur de degré 3 de  $A$ .

- (2) La matrice  $A$  est-elle inversible ?
- (3) Est-elle diagonalisable ?
- (4) Montrez que les valeurs propres de  $A^2$  sont négatives ou nulles.

**Exercice 5.34 (Oral TPE, 5)**

Montrez de deux façons différentes que  $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$  et  $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$  sont semblables.

**Exercice 5.35 (Oral IMT, 6)**

Soit  $\alpha \in \mathbb{R}$ . Déterminez la limite quand  $n \rightarrow +\infty$  de  $\begin{pmatrix} \cos \alpha/n & \sin \alpha/n \\ \sin \alpha/n & \cos \alpha/n \end{pmatrix}^n$ .

**Exercice 5.36 (Oral IMT, 7)**

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  telle que  $A^2 - 2A$  soit diagonalisable et 1 n'est pas valeur propre de  $A$ .

Montrez que  $A$  est diagonalisable.

**Exercice 5.37 (Oral CCINP, 8)**

(1) Soient  $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  et  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  ses valeurs propres. Montrez que  $\text{tr } M^2 = \sum_{i=1}^n \lambda_i^2$ .

(2) Pour  $n \geq 3$ , on pose  $A$  la matrice dont tous les coefficients sont nuls, sauf ceux situés sur les quatre bords, égaux à 1. Déterminez les valeurs propres et les vecteurs propres de  $A$ .

**Exercice 5.38 (Oral CCINP, 9)**

Soient  $\alpha \in \mathbb{C}$  et  $A = \left( \alpha^{i+j-2} \right)_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ .

- (1) Calculez le rang de  $A$ . Déduisez-en ses valeurs propres.
- (2) À quelle condition sur  $\alpha$  la matrice  $A$  est-elle diagonalisable ?

**Exercice 5.39 (Oral CCINP, 10)**

Soient  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $f$  l'endomorphisme de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  tel que  $f(M) = M + 2 {}^t M$ .

- (1) Déterminez les valeurs et vecteurs propres de  $f$ .
- (2) L'endomorphisme  $f$  est-il diagonalisable ? Calculez sa trace et son déterminant.

---

**Exercice 5.40 (Oral Navale, 11)**

Soit  $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ . Montrez que 1 est la seule valeur propre de  $M$  ssi pour tout  $k \in \mathbb{N}^*$ ,  $\text{tr } M^k = n$ .

---

**Exercice 5.41 (Oral Navale, 12)**

- (1) Diagonalisez la matrice  $\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ .
- (2) Soient  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ ,  $B = \begin{pmatrix} A & 4A \\ A & A \end{pmatrix}$  et  $C = \begin{pmatrix} -A & 0 \\ 0 & 3A \end{pmatrix}$ . Montrez que  $B$  et  $C$  sont semblables.

---

**Exercice 5.42 (Oral CCINP, 13)**

Soient  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  et  $B = \begin{pmatrix} 0 & A \\ I_n & 0 \end{pmatrix}$ .

- (1) Exprimez le rang de  $B$  en fonction du rang de  $A$ .
- (2) Trouvez une relation entre  $\chi_A$  et  $\chi_B$ . Déduisez-en le spectre de  $B$  en fonction de celui de  $A$ .
- (3) Déterminez les dimensions des sous-espaces propres de  $B$  en fonction de celles des sous-espaces propres de  $A$ .
- (4) Montrez que  $B$  est diagonalisable ssi  $A$  est diagonalisable et inversible.

---

**Exercice 5.43 (Oral IMT, 14)**

Soient  $E$  un espace muni d'une base  $(e_1, \dots, e_n)$ ,  $v$  un vecteur de  $E$  et  $f$  l'endomorphisme de  $E$  tel que  $f(e_1) = \dots = f(e_n) = v$ .

- (1) Quel est le rang de  $f$ ?
- (2) Discutez de la diagonalisabilité de  $f$  en fonction du vecteur  $v$ .

---

**Exercice 5.44 (Oral CCINP, 15)**

- (1) Montrez que si deux matrices  $U$  et  $V$  sont semblables, alors pour tout polynôme  $R$ ,  $R(U)$  et  $R(V)$  sont semblables.

Soient  $A, B$  deux matrices de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  telles que  $AB = BA$ . On pose  $M = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & A \end{pmatrix}$ .

- (2) Pour  $P \in \mathbb{C}[X]$ , exprimez  $P(M)$  en fonction de  $P(A)$ ,  $P'(A)$  et  $B$ .

(3) Montrez que si  $A$  est diagonalisable et  $B$  est nulle, alors  $M$  est diagonalisable.

(4) Montrez la réciproque.

---

**Exercice 5.45 (Oral CCMP, 16)**

(1) Soient  $A$  et  $B$  deux matrices de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  telles que  $A^2 = B^2 = 0$  et  $\operatorname{rg} A = \operatorname{rg} B$ . Montrez que  $A$  et  $B$  sont semblables.

(2) Le résultat subsiste-t-il avec les hypothèses  $A^3 = B^3 = 0$  et  $\operatorname{rg} A = \operatorname{rg} B$  ?

---

**Exercice 5.46 (Oral CCMP, 17)**

Soient  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  tels que  $(AB)^n = 0$ . Montrez que  $(BA)^n = 0$ .

---

**Exercice 5.47 (Oral CCMP, 18)**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et  $u, v \in \mathcal{L}(E)$ .

(1) On suppose que  $\operatorname{Vect}(u, v)$  contient un élément inversible. Montrez que  $\ker u \cap \ker v = \{0\}$ .

(2) Montrez que la réciproque est fausse.

(3) Montrez que si  $u$  et  $v$  commutent, alors la réciproque est vraie.

---

**Exercice 5.48 (Oral CCMP, 19)**

Soient  $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$  non-nul tel que  $u^3 = u^2$  et  $C(u) = \{v \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3) \mid u \circ v = v \circ u\}$ .

Montrez que  $C(u)$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$  et déterminez sa dimension.

---

**Exercice 5.49 (Oral CCMP, 20)**

Soient  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  et  $\varphi$  l'endomorphisme de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  défini par  $\varphi : M \mapsto M + \operatorname{tr}(AM)A$ .

(1) Étudiez la diagonalisabilité de  $\varphi$ .

(2) Calculez  $\operatorname{tr} \varphi$  et  $\det \varphi$ .



---

**Exercice 5.50 (Oral CCMP, 21)**

Pour  $c \in \mathbb{R}$ , on pose  $A(c) = \begin{pmatrix} -c & -1 & c \\ -1 & 1-c & 1 \\ c & -1 & -c \end{pmatrix}$ .

- (1) Déterminez les réels  $c$  tels que  $A(c)$  ne pas diagonalisable.
- (2) Soit  $d$  la plus petite de ces valeurs. Trouvez  $P$  inversible telle que  $P^{-1}A(d)P$  soit triangulaire.

---

**Exercice 5.51 (Oral CCMP, 22)**

- (1) Soit  $x = \cos \frac{2\pi}{5}$ . Déterminez une équation du second degré à coefficients rationnels dont  $x$  est racine, puis donnez les valeurs de  $x$  et  $\cos \frac{4\pi}{5}$ .
- (2) Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  telle que  $A^4 + A^3 + A^2 + A + I_n = 0$ . On suppose que la trace de  $A$  est un rationnel. Montrez que 4 divise  $n$ .

---

**Exercice 5.52 (Oral CCMP, 23)**

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  telle que  $A^3 = A + I_n$ . Montrez que  $\det A > 0$ .

---

**Exercice 5.53 (Oral CCMP, 24)**

Soient  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  et  $B = \begin{pmatrix} A & A \\ 0 & A \end{pmatrix}$ . Déterminez une condition nécessaire et suffisante sur  $A$  pour que  $B$  soit diagonalisable.

---

**Exercice 5.54 (Oral CCMP, 25)**

Soient  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  et  $B = \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ A & A \end{pmatrix}$ . On suppose que  $B$  est diagonalisable. Montrez que  $A$  est diagonalisable et que  $I_n - A$  est inversible.

---

**Exercice 5.55 (Oral CCMP, 26)**

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ . On suppose qu'il existe  $P \in \mathbb{C}[X]$  tel que  $P(A)$  est diagonalisable et  $P'(A)$  est inversible. Montrez que  $A$  est diagonalisable.

---

**Exercice 5.56 (Oral CCMP, 27)**

Soit  $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  définie par  $a_{ii} = 0$  et  $a_{ij} = i$  si  $i \neq j$ .

- (1) Montrez qu'un réel  $\lambda$  est valeur propre de  $A$  ssi  $\sum_{k=1}^n \frac{k}{k+\lambda} = 1$ .
- (2) Montrez que  $A$  est diagonalisable. Listez ses valeurs propres avec un encadrement le plus précis possible.
- (3) Déterminez la somme des valeurs propres de  $A$ . On note  $\mu_n$  la plus grande d'entre elles. Trouvez  $C \in \mathbb{R}$  tel que  $\mu_n \sim Cn^2$  quand  $n$  tend vers l'infini.

---

**Exercice 5.57 (Oral Centrale, 28)**

À quelles conditions  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 & 0 \\ b & c & 2 & 0 \\ d & e & f & 2 \end{pmatrix}$  est-elle diagonalisable ? Le cas échéant, diagonalisez  $A$ .

---

**Exercice 5.58 (Oral Centrale, 29)**

Soient  $a, b, c \in \mathbb{R}$  et  $A = \begin{pmatrix} 0 & a & b & c \\ a & 0 & c & b \\ b & c & 0 & a \\ c & b & a & 0 \end{pmatrix}$ .

- (1) Donnez un vecteur propre évident de  $A$ .
- (2) Calculez le polynôme caractéristique de  $A$  et donnez son spectre. Justifiez que  $A$  est diagonalisable.
- (3) Exprimez, lorsqu'elle existe, la matrice inverse  $A^{-1}$  en fonction de  $I_4$ ,  $A$ ,  $A^2$  et  $A^3$ .

---

**Exercice 5.59 (Oral Centrale, 30)**

Soient  $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  telles que pour tout  $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ ,  $\chi_{AM+B} = \chi_{AM}$ .

- (1) Montrez qu'il existe un entier  $p \in \mathbb{N}^*$  tel que  $B^p = 0$ .
- (2) Montrez que  $BA = 0$ .
- (3) Réciproquement, soient  $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  telles que  $B^n = BA = 0$ . Montrez que pour tout  $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ ,  $\chi_{AM+B} = \chi_{AM}$ .

---

**Exercice 5.60 (Oral Centrale, 31)**

Soient  $\theta_1, \dots, \theta_p$  des réels distincts modulo  $2\pi$  et  $m_1, \dots, m_p$  des complexes non-nuls. Le but de l'exercice est de montrer que la suite  $(m_1 e^{i\theta_1 n} + \dots + m_p e^{i\theta_p n})$  ne converge pas vers 0.

Par l'absurde, on suppose que  $m_1 e^{i\theta_1 n} + \dots + m_p e^{i\theta_p n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ .

(1) On note  $M_n = \begin{pmatrix} e^{i\theta_1 n} & \dots & e^{i\theta_p n} \\ \vdots & & \vdots \\ e^{i\theta_1(n+p-1)} & \dots & e^{i\theta_p(n+p-1)} \end{pmatrix}$ . Montrez que  $Y_n = M_n \begin{pmatrix} m_1 \\ \vdots \\ m_p \end{pmatrix} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ .

(2) Montrez que  $|\det M_n|$  est une constante non-nulle.

(3) À l'aide du théorème de Cayley-Hamilton, exprimez  $M^{-1}$  et trouvez une contradiction.

---

**Exercice 5.61 (Oral ENS, 32)**

On considère un automorphisme  $\alpha$  de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  qui conserve le produit matriciel, c'est-à-dire tel que pour tout  $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ ,  $\alpha(AB) = \alpha(A)\alpha(B)$ .

(1) Montrez que  $\alpha(I_n) = I_n$ .

(2) Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  diagonalisable. Montrez que  $\alpha(A)$  l'est aussi.

(3) On suppose que  $A$  est semblable à une matrice diagonale  $D$  à coefficients diagonaux tous distincts. Montrez que  $\alpha(A)$  est, elle aussi, semblable à  $D$ .

(4) Justifiez l'existence de  $P \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$  telle que  $\alpha(D) = PDP^{-1}$  puis montrez que  $\alpha(E) = PEP^{-1}$  pour toute matrice diagonale  $E$ .

(5) Déterminer  $\alpha$ .

## Problème – Matrices réelles sans valeur propre réelle

Dans ce problème,  $n$  désigne un entier naturel non-nul. Pour alléger les notations, on pose  $E_n = \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$ . La lettre  $X$  est utilisée ici pour désigner une matrice-colonne, on évitera donc de l'utiliser pour désigner l'indéterminée des polynômes qui sera pour une fois notée  $x$ .

Si  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ , on pose  $S(a, b) = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$ .

Toute matrice  $Z$  à coefficients complexes de  $\mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{C})$  peut s'écrire de manière unique sous la forme  $X+iY$  où  $X, Y$  sont deux matrices réelles de  $\mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{R})$ . On appelle conjuguée de  $Z$  la matrice  $\bar{Z} = X-iY$ .

D'après les propriétés de la conjugaison dans  $\mathbb{C}$ , on en déduit que les règles de calcul sont les mêmes :  $\overline{Z_1 + Z_2} = \bar{Z}_1 + \bar{Z}_2$ ,  $\overline{\lambda Z} = \bar{\lambda} \bar{Z}$  et  $\overline{Z_1 \cdot Z_2} = \bar{Z}_1 \cdot \bar{Z}_2$ .

Soit  $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ . On veut montrer l'équivalence entre les propositions suivante :

( $\alpha$ ) il existe  $(a_1, b_1, \dots, a_m, b_m) \in \mathbb{R}^{2m}$  tel que  $M$  soit semblable dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  à la matrice diagonale par blocs

$$\text{diag}(S(a_1, b_1), \dots, S(a_m, b_m)) = \begin{pmatrix} S(a_1, b_1) & 0 & \dots & 0 \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ & 0 & \ddots & 0 \\ & \vdots & \ddots & S(a_m, b_m) \end{pmatrix}$$

( $\beta$ ) il existe un polynôme de  $\mathbb{R}[x]$  annulateur de  $M$  à racines simples non-réelles.

## Un cas particulier simple

Soit  $\omega$  un complexe non-réel. On pose  $f : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$  définie par  $f(z) = \omega z$ .

Vérifiez que  $f$  est un endomorphisme du  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel  $\mathbb{C}$ , que  $f$  a un polynôme annulateur réel à racines simples non-réelles et que sa matrice dans une base de  $\mathbb{C}$  bien choisie est une matrice  $S(a, b)$ .

( $\beta$ )  $\implies$  ( $\alpha$ )

### Question 1

Soit  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$  tel que  $b \neq 0$ . Montrez qu'il existe un polynôme de  $\mathbb{R}[x]$  annulateur de  $S(a, b)$  à racines simples non-réelles.

### Question 2

Montrez l'implication ( $\beta$ )  $\implies$  ( $\alpha$ ).

( $\alpha$ )  $\implies$  ( $\beta$ )

Dans cette partie,  $M$  est une matrice de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  qui annule un polynôme réel à racines simples non-réelles. On appelle  $f$  l'endomorphisme de  $E_n$  de matrice  $M$  dans la base canonique de  $E_n$  (autrement dit, pour tout  $Z \in E_n$ ,  $f(Z) = MZ$ ).

### Question 3

Soient  $z \in \mathbb{C}^*$  et  $\lambda \in \mathbb{C}$  tel que  $\bar{z} = \lambda z$ . Montrez qu'il existe  $\theta \in \mathbb{R}$  tel que  $\lambda = e^{2i\theta}$  et  $e^{i\theta}z$  est un réel.

### Question 4

Montrez que  $n$  est pair. On note  $n = 2m$ .

---

**Question 5**

Montrez que si  $\lambda$  est une valeur propre de  $M$ , alors  $\bar{\lambda}$  en est une aussi, puis que les sous-espaces propres  $\text{sep}(M, \lambda)$  et  $\text{sep}(M, \bar{\lambda})$  ont la même dimension.

---

**Question 6**

Soient  $\lambda \in \mathbb{C}$  une valeur propre de  $M$  et  $Z$  un vecteur propre de  $M$ .

- (a) Montrez que  $\text{Vect}(Z, \bar{Z})$  est un plan stable par  $f$ .
  - (b) On pose  $Z = X + iY$  où  $X, Y$  sont des matrices réelles. Montrez que  $(X, Y)$  est une base de ce plan.
  - (c) Montrez qu'il existe  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$  tel que  $b \neq 0$  et l'endomorphisme induit par  $f$  dans ce plan a pour matrice  $S(a, b)$  dans la base  $(X, Y)$ .
- 

**Question 7**

Soit  $\lambda \in \mathbb{C}$  une valeur propre de  $M$ . On choisit une base  $(Z_1, \dots, Z_p)$  de  $\text{sep}(M, \lambda)$  et on écrit chaque vecteur sous la forme  $Z_k = X_k + iY_k$  où  $X_k, Y_k$  sont réelles.

Montrez que les plans  $(\text{Vect}(X_k, Y_k))_{1 \leq k \leq p}$  sont en somme directe et que  $\text{sep}(M, \lambda) \oplus \text{sep}(M, \bar{\lambda}) = \bigoplus_{k=1}^p \text{Vect}(X_k, Y_k)$ .

---

**Question 8**

Montrez qu'il existe une base de  $E_n$  constituée de vecteurs réels dans laquelle la matrice de  $f$  est égale à une matrice diagonale par blocs  $D = \text{diag}(S(a_1, b_1), \dots, S(a_m, b_m))$ .

Montrez enfin qu'il existe une matrice  $P \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$  telle que  $M = PDP^{-1}$ .

**Un exemple**

On pose  $M = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 4 & 0 \\ 1 & -3 & 0 & 4 \\ -2 & 0 & 5 & -2 \\ 0 & -2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ .

---

**Question 9**

On écrit  $xI_4 - M$  par blocs  $(2, 2)$  :  $xI_4 - M = \begin{pmatrix} A & -4I_2 \\ 2I_2 & B \end{pmatrix}$ .

- (1) Calculez le produit par blocs  $\begin{pmatrix} -4I_2 & A \\ B & 2I_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2I_2 & 0 \\ B & I_2 \end{pmatrix}$ . Déduisez-en que  $\det(xI_4 - M) = \det(AB + 8I_2)$ .
- (2) Explicitez le polynôme caractéristique de  $M$ . Déterminez ses racines imaginaires pures, puis les autres racines.

---

**Question 10**

Montrez que  $M$  annule un polynôme réel à racines simples non-réelles.

Vérifiez que les vecteurs-colonnes  $\begin{pmatrix} 2 \\ 1+i \\ 2 \\ 1+i \end{pmatrix}$  et  $\begin{pmatrix} 4 \\ 2-2i \\ 2 \\ 1-i \end{pmatrix}$  sont des vecteurs propres de  $M$ , puis donnez une matrice  $P \in \text{GL}_4(\mathbb{R})$  et une matrice réelle diagonale par blocs  $D$  telle que  $M = PDP^{-1}$ .

## Application

Dans cette partie, on suppose que  $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  annule un polynôme de  $\mathbb{R}[x]$  à racines simples dans  $\mathbb{C}$ . On garde les notations introduites précédemment.

On note  $\text{Sp}_{\mathbb{R}}(M)$  l'ensemble des valeurs propres réelles et  $\text{Sp}_{\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}}(M)$  l'ensemble des valeurs propres complexes non-réelles de  $M$ .

---

**Question 11**

On pose  $G = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{R}}(M)} \text{sep}(M, \lambda)$  et  $H = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}}(M)} \text{sep}(M, \lambda)$ . Par convention, si  $M$  n'a pas de valeur propre réelle, alors  $G = \{0\}$  et si  $M$  n'a que des valeurs propres réelles, alors  $H = \{0\}$ .

Montrez que  $G$  et  $H$  sont supplémentaires dans  $E_n$  et qu'ils sont stables par  $f$ .

On note  $g$  et  $h$  les endomorphismes induits par  $f$  dans  $G$  et  $H$  respectivement.

---

**Question 12**

Montrez qu'il existe une base  $\mathcal{B}$  de  $E_n$  telle que  $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = R = \begin{pmatrix} D & 0 \\ 0 & S \end{pmatrix}$  où  $D$  est une matrice diagonale réelle et  $S$  une matrice diagonale par blocs  $\text{diag}(S(a_1, b_1), \dots, S(a_m, b_m))$ . On remarque que  $R$  est une matrice réelle.

---

**Question 13**

Un exercice classique : soit  $(U, V) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})^2$ .

- (1) Justifiez que la fonction  $x \mapsto \det(U + xV)$  est une fonction polynôme.
- (2) Montrez que s'il existe  $z \in \mathbb{C}$  tel que  $\det(U + zV) \neq 0$ , alors il existe  $x \in \mathbb{R}$  tel que  $\det(U + xV) \neq 0$ .

Application : soit  $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})^2$  tel que  $A$  et  $B$  soient semblables dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  ; montrez qu'elles sont alors semblables dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ .

---

**Question 14**

Montrez finalement que  $M$  et  $R$  sont semblables dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ .

# Chapitre 6

## Intégrales généralisées

### Sommaire

<b>Exercices.</b>	<b>238</b>
<b>Problème 1 – Calculs d'intégrales.</b>	<b>247</b>
Intégrale de Gauss	247
Des intégrales avec des logarithmes	248
<b>Problème 2 – Des inégalités entre intégrales</b>	<b>248</b>
Partie 1	248
Partie 2	249
Partie 3	249

### Exercices

- ★ Exercice proche du cours
- ★★ Exercice de difficulté normale
- ★★★ Exercice difficile (voire très difficile)
- + Exercice à faire en priorité

---

#### ★ Exercice 6.1

Montrez la convergence des intégrales suivantes et calculez leurs valeurs.

$$(1) \int_0^{+\infty} \frac{1}{(x+1)(x+2)(x+3)} dx$$

$$(2) \int_0^{+\infty} \frac{x}{x^3 + x^2 + x + 1} dx$$

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{1}{x^3 + 1} dx$$

$$(4) \int_0^{+\infty} \frac{x^5}{x^{12} + 1} dx$$

$$(5) \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+t^2)^2} dt$$



$$(6) \int_0^{+\infty} (\operatorname{Arctan}(t+1) - \operatorname{Arctan} t) dt$$

### ★ Exercice 6.2

Justifiez la convergence des intégrales  $\int_1^{+\infty} \frac{1}{\operatorname{sh} x} dx$  et  $\int_0^{+\infty} \frac{1}{\operatorname{ch} x} dx$  et donnez leurs valeurs en vous servant de l'égalité  $\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = 1$ .

### ★ Exercice 6.3

Soit  $n \in \mathbb{N}$ .

Montrez que l'intégrale  $\int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)(1+x^n)} dx$  converge et donnez sa valeur en faisant le changement de variable  $y = \frac{1}{x}$ .

### ★★ Exercice 6.4

Montrez la convergence des intégrales suivantes et calculez leurs valeurs.

$$(1) \int_0^{+\infty} \ln \left( 1 + \frac{1}{x^2} \right) dx$$

$$(2) \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x\sqrt{x}} dx$$

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{(x+a)^2} dx \text{ (où } a > 0 \text{)}$$

$$(4) \int_0^{+\infty} \frac{x \ln x}{(1+x^2)^3} dx$$

$$(5) \int_0^1 \frac{\ln(1+3x^2)}{x^2} dx$$

$$(6) \int_0^1 \frac{\ln(1-x^2)}{x^2} dx$$

### ★★ Exercice 6.5

On considère l'intégrale  $I = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^3 t}{t^2} dt$ .

(1) Justifiez que  $I$  est convergente.

(2) Démontrez que  $\forall t \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right], t - \frac{t^3}{6} \leq \sin t \leq t$ .

Déduisez-en  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \int_x^{3x} \frac{\sin t}{t^2} dt$ .

(3) Montrez que  $\lim_{y \rightarrow +\infty} \int_y^{3y} \frac{\sin t}{t^2} dt = 0$ .

(4) Linéarisez  $\sin^3 t$  et déduisez de tout ce qui précède la valeur de  $I$ .

### ★ Exercice 6.6

Soit  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$  tels que  $a < b$ .

(1) Déterminez une application affine  $\varphi$  envoyant l'intervalle  $] -1 ; 1[$  sur  $]a ; b[$ .

(2) Déduisez-en la nature et la valeur éventuelle de l'intégrale  $\int_a^b \frac{dt}{\sqrt{(t-a)(b-t)}}$ .

### ★★ Exercice 6.7

On pose  $C = \int_0^{\pi/2} \ln(\cos t) dt$ ,  $S = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin t) dt$  et  $I = \int_0^\pi \ln(\sin t) dt$ .

(1) Justifiez l'existence de ces trois intégrales.

(2) Montrez que  $C = S$ .

(3) Montrez que  $I = 2S$  et donnez une autre relation liant  $C + S$  et  $I$ .

(4) Donnez la valeur de ces trois intégrales.

### ★★ Exercice 6.8

Justifiez l'existence des intégrales suivantes, puis par le changement de variable  $x = \sin t$ , montrez que

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{(2-x^2)\sqrt{1-x^2}} dx = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{1}{1+\cos^2 t} dt.$$

Effectuez le changement de variable  $u = \tan t$  dans la dernière intégrale afin d'obtenir sa valeur.

### ★★ Exercice 6.9

(1) Soit  $a > 0$ . Montrez que  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t^a} dt$  converge ssi  $a < 2$ .

(2) Montrez que les intégrales suivantes convergent :  $\int_0^1 \sin\left(\frac{1}{t}\right) dt$ ,  $\int_0^{+\infty} \sin(t^2) dt$  et  $\int_0^{+\infty} \sin(e^x) dx$ .

---

**★★ Exercice 6.10**

Soient  $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$  continue telle que  $\int_1^{+\infty} \frac{f(x)}{x} dx$  converge et  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$  tel que  $0 < a < b$ .

(1) Montrez que pour tout  $\varepsilon > 0$ , 
$$\int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = \int_{a\varepsilon}^{b\varepsilon} \frac{f(x)}{x} dx.$$

(2) Dédisez-en que  $\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx$  converge et vaut  $f(0) \ln \frac{b}{a}$ .

---

**★★ Exercice 6.11**

Soient  $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$  continue et ayant une limite réelle  $\ell$  en  $+\infty$  et  $a > 0$ .

Montrez que  $\int_0^{+\infty} \frac{f(x) - f(ax)}{x} dx$  converge et donnez sa valeur en fonction de  $\ell$ ,  $f(0)$  et  $a$ .

---

**★★ Exercice 6.12 (Fonction  $\Gamma$  d'Euler)**

Pour  $x > 0$ , on pose  $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$ .

- (1) Montrez que  $\Gamma$  est bien définie sur  $]0 ; +\infty[$ .
- (2) Donnez une relation de récurrence entre  $\Gamma(x)$  et  $\Gamma(x+1)$ .  
Dédisez-en la valeur de  $\Gamma(n)$  pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ .

---

**★★ Exercice 6.13**

Une idée fausse : beaucoup pensent que si  $f$  est positive et intégrable sur  $[0 ; +\infty[$ , alors  $f$  a pour limite 0 en  $+\infty$ .

Soit  $f$  la fonction définie sur  $[0 ; +\infty[$  de la façon suivante : pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , on pose  $a_n = \frac{1}{2n^2}$  puis, pour  $x \geq 0$ ,

- ▷ s'il existe  $n \in \mathbb{N}^*$  tel que  $n - a_n \leq x \leq n$ , alors  $f(x) = 2n^2(x - n) + 1$
- ▷ s'il existe  $n \in \mathbb{N}^*$  tel que  $n \leq x \leq n + a_n$ , alors  $f(x) = -2n^2(x - n) + 1$
- ▷ sinon,  $f(x) = 0$ .

Représentez la courbe de  $f$  sur  $[0 ; 4,5]$  et montrez que  $f$  est intégrable sur  $[0 ; +\infty[$  mais que  $f$  n'a pas de limite en  $+\infty$ .

---

**★★ Exercice 6.14**

Déterminez la nature des intégrales suivantes (où  $\alpha > 0$ ).

- (1)  $\int_0^{+\infty} \frac{1}{1 + |\sin x|} dx$
- (2)  $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha (1 + \sin^2 x)} dx$
- (3)  $\int_0^{+\infty} e^{-\sqrt{x}} dx$
- (4)  $\int_0^1 e^{-1/t} dt$
- (5)  $\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{x + e^{-x}} dx$
- (6)  $\int_0^{+\infty} e^{-\ln^2 x} dx$
- (7)  $\int_0^1 \sin(\ln t) dt$
- (8)  $\int_0^1 \frac{\ln t}{(1-t)^{3/2}} dt$
- (9)  $\int_0^{+\infty} \frac{\operatorname{Arctan} \sqrt{t}}{t(1+t^2)} dt$
- (10)  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{e^x - 1} dx$
- (11)  $\int_0^{+\infty} \sin(t^2) dt$
- (12)  $\int_0^{+\infty} \sin\left(\frac{1}{t}\right) dt$
- (13)  $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} dt$

---

**★★ Exercice 6.15**

Montrez les comparaisons suivantes en justifiant l'existence des intégrales.

- (1)  $\int_0^X \frac{\ln x}{x + e^{-x}} dx \underset{X \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{2} \ln^2 X$
- (2)  $\int_x^{+\infty} \frac{\operatorname{Arctan} \sqrt{t}}{t(1+t^2)} dt \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\pi}{4x^2}$
- (3)  $\int_x^1 \frac{e^t}{\sin t} dt \underset{x \rightarrow 0}{\sim} -\ln x$

- (4)  $\int_0^x \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} dt \underset{x \rightarrow 0}{\sim} 2\sqrt{x}$
- (5)  $\int_x^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t} dt \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(e^{-x})$
- (6)  $\int_x^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t} dt \underset{x \rightarrow 0}{\sim} -\ln x$
- (7)  $\int_1^x \frac{e^t}{t} dt \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(e^{x/2})$
- (8)  $\int_0^x \frac{\ln(1+t^2)}{1+\sqrt{t}} dt \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} 2\sqrt{x} \ln x$

### ★★ Exercice 6.16

Donnez des équivalents simples aux points indiqués des intégrales suivantes en justifiant leurs existences.

- (1)  $\int_0^x \frac{\sin t}{t} dt \underset{x \rightarrow 0}{\sim} ?$
- (2)  $\int_0^x \frac{\sin t}{t^{3/2}} dt \underset{x \rightarrow 0}{\sim} ?$
- (3)  $\int_x^{+\infty} \frac{t^2 e^{-t}}{t^2 + 1} dt \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} ?$
- (4)  $\int_0^x \ln(t^2 + \sin t) dt \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} ?$

### ★★ Exercice 6.17

Soient  $a, \alpha$  deux réels strictement positifs.

- (1) En effectuant le changement de variable  $t = \tan x$ , montrez que

$$\int_0^{\pi/2} \frac{1}{1 + a \sin^2 x} dx = \int_0^{+\infty} \frac{1}{1 + (1+a)t^2} dt$$

puis calculez ces intégrales et donnez la valeur de  $\int_0^{\pi} \frac{1}{1 + a \sin^2 x} dx$ .

- (2) Donnez la nature de la série de terme général  $\int_0^{\pi} \frac{1}{1 + (t + n\pi)^\alpha \sin^2 t} dt$  selon la valeur de  $\alpha$ .
- (3) Étudiez la convergence de l'intégrale  $\int_0^{+\infty} \frac{1}{1 + x^\alpha \sin^2 x} dx$ .

### ★★ Exercice 6.18

Discutez, selon  $\alpha$  et  $\beta$  réels, de la nature de l'intégrale  $\int_0^{+\infty} \frac{(t+1)^\alpha - t^\alpha}{t^\beta} dt$ .

---

**★★ Exercice 6.19**

Soit  $f$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $[0 ; +\infty[$ , à valeurs réelles et telle que les fonctions  $t \mapsto t^2 f^2(t)$  et  $t \mapsto f'^2(t)$  soient intégrables sur  $[0 ; +\infty[$ .

(1) Montrez que la fonction  $t \mapsto t f(t) f'(t)$  est intégrable sur  $[0 ; +\infty[$ .

(2) Montrez que pour tout  $x > 0$ ,  $x f^2(x) = \int_0^x f^2(t) dt + 2 \int_0^x t f(t) f'(t) dt$ .

Déduisez-en que  $x f^2(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ .

(3) Montrez que  $t \mapsto f^2(t)$  est intégrable sur  $[0 ; +\infty[$ .

(4) Démontrez que

$$\left( \int_0^{+\infty} f^2(t) dt \right)^2 \leq 4 \left( \int_0^{+\infty} t^2 f^2(t) dt \right) \left( \int_0^{+\infty} f'^2(t) dt \right).$$

---

**Exercice 6.20 (Oral IMT, 1)**

Justifiez l'existence de  $\int_0^1 \frac{\ln(t) \ln(1-t)}{t} dt$ .

---

**Exercice 6.21 (Oral IMT, 2)**

Soit  $a \in \mathbb{R}$ . L'intégrale  $\int_0^{+\infty} x^a \ln(1 + e^{ax}) dx$  est-elle convergente ?

---

**Exercice 6.22 (Oral IMT, 3)**

Justifiez l'existence de  $\int_0^{+\infty} \left( 1 - t \operatorname{Arctan} \frac{1}{t} \right) dt$  et donnez sa valeur.

---

**Exercice 6.23 (Oral CCINP, 4)**

Justifiez l'existence de  $\int_0^{+\infty} \frac{x^2}{e^x - 1} dx$ .

---

**Exercice 6.24 (Oral CCINP, 5)**

Pour quelles valeurs de  $n \in \mathbb{N}$  l'intégrale  $\int_1^{+\infty} \frac{1}{\left(x + \sqrt{x^2 - 1}\right)^n} dx$  converge-t-elle ? Donnez alors sa valeur.

---

**Exercice 6.25 (Oral IMT, 6)**

Soit  $a > 0$ . Donnez la nature de  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^a} dx$ .

---

**Exercice 6.26 (Oral CCINP, 7)**

Pour  $k \in \mathbb{N}^*$ , on pose  $I_k = \int_k^{k+1} \frac{x - 1/2 - \lfloor x \rfloor}{x} dx$ .

- (1) Calculez  $I_k$ .
- (2) On pose  $J_n = \int_1^n \frac{x - 1/2 - \lfloor x \rfloor}{x} dx$ . Montrez que  $J_n = n + \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln(n+1) - \ln n!$ .
- (3) Montrez que  $\ln n! = n \ln n - n + \ln n + \frac{1}{2} \ln(2\pi) + o(1)$ .
- (4) Montrez que la suite  $(J_n)_{n \geq 1}$  converge et donnez sa valeur.
- (5) Montrez que  $\int_1^{+\infty} \frac{x - 1/2 - \lfloor x \rfloor}{x} dx$  converge et donnez sa valeur.

---

**Exercice 6.27 (Oral CCINP, 8)**

Pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , on pose  $u_n = \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)^{-n}$ ,  $v_n = e^{-\sqrt{n}}$  et  $I_n = \int_n^{+\infty} e^{\sqrt{t}} dt$ .

- (1) Montrez que la série  $\sum_n v_n$  converge.
- (2) Montrez que  $I_n$  existe et que  $I_n = 2(1 + \sqrt{n}) v_n$ .
- (3) On pose  $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} v_k$ . Montrez que  $I_{n+1} \leq R_n \leq I_n$  et donnez un équivalent de  $R_n$ .
- (4) On pose  $T_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k$ . Montrez que  $T_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{R_n}{\sqrt{e}}$ .

---

**Exercice 6.28 (Oral Centrale, 9)**

Soit  $I_n = \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+t^3)^n} dt$  pour  $n \geq 1$ .

(1) On définit les suites  $(u_n)_{n \geq 1}$  et  $(v_n)_{n \geq 1}$  par  $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n$  et  $v_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n+1)$ .

Montrez qu'elles convergent vers la même limite.

(2) Montrez que pour tout  $n \geq 1$ ,  $I_{n+1} = \left(1 - \frac{1}{3n}\right) I_n$ .

(3) Montrez qu'il existe des réels  $a$  et  $b$  tels que  $\ln I_n = a \ln n + b + o(1)$ .

(4) Montrez que la série de terme général  $I_n$  converge.

---

**Exercice 6.29 (Oral CCMP, 10)**

Soit  $y \in \mathbb{R}$ .

Calculez  $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)(1+x^2y^2)} dx$ .

---

**Exercice 6.30 (Oral CCMP, 11)**

Soit  $y \in \mathbb{R}$ .

Justifiez l'existence et calculez  $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)(1+ixy)} dx$ .

---

**Exercice 6.31 (Oral CCMP, 12)**

Soit  $\alpha > 0$ .

Étudiez la convergence de  $\int_0^{+\infty} \left( \exp\left(\frac{\sin^2 t}{t^\alpha}\right) - 1 \right) dt$ .

---

**Exercice 6.32 (Oral CCMP, 13)**

Soient  $a \in [0 ; 1[$  et  $f : \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}_+^*$  continue par morceaux telle que  $\frac{f(x+1)}{f(x)} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} a$ .

Montrez que  $f$  est intégrable sur  $\mathbb{R}_+$ .



# Problème 1 – Calculs d'intégrales

## Intégrale de Gauss

L'intégrale de Gauss est l'intégrale généralisée  $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt$ .

On rappelle un résultat à propos des intégrales de Wallis : en notant  $W_n = \int_0^{\pi/2} (\cos \theta)^n d\theta$ , on a

$$W_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{\frac{\pi}{2n}}.$$

---

### Question 1

Justifiez que l'intégrale  $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt$  est convergente.

---

### Question 2

Montrez que  $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall t \in [0 ; \sqrt{n}]$ ,  $\left(1 - \frac{t^2}{n}\right)^n \leq e^{-t^2} \leq \left(1 + \frac{t^2}{n}\right)^{-n}$ .

---

### Question 3

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

À l'aide du changement de variable  $t = \sqrt{n} \sin \theta$ , exprimez l'intégrale  $\int_0^{\sqrt{n}} \left(1 - \frac{t^2}{n}\right)^n dt$  en fonction d'une intégrale de Wallis.

---

### Question 4

Avec le changement de variable  $t = \sqrt{n} \tan \theta$ , établissez que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \int_0^{\sqrt{n}} \left(1 + \frac{t^2}{n}\right)^{-n} dt \leq \sqrt{n} W_{2n-2}.$$

Déduisez-en que  $\forall n \in \mathbb{N}^*, \sqrt{n} W_{2n+1} \leq \int_0^{\sqrt{n}} e^{-t^2} dt \leq \sqrt{n} W_{2n-2}$ .

---

### Question 5

Déterminez enfin la valeur de l'intégrale de Gauss.

## Des intégrales avec des logarithmes

Pour  $n \in \mathbb{N}$ , on pose  $u_n = \int_0^1 t^n \ln(t) dt$  et  $v_n = \int_0^1 t^n \frac{\ln t}{1+t} dt$ .

---

### Question 6

- (1) Justifiez l'existence de  $u_n$  et  $v_n$ , puis montrez que  $u_n = \frac{-1}{(n+1)^2}$ .
- (2) Montrez que  $|v_n| \leq -u_n$  et déduisez-en la limite de  $v_n$  quand  $n$  tend vers  $+\infty$ .
- 

### Question 7

- (1) Montrez que la série  $\sum_{n \geq 0} (-1)^n u_n$  converge, puis que  $\sum_{k=0}^n (-1)^k u_k = v_0 + (-1)^n v_{n+1}$ .
- (2) On rappelle que  $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$ . Montrez que  $v_0 = -\frac{\pi^2}{12}$ .
- 

### Question 8

Montrez que l'intégrale  $\int_0^1 \frac{\ln(1+t)}{t} dt$  converge et donnez sa valeur grâce à ce qui précède.

---

## Problème 2 – Des inégalités entre intégrales

### Partie 1

Soit  $f : [0 ; 1] \longrightarrow \mathbb{R}$  de classe  $\mathcal{C}^1$  telle que  $f(0) = f(1) = 0$ .

---

### Question 1

Montrez l'existence des intégrales suivantes et justifiez l'égalité

$$\int_0^1 f(x) f'(x) \cotan(\pi x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^1 \frac{f^2(x)}{\sin^2(\pi x)} dx.$$

---

### Question 2

Déduisez-en  $\int_0^1 f'^2 - \pi^2 \int_0^1 f^2 = \int_0^1 (f'(x) - \pi f(x) \cotan(\pi x))^2 dx$ .

---

### Question 3

Concluez :  $\int_0^1 f'^2 \geq \pi^2 \int_0^1 f^2$ . Dans quel cas y a-t-il égalité ?

---

## Partie 2

Soit  $f : \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}$  de classe  $\mathcal{C}^2$  telle que  $f(0) = 0$  et l'intégrale  $\int_0^{+\infty} f'^2$  converge.

On pose  $g : x \longmapsto \frac{f(x)}{\sqrt{x}}$ .

---

### Question 4

(1) Montrez que  $g$  est prolongeable par continuité en 0.

(2) Justifiez que  $g$  est de classe  $\mathcal{C}^2$  sur  $]0 ; +\infty[$  et montrez que

$$\forall x > 0, \quad f'^2(x) = x g'^2(x) + g(x) g'(x) + \frac{1}{4x} g^2(x).$$

---

### Question 5

Montrez que les intégrales  $\int_0^{+\infty} x g'^2(x) dx$  et  $\int_0^{+\infty} \frac{f^2(x)}{x^2} dx$  sont convergentes et que la fonction  $g^2$  a une limite réelle en  $+\infty$ .

---

### Question 6

Montrez que cette limite est nulle et déduisez-en l'inégalité

$$\int_0^{+\infty} \left( \frac{f(x)}{x} \right)^2 dx \leq 4 \int_0^{+\infty} f'^2(x) dx.$$

---

### Question 7

Étudiez le cas d'égalité.

## Partie 3

Soit  $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$  de classe  $\mathcal{C}^2$  telle que les intégrales  $\int_{-\infty}^{+\infty} f^2$  et  $\int_{-\infty}^{+\infty} f''^2$  convergent.

On rappelle l'inégalité de Cauchy-Schwarz : si  $u, v$  sont deux fonctions continues sur  $[a ; b]$ , alors

$$\left( \int_a^b uv \right)^2 \leq \int_a^b u^2 \times \int_a^b v^2.$$

---

**Question 8**

- (1) Montrez que l'intégrale  $\int_{-\infty}^{+\infty} f f''$  est absolument convergente.
- (2) Pour  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ , donnez une relation entre  $\int_a^b f'^2$  et  $\int_a^b f f''$ .

---

**Question 9**

On suppose que l'intégrale  $\int_0^{+\infty} f'^2$  diverge.

- (1) Montrez que  $f(x) f'(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$ . Déduisez-en que  $f^2(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$ .
- (2) Est-ce possible ? Que pensez-vous de la nature de l'intégrale  $\int_{-\infty}^0 f'^2$ .

---

**Question 10**

- (1) Montrez que la fonction  $f f'$  a des limites réelles a des limites réelles en  $+\infty$  et en  $-\infty$ , puis que ces limites sont nulles.
- (2) Justifiez finalement l'inégalité

$$\left( \int_{-\infty}^{+\infty} f'^2 \right)^2 \leq \int_{-\infty}^{+\infty} f^2 \times \int_{-\infty}^{+\infty} f''^2.$$

---

**Question 11**

Étudiez le cas d'égalité dans l'inégalité précédente.

# Chapitre 7

## Intégrales à paramètre

### Sommaire

<b>Exercices.</b>	<b>251</b>
<b>Problème 1 – CCINP 2013 – PC</b>	<b>262</b>
Étude de quelques suites d'intégrales	263
Étude de séries de fonctions	263
<b>Problème 2 – CCINP 2022 – MP – Math 1</b>	<b>265</b>
Intégrales fonctions de leur borne	265
Calcul des intégrales de Fresnel	267
Étude d'une série de fonctions	268

### Exercices

#### ★ Exercice 7.1

Déterminez les limites suivantes :

$$(1) \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+t^2)^n} dt$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} \frac{t^n}{1+t^{n+2}} dt$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^n + e^x}$$

#### ★★ Exercice 7.2

Déterminez les limites suivantes :

$$(1) \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} \left(1 + \frac{t}{2n}\right)^n e^{-t} dt$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(1 + \frac{t^2}{n}\right)^{-n} dt$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{1+nx}{(1+x)^n} dx$$

### ★★ Exercice 7.3

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on pose  $I_n = \int_0^1 \sin(t^n) dt$ .

- (1) Établissez l'inégalité suivante :  $\forall u \in \mathbb{R}, |\sin u| \leq |u|$ .
- (2) Déduisez-en la limite de la suite  $(I_n)_{n \geq 0}$  puis retrouvez ce résultat par une autre méthode.
- (3) À l'aide du changement de variable  $t = u^{1/n}$ , montrez que

$$I_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{J}{n}$$

où  $J$  est une intégrale qu'on ne cherchera pas à calculer.

### ★★ Exercice 7.4

- (1) Soit  $f : [0 ; 1] \rightarrow \mathbb{R}$  continue. Montrez que  $\int_0^1 f(t^n) dt \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(0)$ .

- (2) Cherchez un équivalent de  $\int_0^1 \frac{t^n}{1+t^n} dt$ .

- (3) Cherchez un équivalent de  $-1 + \int_0^1 \sqrt{1+t^n} dt$ .

### ★★ Exercice 7.5

Soit  $x \in [0 ; n]$ .

Montrez que  $\left(1 - \frac{x}{n}\right)^n \leq e^{-x}$ .

Déduisez-en  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^n \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n x^p dx$  pour  $p \in \mathbb{N}$ .

### ★★ Exercice 7.6

En utilisant notamment un changement de variable et le théorème de convergence dominée, démontrez que

$$\int_1^{+\infty} e^{-x^n} dx \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{K}{n}$$

où  $K = \int_1^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t} dt$ .

---

**★ Exercice 7.7**

En développant en série  $\frac{1}{1-t}$ , démontrez que

$$\int_0^1 \frac{\ln t}{1-t} dt = -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}.$$

---

**★★ Exercice 7.8**

Montrez que  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{e^t - 1} dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2 + 1}$ .

---

**★★ Exercice 7.9**

Montrez que la série  $\sum_n (-1)^n \int_0^{\pi/2} \cos(t)^n dt$  converge et donnez la valeur de sa somme.

---

**★★ Exercice 7.10**

Soit  $(a_n)$  une suite telle que la série  $\sum_n a_n$  converge absolument.

(1) Montrez que pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , la série  $\sum_n \frac{a_n}{n!} x^n$  est convergente.

(2) On pose  $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{n!} x^n e^{-x}$ . On admettra momentanément que  $f$  est continue sur  $\mathbb{R}$ .

Montrez que  $f$  est intégrable sur  $[0; +\infty[$  et que  $\int_0^{+\infty} f(x) dx = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ .

---

**★★ Exercice 7.11**

Montrez que la fonction  $S : x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{1+n^2 x^2}$  est définie sur  $\mathbb{R}_+^*$ .

On admettra momentanément que  $S$  est continue sur  $\mathbb{R}$ .

Prouvez l'existence de  $\int_0^{+\infty} S(x) dx$  et calculez la.

---

**★★ Exercice 7.12**

On admet que  $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$  (voir un exercice ci-dessous).

Montrez que pour tout  $x \in ]-1 ; 1[$ ,  $\frac{2x}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} \frac{1}{e^{t^2} - x} dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{\sqrt{n}}$ .

---

**★★ Exercice 7.13**

Existence et calcul de  $\int_0^{+\infty} \frac{x}{\operatorname{sh} x} dx$  (on admet que  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ ).

---

**★★ Exercice 7.14 (Intégrale de Gauss)**

Le but de cet exercice est de déterminer la valeur de l'intégrale de Gauss

$$I = \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt.$$

Pour tout  $x \in \mathbb{R}_+$ , on pose

$$g(x) = \int_0^1 \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2} dt \quad \text{et} \quad h(x) = \int_0^\pi e^{-t^2} dt.$$

- (1) Montrez que  $g$  et  $h$  sont de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}_+$  et calculez leurs dérivées.
- (2) Montrez que  $g + h^2$  est une fonction constante sur  $\mathbb{R}_+$ , constante que l'on déterminera.
- (3) Montrez que  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$ .
- (4) En déduire que  $I = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ .

---

**★★ Exercice 7.15 (Fonction caractéristique de la loi normale centrée réduite)**

On cherche à calculer explicitement la fonction  $\phi$  définie par

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad \phi(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} e^{-x^2/2} dx.$$

NB : il s'agit de la fonction caractéristique pour la loi normale centrée réduite. Pour les variables aléatoires continues, la fonction caractéristique joue un rôle analogue à la fonction génératrice pour les variables discrètes.

- (1) Montrez que  $\phi$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}$  et donnez une expression de sa dérivée.



- (2) Montrez que  $\phi$  est solution d'une équation différentielle linéaire d'ordre 1 que l'on précisera.
- (3) À l'aide de l'intégrale de Gauss, calculez  $\phi(0)$ .
- (4) Montrez enfin que  $\forall t \in \mathbb{R}, \phi(t) = e^{-t^2/2}$ .

**★★ Exercice 7.16**

On pose, pour tout réel  $a$  :  $F(a) = \int_0^1 \frac{t^2}{\sqrt{1+a^4 t^2}} dt$ .

- (1) Montrez que la fonction  $F$  est bien définie et continue sur  $\mathbb{R}$ .
- (2) Déduisez-en la valeur de  $\lim_{a \rightarrow 0} \int_0^1 \frac{t^2}{\sqrt{1+a^4 t^2}} dt$ .

**★★ Exercice 7.17**

On considère la fonction  $F : x \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{\sin(xt)}{t} e^{-t} dt$ .

- (1) Déterminez le domaine de définition de  $F$ .
- (2) Montrez que  $F$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur son domaine de définition.
- (3) Calculez  $F'$  et déduisez-en  $F$ .

**★★ Exercice 7.18**

Démontrez que la fonction  $F$  définie par

$$\forall p \geq 0, F(p) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-pt}}{1+t^2} dt$$

est continue sur  $[0; +\infty[$  et de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $]0; +\infty[$ .

**★★ Exercice 7.19**

Soient  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$  tel que  $a > 0$ . On pose

$$g(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt} - e^{-at}}{t} \cos(bt) dt.$$

- (1) Justifiez que  $g$  est bien définie sur  $\mathbb{R}_+^*$ .
- (2) Justifiez que  $g$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}_+^*$ .
- (3) Calculez  $g'$  puis  $g$ .

---

**★★ Exercice 7.20 (Compléments sur la fonction Gamma d'Euler)**

On rappelle la définition de la fonction Gamma d'Euler :

$$\forall x > 0, \quad \Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt.$$

Démontrez la relation suivante :

$$\forall x > 1, \quad \Gamma(x) \zeta(x) = \int_0^{+\infty} \frac{t^{x-1}}{e^t - 1} dt,$$

où  $\zeta$  est la fonction zêta de Riemann vérifiant  $\zeta(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} n^{-x}$  pour tout réel  $x > 1$ .

---

**★★ Exercice 7.21 (Transformée de Fourier)**

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$  une fonction continue par morceaux et intégrable sur  $\mathbb{R}$ . On définit la transformée de Fourier de  $f$ , notée  $\hat{f}$ , par :

$$\forall \omega \in \mathbb{R}, \quad \hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx.$$

- (1) Montrez que la fonction  $\hat{f}$  est bien définie et continue sur  $\mathbb{R}$ .
- (2) On suppose de plus que  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  et que  $f'$  est intégrable sur  $\mathbb{R}$ .
  - (a) Montrez que  $\lim_{\pm\infty} f = 0$ .
  - (b) Montrez que  $\forall \omega \in \mathbb{R}, \quad \widehat{f'}(\omega) = i\omega \hat{f}(\omega)$ .

---

**★★ Exercice 7.22**

On pose  $g(x) = \int_0^1 \frac{t^x - 1}{\ln t} dt$ .

- (1)
  - (a) Déterminez le domaine de définition  $\mathcal{D}$  de  $g$ .
  - (b) Montrez que  $g$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathcal{D}$  et calculez sa dérivée.
  - (c) Déduisez-en l'expression de  $g$ .
- (2) On pose, pour tout  $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2 : I(\alpha, \beta) = \int_0^1 \frac{t^\alpha - t^\beta}{\ln t} dt$ .
  - (a) Pour quelles valeurs de  $(\alpha, \beta)$  cette intégrale est-elle convergente ?
  - (b) Lorsqu'elle converge, pratiquez le changement de variable  $u \mapsto u^\gamma$  dans cette intégrale. Déduisez-en la valeur de  $I(\alpha, \beta)$ .

---

**★★ Exercice 7.23**

On s'intéresse au comportement de la fonction  $F$  de l'exercice 18 au voisinage de 0.

- (1) Montrez que pour tout  $p > 0$ ,  $F'(p)$  se met sous la forme

$$F'(p) = \int_0^{+\infty} G(p, u) e^{-u} du,$$

où  $G(p, u)$  est une fonction rationnelle des variables  $p$  et  $u$  que l'on précisera.

- (2) Conjecturez la limite quand  $p \rightarrow 0^+$  de  $F'(p)$  puis démontrez la.
- (3) La fonction  $F$  est-elle dérivable en 0 ? Donnez une interprétation graphique du résultat.

---

**★★ Exercice 7.24 (Prolongement  $\mathcal{C}^\infty$ )**

Soit  $f$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $\mathbb{R}$  telle que  $f(0) = 0$ .

- (1) Montrez que  $\forall x \in \mathbb{R}^*, \frac{f(x)}{x} = \int_0^1 f'(tx) dt$ .
- (2) Déduisez-en que  $g : x \mapsto \frac{f(x)}{x}$  se prolonge en une fonction de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $\mathbb{R}$ .

---

**★★ Exercice 7.25**

On donne la valeur de l'intégrale de Dirichlet :

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin u}{u} du = \frac{\pi}{2}.$$

Calculez, pour tout réel  $x$  positif :

$$g(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(xt)}{t(1+t^2)} dt.$$

---

**★★ Exercice 7.26**

Soit  $f \in \mathcal{C}^0([0; 1], \mathbb{R})$ . Démontrez que

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \int_0^1 \frac{h}{h^2 + x^2} f(x) dx = \frac{\pi}{2} f(0).$$

*Indication : on pourra effectuer le changement de variable  $x = ht$ .*

---

**Exercice 7.27 (Oral CCINP, 1)**

(1) Montrez que pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $f_n : x \mapsto (\operatorname{ch} x)^{-n}$  est intégrable sur  $\mathbb{R}_+$ .

(2) Calculez la limite de  $I_n = \int_0^{+\infty} f_n$  quand  $n \rightarrow +\infty$ .

(3) Donnez la nature des séries  $\sum_n (-1)^n I_n$  et  $\sum_n I_n$  (*indication : montrez que pour tout  $x \in \mathbb{R}_+$ ,  $\operatorname{ch} x \geq \operatorname{sh} x$* ).

(4) Donnez le rayon de convergence de la série entière  $\sum_n I_n x^n$ .

---

**Exercice 7.28 (Oral Navale, 2)**

On pose, pour  $n \geq 2$  :  $I_n = \int_0^{+\infty} \frac{1+t^n}{\sqrt{t}+t^{2n}} dt$ .

Montrez que  $(I_n)$  est bien définie et calculez sa limite.

---

**Exercice 7.29 (Oral CCINP, 3)**

Pour  $n \in \mathbb{N}$ , on pose  $I_n = \int_0^1 \frac{1}{1+t^n} dt$  et  $J_n = \int_0^1 \ln(1+t^n) dt$ .

(1) Donnez une relation entre  $I_n$  et  $J_n$  (on pourra calculer  $n(1-I_n)$ ).

(2) Déduisez-en un développement asymptotique de  $I_n$  avec une précision de  $\frac{1}{n}$ .

(3) Montrez que l'application  $F : u \in [0 ; 1] \mapsto \int_0^u \frac{\ln(1+t)}{t} dt$  est bien définie, puis montrez que  $\int_0^1 F(t^n) dt \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ .

(4) Déduisez-en un développement asymptotique de  $J_n$  avec une précision  $\frac{1}{n}$ , puis un développement de  $I_n$  en  $\frac{1}{n^2}$ .

---

**Exercice 7.30 (Oral ENSEA, 4)**

Soit  $\Phi : t \mapsto \int_0^\pi \cos(t \sin \theta) d\theta$ .

Montrez que  $\Phi$  admet une unique racine  $z \in [0 ; \pi]$  et que  $z > \frac{\pi}{2}$ .

---

**Exercice 7.31 (Oral IMT, 5)**

Soit  $F : x \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt^2}}{1+t} dt$ .

- (1) Montrez que pour tout  $x > 0$ , l'intégrale  $F(x)$  est convergente.
- (2) Étudiez les variations de  $F$ .
- (3) Montrez que  $F$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $]0 ; +\infty[$ .
- (4) Montrez que pour tout  $x > 0$ ,  $F(x) \geq \frac{1}{e} \int_0^{1/\sqrt{x}} \frac{dt}{1+t}$ . Déduisez-en la limite de  $F$  en 0.

---

**Exercice 7.32 (Oral ENSEA, 6)**

(1) Déterminez le domaine de définition de  $f : x \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{\operatorname{sh} t}{t} e^{-xt} dt$ .

- (2) Calculez  $f'$ .
- (3) Déterminez la limite de  $f$  en  $+\infty$ . Déduisez-en  $f$ .

---

**Exercice 7.33 (Oral CCINP, 7)**

Soit  $f : x \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{te^{-xt}}{e^t - 1} dt$ .

- (1) Donnez le domaine de définition de  $f$ .
- (2) Calculez la limite de  $f$  en  $+\infty$ .
- (3) Pour  $x > 0$ , calculez  $f(x-1) - f(x)$ .
- (4) Déterminez une expression de  $f(x)$  sous forme de série.
- (5) Quelle autre méthode aurait-on pu utiliser pour trouver cette expression de  $f(x)$  ?

---

**Exercice 7.34 (Oral CCINP, 8)**

Soit  $f(x) = \int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos t}{t^2} e^{-xt} dt$ .

- (1) Montrez que  $f(x)$  existe pour  $x \geq 0$ .

- (2) Montrez que  $f$  est continue sur  $\mathbb{R}_+$ .
- (3) Montrez que  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^2$  sur  $]0 ; +\infty[$ .
- (4) Déterminez les limites de  $f$  et  $f'$  en  $+\infty$ .
- (5) Calculez  $f'(x)$  et  $f(x)$ .
- (6) Justifiez l'existence et calculez  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$ .

### Exercice 7.35 (Oral CCINP, 9)

On pose  $f : x \mapsto \int_0^{+\infty} t^x e^{-t} dt$ .

- (1) Montrez que  $f$  est définie et continue sur  $\mathbb{R}_+$ .
- (2) Pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , on pose  $u_n = \int_{n-1}^n \ln(f(t)) dt$ .  
Déterminez la nature de la série  $\sum_n (-1)^n u_n$ .

### Exercice 7.36 (Oral CCMP, 10)

Soit  $f$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^1$  de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ . On pose  $g(x) = \int_0^1 f(xt) \ln(t) dt$ .

- (1) Montrez que  $g$  est définie sur  $\mathbb{R}$  et calculez  $g(0)$ .
- (2) Montrez que  $g$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}$  et calculez  $g'(0)$ .

### Exercice 7.37 (Oral CCMP, 11)

Soit  $f : x \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+t^2)(1+t^x)} dt$ .

- (1) Montrez que  $f$  est définie sur  $\mathbb{R}_+$ . Calculez  $f(0)$  et  $\lim_{+\infty} f$ .
- (2) Soit  $x \in \mathbb{R}_+$ . Calculez  $f(x)$ .

---

**Exercice 7.38 (Oral CCMP, 12)**

Soit  $f : x \mapsto \int_0^{+\infty} e^{-t^2} \cos(xt) dt$ .

- (1) Montrez que  $f$  est définie sur  $\mathbb{R}$ .
- (2) Montrez que  $f$  est solution d'une équation différentielle.
- (3) Déduisez-en  $f$ .

---

**Exercice 7.39 (Oral CCMP, 13)**

Soit  $f : x \mapsto \int_0^1 \ln(t) \ln(1 - t^x) dt$ .

- (1) Déterminez le domaine de définition de  $f$ .
- (2) Écrivez  $f$  comme somme d'une série de fonctions.
- (3) Déterminez la limite de  $f$  en 0.

---

**Exercice 7.40 (Oral CCMP, 14)**

Soit  $f : x \mapsto \frac{1}{x} \int_0^{+\infty} \frac{1 - e^{-tx}}{1 + t^2} dt$ .

- (1) Montrez que  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^2$  sur  $\mathbb{R}_+$ .
- (2) Trouvez un équivalent simple de  $f$  en  $+\infty$ .
- (3) Trouvez un équivalent simple de  $f$  en 0.

---

**Exercice 7.41 (Oral CCMP, 15)**

Soit  $\Gamma$  la fonction de la variable réelle  $x$  définie par  $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$ .

- (1) Déterminez le domaine de définition de  $\Gamma$ .
- (2) Donnez un équivalent en  $+\infty$  de  $f(x) = \int_x^{x+1} \ln(\Gamma(u)) du$ .
- (3) Déduisez-en un équivalent en  $+\infty$  de  $\ln(\Gamma(x))$ .

---

**Exercice 7.42 (Oral CCMP, 16)**

Soit  $f : x \mapsto \int_0^1 e^{t^x \ln t} dt$ .

- (1) Montrez que  $f$  est définie sur  $\mathbb{R}$ .
- (2) Montrez que  $f$  est croissante et continue sur  $\mathbb{R}$ .
- (3) Donnez une expression de  $f(x)$  comme somme de série pour  $x > 0$ .

---

**Exercice 7.43 (Oral CCMP, 17)**

Soit  $(a_n)$  une suite de réels strictement positifs, croissante et de limite  $+\infty$ .

Montrez l'égalité

$$\int_0^{+\infty} \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n e^{-a_n t} dt = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{1}{a_n}.$$

---

**Exercice 7.44 (Oral CCMP, 18)**

Soit  $f : ]-1 ; +\infty[ \rightarrow \mathbb{R}$  définie par  $f(x) = \int_0^1 \frac{1 - (1-t)^x}{t} dt$ .

Justifiez la définition de  $f$  et donnez une expression de  $f(x)$  comme somme d'une série.

---

**Exercice 7.45 (Oral CCMP, 19)**

Soit  $T : x \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{e^{itx} - 1}{t} e^{-t} dt$ .

Montrez que  $T$  est définie sur  $\mathbb{R}$  et calculez  $T(x)$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .

## Problème 1 – CCINP 2013 – PC

On s'intéresse ici à des suites et séries de fonctions en liaison avec des intégrales.

Les deux premières parties sont indépendantes.

On admet les résultats suivants :

$$K = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos t}{t^2} dt = \frac{\pi}{2} \quad \text{et} \quad \int_0^1 \frac{\ln u}{u-1} du = \frac{\pi^2}{6}.$$



## Étude de quelques suites d'intégrales

---

### Question 1

- (1) On considère ici une application continue  $f : [0 ; +\infty[ \longrightarrow \mathbb{R}$ .

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on pose  $I_n = \int_0^1 f(t^n) dt$ .

Déterminez  $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$ .

- (2) On suppose ici de plus que  $u \mapsto \frac{f(u)}{u}$  est intégrable sur  $]0 ; 1]$ .

Déterminez  $\lim_{n \rightarrow +\infty} nI_n$ .

*On pourra transformer  $nI_n$  grâce à un changement de variable.*

- (3) Application : déterminez un équivalent quand  $n \rightarrow +\infty$  de  $\int_0^1 \sin(t^n) dt$  (grâce à une intégrale).

---

### Question 2

On considère maintenant que  $f : [0 ; +\infty[ \longrightarrow \mathbb{R}$  est une application continue et intégrable sur  $\mathbb{R}_+$ .

- (1) Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . Grâce à un changement de variable approprié, justifiez l'existence de  $A_n = \int_1^{+\infty} f(t^n) dt$ .

- (2) Déterminez  $\lim_{n \rightarrow +\infty} nA_n$  (grâce à une intégrale qu'on ne cherchera pas à calculer).

---

### Question 3

- (1) Pour tout  $n \in \mathbb{N}$  tel que  $n \geq 2$  et tout  $A > 1$ , on pose  $C_n(A) = \int_1^A \sin(t^n) dt$ .

Grâce à un changement de variable et une intégration par parties, exprimez  $C_n(A)$  en fonction de  $\int_1^{A^n} \frac{1 - \cos u}{u^2} u^{1/n} du$  et de  $A$ .

- (2) Déduisez-en que  $C_n(A)$  a une limite quand  $A \rightarrow +\infty$ , prouvant l'existence de  $\int_1^{+\infty} \sin(t^n) dt$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$  tel que  $n \geq 2$ .

- (3) Application : déterminez  $\lim_{n \rightarrow +\infty} n \int_0^{+\infty} \sin(t^n) dt$  grâce à  $K$ , admise en préambule.

## Étude de séries de fonctions

★★ Ne pas traiter les questions 4 et 5 ★★

---

**Question 4 (Un premier exemple)**

(1) Pour tout  $x \in ]-1 ; 1[$ , calculez  $F(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} x^n$  ainsi que  $F'(x)$ .

(2) Déterminez  $\lim_{x \rightarrow 1^-} F(x)$ ,  $\lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x)F(x)$ ,  $\lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x)F'(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x)^2 F'(x)$ .

---

**Question 5 (Un deuxième exemple)**

Dans cette question pour tout  $x \in ]-1 ; 1[$ , on pose cette fois  $F(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{1-x^n}$ .

(1) Soit  $a \in ]0 ; 1[$ . Prouvez la convergence normale de cette série de fonctions sur le segment  $[-a ; a]$ .

Déduisez-en que  $F$  est définie et continue sur  $] -1 ; 1[$ .

(2) Montrez que, pour tout  $x \in ]0 ; 1[$  et pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , on a  $\frac{1-x^n}{1-x} \leq n$ .

Déduisez-en  $\lim_{x \rightarrow 1^-} F(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x)F(x)$ .

---

**Question 6**

Dans cette question,  $f$  est une application réelle continue et croissante sur  $[0 ; 1[$  avec  $f(0) = 0$  et telle que  $u \mapsto \frac{f(u)}{u}$  soit intégrable sur  $]0 ; 1[$ .

Soit  $x \in ]0 ; 1[$ .

(1) Justifiez l'existence de  $G(x) = \int_0^{+\infty} f(x^t) dt$  et l'égalité  $G(x) = -\frac{1}{\ln x} \int_0^1 \frac{f(u)}{u} du$ .

(2) Pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , justifiez l'encadrement

$$\int_n^{n+1} f(x^t) dt \leq f(x^n) \leq \int_{n-1}^n f(x^t) dt.$$

(3) Déduisez-en l'existence de  $F(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} f(x^n)$ , ainsi qu'un encadrement de  $F(x)$  par deux intégrales dépendant de  $x$ .

(4) Concluez avec soin que  $\lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x)F(x) = \int_0^1 \frac{f(u)}{u} du$ .

---

**Question 7 (Un dernier exemple)**  
**★★ Ne pas traiter la sous-question 1 ★★**

Pour tout  $x \in ]-1 ; 1[$ , on pose cette fois  $F(x) = - \sum_{n=1}^{+\infty} \ln(1 - x^n)$ .

- (1) Montrez que  $F$  est définie et de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $] -1 ; 1[$  et exprimez sa dérivée sous la forme d'une série de fonctions.
- (2) Grâce à la question 6.4, montrez que  $\lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x) F(x) = \int_0^1 \frac{\ln u}{u-1} du$  (intégrale donnée en préambule).
- (3) Par une méthode similaire à celle de la question 6, montrez que

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \left( (1-x)^2 \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{nx^n}{1-x^n} \right) = \int_0^1 \frac{\ln u}{u-1} du.$$

Déduisez-en  $\lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x)^2 F'(x)$ .

## Problème 2 – CCINP 2022 – MP – Math 1

Dans ce problème, on étudie certaines intégrales et séries numériques reliées aux intégrales dites de Fresnel. Augustin Fresnel (1788-1827) démontra le caractère ondulatoire de la lumière et, pour cette raison, il est considéré comme un des fondateurs de l'optique moderne.

### Intégrales fonctions de leur borne

**★★ Ne pas traiter les questions 3, 7 et 8 ★★**

Dans cette partie, on définit la fonction  $H$  par l'expression  $H(x) = \int_0^x e^{it^2} dt$ , où  $e^{it^2}$  signifie  $\exp(it^2)$ .

---

#### Question 1

Démontrez que  $H$  est définie et de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $\mathbb{R}$ . Donnez une expression de  $H'(x)$ .

---

#### Question 2

Étudiez la parité de la fonction  $H$ .

---

**Question 3**

Démontrez que la fonction  $t \mapsto e^{it^2}$  est développable en série entière au voisinage de 0. Déduisez-en un développement en série entière de la fonction  $H$  au voisinage de 0, en précisant l'intervalle sur lequel ce développement est valable.

---

**Question 4**

Si  $x > 0$ , démontrez que

$$H(x) = \frac{1}{2} \int_0^{x^2} \frac{e^{iu}}{\sqrt{u}} du.$$

---

**Question 5**

Pour  $x > \sqrt{2\pi}$ , déduisez-en que

$$H(x) - H(\sqrt{2\pi}) = -i \frac{e^{ix^2}}{2x} + \frac{i}{2\sqrt{2\pi}} - \frac{i}{4} \int_{2\pi}^{x^2} \frac{e^{iu}}{u^{3/2}} du.$$

---

**Question 6**

Déduisez-en que l'intégrale généralisée  $\int_0^{+\infty} e^{it^2} dt$  converge.

---

**Question 7 (Informatique Pour Tous)**

Proposez, en langage Python, une fonction  $I(f, a, b, n)$  qui prend en entrée une fonction  $f$  à valeurs réelles ou complexes, deux réels  $a$  et  $b$  et un entier naturel  $n$  et qui renvoie une valeur approchée avec la méthode des rectangles de  $\int_a^b f(t) dt$  calculée avec  $n$  rectangles.

---

**Question 8 (Informatique Pour Tous)**

Proposez, en langage Python, une fonction  $H(x, n)$  qui prend en entrée un réel  $x$  et un entier naturel  $n$  et qui renvoie une valeur approchée de  $H(x)$  calculée avec la fonction de la question précédente. On rappelle que le code Python pour  $e^{it^2}$  est `exp(1j * t ** 2)`.

---

## Calcul des intégrales de Fresnel

Dans cette partie, on étudie la fonction  $g$  d'expression

$$g(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-x^2(t^2-i)}}{t^2-i} dt.$$

Pour cela, on pose  $f(x, t) = \frac{e^{-x^2(t^2-i)}}{t^2-i}$ .

---

### Question 9

Si  $(x, t) \in \mathbb{R}^2$ , déterminez les modules des nombres complexes  $e^{-x^2(t^2-i)}$  et  $t^2-i$ .

---

### Question 10

Démontrez que  $g$  est définie et continue sur  $\mathbb{R}$  (on pourra utiliser un argument de parité).

---

### Question 11

Soit  $(x_n)_n$  une suite divergente vers  $+\infty$ .

À l'aide du théorème de convergence dominée, démontrez que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} g(x_n) = 0$ .

Déduisez-en la limite de  $g$  en  $+\infty$  et en  $-\infty$ .

---

### Question 12

Démontrez que  $g$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}^*$ .

---

### Question 13

On admet dans cette question que l'intégrale  $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt$  converge et est égale à  $\sqrt{\pi}$ .

Vérifiez que

$$\forall x > 0, \quad g'(x) = -2\sqrt{\pi}e^{ix^2}.$$

---

### Question 14

Décomposez dans  $\mathbb{C}[X]$  la fraction rationnelle  $\frac{1}{X^2-i}$ .

On admet ensuite que

$$\frac{1}{X^2-i} = \frac{1-i}{4} \left( \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{2X-\sqrt{2}}{X^2-X\sqrt{2}+1} + \frac{i}{X^2-X\sqrt{2}+1} - \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{2X+\sqrt{2}}{X^2+X\sqrt{2}+1} + \frac{i}{X^2+X\sqrt{2}+1} \right).$$

Démontrez que  $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{t^2-\sqrt{2}t+1} dt = \pi\sqrt{2}$ .

Donnez la valeur de  $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{t^2+\sqrt{2}t+1} dt$  puis déterminez la valeur de  $g(0)$ .

---

**Question 15**

Déduisez-en que

$$\forall x > 0, \quad g(x) = \frac{(1+i)\pi}{\sqrt{2}} - 2\sqrt{\pi}H(x).$$

Donnez ensuite les valeurs de  $\int_0^{+\infty} e^{it^2} dt$ , de  $\int_0^{+\infty} \cos(t^2) dt$  et de  $\int_0^{+\infty} \sin(t^2) dt$ .

## Étude d'une série de fonctions

Dans cette partie, on étudie la fonction  $S$  d'expression

$$S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{e^{inx}}{\sqrt{n}}.$$

Pour tout entier naturel  $n$  non-nul, on note  $f_n$  la fonction d'expression  $f_n(x) = \frac{e^{inx}}{\sqrt{n}}$ .

---

**Question 16**

On suppose que  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  est une suite réelle positive décroissante de limite nulle et que  $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est une suite bornée.

En admettant l'identité suivante :

$$\forall N \in \mathbb{N}^*, \quad \sum_{n=1}^N a_n (b_n - b_{n-1}) = \sum_{n=1}^N (a_n - a_{n+1}) b_n + a_{N+1} b_N - a_1 b_0,$$

démontrez que la série  $\sum_n a_n (b_n - b_{n-1})$  converge.

---

**Question 17**

Soient  $x \in ]0 ; 2\pi[$  et  $n \in \mathbb{N}^*$ .

Démontrez que

$$\sum_{k=1}^n e^{ikx} = e^{\frac{i(n+1)x}{2}} \times \frac{\sin(nx/2)}{\sin(x/2)}.$$

---

**Question 18**

À l'aide des deux questions précédentes, démontrez que  $S$  est définie sur  $]0 ; 2\pi[$ .

---

**Question 19**

On admet dans cette question que si  $k \in \mathbb{N}^*$  et  $x \in ]0 ; 2\pi[$ , alors

$$\left| \frac{e^{i(k+1)x} - e^{ikx}}{ix\sqrt{k}} - \int_k^{k+1} \frac{e^{itx}}{\sqrt{t}} dt \right| \leq \frac{1}{4k^{3/2}}.$$

Démontrez qu'il existe une constante  $C > 0$  telle que pour tout  $x \in ]0 ; 2\pi[$  :

$$\left| \frac{e^{ix} - 1}{ix} S(x) - \int_1^{+\infty} \frac{e^{itx}}{\sqrt{t}} dt \right| \leq C.$$

---

**Question 20**

Démontrez la convergence de l'intégrale  $J(x) = \int_1^{+\infty} \frac{e^{itx}}{\sqrt{t}} dt$ .

Déterminez la limite, quand  $x$  tend vers  $0^+$ , de  $I(x) = \sqrt{x}J(x)$ .

---

**Question 21**

Déterminez la limite en  $0^+$  de la fonction  $x \mapsto \frac{e^{ix} - 1}{ix}$ .

Donnez un équivalent de  $S(x)$  quand  $x$  tend vers  $0^+$ .

# Chapitre 8

## Espaces préhilbertiens réels

*Cf.* chapitre suivant.



# Chapitre 9

## Endomorphismes dans un espace euclidien

### Sommaire

<b>Exercices.</b>	<b>271</b>
<b>Problème</b>	<b>284</b>
Notations	284
Une norme sur $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$	284
Sur les valeurs propres de $H_n$	286
Sur le déterminant de $H_n$	288

### Exercices

- ★ Exercice proche du cours
- ★★ Exercice de difficulté normale
- ★★★ Exercice difficile (voire très difficile)
- + Exercice à faire en priorité

---

#### ★ Exercice 9.1

Soit  $E = \mathbb{R}_n[X]$ . On définit  $\langle P | Q \rangle = \sum_{k=0}^n P(k) Q(k)$ .

- (1) Montrez que  $\langle | \rangle$  est un produit scalaire.
- (2) Dans le cas où  $n = 3$ , donnez une base orthonormée de  $\mathbb{R}_2[X]$ .
- (3) Calculez la distance de  $X^3$  à  $\mathbb{R}_2[X]$ .

---

#### ★ Exercice 9.2

Soit  $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  muni du produit scalaire classique  $(A, B) \mapsto \text{tr}({}^tAB)$ .

- (1) Montrez que si  $A$  est symétrique et  $B$  est antisymétrique, alors  $A$  et  $B$  sont orthogonales pour ce produit scalaire.

(2) Déterminez  $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})^\perp$ .

(3) Dans le cas où  $n = 2$ , calculez la distance de la matrice  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$  au sous-espace vectoriel des matrices triangulaires supérieures.

---

★★ Exercice 9.3

Soit  $E = \mathbb{R}[X]$ . On définit  $\langle P | Q \rangle = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{P(k) Q(k)}{2^k}$ .

(1) Montrez que  $\langle | \rangle$  est un produit scalaire.

(2) Donnez une base orthonormée du sous-espace  $\mathbb{R}_2[X]$ .

(3) Calculez la distance de  $X^3$  à  $\text{Vect}(1, X, X^2)$ .

---

★★ Exercice 9.4

Même exercice avec  $\langle P | Q \rangle = \int_0^{+\infty} P(t) Q(t) e^{-t} dt$ .

---

★★ Exercice 9.5

(1) Montrez que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , il existe un unique polynôme  $T_n$  tel que pour tout  $t \in \mathbb{R}$ ,  $T_n(\cos t) = \cos(nt)$ .

(2) Calculez  $T_0$  et  $T_1$  puis montrez que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $T_{n+2} = 2XT_{n+1} - T_n$ . En déduire le degré et le coefficient dominant de  $T_n$ .

(3) Montrez que l'application  $(P, Q) \mapsto \int_{-1}^1 \frac{P(t) Q(t)}{\sqrt{1-t^2}} dt$  est un produit scalaire sur  $\mathbb{R}[X]$ .

(4) Montrez que la famille  $(T_n)$  est orthogonale pour ce produit scalaire.

---

★★ Exercice 9.6

Soit  $E$  l'ensemble des suites réelles  $x$  telles que la série  $\sum_n x_n^2$  converge.

(1) Vérifiez rapidement que pour tout  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ ,  $|ab| \leq \frac{a^2 + b^2}{2}$ .

(2) Soient  $x, y \in E$ . Montrez que la série  $\sum_n x_n y_n$  est absolument convergente.

(3) Montrez que  $E$  est un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

(4) On pose  $\langle x | y \rangle = \sum_{n=0}^{+\infty} x_n y_n$ . Montrez qu'on définit ainsi un produit scalaire sur  $E$ .

---

**★ Exercice 9.7**

Soit  $E$  un espace euclidien de dimension 3 muni d'une base orthonormée dans laquelle toutes les coordonnées sont exprimées. Soient  $u$  de coordonnées  $(1, 3, 1)$ ,  $v$  de coordonnées  $(5, 2, -1)$  et  $w$  de coordonnées  $(1, 1, 1)$ .

- (1) Donnez un système d'équation et une base d'un supplémentaire de chacun des sous-espaces vectoriels  $\text{Vect}(u)$  et  $\text{Vect}(u, v)$ .
- (2) Déterminez la projection orthogonale de  $v$  sur la droite  $\text{Vect}(u)$ .
- (3) Déterminez la projection orthogonale de  $w$  sur le plan  $\text{Vect}(u, v)$ .
- (4) Déterminez la matrice du projecteur orthogonal sur le plan précédent.

---

**★ Exercice 9.8**

Soient  $E$  un espace euclidien de dimension 4 muni d'une base orthonormée dans laquelle toutes les coordonnées sont exprimées et  $F = \{x \in E \mid x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \text{ et } x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0\}$ .

- (1) Justifiez que  $F$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ . Donnez une base orthonormée de  $F$ .
- (2) Soit  $v$  de coordonnées  $(2, 3, 1, -1)$ . Déterminez sa projection orthogonale sur  $F$ .
- (3) Déterminez la matrice de la symétrie orthogonale par rapport à  $F$ .

---

**★★ Exercice 9.9**

Soit  $E = \text{Vect}(\text{id}_{[0;\pi]}, \sin, \cos)$  muni du produit scalaire  $\langle f \mid g \rangle = \int_0^\pi f(t) g(t) dt$ .

Déterminez  $\inf_{(a,b) \in \mathbb{R}^2} \int_0^\pi (x - (a \cos x + b \sin x))^2 dx$ .

---

**★★ Exercice 9.10**

- (1) Déterminez  $\inf_{x \in \mathbb{R}} \left( (2x - b_1)^2 + (3x - b_2)^2 + (4x - b_3)^2 \right)$  où  $b_1, b_2, b_3$  sont fixés dans  $\mathbb{R}$ .

- (2) Déterminez  $\inf_{(a,b) \in \mathbb{R}^2} \sum_{k=1}^n (k^2 - ak - b)^2$ . On admet  $\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$  et

$$\sum_{k=1}^n k^4 = \frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30}.$$

- (3) Déterminez  $\inf_{(a,b) \in \mathbb{R}^2} \int_0^1 (x^2 - ax - b)^2 x^2 dx$ .

- (4) Déterminez  $\inf_{(a,b,c) \in \mathbb{R}^3} \int_{-\pi}^\pi (t - a \sin t - b \cos t - c)^2 dt$ .

---

**★★ Exercice 9.11**

Soient  $E$  un espace euclidien et  $(e_1, \dots, e_n) \in E^n$  des vecteurs unitaires tels que

$$\forall x \in E, \quad \|x\|^2 = \sum_{k=1}^n \langle x | e_k \rangle^2.$$

Montrez que  $(e_1, \dots, e_n)$  est une base orthonormale de  $E$ .

---

**★★ Exercice 9.12**

Soient  $E$  un espace euclidien et  $F, G$  deux sous-espaces vectoriels de  $E$ .

Montrez que  $(F^\perp)^\perp = F$ ,  $(F + G)^\perp = F^\perp \cap G^\perp$  et  $(F \cap G)^\perp = F^\perp + G^\perp$ .

---

**★★★ Exercice 9.13**

On munit  $E = \mathcal{C}^0([0; 1], \mathbb{R})$  du produit scalaire  $\langle f | g \rangle = \int_0^1 f(t) g(t) dt$ .

Soit  $F = \{f \in E \mid f(0) = 0\}$ .

A-t-on  $E = F \oplus F^\perp$ ? A-t-on  $(F^\perp)^\perp = F$ ?

*Indication : si  $f \in F^\perp$ , considérez la fonction  $t \mapsto tf(t)$ .*

---

**★★ Exercice 9.14**

Soient  $E$  un espace euclidien et  $p \in \mathcal{L}(E)$  un projecteur.

On sait d'après le cours que si  $p$  est un projecteur orthogonal, alors pour tout  $x \in E$ ,  $\|p(x)\| \leq \|x\|$ .

Montrez que la réciproque est vraie, en utilisant le vecteur  $y + \lambda x$ , où  $x \in \text{Im } p$ ,  $y \in \ker p$  et  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

---

**★★ Exercice 9.15**

Soient  $E$  un espace euclidien de dimension 3 rapporté à une base orthonormée  $\mathcal{B}$  et  $f \in \mathcal{L}(E)$  tel

$$\text{que } \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = A = \frac{1}{15} \begin{pmatrix} 8 & 6 & -10 \\ -10 & 5 & 0 \\ 6 & -8 & 5 \end{pmatrix}.$$

- (1) Donnez une base du noyau et de l'image de  $f$ . Vérifiez que ces deux sous-espaces de  $E$  sont supplémentaires orthogonaux.
- (2) Donnez une base orthonormée directe  $\mathcal{B}'$  de  $E$  dont les vecteurs sont choisis dans le noyau ou l'image de  $f$  (dans cet ordre).

(3) Montrez que la matrice de  $f$  dans cette nouvelle base est de la forme  $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$ .

- (4) Donnez une interprétation géométrique de l'application  $f$ .

---

**★ Exercice 9.16**

Soit  $E$  un espace euclidien orienté de dimension 3 rapporté à une base orthonormée directe.

Déterminez la nature et les éléments caractéristiques de chacune des applications linéaires dont les matrices sont :

$$A = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -2 & -1 & 2 \\ 2 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \quad B = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 7 & 4 & 4 \\ -4 & 8 & -1 \\ 4 & 1 & -8 \end{pmatrix} \quad C = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} -8 & 4 & 1 \\ 4 & 7 & 4 \\ 1 & 4 & -8 \end{pmatrix}$$

$$D = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 & 1 & \sqrt{6} \\ 1 & 3 & -\sqrt{6} \\ -\sqrt{6} & \sqrt{6} & 2 \end{pmatrix} \quad E = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 & 1 & -\sqrt{6} \\ 1 & 3 & \sqrt{6} \\ -\sqrt{6} & \sqrt{6} & -2 \end{pmatrix}.$$

---

**★★ Exercice 9.17**

Soit  $E$  un espace euclidien orienté de dimension 3 rapporté à une base orthonormée directe.

Déterminez la matrice de la rotation d'axe orienté par  $u$  de coordonnées  $(1, 1, -1)$  et d'angle  $\frac{\pi}{2}$ .

---

**★★ Exercice 9.18**

Soient  $E$  un espace euclidien orienté de dimension 3 rapporté à une base orthonormée directe,  $u$  un vecteur unitaire,  $\theta$  un réel et  $f$  la rotation d'axe orienté par  $u$  et d'angle  $\theta$ .

Montrez que pour tout  $x \in E$ ,  $f(x) = (1 - \cos \theta) \langle x | u \rangle u + \cos(\theta) x + \sin(\theta) u \wedge x$ .

---

**★★ Exercice 9.19**

Déterminez  $\text{Card}(\mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \cap \mathcal{M}_n(\mathbb{Z}))$ .

---

**★★ Exercice 9.20**

Soit  $E$  un espace euclidien et  $u$  un automorphisme orthogonal de  $E$ . On pose  $v = \text{id}_E - u$ .

(1) Montrez que  $\ker v = (\text{Im } v)^\perp$ .

(2) Soit  $p$  la projection orthogonale sur  $\ker v$ . Montrez que

$$\forall x \in E, \quad \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} u^k(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} p(x).$$

---

**★ Exercice 9.21**

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  telle que  ${}^tA = A$ .

- (1) Montrez que s'il existe  $k \in \mathbb{N}$  tel que  $A^k = I_n$ , alors  $A^2 = I_n$ . Que peut-on dire de mieux si  $k$  est impair ?
- (2) Montrez que si  $A$  est nilpotente, alors  $A = 0$ .

---

**★ Exercice 9.22**

Soient  $S = (s_{ij})$  une matrice symétrique de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  et  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  ses valeurs propres.

Montrez que  $\sum_{1 \leq i, j \leq n} s_{ij}^2 = \sum_{i=1}^n \lambda_i^2$ .

---

**★★ Exercice 9.23**

Soient  $n \geq 3$  et  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & 0 & \vdots & \vdots \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ .

- (1) Justifiez que  $A$  est diagonalisable, puis que  $A$  possède au plus trois valeurs propres distinctes dont l'une est 0.
- (2) En notant  $\lambda$  et  $\mu$  les deux autres valeurs propres (pouvant être égales), donnez deux équations reliant  $\lambda$  et  $\mu$ , et déduisez-en le spectre de  $A$ .

---

**★★ Exercice 9.24**

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ .

Montrez que  $A {}^tA$  et  ${}^tAA$  sont orthosemblables.

---

**★★ Exercice 9.25**

Déterminez toutes les matrices  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  telles que

$$A {}^tAA = I_n.$$

---

**★★ Exercice 9.26**

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . On munit  $E = \mathbb{R}_n[X]$  du produit scalaire

$$\langle P | Q \rangle = \int_{-1}^1 P(t) Q(t) dt.$$

- (1) Montrez que l'application  $u : P \mapsto (1 - X^2) P'' - 2XP'$  est un endomorphisme auto-adjoint de  $E$ .
- (2) Montrez que les valeurs propres de  $u$  sont négatives.

---

**★★ Exercice 9.27**

Soient  $E$  un espace euclidien,  $u_1, \dots, u_p \in E$  et  $f$  l'application de  $E$  dans  $E$  telle que

$$f : x \mapsto \sum_{k=1}^p \langle u_k | x \rangle u_k.$$

- (1) Quelle est l'application  $f$  lorsque  $(u_1, \dots, u_p)$  est une famille orthonormée ?
- (2) Dans le cas général, montrez que  $f$  est un endomorphisme auto-adjoint positif de  $E$ .
- (3) Déterminez  $\ker f$  et  $\operatorname{Im} f$ .

---

**★★ Exercice 9.28**

Rappel : une matrice symétrique  $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$  est dite positive quand  $\forall X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}), {}^tXAX \geq 0$ .

Soit  $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ . Montrez l'équivalence des propriétés suivantes :

- ( $\alpha$ )  $A$  est positive
- ( $\beta$ ) toutes les valeurs propres de  $A$  sont positives
- ( $\gamma$ ) il existe  $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  telle que  $A = {}^tMM$
- ( $\delta$ ) il existe  $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$  telle que  $A = S^2$ .

Modifiez les propositions précédentes pour caractériser les matrices  $A$  définies-positives.

---

**★★★ Exercice 9.29 (Racine carrée)**

- (1) Montrez que  $r : \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$  est une surjection.  
$$M \longmapsto M^2$$
- (2) Soit  $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$  et  $M$  un antécédent de  $A$  par  $r$ . Montrez qu'il existe un polynôme  $P \in \mathbb{R}[X]$  tel que  $M = P(A)$ .
- (3) Soient  $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$  et  $M, N$  deux antécédents de  $A$  par  $r$ . Montrez que  $(M - N)(M + N) = 0$  et que  $M + N$  est inversible. Dédisez-en que l'application  $r$  est injective.

---

**★★★ Exercice 9.30 (Décomposition polaire)**

Montrez que pour tout  $A \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ , il existe un unique couple  $(Q, S) \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \times \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$  tel que  $A = QS$ .

---

**★★ Exercice 9.31**

Soient  $f$  et  $g$  deux endomorphismes auto-adjoints d'un espace euclidien.

Montrez que  $f \circ g$  est auto-adjoint ssi  $f$  et  $g$  commutent.

---

**★★ Exercice 9.32**

- (1) Soit  $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ . Montrez qu'il existe des réels  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  et des matrices colonnes  $U_1, \dots, U_n$  de  $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$  tels que

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1 ; n \rrbracket^2, {}^t U_i U_j = \delta_{ij} \quad \text{et} \quad S = \sum_{i=1}^n \lambda_i U_i {}^t U_i.$$

- (2) Soit  $u$  un endomorphisme auto-adjoint d'un espace euclidien  $E$ . Montrez que  $u$  est combinaison linéaire de projections orthogonales sur des droites et que ces projections commutent entre elles.

---

**★★ Exercice 9.33**

Une matrice  $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  vérifie  $M^2 + 4I_n = 0$  et  ${}^t M M = M {}^t M = S$ .

- (1) Trouvez un polynôme annulateur de  $S$  de degré 2.
- (2) Déduisez-en que  $\frac{1}{2}M$  est orthogonale.
- (3) Dans le cas  $n = 2$ , déterminez toutes les matrices de  $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$  qui vérifient les conditions de l'exercice.

---

**★★ Exercice 9.34**

Soient  $E$  un espace euclidien orienté de dimension 3 et  $u$  un vecteur non-nul de  $E$ .

On pose  $f$  l'endomorphisme de  $E$  défini par  $f(x) = u \wedge (u \wedge x)$ .

Montrez que  $f$  est diagonalisable et diagonalisez-le.

---

**★★ Exercice 9.35**

Soient  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ ,  $S = \frac{1}{2}(A + {}^t A)$  et  $a, b$  les plus petite et plus grande valeurs propres de  $S$ .

Montrez que toute valeur propre réelle de  $A$  est comprise entre  $a$  et  $b$ .



---

**★★ Exercice 9.36**

Soit  $E$  un espace euclidien. On dit qu'un endomorphisme  $f$  de  $E$  est anti-adjoint quand

$$\forall u, v \in E, \quad \langle f(u) | v \rangle = -\langle u | f(v) \rangle.$$

Soit  $f$  un endomorphisme anti-adjoint de  $E$ .

- (1) Montrez que  $\forall u \in E, \quad f(u) \perp u$ .
- (2) Montrez que la seule valeur propre possible de  $f$  est 0. L'endomorphisme  $f$  peut-il être diagonalisable ?
- (3) Montrez que  $f \circ f$  est un endomorphisme auto-adjoint de  $E$  et que ses valeurs propres sont négatives ou nulles.
- (4) Soit  $x$  un vecteur propre de  $f \circ f$  pour la valeur propre  $-\lambda \neq 0$ .
  - (a) Montrez que  $P_x = \text{Vect}(x, f(x))$  est un plan vectoriel stable par  $f$ .
  - (b) Montrez qu'il existe une base orthonormée  $(a, b)$  de  $P_x$  où la matrice de l'endomorphisme induit  $f_{P_x}$  est de la forme

$$R_\mu = \begin{pmatrix} 0 & -\mu \\ \mu & 0 \end{pmatrix},$$

où  $\mu$  est un réel strictement positif que l'on précisera.

- (5) Montrez qu'il existe une base orthonormée de  $E$  où la matrice de  $f$  est diagonale par blocs, avec des blocs de la forme  $R_\mu$  d'abord puis des blocs (0) de taille  $1 \times 1$ .

---

**Exercice 9.37 (Oral CCINP, 1)**

- (1) Calculez, pour  $n \in \mathbb{N}$ ,  $I_n = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} t^n dt$  (distinguer les cas  $n$  pair et  $n$  impair ; on donne de plus  $I_0 = 1$ ).
- (2) Montrez que l'application  $(P, Q) \mapsto \int_{-\infty}^{+\infty} P(t) Q(t) e^{-t^2} dt$  est un produit scalaire sur  $\mathbb{R}[X]$ .
- (3) Calculez la distance de  $X^3$  à  $\mathbb{R}_2[X]$ .

---

**Exercice 9.38 (Oral CCINP, 2)**

Soit  $E = \mathcal{C}^0([0; 1], \mathbb{R})$ . On pose pour  $(f, g) \in E^2 : \langle f | g \rangle = \int_0^1 f(t) g(t) t^2 dt$ .

- (1) Montrez que  $\langle | \rangle$  est un produit scalaire.
- (2) Calculez  $\int_0^1 t^n \ln(t) dt$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .
- (3) Soit  $F = \{x \mapsto ax + b \mid (a, b) \in \mathbb{R}^2\}$  et  $u \in E$  telle que  $u(x) = x \ln x$  pour tout  $x \in ]0; 1]$ . Déterminez le projeté orthogonal de  $u$  sur  $F$ .
- (4) Déterminez  $\inf_{(a,b) \in \mathbb{R}^2} \int_0^1 (at + b - t \ln t)^2 t^2 dt$ .

---

**Exercice 9.39 (Oral CCINP, 3)**

Soit  $E = \mathcal{C}^2([0; 1], \mathbb{R})$ . On pose pour  $(f, g) \in E^2 : \langle f | g \rangle = \int_0^1 (fg + f'g')$ .

On considère les sous-ensembles

$$V = \{f \in E \mid f'' = f\} \quad G = \{f \in E \mid f(0) = f(1) = 0\} \quad H = \{f \in E \mid f(0) = \text{ch } 1 \text{ et } f(1) = 1\}.$$

- (1) Montrez que la famille  $(\text{ch}, \text{sh})$  est une base de  $V$ .
- (2) Soient  $f \in V$  et  $g \in E$ . Montrez que  $\langle f | g \rangle = f'(1)g(1) - f'(0)g(0)$ . Calculez  $\langle \text{ch} | \text{sh} \rangle$ ,  $\|\text{ch}\|^2$  et  $\|\text{sh}\|^2$ .
- (3) Soient  $f \in V$  et  $g \in G$ . Montrez que  $\langle f | g \rangle = 0$ .
- (4) Soit  $f \in H$ . Calculez  $\langle f | \text{ch} \rangle$  et  $\langle f | \text{sh} \rangle$ . Déduisez-en le projeté orthogonal de  $f$  sur  $V$ .
- (5) Calculez  $\inf_{f \in H} \int_0^1 (f^2 + f'^2)$ .

---

**Exercice 9.40 (Oral CCINP, 4)**

Soient  $E$  un espace euclidien,  $(e_1, \dots, e_n)$  une base orthonormée de  $E$  et  $(u_1, \dots, u_n)$  une famille de vecteurs de  $E$ .

- (1) Soit  $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n$ . Montrez que  $\left\| \sum_{i=1}^n \lambda_i u_i \right\|^2 \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i^2 \times \sum_{i=1}^n \|u_i\|^2$ .
- (2) Déduisez-en que si  $\sum_{i=1}^n \|u_i\|^2 < 1$ , alors la famille  $(e_i + u_i)_{1 \leq i \leq n}$  est une base de  $E$ .

---

**Exercice 9.41 (Oral CCINP, 5)**

Soient  $E$  un espace euclidien et  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  une base orthonormée de  $E$ . On note  $D$  la droite engendrée par le vecteur  $u = \sum_{k=1}^n k e_k$ .

- (1) Donnez la matrice dans la base  $\mathcal{B}$  du projecteur orthogonal sur  $D$ , noté  $p$ .
- (2) Donnez le polynôme caractéristique et le spectre de  $p$ .
- (3) Calculez la distance de  $v = \sum_{k=1}^n e_k$  à  $D$ .

---

**Exercice 9.42 (Oral CCINP, 6)**

Soient  $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$  une matrice définie-positive et  $B \in \mathcal{M}_{nm}(\mathbb{R})$  une matrice de rang  $m$ .

- (1) Montrez que  $n \geq m$ .
- (2) Montrez que  $C = \begin{pmatrix} A & B \\ {}^t B & 0 \end{pmatrix}$  est inversible.

---

**Exercice 9.43 (Oral IMT, 7)**

Soient  $E$  un espace euclidien et  $f$  un endomorphisme auto-adjoint défini-positif de  $E$ .

- (1) Montrez que  $(x, y) \mapsto \langle f(x) | y \rangle$  est un produit scalaire sur  $E$ .
- (2) Montrez qu'il existe un endomorphisme auto-adjoint défini-positif  $g$  tel que  $g^2 = f$ .

---

**Exercice 9.44 (Oral IMT, 8)**

Soient  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  telle que  $A {}^t A = {}^t A A$  et  $p \geq 2$  tel que  $A^p = 0$ .

Montrez que  $A = 0$ .

---

**Exercice 9.45 (Oral CCINP, 9)**

Soient  $A, B \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$  telles que  $M = \frac{1}{3}(2A + B) \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ .

- (1) Calculez  $A {}^t B + B {}^t A$  en calculant  $M {}^t M$ .
- (2) Montrez que  $A = B$ .

---

**Exercice 9.46 (Oral CCINP, 10)**

Soient  $C \in \mathcal{M}_{n+1}(\mathbb{R})$  et  $M = \begin{pmatrix} 1 & -{}^t C \\ C & I_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n+1}(\mathbb{R})$ .

- (1) Calculez  ${}^t M M$ , déduisez-en que  $M$  est inversible.
- (2) Montrez que  $M^{-1} {}^t M$  est une matrice orthogonale.

---

**Exercice 9.47 (Oral CCINP, 11)**

Soit  $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  telle que  $M \neq I_n$ ,  $M^3 = I_n$  et  $M {}^t M = {}^t M M$ .

- (1) Montrez que  $M \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ .
- (2) Dans le cas où  $n = 3$ , déterminez les matrices  $M$  vérifiant les conditions de l'énoncé.

---

**Exercice 9.48 (Oral CCMP, 12)**

- (1) Montrez que  $\dim \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) = \frac{n(n+1)}{2}$ .
- (2) Est-ce que l'ensemble des matrices nilpotentes de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  est un espace vectoriel?
- (3) Soit  $\mathcal{N}$  un sous-espace de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  constitué de matrices nilpotentes. Montrez que  $\dim \mathcal{N} \leq \frac{n(n-1)}{2}$ .
- (4) Peut-on avoir  $\dim \mathcal{N} = \frac{n(n-1)}{2}$ ?

---

**Exercice 9.49 (Oral Centrale, 13)**

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ . On dit que  $A$  est une matrice normale quand  $A {}^t A = {}^t A A$ .

- (1) Déterminez les matrices normales de  $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ .
- (2) Montrez que toute matrice normale stabilise un espace de dimension 1 ou 2.
- (3) Montrez que si  $A$  est normale, alors il existe  $P \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$  telle que  ${}^t P A P$  soit diagonale par blocs, chaque bloc diagonal étant soit un bloc  $(a)$ , soit un bloc  $\begin{pmatrix} a & c \\ -c & b \end{pmatrix}$ .

---

**Exercice 9.50 (Oral Centrale, 14)**

Soit  $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ . On munit  $\mathbb{R}^n$  et  $\mathbb{R}^p$  de leurs produits scalaires canoniques.

- (1) Montrez que  $\ker A = \ker {}^tAA$ . Déduisez-en que  $\operatorname{rg} A = \operatorname{rg} {}^tAA$  (noté  $r$  dans la suite).
- (2) Montrez qu'il existe une famille orthonormée  $(y_1, \dots, y_r)$  de  $\mathbb{R}^r$  telle que la matrice  $Y$  de colonnes  $y_1, \dots, y_r$  vérifie  ${}^tY {}^tAA Y = D$ , où  $D$  est diagonale à coefficients diagonaux strictement positifs.
- (3) Montrez qu'il existe  $U, V$  orthogonales et  $\Delta$  diagonale telles que  $A = U\Delta V$ .

---

**Exercice 9.51 (Oral CCMP, 15)**

Soit  $A = (a_{ij}) \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ .

- (1) Montrez que pour tout  $(i, j) \in \llbracket 1 ; n \rrbracket^2$ ,  $a_{ij} > 0$  et  $a_{ij}^2 \leq a_{ii}a_{jj}$ .
- (2) Montrez que  $\max_{(i,j) \in \llbracket 1 ; n \rrbracket^2} |a_{ij}| = \max_{k \in \llbracket 1 ; n \rrbracket} a_{kk}$ .

---

**Exercice 9.52 (Oral CCMP, 16)**

- (1) Montrez que si  $A, B \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ , alors  $\operatorname{tr}(AB) \geq 0$ .

- (2) Déterminez les matrices  $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  telles que  $\forall S \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R}), \operatorname{tr}(MS) \geq 0$ .

---

**Exercice 9.53 (Oral CCMP, 17)**

Soient  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  et  $k \geq 2$  tels que  $A^k = {}^tA$ .

- (1) Montrez que  $\ker A$  et  $\operatorname{Im} A$  sont supplémentaires orthogonaux dans  $\mathbb{R}^n$ .
- (2) Montrez que  $B = A^{k+1}$  est une matrice de projecteur orthogonal.
- (3) Montrez que  $A$  induit une isométrie sur  $\operatorname{Im} A$ .
- (4) Déduisez-en  $A$ .

---

**Exercice 9.54 (Oral CCMP, 18)**

Soient  $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$  et  $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ .

- (1) Montrez que le spectre complexe de  $A$  est inclus dans  $i\mathbb{R}$ .
- (2) Montrez qu'il existe  $S' \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$  telle que  $S'^2 = S$ .
- (3) Montrez que  $\det S \leq \det(S + A)$ .

# Problème

## Notations

Pour ce problème, on désigne par  $n$  un entier naturel non-nul.

On note  $\mathcal{S}_n(\mathbb{R}) = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid {}^tA = A\}$  le sous-espace vectoriel de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  formé des matrices symétriques.

Un vecteur de  $\mathbb{R}^n$  est noté  $x = (x_j)_{1 \leq j \leq n} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$  en identifiant les matrices-colonnes de  $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$  avec les éléments de  $\mathbb{R}^n$ .

Une matrice  $A$  de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  est notée  $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$  où  $a_{ij}$  est le coefficient de  $A$  situé en ligne  $i$  et colonne  $j$ .

$\text{Sp}(A)$  est le spectre de  $A$ , ensemble de ses valeurs propres.

L'espace vectoriel  $\mathbb{R}^n$  est muni du produit scalaire canonique défini par

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n, \quad \langle x \mid y \rangle = {}^txy = \sum_{k=1}^n x_k y_k$$

et  $x \mapsto \|x\| = \sqrt{\langle x \mid x \rangle}$  est la norme euclidienne associée.

La sphère unité de  $\mathbb{R}^n$  est notée  $\Omega_n = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| = 1\}$ .

À toute matrice  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ , on associe la fonction  $q_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  définie par

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, \quad q_A(x) = \langle Ax \mid x \rangle.$$

## Une norme sur $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$

---

### Question 1

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ .

- (1) Montrez que la fonction  $q_A$  est bornée et atteint ses bornes sur la sphère unité  $\Omega_n$ . On note alors

$$m_A = \min_{x \in \Omega_n} q_A(x) \quad \text{et} \quad M_A = \max_{x \in \Omega_n} q_A(x).$$

- (2) Démontrez que toute valeur propre réelle de  $A$  se trouve dans l'intervalle  $[m_A; M_A]$ .

- (3) Explicitiez  $\text{Sp}(A)$ ,  $m_A$  et  $M_A$  pour la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

---

**Question 2**

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ . On suppose que  $q_A(x) = 0$  pour tout  $x \in \Omega_n$ .

- (1) Montrez que  $q_A(y) = 0$  pour tout  $y \in \mathbb{R}^n$ .
- (2) Si  $(y, z) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ , exprimez  $q_A(y + z)$  (qui est nul d'après la question 2a) en fonction de  $\langle Ay \mid z \rangle$  et  $\langle Az \mid y \rangle$ .
- (3) Montrez que la matrice  $A$  est anti-symétrique (c'est à dire que  ${}^t A = -A$ ).

---

**Question 3**

Soit  $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ . Montrez que

$$[\forall x \in \Omega_n, q_A(x) = 0] \iff A = 0_n.$$

---

**Question 4**

Montrez que l'application  $N : \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}$  définie par

$$\forall A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R}), N(A) = \sup_{x \in \Omega_n} |q_A(x)|$$

est une norme.

---

**Question 5**

On considère  $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$  et  $u$  l'endomorphisme de  $\mathbb{R}^n$  canoniquement associé à  $A$ .

- (1) Justifiez qu'il existe  $n$  nombres réels

$$\lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_n$$

et une base orthonormée  $(e_k)_{1 \leq k \leq n}$  de  $\mathbb{R}^n$  tels que

$$\forall k \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, u(e_k) = Ae_k = \lambda_k e_k.$$

- (2) Précisez  $q_A(e_k)$  pour tout  $k \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$ .
- (3) Soit  $x = \sum_{k=1}^n x'_k e_k \in \Omega_n$ . Exprimez  $q_A(x)$  en fonction des valeurs propres  $\lambda_k$  de  $A$  et des composantes  $x'_k$  de  $x$ .
- (4) Redémontrez le résultat de la question 1 : la fonction  $q_A$  possède un minimum  $m_A$  et un maximum  $M_A$  sur la sphère unité  $\Omega_n$ . Explicitez  $m_A$  et  $M_A$  en fonction des valeurs propres de  $A$ .

(5) Montrez que

$$N(A) = \sup_{x \in \Omega_n} |q_A(x)| = \max_{\lambda \in \text{Sp}(A)} |\lambda|.$$

Établissez une inégalité entre  $|\det A|$  et  $(N(A))^n$ .

(6) Exemple : si  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/2 & 1/3 \end{pmatrix}$ , calculez  $\det A$  et  $N(A)$ .

Dans toute la suite du problème, pour tout entier  $n \geq 2$ , on désigne par  $H_n$  la matrice de Hilbert d'ordre  $n$  définie par

$$H_n = \left( \frac{1}{i+j-1} \right)_{1 \leq i, j \leq n} = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & \dots & 1/n \\ 1/2 & 1/3 & \dots & 1/(n+1) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1/n & 1/(n+1) & \dots & 1/(2n-1) \end{pmatrix}$$

ou encore  $H_n = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$  avec  $a_{ij} = \frac{1}{i+j-1}$ .

Pour simplifier, on notera  $q_n$  la fonction  $q_{H_n} : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R} : \forall x \in \mathbb{R}^n, q_n(x) = q_{H_n}(x) = \langle H_n x \mid x \rangle$ .

## Sur les valeurs propres de $H_n$

### Question 6

Soit  $x = (x_j)_{1 \leq j \leq n} \in \mathbb{R}^n$ .

(1) Montrez que

$$q_n(x) = \langle H_n x \mid x \rangle = \sum_{i=1}^n \left( \sum_{j=1}^n \frac{x_j}{i+j-1} \right) x_i = \sum_{1 \leq i, j \leq n} \frac{x_i x_j}{i+j-1}.$$

(2) Développez  $\left( \sum_{i=1}^n x_i t^{i-1} \right) \left( \sum_{j=1}^n x_j t^{j-1} \right)$  où  $t$  est une variable réelle.

(3) Montrez que  $q_n(x) = \int_0^1 \left( \sum_{j=1}^n x_j t^{j-1} \right)^2 dt$ .

(4) Montrez que

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, q_n(x) \geq 0$$

et

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, q_n(x) = 0 \iff x = 0.$$

Que peut-on en déduire concernant les valeurs propres de  $H_n$  ?



---

**Question 7**

(1) Soit  $P(t) = \sum_{k=0}^m a_k t^k$  un polynôme à coefficients complexes.

Montrez que  $\int_{-1}^1 P(t) dt = -i \int_0^\pi P(e^{i\theta}) e^{i\theta} d\theta$ .

On pourra expliciter  $\int_{-1}^1 t^k dt$  et  $-i \int_0^\pi e^{ik\theta} e^{i\theta} d\theta$ .

(2) En gardant les notations introduites dans la question 6 et en notant  $Q(t) = \sum_{k=1}^n x_k t^{k-1}$ , montrez que pour tout  $x \in \mathbb{R}^n$ , on a

$$0 \leq q_n(x) = \int_0^1 Q^2(t) dt \leq \int_0^\pi \left| \sum_{k=1}^n x_k e^{i(k-1)\theta} \right|^2 d\theta.$$

---

**Question 8**

(1) Soit  $f$  une fonction continue sur  $[0; \pi]$  à valeurs complexes telle que  $\int_0^\pi |f(\theta)| d\theta = \left| \int_0^\pi f(\theta) d\theta \right|$ .  
Montrez que  $f$  est à valeurs dans  $\mathbb{R}_+$ .

(2) Soit  $P(t) = \sum_{k=0}^m a_k t^k$  un polynôme à coefficients complexes.

Calculez, pour  $k \in \llbracket 0; n \rrbracket$ ,  $\int_0^{2\pi} P(e^{i\theta}) e^{-ik\theta} d\theta$ .

Déduisez-en que s'il existe  $\alpha \in \mathbb{R}$  tel que pour tout  $\theta$ ,  $P(e^{i\theta}) e^{-i\alpha} \in \mathbb{R}_+$ , alors  $P$  est constant.

(3) Montrez que les inégalités de la question 7b sont strictes pour  $x \neq 0$ .

---

**Question 9**

Montrez que

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, \quad 0 \leq q_n(x) \leq \pi \|x\|^2,$$

les inégalités étant strictes pour  $x \neq 0$ .

---

**Question 10**

Pour tout entier  $n \geq 2$ , on note

$$\mu_n = \min \operatorname{Sp}(H_n) \quad \text{et} \quad \rho_n = \max \operatorname{Sp}(H_n).$$

(1) Explicitez  $\mu_2$  et  $\rho_2$ . Montrez que pour tout  $n \geq 2$ , on a

$$0 < \mu_n < \rho_n < \pi.$$

(2) Montrez que  $q_n(\Omega_n) = [\mu_n ; \rho_n]$ .

(3) Calculez  $\langle H_n \varepsilon_n | \varepsilon_n \rangle$  où  $\varepsilon_n$  désigne le dernier vecteur de la base canonique de  $\mathcal{M}_{n1}(\mathbb{R})$  :  $\varepsilon_n = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ .

Déduisez-en la limite de  $\mu_n$  lorsque  $n \rightarrow +\infty$ .

## Sur le déterminant de $H_n$

$H_n$  désigne toujours la matrice de Hilbert d'ordre  $n$ , pour  $n \geq 2$ .

### Question 11 (Une fraction rationnelle)

On considère la fraction rationnelle

$$R_n(x) = \frac{\prod_{k=1}^n (x - k)}{\prod_{k=0}^n (x + k)}.$$

On admettra qu'il existe des réels  $\lambda_{0n}, \dots, \lambda_{nn}$  tels que

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0, \dots, -n\}, \quad R_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{\lambda_{kn}}{x + k},$$

cette décomposition (en éléments simples) de  $R_n$  étant unique.

Exprimez le coefficient  $\lambda_{nn}$  de  $\frac{1}{x+n}$  à l'aide de  $(2n)!$  et de  $n!$ .

### Question 12 (Matrice $A_n$ )

Pour  $n \geq 2$ , on considère la matrice  $A_n$  définie par  $A_n = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$  avec

$$a_{ij} = \begin{cases} \frac{1}{i+j-1} & \text{pour } 1 \leq i \leq n-1 \text{ et } 1 \leq j \leq n \\ R_{n-1}(j) & \text{pour } i = n \text{ et } 1 \leq j \leq n \end{cases}$$

où les  $R_p$  ont été définis plus haut.

(1) Montrez que pour  $1 \leq i \leq n$ , on a

$$R_{n-1}(i) = \sum_{j=1}^n \lambda_{j-1, n-1} h_{ij}$$

puis déduisez-en que  $\det A_n = \binom{2(n-1)}{n-1} \det H_n$ .

(2) Montrez que

$$\det A_n = \frac{\det H_{n-1}}{(2n-1) \binom{2(n-1)}{n-1}}.$$

Déduisez-en l'expression de  $\det H_n$  en fonction de  $\det H_{n-1}$ .

(3) Montrez que pour tout  $n \geq 2$ ,

$$\det H_n \neq 0,$$

puis que

$$\frac{1}{\det H_n} \in \mathbb{N}^*.$$

---

**Question 13 (Calcul de  $\det H_n$ )**

En notant, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$  :  $\Phi_n = \prod_{k=1}^n k!$ , montrez que

$$\forall n \geq 2, \quad \det H_n = \frac{\Phi_{n-1}^4}{\Phi_{2n-1}}.$$

# Chapitre 10

## Fonctions vectorielles

- ★ Exercice proche du cours
- ★★ Exercice de difficulté normale
- ★★★ Exercice difficile (voire très difficile)
- + Exercice à faire en priorité

---

### ★★ Exercice 10.1

Pour  $x \in \mathbb{R}$  et  $n \in \mathbb{N}^*$ , on pose

$$D_n = \begin{vmatrix} x & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \frac{x^2}{2!} & x & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \frac{x^3}{3!} & \frac{x^2}{2!} & x & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x^{n-1} & x^{n-2} & \dots & x^2 & x & 1 \\ \frac{(n-1)!}{x^n} & \frac{(n-2)!}{x^{n-1}} & \dots & \frac{2!}{x^2} & x & 1 \\ \frac{n!}{x^n} & \frac{(n-1)!}{x^{n-1}} & \dots & \frac{(n-2)!}{x^{n-2}} & \dots & \frac{2!}{x^2} & x \end{vmatrix}.$$

- (1) Justifiez que  $D_n$  est dérivable et calculez  $D'_n$ .
- (2) Donnez une expression générale de  $D_n(x)$ .

---

### ★★ Exercice 10.2

Soient  $a > 0$  et  $f : [0 ; a] \longrightarrow \mathbb{R}$  dérivable sur  $[0 ; a]$  et telle que  $f(0) = f'(0) = f(a) = 0$ .

Montrez qu'il existe  $c \in ]0 ; a[$  tel que la tangente au point d'abscisse  $c$  passe par l'origine du repère.

---

### ★★ Exercice 10.3

Soient  $f, g : [a ; b] \longrightarrow \mathbb{R}$  deux fonctions continues sur  $[a ; b]$  et dérivables sur  $]a ; b[$ .

Montrez qu'il existe  $c \in ]a ; b[$  tel que

$$(f(b) - f(a))g'(c) = (g(b) - g(a))f'(c).$$

---

**★★ Exercice 10.4**

Soient  $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$  de classe  $\mathcal{C}^2$  telle que  $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$  et  $x_0 \in \mathbb{R}$  tel que  $f(x_0) f'(x_0) \geq 0$ .

(1) Montrez qu'il existe  $x_1 > x_0$  tel que  $f'(x_1) = 0$ .

(2) Montrez qu'il existe  $x_2 > x_1$  tel que  $f''(x_2) = 0$ .

---

**★★ Exercice 10.5**

Soient  $f$  une fonction  $n$  fois dérivable sur un intervalle  $I$  et  $(x_0, \dots, x_n) \in I^{n+1}$  tel que  $x_0 < \dots < x_n$  et  $f(x_0) = \dots = f(x_n) = 0$ .

Montrez qu'il existe  $c \in I$  tel que  $f^{(n)}(c) = 0$ .

Application : soit  $P$  une fonction polynôme de degré  $n$  ; montrez que l'équation  $e^x = P(x)$  a au plus  $n + 1$  solutions.

---

**★★ Exercice 10.6**

Soit  $f$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^2$  sur  $\mathbb{R}$  telle que  $f$  et  $f''$  aient pour limite 0 en  $+\infty$ .

Montrez que  $f'$  a aussi pour limite 0 en  $+\infty$ .

---

**★★ Exercice 10.7**

(1) Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . Calculez la dérivée  $n$ -ème de la fonction  $x \mapsto x^{n-1} \ln(1+x)$  définie sur  $] -1 ; +\infty[$ .

(2) Soient  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $f$  une fonction  $n$  fois dérivable sur  $\mathbb{R}$ . Calculez la dérivée  $n$ -ème de

$$x \mapsto x^{n-1} f\left(\frac{1}{x}\right).$$

(3) Déduisez-en les dérivées  $n$ -èmes de

$$x \mapsto x^{n-1} \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) \quad \text{et} \quad x \mapsto x^{n-1} e^{1/x}.$$

---

**★★ Exercice 10.8**

Soit  $F : t \mapsto \int_t^{t^2} \frac{1}{\ln u} du$ .

(1) Déterminez l'ensemble de définition de  $F$ .

- (2) Soit  $\varphi : u \mapsto \frac{1}{\ln u} - \frac{1}{u-1}$ . Montrez que  $\varphi$  est prolongeable en une fonction continue sur  $]0 ; +\infty[$ .  
Déduisez-en que  $\lim_{t \rightarrow 1} \int_t^{t^2} \frac{1}{\ln u} du = \ln 2$ .
- (3) Montrez que pour tout  $t \in ]1 ; +\infty[$ ,  $\frac{t^2 - t}{2 \ln t} \leq \int_t^{t^2} \frac{1}{\ln u} du \leq \frac{t^2 - t}{\ln t}$ . Déduisez-en  $\lim_{t \rightarrow +\infty} \int_t^{t^2} \frac{1}{\ln u} du$ .
- (4) Étudiez la fonction  $F$  (on la prolongera par continuité chaque fois que c'est possible) et donnez l'allure de sa courbe représentative.
- (5) Soit  $f : x \mapsto \frac{x-1}{\ln x}$ , prolongée par continuité en 0 et en 1. Montrez que pour tout  $t \in ]0 ; 1[$ ,  $\int_0^t f = F(t)$ . Déduisez-en la valeur de  $\int_0^1 f$ .

### ★★ Exercice 10.9

Soit  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$  tel que  $a < b$ .

Montrez que pour toute application  $f \in \mathcal{C}^1([a ; b], \mathbb{R})$ , on a

$$\max_{[a;b]} |f| \leq \int_a^b |f'| + \frac{1}{b-a} \int_a^b |f|.$$

Montrez que cette inégalité est également valable pour toute application  $f \in \mathcal{C}^1([a ; b], \mathbb{C})$ .

### ★★ Exercice 10.10

Soient  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$  tel que  $a < b$  et  $f \in \mathcal{C}^2([a ; b], E)$  telle que  $f(a) = f(b) = 0$ . On pose  $M = \sup_{[a;b]} \|f''\|$ .

- (1) Montrez que pour tout  $x \in [a ; b]$ ,  $\|f(x)\| \leq \frac{M}{2} (x-a)(b-x)$ .
- (2) Montrez que  $\left\| \int_a^b f \right\| \leq \frac{M(b-a)^3}{12}$ .
- (3) Déduisez-en une majoration de l'erreur commise lors du calcul approché de  $\int_a^b f$  par la méthode des trapèzes.

### ★★ Exercice 10.11

Soit  $f$  continue sur  $[a ; b]$  avec  $a < b$ .

Montrez que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \int_a^b \|f(t)\|^n dt \right)^{1/n} = \sup_{[a;b]} \|f\|$ .

---

**★★ Exercice 10.12**

Soit  $a > 1$ .

Montrez que la fonction  $f : x \mapsto \ln(1 - 2a \cos x + a^2)$  est continue sur  $[0 ; \pi]$ .

Sans chercher à utiliser une primitive, montrez  $\int_0^\pi f = 2\pi \ln a$ .

---

**★★ Exercice 10.13**

Soit  $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{U}$ .

Décomposez en éléments simples la fraction  $\frac{nX^{n-1}}{X^n - 1}$  puis calculez  $\int_0^{2\pi} \frac{1}{z - e^{it}} dt$ .

---

**★★ Exercice 10.14**

On considère une application  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$  de classe  $\mathcal{C}^1$  et  $2\pi$ -périodique telle que pour tout  $t \in \mathbb{R}$ ,  $f(t) \neq 0$ .

Montrez que  $\int_0^{2\pi} \frac{f'}{f} \in 2\pi\mathbb{Z}$ .

---

**★★ Exercice 10.15**

Soient  $E$  un espace vectoriel de dimension finie et  $f \in \mathcal{C}^\infty([a ; b], E)$ .

On suppose qu'il existe  $P \in \mathbb{R}[X]$  de degré impair tel que  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $\forall x \in [a ; b]$ ,  $\|f^{(n)}(x)\| \leq |P(x)|$ .

Montrez que  $f = 0$ .

---

**★★ Exercice 10.16 (Égalité de la moyenne généralisée)**

Soient  $f, g \in \mathcal{C}^0([a ; b], \mathbb{R})$  telles que  $g$  soit positive.

Montrez qu'il existe  $c \in [a ; b]$  tel que

$$\int_a^b f(t) g(t) dt = f(c) \int_a^b g(t) dt.$$

---

**★★ Exercice 10.17 (Égalité de Taylor-Lagrange)**

Soit  $f \in \mathcal{C}^{n+1}([a ; b], E)$ .

Montrez qu'il existe  $c \in ]a ; b[$  tel que

$$f(b) = \sum_{k=0}^n \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(c).$$

---

**★★★ Exercice 10.18**

Soit  $f \in \mathcal{C}^2([a; b], \mathbb{R})$ .

Montrez qu'il existe  $c \in ]a; b[$  tel que

$$\frac{f(a) + f(b)}{2} = f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{(b-a)^2}{8} f''(c).$$

---

**★★★ Exercice 10.19**

Soit  $f \in \mathcal{C}^2([a; b], \mathbb{R})$  telle que  $f(a) = f'(a)$  et  $f(b) = f'(b)$ .

Montrez qu'il existe  $c \in ]a; b[$  tel que  $f''(c) = f(c)$ .

---

**★★ Exercice 10.20**

On considère l'application  $u : t \mapsto e^{-t^2/2}$  et on pose pour  $n \in \mathbb{N}$ ,  $H_n(t) = e^{t^2/2} u^{(n)}(t)$ .

- (1) Montrez que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $H_n$  est un polynôme de degré  $n$ .
- (2) Montrez que si  $f \in \mathcal{C}^0([a; +\infty[, \mathbb{R})$  est dérivable sur  $[a; +\infty[$  et si  $f(t) \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} f(a)$ , alors il existe  $c \in ]a; +\infty[$  tel que  $f'(c) = 0$ .
- (3) Montrez que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $H_n$  est scindé à racines simples sur  $\mathbb{R}$ .

---

**★★ Exercice 10.21**

Soit  $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  telle que  $f$  et  $f''$  soient bornées. On note  $M_0 = \sup_{\mathbb{R}} |f|$  et  $M_2 = \sup_{\mathbb{R}} |f''|$ .

- (1) Montrez que pour tout  $(x, h) \in \mathbb{R}^2$ ,  $|f(x+h) - f(x) - hf'(x)| \leq \frac{h^2}{2} M_2$  et  
 $|f(x-h) - f(x) + hf'(x)| \leq \frac{h^2}{2} M_2$ .
- (2) Dédisez-en que pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , pour tout  $h > 0$ ,  $|f'(x)| \leq \frac{M_0}{h} + \frac{h}{2} M_2$ .
- (3) Montrez que  $f'$  est aussi bornée sur  $\mathbb{R}$  et que  $M_1 = \sup_{\mathbb{R}} |f'| \leq \sqrt{2M_0 M_2}$ .

---

**★★★ Exercice 10.22**

Soit  $f$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $\mathbb{R}$  telle que

- ▷ pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $f^{(n)}(0) = 0$



► il existe  $a > 0$  tel que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , pour tout  $t \in \mathbb{R}$ ,  $\left| f^{(n)}(t) \right| \leq a^n n!$ .

(1) Montrez que  $f$  est la fonction nulle sur  $\left[ \frac{-1}{a} ; \frac{1}{a} \right]$ .

(2) Montrez que  $f$  est la fonction nulle sur  $\mathbb{R}$ .

---

**Exercice 10.23 (Oral CCINP, 1)**

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  dérivable telle que  $f'(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$ .

Montrez que  $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$ .

---

**Exercice 10.24 (Oral TPE, 2)**

Cherchez les  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  dérivables telles que  $f(0) = 1$ ,  $f'(0) > 1$  et  $\forall x \in \mathbb{R}$ ,  $f'(f(x)) f'(x) = 1$ .

---

**Exercice 10.25 (Oral CCINP, 3)**

Pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , on pose  $f_n : x \mapsto x^n \ln x$ .

Montrez que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n^{(n)}\left(\frac{1}{n}\right) = \gamma$  où  $\gamma$  est la constante d'Euler-Mascheroni.

---

**Exercice 10.26 (Oral CCMP, 4)**

Soit  $f : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$  continue. On pose  $g : x \mapsto xf(x)$  et  $h : x \mapsto f\left(\frac{1}{x}\right)$ .

Montrez que  $g$  est convexe sur  $\mathbb{R}_+^*$  ssi  $h$  l'est aussi.

---

**Exercice 10.27 (Oral CCMP, 5)**

Soit  $f : [0 ; 1] \rightarrow \mathbb{R}$  dérivable telle que pour tout  $x \in [0 ; 1]$ ,  $(f(x), f'(x)) \neq (0, 0)$ .

Montrez que l'ensemble des zéros de  $f$  est fini.

---

**Exercice 10.28 (Oral CCMP, 6)**

Soient  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$  tel que  $a < b$  et  $E$  l'ensemble des fonctions continues sur  $[a ; b]$  et strictement positives.

Pour  $f \in E$ , on pose  $\varphi(f) = \int_a^b f \times \int_a^b \frac{1}{f}$ .

Déterminez  $\varphi(E)$ .

---

**Exercice 10.29 (Oral CCMP, 7)**

Soit  $E = \{f \in \mathcal{C}^0([0; 1], \mathbb{R}_+) \mid \forall (x, y) \in [0; 1]^2, |f(x) - f(y)| \geq |x - y|\}$ .

Déterminez  $\inf_{f \in E} \int_0^1 f$ .

---

**Exercice 10.30 (Oral Centrale, 8)**

Soient  $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$  majorée et  $\alpha > 0$  tel que pour tout  $x \in \mathbb{R}_+$ ,  $f''(x) \geq \alpha f(x)$ .

- (1) Montrez que  $f'$  est croissante et  $\lim_{+\infty} f' = 0$ .
- (2) Montrez que  $\lim_{+\infty} f = 0$ .
- (3) Montrez que pour tout  $x \in \mathbb{R}_+$ ,  $f(x) \leq f(0) e^{-x\sqrt{\alpha}}$ .

# Chapitre 11

## Suites et séries de fonctions

★★ À venir ★★

# Chapitre 12

## Séries entières

★★ À venir ★★

# Chapitre 13

## Probabilités

★★ À venir ★★

# Chapitre 14

## Variables aléatoires discrètes

★★ À venir ★★

# Chapitre 15

## Équations différentielles linéaires

★★ À venir ★★

