

Maths – MP2I

Romain Bricout

2 août 2023

## Introduction

Ce document réunit l'ensemble de mes cours de Mathématiques de MP2I, ainsi que les TDs (travaux dirigés) les accompagnant. Le professeur était M. Jansou. J'ai adapté certaines formulations me paraissant floues ou ne me plaisant pas mais le contenu pur des cours est strictement équivalent. Le document est organisé selon la hiérarchie suivante : chapitre, I), 1), a).

Les éléments des tables des matières initiale et présentes au début de chaque chapitre sont cliquables (amenant directement à la partie cliquée). C'est également le cas des références à des éléments antérieurs de la forme, par exemple, « Démonstration 5.22 ».

Dernier chapitre terminé : Chapitre 23 – Probabilités (trou de 18 à 20).

Dernier TD terminé : Chapitre 23 – Probabilités (à jour).

Dernier TD corrigé : aucun.

# Table des matières

<b>I</b>	<b>Cours</b>	<b>17</b>
<b>0</b>	<b>Préliminaires</b>	<b>18</b>
0.1	Logique . . . . .	18
0.2	Quantificateurs . . . . .	20
0.3	Raisonnements par analyse-synthèse . . . . .	22
0.4	Congruences . . . . .	23
<b>1</b>	<b>Inégalités, calculs</b>	<b>25</b>
1.1	Inégalités dans $\mathbb{R}$ . . . . .	25
1.1.1	Parties de $\mathbb{R}$ . . . . .	25
1.1.2	Manipulation d'inégalités, fonctions . . . . .	28
1.1.3	Valeur absolue . . . . .	30
1.1.4	Partie entière d'un réel . . . . .	32
1.2	Sommes et produits . . . . .	32
1.3	Factorielle, coefficients binomiaux . . . . .	37
<b>2</b>	<b>Révisions de trigonométrie</b>	<b>40</b>
2.1	Formules . . . . .	40
2.1.1	Propriétés fondamentales . . . . .	40
2.1.2	Conséquences . . . . .	40
2.1.3	Lien avec les nombres complexes . . . . .	41
2.2	Démonstrations et compléments . . . . .	41
<b>3</b>	<b>Nombres complexes</b>	<b>47</b>

3.1	Rappels . . . . .	47
3.1.1	Point de vue algébrique . . . . .	47
3.1.2	Point de vue géométrique . . . . .	50
3.1.3	Généralisation de formules connues . . . . .	54
3.2	Lien avec la trigonométrie . . . . .	55
3.2.1	Formules . . . . .	55
3.2.2	Application 1 : sommes particulières . . . . .	56
3.2.3	Application 2 : linéarisation . . . . .	57
3.3	Équations algébriques . . . . .	58
3.3.1	Fonctions polynomiales . . . . .	58
3.3.2	Racines nièmes . . . . .	60
3.3.3	Équations polynomiales de degré 2 . . . . .	66
3.4	Exponentielle complexe . . . . .	69
<b>4</b>	<b>Notions ensemblistes</b>	<b>73</b>
4.1	Ensembles . . . . .	73
4.1.1	Notations de base . . . . .	73
4.1.2	Opérations sur les ensembles . . . . .	74
4.1.3	Produit cartésien . . . . .	76
4.1.4	Autres opérations . . . . .	76
4.1.5	Partitions . . . . .	76
4.1.6	Droite réelle achevée . . . . .	77
4.2	Fonctions . . . . .	78
4.2.1	Notations de base . . . . .	78
4.2.2	Injectivité, surjectivité, bijectivité . . . . .	81
4.3	Relations . . . . .	87
4.3.1	Définition . . . . .	87
4.3.2	Relations d'équivalence . . . . .	88
4.3.3	Relations d'ordre . . . . .	90
4.4	Ensemble ordonné $(\mathbb{N}, \leq)$ . . . . .	93

4.5	Ensemble ordonné $(\mathbb{R}, \leq)$ . . . . .	95
4.6	Fonctions à valeurs dans un ensemble ordonné . . . . .	96
<b>5</b>	<b>Suites</b>	<b>97</b>
5.1	Suites . . . . .	97
5.1.1	Cadre . . . . .	97
5.1.2	Définitions . . . . .	98
5.1.3	Suite définie en itérant une fonction . . . . .	98
5.1.4	Suites particulières . . . . .	99
5.2	Convergence . . . . .	101
5.2.1	Définition . . . . .	101
5.2.2	Convergence et ordre . . . . .	103
5.2.3	Opérations sur les limites . . . . .	107
5.3	Limites infinies . . . . .	111
5.4	Suites extraites . . . . .	113
5.5	Opérations sur les limites . . . . .	115
5.6	Suites monotones . . . . .	119
5.7	Retour sur les suites extraites . . . . .	120
5.8	Densité. . . . .	123
5.8.1	Rappels . . . . .	123
5.8.2	Densité . . . . .	124
5.8.3	Caractérisation séquentielle de la densité . . . . .	126
5.9	Remarque. . . . .	127
5.10	Suites de nombres complexes . . . . .	128
<b>6</b>	<b>Algèbre générale</b>	<b>133</b>
6.1	Lois de composition internes. . . . .	133
6.1.1	Définition . . . . .	133
6.1.2	Associativité, commutativité . . . . .	134
6.1.3	Élément neutre, inverse . . . . .	135

6.1.4	Distributivité . . . . .	140
6.1.5	Parties stables . . . . .	141
6.2	Groupes . . . . .	142
6.2.1	Définition . . . . .	142
6.2.2	Sous-groupes . . . . .	146
6.2.3	Morphismes de groupe . . . . .	149
6.2.4	Isomorphismes, endomorphismes, automorphismes . . . . .	154
6.3	Anneaux . . . . .	155
6.3.1	Définition . . . . .	155
6.3.2	Calculs dans un anneau . . . . .	157
6.3.3	Sous-anneaux . . . . .	162
6.3.4	Morphismes d'anneaux . . . . .	164
6.3.5	Isomorphismes, endomorphismes, automorphismes . . . . .	166
6.3.6	Anneaux intègres . . . . .	168
6.4	Corps . . . . .	169
<b>7</b>	<b>Limites de fonctions, continuité</b>	<b>171</b>
7.1	Voisinages . . . . .	172
7.1.1	Définition . . . . .	172
7.1.2	Vocabulaire lié aux voisinages . . . . .	173
7.2	Limite d'une fonction en un point de $\overline{\mathbb{R}}$ . . . . .	175
7.2.1	Définition d'une limite . . . . .	176
7.2.2	Limites et ordre . . . . .	181
7.2.3	Compléments . . . . .	183
7.2.4	Opérations sur les limites . . . . .	185
7.2.5	Caractérisation séquentielle de la limite . . . . .	189
7.2.6	Théorème de la limite monotone . . . . .	190
7.3	Continuité . . . . .	194
7.3.1	Fonctions continues en un point . . . . .	194
7.3.2	Fonctions continues . . . . .	200

7.3.3	Fonctions continues sur un intervalle . . . . .	202
7.3.4	Fonctions continues sur un segment . . . . .	207
7.3.5	Fonctions continues injectives sur un intervalle . . . . .	209
7.3.6	Fonctions circulaires réciproques . . . . .	211
7.4	Propriétés plus fortes que la continuité . . . . .	217
7.4.1	Continuité uniforme . . . . .	217
7.4.2	Fonctions lipschitziennes . . . . .	220
<b>8</b>	<b>Arithmétique</b>	<b>222</b>
8.1	Rappels & compléments . . . . .	222
8.1.1	Division euclidienne . . . . .	222
8.1.2	Divisibilité . . . . .	223
8.1.3	Congruences . . . . .	224
8.1.4	Sous-groupes . . . . .	226
8.2	PGCD . . . . .	229
8.2.1	PGCD de deux entiers . . . . .	229
8.2.2	Relation de Bézout . . . . .	235
8.2.3	PGCD de plusieurs entiers . . . . .	237
8.3	Entiers premiers entre eux. . . . .	238
8.3.1	Cas de deux entiers . . . . .	238
8.3.2	Cas de plusieurs entiers . . . . .	241
8.4	PPCM . . . . .	242
8.5	Nombres premiers . . . . .	246
8.5.1	Définition . . . . .	246
8.5.2	Théorème fondamental . . . . .	248
8.5.3	Valuations $p$ -adiques . . . . .	250
8.6	Petit théorème de Fermat . . . . .	253
<b>9</b>	<b>Fonctions dérivables</b>	<b>256</b>

9.1	Étude locale. . . . .	257
9.1.1	Définitions . . . . .	257
9.1.2	Opérations sur les dérivées . . . . .	259
9.1.3	Fonctions de classe $\mathcal{C}^k$ . . . . .	262
9.1.4	Extrema locaux . . . . .	265
9.2	Étude globale . . . . .	266
9.2.1	Égalité des accroissements finis . . . . .	266
9.2.2	Inégalité des accroissements finis . . . . .	267
9.2.3	Cas des fonctions à valeurs complexes . . . . .	270
9.2.4	Fonctions croissantes . . . . .	271
9.2.5	Théorème de la limite de la dérivée . . . . .	274
9.2.6	Fonctions usuelles . . . . .	276
9.3	Fonctions convexes . . . . .	280
9.3.1	Preliminaires . . . . .	280
9.3.2	Définition . . . . .	281
9.3.3	Propriétés . . . . .	283
9.3.4	Fonctions convexes dérivables . . . . .	286

## 10 Polynômes, fractions rationnelles 291

10.1	Polynômes . . . . .	292
10.1.1	Anneau des polynômes . . . . .	292
10.1.2	Degré . . . . .	296
10.1.3	Division euclidienne . . . . .	300
10.1.4	Divisibilité . . . . .	302
10.1.5	Racines . . . . .	304
10.1.6	Fonctions polynomiales . . . . .	306
10.1.7	Dérivation . . . . .	307
10.2	Arithmétique des polynômes. . . . .	309
10.2.1	Idéal d'un anneau commutatif . . . . .	309



10.2.2	PGCD . . . . .	314
10.2.3	Polynômes premiers entre eux . . . . .	321
10.2.4	PPCM . . . . .	323
10.2.5	Polynômes irréductibles . . . . .	327
10.2.6	Théorème fondamental de l'arithmétique des polynômes . . . . .	332
10.3	Racines des polynômes . . . . .	339
10.3.1	Multiplicités . . . . .	339
10.3.2	Nombre de racines d'un polynôme . . . . .	341
10.3.3	Polynômes interpolateurs de Lagrange . . . . .	342
10.3.4	Polynômes scindés . . . . .	344
10.4	Fractions rationnelles . . . . .	347
10.4.1	Corps des fractions rationnelles . . . . .	347
10.4.2	Degré . . . . .	350
10.4.3	Racines, pôles . . . . .	354
10.4.4	Dérivation . . . . .	355
10.4.5	Décomposition en éléments simples . . . . .	356
<b>11</b>	<b>Intégrales sur un segment</b>	<b>368</b>
11.1	Définitions . . . . .	368
11.1.1	Subdivisions d'un segment . . . . .	368
11.1.2	Fonctions en escalier . . . . .	369
11.1.3	Fonctions continues par morceaux . . . . .	370
11.1.4	Intégrales . . . . .	372
11.2	Propriétés . . . . .	376
11.2.1	Premières propriétés . . . . .	376
11.2.2	Sommes de Riemann . . . . .	379
11.2.3	Théorème fondamental . . . . .	381
11.2.4	Intégration par parties . . . . .	384
11.2.5	Formules de Taylor . . . . .	386
11.2.6	Changements de variable . . . . .	388

11.2.7	Symétries . . . . .	390
11.3	Techniques de calcul . . . . .	391
11.3.1	Utiliser les nombres complexes . . . . .	391
11.3.2	Primitives des fonctions rationnelles . . . . .	392
11.3.3	Fonctions rationnelles en $e^t$ . . . . .	395
11.3.4	Règle de Bioche . . . . .	396
<b>12</b>	<b>Espaces vectoriels</b>	<b>398</b>
12.1	Espaces vectoriels, sous-espaces vectoriels . . . . .	399
12.1.1	Espaces vectoriels . . . . .	399
12.1.2	Sous-espaces vectoriels . . . . .	403
12.1.3	Sommes, sommes directes . . . . .	405
12.2	Applications linéaires . . . . .	409
12.2.1	Définitions . . . . .	409
12.2.2	Opérations sur les applications linéaires . . . . .	410
12.2.3	Applications linéaires et sous-espaces vectoriels . . . . .	413
12.2.4	Projecteurs . . . . .	417
12.2.5	Symétries . . . . .	422
12.2.6	Isomorphismes, automorphismes . . . . .	424
12.3	Familles de vecteurs . . . . .	426
12.3.1	Familles libres . . . . .	426
12.3.2	Familles génératrices . . . . .	431
12.3.3	Bases . . . . .	433
12.3.4	Pivot de Gauss pour les systèmes linéaires . . . . .	436
12.3.5	Familles de vecteurs et applications linéaires . . . . .	439
12.3.6	Extension aux familles quelconques . . . . .	441
12.4	Géométrie affine . . . . .	444
12.4.1	Translations . . . . .	444
12.4.2	Sous-espaces affines . . . . .	445
12.4.3	Équations linéaires . . . . .	448

<b>13 Équations différentielles</b>	<b>451</b>
13.1 Équations différentielles linéaires du premier ordre . . . . .	451
13.1.1 Cadre . . . . .	451
13.1.2 Cas homogène . . . . .	452
13.1.3 Méthode de variation de la constante . . . . .	454
13.1.4 Conséquences de la linéarité . . . . .	455
13.1.5 Méthode de résolution . . . . .	457
13.2 Équations différentielles linéaires du second ordre à coefficients constants. . . . .	459
13.2.1 Cadre . . . . .	459
13.2.2 Conséquences de la linéarité . . . . .	460
13.2.3 Cas homogène . . . . .	461
13.2.4 Second membre de la forme « polynôme $\times$ exponentielle » . . . . .	465
13.3 Changements de variable . . . . .	471
13.4 Problèmes de raccord. . . . .	471
<b>14 Espaces vectoriels de dimension finie</b>	<b>472</b>
14.1 Familles de vecteurs . . . . .	473
14.1.1 Quelques rappels . . . . .	473
14.1.2 Cardinaux des familles libres / génératrices . . . . .	473
14.1.3 Théorème de la base incomplète . . . . .	475
14.2 Dimension . . . . .	477
14.2.1 Définition . . . . .	477
14.2.2 Exemples . . . . .	479
14.3 Familles de vecteurs en dimension finie . . . . .	481
14.4 Sous-espaces vectoriels en dimension finie . . . . .	484
14.4.1 Dimension d'un sous-espace vectoriel . . . . .	484
14.4.2 Rang d'une famille de vecteurs . . . . .	486
14.4.3 Sommes directes en dimension finie . . . . .	488
14.4.4 Supplémentaire en dimension finie . . . . .	490

14.5	Autres exemples de dimensions . . . . .	491
14.5.1	Dimension d'un produit d'espaces vectoriels . . . . .	491
14.5.2	Dimension de $\mathcal{L}(E, F)$ . . . . .	492
14.6	Rang d'une application linéaire . . . . .	493
14.6.1	Définition . . . . .	493
14.6.2	Théorème du rang . . . . .	496
14.6.3	Applications . . . . .	497
14.7	Hyperplans . . . . .	501
14.7.1	Hyperplans en dimension quelconque . . . . .	501
14.7.2	Hyperplans en dimension finie . . . . .	504
14.7.3	Intersections d'hyperplans en dimension finie . . . . .	506

## 15 Matrices I 509

15.1	Matrices . . . . .	509
15.2	Combinaisons linéaires de matrices . . . . .	511
15.3	Produit matriciel . . . . .	513
15.3.1	Produits de matrices . . . . .	513
15.3.2	Produits de matrices carrées . . . . .	517
15.3.3	Matrices inversibles, groupe linéaire . . . . .	519
15.4	Matrices diagonales, matrices triangulaires. . . . .	521
15.5	Transposition . . . . .	523
15.6	Matrices symétriques, matrices antisymétriques. . . . .	525
15.7	Lignes et colonnes d'une matrice . . . . .	527
15.7.1	Abus autorisés . . . . .	527
15.7.2	Produits matriciels . . . . .	529
15.7.3	Opérations élémentaires sur les matrices . . . . .	531
15.8	Rang d'une matrice . . . . .	532
15.9	Application linéaire canoniquement associée à une matrice . . . . .	534
15.9.1	Définition . . . . .	534
15.9.2	Propriétés . . . . .	537

15.9.3	Conséquences sur l'inversibilité des matrices . . . . .	540
15.9.4	Remarque . . . . .	541
15.10	Matrices équivalentes . . . . .	541
15.11	Matrices semblables . . . . .	543
15.12	Rang d'une matrice (suite) . . . . .	545
15.13	Trace d'une matrice carrée . . . . .	548
15.14	Matrices et systèmes linéaires . . . . .	550
15.15	Calculer l'inverse d'une matrice . . . . .	553
<b>16</b>	<b>Matrices II</b>	<b>554</b>
16.1	Matrice d'une famille de vecteurs. . . . .	554
16.1.1	Définition . . . . .	554
16.1.2	Formules de changement de base . . . . .	556
16.1.3	Isomorphisme entre familles de vecteurs et matrices . . . . .	558
16.2	Matrice d'une application linéaire . . . . .	560
16.2.1	Définition . . . . .	560
16.2.2	Formules de changement de base . . . . .	563
16.2.3	Isomorphismes entre applications linéaires et matrices . . . . .	565
16.2.4	Trace d'un endomorphisme . . . . .	568
<b>17</b>	<b>Relations de comparaison, développements limités</b>	<b>570</b>
17.1	Relations de comparaison : cas des suites . . . . .	571
17.1.1	Relation de domination $\mathcal{O}$ . . . . .	571
17.1.2	Relation de négligeabilité $o$ . . . . .	572
17.1.3	Propriétés de $\mathcal{O}$ et $o$ . . . . .	573
17.1.4	Croissances comparées . . . . .	575
17.1.5	Relation d'équivalence $\sim$ . . . . .	579
17.1.6	Propriétés de $\sim$ . . . . .	581
17.1.7	Formule de Stirling . . . . .	584

17.2	Relations de comparaison : cas général . . . . .	584
17.2.1	Relation de domination $\mathcal{O}$ . . . . .	585
17.2.2	Relation de négligeabilité $o$ . . . . .	586
17.2.3	Propriétés de $\mathcal{O}$ et $o$ . . . . .	587
17.2.4	Relation d'équivalence $\sim$ . . . . .	589
17.2.5	Propriétés de $\sim$ . . . . .	591
17.2.6	Changements de variable . . . . .	592
17.2.7	Croissances comparées . . . . .	593
17.2.8	Erreurs à ne pas faire . . . . .	594
17.3	Développements limités . . . . .	595
17.3.1	Définition . . . . .	595
17.3.2	Propriétés des développements limités . . . . .	597
17.3.3	Applications . . . . .	600
17.4	Formule de Taylor . . . . .	602
17.4.1	Primitivation de développements limités . . . . .	602
17.4.2	Application . . . . .	608
17.5	Développements asymptotiques . . . . .	610
17.6	Méthodes à bien connaître . . . . .	614
17.6.1	Composer des développements limités . . . . .	614
17.6.2	Inverse d'un développement limité . . . . .	614
17.6.3	Se ramener aux développements limités connus . . . . .	615
<b>18</b>	<b>Groupe symétrique</b>	<b>618</b>
<b>19</b>	<b>Déterminants</b>	<b>619</b>
<b>20</b>	<b>Séries, familles sommables</b>	<b>620</b>
<b>21</b>	<b>Espaces préhilbertiens</b>	<b>621</b>
21.1	Produit scalaire, norme associée . . . . .	621
21.1.1	Produit scalaire . . . . .	621

21.1.2	Norme associée à un produit scalaire . . . . .	624
21.1.3	Propriétés . . . . .	628
21.2	Orthogonalité, base orthonormale . . . . .	629
21.2.1	Vocabulaire . . . . .	629
21.2.2	Propriétés des familles orthogonales . . . . .	631
21.2.3	Calculs dans une base orthonormale . . . . .	633
21.3	Sous-espaces vectoriels . . . . .	634
21.3.1	Sous-espaces vectoriels orthogonaux . . . . .	634
21.3.2	Supplémentaire orthogonal . . . . .	637
21.3.3	Projecteur orthogonal sur un sous-espace vectoriel de dimension finie . . . . .	639
21.3.4	Procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt . . . . .	642
21.3.5	Hyperplans d'un espace euclidien . . . . .	645
<b>22</b>	<b>Fonctions de deux variables réelles</b>	<b>648</b>
22.1	Ouverts de $\mathbb{R}^2$ . . . . .	648
22.2	Continuité . . . . .	650
22.3	Fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ . . . . .	652
22.3.1	Développement limité d'ordre 1 . . . . .	652
22.3.2	Dérivées partielles . . . . .	652
22.3.3	Fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ . . . . .	653
22.3.4	Règle de la chaîne . . . . .	655
22.3.5	Équations aux dérivées partielles . . . . .	657
22.4	Extrema globaux, locaux . . . . .	658
<b>23</b>	<b>Probabilités</b>	<b>661</b>
23.1	Rappels et compléments sur les ensembles . . . . .	662
23.1.1	Ensembles finis . . . . .	662
23.1.2	Dénombrement des ensembles finis . . . . .	662
23.2	Espaces probabilisés . . . . .	665
23.2.1	Cadre formel . . . . .	665

23.2.2	Exemple : probabilité uniforme sur un ensemble fini . . . . .	669
23.3	Conditionnement . . . . .	671
23.3.1	Définitions . . . . .	671
23.3.2	Propriétés . . . . .	673
23.4	Événements indépendants . . . . .	675
23.5	Variables aléatoires. . . . .	677
23.5.1	Définition . . . . .	677
23.5.2	Exemples . . . . .	679
23.5.3	Couples de variables aléatoires . . . . .	681
23.6	Variables aléatoires indépendantes . . . . .	683
23.6.1	Définition . . . . .	683
23.6.2	Lemme des coalitions . . . . .	685
23.6.3	Interprétation de la loi binomiale . . . . .	686
23.7	Espérance, variance . . . . .	687
23.7.1	Espérance . . . . .	688
23.7.2	Variance, écart-type, covariance . . . . .	691
23.7.3	Inégalités . . . . .	695
23.7.4	Compléments . . . . .	697

## **II TDs 698**

### **0 Préliminaires 699**

0.1	Logique . . . . .	699
0.2	Quantificateurs . . . . .	700
0.3	Raisonnement par analyse-synthèse . . . . .	702
0.4	Congruences . . . . .	702

### **1 Inégalités, calculs 704**

### **2 Révisions de trigonométrie 709**



<b>3</b>	<b>Nombres complexes</b>	<b>712</b>
<b>4</b>	<b>Notions ensemblistes</b>	<b>718</b>
4.1	Ensembles . . . . .	718
4.2	Fonctions . . . . .	720
4.3	Ensembles ordonnés . . . . .	723
4.4	Entiers naturels . . . . .	725
<b>5</b>	<b>Suites</b>	<b>726</b>
<b>6</b>	<b>Algèbre générale</b>	<b>732</b>
6.1	Lois de composition internes. . . . .	732
6.2	Groupes . . . . .	733
6.3	Anneaux . . . . .	736
6.4	Corps . . . . .	739
<b>7</b>	<b>Limites de fonctions, continuité</b>	<b>741</b>
7.1	Limites & continuité . . . . .	741
7.2	Principaux théorèmes. . . . .	744
7.3	Fonctions circulaires réciproques . . . . .	747
7.4	Fonctions lipschitziennes . . . . .	749
<b>8</b>	<b>Arithmétique</b>	<b>750</b>
8.1	Compléments sur les groupes . . . . .	750
8.2	Arithmétique . . . . .	751
<b>9</b>	<b>Fonctions dérivables</b>	<b>757</b>
9.1	Étude locale. . . . .	757
9.2	Étude globale . . . . .	759
9.3	Convexité. . . . .	762
<b>10</b>	<b>Polynômes, fractions rationnelles</b>	<b>766</b>
10.1	Polynômes . . . . .	766

10.2	Fractions rationnelles . . . . .	772
<b>11</b>	<b>Intégrales sur un segment</b>	<b>775</b>
<b>12</b>	<b>Espaces vectoriels</b>	<b>782</b>
12.1	Espaces vectoriels . . . . .	782
12.2	Applications linéaires . . . . .	783
12.3	Sommes directes, projecteurs . . . . .	786
12.4	Familles libres / génératrices. . . . .	787
<b>13</b>	<b>Équations différentielles</b>	<b>791</b>
13.1	Équations différentielles linéaires d'ordre 1. . . . .	791
13.2	Équations différentielles linéaires d'ordre 2. . . . .	795
13.3	Applications . . . . .	799
<b>14</b>	<b>Espaces vectoriels en dimension finie</b>	<b>800</b>
<b>15</b>	<b>Matrices I</b>	<b>807</b>
<b>16</b>	<b>Matrices II</b>	<b>812</b>
<b>17</b>	<b>Relations de comparaison, développements limités</b>	<b>817</b>
<b>18</b>	<b>Groupe symétrique</b>	<b>826</b>
<b>19</b>	<b>Déterminants</b>	<b>834</b>
<b>20</b>	<b>Séries, familles sommables</b>	<b>842</b>
<b>21</b>	<b>Espaces préhilbertiens</b>	<b>852</b>
<b>22</b>	<b>Fonctions de deux variables réelles</b>	<b>860</b>
<b>23</b>	<b>Probabilités</b>	<b>868</b>

# Première partie

## Cours

# Chapitre 0

## Préliminaires

### Sommaire

0.1	Logique . . . . .	18
0.2	Quantificateurs. . . . .	20
0.3	Raisonnements par analyse-synthèse . . . . .	22
0.4	Congruences . . . . .	23

### 0.1 Logique

#### Définition 0.1

Une proposition est une affirmation qui peut être vraie ou fausse.

Exemples :  $1 + 1 = 2$  est une proposition vraie ;  $0 > 1$  est une proposition fausse.

#### Définition 0.2

Soient  $P$  et  $Q$  deux propositions. On définit :

- la proposition «  $P$  et  $Q$  » (notée aussi  $P \wedge Q$ ) de table de vérité :

$P$	$Q$	$P \wedge Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

- la proposition «  $P$  ou  $Q$  » (notée aussi  $P \vee Q$ ) de table de vérité :

$P$	$Q$	$P \vee Q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

- la proposition «  $P$  implique  $Q$  » (notée aussi  $P \Rightarrow Q$ ) de table de vérité :

$P$	$Q$	$P \Rightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Exemple : Soit  $x$  un nombre réel. La proposition  $x \geq 0 \implies x^2 \geq 0$  est vraie. La proposition  $x = 4 \implies x = 5$  est fausse si  $x = 4$  et vraie sinon.

- la proposition «  $P$  équivaut à  $Q$  » (notée aussi  $P \iff Q$ ) de table de vérité

$P$	$Q$	$P \iff Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

- la proposition « non  $P$  » (notée aussi  $\neg P$ ) de table de vérité

$P$	$\neg P$
V	F
F	V

---

### Remarque 0.3 (Contraposition)

Soient  $P$  et  $Q$  deux propositions. Les propositions  $P \implies Q$  et  $\neg Q \implies \neg P$  sont équivalentes.

---

### Démonstration 0.4 (Méthode 1)

Il suffit de remarquer que les deux propositions ont la même table de vérité :

$P$	$Q$	$P \implies Q$	$\neg Q$	$\neg P$	$\neg Q \implies \neg P$
V	V	V	F	F	V
V	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V
F	F	V	V	V	V

■

---

### Démonstration 0.5 (Méthode 2)

Montrons que  $(P \implies Q) \iff (\neg Q \implies \neg P)$  :

$\implies$  Supposons  $P \implies Q$ . Montrons que  $\neg Q \implies \neg P$ .

Supposons  $\neg Q$ .

Si  $P$  était vraie,  $Q$  serait vraie aussi. Donc  $P$  est fausse. Donc  $\neg P$ .

D'où  $\neg Q \implies \neg P$ .

$\impliedby$  Supposons  $\neg Q \implies \neg P$ .

D'après  $\implies$  on a  $\neg(\neg P) \implies \neg(\neg Q)$ , c'est à dire  $P \implies Q$ .

■

---

### Définition 0.6

Soient  $P$  et  $Q$  deux propositions. Démontrer l'implication  $P \implies Q$  par contraposition, c'est démontrer l'implication contraposée  $\neg Q \implies \neg P$ , c'est à dire supposer  $\neg Q$  et montrer  $\neg P$ .

---

### Définition 0.7

CS : condition suffisante ; CN : condition nécessaire ; CNS : condition nécessaire et suffisante.

---

*Exemple 0.8*

CS pour avoir  $x \geq 0 : x = 10$  ; CN pour avoir  $x \geq : x \geq -1$  ; CNS pour avoir  $x \geq 0 : x + 1 \geq 1$ .

---

*Remarque 0.9*

Ne pas utiliser les symboles  $\implies$  et  $\iff$  comme des abréviations dans du texte en français.

---

*Exemple 0.10*

Soit  $x \in \mathbb{R}_+$ . Montrons que  $x + 1 \geq 1$ .

Écrire « On a  $x \geq 0 \iff x + 1 \geq 1$  » est faux.

Écrire « On a  $x \geq 0$  donc  $x + 1 \geq 1$  » est correct.

---

*Remarque 0.11*

Abréviations autorisées : CS, CN, CNS et ssi.

## 0.2 Quantificateurs

---

**Notation 0.12**

$\in$  : « appartient »

$\exists$  : « il existe ... tel que » (quantificateur existentiel)

$\forall$  : « pour tout » (quantificateur universel)

$\exists!$  : « il existe un unique ... tel que »

---

*Exemple 0.13*

$$\forall a, b \in \mathbb{R}, (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, \exists y \in \mathbb{R}, x = y^2$$

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, \exists! y \in \mathbb{R}_+, x = y^2$$

---

*Remarque 0.14*

Les quantificateurs se lisent de gauche à droite et leur ordre est important.

---

*Exemple 0.15*

On associe à tous réels  $x, y$  une proposition  $P(x, y)$ .

Alors  $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, P(x, y) \implies \forall y \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R}, P(x, y)$ .

Dans la proposition de gauche, le  $x$  est valable pour tout  $y$ . Dans la proposition de droite, le  $x$  dépend du  $y$ .

L'implication réciproque est généralement fausse.

Par exemple, la proposition  $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, y = x + 1$  est fausse mais la proposition  $\forall y \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R}, y = x + 1$  est vraie.

---

**Définition 0.16 (Produit cartésien d'ensembles)**

Soient  $A, B$  deux ensembles. On note  $A \times B$  l'ensemble des couples de la forme  $(x, y)$  où  $x \in A$  et  $y \in B$ .

Plus généralement, soient  $A_1, \dots, A_n$  des ensembles avec  $n \in \mathbb{N}^*$ .  $A_1 \times \dots \times A_n$  est l'ensemble des  $n$ -uplets de la forme  $(x_1, \dots, x_n)$  où  $x_1 \in A_1, \dots, x_n \in A_n$ .

Soient  $C$  un ensemble et  $m \in \mathbb{N}^*$ . On pose  $C^m = \underbrace{C \times \dots \times C}_{m \text{ facteurs}}$ .


On s'autorise alors les identifications suivantes :  $A \times B \times C = A \times (B \times C) = (A \times B) \times C$  et  $(x, y, z) = (x, (y, z)) = ((x, y), z)$ .

---


*Exemple 0.17*

Dessiner les ensembles  $A = [1 ; 2] \times \mathbb{R}_+$ ,  $B = \mathbb{N} \times \mathbb{R}$  et  $C = ([0 ; 1] \cup \{2\}) \times \mathbb{Z}$ .


On a  $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, (x, y) \in A \iff \begin{cases} x \in [1 ; 2] \\ y \in \mathbb{R}_+ \end{cases}$  donc :



De même, on a  $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, (x, y) \in B \iff \begin{cases} x \in \mathbb{N} \\ y \in \mathbb{R} \end{cases}$  donc :



Enfin, on a  $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, (x, y) \in C \iff \begin{cases} x \in [0 ; 1] \cup \{2\} \\ y \in \mathbb{Z} \end{cases}$  donc :




---

*Remarque 0.18*

Les notations «  $\forall x, y \in \mathbb{R}$  » et «  $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$  » sont équivalentes.

En revanche, les produits cartésiens sont nécessaires pour le quantificateur  $\exists!$ . En effet, on a  $\exists! (x, y) \in \mathbb{R}^2, P(x, y) \implies \exists! x \in \mathbb{R}, \exists! y \in \mathbb{R}, P(x, y)$ .

## 0.3 Raisonnements par analyse-synthèse

Ils sont utiles pour trouver toutes les solutions à un problème.



---

*Exemple 0.19*

Soit  $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ . Montrons que  $f$  s'écrit de façon unique comme la somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire. Autrement dit, en notant  $E_0$  l'ensemble des fonctions paires de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  et  $E_1$  l'ensemble des fonctions impaires de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ , on a  $\exists! (g, h) \in E_0 \times E_1, f = g + h$ .

analyse

Soit  $(g, h) \in E_0 \times E_1$  tel que  $f = g + h$ .

$$\text{On a } \forall x \in \mathbb{R}, \begin{cases} f(x) = g(x) + h(x) \\ f(-x) = g(x) - h(x) \end{cases}$$

$$\text{Donc par somme et différence, } \forall x \in \mathbb{R}, \begin{cases} f(x) + f(-x) = 2g(x) \\ f(x) - f(-x) = 2h(x) \end{cases}$$

$$\text{Donc } \forall x \in \mathbb{R}, \begin{cases} g(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} \\ h(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2} \end{cases}$$

synthèse

$$\text{On définit les fonctions } g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \quad \text{et} \quad h : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \quad . \\ x \longmapsto \frac{f(x) + f(-x)}{2} \quad \quad x \longmapsto \frac{f(x) - f(-x)}{2}$$

$$\text{On remarque } \forall x \in \mathbb{R}, \begin{cases} g(-x) = \frac{f(-x) + f(-(-x))}{2} = \frac{f(-x) + f(x)}{2} = g(x) \\ h(-x) = \frac{f(-x) - f(-(-x))}{2} = \frac{f(-x) - f(x)}{2} = -h(x) \end{cases}$$

Donc  $g$  est paire et  $h$  est impaire.

$$\text{Et } \forall x \in \mathbb{R}, g(x) + h(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} + \frac{f(x) - f(-x)}{2} = f(x).$$

conclusion

$$\text{Le seul couple } (g, h) \in E_0 \times E_1 \text{ est } \left( \begin{array}{c} \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto \frac{f(x) + f(-x)}{2} \end{array}, \begin{array}{c} \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto \frac{f(x) - f(-x)}{2} \end{array} \right).$$

## 0.4 Congruences

---

**Définition 0.20**

Soient  $x, y \in \mathbb{R}$  et  $T \in \mathbb{R}_+^*$ .

On dit que  $x$  et  $y$  sont congrus modulo  $T$  si on a  $\exists k \in \mathbb{Z}, x = y + kT$ .

On note alors  $x \equiv y [T]$ .

---

*Remarque 0.21*

Soient  $x, y, z \in \mathbb{R}$  et  $T \in \mathbb{R}_+^*$ . On a

- $x \equiv y [T] \iff y \equiv x [T]$  : symétrie
- $x \equiv x [T]$  : réflexivité
- $\begin{cases} x \equiv y [T] \\ y \equiv z [T] \end{cases} \implies x \equiv z [T]$  : transitivité

# Chapitre 1

## Inégalités, calculs

### Sommaire

<b>1.1</b>	<b>Inégalités dans <math>\mathbb{R}</math></b>	<b>25</b>
1.1.1	Parties de $\mathbb{R}$	25
1.1.2	Manipulation d'inégalités, fonctions	28
1.1.3	Valeur absolue	30
1.1.4	Partie entière d'un réel	32
<b>1.2</b>	<b>Sommes et produits</b>	<b>32</b>
<b>1.3</b>	<b>Factorielle, coefficients binomiaux</b>	<b>37</b>

## 1.1 Inégalités dans $\mathbb{R}$

### 1.1.1 Parties de $\mathbb{R}$

#### Définition 1.1

Soient  $A \subseteq \mathbb{R}$  et  $m, M \in \mathbb{R}$ .

On dit que  $M$  est un majorant de  $A$  et que  $M$  majore  $A$  si on a  $\forall x \in A, x \leq M$ .

On dit que  $m$  est un minorant de  $A$  et que  $m$  minore  $A$  si on a  $\forall x \in A, m \leq x$ .

On dit que la partie  $A$  est majorée si elle admet un majorant.

On dit que la partie  $A$  est minorée si elle admet un minorant.

On dit que la partie  $A$  est bornée si elle admet un majorant et un minorant.

Ainsi,

- $A$  est majorée  $\iff \exists \lambda \in \mathbb{R}, \forall x \in A, x \leq \lambda$
- $A$  est minorée  $\iff \exists \mu \in \mathbb{R}, \forall x \in A, \mu \leq x$
- $A$  est bornée  $\iff \exists \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \forall x \in A, \mu \leq x \leq \lambda \iff \exists \lambda \in \mathbb{R}_+, \forall x \in A, |x| \leq \lambda$

---

*Exemple 1.2*

- $[0 ; 1]$  est bornée (majorants possibles :  $1, \pi, \dots$  et minorants possibles :  $0, -10, \dots$ ).
- $\mathbb{N}$  est minorée par 0 mais non-majorée et donc non-bornée.
- $\mathbb{Z}$  n'est ni majorée ni minorée et donc non-bornée.

---

*Remarque 1.3*

Il n'y a jamais unicité du majorant ou du minorant.

---

**Définition 1.4**

Soient  $A \subseteq \mathbb{R}$  et  $a \in A$ .

On dit que  $a$  est le plus grand élément de  $A$  (ou maximum de  $A$ ) si on a  $\forall b \in A, b \leq a$ .

On dit que  $a$  est le plus petit élément de  $A$  (ou minimum de  $A$ ) si on a  $\forall b \in A, a \leq b$ .

---

**Proposition 1.5**

*S'il existe, le plus grand élément de  $A$  est unique et est noté  $\max A$ .*

*S'il existe, le plus petit élément de  $A$  est unique et est noté  $\min A$ .*

---

*Démonstration 1.6*

Montrons l'unicité du plus grand élément de  $A$ .

Soient  $a_1, a_2 \in A$  tels que  $\forall b \in A, \begin{cases} b \leq a_1 \\ b \leq a_2 \end{cases}$

On a en particulier  $\begin{cases} a_1 \leq a_2 \text{ avec } b = a_1 \\ a_2 \leq a_1 \text{ avec } b = a_2 \end{cases}$

Donc  $a_1 = a_2$ . Donc le plus grand élément est unique.

On montre de même l'unicité du plus petit élément. ■

---

*Remarque 1.7 (Plus grand élément  $\implies$  majorant)*

Soient  $A \subseteq \mathbb{R}$  et  $x \in \mathbb{R}$ .

$x$  est le plus grand élément de  $A$  ssi  $\begin{cases} x \in A \\ x \text{ majore } A \end{cases}$

En particulier, pour que  $A$  admette un plus grand élément, il faut que  $A$  soit majorée.

---

*Exemple 1.8*

- $[0 ; 1]$  admet 1 comme plus grand élément et 0 comme plus petit élément.
- $\mathbb{R}_+$  admet 0 comme plus petit élément mais n'admet pas de plus grand élément (car  $\mathbb{R}_+$  n'est pas majorée).
- $[0 ; 1[$  admet 0 comme plus petit élément et est majorée (par 1) mais n'admet pas de plus grand élément.

En effet, par l'absurde :

Soit  $a \in [0 ; 1[$ . Supposons que  $a$  est le plus grand élément de  $[0 ; 1[$ .

Comme  $a \in [0 ; 1[$ , on a  $0 \leq a < 1$ .

Posons  $b = \frac{a+1}{2}$ .

On a d'une part  $0 \leq a+1 < 2$  donc  $0 \leq \frac{a+1}{2} < 1$  donc  $0 \leq b < 1$  donc  $b \in [0 ; 1[$ .

D'autre part,  $a+a < a+1$  donc  $\frac{a+a}{2} < \frac{a+1}{2}$  donc  $a < b$ .

Donc  $a$  ne majore pas  $[0 ; 1[$  : contradiction.

---

*Remarque 1.9*

Toute partie finie admet un plus grand élément.

---

**Théorème 1.10**

*Toute partie non-vide de  $\mathbb{N}$  admet un plus petit élément.*

---

*Démonstration 1.11*

★★ ADMIS ★★ (fait partie de la définition de  $\mathbb{N}$ , hors programme). ■

---

**Corollaire 1.12**

*Toute partie non-vide de  $\mathbb{Z}$  minorée admet un plus petit élément.*

*Toute partie non-vide de  $\mathbb{Z}$  majorée admet un plus grand élément.*

---

*Démonstration 1.13*

Soit  $A \subseteq \mathbb{Z}$  non-vide et minorée.

Soit  $m \in \mathbb{R}$  un minorant de  $A$ .

Soit  $m' \in \mathbb{Z}$  tel que  $m' \leq m$ .

On a  $\forall x \in A, m' \leq m \leq x$ .

Donc  $m'$  minore  $A$ .

Posons  $B = \{x - m' \}_{x \in A}$ .

On remarque  $B \neq \emptyset$  car  $A \neq \emptyset$  et  $B \subseteq \mathbb{N}$  car  $\forall x \in A, \begin{cases} x - m' \in \mathbb{Z} \text{ car } x, m' \in \mathbb{Z} \\ x - m' \geq 0 \text{ car } m' \leq x \end{cases}$

Ainsi,  $B$  est une partie non-vide de  $\mathbb{N}$ .

Donc  $B$  admet un plus petit élément  $b_0 \in B : \forall b \in B, b_0 \leq b$ .

Cet élément  $b_0$  s'écrit  $b_0 = a_0 - m'$  par définition de  $B$ .

On a  $\forall x \in A, a_0 - m' \leq x - m'$  donc  $\forall x \in A, a_0 \leq x$ .

Donc  $a_0 = \min A$ .

On montre de même que toute partie  $C$  majorée non-vide de  $\mathbb{Z}$  admet un maximum, en considérant un majorant  $M \in \mathbb{Z}$  de  $C$  puis l'ensemble  $D = \{M - x\}_{x \in C}$ . ■

---

### Définition 1.14 (Intervalle)

Soit  $I \subseteq \mathbb{R}$ .

On dit que  $I$  est un intervalle de  $\mathbb{R}$  si on a  $\forall x, y \in I, \forall z \in \mathbb{R}, x \leq z \leq y \implies z \in I$ .

I.e :  $\forall x, y \in I, [x ; y] \subseteq I$ , en notant  $[x ; y] = \{z \in \mathbb{R} \mid x \leq z \leq y\}$  avec donc  $[x ; y] = \emptyset$  si  $x > y$ .

---

#### Exemple 1.15

- $\emptyset$  et  $\mathbb{R}$  sont des intervalles de  $\mathbb{R}$ .
- $[a ; b], [a ; b[, ]a ; +\infty[, \dots$  sont des intervalles de  $\mathbb{R}$  pour tous  $a, b \in \mathbb{R}$ .
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \dots$  ne sont pas des intervalles de  $\mathbb{R}$ . Par exemple, on a  $0 \leq \frac{1}{2} \leq 1$  mais  $\frac{1}{2} \notin \mathbb{N}$ .

## 1.1.2 Manipulation d'inégalités, fonctions

---

### Proposition 1.16

Soit  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$ .

Soit  $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$  dérivable.

- $f$  est constante  $\iff \forall x \in I, f'(x) = 0$
- $f$  est croissante  $\iff \forall x \in I, f'(x) \geq 0$
- $f$  est strictement croissante  $\iff \forall x \in I, f'(x) > 0$
- $f$  est strictement croissante  $\iff \begin{cases} \forall x \in I, f'(x) \geq 0 \\ \forall x, y \in I, x < y \implies \exists z \in [x ; y], f'(z) > 0 \end{cases}$

---

Remarque 1.18

Il ne faut pas oublier l'hypothèse selon laquelle  $I$  est un intervalle.

Par exemple, si  $I = \mathbb{R}^*$  alors  $I$  n'est pas un intervalle de  $\mathbb{R}$  (on a par exemple  $-1 \leq 0 \leq 1$  mais  $0 \notin \mathbb{R}^*$ ) et les fonctions  $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$  et  $g : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$  vérifient :

$$x \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x > 0 \\ -1 & \text{si } x < 0 \end{cases} \quad x \mapsto \frac{1}{x}$$

- $f' = 0$  mais  $f$  non-constante
- $\forall x \in \mathbb{R}^*, g'(x) = \frac{-1}{x^2} < 0$  mais  $g$  n'est pas strictement décroissante.

---

Remarque 1.19

Soient  $A \subseteq \mathbb{R}$  et  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ . On considère les propositions suivantes :

- (1)  $f$  croissante
- (2)  $f$  strictement croissante
- (3)  $\forall x, y \in A, x \leq y \implies f(x) \leq f(y)$
- (4)  $\forall x, y \in A, x < y \implies f(x) < f(y)$
- (5)  $\forall x, y \in A, x \leq y \iff f(x) \leq f(y)$
- (6)  $\forall x, y \in A, x < y \iff f(x) < f(y)$

Les propositions (1) et (3) sont équivalentes.

Les propositions (2), (4), (5) et (6) sont équivalentes.

---

Remarque 1.20

Quand on rédige un raisonnement par équivalences, la façon correcte d'écrire est la suivante : «  $x \leq y \iff f(x) \leq f(y)$  car  $f$  est strictement croissante ».

---

Démonstration 1.21

- (1)  $\iff$  (3) : par définition
- (2)  $\iff$  (4) : par définition
- (6)  $\iff$  (5) : par contraposition
- (6)  $\implies$  (4) : clair
- Il ne reste plus qu'à montrer que (4)  $\implies$  (6).  
Supposons (4), montrons (6).  
Soient  $x, y \in A$ . Montrons que  $x < y \iff f(x) < f(y)$ .

- $\Rightarrow$  Ok selon (4)
- $\Leftarrow$  Supposons  $f(x) < f(y)$ . Montrons que  $x < y$ .  
 Si  $x = y$  alors  $f(x) = f(y)$  : impossible.  
 Si  $x > y$  alors  $f(x) > f(y)$  selon (4) : impossible.  
 Donc  $x < y$ , d'où (6). ■

### Proposition 1.22

Soient  $a, b, c, d, \lambda \in \mathbb{R}$ .

On a

- (1)  $\begin{cases} a \leq b \\ c \leq d \end{cases} \Rightarrow a + c \leq b + d$
- (2)  $\begin{cases} a \leq b \\ \lambda \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \lambda a \leq \lambda b$
- (3)  $\begin{cases} a \leq b \\ \lambda \leq 0 \end{cases} \Rightarrow \lambda a \geq \lambda b$
- (4)  $\begin{cases} 0 \leq a \leq b \\ 0 \leq c \leq d \end{cases} \Rightarrow ac \leq bd$
- (5)  $\begin{cases} a \leq b \\ ab > 0 \end{cases} \Rightarrow \frac{1}{a} \geq \frac{1}{b}$

### Démonstration 1.23

- (1) Supposons  $a \leq b$  et  $c \leq d$ .  
 On a  $a + c \leq b + c$  car  $x \mapsto x + c$  croissante.  
 Donc  $a + c \leq b + d$  car  $c \leq d$ .
- (2) Supposons  $\lambda \geq 0$ .  
 La fonction  $x \mapsto \lambda x$  est de dérivée positive sur l'intervalle  $\mathbb{R}$  donc elle est croissante.
- (3) Idem.
- (4) Idem.
- (5) C'est la décroissance de la fonction inverse sur les intervalles  $\mathbb{R}_+^*$  et  $\mathbb{R}_-^*$  (en effet,  $ab > 0 \iff (a, b \in \mathbb{R}_+^* \text{ ou } a, b \in \mathbb{R}_-^*)$ ). ■

### 1.1.3 Valeur absolue

#### Notation 1.24

On pose  $\forall x \in \mathbb{R}, |x| = \max \{x ; -x\} = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$



---

Remarque 1.25

On a  $\forall x \in \mathbb{R}_+, \sqrt{x^2} = x$  et  $\forall x \in \mathbb{R}, \sqrt{x^2} = |x|$ .

Ainsi, on a  $\forall x, y \in \mathbb{R}, \begin{cases} x^2 = y^2 \iff |x| = |y| \\ x^2 \leq y^2 \iff |x| \leq |y| \end{cases}$  car  $x \mapsto \sqrt{x}$  strictement croissante

---

**Proposition 1.26 (Inégalité triangulaire)**

Soient  $x, y \in \mathbb{R}$ .

On a  $||x| - |y|| \leq |x + y| \leq |x| + |y|$ .

Et donc  $||x| - |y|| \leq |x - y| \leq |x| + |y|$  en remplaçant  $y$  par  $-y$ .

---

Démonstration 1.27

(1) Montrons que  $|x + y| \leq |x| + |y|$ .

Si  $x \geq 0$  et  $y \geq 0$  alors  $x + y \geq 0$  donc  $|x + y| = x + y = |x| + |y|$ .

Si  $x < 0$  et  $y < 0$  alors  $x + y < 0$  donc  $|x + y| = -x - y = |x| + |y|$ .

Si  $x \geq 0$  et  $y < 0$  alors  $\begin{cases} x + y \leq x - y = |x| + |y| \text{ car } y < 0 \\ -x - y \leq x - y = |x| + |y| \text{ car } x \geq 0 \end{cases}$  donc  $|x + y| = \max \{x + y ; -x - y\} \leq |x| + |y|$ .

Si  $x < 0$  et  $y \geq 0$  : idem en échangeant  $x$  et  $y$ .

(2) On remarque  $|x| = |x + y - y|$

$$\leq |x + y| + |-y| \text{ selon (1)}$$

$$= |x + y| + |y|$$

Donc  $|x| - |y| \leq |x + y|$ .

De même,  $|y| = |y + x - x| \leq |y + x| + |x|$ .

Donc  $|y| - |x| \leq |y + x|$ .

Finalement,  $||x| - |y|| = \max \{|x| - |y| ; |y| - |x|\} \leq |x + y|$ . ■

---

**Proposition 1.28**

Soient  $x, y \in \mathbb{R}$ .

On a  $|xy| \leq \frac{x^2 + y^2}{2}$ .

---

Démonstration 1.29

On a  $(x - y)^2 \geq 0$  et  $(x + y)^2 \geq 0$ .

$$\text{Donc } \begin{cases} xy \leq \frac{x^2 + y^2}{2} \\ -xy \leq \frac{x^2 + y^2}{2} \end{cases}$$

D'où  $|xy| = \max \{xy ; -xy\} \leq \frac{x^2 + y^2}{2}$ . ■

### 1.1.4 Partie entière d'un réel

---

#### Définition 1.30

Soit  $x \in \mathbb{R}$ .

On appelle partie entière de  $x$  et on note  $\lfloor x \rfloor$  le plus grand entier relatif  $n \in \mathbb{Z}$  tel que  $n \leq x$ .

Un tel entier existe car  $\{n \in \mathbb{Z} \mid n \leq x\}$  est une partie non-vide et majorée de  $\mathbb{Z}$ .

---

*Exemple 1.31*

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \lfloor n \rfloor = n; \left\lfloor \frac{1}{2} \right\rfloor = 1; \left\lfloor -\frac{1}{2} \right\rfloor = -2.$$

---

#### Proposition 1.32

Soit  $x \in \mathbb{R}$ .

On a

$$(1) \lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$$

$$(2) \forall n \in \mathbb{Z}, n \leq x \iff n \leq \lfloor x \rfloor$$

---

*Démonstration 1.33*

(1) On a  $\lfloor x \rfloor \leq x$  par définition.

De plus,  $\lfloor x \rfloor$  est le plus grand entier inférieur à  $x$  donc  $\lfloor x \rfloor + 1$  n'est pas un entier inférieur à  $x$ .

(2) Soit  $n \in \mathbb{Z}$ .

$\boxed{\Leftarrow}$  Claire car  $\lfloor x \rfloor \leq x$ .

$\boxed{\Rightarrow}$  Si  $n \leq x$  alors  $n$  est plus petit que le plus grand entier inférieur à  $x$ .

Donc  $n \leq \lfloor x \rfloor$ . ■

## 1.2 Sommes et produits

---

#### Notation 1.34

On pose  $\forall a, b \in \mathbb{Z}, \llbracket a ; b \rrbracket = \{n \in \mathbb{Z} \mid a \leq n \leq b\}$ .

---

**Notation 1.35**

Soient  $a, b \in \mathbb{Z}$  et  $f : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{R}$ .

- On pose  $\sum_{k=a}^b f(k) = \begin{cases} f(a) + f(a+1) + \cdots + f(b) & \text{si } a \leq b \\ 0 & \text{si } a > b \end{cases}$
- On pose  $\prod_{k=a}^b f(k) = \begin{cases} f(a) \times f(a+1) \times \cdots \times f(b) & \text{si } a \leq b \\ 1 & \text{si } a > b \end{cases}$
- Soit  $E$  un ensemble fini et  $f : E \longrightarrow \mathbb{R}$ .  
On note  $\sum_{x \in E} f(x)$  la somme des  $f(x)$  pour  $x \in E$  (0 si  $E = \emptyset$ ).  
Et  $\prod_{x \in E} f(x)$  le produit des  $f(x)$  pour  $x \in E$  (1 si  $E = \emptyset$ ).

---

*Remarque 1.36*

Les indices  $k$  et  $x$  sont des « variables locales », non définies en dehors des  $\sum$  et  $\prod$ .

Ce sont aussi des « variables muettes », la somme ou le produit ne dépend pas du nom de la variable :

$$\sum_{k=a}^b f(k) = \sum_{\ell=a}^b f(\ell).$$

---

*Remarque 1.37 (Changements d'indice)*

- Soit  $n \in \llbracket 2 ; +\infty \rrbracket$ .

$$\text{On a } \sum_{k=2}^n 2^{k-2} \ln(k+1) = \sum_{k=0}^{n-2} 2^k \ln(k+3).$$

- Soit  $(u_k)_{k \in \mathbb{N}}$  une suite de réels.

$$\text{On a } \sum_{k=0}^{n-1} u_{k+1} = \sum_{k=1}^n u_k.$$

---

**Proposition 1.38**

Soient  $E$  et  $F$  deux ensembles finis. On suppose que  $E$  et  $F$  sont disjoints (ie  $E \cap F = \emptyset$ ).

Soit  $f : E \cup F \longrightarrow \mathbb{R}$ .

$$\text{Alors } \sum_{x \in E \cup F} f(x) = \sum_{x \in E} f(x) + \sum_{x \in F} f(x).$$

$$\text{Et } \prod_{x \in E \cup F} f(x) = \prod_{x \in E} f(x) \times \prod_{x \in F} f(x).$$

---

**Proposition 1.39 (Sommes télescopiques)**

Soient  $a, b \in \mathbb{Z}$  tels que  $a \leq b$  et  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite de réels.

$$\text{On a } \sum_{k=a}^b (u_{k+1} - u_k) = u_{b+1} - u_a.$$

---

*Démonstration 1.40*

$$\text{On a } \sum_{k=a}^b (u_{k+1} - u_k) = \sum_{k=a}^b u_{k+1} - \sum_{k=a}^b u_k = \sum_{k=a+1}^{b+1} u_k - \sum_{k=a}^b u_k = u_{b+1} - u_a. \quad \blacksquare$$

---

*Exemple 1.41*

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . Calculer  $\sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{1}{k}\right)$  et  $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}$ .

$$\begin{aligned} \bullet \text{ On a } \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{1}{k}\right) &= \sum_{k=1}^n \ln \frac{k+1}{k} \\ &= \sum_{k=1}^n (\ln(k+1) - \ln k) \\ &= \sum_{k=1}^n \ln(k+1) - \sum_{k=1}^n \ln k \\ &= \sum_{k=2}^{n+1} \ln k - \sum_{k=1}^n \ln k \\ &= \ln(n+1) - \ln 1 \\ &= \ln(n+1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\bullet \text{ On a } \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} &= \sum_{k=1}^n \frac{1+k-k}{k(k+1)} \\
&= \sum_{k=1}^n \left( \frac{1+k}{k(k+1)} - \frac{k}{k(k+1)} \right) \\
&= \sum_{k=1}^n \left( \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\
&= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k+1} \\
&= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \sum_{k=2}^{n+1} \frac{1}{k} \\
&= 1 - \frac{1}{n+1} \\
&= \frac{n}{n+1}
\end{aligned}$$

---

**Proposition 1.42 (Produits télescopiques)**

Soient  $a, b \in \mathbb{N}$  tels que  $a \leq b$  et  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite de réels non-nuls.

Alors, 
$$\prod_{k=a}^b \frac{u_{k+1}}{u_k} = \frac{u_{b+1}}{u_a}.$$

---

**Proposition 1.43 (Doubles sommes)**

Soient  $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$  et  $f : \mathbb{Z}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ .

Alors, 
$$\sum_{i=a}^b \sum_{j=c}^d f(i, j) = \sum_{(i,j) \in \llbracket a;b \rrbracket \times \llbracket c;d \rrbracket} f(i, j) = \sum_{j=c}^d \sum_{i=a}^b f(i, j).$$

On appelle *intersion* le passage du membre de gauche au membre de droite.

---

**Proposition 1.44 (Produits doubles)**

Soient  $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$  et  $f : \mathbb{Z}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ .

Alors, 
$$\prod_{i=a}^b \prod_{j=c}^d f(i, j) = \prod_{j=c}^d \prod_{i=a}^b f(i, j) \text{ (intersion).}$$

---

*Exemple 1.45*

$$\text{On a } \sum_{i=0}^1 \sum_{j=0}^2 j^i = (1+1+1) + (0+1+2) = 6 \text{ et } \sum_{j=0}^2 \sum_{i=0}^1 j^i = (1+0) + (1+1) + (1+2) = 6.$$

---

**Proposition 1.46**

Soient  $E$  et  $F$  deux ensembles finis et  $f : E \longrightarrow \mathbb{R}$  et  $g : F \longrightarrow \mathbb{R}$ .

$$\text{On a } \sum_{x \in E} f(x) \times \sum_{y \in F} g(y) = \sum_{x \in E} \sum_{y \in F} f(x) g(y).$$

---

*Exemple 1.47*

Soient  $n \in \mathbb{N}$  et  $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ .

$$\text{On a } \left( \sum_{k=1}^n x_k \right)^2 = \sum_{k=1}^n x_k^2 + 2 \sum_{1 \leq k < \ell \leq n} x_k x_\ell.$$

---

*Remarque 1.48*

La dernière somme pourrait s'écrire  $\sum_{(k,\ell) \in E} \dots$  où  $E = \{(k, \ell) \in \mathbb{N}^2 \mid 1 \leq k < \ell \leq n\}$  ou encore  $\sum_{k=1}^n \sum_{\ell=k+1}^n \dots$

---

*Démonstration 1.49*

$$\begin{aligned} \text{On a } \left( \sum_{k=1}^n x_k \right)^2 &= \sum_{k=1}^n x_k \times \sum_{\ell=1}^n x_\ell \\ &= \sum_{k=1}^n \sum_{\ell=1}^n x_k x_\ell \\ &= \sum_{1 \leq k = \ell \leq n} x_k x_\ell + \sum_{1 \leq k < \ell \leq n} x_k x_\ell + \sum_{1 \leq \ell < k \leq n} x_k x_\ell \\ &= \sum_{k=1}^n x_k^2 + 2 \sum_{1 \leq k < \ell \leq n} x_k x_\ell \end{aligned}$$

■

## 1.3 Factorielle, coefficients binomiaux

---

### Définition 1.50 (Factorielle)

Soit  $n \in \mathbb{N}$ .

On pose  $n! = \prod_{k=1}^n k$ .

---

### Définition 1.51 (Coefficient binomial)

Soient  $n \in \mathbb{N}$  et  $p \in \mathbb{Z}$ .

On pose 
$$\binom{n}{p} = \begin{cases} \frac{n!}{p! (n-p)!} & \text{si } 0 \leq p \leq n \\ 0 & \text{si } 0 > p \text{ ou } p > n \end{cases}$$

$\binom{n}{p}$  est le nombre de parties de cardinal  $p$  contenues dans un ensemble de cardinal  $n$ .

Supposons  $0 \leq p \leq n$ . On a  $\frac{n!}{(n-p)!} = n(n-1) \dots (n-p+1)$ .

Donc 
$$\binom{n}{p} = \frac{n(n-1) \dots (n-p+1)}{p!}.$$

On a  $\binom{n}{0} = \frac{1}{1} = 1$ ;  $\binom{n}{1} = \frac{n}{1} = n$ ;  $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{1 \times 2} = \frac{n(n-1)}{2}$ .

---

### Proposition 1.52

Soient  $n \in \mathbb{N}$  et  $p \in \mathbb{Z}$ .

On a

$$(1) \quad \binom{n}{p} = \binom{n}{n-p}$$

$$(2) \quad \binom{n}{p} + \binom{n}{p+1} = \binom{n+1}{p+1}$$

$$(3) \quad \text{Si } p \neq 0 \text{ alors } \binom{n}{p} = \frac{n}{p} \binom{n-1}{p-1}$$

---

### Démonstration 1.53

(1) On a  $0 \leq p \leq n \iff 0 \leq n-p \leq n$ .

Si  $p < 0$  ou  $n < p$ , les deux coefficients binomiaux sont nuls.

Sinon, 
$$\binom{n}{n-p} = \frac{n!}{(n-p)! (n-(n-p))!} = \frac{n!}{(n-p)! p!} = \binom{n}{p}.$$

(2) Si  $p < -1$ , les trois coefficients binomiaux sont nuls.

Si  $p = -1$ , on a bien  $0 + 1 = 1$ .

Si  $p > n$ , les trois coefficients binomiaux sont nuls.

Si  $p = n$ , on a bien  $1 + 0 = 1$ .

Supposons désormais  $0 \leq p \leq n - 1$ .

Les trois coefficients binomiaux sont non-nuls et on a :

$$\begin{aligned} \binom{n}{p} + \binom{n}{p+1} &= \frac{n!}{p! (n-p)!} + \frac{n!}{(p+1)! (n-p-1)!} \\ &= \frac{(p+1)n! + (n-p)n!}{(n-p)! (p+1)!} \\ &= \frac{(n+1)n!}{(n-p)! (p+1)!} \\ &= \frac{(n+1)!}{((n+1) - (p+1))! (p+1)!} \\ &= \binom{n+1}{p+1} \end{aligned}$$

(3) Si  $p < 0$ , on a bien  $0 = 0$ .

Si  $p > n$ , idem.

Supposons  $1 \leq p \leq n$ .

$$\text{On a } \binom{n}{p} = \frac{n(n-1)\dots(n-p+1)}{p!} = \frac{n}{p} \times \frac{(n-1)\dots(n-p+1)}{(p-1)!} = \frac{n}{p} \binom{n-1}{p-1}.$$

■

#### Remarque 1.54

Le triangle de Pascal est complété à l'aide de (2) :

	0	1	2	3	4	
0	$\binom{0}{0}$					
1	$\binom{1}{0}$	$\binom{1}{1}$				
2	$\binom{2}{0}$	$\binom{2}{1}$	$\binom{2}{2}$			
3	$\binom{3}{0}$	$\binom{3}{1}$	$\binom{3}{2}$	$\binom{3}{3}$		

donnant

	0	1	2	3	4
0	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0
2	1	2	1	0	0
3	1	3	3	1	0

#### Proposition 1.55 (Formule du binôme de Newton)

Soient  $x, y \in \mathbb{R}$  et  $n \in \mathbb{N}$ .

$$\text{On a } (x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} y^k x^{n-k}$$



---

*Démonstration 1.56*

Par récurrence sur  $n \in \mathbb{N}$ .

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on note  $P(n)$  la proposition «  $(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$  ».

Initialisation :

On a bien  $(x+y)^0 = 1$  et  $\sum_{k=0}^0 \binom{0}{k} x^k y^{0-k} = \binom{0}{0} x^0 y^0 = 1$ .

D'où  $P(0)$ .

Hérédité :

Soit  $n \in \mathbb{N}$  tel que  $P(n)$ . Montrons  $P(n+1)$ . On a :

$$\begin{aligned} (x+y)^{n+1} &= (x+y)(x+y)^n \\ &= (x+y) \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k} \text{ selon } P(n) \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{k+1} y^{n-k} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k+1} \\ &= \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n}{k-1} x^k y^{n-k+1} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k+1} \\ &= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n}{k-1} x^k y^{n-k+1} + \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n}{k} x^k y^{n-k+1} \text{ car } \binom{n}{-1} = \binom{n}{n+1} = 0 \\ &= \sum_{k=0}^{n+1} \left( \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} \right) x^k y^{n-k+1} \\ &= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} x^k y^{n-k+1} \end{aligned}$$

D'où  $P(n+1)$ .

Conclusion :

On a  $\forall n \in \mathbb{N}, P(n)$ . ■

# Chapitre 2

## Révisions de trigonométrie

### Sommaire

<b>2.1</b>	<b>Formules</b>	<b>40</b>
2.1.1	Propriétés fondamentales	40
2.1.2	Conséquences	40
2.1.3	Lien avec les nombres complexes	41
<b>2.2</b>	<b>Démonstrations et compléments</b>	<b>41</b>

## 2.1 Formules

### 2.1.1 Propriétés fondamentales

Les fonctions  $\cos$  et  $\sin$  sont définies sur  $\mathbb{R}$  et vérifient  $\cos^2 + \sin^2 = 1$ .

La fonction  $\tan$  est définie en tout réel  $x$  tel que  $x \neq \frac{\pi}{2} [\pi]$ .

Ces trois fonctions sont dérivables et on a :  $\cos' = -\sin$  ;  $\sin' = \cos$  ;  $\tan' = 1 + \tan^2 = \frac{1}{\cos^2}$ .

$$\forall a, b \in \mathbb{R}, \quad \cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

$$\forall a, b \in \mathbb{R}, \quad \sin(a+b) = \sin a \cos b + \sin b \cos a$$

### 2.1.2 Conséquences

$$\forall a, b \in \mathbb{R}, \quad \begin{cases} a \neq \frac{\pi}{2} [\pi] \\ b \neq \frac{\pi}{2} [\pi] \\ a+b \neq \frac{\pi}{2} [\pi] \end{cases} \implies \tan(a+b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}$$

$$\forall a \in \mathbb{R}, \quad \cos(2a) = 2\cos^2 a - 1 \text{ et } \cos^2 a = \frac{1 + \cos(2a)}{2} \text{ et } \sin^2 a = \frac{1 - \cos(2a)}{2}$$

$$\forall a \in \mathbb{R}, \quad \sin(2a) = 2 \sin a \cos a$$

$$\forall a \in \mathbb{R}, \quad \begin{cases} a \not\equiv \frac{\pi}{2} [\pi] \\ a \not\equiv \frac{\pi}{4} \left[ \frac{\pi}{2} \right] \end{cases} \implies \tan(2a) = \frac{2 \tan a}{1 - \tan^2 a}$$

$$\forall a, b \in \mathbb{R}, \quad \cos a \cos b = \frac{\cos(a+b) + \cos(a-b)}{2}$$

$$\forall a, b \in \mathbb{R}, \quad \sin a \sin b = \frac{-\cos(a+b) + \cos(a-b)}{2}$$

$$\forall a, b \in \mathbb{R}, \quad \sin a \cos b = \frac{\sin(a+b) + \sin(a-b)}{2}$$

$$\forall p, q \in \mathbb{R}, \quad \cos p + \cos q = 2 \cos \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$$

$$\forall p, q \in \mathbb{R}, \quad \sin p + \sin q = 2 \sin \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$$

$$\forall p, q \in \mathbb{R}, \quad \cos p - \cos q = -2 \sin \frac{p+q}{2} \sin \frac{p-q}{2}$$

Soit  $\theta \in \mathbb{R}$  tel que  $\theta \not\equiv \pi [2\pi]$ . On pose  $t = \tan \frac{\theta}{2}$ . On a  $\begin{cases} \cos \theta = \frac{1-t^2}{1+t^2} \\ \sin \theta = \frac{2t}{1+t^2} \end{cases}$

### 2.1.3 Lien avec les nombres complexes

$$\forall \theta \in \mathbb{R}, \quad e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

$$\forall \theta \in \mathbb{R}, \quad \cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \text{ et } \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} \text{ (formules d'Euler)}$$

## 2.2 Démonstrations et compléments

Cercle trigonométrique :  $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\} = \{(\cos \theta, \sin \theta)\}_{\theta \in \mathbb{R}}$ .


*Remarque 2.1*

L'égalité des ensembles signifie :

$$\supseteq \quad \forall \theta \in \mathbb{R}, \quad \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$$

$$\subseteq \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad x^2 + y^2 = 1 \implies \exists \theta \in \mathbb{R}, \quad (x, y) = (\cos \theta, \sin \theta)$$

On a le cercle trigonométrique suivant :



On a  $\frac{\tan \theta}{1} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$  par le théorème de Thalès.

Valeurs remarquables :

$\theta$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin \theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan \theta$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	indéfini

On a  $\forall k \in \mathbb{Z}, \begin{cases} \cos(\theta + k\pi) = (-1)^k \cos \theta \\ \sin(\theta + k\pi) = (-1)^k \sin \theta \end{cases}$  et  $\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sin \theta$  et  $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cos \theta$ .

Soient  $a, b \in \mathbb{R}$ .

- On a  $\tan(a+b)$  bien défini ssi  $a+b \not\equiv \frac{\pi}{2} [\pi]$   
 $\tan a$  bien défini ssi  $a \not\equiv \frac{\pi}{2} [\pi]$   
 $\tan b$  bien défini ssi  $b \not\equiv \frac{\pi}{2} [\pi]$

$$\text{On a alors } \tan(a+b) = \frac{\sin(a+b)}{\cos(a+b)} = \frac{\sin a \cos b + \sin b \cos a}{\cos a \cos b - \sin a \sin b} = \frac{\frac{\sin a}{\cos a} + \frac{\sin b}{\cos b}}{1 - \frac{\sin a \sin b}{\cos a \cos b}} = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}.$$

- On a  $\tan a$  bien défini ssi  $a \not\equiv \frac{\pi}{2} [\pi]$   
 $\tan 2a$  bien défini ssi  $2a \not\equiv \frac{\pi}{2} [\pi]$  ssi  $a \not\equiv \frac{\pi}{4} [\pi]$

$$\text{On a alors } \tan 2a = \frac{\tan a + \tan a}{1 - \tan a \tan a} = \frac{2 \tan a}{1 - \tan^2 a}.$$

- $\cos 2a = \cos a \cos a - \sin a \sin a = \cos^2 a - (1 - \cos^2 a) = 2 \cos^2 a - 1$

$$\text{Donc } \cos^2 a = \frac{\cos 2a + 1}{2}.$$

$$\text{D'où } \sin^2 a = 1 - \frac{\cos 2a + 1}{2} = \frac{1 - \cos 2a}{2}.$$

- $\sin 2a = \sin a \cos a + \sin a \cos a = 2 \sin a \cos a$
- On a

$$(1) \quad \cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

$$(2) \quad \cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$$

$$(3) \quad \sin(a + b) = \sin a \cos b + \sin b \cos a$$

$$(4) \quad \sin(a - b) = \sin a \cos b - \sin b \cos a$$

D'où

$$\text{--- } \cos a \cos b = \frac{\cos(a + b) + \cos(a - b)}{2} \text{ selon } \frac{(1) + (2)}{2}.$$

$$\text{--- } \sin a \sin b = \frac{\cos(a - b) - \cos(a + b)}{2} \text{ selon } \frac{(2) - (1)}{2}.$$

$$\text{--- } \sin a \cos b = \frac{\sin(a + b) + \sin(a - b)}{2} \text{ selon } \frac{(3) + (4)}{2}.$$

- Soient  $p, q \in \mathbb{R}$ .

$$\text{On remarque } \begin{cases} p = \frac{p+q}{2} + \frac{p-q}{2} \\ q = \frac{p+q}{2} - \frac{p-q}{2} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{D'où } \cos p + \cos q &= \cos\left(\frac{p+q}{2} + \frac{p-q}{2}\right) + \cos\left(\frac{p+q}{2} - \frac{p-q}{2}\right) \\ &= \cos\left(\frac{p+q}{2}\right) \cos\left(\frac{p-q}{2}\right) - \sin\left(\frac{p+q}{2}\right) \sin\left(\frac{p-q}{2}\right) + \cos\left(\frac{p+q}{2}\right) \cos\left(\frac{p-q}{2}\right) \\ &\quad + \sin\left(\frac{p+q}{2}\right) \sin\left(\frac{p-q}{2}\right) \\ &= 2 \cos\left(\frac{p+q}{2}\right) \cos\left(\frac{p-q}{2}\right) \end{aligned}$$

$$\text{De même, } \cos p - \cos q = -2 \sin\left(\frac{p+q}{2}\right) \sin\left(\frac{p-q}{2}\right)$$

$$\begin{aligned} \text{Et } \sin p + \sin q &= \sin\left(\frac{p+q}{2} + \frac{p-q}{2}\right) + \sin\left(\frac{p+q}{2} - \frac{p-q}{2}\right) \\ &= \sin\left(\frac{p+q}{2}\right) \cos\left(\frac{p-q}{2}\right) + \sin\left(\frac{p-q}{2}\right) \cos\left(\frac{p+q}{2}\right) + \sin\left(\frac{p+q}{2}\right) \cos\left(\frac{p-q}{2}\right) \\ &\quad - \sin\left(\frac{p-q}{2}\right) \cos\left(\frac{p+q}{2}\right) \\ &= 2 \sin\left(\frac{p+q}{2}\right) \cos\left(\frac{p-q}{2}\right) \end{aligned}$$

- On a  $\theta \notin \pi [2\pi]$  donc  $\frac{\theta}{2} \notin \frac{\pi}{2} [\pi]$  donc  $t = \tan \frac{\theta}{2}$  est bien défini.

$$\begin{aligned}
\text{On a } \cos \theta &= \cos \left( \frac{\theta}{2} + \frac{\theta}{2} \right) \\
&= \cos \left( \frac{\theta}{2} \right) \cos \left( \frac{\theta}{2} \right) - \sin \left( \frac{\theta}{2} \right) \sin \left( \frac{\theta}{2} \right) \\
&= \cos^2 \frac{\theta}{2} - \sin^2 \frac{\theta}{2} \\
&= \cos^2 \frac{\theta}{2} \left( 1 - \frac{\sin^2 \frac{\theta}{2}}{\cos^2 \frac{\theta}{2}} \right) \\
&= \cos^2 \frac{\theta}{2} \left( 1 - \tan^2 \frac{\theta}{2} \right)
\end{aligned}$$

$$\text{Or } 1 + \tan^2 = \frac{1}{\cos^2} \text{ donc } \cos^2 = \frac{1}{1 + \tan^2}.$$


$$\text{Donc } \cos \theta = \frac{1}{1 + \tan^2 \frac{\theta}{2}} \left( 1 - \tan^2 \frac{\theta}{2} \right) = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}.$$

$$\begin{aligned}
\text{De même, } \sin \theta &= \sin \left( \frac{2\theta}{2} \right) \\
&= 2 \sin \left( \frac{\theta}{2} \right) \cos \left( \frac{\theta}{2} \right) \\
&= 2 \frac{\sin \frac{\theta}{2}}{\cos \frac{\theta}{2}} \cos^2 \frac{\theta}{2} \\
&= 2 \tan \frac{\theta}{2} \times \frac{1}{1 + \tan^2 \frac{\theta}{2}} \\
&= \frac{2t}{1 + t^2}
\end{aligned}$$


### Rappel 2.2

On a les courbes suivantes :


$\cos$  ( $2\pi$ -périodique)



$\sin$  ( $2\pi$ -périodique) :



$\tan$  ( $\pi$ -périodique) :




---

### Proposition 2.3

On a  $\forall x \in \mathbb{R}, |\sin x| \leq |x|$ .

---

#### Démonstration 2.4

Comme les fonctions  $x \mapsto |\sin x|$  et  $x \mapsto |x|$  sont paires, il suffit de montrer l'inégalité sur  $\mathbb{R}_+$ .

C'est à dire  $\forall x \in \mathbb{R}_+, \begin{cases} \sin x \leq x \\ -\sin x \leq x \end{cases}$

Posons  $f : x \mapsto x - \sin x$  et  $g : x \mapsto x + \sin x$ .

On a  $\forall x \in \mathbb{R}_+, \begin{cases} f'(x) = 1 - \cos x \geq 0 \\ g'(x) = 1 + \cos x \geq 0 \end{cases}$  car  $\forall x \in \mathbb{R}_+, -1 \leq \cos x \leq 1$ .

Donc  $f$  et  $g$  sont croissantes sur  $\mathbb{R}_+$ . Donc  $\forall x \in \mathbb{R}_+, f(x) \geq f(0) = 0$  et  $\forall x \in \mathbb{R}_+, g(x) \geq g(0) = 0$ .

Donc  $\forall x \in \mathbb{R}_+, \begin{cases} x - \sin x \geq 0 \\ x + \sin x \geq 0 \end{cases}$

D'où le résultat. ■

---

*Remarque 2.5*

Soient  $a, b \in \mathbb{R}$ . On considère la fonction  $f : \theta \mapsto a \cos \theta + b \sin \theta$ .

Supposons  $(a, b) \neq (0, 0)$ .

$$\text{On a } \forall \theta \in \mathbb{R}, \quad f(\theta) = \sqrt{a^2 + b^2} \left( \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cos \theta + \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sin \theta \right).$$

$$\text{On remarque } \left( \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)^2 + \left( \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)^2 = 1.$$

$$\text{Donc il existe } \alpha \in \mathbb{R} \text{ tel que } \begin{cases} \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \sin \alpha \\ \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \cos \alpha \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{On a alors } \forall \theta \in \mathbb{R}, \quad f(\theta) &= \sqrt{a^2 + b^2} (\sin \alpha \cos \theta + \cos \alpha \sin \theta) \\ &= \sqrt{a^2 + b^2} \sin(\theta + \alpha) \end{aligned}$$



# Chapitre 3

## Nombres complexes

### Sommaire

---

<b>3.1</b>	<b>Rappels . . . . .</b>	<b>47</b>
3.1.1	Point de vue algébrique . . . . .	47
3.1.2	Point de vue géométrique . . . . .	50
3.1.3	Généralisation de formules connues . . . . .	54
<b>3.2</b>	<b>Lien avec la trigonométrie. . . . .</b>	<b>55</b>
3.2.1	Formules . . . . .	55
3.2.2	Application 1 : sommes particulières . . . . .	56
3.2.3	Application 2 : linéarisation . . . . .	57
<b>3.3</b>	<b>Équations algébriques . . . . .</b>	<b>58</b>
3.3.1	Fonctions polynomiales . . . . .	58
3.3.2	Racines nièmes . . . . .	60
3.3.2.1	Division euclidienne dans $\mathbb{Z}$ . . . . .	60
3.3.2.2	Racines nièmes d'un nombre complexe . . . . .	62
3.3.2.3	Racines carrées sous forme algébrique . . . . .	65
3.3.3	Équations polynomiales de degré 2 . . . . .	66
3.3.3.1	Résolution . . . . .	66
<b>3.4</b>	<b>Exponentielle complexe . . . . .</b>	<b>69</b>

---

### 3.1 Rappels

#### 3.1.1 Point de vue algébrique

---

##### Rappel 3.1

- On note  $\mathbb{C}$  l'ensemble des nombres complexes et  $i \in \mathbb{C}$  le nombre complexe particulier vérifiant  $i^2 = -1$ .
- Tout nombre complexe  $z \in \mathbb{C}$  s'écrit de façon unique sous la forme  $z = a + ib$  où  $a, b \in \mathbb{R}$  sont appelés respectivement partie réelle et partie imaginaire de  $z$  et notés  $a = \operatorname{Re} z$  et  $b = \operatorname{Im} z$ . On dit que  $z = a + ib$  est l'écriture algébrique de  $z$ .
- Enfin, on dit que  $z$  est un imaginaire pur si  $\operatorname{Re} z = 0$ .

- Opérations sur les nombres complexes :

Soient  $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ . Soient  $a_1, b_1, a_2, b_2 \in \mathbb{R}$  tels que 
$$\begin{cases} z_1 = a_1 + ib_1 \\ z_2 = a_2 + ib_2 \end{cases}$$

$$\text{On pose } \begin{cases} z_1 + z_2 = a_1 + a_2 + i(b_1 + b_2) \\ z_1 z_2 = a_1 a_2 - b_1 b_2 + i(a_1 b_2 + a_2 b_1) \\ \overline{z_1} = a_1 - ib_1 \\ |z_1| = \sqrt{a_1^2 + b_1^2} \end{cases}$$

$$\text{On a alors } \begin{cases} \operatorname{Re} z_1 = \frac{z_1 + \overline{z_1}}{2} \text{ et } \operatorname{Im} z_1 = \frac{z_1 - \overline{z_1}}{2} \\ z_1 + \overline{z_1} = 2 \operatorname{Re} z_1 \text{ et } z_1 \overline{z_1} = |z_1|^2 \end{cases}$$

Si  $z_1 \neq 0$  alors l'inverse de  $z_1$  est l'unique nombre complexe noté  $z_1^{-1}$  vérifiant  $z_1 z_1^{-1} = 1$ .

On remarque  $z_1^{-1} = \frac{\overline{z_1}}{|z_1|^2}$  car  $z_1 \frac{\overline{z_1}}{|z_1|^2} = 1$ . Donc  $z_1^{-1} = \frac{a_1 - ib_1}{a_1^2 + b_1^2}$ .

On pose  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $z_1^n = \underbrace{z_1 \times z_1 \times \cdots \times z_1}_{n \text{ facteurs}} = \prod_{k=1}^n z_1$ .

Si  $z_1 \neq 0$  on pose aussi  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $z_1^{-n} = \frac{1}{z_1^n}$ .

- Propriétés :

Soient  $n \in \mathbb{N}$  et  $z_1, \dots, z_n \in \mathbb{C}$ .

On a

$$\text{— } \operatorname{Re} \left( \sum_{k=1}^n z_k \right) = \sum_{k=1}^n \operatorname{Re} z_k$$

$$\text{— } \operatorname{Im} \left( \sum_{k=1}^n z_k \right) = \sum_{k=1}^n \operatorname{Im} z_k$$

$$\text{— } \left| \prod_{k=1}^n z_k \right| = \prod_{k=1}^n |z_k|$$

$$\text{— } \overline{\sum_{k=1}^n z_k} = \sum_{k=1}^n \overline{z_k} \text{ et } \overline{\prod_{k=1}^n z_k} = \prod_{k=1}^n \overline{z_k}$$

$$\text{— } \forall N \in \mathbb{N}, \left( \prod_{k=1}^n z_k \right)^N = \prod_{k=1}^n z_k^N$$

$$\text{— } z_1, \dots, z_n \in \mathbb{C}^* \implies \forall n \in \mathbb{Z}, \left( \prod_{k=1}^n z_k \right)^N = \prod_{k=1}^n z_k^N$$

- Nombres complexes de module 1 :

On pose  $\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$ .

Soit  $z \in \mathbb{C}$ . Soient  $a, b \in \mathbb{R}$  tels que  $z = a + ib$ .

On a  $z \in \mathbb{U} \iff |z| = 1$

$$\iff \sqrt{a^2 + b^2} = 1$$

$$\iff a^2 + b^2 = 1$$

$$\iff \exists \theta \in \mathbb{R}, \begin{cases} a = \cos \theta \\ b = \sin \theta \end{cases}$$

Donc  $\mathbb{U} = \{\cos \theta + i \sin \theta\}_{\theta \in \mathbb{R}}$ .

On pose  $\forall \theta \in \mathbb{R}, e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ .

Ainsi,  $\mathbb{U} = \{e^{i\theta}\}_{\theta \in \mathbb{R}}$ .

---

*Remarque 3.2*

On a  $\operatorname{Im} z = 0 \iff z \in \mathbb{R}$ .

---

### Définition/Proposition 3.3

Soit  $z \in \mathbb{C}^*$ .

Alors il existe  $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$  et  $\theta \in \mathbb{R}$  tels que  $z = \lambda e^{i\theta}$  (écriture trigonométrique).

On a  $\lambda = |z|$ .

On dit que  $\theta$  est un argument de  $z$ .

Si de plus on a  $\theta \in ]-\pi ; \pi]$ , on dit que  $\theta$  est l'argument (principal) de  $z$  et on note  $\theta = \arg z$ .

---

*Démonstration 3.4*

Montrons que  $\lambda$  et  $\theta$  existent.

On a  $z \neq 0$ .

Donc  $\frac{z}{|z|}$  est bien défini et on a  $\left| \frac{z}{|z|} \right| = 1$ .

Donc il existe  $\theta \in \mathbb{R}$  tel que  $\frac{z}{|z|} = e^{i\theta}$  car  $z \in \mathbb{U}$ .

On a bien  $z = \lambda e^{i\theta}$  en posant  $\lambda = |z|$ . ■

---

*Remarque 3.5*

Soient  $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}_+^*$  et  $\theta_1, \theta_2 \in \mathbb{R}$ .

$$\text{On a } \lambda_1 e^{i\theta_1} = \lambda_2 e^{i\theta_2} \iff \begin{cases} \lambda_1 = \lambda_2 \\ \theta_1 \equiv \theta_2 [2\pi] \end{cases}$$

---

*Démonstration 3.6*



Claire.



Supposons  $\lambda_1 e^{i\theta_1} = \lambda_2 e^{i\theta_2}$ .

Donc  $|\lambda_1 e^{i\theta_1}| = |\lambda_2 e^{i\theta_2}|$ .

Donc  $\lambda_1 = \lambda_2$ .

Donc  $e^{i\theta_1} = e^{i\theta_2}$  car  $\lambda_1 = \lambda_2 \neq 0$ .

Donc  $\cos \theta_1 + i \sin \theta_1 = \cos \theta_2 + i \sin \theta_2$ .

Donc 
$$\begin{cases} \cos \theta_1 = \cos \theta_2 \\ \sin \theta_1 = \sin \theta_2 \end{cases}$$

Donc  $\theta_1 \equiv \theta_2 [2\pi]$ . ■

---

**Proposition 3.7**

Soient  $z_1, z_2 \in \mathbb{C}^*$ .

On a

- $\arg(z_1 z_2) \equiv \arg z_1 + \arg z_2 [2\pi]$
- $\arg \frac{1}{z_1} \equiv -\arg z_1 [2\pi]$
- $\arg \overline{z_1} \equiv -\arg z_1 [2\pi]$
- $\forall \lambda \in \mathbb{R}_+^*, \arg(\lambda z_1) = \arg z_1$

### 3.1.2 Point de vue géométrique

---

**Définition 3.8 (Affixe)**

Soient  $a, b \in \mathbb{R}$ .


On a  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ .

On associe à ce point le nombre complexe  $z = a + ib$ .

Ce nombre complexe est appelé l'affixe du point.

---

*Exemple 3.9*




---

### Proposition 3.10

Soit  $M \in \mathbb{R}^2$ .

On note  $z$  l'affixe de  $M$ .

Alors

- $|z|$  est la distance de  $M$  à l'origine ;
- $\bar{z}$  est l'affixe du symétrique de  $M$  par rapport à l'axe des abscisses.

---

### Proposition 3.11

Soient  $z, z_1 \in \mathbb{C}^*$ .

On pose  $z_2 = zz_1$ .

Considérons les écritures trigonométriques de ces trois complexes :

$$\begin{cases} z = \lambda e^{i\theta} \\ z_1 = \lambda_1 e^{i\theta_1} \\ z_2 = \lambda_2 e^{i\theta_2} = \lambda \lambda_1 e^{i(\theta+\theta_1)} \end{cases}$$



---

### Définition 3.12 (Affixe d'un vecteur)

Soient  $A, B \in \mathbb{R}^2$  deux points du plan d'affixes respectives  $a, b \in \mathbb{C}$ .

L'affixe du vecteur  $\vec{AB}$  est le nombre complexe  $b - a$ .

Son module  $|b - a|$  est la longueur  $AB$  et son argument est l'angle :




---

### Proposition 3.13 (Inégalité triangulaire pour les complexes)

Soient  $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ .

On a  $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$  avec égalité ssi  $\exists \lambda \in \mathbb{R}_+, z_1 = \lambda z_2$  ou  $z_2 = \lambda z_1$ .

---

*Démonstration 3.14*

On remarque qu'on a  $\forall z \in \mathbb{C}, \operatorname{Re} z \leq |z|$  avec égalité ssi  $z \in \mathbb{R}_+$ .

En effet, soit  $z \in \mathbb{C}$  et  $a, b \in \mathbb{R}$  tels que  $z = a + ib$ .

On a  $\operatorname{Re} z = a \leq |a| = \sqrt{a^2} \leq \sqrt{a^2 + b^2} = |z|$ .

$$\begin{aligned} \text{Cas d'égalité : } \operatorname{Re} z = |z| &\iff \begin{cases} a = |a| \\ \sqrt{a^2} = \sqrt{a^2 + b^2} \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} a \geq 0 \\ b = 0 \end{cases} \\ &\iff z \in \mathbb{R}_+ \end{aligned}$$

Montrons l'inégalité triangulaire.

$$\begin{aligned} \text{On a } |z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2| &\iff |z_1 + z_2|^2 \leq (|z_1| + |z_2|)^2 \text{ car } t \mapsto t^2 \text{ strictement croissante sur } \mathbb{R}_+ \\ &\iff (z_1 + z_2)(\overline{z_1 + z_2}) \leq (|z_1| + |z_2|)^2 \\ &\iff z_1 \overline{z_1} + z_1 \overline{z_2} + z_2 \overline{z_1} + z_2 \overline{z_2} \leq |z_1|^2 + 2|z_1||z_2| + |z_2|^2 \\ &\iff 2 \operatorname{Re}(z_1 \overline{z_2}) \leq 2|z_1||z_2| \\ &\iff \operatorname{Re}(z_1 \overline{z_2}) \leq |z_1||z_2| = |z_1||\overline{z_2}| = |z_1 \overline{z_2}| \\ &\text{ce qui est vrai (cf. ci-dessus)} \end{aligned}$$

Cas d'égalité : montrons que  $|z_1 + z_2| = |z_1| + |z_2| \iff \exists \lambda \in \mathbb{R}_+, z_1 = \lambda z_2$  ou  $z_2 = \lambda z_1$ .

On remarque que l'équivalence est vraie si  $z_1$  ou  $z_2$  est nul.

Supposons  $z_1$  et  $z_2$  non-nuls.

$$\begin{aligned}
\text{On a } |z_1 + z_2| = |z_1| + |z_2| &\iff \operatorname{Re}(z_1 \overline{z_2}) = |z_1 \overline{z_2}| \\
&\iff z_1 \overline{z_2} \in \mathbb{R}_+ \\
&\iff \frac{z_1 \overline{z_2}}{|z_2|^2} \in \mathbb{R}_+ \text{ car } z_2 \neq 0 \\
&\iff \frac{z_1}{z_2} \in \mathbb{R}_+ \text{ car } \frac{\overline{z_2}}{|z_2|} = \frac{\overline{z_2}}{z_2 \overline{z_2}} \\
&\iff \exists \lambda \in \mathbb{R}_+, \frac{z_1}{z_2} = \lambda \\
&\iff \exists \lambda \in \mathbb{R}_+, z_1 = \lambda z_2
\end{aligned}$$

■

---

### Remarque 3.15

Mêmes notations.

Comme on l'a vu pour les réels, on déduit de l'inégalité triangulaire la minoration  $||z_1| - |z_2|| \leq |z_1 + z_2|$ .

---

### Corollaire 3.16

Soient  $A, B, C \in \mathbb{R}^2$ .

On a  $AC \leq AB + BC$  avec égalité ssi  $\exists \lambda \in \mathbb{R}_+, \vec{AB} = \lambda \vec{BC}$  ou  $\vec{BC} = \lambda \vec{AB}$ , c'est à dire ssi  $\vec{AB}$  et  $\vec{BC}$  sont colinéaires et de même sens.

---

### Démonstration 3.17

Découle de ce qui précède appliqué aux affixes  $z_1, z_2$  respectives de  $\vec{AB}$  et  $\vec{BC}$ .

■

---

### Proposition 3.18

Soient  $A, B, C \in \mathbb{R}^2$  trois points deux à deux distincts d'affixes  $a, b, c \in \mathbb{C}$  respectivement.

Interprétation de  $z = \frac{c-a}{b-a} : |z| = \frac{AC}{AB}$  et  $\arg z \equiv (\vec{AB} ; \vec{AC}) [2\pi]$ .

---

### Exemple 3.19

- $A, B, C$  alignés  $\iff \arg \frac{c-a}{b-a} \equiv 0 [\pi]$   
 $\iff \frac{c-a}{b-a} \in \mathbb{R}$
- Le triangle  $ABC$  est rectangle en  $A$   $\iff \arg \frac{c-a}{b-a} \equiv \frac{\pi}{2} [\pi]$   
 $\iff \frac{c-a}{b-a} \in i\mathbb{R}$

---

**Définition 3.20**

Soient  $z_0 \in \mathbb{C}$  et  $r \in \mathbb{R}_+$ .

On définit :

- le cercle de centre  $z_0$  et de rayon  $r : \{z \in \mathbb{C} \mid |z - z_0| = r\}$ ;
- le disque ouvert de centre  $z_0$  et de rayon  $r : \{z \in \mathbb{C} \mid |z - z_0| < r\}$ ;
- le disque fermé de centre  $z_0$  et de rayon  $r : \{z \in \mathbb{C} \mid |z - z_0| \leq r\}$ .

---

**Définition 3.21 (Similitude directe)**

On appelle similitude directe de  $\mathbb{C}$  toute fonction de la forme  $\begin{array}{ccc} \mathbb{C} & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ z & \longmapsto & az + b \end{array}$  avec  $\begin{cases} a \in \mathbb{C}^* \\ b \in \mathbb{C} \end{cases}$

---

*Exemple 3.22*

- $\text{id}_{\mathbb{C}} : z \mapsto z$  est une similitude directe de  $\mathbb{C}$  (avec  $a = 1$  et  $b = 0$ ) ;
- $\forall b \in \mathbb{C}, z \mapsto z + b$  est une similitude directe de  $\mathbb{C}$  (translation) ;
- $\forall a \in \mathbb{R}_+^*, z \mapsto az$  est une similitude directe de  $\mathbb{C}$  (homothétie de centre  $O$ ), en particulier, la symétrie centrale par rapport à  $O$  est une similitude directe de  $\mathbb{C} : z \mapsto -z$  ;
- $\forall \theta \in \mathbb{R}, z \mapsto e^{i\theta}z$  est une similitude directe de  $\mathbb{C}$  (rotation d'angle  $\theta$  et de centre  $O$ ).

---

*Remarque 3.23*

Soient  $a \in \mathbb{C}^*$  et  $b \in \mathbb{C}$ .

On pose  $f : z \mapsto az + b$  une similitude directe de  $\mathbb{C}$ .

- Si  $a = 1$  et  $b = 0$  alors  $\forall z \in \mathbb{C}, f(z) = z$  (tout complexe  $z$  est un point fixe de  $f$ ) ;
- si  $a = 1$  et  $b \neq 0$  alors  $f$  n'admet aucun point fixe :  $\forall z \in \mathbb{C}, f(z) \neq z$  ;
- si  $a \neq 1$  alors  $f$  admet un unique point fixe.

En effet,  $f(z) = z \iff az + b = z$

$$\iff \frac{b}{1-a} = z$$

---

*Remarque 3.24*

Les fonctions  $z \mapsto \bar{z}$  (symétrie par rapport à  $\mathbb{R}$ ) et  $z \mapsto -\bar{z}$  (symétrie par rapport à  $i\mathbb{R}$ ) ne sont pas des similitudes directes de  $\mathbb{C}$ .

### 3.1.3 Généralisation de formules connues

La formule du binôme de Newton, la factorisation de  $a^n - b^n$  et la valeur de  $\sum_{k=a}^b z^k$  restent vraies en prenant des nombres complexes à la place des nombres réels.



## 3.2 Lien avec la trigonométrie

### 3.2.1 Formules

On rappelle qu'on a posé  $\forall \theta \in \mathbb{R}, e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ .

---

**Proposition 3.25**

Soient  $\theta_1, \theta_2 \in \mathbb{R}$ .

On a  $e^{i(\theta_1+\theta_2)} = e^{i\theta_1}e^{i\theta_2}$ .

---

*Démonstration 3.26*

$$\begin{aligned} \text{On a } e^{i(\theta_1+\theta_2)} &= \cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2) \\ &= \cos \theta_1 \cos \theta_2 - \sin \theta_1 \sin \theta_2 + i (\sin \theta_1 \cos \theta_2 + \sin \theta_2 \cos \theta_1) \\ &= (\cos \theta_1 + i \sin \theta_1) (\cos \theta_2 + i \sin \theta_2) \\ &= e^{i\theta_1} e^{i\theta_2} \end{aligned}$$

■

---

**Proposition 3.27 (Formule de Moivre)**

$$\text{On a } \forall n \in \mathbb{N}, \forall \theta \in \mathbb{R}, \begin{cases} \cos(n\theta) = \operatorname{Re}((\cos \theta + i \sin \theta)^n) \\ \sin(n\theta) = \operatorname{Im}((\cos \theta + i \sin \theta)^n) \end{cases}$$

---

*Démonstration 3.28*

Soit  $\theta \in \mathbb{R}$ .

On déduit de la Proposition 3.25 que  $\forall n \in \mathbb{N}, e^{in\theta} = (e^{i\theta})^n$  par récurrence sur  $n \in \mathbb{N}$ .

Soit  $n \in \mathbb{N}$ . On a donc  $\cos(n\theta) + i \sin(n\theta) = (\cos \theta + i \sin \theta)^n$ .

On conclut en prenant les parties réelles et imaginaires.

■

---

*Exemple 3.29*

Soit  $\theta \in \mathbb{R}$ . Exprimons  $\cos(3\theta)$  en fonction de  $\cos \theta$ .

$$\begin{aligned}
\text{On a } \cos(3\theta) &= \operatorname{Re} \left( (\cos \theta + i \sin \theta)^3 \right) \\
&= \operatorname{Re} \left( \sum_{k=0}^3 \binom{3}{k} (i \sin \theta)^k (\cos \theta)^{3-k} \right) \\
&= \operatorname{Re} \left( \cos^3 \theta + 3i \sin \theta \cos^2 \theta - 3 \sin^2 \theta \cos \theta - i \sin^3 \theta \right) \\
&= \cos^3 \theta - 3 \sin^2 \theta \cos \theta \\
&= \cos^3 \theta - 3 (1 - \cos^2 \theta) \cos \theta \\
&= \cos^3 \theta - 3 \cos \theta + 3 \cos^3 \theta \\
&= 4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta
\end{aligned}$$

Plus tard, on écrira  $\cos(3\theta) = T_3(\cos \theta)$  avec  $T_3(X) = 4X^3 - 3X$ .

### Proposition 3.30 (Formules d'Euler)

Soit  $\theta \in \mathbb{R}$ .

$$\text{On a } \begin{cases} \cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \\ \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} \end{cases}$$

#### Remarque 3.31

Soient  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ .

Voyons comment factoriser  $e^{i\alpha} \pm e^{i\beta}$ .

$$\text{On remarque } \begin{cases} \alpha = \frac{\alpha + \beta}{2} + \frac{\alpha - \beta}{2} \\ \beta = \frac{\alpha + \beta}{2} - \frac{\alpha - \beta}{2} \end{cases}$$

$$\text{Donc } e^{i\alpha} + e^{i\beta} = e^{i\frac{\alpha+\beta}{2}} \left( e^{i\frac{\alpha-\beta}{2}} + e^{-i\frac{\alpha-\beta}{2}} \right) = 2 \cos \left( \frac{\alpha - \beta}{2} \right) e^{i\frac{\alpha+\beta}{2}}.$$

$$\text{Et } e^{i\alpha} - e^{i\beta} = e^{i\frac{\alpha+\beta}{2}} \left( e^{i\frac{\alpha-\beta}{2}} - e^{-i\frac{\alpha-\beta}{2}} \right) = 2i \sin \left( \frac{\alpha - \beta}{2} \right) e^{i\frac{\alpha+\beta}{2}}.$$

### 3.2.2 Application 1 : sommes particulières

Soit  $\theta \in \mathbb{R}$  et  $n \in \mathbb{N}$ .

$$\text{Calculons } S_1 = \sum_{k=0}^n \cos(k\theta) \text{ et } S_2 = \sum_{k=0}^n \sin(k\theta).$$

Calculons d'abord  $S = \sum_{k=0}^n e^{ik\theta}$ .

On a  $S = \sum_{k=0}^n \left(e^{i\theta}\right)^k$ .

Si  $\theta \equiv 0 [2\pi]$  alors  $S = \sum_{k=0}^n 1^k = n+1$ .

Sinon,  $S = \frac{1 - (e^{i\theta})^{n+1}}{1 - e^{i\theta}}$ .

Supposons  $\theta \not\equiv 0 [2\pi]$ .

$$\begin{aligned} \text{On a } S &= \frac{1 - \left(e^{i\theta(n+1)}\right)}{1 - e^{i\theta}} \\ &= \frac{e^{i\frac{\theta(n+1)}{2}} \left(e^{-i\frac{\theta(n+1)}{2}} - e^{i\frac{\theta(n+1)}{2}}\right)}{e^{i\frac{\theta}{2}} \left(e^{-i\frac{\theta}{2}} - e^{i\frac{\theta}{2}}\right)} \\ &= \frac{-2ie^{i\frac{\theta(n+1)}{2}} \sin\left(\frac{\theta(n+1)}{2}\right)}{-2ie^{i\frac{\theta}{2}} \sin\frac{\theta}{2}} \\ &= \frac{\sin\frac{\theta(n+1)}{2}}{\sin\frac{\theta}{2}} \times e^{i\theta\left(\frac{n+1-1}{2}\right)} \\ &= e^{in\frac{\theta}{2}} \times \frac{\sin\left(\frac{n+1}{2}\right)\theta}{\sin\frac{\theta}{2}} \end{aligned}$$

$$\text{D'où } S_1 = \operatorname{Re} S = \cos \frac{n\theta}{2} \times \frac{\sin\left(\frac{n+1}{2}\theta\right)}{\sin\frac{\theta}{2}}.$$

$$\text{Et } S_2 = \operatorname{Im} S = \sin \frac{n\theta}{2} \times \frac{\sin\left(\frac{n+1}{2}\theta\right)}{\sin\frac{\theta}{2}}.$$

### 3.2.3 Application 2 : linéarisation

Soient  $a, b \in \mathbb{N}$  et  $\theta \in \mathbb{R}$ .

Linéariser  $\cos^a \theta \sin^b \theta$  c'est écrire cette expression sous la forme  $\sum_{i \in I} \lambda_i \cos(\mu_i \theta)$  ou  $\sum_{i \in I} \lambda_i \sin(\mu_i \theta)$  où  $I$  est un ensemble fini et  $\forall i \in I, \lambda_i, \mu_i \in \mathbb{R}$ .

---

Exemple 3.32

$$\text{On a } \forall \theta \in \mathbb{R}, \begin{cases} \cos^2 \theta = \frac{1 + \cos(2\theta)}{2} \\ \sin^2 \theta = \frac{1 - \cos(2\theta)}{2} \\ \cos^3 \theta = \frac{\cos(3\theta) + 3 \cos \theta}{4} \\ \cos \theta \sin \theta = \frac{1}{2} \sin(2\theta) \end{cases}$$

Application : linéariser l'expression  $\cos^a \theta \sin^b \theta$  permet de la primitiver.

Méthode : remplacer  $\cos \theta$  et  $\sin \theta$  avec les formules d'Euler puis développer avec le binôme de Newton.

---

Exemple 3.33

$$\begin{aligned} \text{Soit } f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ \theta &\longmapsto \sin^4 \theta \end{aligned}$$

Linéarisons  $f(\theta)$ .

$$\begin{aligned} \text{On a } \sin^4 \theta &= \left( \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} \right)^4 \\ &= \sum_{k=0}^4 \binom{4}{k} \left( \frac{e^{i\theta}}{2i} \right)^k \left( \frac{-e^{-i\theta}}{2i} \right)^{4-k} \\ &= 1 \times 1 \times \frac{e^{-4i\theta}}{16} + 4 \times \frac{e^{i\theta}}{2i} \times \frac{-e^{-3i\theta}}{-8i} + 6 \times \frac{e^{2i\theta}}{-4} \times \frac{e^{-2i\theta}}{-4} + 4 \times \frac{e^{3i\theta}}{-8i} \times \frac{-e^{-i\theta}}{2i} + 1 \times \frac{e^{4i\theta}}{16} \times 1 \\ &= \frac{e^{4i\theta}}{16} + \frac{e^{-4i\theta}}{16} + 4 \left( \frac{-e^{-2i\theta}}{16} + \frac{-e^{2i\theta}}{16} \right) + \frac{6}{16} \\ &= \frac{1}{8} \cos(4\theta) - \frac{1}{2} \cos(2\theta) + \frac{3}{8} \end{aligned}$$

$$\text{On en déduit la primitive } F(\theta) = \frac{1}{32} \sin(4\theta) - \frac{1}{4} \sin(2\theta) + \frac{3\theta}{8}.$$

## 3.3 Équations algébriques

### 3.3.1 Fonctions polynomiales

---

**Définition 3.34**

On appelle fonction polynomiale de  $\mathbb{C}$  dans  $\mathbb{C}$  toute fonction de la forme  $f : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$  où

$$z \longmapsto \sum_{k=0}^n \lambda_k z^k$$

$n \in \mathbb{N}$  et  $\lambda_0, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}$ .

Si  $\lambda_n \neq 0$ , on dit que la fonction polynomiale est de degré  $n$ .

Si  $z_0 \in \mathbb{C}$  vérifie  $f(z_0) = 0$ , on dit que  $z_0$  est une racine de  $f$ .

---

**Proposition 3.35**

Soient  $n \in \mathbb{N}$  et  $\lambda_0, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}$ .

On pose  $f : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$ .

$$z \longmapsto \sum_{k=0}^n \lambda_k z^k$$

Les propositions suivantes sont équivalentes :

- (1)  $z_0$  est racine de  $f$
- (2) il existe une fonction polynomiale  $g : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$  telle que  $\forall z \in \mathbb{C}, f(z) = (z - z_0) g(z)$

---

**Remarque 3.36**

Cette proposition est fausse pour les fonctions continues de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ .

Posons par exemple  $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ .

$$t \longmapsto \sqrt{|t|}$$

On a  $f(0) = 0$  donc 0 racine de  $f$  donc (1) est vraie.

Pourtant si  $g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$  vérifie  $\forall t \in \mathbb{R}, f(t) = (t - 0) g(t)$  alors  $\forall t \in \mathbb{R}_+^*, g(t) = \frac{f(t)}{t} = \frac{\sqrt{|t|}}{t} = \frac{\sqrt{t}}{t} = \frac{1}{\sqrt{t}}$ .

On a  $\lim_{t \rightarrow 0^+} g(t) = +\infty$  : contradiction car  $g$  est continue en 0.

---

**Démonstration 3.37**

Montrons que (1)  $\iff$  (2).

$\Leftarrow$  Claire.

$\Rightarrow$  Supposons  $f(z_0) = 0$ .

On a  $\forall z \in \mathbb{C}, f(z) = f(z) - f(z_0)$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{k=0}^n \lambda_k z^k - \sum_{k=0}^n \lambda_k z_0^k \\
&= \sum_{k=0}^n \lambda_k (z^k - z_0^k) \\
&= \sum_{k=0}^n \left( \lambda_k (z - z_0) \sum_{\ell=0}^{k-1} z^\ell z_0^{k-1-\ell} \right) \\
&= (z - z_0) \sum_{1 \leq \ell < k \leq n} \lambda_k z_0^{k-1-\ell} z^\ell \\
&= (z - z_0) \sum_{\ell=0}^{n-1} \left( \sum_{k=\ell+1}^n \lambda_k z_0^{k-1-\ell} \right) z^\ell \\
&= (z - z_0) \sum_{\ell=0}^{n-1} \mu_\ell z^\ell
\end{aligned}$$

en posant  $\forall \ell \in \llbracket 0 ; n-1 \rrbracket, \mu_\ell = \sum_{k=\ell+1}^n \lambda_k z_0^{k-1-\ell}$ .

D'où (2) en prenant  $g : z \mapsto \sum_{\ell=0}^{n-1} \mu_\ell z^\ell$ . ■

### 3.3.2 Racines nièmes

---

*Rappel 3.38*

Si  $x \in \mathbb{R}_+$ , on note  $\sqrt{x}$  ou  $x^{1/2}$  l'unique réel positif de carré  $x$ .

On a par exemple  $\sqrt{4} = 2$ ;  $\sqrt{2}$  est l'unique réel positif tel que  $\sqrt{2}^2 = 2$ .

Si  $x \in \mathbb{R}_+$  et  $n \in \mathbb{N}^*$ , on note  $\sqrt[n]{x}$  ou  $x^{1/n}$  l'unique réel positif dont la puissance nième vaut  $x$ .

---

*Remarque 3.39*

On a  $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \sqrt[n]{x} = e^{\frac{1}{n} \ln x}$ .

En effet,  $e^{\frac{1}{n} \ln x} \geq 0$  et  $\left(e^{\frac{1}{n} \ln x}\right)^n = e^{\ln x} = x$ .

#### 3.3.2.1 Division euclidienne dans $\mathbb{Z}$

---

**Proposition 3.40**

Soient  $a \in \mathbb{Z}$  et  $b \in \mathbb{N}^*$ .

$$\text{Alors } \exists! (q, r) \in \mathbb{Z}^2, \begin{cases} a = qb + r \\ 0 \leq r < b \end{cases}$$

$q$  et  $r$  sont respectivement appelés le quotient et le reste de la division euclidienne de  $a$  par  $b$ .

---

Démonstration 3.41

unicité

$$\text{Soient } (q_1, r_1), (q_2, r_2) \in \mathbb{Z}^2 \text{ tels que } \begin{cases} a = q_1b + r_1 \\ a = q_2b + r_2 \\ 0 \leq r_1 < b \\ 0 \leq r_2 < b \end{cases}$$

On a d'une part  $q_1b + r_1 = q_2b + r_2$  donc  $(q_1 - q_2)b = r_2 - r_1$ .

$$\text{D'autre part on a } \begin{cases} 0 \leq r_1 < b \text{ donc } -b < r_1 - r_2 < b \\ -b < -r_2 \leq 0 \text{ donc } |r_2 - r_1| < b \end{cases}$$

On en déduit que  $q_1 - q_2 = 0$ .

En effet, par l'absurde, si  $q_1 - q_2 \neq 0$  alors  $|q_1 - q_2| \geq 1$  donc  $|r_2 - r_1| = |q_1 - q_2|b \geq b$  : contradiction.

Donc  $q_1 = q_2$  donc  $r_1 = a - q_1b = a - q_2b = r_2$ .

D'où l'unicité.

existence

Montrons d'abord le cas où  $a \in \mathbb{N}$ .

On pose  $A = \{x \in \mathbb{N} \mid \neg (\exists q \in \mathbb{Z}, \exists r \in \llbracket 0 ; b - 1 \rrbracket, x = bq + r)\}$ .

Montrons que  $A = \emptyset$ . Par l'absurde, supposons  $A \neq \emptyset$ .

Comme  $A$  est une partie non-vide de  $\mathbb{N}$ , elle admet un plus petit élément  $m \in A$ .

- On remarque que tout  $x \in \llbracket 0 ; b - 1 \rrbracket$  admet une division euclidienne par  $b$  :  $x = 0 \times b + x$ . Donc  $x \notin A$ .  
Donc  $m < b$ .
- Considérons  $m' = m - b$ . On a  $m' < m$ .  
Donc  $m' \notin A$  et  $m' \in \mathbb{N}$  donc il existe  $q' \in \mathbb{Z}$  et  $r' \in \llbracket 0 ; b - 1 \rrbracket$  tels que  $m' = q'b + r'$ .  
Finalement,  $m = m' + b = (q' + 1)b + r'$ .  
Donc  $m \notin A$  : contradiction.

Ainsi on a montré  $A = \emptyset$  donc tout  $x \in \mathbb{N}$  admet une division euclidienne.

On montre ensuite le cas où  $a < 0$ .

Supposons  $a < 0$ . On a  $-a \in \mathbb{N}$ .

Donc il existe  $q \in \mathbb{Z}$  et  $r \in \llbracket 0 ; b - 1 \rrbracket$  tels que  $-a = qb + r$ .

On a  $a = -qb - r = -qb + b - b - r = (-q - 1)b + b - r$  avec  $-b < -r \leq 0$  donc  $0 < b - r \leq b$ .

Donc  $a$  admet une division euclidienne par  $b$ . ■

### 3.3.2.2 Racines nièmes d'un nombre complexe

---

#### Définition 3.42

Soient  $z \in \mathbb{C}$  et  $n \in \mathbb{N}^*$ .

Tout nombre complexe  $\gamma \in \mathbb{C}$  tel que  $\gamma^n = z$  est appelé une racine nième de  $z$ .

Les racines nièmes de 1 sont appelées racines nièmes de l'unité.

Leur ensemble est noté  $\mathbb{U}_n$ . On a  $\mathbb{U}_n = \{\omega \in \mathbb{C} \mid \omega^n = 1\}$ .

---

#### Exemple 3.43

- $i \in \mathbb{U}_4$  car  $i^4 = 1$  ;
- $i \in \mathbb{U}_8$  car  $i^8 = 1$  ;
- $1 + i$  est une racine carrée de  $2i$  car  $(1 + i)^2 = 2i$  ;
- $-1 - i$  est aussi une racine carrée de  $2i$  car  $(-1 - i)^2 = 2i$ .

---

#### Théorème 3.44

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

Tout nombre complexe non-nul admet exactement  $n$  racines nièmes.

Soient  $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$  et  $\theta \in \mathbb{R}$ .

Les racines nièmes du nombre complexe  $z = \lambda e^{i\theta}$  sont les nombres complexes de la forme  $\gamma_k = \sqrt[n]{\lambda} e^{i \frac{\theta + 2k\pi}{n}}$  avec  $k \in \llbracket 0 ; n - 1 \rrbracket$ .

---

#### Démonstration 3.45

On rappelle  $\forall r_1, r_2 \in \mathbb{R}_+^*, \forall \theta_1, \theta_2 \in \mathbb{R}, r_1 e^{i\theta_1} = r_2 e^{i\theta_2} \iff \begin{cases} r_1 = r_2 \\ \theta_1 \equiv \theta_2 [2\pi] \end{cases}$

Soient  $r \in \mathbb{R}_+$  et  $\alpha \in \mathbb{R}$ . Posons  $\gamma = r e^{i\alpha}$ .



On a  $\gamma^n = z \iff r^n e^{in\alpha} = \lambda e^{i\theta}$

$$\iff \begin{cases} r^n = \lambda \\ n\alpha \equiv \theta [2\pi] \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} r = \sqrt[n]{\lambda} \\ \alpha \equiv \frac{\theta}{n} \left[ \frac{2\pi}{n} \right] \end{cases}$$

Avec  $\alpha \equiv \frac{\theta}{n} \left[ \frac{2\pi}{n} \right] \iff \exists \ell \in \mathbb{Z}, \alpha = \frac{\theta}{n} + \frac{2\ell\pi}{n}$

$$\iff \exists Q \in \mathbb{Z}, \exists R \in \llbracket 0 ; n-1 \rrbracket, \alpha = \frac{\theta}{n} + \frac{2(Qn+R)\pi}{n}$$

$$\iff \exists R \in \llbracket 0 ; n-1 \rrbracket, \exists Q \in \mathbb{Z}, \alpha = \frac{\theta}{n} + \frac{2R\pi}{n} + 2Q\pi$$

$$\iff \exists R \in \llbracket 0 ; n-1 \rrbracket, \alpha \equiv \frac{\theta}{n} + \frac{2R\pi}{n} [2\pi]$$

Ainsi  $\gamma^n = z \iff \begin{cases} r = \sqrt[n]{\lambda} \\ \exists R \in \llbracket 0 ; n-1 \rrbracket, \alpha \equiv \frac{\theta}{n} + \frac{2R\pi}{n} [2\pi] \end{cases}$

Les racines nièmes de  $z$  sont donc les complexes de la forme  $\sqrt[n]{\lambda} e^{i\frac{\theta+2R\pi}{n}}$  où  $R \in \llbracket 0 ; n-1 \rrbracket$ . ■

### Exemple 3.46

Déterminons  $\mathbb{U}_2$  et  $\mathbb{U}_3$ .

- Les racines carrées de  $1 = 1e^{0 \times i}$  sont les nombres complexes de la forme  $\sqrt{1}e^{i\frac{0+2k\pi}{2}}$  où  $k \in \llbracket 0 ; 1 \rrbracket$ , c'est à dire  $1$  et  $1 \times e^{i\frac{2\pi}{2}} = e^{i\pi} = -1$ .  
Donc  $\mathbb{U}_2 = \{-1 ; 1\}$ .
- Les racines cubiques de  $1$  sont les nombres complexes de la forme  $e^{i\frac{2k\pi}{3}}$  où  $k \in \llbracket 0 ; 2 \rrbracket$ , c'est à dire  $e^{0 \times i} = 1$ ,  $e^{i\frac{2\pi}{3}} = j$  et  $e^{i\frac{4\pi}{3}} = -j$ .  
Donc  $\mathbb{U}_3 = \{- ; j ; -j\}$ .

### Remarque 3.47

On a  $j = e^{i\frac{2\pi}{3}} = \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}$ .

Et  $j^2 = e^{i\frac{4\pi}{3}} = e^{-i\frac{2\pi}{3}} = j^{-1} = \bar{j}$ .

Et  $1 + j + j^2 = 0$ .

---

*Remarque 3.48*

On a  $\mathbb{U}_n = \left\{ e^{i \frac{2k\pi}{n}} \right\}_{k \in \llbracket 0; n-1 \rrbracket}$

---

*Remarque 3.49*

Soient  $m, n \in \mathbb{N}^*$ .

On dit que  $n$  divise  $m$  et on note  $n \mid m$  si on a  $\exists k \in \mathbb{Z}, m = kn$ .

On a alors  $\mathbb{U}_n \subseteq \mathbb{U}_m$ .

---

*Démonstration 3.50*

Supposons  $n \mid m$ . Soit  $k \in \mathbb{Z}$  tel que  $kn = m$ .

Montrons que  $\mathbb{U}_n \subseteq \mathbb{U}_m$ .

Soit  $\omega \in \mathbb{U}_n$ . On a  $\omega^n = 1$ .

Donc  $\omega^m = \omega^{nk} = (\omega^n)^k = 1^k = 1$ .

Donc  $\omega \in \mathbb{U}_m$ . Donc  $\mathbb{U}_n \subseteq \mathbb{U}_m$ . ■

---

**Proposition 3.51**

Soient  $z, \gamma \in \mathbb{C}^*$  tels que  $\gamma$  soit une racine nième de  $z$ .

Les racines nièmes de  $z$  sont les nombres complexes de la forme  $\omega\gamma$  où  $\omega \in \mathbb{U}_n$ .

---

*Démonstration 3.52*

Soit  $w \in \mathbb{C}$ .

On a  $w$  racine nième de  $z \iff w^n = z$

$$\iff w^n = \gamma^n$$

$$\iff \left( \frac{w}{\gamma} \right)^n = 1$$

$$\iff \frac{w}{\gamma} \in \mathbb{U}_n$$

$$\iff \exists \omega \in \mathbb{U}_n, \frac{w}{\gamma} = \omega$$

$$\iff \exists \omega \in \mathbb{U}_n, w = \omega\gamma$$

D'où le résultat. ■

---

### Exemple 3.53

Déterminons les racines quatrièmes de 4 et  $-4$ .

- On a  $4 = 4e^{0 \times i}$  donc les racines quatrièmes de 4 sont de la forme  $\sqrt[4]{4}e^{i\frac{2k\pi+0}{4}}$  avec  $k \in \llbracket 0 ; 3 \rrbracket$ .  
C'est à dire
  - $\sqrt{2}e^{0 \times i} = \sqrt{2}$  ;
  - $\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{2}} = i\sqrt{2}$  ;
  - $\sqrt{2}e^{i\pi} = -\sqrt{2}$  ;
  - $\sqrt{2}e^{i\frac{3\pi}{2}} = -i\sqrt{2}$ .
- On a  $-4 = 4e^{i\pi}$  donc les racines quatrièmes de  $-4$  sont de la forme  $\sqrt[4]{4}e^{i\frac{2k\pi+\pi}{4}}$  avec  $k \in \llbracket 0 ; 3 \rrbracket$ .  
C'est à dire
  - $\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}} = 1 + i$  ;
  - $\sqrt{2}e^{i\frac{3\pi}{4}} = -1 + i$  ;
  - $\sqrt{2}e^{i\frac{5\pi}{4}} = -1 - i$  ;
  - $\sqrt{2}e^{i\frac{7\pi}{4}} = 1 - i$ .

### 3.3.2.3 Racines carrées sous forme algébrique

---

#### Méthode 3.54

Soit  $z = a + ib \in \mathbb{C}^*$  un nombre complexe non-nul écrit sous forme algébrique avec  $a, b \in \mathbb{R}$  tels que  $(a, b) \neq (0, 0)$ .

Pour déterminer ses racines carrées sous forme algébrique, on résout l'équation  $(x + iy)^2 = a + ib$  d'inconnues  $x, y \in \mathbb{R}$  :

$$\begin{aligned}(x + iy)^2 = a + ib &\iff \begin{cases} (x + iy)^2 = a + ib \\ |x + iy|^2 = |a + ib| \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x^2 - y^2 + 2ixy = a + ib \\ x^2 + y^2 = \sqrt{a^2 + b^2} \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x^2 - y^2 = a & L_1 \\ 2xy = b & L_2 \\ x^2 + y^2 = \sqrt{a^2 + b^2} & L_3 \end{cases}\end{aligned}$$

On obtient  $|x|$  par  $L_1 + L_3$ ,  $|y|$  par  $L_3 - L_1$  et les signes par  $L_2$ .

---

*Exemple 3.55*

Déterminons les racines carrées de  $-5 - 12i$ .

$$\begin{aligned} \text{Soient } x, y \in \mathbb{R}. \text{ On a } (x + iy)^2 = -5 - 12i &\iff \begin{cases} (x + iy)^2 = -5 - 12i \\ |x + iy|^2 = |-5 - 12i| \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x^2 - y^2 + 2ixy = -5 - 12i \\ x^2 + y^2 = \sqrt{(-5)^2 + (-12)^2} \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x^2 - y^2 = -5 \\ 2xy = -12 \\ x^2 + y^2 = 13 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} 2x^2 = 8 \\ 2y^2 = 18 \\ xy = -6 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} |x| = 2 \\ |y| = 3 \\ xy = -6 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x = 2 \\ y = -3 \\ xy = -6 \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} x = -2 \\ y = 3 \\ xy = -6 \end{cases} \end{aligned}$$

Donc les racines carrées de  $-5 - 12i$  sont  $2 - 3i$  et  $-2 + 3i$ .

### 3.3.3 Équations polynomiales de degré 2

#### 3.3.3.1 Résolution

---

**Proposition 3.56**

Soient  $a, b, c \in \mathbb{C}$  avec  $a \neq 0$ .

On associe à l'équation  $(E) : az^2 + bz + c = 0$  d'inconnue  $z \in \mathbb{C}$  le discriminant  $\Delta = b^2 - 4ac$ .

Soit  $\delta \in \mathbb{C}$  une racine carrée de  $\Delta$ .

Les solutions de  $(E)$  sont  $\frac{-b \pm \delta}{2a}$ .

Elles sont distinctes ssi  $\Delta \neq 0$ .

---

*Démonstration 3.57*

Soit  $z \in \mathbb{C}$ .

On a  $(E) \iff az^2 + bz + c = 0$

$$\iff a \left( z^2 + \frac{b}{a}z + \frac{b^2}{4a^2} \right) - \frac{b^2}{4a} + c = 0$$

$$\iff a \left( \left( z + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \right) = 0$$

$$\iff \left( z + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} = 0$$

$$\iff \left( z + \frac{b}{2a} \right)^2 - \left( \frac{\delta}{2a} \right)^2 = 0$$

$$\iff \left( z + \frac{b}{2a} - \frac{\delta}{2a} \right) \left( z + \frac{b}{2a} + \frac{\delta}{2a} \right) = 0$$

$$\iff z = \frac{-b + \delta}{2a} \text{ ou } z = \frac{-b - \delta}{2a}$$

■

---

*Exemple 3.58*

Résolvons les équations (A) :  $z^2 - (3 + 2i)z + 1 + 3i = 0$  et (B) :  $z^2 - (4 + i)z + 4 + 2i = 0$ .

- Résolvons (A).

On a  $\Delta = (-3 - 2i)^2 - 4 \times 1 \times (1 + 3i) = 9 - 2 \times (-3) \times 2i - 4 - 4 - 12i = 1$ .

Donc  $\delta = 1$ . Donc on a  $z = \frac{3 + 2i \pm 1}{2} = 2 + i$  ou  $1 + i$ .

- Résolvons (B).

On a  $\Delta = (-4 - i)^2 - 4 \times 1 \times (4 + 2i) = 16 - 2 \times (-4) \times i - 1 - 16 - 8i = -1 = i^2$ .

Donc  $\delta = i$ . Donc on a  $z = \frac{4 + i \pm i}{2} = 2 + i$  ou  $2$ .

---

*Remarque 3.59*

Si  $\Delta \in \mathbb{R}_-$  alors une racine carrée de  $\Delta$  est  $i\sqrt{-\Delta}$  donc les solutions sont  $\frac{-b \pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}$ .

---

*Remarque 3.60*

Si  $a, b, c \in \mathbb{R}$  alors  $\Delta \in \mathbb{R}$ . On obtient

- deux solutions complexes (non-réelles) conjuguées si  $\Delta < 0$  ;
- une solution réelle si  $\Delta = 0$  ;
- deux solutions réelles distinctes si  $\Delta > 0$ .

---

**Proposition 3.61 (Relations coefficients/racines)**

Soient  $a, b, c \in \mathbb{C}$  avec  $a \neq 0$ .

On note  $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$  les racines de  $f : z \mapsto az^2 + bz + c$  et  $\Delta$  le discriminant de  $f$ .

On a vu que  $\forall z \in \mathbb{C}, f(z) = a(z - z_1)(z - z_2)$ .

On a  $z_1 + z_2 = -\frac{b}{a}$  et  $z_1 z_2 = \frac{c}{a}$ .

---

**Démonstration 3.62**

On note  $\delta$  une racine carrée de  $\Delta$ .

On a  $z_1 = \frac{-b - \delta}{2a}$  et  $z_2 = \frac{-b + \delta}{2a}$ .

On a  $z_1 + z_2 = \frac{-b - \delta - b + \delta}{2a} = -\frac{2b}{2a} = -\frac{b}{a}$  et  $z_1 z_2 = \left(\frac{-b - \delta}{2a}\right) \left(\frac{-b + \delta}{2a}\right) = \frac{b^2 - \delta^2}{4a^2} = \frac{b^2 - (b^2 - 4ac)}{4a^2} = \frac{c}{a}$ . ■

---

**Remarque 3.63**

Il est conseillé de vérifier au moins la somme des racines quand on les calcule.

---

**Proposition 3.64**

Soient  $z_1, z_2, S, P \in \mathbb{C}$ .

Alors  $\begin{cases} z_1 + z_2 = S \\ z_1 z_2 = P \end{cases} \iff z_1, z_2 \text{ sont les racines de } \begin{array}{ccc} \mathbb{C} & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ z & \longmapsto & z^2 - Sz + P \end{array}$

---

**Démonstration 3.65**

Montrons l'équivalence :

◁ Déjà vue.

⇒ Supposons  $z_1 + z_2 = S$  et  $z_1 z_2 = P$ .

$$\begin{aligned} \text{Alors } \forall z \in \mathbb{C}, \quad z^2 - Sz + P &= z^2 - (z_1 + z_2)z + z_1 z_2 \\ &= z^2 - z_1 z - z_2 z + z_1 z_2 \\ &= (z - z_1)(z - z_2) \end{aligned}$$

■

---

### Exemple 3.66

Réolvons le système  $\begin{cases} a+b=4 \\ ab=5 \end{cases}$  d'inconnues  $a, b \in \mathbb{C}$ .

On a  $\begin{cases} a+b=4 \\ ab=5 \end{cases} \iff a, b \text{ sont les racines de } f: \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$   
 $z \longmapsto z^2 - 4z + 5$

On note  $\Delta$  le discriminant de  $f$ . On a  $\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 5 = 16 - 20 = -4$ .

Donc on a  $\begin{cases} a = \frac{4+i\sqrt{4}}{2} = 2+i \\ b = \frac{4-i\sqrt{4}}{2} = 2-i \end{cases}$  ou  $\begin{cases} a = 2-i \\ b = 2+i \end{cases}$

On a donc  $\mathfrak{S}_= \{(2+i; 2-i); (2-i; 2+i)\}$ .

## 3.4 Exponentielle complexe

---

### Définition 3.67

Soit  $z = x + iy \in \mathbb{C}$  avec  $x, y \in \mathbb{R}$ .

On pose  $\exp z = e^z = e^x e^{iy}$ .

On appelle exponentielle complexe la fonction  $\exp: \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$   
 $z \longmapsto e^z$

---

### Proposition 3.68

On a

- $e^0 = 1$  ;
- $\forall z \in \mathbb{C}, |e^z| = e^{\operatorname{Re} z}$  ;
- $\forall z, z' \in \mathbb{C}, e^{z+z'} = e^z e^{z'}$  ;
- $\forall z \in \mathbb{C}, e^z \neq 0$  et  $\frac{1}{e^z} = e^{-z}$  ;
- $\forall z \in \mathbb{C}, \forall n \in \mathbb{Z}, (e^z)^n = e^{nz}$  ;
- $\forall z, z' \in \mathbb{C}, e^z = e^{z'} \iff z \equiv z' [2i\pi]$  ;
- $\exp(\mathbb{C}) = \mathbb{C}^*$ .

---

Remarque 3.70

La Définition 3.67 est compatible avec les précédentes définitions de l'exponentielle.

---

**Définition 3.71**

Soient  $I \subseteq \mathbb{R}$  et  $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ .

On appelle partie réelle de  $f$  la fonction  $\text{Re}(f) : I \rightarrow \mathbb{R}$   
 $t \mapsto \text{Re}(f(t))$

On appelle partie imaginaire de  $f$  la fonction  $\text{Im}(f) : I \rightarrow \mathbb{R}$   
 $t \mapsto \text{Im}(f(t))$

---

Remarque 3.72

De même que la donnée d'un nombre complexe revient à celle de deux réels (ses parties réelle et imaginaire), la donnée d'une fonction à valeurs complexes revient à celle de deux fonctions à valeurs réelles (ses parties réelle et imaginaire).

C'est à dire  $\forall t \in I, f(t) = (\text{Re}(f))(t) + i(\text{Im}(f))(t)$ .

---

**Définition 3.73**

Soient  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$  et  $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ .

On dit que  $f$  est continue en un point  $a \in I$  si  $\text{Re}(f)$  et  $\text{Im}(f)$  sont continues en  $a$ .

On dit que  $f$  est continue (sur  $I$ ) si elle est continue en tout point de  $I$ , c'est à dire si  $\text{Re}(f)$  et  $\text{Im}(f)$  sont continues sur  $I$ .

On dit que  $f$  est dérivable en un point  $a \in I$  si  $\text{Re}(f)$  et  $\text{Im}(f)$  le sont.

On dit que  $f$  est dérivable (sur  $I$ ) si elle est dérivable en tout point de  $I$ , c'est à dire si  $\text{Re}(f)$  et  $\text{Im}(f)$  sont dérivables sur  $I$ .

Quand  $f$  est dérivable en un point  $a \in I$ , on pose  $f'(a) = (\text{Re}(f))'(a) + i(\text{Im}(f))'(a)$ .

---

**Théorème 3.74**

Soient  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$  et  $f : I \rightarrow \mathbb{C}$  une fonction dérivable sur  $I$ .

Alors la fonction  $\exp \circ f : I \rightarrow \mathbb{C}$  est dérivable et  $(\exp \circ f)' = f' \times \exp(f)$ .  
 $t \mapsto e^{f(t)}$



---

*Démonstration 3.75*

Posons  $f_1 = \operatorname{Re}(f)$  et  $f_2 = \operatorname{Im}(f)$ .

$$\begin{aligned} \text{On a } \forall t \in I, \quad (\exp \circ f)(t) &= e^{f_1(t) + i f_2(t)} \\ &= e^{f_1(t)} e^{i f_2(t)} \\ &= e^{f_1(t)} (\cos(f_2(t)) + i \sin(f_2(t))) \\ &= \underbrace{e^{f_1(t)} \cos(f_2(t))}_{\in \mathbb{R}} + i \underbrace{e^{f_1(t)} \sin(f_2(t))}_{\in \mathbb{R}} \end{aligned}$$

$$\text{D'où } \forall t \in I, \quad \begin{cases} (\operatorname{Re}(\exp \circ f))(t) = e^{f_1(t)} \cos(f_2(t)) \\ (\operatorname{Im}(\exp \circ f))(t) = e^{f_1(t)} \sin(f_2(t)) \end{cases}$$

La fonction à valeurs complexes  $\exp \circ f$  est donc dérivable (car ses parties réelle et imaginaire le sont) et on a pour tout  $t \in I$  :

$$\begin{aligned} (\exp \circ f)'(t) &= \left( f_1'(t) e^{f_1(t)} \cos(f_2(t)) - e^{f_1(t)} f_2'(t) \sin(f_2(t)) \right) \\ &\quad + i \left( f_1'(t) e^{f_1(t)} \sin(f_2(t)) + e^{f_1(t)} f_2'(t) \cos(f_2(t)) \right) \\ &= e^{f_1(t)} (f_1'(t) [\cos(f_2(t)) + i \sin(f_2(t))] + f_2'(t) [-\sin(f_2(t)) + i \cos(f_2(t))]) \\ &= e^{f_1(t)} (f_1'(t) e^{i f_2(t)} + f_2'(t) i e^{i f_2(t)}) \\ &= e^{f_1(t)} e^{i f_2(t)} (f_1'(t) + i f_2'(t)) \\ &= e^{f(t)} \times f'(t) \end{aligned}$$

■

---

*Exemple 3.76*

Soit  $a \in \mathbb{C}$ .

La fonction  $g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{C}$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  et on a  $\forall t \in \mathbb{R}, g'(t) = a e^{at}$ .

$$t \longmapsto e^{at}$$


---

*Démonstration 3.77*

Cela découle du Théorème 3.74, en prenant  $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{C}$ .

$$t \longmapsto at$$

■

---

**Théorème 3.78**

Soient  $f, g$  deux fonctions de  $I$  dans  $\mathbb{C}$ , où  $I$  est un intervalle de  $\mathbb{R}$ .

Si  $f$  et  $g$  sont dérivables sur  $I$ , alors  $f + g$  et  $fg$  le sont aussi et on a

$$(f + g)' = f' + g' \text{ et } (fg)' = f'g + fg'$$

Si, de plus,  $g$  ne s'annule pas sur  $I$ , alors  $\frac{f}{g}$  est dérivable sur  $I$  et on a

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$$

---

Démonstration 3.79

★★ EXERCICE ★★

■

---

**Théorème 3.80**

Soient  $I, J$  deux intervalles de  $\mathbb{R}$  et  $f : I \longrightarrow J$  et  $g : J \longrightarrow \mathbb{C}$  deux fonctions dérivables.

Alors  $g \circ f$  est dérivable et on a  $(g \circ f)' = f' \times (g' \circ f)$ .

---

Démonstration 3.81

★★ EXERCICE ★★

■

# Chapitre 4

## Notions ensemblistes

### Sommaire

---

<b>4.1</b>	<b>Ensembles . . . . .</b>	<b>73</b>
4.1.1	Notations de base . . . . .	73
4.1.2	Opérations sur les ensembles . . . . .	74
4.1.2.1	Réunion . . . . .	74
4.1.2.2	Intersection . . . . .	75
4.1.3	Produit cartésien . . . . .	76
4.1.4	Autres opérations . . . . .	76
4.1.5	Partitions . . . . .	76
4.1.6	Droite réelle achevée . . . . .	77
4.1.6.1	Somme de deux éléments de $\overline{\mathbb{R}}$ . . . . .	77
4.1.6.2	Produit de deux éléments de $\overline{\mathbb{R}}$ . . . . .	78
4.1.6.3	Relation d'ordre sur $\overline{\mathbb{R}}$ . . . . .	78
<b>4.2</b>	<b>Fonctions . . . . .</b>	<b>78</b>
4.2.1	Notations de base . . . . .	78
4.2.2	Injectivité, surjectivité, bijectivité . . . . .	81
4.2.2.1	Injectivité . . . . .	81
4.2.2.2	Surjectivité . . . . .	82
4.2.2.3	Bijectivité . . . . .	83
<b>4.3</b>	<b>Relations . . . . .</b>	<b>87</b>
4.3.1	Définition . . . . .	87
4.3.2	Relations d'équivalence . . . . .	88
4.3.3	Relations d'ordre . . . . .	90
<b>4.4</b>	<b>Ensemble ordonné <math>(\mathbb{N}, \leq)</math> . . . . .</b>	<b>93</b>
<b>4.5</b>	<b>Ensemble ordonné <math>(\mathbb{R}, \leq)</math> . . . . .</b>	<b>95</b>
<b>4.6</b>	<b>Fonctions à valeurs dans un ensemble ordonné . . . . .</b>	<b>96</b>

---

## 4.1 Ensembles

### 4.1.1 Notations de base

Ensemble vide :  $\emptyset$  ou  $\{\}$ .

Singletons (ensembles avec un unique élément) :  $\{1\}, \{\sin\}, \{\emptyset\}, \dots$

Ensembles finis :  $\{1 ; 2 ; 3\}, \{0 ; \emptyset ; \cos ; \mathbb{R}\}, \dots$

Ensembles classiques (infinis) :  $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{Q}_+, \mathbb{R}_+^*, \dots$

Sous-ensembles définis par une condition :  $\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\} = \mathbb{R}_+, \dots$

Ensembles paramétrés par un autre ensemble :  $\{x + iy\}_{(x,y) \in \mathbb{R}^2}, \{\cos + \lambda \sin\}_{\lambda \in \mathbb{R}_+}, \left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & ax + b \end{array} \right\}_{(a,b) \in \mathbb{R}^2}, \dots$

Appartenance : «  $x \in E$  » signifie que l'élément  $x$  appartient à l'ensemble  $E$ .

Inclusion : «  $A \subseteq B$  » signifie  $\forall x \in A, x \in B$ .

$$\text{Égalité : } A = B \iff \begin{cases} A \subseteq B \\ B \subseteq A \end{cases}$$

---

*Remarque 4.1*

$$\begin{cases} A \subseteq B \\ B \subseteq C \end{cases} \implies A \subseteq C.$$

## 4.1.2 Opérations sur les ensembles

### 4.1.2.1 Réunion

Si  $A, B$  sont deux ensembles, alors leur réunion est l'ensemble des éléments qui appartiennent à  $A$  ou à  $B$ .

Elle est définie par  $x \in A \cup B \iff (x \in A \vee x \in B)$  pour tout élément  $x$ .

La réunion  $\cup$  est une loi associative :  $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$  pour tous ensembles  $A, B, C$ . En pratique, on note simplement  $A \cup B \cup C$ .

Si  $I$  est un ensemble et  $(A_i)_{i \in I}$  est une famille d'ensembles indexée par  $I$ , alors on définit la réunion  $\bigcup_{i \in I} A_i$  par  $x \in \bigcup_{i \in I} A_i \iff \exists i \in I, x \in A_i$ .

---

*Exemple 4.2*  
 $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \{n\} = \mathbb{N}.$

### 4.1.2.2 Intersection

Si  $A, B$  sont deux ensembles, alors leur intersection est l'ensemble des éléments qui appartiennent à  $A$  et à  $B$ . Elle est définie par  $x \in A \cap B \iff (x \in A \wedge x \in B)$  pour tout élément  $x$ .

L'intersection  $\cap$  est une loi associative :  $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$  pour tous ensembles  $A, B, C$ . En pratique, on note simplement  $A \cap B \cap C$ .

Si  $I$  est un ensemble et  $(A_i)_{i \in I}$  est une famille d'ensembles indicées par  $I$ , alors on définit l'intersection

$$\bigcap_{i \in I} A_i \text{ par } x \in \bigcap_{i \in I} A_i \iff \forall i \in I, x \in A_i.$$

*Exemple 4.3*

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} [n ; +\infty[ = \emptyset$$

*Démonstration 4.4*

$\supseteq$  Claire.

$\subseteq$  Supposons  $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} [n ; +\infty[$ .

On a  $\forall n \in \mathbb{N}, n \leq x$ . En particulier,  $\lfloor x \rfloor + 1 \leq x$  : impossible. ■

*Exemple 4.5*

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}^*} \left[ -\frac{1}{n} ; \frac{1}{n} \right] = \{0\}$$

*Démonstration 4.6*

$\supseteq$  Claire : on a bien  $\forall n \in \mathbb{N}^*, -\frac{1}{n} \leq 0 \leq \frac{1}{n}$ .

$\subseteq$  Soit  $x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}^*} \left[ -\frac{1}{n} ; \frac{1}{n} \right]$ . Montrons que  $x \in \{0\}$ , c'est à dire  $x = 0$ .

On a  $\forall n \in \mathbb{N}^*, x \in \left[ -\frac{1}{n} ; \frac{1}{n} \right]$ .

Donc  $\forall n \in \mathbb{N}^*, -\frac{1}{n} \leq x \leq \frac{1}{n}$ .

Donc  $\forall n \in \mathbb{N}^*, |x| \leq \frac{1}{n}$ .

Supposons  $x \neq 0$ . Alors on a  $\forall n \in \mathbb{N}^*, n \leq \frac{1}{|x|}$ .

En particulier,  $\left\lfloor \frac{1}{|x|} \right\rfloor + 1 \leq \frac{1}{|x|}$  : contradiction.

Donc par l'absurde,  $x = 0$ , d'où l'inclusion. ■

*Remarque 4.7*

Si  $I$  est un ensemble et  $(A_i)_{i \in I}$  est une famille d'ensembles indicée par  $I$ , alors  $\forall j \in I, \bigcap_{i \in I} A_i \subseteq A_j \subseteq$

$$\bigcup_{i \in I} A_i.$$

### 4.1.3 Produit cartésien

---

#### Rappel 4.8

Soient  $E_1, \dots, E_n$  des ensembles avec  $n \in \mathbb{N}^*$ . Le produit cartésien  $E_1 \times \dots \times E_n$  est l'ensemble des  $n$ -uplets  $(x_1, \dots, x_n)$  tels que  $\forall i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, x_i \in E_i$ .

Alors si  $E_1, \dots, E_m, F_1, \dots, F_n$  sont des ensembles avec  $m, n \in \mathbb{N}^*$ , on identifie les ensembles  $(E_1 \times \dots \times E_m) \times (F_1 \times \dots \times F_n)$  et  $E_1 \times \dots \times E_m \times F_1 \times \dots \times F_n$ . Autrement dit :

$$\forall x_1 \in E_1, \dots, \forall x_m \in E_m, \forall y_1 \in F_1, \dots, \forall y_n \in F_n, [(x_1, \dots, x_m), (y_1, \dots, y_n)] = (x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n).$$

### 4.1.4 Autres opérations

---

#### Définition 4.9

Soit  $E$  un ensemble. Une partie de  $E$  est un ensemble inclus dans  $E$ . L'ensemble des parties de  $E$  est noté  $\mathcal{P}(E)$ .

#### Définition 4.10 (Différence ensembliste)

Soient  $A, B$  deux ensembles.

On pose  $A \setminus B = \{x \in A \mid x \notin B\}$ .

#### Exemple 4.11

$$\mathbb{R} \setminus \mathbb{R}_- = \mathbb{R}_+^*$$

#### Définition 4.12 (Complémentaire)

Soient  $E$  un ensemble et  $A \in \mathcal{P}(E)$ .

Le complémentaire de  $A$  (dans  $E$ ) est  $E \setminus A$ .

Il est noté  $\complement_E A$  ou  $\overline{A}$  ou  $A^C$ .

### 4.1.5 Partitions

---

#### Définition 4.13

Soient  $E$  un ensemble et  $P \subseteq \mathcal{P}(E)$  un ensemble de parties de  $E$ .

On dit que  $P$  est un recouvrement disjoint de  $E$  si on a 
$$\begin{cases} \bigcup_{A \in P} A = E \text{ (recouvrement)} \\ \forall A, B \in P, A \neq B \text{ (disjoints deux à deux)} \end{cases}$$

---

*Exemple 4.14*

Si  $E = \llbracket 1 ; 5 \rrbracket$  alors  $\{\{1\} ; \{2 ; 4\} ; \emptyset ; \{3 ; 5\}\}$  est un recouvrement disjoint de  $E$ .

---

*Remarque 4.15*

On note alors  $E = \bigsqcup_{A \in P} A$ .

---

**Définition 4.16**

Soit  $E$  un ensemble et  $P \subseteq \mathcal{P}(E)$ . On dit que  $P$  est une partition de  $E$  si  $P$  est un recouvrement disjoint de  $E$  et  $\emptyset \notin P$ .

---

*Exemple 4.17*

Si  $E = \emptyset$  alors  $\mathcal{P}(E) = \{\emptyset\}$  et  $P = \emptyset$  est l'unique partition de  $\emptyset$ .

Si  $E = \{1\}$  alors  $\mathcal{P}(E) = \{\{1\} ; \emptyset\}$  et  $P = \{1\}$  est l'unique partition de  $E$ .

Si  $E = \{1 ; 2\}$  alors il existe deux partitions de  $E$  :  $\{\{1 ; 2\}\}$  et  $\{\{1\} ; \{2\}\}$ .

Si  $E = \{1 ; 2 ; 3\}$  alors il existe cinq partitions de  $E$  :  $\{\{1 ; 2 ; 3\}\}$ ,  $\{\{1 ; 2\} ; \{3\}\}$ ,  $\{\{1 ; 3\} ; \{2\}\}$ ,  $\{\{2 ; 3\} ; \{1\}\}$  et  $\{\{1\} ; \{2\} ; \{3\}\}$ .

Si  $E = \mathbb{R}$ , on a notamment les partitions  $\{\mathbb{R}_-^* ; \{0\} ; \mathbb{R}_+^*\}$  et  $\{\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}\} \cup \bigcup_{n \in \mathbb{Z}} \{\{n\}\}$ .

## 4.1.6 Droite réelle achevée

La droite réelle achevée est l'ensemble  $\overline{\mathbb{R}} = [-\infty ; +\infty] = \mathbb{R} \cup \{-\infty ; +\infty\}$ .

### 4.1.6.1 Somme de deux éléments de $\overline{\mathbb{R}}$

La somme  $a + b$  est définie pour tout couple  $(a, b) \in \overline{\mathbb{R}}^2 \setminus \{(-\infty, +\infty) ; (+\infty, -\infty)\}$ .

Si  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$  alors  $a + b$  est simplement la somme des réels  $a$  et  $b$ .

$$\text{Sinon, on pose } \begin{cases} (+\infty) + (+\infty) = +\infty \\ \forall x \in \mathbb{R}, \quad (+\infty) + x = x + (+\infty) = +\infty \\ (-\infty) + (-\infty) = -\infty \\ \forall x \in \mathbb{R}, \quad (-\infty) + x = x + (-\infty) = -\infty \end{cases}$$

#### 4.1.6.2 Produit de deux éléments de $\overline{\mathbb{R}}$

Le produit  $a \times b$  est défini pour tout couple  $(a, b) \in \overline{\mathbb{R}}^2 \setminus \{(-\infty, 0) ; (+\infty, 0) ; (0, -\infty) ; (0, +\infty)\}$ .

Si  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$  alors  $a \times b$  est simplement le produit des réels  $a$  et  $b$ .

$$\text{Sinon, on pose } \begin{cases} (+\infty) \times (+\infty) = (-\infty) \times (-\infty) = +\infty \\ (-\infty) \times (+\infty) = (+\infty) \times (-\infty) = -\infty \\ \forall x \in \mathbb{R}_+^*, (+\infty) \times x = x \times (+\infty) = +\infty \quad \text{et} \quad (-\infty) \times x = x \times (-\infty) = -\infty \\ \forall x \in \mathbb{R}_-^*, (+\infty) \times x = x \times (+\infty) = -\infty \quad \text{et} \quad (-\infty) \times x = x \times (-\infty) = +\infty \end{cases}$$

#### 4.1.6.3 Relation d'ordre sur $\overline{\mathbb{R}}$

On munit l'ensemble  $\overline{\mathbb{R}}$  de la relation d'ordre notée  $\leq$  qui prolonge la relation d'ordre usuelle de  $\mathbb{R}$  et pour laquelle  $+\infty$  est le plus grand élément de  $\overline{\mathbb{R}}$  et  $-\infty$  le plus petit élément de  $\overline{\mathbb{R}}$ .

On a donc  $\forall x \in \overline{\mathbb{R}}, -\infty \leq x \leq +\infty$ .

C'est un ordre total.

## 4.2 Fonctions

### 4.2.1 Notations de base

Les termes « fonction » et « application » sont synonymes.

---

**Définition 4.18**

Une fonction  $f$  d'un ensemble  $E$  dans un ensemble  $F$  associe à tout élément  $x$  de  $E$  un unique élément de  $F$  noté  $f(x) : \forall x \in E, \exists ! y \in F, y = f(x)$ .

On dit que  $E$  et  $F$  sont respectivement l'ensemble de départ (ou de définition) et d'arrivée de  $f$ .

---

**Définition 4.19**

Soient  $E, F$  deux ensembles.

L'ensemble des fonctions de  $E$  dans  $F$  est noté  $\mathcal{F}(E, F)$  ou  $F^E$ .

---

**Définition 4.20 (Ensemble image)**

Soient  $E, F$  deux ensembles et  $f \in \mathcal{F}(E, F)$ .

On pose  $\text{Im } f = \{f(x)\}_{x \in E}$ .



---

*Remarque 4.21*

Il ne faut pas confondre  $\text{Im } f$  et  $F$  : on a  $\text{Im } f \subseteq F$ .

---

**Définition 4.22 (Famille d'éléments d'un ensemble)**

Soient  $I, E$  deux ensembles.

Une famille d'éléments de  $E$  indexée par  $I$  est un objet  $(x_i)_{i \in I}$  où  $\forall i \in I, x_i \in E$ .

L'ensemble des familles d'éléments de  $E$  indexées par  $I$  est noté  $E^I$ .

---

**Définition 4.23**

Soient  $E$  un ensemble et  $A \subseteq E$ .


La fonction indicatrice de  $A$  est la fonction  $\mathbb{1}_A : E \longrightarrow \{0 ; 1\}$

$$x \longmapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

---

*Exemple 4.24*

$\mathbb{1}_{\mathbb{R}_+^*} :$



---

**Définition 4.25 (Image directe, image réciproque)**

Soient  $E, F$  deux ensembles et  $f : E \longrightarrow F$ .

Soient  $A \subseteq E$  et  $B \subseteq F$ .

L'image directe de  $A$  par  $f$  est  $f(A) = \{f(x)\}_{x \in A} \subseteq F$ .

On a aussi  $f(A) = \{y \in F \mid \exists x \in A, y = f(x)\}$ .

En pratique,  $f(A) \subseteq F$  et  $\forall y \in F, y \in f(A) \iff \exists x \in A, f(x) = y$ .

L'image réciproque de  $B$  par  $f$  est  $f^{-1}(B) = \{x \in E \mid f(x) \in B\}$ .

En pratique,  $f^{-1}(B) \subseteq E$  et  $\forall x \in E, x \in f^{-1}(B) \iff f(x) \in B$ .

---

*Remarque 4.26*

Mêmes notations.

On a  $\text{Im } f = f(E)$ .

Soient  $x \in E$  et  $y \in F$ . Si  $y = f(x)$ , on dit que  $y$  est l'image de  $x$  par  $f$  et que  $x$  est un antécédent de  $y$  par  $f$ .

$f(A)$  est l'ensemble des images des éléments de  $A$ .

$f^{-1}(B)$  est l'ensemble des antécédents des éléments de  $B$ .

---

*Exemple 4.27*

Considérons la fonction  $\sin : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ .

On a

- $\text{Im } \sin = \sin(\mathbb{R}) = [-1 ; 1]$  ;
- $\sin(\mathbb{R}_+) = [-1 ; 1]$  ;
- $\sin([0 ; \pi]) = [0 ; 1]$  ;
- $\sin^{-1}(\{0\}) = \{k\pi\}_{k \in \mathbb{Z}} = \pi\mathbb{Z}$

En effet,  $\forall x \in \mathbb{R}, x \in \sin^{-1}(\{0\}) \iff \sin x \in \{0\}$

$$\iff \sin x = 0$$

$$\iff x \equiv 0 [\pi]$$

$$\iff \exists k \in \mathbb{Z}, x = k\pi$$

- $\sin^{-1}([2 ; +\infty[) = \emptyset$ .
- 

**Définition 4.28**

Soient  $E, F$  deux ensembles et  $f : E \longrightarrow F$ .

Soit  $A \subseteq E$ .

On appelle restriction de  $f$  à  $A$  la fonction  $f|_A : A \longrightarrow F$   
 $x \longmapsto f(x)$

---

**Définition 4.29**

Soient  $E, E', F$  trois ensembles tels que  $E \subseteq E'$ .

Soient  $f : E \longrightarrow F$  et  $g : E' \longrightarrow F$ .

On dit que  $g$  est un prolongement de  $f$  à  $E'$  si on a  $f = g|_E$

---

**Définition 4.30 (Composition)**

Soient  $E, F, G$  trois ensembles. Soient  $f : E \longrightarrow F$  et  $g : F \longrightarrow G$ .

On définit la composée de  $f$  et  $g$  :

$$\begin{array}{ccc} g \circ f : & E & \longrightarrow & G \\ & x & \longmapsto & g(f(x)) \end{array}$$

---

*Remarque 4.31*

Soient  $E, F, G, H$  quatre ensembles. Soient  $f : E \longrightarrow F$ ,  $g : F \longrightarrow G$  et  $h : G \longrightarrow H$ .

On a  $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$ .

On note  $h \circ g \circ f$ .

## 4.2.2 Injectivité, surjectivité, bijectivité

### 4.2.2.1 Injectivité

---

**Définition 4.32**

Soient  $E, F$  deux ensembles et  $f : E \longrightarrow F$ .

On dit que  $f$  est injective ou que  $f$  est une injection si on a  $\forall x, y \in E, f(x) = f(y) \implies x = y$ .

---

*Exemple 4.33*

La fonction  $\exp : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$  est injective car  $\forall x, y \in \mathbb{R}, e^x = e^y \implies x = y$ .

La fonction  $\sin : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$  n'est pas injective car  $\begin{cases} \sin 0 = \sin \pi \\ 0 \neq \pi \end{cases}$

---

*Remarque 4.34*

On a aussi  $f$  injective  $\iff (\forall x, y \in E, f(x) = f(y) \iff x = y)$ .

---

**Proposition 4.35**

Soient  $I \subseteq \mathbb{R}$  et  $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$  une fonction strictement monotone.

Alors  $f$  est injective.

---

*Démonstration 4.36*

Soient  $x, y \in I$  tels que  $x \neq y$ . Montrons que  $f(x) \neq f(y)$ .

Si  $f$  est strictement croissante et  $x < y$  alors  $f(x) < f(y)$  donc  $f(x) \neq f(y)$ .

Si  $f$  est strictement croissante et  $x > y$  alors  $f(x) > f(y)$  donc  $f(x) \neq f(y)$ .

Si  $f$  est strictement décroissante et  $x < y$  alors  $f(x) > f(y)$  donc  $f(x) \neq f(y)$ .

Si  $f$  est strictement décroissante et  $x > y$  alors  $f(x) < f(y)$  donc  $f(x) \neq f(y)$ .

Donc  $f(x) \neq f(y)$ .

Donc  $f$  injective. ■

---

**Proposition 4.37 (Une composée d'injections est une injection)**

Soient  $E, F, G$  trois ensembles. Soient  $f : E \longrightarrow F$  et  $g : F \longrightarrow G$  deux injections.

Alors  $g \circ f$  est une injection.

---

*Démonstration 4.38*

Soient  $x, y \in E$  tels que  $g \circ f(x) = g \circ f(y)$ .

Montrons que  $x = y$ .

Comme  $g$  injective, on a  $f(x) = f(y)$ .

Comme  $f$  injective, on a  $x = y$ .

Donc  $g \circ f$  est une injection. ■

#### 4.2.2.2 Surjectivité

---

**Définition 4.39**

Soient  $E, F$  deux ensembles et  $f : E \longrightarrow F$ .

On dit que  $f$  est surjective ou que  $f$  est une surjection si on a  $\text{Im } f = F$ , c'est à dire si  $\forall y \in F, \exists x \in E, f(x) = y$ .

Ces deux conditions sont équivalentes car on a  $\text{Im } f \subseteq F$ .

Donc  $\text{Im } f = F \iff F \subseteq \text{Im } f$

$$\iff \forall y \in F, y \in \text{Im } f$$

$$\iff \forall y \in F, \exists x \in E, y = f(x)$$

NB : quand on parle de la surjectivité d'une fonction, il faut que l'ensemble d'arrivée de la fonction soit clair.

---

*Exemple 4.40*

$\sin : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$  n'est pas surjective car  $\text{Im } \sin = [-1 ; 1] \neq \mathbb{R}$ .

$\sin : \mathbb{R} \longrightarrow [-1 ; 1]$  est une surjection car  $\sin(\mathbb{R}) = [-1 ; 1]$ .

---

**Proposition 4.41 (Une composée de surjections est une surjection)**

Soient  $E, F, G$  trois ensembles. Soient  $f : E \longrightarrow F$  et  $g : F \longrightarrow G$  deux surjections.

Alors  $g \circ f$  est une surjection de  $E$  dans  $G$ .

---

*Démonstration 4.42*

Montrons que  $\forall z \in G, \exists x \in E, g \circ f(x) = z$ .

Soit  $z \in G$ .

Comme  $g$  est une surjection, il existe  $y \in F$  tel que  $g(y) = z$ .

Comme  $f$  est une surjection, il existe  $x \in E$  tel que  $g(x) = y$ .

On a  $z = g(y) = g(f(x)) = g \circ f(x)$ .

Donc  $g \circ f$  est surjective. ■

### 4.2.2.3 Bijektivité

---

**Définition 4.43**

Soient  $E, F$  deux ensembles et  $f : E \longrightarrow F$ .

On dit que  $f$  est bijective ou que  $f$  est une bijection de  $E$  dans  $F$  si elle est injective et surjective, c'est à dire si on a  $\forall y \in F, \exists! x \in E, f(x) = y$ .

---

*Exemple 4.44*

$\exp$  est une bijection de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}_+^*$ .

$\ln$  est une bijection de  $\mathbb{R}_+^*$  dans  $\mathbb{R}$ .

$\sin$  n'est pas une injection et donc pas une bijection.

Mais  $\sin|_{[-\pi/2; \pi/2]}$  est une bijection de  $[-\frac{\pi}{2} ; \frac{\pi}{2}]$  dans  $[-1 ; 1]$ .

---

*Remarque 4.45*

Soit  $f : E \longrightarrow F$  une injection avec  $E, F$  deux ensembles.

Alors  $f$  est une bijection de  $E$  dans  $\text{Im } f$ .

---

**Proposition 4.46 (Une composée de bijections est une bijection)**

Soient  $E, F, G$  trois ensembles. Soient  $f : E \longrightarrow F$  et  $g : F \longrightarrow G$  deux bijections.

Alors  $g \circ f : E \longrightarrow G$  est une bijection.

---

*Démonstration 4.47*

Comme  $g$  et  $f$  sont des injections,  $g \circ f$  est une injection.

Comme  $g$  et  $f$  sont des surjections,  $g \circ f$  est une surjection.

Donc  $g \circ f$  est une bijection. ■

---

**Définition/Proposition 4.48 (Bijection réciproque)**

Soient  $E, F$  deux ensembles et  $f : E \longrightarrow F$  une bijection. On a  $\forall y \in F, \exists ! x \in E, f(x) = y$ .

Pour tout  $y \in F$ , on note  $f^{-1}(y)$  l'unique antécédent de  $y$  par  $f$ .

On obtient alors une fonction  $f^{-1} : F \longrightarrow E$  appelée bijection réciproque de  $f$ .

La fonction  $f^{-1} : F \longrightarrow E$  est une bijection et vérifie 
$$\begin{cases} f \circ f^{-1} = \text{id}_F \\ f^{-1} \circ f = \text{id}_E \end{cases}$$

---

*Oubli 4.49*

Soit  $E$  un ensemble.

On pose  $\text{id}_E : E \longrightarrow E$  la « fonction identité » de  $E$ .  
$$x \longmapsto x$$

---

*Remarque 4.50*

Soit  $E$  un ensemble.

Ne pas confondre :

- si  $A \subseteq E$ ,  $f^{-1}(A)$  est l'image réciproque de  $A$  par  $f$  ;
- si  $y \in E$  et  $f$  bijective,  $f^{-1}(y)$  est l'antécédent de  $y$  par  $f$ .

---

*Démonstration 4.51 (De la Définition/Proposition 4.48)*

- Montrons que  $f^{-1} : F \longrightarrow E$  est une bijection.

On a  $f^{-1}$  bijection  $\iff \forall x \in E, \exists ! y \in F, f^{-1}(y) = x$

$$\iff \forall x \in E, \exists ! y \in F, f(x) = y$$

ce qui est vrai

- Pour tout  $y \in F$ ,  $f^{-1}(y)$  est l'antécédent de  $y$  par  $f$ .

Donc  $\forall y \in F, f(f^{-1}(y)) = y$ .

Donc  $f \circ f^{-1} = \text{id}_F$ .

De même, pour tout  $x \in E$ , l'antécédent de  $f(x)$  par  $f$  est  $x$ .

Donc  $\forall x \in E, f^{-1}(f(x)) = x$ .

Donc  $f^{-1} \circ f = \text{id}_E$ . ■

---

*Exemple 4.52*

- Déterminons la bijection réciproque de  $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$   

$$x \longmapsto x + 1$$

On a  $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, f(x) = y \iff x + 1 = y$

$$\iff x = y - 1$$

Comme tout  $y$  admet un unique antécédent,  $f$  est bijective.

De plus, on a obtenu  $\forall y \in \mathbb{R}, f^{-1}(y) = y - 1$ .

- Déterminons la bijection réciproque de  $\exp : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}_+$   

$$x \longmapsto e^x$$

On remarque  $\forall y \in \mathbb{R}_+^*, \forall x \in \mathbb{R}, \exp x = y \iff \ln(\exp x) = \ln y$

$$\iff x = \ln y$$

Ainsi,  $\forall y \in \mathbb{R}_+^*, \exists ! x \in \mathbb{R}, \exp x = y$  donc  $\exp$  est bijective.

De plus, on a obtenu  $\forall y \in \mathbb{R}_+^*, \exp^{-1} = \ln y$ .

---

*Remarque 4.53*

Soient  $I, J \subseteq \mathbb{R}$ . Soit  $f : I \longrightarrow J$  bijective.

Le graphe de  $f$  est l'ensemble  $\Gamma_f = \{(x, f(x))\}_{x \in I}$ .

Autrement dit,  $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, (x, y) \in \Gamma_f \iff \begin{cases} x \in I \text{ et } y \in J \\ y = f(x) \end{cases}$

De même,  $\forall (y, x) \in \mathbb{R}^2, (y, x) \in \Gamma_{f^{-1}} \iff \begin{cases} y \in J \text{ et } x \in I \\ x = f^{-1}(y) \end{cases}$

$$\iff \begin{cases} y \in J \text{ et } x \in I \\ y = f(x) \end{cases}$$

$$\iff (x, y) \in \Gamma_f$$

Donc  $\Gamma_{f^{-1}}$  est le symétrique de  $\Gamma_f$  par rapport à la droite  $\Delta : y = x$ .

En effet, la symétrie par rapport à  $\Delta$  est la fonction  $\mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$   
 $(x, y) \longmapsto (y, x)$

---

*Remarque 4.54*

Soient  $E, F$  deux ensembles. Soit  $B \subseteq F$ . Soit  $f : E \longrightarrow F$  bijective.

Alors  $f^{-1}(B)$  peut désigner l'image réciproque de  $B$  par  $f$  ou l'image directe de  $B$  par  $f^{-1}$ .

En fait, les deux ensembles sont égaux.

---

*Démonstration 4.55*

Notons  $X = \{x \in E \mid f(x) \in B\}$  le premier ensemble et  $Y = \{f^{-1}(y) \mid y \in B\}$  le second.

$$\begin{aligned} \text{On a, } X \subseteq E \text{ et } Y \subseteq E \text{ et } \forall x \in E, x \in X &\iff f(x) \in B \\ &\iff \exists y \in B, f(x) = y \\ &\iff \exists y \in B, x = f^{-1}(y) \\ &\iff x \in Y \end{aligned}$$

Donc  $X = Y$ . ■

---

**Proposition 4.56**

Soient  $E, F, G$  des ensembles. Soient  $f : E \longrightarrow F$  et  $g : F \longrightarrow G$ .

On a

- (1)  $g \circ f$  injection  $\implies f$  injection ;
- (2)  $g \circ f$  surjection  $\implies g$  surjection ;
- (3)  $g \circ f$  bijection  $\implies g$  surjection et  $f$  injection.

---

*Démonstration 4.57*

- (1) Supposons  $g \circ f$  injection.

Soient  $x, y \in E$ . On suppose  $f(x) = f(y)$ .

Montrons que  $x = y$ .

On a  $g(f(x)) = g(f(y))$ .

Comme  $g \circ f$  injective, on a  $x = y$ .

Donc  $f$  injective.

- (2) Supposons  $g \circ f$  surjection.

Montrons que  $g$  est surjective.

Soit  $z \in G$ . Montrons que  $\exists y \in F, g(y) = z$ .

Comme  $g \circ f$  surjective, il existe  $x \in E$  tel que  $g \circ f(x) = z$ .

On a  $g(f(x)) = z$ .

Donc  $f(x)$  est un antécédent de  $z$  par  $g$ , donc  $g$  est surjective.

- (3) Découle de (1) et (2). ■



---

Oubli 4.58

Soient  $E, F$  deux ensembles. Soit  $f : E \longrightarrow F$  bijective.

On a  $(f^{-1})^{-1} = f$ .

---

Démonstration 4.59

Soit  $x \in E$ .

On a  $x = f^{-1}(f(x))$ .

Donc  $f(x) = (f^{-1})^{-1}(x)$ . ■

---

### Proposition 4.60

Soient  $E, F, G$  trois ensembles. Soient  $f : E \longrightarrow F$  et  $g : F \longrightarrow G$  bijectives.

On a vu que  $g \circ f : E \longrightarrow G$  est une bijection.

On a  $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$ .

---

Démonstration 4.61

Soit  $z \in G$ .

$$\begin{aligned}\text{On a } z &= g(g^{-1}(z)) \\ &= g(f(f^{-1}(g^{-1}(z)))) \\ &= g \circ f(f^{-1} \circ g^{-1}(z))\end{aligned}$$

Donc  $f^{-1} \circ g^{-1}(z) = (g \circ f)^{-1}(z)$ . ■

## 4.3 Relations

### 4.3.1 Définition

---

#### Définition 4.62

Soit  $E$  un ensemble.

On appelle relation binaire sur  $E$  tout partie  $\mathcal{R} \subseteq E \times E$ .

On pose alors,  $\forall (x, y) \in E^2$ ,  $x \mathcal{R} y \iff (x, y) \in \mathcal{R}$ .

Ainsi, une relation binaire est une proposition qui dépend de  $(x, y) \in E^2$ .

---

*Exemple 4.63*

Égalité : si  $\mathcal{R} = \{(x, x)\}_{x \in E}$  (« diagonale » de  $E^2$ ), alors on obtient  $\forall (x, y) \in E^2, x \mathcal{R} y \iff x = y$ .

Si  $E = \mathbb{R}$  et  $\mathcal{R} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x < y\}$  alors on obtient la relation binaire  $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, x \mathcal{R} y \iff x < y$ .

---

**Définition 4.64**

Soient  $E$  un ensemble et  $\mathcal{R}$  une relation binaire sur  $E$ .

On dit que  $\mathcal{R}$  est réflexive si  $\forall x \in E, x \mathcal{R} x$ .

On dit que  $\mathcal{R}$  est transitive si  $\forall x, y, z \in E, (x \mathcal{R} y \wedge y \mathcal{R} z) \implies x \mathcal{R} z$ .

On dit que  $\mathcal{R}$  est symétrique si  $\forall x, y \in E, x \mathcal{R} y \iff y \mathcal{R} x$ .

On dit que  $\mathcal{R}$  est antisymétrique si  $\forall x, y \in E, (x \mathcal{R} y \wedge y \mathcal{R} x) \implies x = y$ .

---

*Exemple 4.65*

La relation  $=$  sur un ensemble  $E$  fini est réflexive, transitive, symétrique et antisymétrique.

La relation  $\leq$  sur  $\mathbb{R}$  est réflexive, transitive et antisymétrique.

La relation  $<$  sur  $\mathbb{R}$  est transitive et antisymétrique.

Soit  $E$  un ensemble. La relation  $\subseteq$  sur  $\mathcal{P}(E)$  est réflexive, transitive et antisymétrique.

## 4.3.2 Relations d'équivalence

---

**Définition 4.66**

Soient  $E$  un ensemble et  $\mathcal{R}$  une relation binaire sur  $E$ .

On dit que  $\mathcal{R}$  est une relation d'équivalence sur  $E$  si elle est réflexive, transitive et symétrique.

---

*Exemple 4.67*

- Soit  $E$  un ensemble. La relation  $=$  est une relation d'équivalence sur  $E$ .
- La relation  $\leq$  n'est pas une relation d'équivalence sur  $\mathbb{R}$  (car elle n'est pas symétrique).
- Soit  $E$  un ensemble non-vide. La relation  $\subseteq$  n'est pas une relation d'équivalence sur  $\mathcal{P}(E)$ .
- Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . On définit une relation binaire  $\mathcal{R}$  sur  $\mathbb{Z}$  en posant  $\forall x, y \in \mathbb{Z}, x \mathcal{R} y \iff x \equiv y [n]$ .  
 $\mathcal{R}$  est une relation d'équivalence sur  $\mathbb{Z}$ .

En effet,  $\mathcal{R}$  est

- réflexive car  $\forall x \in \mathbb{Z}, x \equiv x [n]$  ;
- symétrique car  $\forall x, y \in \mathbb{Z}, x \equiv y [n] \iff y \equiv x [n]$  ;

- transitive car si on a  $x, y, z \in \mathbb{Z}$  tels que  $x \equiv y [n]$  et  $y \equiv z [n]$  alors il existe  $k, \ell \in \mathbb{Z}$  tels que  $x = y + kn$  et  $y = z + \ell n$  donc on a  $x = z + (\ell + k)n$  où  $\ell + k \in \mathbb{Z}$  donc  $x \equiv z [n]$ .
- Idem pour la relation de congruence sur  $\mathbb{R}$  modulo un réel.
- Soient  $E, F$  deux ensembles et  $f : E \longrightarrow F$ .  
On définit la relation binaire  $\mathcal{R}$  sur  $E$  en posant  $\forall x, y \in E, x \mathcal{R} y \iff f(x) = f(y)$ .  
Alors  $\mathcal{R}$  est une relation d'équivalence sur  $E$ .

#### Remarque 4.68

En général, les relations d'équivalence sont notées  $\sim, =, \approx, \equiv, \dots$

### Définition/Proposition 4.69

Soient  $E$  un ensemble et  $\sim$  une relation d'équivalence sur  $E$ .

On associe à tout élément sa classe d'équivalence  $\tilde{x} = \{y \in E \mid y \sim x\}$ .

On note  $E/\sim = \{\tilde{x}\}_{x \in E}$  l'ensemble des classes d'équivalence de  $E$ .

On a  $\forall x_1, x_2 \in E, \tilde{x}_1 = \tilde{x}_2 \iff x_1 \sim x_2$ .

#### Démonstration 4.70

- Montrons que  $E/\sim$  est une partition de  $E$ .
  - Chaque classe d'équivalence est non-vide. En effet,  $\forall x \in E, x \in \tilde{x}$  car  $\sim$  est réflexive.
  - On a  $\bigcup_{\theta \in E/\sim} \theta = \bigcup_{x \in E} \tilde{x} = E$ .  
En effet, d'une part  $\forall x \in E, \tilde{x} \subseteq E$  donc  $\bigcup_{x \in E} \tilde{x} \subseteq E$ .  
Et d'autre part  $\forall y \in E, y \in \tilde{y}$  donc  $\forall y \in E, y \in \bigcup_{x \in E} \tilde{x}$ .
  - Montrons que les éléments de  $E/\sim$  sont deux à deux disjoints.  
Soient  $\theta_1, \theta_2 \in E/\sim$ .  
Supposons  $\theta_1 \neq \theta_2$ . Montrons que  $\theta_1 \cap \theta_2 = \emptyset$ .  
Soient  $x_1, x_2 \in E$  tels que  $\theta_1 = \tilde{x}_1$  et  $\theta_2 = \tilde{x}_2$ .  
Par l'absurde, supposons  $\theta_1 \cap \theta_2 \neq \emptyset$ .  
Soit  $x \in \theta_1 \cap \theta_2$ . On a  $x \in \tilde{x}_1 \cap \tilde{x}_2$ .  
Donc  $x \sim x_1$  et  $x \sim x_2$ .  
Montrons que  $\theta_1 \subseteq \theta_2$ .  
Soit  $y \in \theta_1$ . On a  $y \sim x_1$ .  
Or  $x_1 \sim x$  et  $x \sim x_2$ .  
Donc  $y \sim x_2$ . Donc  $y \in \theta_2$ .  
On montre de même  $\theta_2 \subseteq \theta_1$ .  
Donc  $\theta_1 = \theta_2$  : contradiction.

Finalement,  $E/\sim$  est une partition de  $E$ .

- Montrons que  $\tilde{x}_1 = \tilde{x}_2 \iff x_1 \sim x_2$ .



Supposons  $\tilde{x}_1 = \tilde{x}_2$ .

Comme  $x_1 \in \tilde{x}_1$ , on a  $x_1 \in \tilde{x}_2$  donc  $x_1 \sim x_2$ .



Supposons  $x_1 \sim x_2$ .

Montrons que  $\tilde{x}_1 \subseteq \tilde{x}_2$ . Soit  $y \in \tilde{x}_1$ .

On a  $y \sim x_1$ . Or  $x_1 \sim x_2$ .

Donc  $y \sim x_2$ . Donc  $y \in \tilde{x}_2$ . Donc  $\tilde{x}_1 \subseteq \tilde{x}_2$ .

On montre de même  $\tilde{x}_2 \subseteq \tilde{x}_1$ .

Donc  $\tilde{x}_1 = \tilde{x}_2$ . ■

*Remarque 4.71*

$\forall \theta \in E/\sim, \forall x, y \in \theta, x \sim y$

*Remarque 4.72*

Soient  $E$  un ensemble et  $\sim$  une relation d'équivalence sur  $E$ .

On note  $\pi : E \longrightarrow E/\sim$  la surjection canonique de  $E$  vers  $E/\sim$ .

$$x \longmapsto \tilde{x}$$

On a  $\forall x, y \in E, x \sim y \iff \pi(x) = \pi(y)$ .

*Démonstration 4.73*

$\pi$  est une surjection car tout  $\theta \in E/\sim$  admet un antécédent :  $\forall \theta \in E/\sim, \exists x \in E, \theta = \tilde{x}$ .

Donc  $\forall \theta \in E/\sim, \exists x \in E, \pi(x) = \theta$ . ■

### 4.3.3 Relations d'ordre

#### Définition 4.74

Soit  $E$  un ensemble.

On appelle relation d'ordre (partiel) tout relation binaire  $\leq$  sur  $E$  qui est réflexive, transitive et antisymétrique.

On dit alors que  $(E, \leq)$  est un ensemble (partiellement) ordonné.

Si la relation binaire  $\leq$  est claire, on dit parfois que  $E$  est un ensemble ordonné.

Si, de plus,  $\leq$  vérifie  $\forall x, y \in E, x \leq y$  ou  $y \leq x$  alors on dit que  $\leq$  est une relation d'ordre total et que  $(E, \leq)$  est totalement ordonné.

---

*Exemple 4.75*

Soit  $E$  un ensemble. La relation  $=$  est une relation d'ordre partiel sur  $E$ .

$(\mathbb{R}, \leq)$  est un ensemble totalement ordonné.

Soit  $X$  un ensemble et  $E = \mathcal{P}(X)$ .  $(E, \subseteq)$  est ordonné.

Posons  $\forall a, b \in \mathbb{Z}, a \mid b \iff \exists k \in \mathbb{Z}, ak = b$ .

La relation  $\mid$  n'est pas une relation d'ordre sur  $\mathbb{Z}$  car elle n'est pas antisymétrique. En effet,  $1 \mid -1$  et  $-1 \mid 1$  mais  $-1 \neq 1$ .

En revanche,  $\mid$  est une relation d'ordre sur  $\mathbb{N}$ .

---

**Définition 4.76**

Soient  $(E, \leq)$  un ensemble ordonné et  $A \subseteq E$ .

On dit que  $M \in E$  est un majorant de  $A$  dans  $E$  si  $\forall x \in A, x \leq M$ .

On dit que  $m \in E$  est un minorant de  $A$  dans  $E$  si  $\forall x \in A, m \leq x$ .

On dit que  $A$  est majorée (dans  $E$ ) si elle admet un majorant (dans  $E$ ).

On dit que  $A$  est minorée (dans  $E$ ) si elle admet un minorant (dans  $E$ ).

On dit que  $A$  est bornée (dans  $E$ ) si elle admet un majorant et un minorant (dans  $E$ ).

On dit que  $M \in E$  est le plus grand élément de  $A$  ssi on a  $M \in A$  et  $\forall x \in A, x \leq M$ .

On dit que  $m \in E$  est le plus petit élément de  $A$  ssi on a  $m \in A$  et  $\forall x \in A, m \leq x$ .

S'il existe, le plus grand élément de  $A$  est unique et est noté  $\max A$ .

S'il existe, le plus petit élément de  $A$  est unique et est noté  $\min A$ .

---

*Démonstration 4.77*

Montrons l'unicité du plus grand élément de  $A$ . Soient  $M_1, M_2 \in E$ .

$$\text{Supposons } \begin{cases} M_1 \in A & (1) \\ M_2 \in A & (2) \\ \forall x \in A, x \leq M_1 & (3) \\ \forall x \in A, x \leq M_2 & (4) \end{cases}$$

Montrons que  $M_1 = M_2$ .

Selon (1) et (4),  $M_1 \leq M_2$  et selon (2) et (3),  $M_2 \leq M_1$ .

Donc  $M_1 = M_2$  car  $\leq$  est antisymétrique.

On montre de même l'unicité du plus petit élément. ■

---

*Exemple 4.78*

La partie  $\mathbb{R}_+$  n'est pas majorée dans  $\mathbb{R}$ . En revanche, elle est majorée dans  $\overline{\mathbb{R}}$ .

$+\infty$  est le plus grand élément de  $\overline{\mathbb{R}}$ .

0 est le plus grand élément de  $] -\infty ; 0]$ .

Soit  $X$  un ensemble. Dans  $(\mathcal{P}(X), \subseteq)$ ,  $\emptyset$  est le plus petit élément et  $X$  est le plus grand élément.

Dans  $(\mathbb{N}, |)$ , 1 est le plus petit élément et 0 est le plus grand élément.

Toute partie de  $(\mathbb{N}, |)$  est bornée : minorée par 1 et majorée par 0.

La partie  $\mathbb{N}^*$  admet 1 comme plus petit élément mais pas de plus grand élément.

---

**Définition 4.79**

Soient  $(E, \leq)$  un ensemble ordonné et  $A \subseteq E$ .

Notons  $\text{majorants}(A)$  l'ensemble des majorants de  $A$  :  $\text{majorants}(A) = \{M \in E \mid \forall x \in A, x \leq M\}$  et  $\text{minorants}(A)$  l'ensemble des minorants de  $A$  :  $\text{minorants}(A) = \{m \in E \mid \forall x \in A, m \leq x\}$ .

S'il existe, le plus petit élément de  $\text{majorants}(A)$  est appelé la borne supérieure de  $A$  et est noté  $\sup A$ .

S'il existe, le plus grand élément de  $\text{minorants}(A)$  est appelé la borne inférieure de  $A$  et est noté  $\inf A$ .

---

*Exemple 4.80*

Dans  $(\mathbb{R}, \leq)$  :

- $\text{majorants}([0 ; 1]) = [1 ; +\infty[$  donc  $\sup [0 ; 1] = 1$ .
- $\text{majorants}([0 ; 1[) = [1 ; +\infty[$  donc  $\sup [0 ; 1[ = 1$ .
- $\text{majorants}(\emptyset) = \mathbb{R}$  donc  $\sup \emptyset$  n'existe pas.

Dans  $(\overline{\mathbb{R}}, \leq)$  :

- $\text{majorants}(\mathbb{R}) = \{+\infty\}$  donc  $\sup \mathbb{R} = +\infty$ .
- $\text{majorants}(\emptyset) = \overline{\mathbb{R}}$  donc  $\sup \emptyset = -\infty$ .

Dans  $(\mathbb{N}, |)$  :

- $\text{majorants}(\mathbb{N}^*) = \{0\}$  donc  $\sup \mathbb{N}^* = 0$ .
- Notons  $\mathbb{P}$  l'ensemble des nombres premiers.  $\text{majorants}(\mathbb{P}) = \{0\}$  donc  $\sup \mathbb{P} = 0$ .

---

**Proposition 4.81**

Soient  $(E, \leq)$  un ensemble ordonné et  $A \subseteq E$ .

- (1) Si  $A$  admet un plus grand élément, alors  $A$  admet une borne supérieure qui est son plus grand élément :  $\sup A = \max A$ .
- (2) Pour que  $A$  admette une borne supérieure, il faut que  $A$  soit majorée.

---

Démonstration 4.82

(1) Supposons que  $A$  admet un plus grand élément  $M$  : 
$$\begin{cases} M \in A \\ \forall x \in A, x \leq M \end{cases}$$

Alors  $M$  majore  $A$  donc  $M \in \text{majorants}(A)$ .

De plus,  $\forall M' \in \text{majorants}(A)$ ,  $M \leq M'$  car  $M \in A$ .

Donc  $M$  est le plus petit élément de  $\text{majorants}(A)$ .

Donc  $M = \sup A$ .

(2) Clair. ■

---

### Proposition 4.83

Soit  $(E, \leq)$  un ensemble ordonné. Soient  $A \subseteq E$  et  $y \in E$ .

Les propositions suivantes sont équivalentes :

(1)  $y$  est la borne supérieure de  $A$

(2)  $\forall z \in E$ ,  $z$  majore  $A \iff y \leq z$

---

Démonstration 4.84

Montrons que (1)  $\iff$  (2).

$\implies$  Supposons  $y = \sup A$ . Soit  $z \in E$ .

Montrons que  $z$  majore  $A \iff y \leq z$ .

$\implies$  Claire car  $y$  est le plus petit majorant de  $A$ .

$\impliedby$  Si  $y \leq z$  alors  $\forall x \in A$ ,  $x \leq y \leq z$  donc  $z$  majore  $A$ .

$\impliedby$  Supposons (2).

Comme  $y \leq y$ ,  $y$  majore  $A$  (selon  $\impliedby$ ).

De plus, tout majorant  $z \in A$  vérifie  $y \leq z$  (selon  $\implies$ ).

Donc  $y = \sup A$ . ■

## 4.4 Ensemble ordonné $(\mathbb{N}, \leq)$

---

### Théorème 4.85

Toute partie non-vide de  $\mathbb{N}$  admet un plus petit élément.

---

Démonstration 4.86

★★ ADMIS ★★ ■

---

**Proposition 4.87**

Toute partie finie non-vide de  $\mathbb{N}$  admet un plus grand élément.

---

**Remarque 4.88**

Plus généralement, tout ensemble totalement ordonné fini admet un plus petit élément et un plus grand élément.

---

**Théorème 4.89 (Démonstration par récurrence)**

Soit  $P(n)$  une proposition dépendant d'un entier  $n \in \mathbb{N}$ .

$$\text{Supposons } \begin{cases} P(0) \\ \forall n \in \mathbb{N}, P(n) \implies P(n+1) \end{cases}$$

Alors  $\forall n \in \mathbb{N}, P(n)$ .

---

**Démonstration 4.90**

On pose  $A = \{n \in \mathbb{N} \mid \neg P(n)\}$ . Montrons que  $A = \emptyset$ .

Supposons par l'absurde  $A \neq \emptyset$ .

Posons  $n_0 = \min A$ .  $n_0$  existe selon le Théorème 4.85. On a  $n_0 \neq 0$  car  $0 \notin A$  car  $P(0)$  est vraie.

Donc  $n_0 \geq 1$ .

On a  $n_0 - 1 \notin A$  car  $n_0$  minore  $A$ .

Donc  $P(n_0 - 1)$  est vraie. Donc  $P(n_0)$  est vraie : contradiction.

Donc  $\forall n \in \mathbb{N}, P(n)$ . ■

---

**Corollaire 4.91 (Démonstration par récurrence forte)**

Soit  $P(n)$  une proposition dépendant de  $n \in \mathbb{N}$ .

$$\text{Supposons } \begin{cases} P(0) \\ \forall n \in \mathbb{N}, (P(0) \wedge P(1) \wedge \dots \wedge P(n)) \implies P(n+1) \end{cases}$$

Alors  $\forall n \in \mathbb{N}, P(n)$ .

---

**Démonstration 4.92**

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on note  $Q(n)$  la proposition «  $P(0) \wedge P(1) \wedge \dots \wedge P(n)$  », c'est à dire «  $\forall k \in [0; n], P(k)$  ».

On a  $Q(0)$  car  $P(0)$  et  $\forall n \in \mathbb{N}, Q(n) \implies P(n+1)$ .

Donc  $\forall n \in \mathbb{N}, Q(n) \implies (Q(n) \wedge P(n+1))$ .

Donc  $\forall n \in \mathbb{N}, Q(n) \implies Q(n+1)$ .

D'où selon le Théorème 4.89 :  $\forall n \in \mathbb{N}, Q(n)$  donc  $\forall n \in \mathbb{N}, P(n)$ . ■

---



## 4.5 Ensemble ordonné $(\mathbb{R}, \leq)$

*Rappel 4.93*

On appelle intervalle de  $\mathbb{R}$  toute partie  $I$  de  $\mathbb{R}$  telle que  $\forall x, y \in I, \forall z \in \mathbb{R}, x \leq z \leq y \implies z \in I$ .

### **Théorème 4.94 (Caractérisation de la borne supérieure dans $\mathbb{R}$ )**

Soit  $A \subseteq \mathbb{R}$ . Soit  $y \in \mathbb{R}$ .

$$\text{Alors } y = \sup A \iff (S) : \begin{cases} \forall x \in A, y \geq x & (1) \\ \forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists x \in A, y - \varepsilon \leq x & (2) \end{cases}$$

*Démonstration 4.95*



Supposons  $y = \sup A$ .

Alors  $y$  majore  $A$  donc  $\forall x \in A, x \leq y$ .

De plus, on a  $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, y - \varepsilon < y$ .

Donc  $y - \varepsilon$  n'est pas un majorant de  $A$ .

Donc  $\exists x \in A, y - \varepsilon \leq x$ .



Supposons (S).

—  $y$  majore  $A$  d'après (1).

— Montrons que  $y$  est le plus petit majorant de  $A$ .

Soit  $z$  un majorant de  $A$ . Montrons que  $z \geq y$ .

Soit  $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$ .

Soit  $x \in A$  tel que  $y - \varepsilon \leq x$ .

On a  $y - \varepsilon \leq x \leq z$ .

Donc  $y - \varepsilon \leq z$ .

Donc  $y \leq z$ . En effet, supposons par l'absurde  $z < y$ .

Posons  $\varepsilon = \frac{y - z}{2} \in \mathbb{R}_+^*$ .

On a  $y - \varepsilon \leq z$ .

Donc  $y - \frac{y - z}{2} < z$ .

Donc  $\frac{y}{2} < \frac{z}{2}$  : contradiction.

Donc on a  $y = \sup A$ . ■

### **Théorème 4.96 (Caractérisation de la borne inférieure dans $\mathbb{R}$ )**

Soient  $A \subseteq \mathbb{R}$  et  $y \in \mathbb{R}$ .

$$\text{On a } y = \inf A \iff \begin{cases} \forall x \in A, y \leq x \\ \forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists x \in A, x \leq y + \varepsilon \end{cases}$$

---

Démonstration 4.97

Idem. ■

---

**Théorème 4.98**

Toute partie non-vide et majorée de  $\mathbb{R}$  admet une borne supérieure.

Toute partie non-vide et minorée de  $\mathbb{R}$  admet une borne inférieure.

---

Démonstration 4.99

★★ ADMIS ★★ ■

## 4.6 Fonctions à valeurs dans un ensemble ordonné

---

**Définition 4.100**

Soient  $E$  un ensemble,  $(F, \leq)$  un ensemble ordonné et  $f : E \longrightarrow F$ .

On appelle majorant de  $f$  tout majorant de  $\text{Im } f$ .

On appelle minorant de  $f$  tout minorant de  $\text{Im } f$ .

Ainsi,  $M$  majore  $f \iff \forall y \in \text{Im } f, y \leq M$

$$\iff \forall x \in E, f(x) \leq M$$

On appelle borne supérieure de  $f$  la borne supérieure de  $\text{Im } f$  si elle existe.

On appelle borne inférieure de  $f$  la borne inférieure de  $\text{Im } f$  si elle existe.

---

Remarque 4.101

$$\sup f = \sup_{x \in E} f(x)$$

---

**Définition 4.102**

Soient  $(E, \leq)$  un ensemble ordonné,  $I$  un ensemble et  $(x_i)_{i \in I}$  une famille d'éléments de  $E$ .

On appelle majorant de  $(x_i)_{i \in I}$  tout majorant de  $\{x_i\}_{i \in I}$ .

On appelle minorant de  $(x_i)_{i \in I}$  tout minorant de  $\{x_i\}_{i \in I}$ .

On dit que  $(x_i)_{i \in I}$  est majorée si on a  $\exists M \in E, \forall i \in I, x_i \leq M$ .

On dit que  $(x_i)_{i \in I}$  est minorée si on a  $\exists m \in E, \forall i \in I, m \leq x_i$ .

La borne supérieure de  $(x_i)_{i \in I}$  est le plus petit majorant de la famille.

La borne inférieure de  $(x_i)_{i \in I}$  est le plus grand minorant de la famille.

Elles sont notées  $\sup_{i \in I} x_i$  et  $\inf_{i \in I} x_i$ .

# Chapitre 5

## Suites

### Sommaire

---

<b>5.1</b>	<b>Suites . . . . .</b>	<b>97</b>
5.1.1	Cadre . . . . .	97
5.1.2	Définitions . . . . .	98
5.1.3	Suite définie en itérant une fonction . . . . .	98
5.1.4	Suites particulières . . . . .	99
<b>5.2</b>	<b>Convergence . . . . .</b>	<b>101</b>
5.2.1	Définition . . . . .	101
5.2.2	Convergence et ordre . . . . .	103
5.2.3	Opérations sur les limites . . . . .	107
<b>5.3</b>	<b>Limites infinies. . . . .</b>	<b>111</b>
<b>5.4</b>	<b>Suites extraites . . . . .</b>	<b>113</b>
<b>5.5</b>	<b>Opérations sur les limites . . . . .</b>	<b>115</b>
<b>5.6</b>	<b>Suites monotones. . . . .</b>	<b>119</b>
<b>5.7</b>	<b>Retour sur les suites extraites . . . . .</b>	<b>120</b>
<b>5.8</b>	<b>Densité . . . . .</b>	<b>123</b>
5.8.1	Rappels . . . . .	123
5.8.2	Densité . . . . .	124
5.8.3	Caractérisation séquentielle de la densité . . . . .	126
<b>5.9</b>	<b>Remarque . . . . .</b>	<b>127</b>
<b>5.10</b>	<b>Suites de nombres complexes . . . . .</b>	<b>128</b>

---

## 5.1 Suites

### 5.1.1 Cadre

On appelle suite réelle toute famille de réels  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  indexée par  $\mathbb{N}$ .

On appelle suite complexe toute famille  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$  indexée par  $\mathbb{N}$ .

On note aussi abusivement  $(u_n)_n$  ces suites.

Plus généralement, on peut appeler suite toute famille de la forme  $(u_n)_{n \in [n_0; +\infty[}$  où  $n_0 \in \mathbb{Z}$ .

### 5.1.2 Définitions

Soient  $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}, v = (v_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ .

On dit que  $u$  est constante si  $\exists c \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, u_n = c$ .

On dit que  $u$  est stationnaire (ou « constante à partir d'un certain rang ») si  $\exists c \in \mathbb{R}, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \llbracket N ; +\infty \llbracket, u_n = c$ .

On dit que  $u$  est

- croissante si  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq u_{n+1}$  ;
- décroissante si  $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} \leq u_n$  ;
- strictement croissante si  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n < u_{n+1}$  ;
- strictement décroissante si  $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} < u_n$  ;
- monotone si elle est croissante ou décroissante ;
- strictement monotone si elle est strictement croissante ou strictement décroissante.

On dit que  $u$  est

- majorée si  $\exists M \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq M$  ;
- minorée si  $\exists m \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, m \leq u_n$  ;
- bornée si elle est majorée et minorée, c'est à dire si  $\exists K \in \mathbb{R}_+, \forall n \in \mathbb{N}, |u_n| \leq K$ .

On dit que  $u$  est inférieure ou égale à  $v$  et on note  $u \leq v$  si  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq v_n$ .

On dit que  $u$  est positive (ou « à termes positifs ») et on note  $u \geq 0$  si  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq 0$ .

On note  $u+v$  la suite  $(w_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  définie par  $\forall n \in \mathbb{N}, w_n = u_n + v_n$ . Autrement dit,  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} + (v_n)_{n \in \mathbb{N}} = (u_n + v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ .

On pose de même  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \times (v_n)_{n \in \mathbb{N}} = (u_n v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ .

On pose enfin, si  $\lambda \in \mathbb{R} : \lambda (u_n)_{n \in \mathbb{N}} = (\lambda u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ .

---

#### Exemple 5.1

Supposons  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = (-1)^n$  et  $v_n = (-1)^{n+1}$ .

On a  $u + v = (0)_n$  et  $uv = (-1)_n$ .

### 5.1.3 Suite définie en itérant une fonction

---

#### Proposition 5.2

Soient  $I \subseteq \mathbb{R}, x \in I$  et  $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ .

On suppose  $f(I) \subseteq I$  ( $I$  est stable par  $f$ ).

Alors il existe une unique suite  $(u_n)_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  telle que 
$$\begin{cases} u_0 = x \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$

---

### Démonstration 5.3

unicité

Soient  $(u_n)_n, (v_n)_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  telles que 
$$\begin{cases} u_0 = v_0 = x \\ \forall n \in \mathbb{N}, \begin{cases} u_{n+1} = f(u_n) \\ v_{n+1} = f(v_n) \end{cases} \end{cases}$$

Montrons que  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = v_n$  par récurrence sur  $n$ .

On a  $u_0 = x = v_0$ .

Soit  $n \in \mathbb{N}$  tel que  $u_n = v_n$ . On a  $f(u_n) = f(v_n)$  donc  $u_{n+1} = v_{n+1}$ .

existence

On pose  $\forall n \in \mathbb{N}, f^{on} = \begin{cases} \text{id}_E & \text{si } n = 0 \\ \underbrace{f \circ f \circ f \circ \dots \circ f}_{n \text{ facteurs}} & \text{sinon} \end{cases}$

On remarque que la suite  $(f^{on}(x))_{n \in \mathbb{N}}$  convient. ■

---

### Exemple 5.4

Avec  $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$  et  $x = 2$ , on a  $u_0 = 2, u_1 = 4, u_2 = 16, u_3 = 256, \dots$   
 $t \longmapsto t^2$

Avec  $f : \mathbb{R}_+^* \longrightarrow \mathbb{R}$  et  $x = e$ , on a  $u_0 = e, u_1 = 1, u_2 = 0, u_3 = \text{problème}$  car  $\mathbb{R}_+^*$  n'est pas stable par  $f$ .  
 $t \longmapsto \ln t$

## 5.1.4 Suites particulières

---

### Définition 5.5

On dit que  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  est une suite arithmétique si on a  $\exists r \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n + r$ .

Un tel réel  $r$  est unique et est appelé raison de la suite.

---

### Proposition 5.6

Soit  $(u_n)_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  une suite arithmétique de raison  $r \in \mathbb{R}$ .

On a  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = u_0 + nr$ .

---

**Définition 5.7**

On dit que  $(u_n)_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  est une suite géométrique si on a  $\exists q \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = qu_n$ .

Un tel réel  $q$  est unique si  $v_0 \neq 0$  et est alors appelé raison de la suite.

---

**Proposition 5.8**

Soit  $(u_n)_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  une suite géométrique de raison  $q \in \mathbb{R}$ .

On a  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = u_0 \times q^n$ .

---

**Définition 5.9**

On dit que  $(u_n)_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  est une suite arithmético-géométrique si on a  $\exists a, b \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = au_n + b$ .

---

**Proposition 5.10**

Soit  $(u_n)_n$  une suite arithmético-géométrique. Soient  $a, b \in \mathbb{R}$  tels que  $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = au_n + b$ .

Si  $a = 1$  alors  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = u_0 + nb$ .

Supposons désormais  $a \neq 1$ . Alors la fonction  $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$  admet un unique point fixe  
$$x \longmapsto ax + b$$
  
 $\lambda \in \mathbb{R} : \exists ! \lambda \in \mathbb{R}, f(\lambda) = \lambda$  et la suite  $(u_n - \lambda)_n$  est une suite géométrique.

---

*Démonstration 5.11*

Soit  $x \in \mathbb{R}$ . On a :

$$\begin{aligned} x \text{ point fixe de } f &\iff f(x) = x \\ &\iff ax + b = x \\ &\iff x = \frac{b}{1-a}. \end{aligned}$$

Donc  $\lambda = \frac{b}{1-a}$  est l'unique point fixe de  $f$ .

De plus, on a :

$$\begin{aligned} \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} - \lambda &= au_n + b - \frac{b}{1-a} \\ &= au_n + b \left(1 - \frac{1}{1-a}\right) \\ &= au_n + b \frac{-a}{1-a} \\ &= a \left(u_n - \frac{b}{1-a}\right) \\ &= a(u_n - \lambda). \end{aligned}$$

Donc  $(u_n - \lambda)_n$  est une suite géométrique de raison  $a$ . ■

---

*Exemple 5.12*

Soit  $(u_n)_n$  définie par  $\begin{cases} u_0 = 2 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 5u_n + 3 \end{cases}$ .

Calculons  $u_n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

Réolvons l'équation  $x = 5x + 3$  pour tout  $x \in \mathbb{R} : x = -\frac{3}{4}$ .

Ainsi, on a :

$$\begin{aligned} \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} + \frac{3}{4} &= 5u_n + 3 + \frac{3}{4} \\ &= 5u_n + \frac{15}{4} \\ &= 5 \left( u_n + \frac{3}{4} \right). \end{aligned}$$

Donc  $\left( u_n + \frac{3}{4} \right)_n$  est géométrique de raison 5.

Donc  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n + \frac{3}{4} = \left( u_0 + \frac{3}{4} \right) \times 5^n$ .

D'où  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \frac{11}{4} \times 5^n - \frac{3}{4}$ .

## 5.2 Convergence

### 5.2.1 Définition

---

#### Définition/Proposition 5.13

Soient  $(u_n)_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  et  $\ell \in \mathbb{R}$ .

On dit que  $(u_n)_n$  converge (ou tend) vers  $\ell$  si on a :

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in [N ; +\infty[, |u_n - \ell| \leq \varepsilon.$$

Un tel réel  $\ell$  est unique et est appelé la limite de  $(u_n)_n$ . Il est noté :

$$\ell = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_n u_n \quad \text{ou} \quad u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell.$$

On dit enfin que  $(u_n)_n$  est convergente. Sinon, on dit que  $(u_n)_n$  est divergente.

---

*Remarque 5.14*

La notation «  $\lim_n u_n = \ell$  » signifie « la limite de  $(u_n)_n$  existe et vaut  $\ell$  ». Sa négation n'est donc pas  $\lim_n u_n \neq \ell$  mais

$$\exists \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \forall N \in \mathbb{N}, \exists n \in \llbracket N ; +\infty \llbracket, |u_n - \ell| > \varepsilon.$$

---

*Démonstration 5.15*

Montrons que  $(u_n)_n$  admet au plus une limite.

Soient  $\ell, \ell' \in \mathbb{R}$  tels que 
$$\begin{cases} \forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \llbracket N ; +\infty \llbracket, |u_n - \ell| \leq \varepsilon \\ \forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \llbracket N ; +\infty \llbracket, |u_n - \ell'| \leq \varepsilon \end{cases}.$$

Supposons  $\ell \neq \ell'$ . Posons  $\varepsilon = \frac{|\ell - \ell'|}{3}$ . On a  $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$ .

Soit  $N_1 \in \mathbb{N}$  tel que  $\forall n \geq N_1, |u_n - \ell| \leq \varepsilon$ .

Soit  $N_2 \in \mathbb{N}$  tel que  $\forall n \geq N_2, |u_n - \ell'| \leq \varepsilon$ .

Posons  $N = \max\{N_1 ; N_2\}$ . On a 
$$\begin{cases} |u_N - \ell| \leq \varepsilon \\ |u_N - \ell'| \leq \varepsilon \end{cases}.$$

Donc on a :

$$\begin{aligned} |\ell - \ell'| &\leq |\ell - u_N| + |u_N - \ell'| \\ &\leq \varepsilon + \varepsilon \\ &= 2\varepsilon \\ &= \frac{2}{3} |\ell - \ell'| \quad \text{contradiction.} \end{aligned}$$

Donc par l'absurde,  $\ell = \ell'$  donc la limite est unique. ■

---

*Exemple 5.16*

Montrons que  $\lim_n \frac{1}{n} = 0$ , c'est-à-dire :

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \llbracket N ; +\infty \llbracket, \left| \frac{1}{n} - 0 \right| \leq \varepsilon.$$

Soit  $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$ .

On a :

$$\begin{aligned} \forall n \in \mathbb{N}^*, \left| \frac{1}{n} \right| \leq \varepsilon &\iff n \geq \frac{1}{\varepsilon} \\ &\iff n \geq \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil. \end{aligned}$$

Donc l'entier  $\left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil + 1$  convient (donc  $N$  existe).



---

*Remarque 5.17*

Pour une suite, on a :

$$\text{constante} \implies \text{stationnaire} \implies \text{convergente}.$$

---

*Remarque 5.18*

Soient  $(u_n)_n, (v_n)_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ .

Si  $(u_n)_n$  et  $(v_n)_n$  coïncident à partir d'un certain rang, c'est-à-dire si on a :

$$\exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_n = v_n$$

alors on a :

$$(u_n)_n \text{ convergente} \iff (v_n)_n \text{ convergente}$$

et les limites sont égales.

---

**Proposition 5.19**

Soient  $(u_n)_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  et  $\ell \in \mathbb{R}$ .

Alors on a :

$$\lim_n u_n = \ell \iff \lim_n (u_n - \ell) = 0.$$

---

*Démonstration 5.20*

On a :

$$\begin{aligned} \lim_n u_n = \ell &\iff \forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |u_n - \ell| \leq \varepsilon \\ &\iff \forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |(u_n - \ell) - 0| \leq \varepsilon \\ &\iff \lim_n (u_n - \ell) = 0 \end{aligned}$$

■

## 5.2.2 Convergence et ordre

---

**Proposition 5.21**

Toute suite convergente est bornée.

---

*Démonstration 5.22*

Soit  $(u_n)_n$  une suite convergente. On note  $\ell$  sa limite.

Soit  $N \in \mathbb{N}$  tel que  $\forall n \geq N, |u_n - \ell| \leq 1$ .

On a :

$$\begin{aligned}\forall n \geq N, |u_n| &= |u_n - \ell + \ell| \\ &\leq |u_n - \ell| + |\ell| \\ &\leq 1 + |\ell|.\end{aligned}$$

Posons  $M = \max \{|u_0| ; \dots ; |u_{N-1}| ; 1 + |\ell|\}$ .

On a  $\forall n \in \mathbb{N}, |u_n| \leq M$ .

Donc  $(u_n)_n$  est bornée. ■

---

### **Proposition 5.23**

*Soit  $(u_n)_n$  une suite convergente de limite  $\ell \in \mathbb{R}$ .*

*Tout minorant strict de  $\ell$  minore strictement  $(u_n)_n$  à partir d'un certain rang.*

---

*Démonstration 5.24*

Soit  $m \in \mathbb{R}$  tel que  $m < \ell$ .

On a :

$$\exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_n > m.$$

Posons  $\varepsilon = \frac{\ell - m}{2}$ . On a  $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$ .

Soit  $N \in \mathbb{N}$  tel que  $\forall n \geq N, |u_n - \ell| \leq \varepsilon$ .

On a :

$$\begin{aligned}\forall n \geq N, u_n - \ell &\geq -\varepsilon \\ \forall n \geq N, u_n - \ell &\geq \frac{m - \ell}{2} \\ \forall n \geq N, u_n &\geq \frac{m + \ell}{2} > m.\end{aligned}$$

Donc  $N$  convient. ■

---

*Exemple 5.25*

Soient  $(u_n)_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  et  $\ell \in \mathbb{R}_+^*$ .

On a  $0 < \ell$  donc  $\exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, 0 < u_n$ .

En particulier,  $\left(\frac{1}{u_n}\right)_n$  est bien définie à partir d'un certain rang.

---

**Proposition 5.26**

Soit  $(u_n)_n$  une suite convergente de limite  $\ell \in \mathbb{R}$ .

Tout majorant strict de  $\ell$  majore strictement  $(u_n)_n$  à partir d'un certain rang.

---

*Démonstration 5.27*

Idem. ■

---

*Remarque 5.28*

On ne peut rien dire d'analogue concernant les minorants ou majorants larges de la limite. Par exemple, 0 majore 0 mais ne majore pas  $\left(\frac{1}{n}\right)_n$  à partir d'un certain rang.

---

**Proposition 5.29 (Passage à la limite dans une inégalité large)**

Soit  $(u_n)_n$  une suite convergente de limite  $\ell \in \mathbb{R}$ . Soit  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

Si  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq \lambda$  alors  $\ell \leq \lambda$ .

Si  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq \lambda$  alors  $\ell \geq \lambda$ .

---

*Démonstration 5.30*

Supposons  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq \lambda$ . Montrons que  $\ell \leq \lambda$ .

Supposons  $\lambda < \ell$ .

Alors  $\exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_n > \lambda$  : contradiction.

Donc  $\ell \leq \lambda$  par l'absurde.

On montre de même que si  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq \lambda$  alors  $\ell \geq \lambda$ . ■

---

*Remarque 5.31*

C'est faux avec des inégalités strictes. Par exemple, on a :  $\forall n \in \mathbb{N}, 0 < \frac{1}{n}$  mais on n'a pas  $0 < \lim_n \frac{1}{n}$ .

---

### **Théorème 5.32 (Théorème des gendarmes)**

Soient  $(u_n)_n, (v_n)_n, (w_n)_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ .

On suppose que :

- les suites  $(u_n)_n$  et  $(w_n)_n$  sont convergentes et de même limite  $\ell \in \mathbb{R}$  ;
- l'on a  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq v_n \leq w_n$ .

Alors  $(v_n)_n$  est convergente de limite  $\ell$ .

---

*Démonstration 5.33*

Montrons que  $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |v_n - \ell| \leq \varepsilon$ .

Soit  $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$ .

Soit  $N_1 \in \mathbb{N}$  tel que  $\forall n \geq N_1, \ell - \varepsilon \leq u_n$ .

Soit  $N_2 \in \mathbb{N}$  tel que  $\forall n \geq N_2, \ell + \varepsilon \geq w_n$ .

Posons  $N = \max \{N_1 ; N_2\}$ .

On a :

$$\forall n \geq N, \ell - \varepsilon \leq u_n \leq w_n \leq \ell + \varepsilon.$$

D'où  $\lim_n v_n = \ell$ . ■

---

*Exemple 5.34*

On a vu  $\lim_n \frac{1}{n} = 0$ . On admet  $\lim_n -\frac{1}{n} = 0$ .

Montrons que  $\left(\frac{(-1)^n}{n}\right)_n$  est convergente et tend vers 0.

On a :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, -\frac{1}{n} \leq \frac{(-1)^n}{n} \leq \frac{1}{n} \quad \text{et} \quad \lim_n -\frac{1}{n} = \lim_n \frac{1}{n} = 0.$$

Donc selon le théorème des gendarmes,  $\lim_n \frac{(-1)^n}{n} = 0$ .

---

**Corollaire 5.35**

Soient  $(u_n)_n, (v_n)_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ . Soit  $\ell \in \mathbb{R}$ .

$$\text{On suppose } \begin{cases} \lim_n v_n = 0 \\ \forall n \in \mathbb{N}, |u_n - \ell| \leq v_n \end{cases}$$

Alors  $(u_n)_n$  est convergente et  $\lim_n u_n = \ell$ .

---

**Démonstration 5.36**

On a  $\forall n \in \mathbb{N}, -v_n \leq u_n - \ell \leq v_n$ .

Donc  $\forall n \in \mathbb{N}, \ell - v_n \leq u_n \leq \ell + v_n$ .

Or  $\lim_n (\ell - v_n) = \lim_n (\ell + v_n) = \ell$ .

Donc  $\lim_n u_n = \ell$  d'après le théorème des gendarmes. ■

---

**Notation 5.37**

Soit  $(u_n)_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ . Soit  $\ell \in \mathbb{R}$ .

La notation  $\lim_n u_n = \ell^+$  signifie que  $(u_n)_n$  converge vers  $\ell$  par valeurs supérieures, c'est-à-dire :

$$\begin{cases} \lim_n u_n = \ell \\ \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, \ell < u_n \end{cases}$$

De même, la notation  $\lim_n u_n = \ell^-$  signifie que  $(u_n)_n$  converge vers  $\ell$  par valeurs inférieures, c'est-à-dire :

$$\begin{cases} \lim_n u_n = \ell \\ \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, \ell > u_n \end{cases}$$

### 5.2.3 Opérations sur les limites

---

**Proposition 5.38**

Soient  $(u_n)_n, (v_n)_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ . Soient  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ . Soient  $\ell, \ell' \in \mathbb{R}$ .

On suppose  $\lim_n u_n = \ell$  et  $\lim_n v_n = \ell'$ .

On a alors :

$$(1) \lim_n (u_n + v_n) = \ell + \ell'$$

$$(2) \lim_n (\lambda u_n + \mu v_n) = \lambda \ell + \mu \ell'$$

$$(3) \lim_n u_n v_n = \ell \ell'$$

---

*Démonstration 5.39 (1)*

Montrons que  $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |u_n + v_n - \ell - \ell'| \leq \varepsilon$ .

Soit  $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$ .

Soit  $N_1 \in \mathbb{N}$  tel que  $\forall n \geq N_1, |u_n - \ell| \leq \frac{\varepsilon}{2}$ .

Soit  $N_2 \in \mathbb{N}$  tel que  $\forall n \geq N_2, |v_n - \ell'| \leq \frac{\varepsilon}{2}$ .

On pose  $N = \max \{N_1 ; N_2\}$ .

On a :

$$\begin{aligned} \forall n \geq N, |u_n + v_n - \ell - \ell'| &\leq |u_n - \ell| + |v_n - \ell'| \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} \\ &= \varepsilon. \end{aligned}$$

■

---

*Démonstration 5.40 (2)*

Montrons que  $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |\lambda u_n + \mu v_n - \lambda \ell - \mu \ell'| \leq \varepsilon$ .

Soit  $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$ .

Soit  $N_1 \in \mathbb{N}$  tel que  $\forall n \geq N_1, |u_n - \ell| \leq \frac{\varepsilon}{2(|\lambda| + 1)}$ .

Soit  $N_2 \in \mathbb{N}$  tel que  $\forall n \geq N_2, |v_n - \ell'| \leq \frac{\varepsilon}{2(|\mu| + 1)}$ .

On pose  $N = \max \{N_1 ; N_2\}$ .

On a :

$$\begin{aligned} \forall n \geq N, |\lambda u_n + \mu v_n - \lambda \ell - \mu \ell'| &= |\lambda (u_n - \ell) + \mu (v_n - \ell')| \\ &\leq |\lambda| |u_n - \ell| + |\mu| |v_n - \ell'| \\ &\leq |\lambda| \frac{\varepsilon}{2(|\lambda| + 1)} + |\mu| \frac{\varepsilon}{2(|\mu| + 1)} \\ &= \frac{\varepsilon}{2} \left( \frac{|\lambda|}{|\lambda| + 1} + \frac{|\mu|}{|\mu| + 1} \right) \\ &\leq \varepsilon. \end{aligned}$$

■

---

*Démonstration 5.41 (3)*

Montrons que  $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |u_n v_n - \ell \ell'| \leq \varepsilon$ .

Soit  $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$ .

On remarque :

$$\begin{aligned} \forall n \in \mathbb{N}, |u_n v_n - \ell \ell'| &= |u_n v_n - u_n \ell' + u_n \ell' - \ell \ell'| \\ &\leq |u_n v_n - u_n \ell'| + |u_n \ell' - \ell \ell'| \\ &= |u_n| |v_n - \ell'| + |u_n - \ell| |\ell'|. \end{aligned}$$

Comme  $(u_n)_n$  est convergente, elle est bornée. Soit  $M \in \mathbb{R}_+^*$  tel que  $\forall n \in \mathbb{N}, |u_n| \leq M$ .

Soit  $N_1 \in \mathbb{N}$  tel que  $\forall n \geq N_1, |u_n - \ell| \leq \frac{\varepsilon}{2(|\ell'| + 1)}$ .

Soit  $N_2 \in \mathbb{N}$  tel que  $\forall n \geq N_2, |v_n - \ell'| \leq \frac{\varepsilon}{2M}$ .

On pose  $N = \max \{N_1 ; N_2\}$ .

On a :

$$\begin{aligned} \forall n \geq N, |u_n v_n - \ell \ell'| &\leq |u_n| |v_n - \ell'| + |u_n - \ell| |\ell'| \\ &\leq M \frac{\varepsilon}{2M} + \frac{\varepsilon}{2(|\ell'| + 1)} |\ell'| \\ &\leq \varepsilon. \end{aligned}$$

■

---

**Proposition 5.42**

Soient  $(u_n)_n, (v_n)_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ .

On suppose  $\lim_n u_n = 0$  et  $(v_n)_n$  bornée.

Alors  $\lim_n u_n v_n = 0$ .

---

*Démonstration 5.43*

Montrons que  $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |u_n v_n| \leq \varepsilon$ .

Soit  $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$ .

Soit  $M \in \mathbb{R}_+^*$  tel que  $\forall n \in \mathbb{N}, |v_n| \leq M$ .

Soit  $N \in \mathbb{N}$  tel que  $\forall n \geq N, |u_n| \leq \frac{\varepsilon}{M}$ .

On a  $\forall n \geq N, |u_n v_n| \leq \frac{\varepsilon}{M} M = \varepsilon$ .

Donc  $N$  convient.

Donc  $\lim_n u_n v_n = 0$ .

■

---

**Proposition 5.44**

Soit  $(u_n)_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ .

On suppose que  $\lim_n u_n = \ell \in \mathbb{R}^*$ .

Alors  $\left(\frac{1}{u_n}\right)_n$  est « bien définie à partir d'un certain rang ».

C'est-à-dire :  $\exists N_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq N_0, u_n \neq 0$ .

De plus,  $\lim_n \frac{1}{u_n} = \frac{1}{\ell}$ .

---

**Démonstration 5.45**

Supposons  $\ell > 0$ .

Comme 0 minore strictement  $\lim_n u_n$ , 0 minore strictement  $(u_n)_n$  à partir d'un certain rang  $N_0 \in \mathbb{N}$  :  $\forall n \geq N_0, 0 < u_n$ .

Montrons que  $\left(\frac{1}{u_n}\right)_{n \geq N_0}$  converge vers  $\frac{1}{\ell}$ .

Soit  $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$ .

On a  $\forall n \in \mathbb{N}, \left| \frac{1}{u_n} - \frac{1}{\ell} \right| = \frac{|\ell - u_n|}{u_n \ell} = \frac{1}{|\ell|} \frac{1}{|u_n|} |\ell - u_n|$ .

On a  $\frac{\ell}{2} < \lim_n u_n$ .

Donc il existe  $N_1 \in \mathbb{N}$  tel que  $\forall n \geq N_1, \frac{\ell}{2} < u_n$ .

Soit  $N_2 \in \mathbb{N}$  tel que  $\forall n \geq N_2, |u_n - \ell| \leq \frac{\varepsilon \ell^2}{2}$ .

On pose  $N = \max \{N_1 ; N_2\}$ .

On a  $\forall n \geq N, \left| \frac{1}{u_n} - \frac{1}{\ell} \right| \leq \frac{1}{\ell} \frac{2}{\ell} \frac{\varepsilon \ell^2}{2} = \varepsilon$ .

Donc  $\lim_n \frac{1}{u_n} = \frac{1}{\ell}$ .

De même si  $\ell < 0$ . ■

---

**Corollaire 5.46**

Soient deux suites convergentes  $(u_n)_n, (v_n)_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  de limites respectives  $\ell, \ell' \in \mathbb{R}$ .

Si  $\ell' \neq 0$  alors  $\lim_n \frac{u_n}{v_n} = \frac{\ell}{\ell'}$ .



---

*Démonstration 5.47*

On a  $\lim_n v_n = \ell' \neq 0$  donc  $\lim_n \frac{1}{v_n} = \frac{1}{\ell'}$ .

Ainsi, on a  $\lim_n \frac{u_n}{v_n} = \frac{\ell}{\ell'}$  par produit. ■

## 5.3 Limites infinies

---

### Définition 5.48

Soit  $(u_n)_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ .

On dit que  $(u_n)_n$  tend (ou diverge) vers  $+\infty$  si on a

$$\forall \alpha \in \mathbb{R}, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_n \geq \alpha.$$

On note alors  $\lim_n u_n = +\infty$  et on dit que  $+\infty$  est la limite de  $(u_n)_n$ .

De même, on dit que  $(u_n)_n$  diverge (ou tend) vers  $-\infty$  si on a

$$\forall \alpha \in \mathbb{R}, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_n \leq \alpha.$$

---

### Remarque 5.49

Une suite convergente est une suite admettant une limite finie  $\ell \in \mathbb{R}$ .

Une suite divergente est une suite admettant une limite infinie  $\ell \in \{-\infty ; +\infty\}$  ou n'admettant pas de limite.

---

### Exemple 5.50

On a les limites suivantes :

- $\lim_n n = +\infty$
- $\lim_n n! = +\infty$
- $\lim_n e^n = +\infty$
- $\lim_n \ln n = +\infty$

---

*Démonstration 5.51*

Montrons que  $\lim_n \ln n = +\infty$ , c'est-à-dire

$$\forall \alpha \in \mathbb{R}, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, \ln n \geq \alpha.$$

Soit  $\alpha \in \mathbb{R}$ .

On a

$$\begin{aligned} \forall n \in \mathbb{N}^*, \ln n \geq \alpha &\iff n \geq e^\alpha \\ &\iff n \geq \lfloor e^\alpha \rfloor + 1 \end{aligned}$$

Donc l'entier  $N = \lfloor e^\alpha \rfloor + 1$  convient. ■

---

**Proposition 5.52**

*Toute suite qui tend vers  $+\infty$  est minorée.*

*Toute suite qui tend vers  $-\infty$  est majorée.*

---

*Démonstration 5.53*

Soit  $(u_n)_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  une suite de limite  $+\infty$ .

Il existe  $N \in \mathbb{N}$  tel que  $\forall n \geq N, 0 \leq u_n$ .

Posons  $m = \min \{u_0 ; \dots ; u_{N-1} ; 0\}$ .

On a  $\forall n \in \mathbb{N}, m \leq u_n$ .

Donc  $(u_n)_n$  est minorée.

Idem si  $\lim_n u_n = -\infty$ . ■

---

**Proposition 5.54**

Soient  $(u_n)_n, (v_n)_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ .

$$Si \begin{cases} \lim_n u_n = +\infty \\ (v_n)_n \text{ minorée} \end{cases} \text{ alors } \lim_n (u_n + v_n) = +\infty.$$

$$Si \begin{cases} \lim_n u_n = -\infty \\ (v_n)_n \text{ majorée} \end{cases} \text{ alors } \lim_n (u_n + v_n) = -\infty.$$

---

*Démonstration 5.55*

Supposons  $\lim_n u_n = +\infty$  et  $(v_n)_n$  minorée.

Soit  $m \in \mathbb{R}$  un minorant de  $(v_n)_n : \forall n \in \mathbb{N}, m \leq v_n$ .

Montrons que  $\lim_n (u_n + v_n) = +\infty$ , c'est-à-dire

$$\forall \alpha \in \mathbb{R}, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, \alpha \leq u_n + v_n.$$

Soit  $\alpha \in \mathbb{R}$ .

Soit  $N \in \mathbb{N}$  tel que  $\forall n \geq N, u_n \geq \alpha - v_n$ .

On a  $\forall n \geq N, u_n + v_n \geq \alpha - m + m = \alpha$ .

Donc  $N$  convient.

Donc  $\lim_n (u_n + v_n) = +\infty$ .

Idem pour l'autre implication. ■

## 5.4 Suites extraites

---

**Définition 5.56**

Soit  $(u_n)_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ .

On appelle suite extraite de  $(u_n)_n$  toute suite de la forme  $(u_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$  où  $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  strictement croissante.

---

*Remarque 5.57*

Soit  $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  strictement croissante.

On a  $\forall n \in \mathbb{N}, \varphi(n) \geq n$ .

---

*Démonstration 5.58*

Par récurrence sur  $n \in \mathbb{N}$  :

On a  $\varphi(0) \in \mathbb{N}$  donc  $\varphi(0) \geq 0$ .

Soit  $n \in \mathbb{N}$  tel que  $\varphi(n) \geq n$ .

On a  $\varphi(n+1) > \varphi(n)$  car  $\varphi$  strictement croissante.

Donc  $\varphi(n+1) \geq \varphi(n) + 1 \geq n + 1$ .

Ainsi, on a  $\forall n \in \mathbb{N}, \varphi(n) \geq n$ . ■

---

*Exemple 5.59*

Prenons  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n = (-1)^n$ .

Si  $\varphi : n \mapsto 2n$  alors on obtient la suite extraite  $(u_{2n})_n = \left((-1)^{2n}\right)_n = (1)_n$ .

Si  $\varphi : n \mapsto 2n+1$  alors on obtient la suite extraite  $(u_{2n+1})_n = \left((-1)^{2n+1}\right)_n = (-1)_n$ .

Prenons maintenant  $\forall n \in \mathbb{N}^*$ ,  $u_n = \frac{1}{n}$ .

Si  $\varphi : n \mapsto 2^n$  alors  $(u_{\varphi(n)})_{n \geq 1} = \left(\frac{1}{2^n}\right)_{n \geq 1}$ .

Si  $\varphi : n \mapsto n^2$  alors  $(u_{\varphi(n)})_{n \geq 1} = \left(\frac{1}{n^2}\right)_{n \geq 1}$ .

---

**Théorème 5.60**

Soient  $(u_n)_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  et  $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$ .

On suppose  $\lim_n u_n = \ell$ .

Alors toute suite extraite de  $(u_n)_n$  tend vers  $\ell$ .

---

*Démonstration 5.61*

Soit  $\varphi : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$  strictement croissante.

Montrons que  $\lim_n u_{\varphi(n)} = \ell$ .

Supposons  $\ell \in \mathbb{R}$ .

Montrons que

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |u_{\varphi(n)} - \ell| \leq \varepsilon.$$

Soit  $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$ .

Soit  $N \in \mathbb{N}$  tel que  $\forall k \geq N, |u_k - \ell| \leq \varepsilon$ .

On remarque  $\forall n \geq N, |u_{\varphi(n)} - \ell| \leq \varepsilon$  car  $\varphi(n) \geq n \geq N$ .

Donc  $N$  convient.

Idem si  $\ell = \pm\infty$ . ■

---

*Exemple 5.62 (Exemple d'application)*

Montrons que  $((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$  n'admet pas de limite.

Par l'absurde, supposons que la suite admet une limite  $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$ .

Alors les suites extraites  $((-1)^{2n})_{n \in \mathbb{N}}$  et  $((-1)^{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$  tendent aussi vers  $\ell$ .

Or, les limites respectives de ces suites sont 1 et -1.

Donc par unicité de la limite,  $\ell = 1 = -1$  : contradiction.

Donc  $((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$  n'admet pas de limite.

## 5.5 Opérations sur les limites

---

### **Théorème 5.63**

Soient  $(u_n)_n, (v_n)_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ . Soient  $\ell, \ell' \in \overline{\mathbb{R}}$ .

On suppose que  $\lim_n u_n = \ell$  et  $\lim_n v_n = \ell'$ .

(1) Si  $(\ell, \ell') \notin \{(+\infty, -\infty); (-\infty, +\infty)\}$  alors

$$\lim_n (u_n + v_n) = \ell + \ell'.$$

(2) Si  $(\ell, \ell') \notin \{(0, +\infty); (0, -\infty); (+\infty, 0); (-\infty, 0)\}$  alors

$$\lim_n u_n v_n = \ell \ell'.$$

(3) Si  $\ell \neq 0$  alors

$$\lim_n \frac{1}{u_n} = \begin{cases} 0 & \text{si } \ell \in \{-\infty; +\infty\} \\ \frac{1}{\ell} & \text{sinon} \end{cases}$$

(4) Si  $\lim_n u_n = 0^+$ , respectivement  $0^-$ , alors

$$\left\{ \begin{array}{l} \left( \frac{1}{u_n} \right)_n \text{ est définie à partir d'un certain rang} \\ \lim_n \frac{1}{u_n} = +\infty, \text{ respectivement } -\infty \end{array} \right.$$

---

*Démonstration 5.64 (1)*

Si  $\ell, \ell' \in \mathbb{R}$ , voir la Démonstration 5.39.

Si  $\ell = +\infty$  et  $\ell' \neq -\infty$  alors

$$\begin{cases} \lim_n u_n = +\infty \\ (v_n)_n \text{ minorée car } \begin{cases} (v_n)_n & \text{bornée si } \ell' \in \mathbb{R} \\ (v_n)_n & \text{minorée si } \ell' = +\infty \end{cases} \end{cases}$$

Donc  $\lim_n (u_n + v_n) = +\infty$ .

Idem si  $\ell' = +\infty$  et  $\ell \neq -\infty$ .

Idem si  $\ell = -\infty$  ou  $\ell' = -\infty$ . ■

---

*Démonstration 5.65 (2)*

Si  $\ell, \ell' \in \mathbb{R}$ , voir la Démonstration 5.41.

Si  $\ell = +\infty = \ell'$ , montrons que  $\lim_n u_n v_n = +\infty$ , c'est-à-dire

$$\forall \alpha \in \mathbb{R}_+, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_n v_n \geq \alpha.$$

Soit  $\alpha \in \mathbb{R}_+$ .

Soit  $N_1 \in \mathbb{N}$  tel que  $\forall n \geq N_1, u_n \geq \alpha$ .

Soit  $N_2 \in \mathbb{N}$  tel que  $\forall n \geq N_2, v_n \geq 1$ .

Posons  $N = \max \{N_1 ; N_2\}$ .

On a

$$\forall n \geq N, u_n v_n \geq \alpha$$

donc  $N$  convient.

Si  $\ell = +\infty$  et  $\ell' \in \mathbb{R}_+^*$ , on a  $\frac{\ell'}{2} < \lim_n v_n$ .

Donc il existe un rang  $N_1 \in \mathbb{N}$  tel que  $\forall n \geq N_1, \frac{\ell'}{2} < v_n$ .

Montrons que  $\lim_n u_n v_n = +\infty$ , c'est-à-dire

$$\forall \alpha \in \mathbb{R}_+, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_n v_n \geq \alpha.$$

Soit  $\alpha \in \mathbb{R}_+$ .

Soit  $N_2 \in \mathbb{N}$  tel que  $\forall n \geq N_2, u_n \geq \frac{2\alpha}{\ell'}$ .

On pose  $N = \max \{N_1 ; N_2\}$ .

On a  $\forall n \geq N, u_n v_n \geq \frac{2\alpha}{\ell'} \times \frac{\ell'}{2} = \alpha$ .

Donc  $\lim_n u_n v_n = +\infty = \ell \ell'$ .

Idem dans les autres cas. ■

---

*Démonstration 5.66 (3)*

Si  $\ell \in \mathbb{R}$ , voir la Démonstration 5.45.

Si  $\ell = +\infty$ , montrons que  $\lim_n \frac{1}{u_n} = 0$ .

La suite  $\left(\frac{1}{u_n}\right)_n$  est bien définie à partir d'un certain rang car on a

$$\exists N_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq N_0, u_n \geq 1 \neq 0.$$

Soit  $N_0 \in \mathbb{N}$  tel que  $\forall n \geq N_0, u_n \neq 0$ .

Montrons que

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists N \geq N_0, \forall n \geq N, \left| \frac{1}{u_n} \right| \leq \varepsilon.$$

Soit  $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$ .

Soit  $N_1 \geq N_0$  tel que  $\forall n \geq N_1, u_n \geq \frac{1}{\varepsilon}$ .

On a  $\forall n \geq N_1, \left| \frac{1}{u_n} \right| = \frac{1}{u_n} \leq \varepsilon$ .

Idem si  $\ell = -\infty$  ■

---

*Démonstration 5.67 (4)*

Si  $\lim_n u_n = 0^+$  alors il existe un rang  $N_0 \in \mathbb{N}$  tel que  $\forall n \geq N_0, u_n > 0$ .

En particulier,  $\left(\frac{1}{u_n}\right)_{n \geq N_0}$  est bien définie.

Montrons que  $\left(\frac{1}{u_n}\right)_{n \geq N_0}$  tend vers  $+\infty$ , c'est-à-dire

$$\forall \alpha \in \mathbb{R}_+^*, \exists N \geq N_0, \forall n \geq N, \frac{1}{u_n} \geq \alpha.$$

Soit  $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$ .

Soit  $N \geq N_0$  tel que  $\forall n \geq N, u_n \leq \frac{1}{\alpha}$ .

On a donc  $\forall n \geq N, 0 < u_n \leq \frac{1}{\alpha}$ .

D'où  $\forall n \geq N, \alpha \leq \frac{1}{u_n}$  car  $t \mapsto \frac{1}{t}$  est décroissante sur  $\mathbb{R}_+^*$ .

Donc  $\lim_n \frac{1}{u_n} = +\infty$ .

Idem si  $\lim_n u_n = 0^-$ . ■

---

**Théorème 5.68 (Théorème des gendarmes dans le cas d'une limite infinie)**

Soient  $(u_n)_n, (v_n)_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ .

Si  $\begin{cases} \lim_n u_n = +\infty \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq v_n \end{cases}$  alors  $\lim_n v_n = +\infty$ .

Si  $\begin{cases} \lim_n v_n = -\infty \\ \forall n \in \mathbb{N}, v_n \geq u_n \end{cases}$  alors  $\lim_n u_n = -\infty$ .

---

*Démonstration 5.69*

Supposons  $\lim_n u_n = +\infty$  et  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq v_n$ .

On a  $\forall \alpha \in \mathbb{R}, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, \alpha \leq u_n$ .

Donc  $\forall \alpha \in \mathbb{R}, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, \alpha \leq v_n$ .

Idem si  $\lim_n v_n = -\infty$  et  $\forall n \in \mathbb{N}, v_n \geq u_n$ . ■

---

**Théorème 5.70 (Passage à la limite dans les inégalités larges)**

Soient  $(u_n)_n, (v_n)_n$  deux suites convergentes.

On suppose  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq v_n$ .

Alors  $\lim_n u_n \leq \lim_n v_n$ .

---

*Démonstration 5.71*

On sait que  $(v_n - u_n)_n$  est convergente et de limite  $\lim_n v_n - \lim_n u_n$ .

Donc on a  $\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq v_n - u_n$ .

Donc  $0 \geq \lim_n v_n - \lim_n u_n$  d'après la Proposition 5.29.

Donc  $\lim_n u_n \leq \lim_n v_n$ . ■



## 5.6 Suites monotones

---

### **Théorème 5.72 (Théorème de la limite monotone)**

*Toute suite monotone admet une limite.*

*Soit  $(u_n)_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  une suite monotone.*

*Si  $(u_n)_n$  est croissante et non-majorée alors  $\lim_n u_n = +\infty$ .*

*Si  $(u_n)_n$  est croissante et majorée alors  $\lim_n u_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} u_n$ .*

*Si  $(u_n)_n$  est décroissante et non-minorée alors  $\lim_n u_n = -\infty$ .*

*Si  $(u_n)_n$  est décroissante et minorée alors  $\lim_n u_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} u_n$ .*

---

#### *Démonstration 5.73*

Supposons  $(u_n)_n$  croissante et non-majorée.

Montrons que  $\lim_n u_n = +\infty$ , c'est-à-dire

$$\forall \alpha \in \mathbb{R}, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_n \geq \alpha.$$

Soit  $\alpha \in \mathbb{R}$ .

Comme  $(u_n)_n$  n'est pas majorée, il existe  $N \in \mathbb{N}$  tel que  $\alpha < u_N$ .

On a  $\forall n \geq N, u_n \geq u_N > \alpha$ .

Donc  $N$  convient et on a  $\lim_n u_n = +\infty$ .

Supposons maintenant  $(u_n)_n$  croissante et majorée.

Comme  $\{u_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  est une partie non-vide et majorée de  $\mathbb{R}$ , elle admet une borne supérieure  $S$ .

$$S \text{ vérifie } \begin{cases} \forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq S \\ \forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists N \in \mathbb{N}, S - \varepsilon \leq u_N \end{cases}$$

Montrons que  $\lim_n u_n = S$ , c'est-à-dire

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, S - \varepsilon \leq u_n \leq S + \varepsilon.$$

Soit  $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$ .

Soit  $N \in \mathbb{N}$  tel que  $S - \varepsilon \leq u_N$ .

On a  $\forall n \geq N, S - \varepsilon \leq u_n \leq S + \varepsilon$ .

Donc  $N$  convient et  $\lim_n u_n = S$ .

Idem pour les suites décroissantes. ■

---

**Théorème 5.74 (Théorème des suites adjacentes)**

Soient  $(a_n)_n, (b_n)_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  telles que  $(a_n)_n$  croissante,  $(b_n)_n$  décroissante et  $\lim_n (b_n - a_n) = 0$ .

Deux telles suites sont dites adjacentes.

Alors  $(a_n)_n$  et  $(b_n)_n$  sont convergentes et de même limite  $\ell$ .

On a alors  $\forall n \in \mathbb{N}, a_n \leq \ell \leq b_n$ .

---

*Démonstration 5.75*

La suite  $(b_n - a_n)_n$  est décroissante et convergente donc décroissante et minorée.

Elle converge donc vers sa borne inférieure.

Donc  $\inf_{n \in \mathbb{N}} (b_n - a_n) = 0$  donc  $\forall n \in \mathbb{N}, b_n - a_n \geq 0$  donc  $\forall n \in \mathbb{N}, a_n \leq b_n$ .

De plus, on a  $(a_n)_n$  croissante et  $(b_n)_n$  décroissante.

Donc  $\forall n \in \mathbb{N}, a_0 \leq a_n \leq b_n \leq b_0$ .

Ainsi,  $(a_n)_n$  est croissante et majorée donc convergente et  $(b_n)_n$  est décroissante et minorée donc convergente.

Enfin, on a  $0 = \lim_n (b_n - a_n) = \lim_n b_n - \lim_n a_n$ . ■

---

*Remarque 5.76*

Toute suite décroissante et convergente est minorée par sa limite.

De même, toute suite croissante et convergente est majorée par sa limite.

## 5.7 Retour sur les suites extraites

---

**Proposition 5.77**

Soit  $(u_n)_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ . Soit  $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$ .

On a

$$\lim_n u_n = \ell \iff \begin{cases} \lim_k u_{2k} = \ell \\ \lim_k u_{2k+1} = \ell \end{cases}$$

---

*Démonstration 5.78*

$\Rightarrow$  Déjà vue (Théorème 5.60).

$\Leftarrow$

Supposons  $\lim_k u_{2k} = \lim_k u_{2k+1} = \ell$ .

Supposons  $\ell \in \mathbb{R}$ .

Montrons que  $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |u_n - \ell| \leq \varepsilon$ .

Soit  $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$ .

Soit  $K_1 \in \mathbb{N}$  tel que  $\forall k \geq K_1, |u_{2k} - \ell| \leq \varepsilon$ .

Soit  $K_2 \in \mathbb{N}$  tel que  $\forall k \geq K_2, |u_{2k+1} - \ell| \leq \varepsilon$ .

Posons  $K = \max \{K_1 ; K_2\}$ .

On a  $\forall k \geq K, \begin{cases} |u_{2k} - \ell| \leq \varepsilon \\ |u_{2k+1} - \ell| \leq \varepsilon \end{cases}$

Donc  $\forall n \geq 2K + 1, |u_n - \ell| \leq \varepsilon$ .

En effet, si  $n$  est pair, il existe  $k \in \mathbb{N}$  tel que  $n = 2k$  et on a  $2k \geq 2K + 1$  donc  $k \geq K$ .

Si  $n$  est impair, il existe  $k \in \mathbb{N}$  tel que  $n = 2k + 1$  et on a  $2k + 1 \geq 2K + 1$  donc  $k \geq K$ .

L'entier  $N = 2K + 1$  convient et on a  $\lim_n u_n = \ell$ . ■

---

### **Théorème 5.79 (Théorème de Bolzano-Weierstrass)**

*De toute suite réelle bornée, on peut extraire une suite convergente.*

---

*Démonstration 5.80*

Soit  $(u_n)_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  une suite bornée.

Soit  $M \in \mathbb{R}_+$  tel que  $\forall n \in \mathbb{N}, |u_n| \leq M$ .

On a  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \in [-M ; M]$ .

S'il existe une infinité d'indices  $n \in \mathbb{N}$  tels que  $u_n \leq 0$ , on construit par récurrence la fonction  $\varphi_1 : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  :

$$\begin{cases} \varphi_1(0) = \min \{n \in \mathbb{N} \mid u_n \leq 0\} \\ \forall n \in \mathbb{N}^*, \varphi_1(n) = \min \{k \in \llbracket \varphi_1(n-1) + 1 ; +\infty \rrbracket \mid u_k \leq 0\} \quad (\text{partie non-vide de } \mathbb{N}) \end{cases}$$

On obtient ainsi une fonction  $\varphi_1$  strictement croissante telle que  $\forall n \in \mathbb{N}, u_{\varphi_1(n)} \leq 0$ .

Sinon, on définit de même une fonction  $\varphi_1 : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$  strictement croissante telle que  $\forall n \in \mathbb{N}, u_{\varphi_1(n)} \geq 0$ .

On pose  $\begin{cases} a_0 = -M \\ b_0 = M \end{cases}$

Puis, dans le premier cas  $\begin{cases} a_1 = -M \\ b_1 = 0 \end{cases}$  et dans le second cas  $\begin{cases} a_1 = 0 \\ b_1 = M \end{cases}$

Ainsi,  $\forall n \in \mathbb{N}, u_{\varphi_1(n)} \in [a_1 ; b_1]$ .

De même que précédemment :

Si  $\text{Card} \left\{ n \in \mathbb{N} \mid u_{\varphi_1(n)} \leq \frac{a_1 + b_1}{2} \right\} = +\infty$  alors on pose  $\begin{cases} a_2 = a_1 \\ b_2 = \frac{a_1 + b_1}{2} \end{cases}$

Sinon, on pose  $\begin{cases} a_2 = \frac{a_1 + b_1}{2} \\ b_2 = b_1 \end{cases}$

Dans les deux cas, on considère  $\varphi_2 : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$  strictement croissante telle que

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{\varphi_1 \circ \varphi_2(n)} \in [a_2 ; b_2] .$$

On continue le procédé et on définit ainsi  $(a_n)_n$  une suite croissante,  $(b_n)_n$  une suite décroissante et  $(\varphi_k)$  une suite de fonctions strictement croissantes, telles que

$$\begin{cases} \forall n \in \mathbb{N}, b_n - a_n = \frac{2M}{2^n} \\ \forall k \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, u_{\varphi_1 \circ \dots \circ \varphi_k(n)} \in [a_k ; b_k] \end{cases}$$

On pose enfin  $\forall n \in \mathbb{N}, \psi(n) = \varphi_1 \circ \dots \circ \varphi_n(n)$ , c'est-à-dire

$$\psi(0) = 0$$

$$\psi(1) = \varphi_1(1)$$

$$\psi(2) = \varphi_1 \circ \varphi_2(2)$$

$$\psi(3) = \varphi_1 \circ \varphi_2 \circ \varphi_3(3)$$

$$\vdots$$

Montrons que  $\psi$  est strictement croissante.

Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Montrons que  $\psi(n) < \psi(n+1)$ .

On a

$$\begin{aligned} \psi(n) &= \varphi_1 \circ \dots \circ \varphi_n(n) \\ &< \varphi_1 \circ \dots \circ \varphi_n(n+1) \\ &\leq \varphi_1 \circ \dots \circ \varphi_n(\varphi_{n+1}(n+1)) \quad \text{car } \varphi_{n+1}(n+1) \geq n+1 \\ &= \psi(n+1) \end{aligned}$$

Donc la suite  $(u_{\psi(n)})_n$  est une suite extraite de  $(u_n)_n$ .

Appliquons le théorème des suites adjacentes à  $(a_n)_n$  et  $(b_n)_n$  :

On a  $\begin{cases} (a_n)_n \text{ croissante} \\ (b_n)_n \text{ décroissante} \\ \lim_n (b_n - a_n) = 0 \end{cases}$  donc  $(a_n)_n$  et  $(b_n)_n$  sont convergentes de même limite.

Enfin, on a  $\forall n \in \mathbb{N}, a_n \leq u_{\psi(n)} \leq b_n$  donc selon le théorème des gendarmes,  $(u_{\psi(n)})_n$  est convergente. ■

*Exemple 5.81*

De  $((-1)^n)_n$  on peut extraire une suite convergente :  $((-1)^{2n})_n$ .

De  $(\sin n)_n$  on peut extraire une suite convergente.

## 5.8 Densité

### 5.8.1 Rappels

#### Définition 5.82

On appelle nombre rationnel tout réel de la forme  $\frac{a}{b}$  avec  $\begin{cases} a \in \mathbb{Z} \\ b \in \mathbb{N}^* \end{cases}$

L'ensemble des rationnels est noté :

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \right\}_{(a,b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*}$$

Tout nombre rationnel s'écrit de façon unique  $\frac{a}{b}$  (écriture irréductible) avec  $\begin{cases} a \in \mathbb{Z} \\ b \in \mathbb{N}^* \\ a \text{ et } b \text{ premiers entre eux} \end{cases}$

#### Définition 5.83

On appelle nombre décimal tout nombre réel de la forme  $\frac{a}{10^\alpha}$  où  $a \in \mathbb{Z}$  et  $\alpha \in \mathbb{N}$ .

*Remarque 5.84*

Soit  $x \in \mathbb{R}$ . On a  $x$  décimal  $\implies x$  rationnel.

---

*Exemple 5.85*

$\frac{1}{3}$  est rationnel non-décimal.

$\sqrt{2}, \pi, e, \dots \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ .

---

*Démonstration 5.86*

Par l'absurde, supposons  $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ .

Considérons l'écriture irréductible de  $\sqrt{2}$  :  $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$  avec  $a \in \mathbb{Z}$  et  $b \in \mathbb{N}^*$  premiers entre eux.

On a  $\sqrt{2}b = a$

donc  $2b^2 = a^2$

donc  $a^2$  pair

donc  $a$  pair

donc il existe  $k \in \mathbb{Z}$  tel que  $a = 2k$

donc on a  $2b^2 = (2k)^2$

donc  $b^2 = 2k^2$

donc  $b$  est pair donc 2 divise  $a$  et  $b$  : contradiction. ■

## 5.8.2 Densité

---

**Définition 5.87**

Soit  $A \subseteq \mathbb{R}$ .

On dit que  $A$  est dense dans  $\mathbb{R}$  si on a

$$\forall a, b \in \mathbb{R}, \quad a < b \implies ]a ; b[ \cap A \neq \emptyset.$$

---

*Exemple 5.88*

$\mathbb{R}$  est dense dans  $\mathbb{R}$ .

$\mathbb{R}^*$  est dense dans  $\mathbb{R}$ .

---

**Proposition 5.89**

(1) L'ensemble des décimaux est dense dans  $\mathbb{R}$ .

(2)  $\mathbb{Q}$  est dense dans  $\mathbb{R}$ .

(3)  $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$  est dense dans  $\mathbb{R}$ .

---

*Démonstration 5.90 (1)*

Notons  $\mathbb{D}$  l'ensemble des décimaux.

Soient  $a, b \in \mathbb{R}$  tels que  $a < b$ .

On a  $b - a > 0$ .

Donc il existe  $\alpha \in \mathbb{N}$  tel que  $10^\alpha (b - a) \geq 1$  (il suffit de prendre  $\alpha = \left\lfloor \frac{-\ln(b-a)}{\ln 10} \right\rfloor + 1$ ).

Montrons que  $10^\alpha a \leq \lfloor 10^\alpha b \rfloor \leq 10^\alpha b$ .

On a  $\lfloor 10^\alpha b \rfloor \geq 10^\alpha b - 1 \geq 10^\alpha a$ , d'où l'encadrement.

Ainsi,  $\frac{\lfloor 10^\alpha b \rfloor}{10^\alpha} \in [a ; b]$ .

Donc  $\mathbb{D} \cap [a ; b] \neq \emptyset$ .

Montrons que  $\mathbb{D} \cap ]a ; b[ \neq \emptyset$ .

On pose  $a' = \frac{2}{3}a + \frac{1}{3}b = a + \frac{1}{3}(b-a)$  et  $b' = \frac{1}{3}a + \frac{2}{3}b = a + \frac{2}{3}(b-a)$ .

On a  $b' - a' = \frac{1}{3}(b-a) > 0$ .

Donc d'après ce qui précède,  $\mathbb{D} \cap ]a' ; b'[ \neq \emptyset$ .

Donc  $\mathbb{D} \cap ]a ; b[ \neq \emptyset$ . ■

---

*Démonstration 5.91 (2)*

Comme  $\mathbb{D} \subseteq \mathbb{Q}$ , on en déduit que  $\mathbb{Q}$  est dense aussi. ■

---

*Démonstration 5.92 (3)*

Montrons que  $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$  est dense dans  $\mathbb{R}$ .

Soient  $a, b \in \mathbb{R}$  tels que  $a < b$ .

On a  $\frac{a}{\sqrt{2}} < \frac{b}{\sqrt{2}}$ .

Comme  $\mathbb{Q}$  est dense dans  $\mathbb{R}$ , il existe  $q \in \mathbb{Q} \cap \left] \frac{a}{\sqrt{2}} ; \frac{b}{\sqrt{2}} \right[$ .

On a  $\frac{a}{\sqrt{2}} < q < \frac{b}{\sqrt{2}}$ .

Donc  $a < \sqrt{2}q < b$ .

Si  $q \neq 0$  alors  $\sqrt{2}q \in \mathbb{R}$ .

En effet, par l'absurde, soient  $a_1, a_2 \in \mathbb{Z}$  et  $b_1, b_2 \in \mathbb{N}^*$  tels que  $q = \frac{a_1}{b_1}$  et  $\sqrt{2}q = \frac{a_2}{b_2}$ . On a  $\frac{a_1}{b_1}\sqrt{2} = \frac{a_2}{b_2}$ .

Comme  $q \neq 0$ , on a  $a_1 \neq 0$  donc  $\sqrt{2} = \frac{a_2 b_1}{a_1 b_2} \in \mathbb{Q}$  : contradiction.

Donc  $\sqrt{2}q \in (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \cap ]a ; b[$ .

Finalement, si  $0 \notin ]a ; b[$  alors  $(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \cap ]a ; b[ \neq \emptyset$ .

Sinon, on a  $a < 0 < b$  donc  $]0 ; b[$  contient un irrationnel donc  $]a ; b[$  aussi. ■

### 5.8.3 Caractérisation séquentielle de la densité

#### Proposition 5.93

Soit  $A \subseteq \mathbb{R}$ .

$A$  est dense dans  $\mathbb{R}$  si et seulement si tout réel est limite d'une suite d'éléments de  $A$  :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \exists (a_n)_n \in A^{\mathbb{N}}, \lim_n a_n = x.$$

*Démonstration 5.94*



Supposons que tout réel est limite d'une suite d'éléments de  $A$ .

Montrons que  $A$  est dense.

Soient  $a, b \in \mathbb{R}$  tels que  $a < b$ . Montrons que  $A \cap ]a ; b[ \neq \emptyset$ .

Soit  $(a_n)_n \in A^{\mathbb{N}}$  une suite qui tend vers  $\frac{a+b}{2}$ .

Posons  $\varepsilon = \frac{b-a}{2}$ .

Soit  $N \in \mathbb{N}$  tel que  $\forall n \geq N, \left| a_n - \frac{a+b}{2} \right| < \varepsilon$ .

On remarque  $\begin{cases} a_N \in A \\ \left| a_N - \frac{a+b}{2} \right| < \varepsilon \end{cases}$



Donc  $a = \frac{a+b}{2} - \varepsilon < a_N < \frac{a+b}{2} + \varepsilon = b$ .

Ainsi,  $a_N \in A \cap ]a ; b[$ .

$\Rightarrow$

Supposons  $A$  dense dans  $\mathbb{R}$ .

Soit  $x \in \mathbb{R}$ .

Pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , on a

$$A \cap \left] x - \frac{1}{n} ; x + \frac{1}{n} \right[ \neq \emptyset.$$

Donc il existe un élément  $a_n \in A \cap \left] x - \frac{1}{n} ; x + \frac{1}{n} \right[$ .

On définit ainsi une suite  $(a_n)_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}^*}$  telle que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \begin{cases} a_n \in A \\ x - \frac{1}{n} < a_n < x + \frac{1}{n} \end{cases}$$

De plus, on a  $\lim_n \left( x - \frac{1}{n} \right) = \lim_n \left( x + \frac{1}{n} \right) = x$ .

Donc d'après le théorème des gendarmes,  $\lim_n a_n = x$ .

Enfin,  $(a_n)_n \in A^{\mathbb{N}^*}$ . ■

## 5.9 Remarque

En général, ne jamais confondre  $<$  et  $\leq$ .

Notamment :

- si deux suites convergentes vérifient  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq v_n$  alors  $\lim_n u_n \leq \lim_n v_n$  ;
- tout majorant **strict** de la limite d'une suite convergente majore **strictement** la suite à partir d'un certain rang.

Parfois, on a le choix entre  $<$  et  $\leq$ . Par exemple :

- $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |u_n - \ell| \leq \varepsilon$  ;
- $\forall \alpha \in \mathbb{R}, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_n \geq \alpha$ .

## 5.10 Suites de nombres complexes

On rappelle que les suites de nombres complexes (ou suites complexes) sont les familles de complexes indicées par  $\mathbb{N}$  (voire par un intervalle de la forme  $\llbracket n_0 ; +\infty \rrbracket$  où  $n_0 \in \mathbb{Z}$ ).

L'ensemble des suites complexes est noté  $\mathbb{C}^{\mathbb{N}}$  (ou  $\mathbb{C}^{\llbracket n_0 ; +\infty \rrbracket}$ ).

---

### Définition 5.95 (Opérations algébriques sur les suites)

De manière analogue au cas réel, si  $(u_n)_n, (v_n)_n$  sont deux suites complexes et  $\lambda, \mu$  deux nombres complexes, on définit :

- la somme de  $(u_n)_n$  et  $(v_n)_n$  :

$$(u_n)_n + (v_n)_n = (u_n + v_n)_n$$

- le produit de  $(u_n)_n$  et  $(v_n)_n$  :

$$(u_n)_n \times (v_n)_n = (u_n v_n)_n$$

- la combinaison linéaire de  $(u_n)_n$  et  $(v_n)_n$  :

$$\lambda (u_n)_n + \mu (v_n)_n = (\lambda u_n + \mu v_n)_n$$

Dans le cas complexe, on définit de plus :

- la partie réelle de  $(u_n)_n$  :

$$\operatorname{Re}((u_n)_n) = (\operatorname{Re}(u_n))_n$$

- la partie imaginaire de  $(u_n)_n$  :

$$\operatorname{Im}((u_n)_n) = (\operatorname{Im}(u_n))_n$$

- la suite des modules :

$$(|u_n|)_n$$

- la suite conjuguée :

$$(\overline{u_n})_n$$

---

**Définition 5.96 (Suite bornée)**

Soit  $(u_n)_n$  une suite complexe. On dit que  $(u_n)_n$  est bornée si on a :

$$\exists M \in \mathbb{R}_+, \forall n \in \mathbb{N}, |u_n| \leq M$$

c'est-à-dire si la suite  $(|u_n|)_n$  est majorée.

---

*Remarque 5.97*

La notion de « suite bornée » pour les suites complexes généralise celle déjà vue pour les suites réelles. En revanche, on ne généralise pas les notions de suite majorée, minorée, croissante, décroissante ou monotone (car  $\mathbb{C}$  n'est pas ordonné « canoniquement »).

---

**Définition/Proposition 5.98 (Limite d'une suite complexe)**

Soient  $(u_n)_n \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$  et  $\ell \in \mathbb{C}$ .

On dit que  $(u_n)_n$  converge (ou tend) vers  $\ell$  si l'on a :

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |u_n - \ell| \leq \varepsilon.$$

On dit alors que  $\ell$  est la limite de  $(u_n)_n$ . Elle est unique et notée

$$\ell = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_n u_n.$$

On dit alors aussi que  $(u_n)_n$  est convergente. Sinon on dit qu'elle est divergente.

---

*Remarque 5.99*

(1) On a

$$\text{constante} \implies \text{stationnaire} \implies \text{convergente}.$$

(2) Si  $(u_n)_n$  et  $(v_n)_n$  sont deux suites complexes convergentes qui coïncident à partir d'un certain rang, c'est-à-dire si l'on a :

$$\exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_n = v_n$$

alors  $(u_n)_n$  est convergente si, et seulement si,  $(v_n)_n$  est convergente, et dans ce cas leurs limites sont égales.

---

**Proposition 5.100 (Une façon de se ramener au cas réel)**

Soient  $(u_n)_n \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$  et  $\ell \in \mathbb{C}$ .

Alors la suite complexe  $(u_n)_n$  converge vers  $\ell$  si, et seulement si, la suite réelle  $(|u_n - \ell|)_n$  converge vers 0.

---

*Démonstration 5.101*

Clair. ■

---

**Théorème 5.102 (Une autre façon de se ramener au cas réel)**

Soient  $(u_n)_n \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$  et  $\ell \in \mathbb{C}$ .

Alors la suite complexe  $(u_n)_n$  converge vers  $\ell$  si, et seulement si,

$$\begin{cases} \text{la suite réelle } (\operatorname{Re} u_n)_n \text{ converge vers } \operatorname{Re} \ell \\ \text{la suite réelle } (\operatorname{Im} u_n)_n \text{ converge vers } \operatorname{Im} \ell \end{cases}$$

---

*Démonstration 5.103*

On pose  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $\begin{cases} a_n = \operatorname{Re} u_n \\ b_n = \operatorname{Im} u_n \end{cases}$  et  $\ell_1 = \operatorname{Re} \ell$  et  $\ell_2 = \operatorname{Im} \ell$ .

$\Rightarrow$

Supposons  $\lim_n u_n = \ell$ .

On a  $\lim_n |u_n - \ell| = 0$ .

Or  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $\begin{cases} |a_n - \ell_1| \leq |u_n - \ell| \\ |b_n - \ell_2| \leq |u_n - \ell| \end{cases}$  car  $|u_n - \ell| = \sqrt{(a_n - \ell_1)^2 + (b_n - \ell_2)^2}$ .

Donc selon le théorème des gendarmes,  $\lim_n a_n = \ell_1$  et  $\lim_n b_n = \ell_2$ .

$\Leftarrow$

Supposons  $\lim_n a_n = \ell_1$  et  $\lim_n b_n = \ell_2$ .

On a  $\lim_n |a_n - \ell_1| = \lim_n |b_n - \ell_2| = 0$ .

Donc  $\lim_n \sqrt{(a_n - \ell_1)^2 + (b_n - \ell_2)^2} = 0$ .

Donc  $\lim_n |u_n - \ell| = 0$ .

Donc  $\lim_n u_n = \ell$ . ■

---

**Proposition 5.104**

*Toute suite convergente est bornée.*

---

*Démonstration 5.105*

Voir le cas des suites réelles convergentes : Démonstration 5.22. ■

---

**Proposition 5.106**

*Soient  $(u_n)_n$  et  $(v_n)_n$  deux suites complexes convergentes et  $\lambda$  et  $\mu$  deux nombres complexes.*

$$\text{On pose } \begin{cases} \ell = \lim_n u_n \\ \ell' = \lim_n v_n \end{cases}$$

*Alors :*

$$(1) \lim_n (u_n + v_n) = \ell + \ell'$$

$$(2) \lim_n u_n v_n = \ell \ell'$$

$$(3) \lim_n (\lambda u_n + \mu v_n) = \lambda \ell + \mu \ell'$$

$$(4) \lim_n \operatorname{Re} u_n = \operatorname{Re} \ell$$

$$(5) \lim_n \operatorname{Im} u_n = \operatorname{Im} \ell$$

$$(6) \lim_n |u_n| = |\ell|$$

$$(7) \lim_n \overline{u_n} = \overline{\ell}$$

$$(8) \text{ Si } \ell \neq 0 \text{ alors } (u_n)_n \text{ est à termes non-nuls à partir d'un certain rang et on a } \lim_n \frac{1}{u_n} = \frac{1}{\ell}.$$

---

*Démonstration 5.107*

★★ EXERCICE ★★ ■

---

**Théorème 5.108 (Théorème de Bolzano-Weierstrass)**

*De toute suite complexe bornée on peut extraire une suite convergente.*

---

*Démonstration 5.109*

Soit  $(u_n)_n \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$  une suite bornée.

On pose  $\forall n \in \mathbb{N}, \begin{cases} a_n = \operatorname{Re} u_n \\ b_n = \operatorname{Im} u_n \end{cases}$

Comme  $(u_n)_n$  est bornée, il existe  $M \in \mathbb{R}_+$  tel que  $\forall n \in \mathbb{N}, |u_n| \leq M$ .

On a  $\forall n \in \mathbb{N}, |a_n| = \sqrt{a_n^2} \leq \sqrt{a_n^2 + b_n^2} = |u_n| \leq M$ .

Donc  $(a_n)_n$  est bornée.

De même, on a  $\forall n \in \mathbb{N}, |b_n| \leq M$ .

Donc  $(b_n)_n$  est bornée.

Comme  $(a_n)_n$  est bornée, selon le théorème de Bolzano-Weierstrass réel, il existe  $\varphi_1 : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$  strictement croissante telle que  $(a_{\varphi_1(n)})_n$  converge.

Comme  $(b_n)_n$  est bornée, la suite  $(b_{\varphi_1(n)})_n$  est bornée.

Selon le théorème de Bolzano-Weierstrass réel, il existe  $\varphi_2 : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$  strictement croissante telle que  $(b_{\varphi_1 \circ \varphi_2(n)})_n$  converge.

Posons  $\varphi = \varphi_1 \circ \varphi_2$ .

On a  $\varphi$  strictement croissante (composée de deux fonctions strictement croissantes).

De plus, on a  $(b_{\varphi(n)})_n$  convergente et  $(a_{\varphi(n)})_n$  convergente (car c'est une suite extraite de  $(a_{\varphi_1(n)})_n$  qui est convergente).

Donc  $(u_{\varphi(n)})_n$  converge. ■

# Chapitre 6

## Algèbre générale

### Sommaire

---

<b>6.1</b>	<b>Lois de composition internes . . . . .</b>	<b>.133</b>
6.1.1	Définition . . . . .	133
6.1.2	Associativité, commutativité . . . . .	134
6.1.3	Élément neutre, inverse . . . . .	135
6.1.4	Distributivité . . . . .	140
6.1.5	Parties stables . . . . .	141
<b>6.2</b>	<b>Groupes . . . . .</b>	<b>.142</b>
6.2.1	Définition . . . . .	142
6.2.2	Sous-groupes . . . . .	146
6.2.3	Morphismes de groupe . . . . .	149
6.2.4	Isomorphismes, endomorphismes, automorphismes . . . . .	154
<b>6.3</b>	<b>Anneaux . . . . .</b>	<b>.155</b>
6.3.1	Définition . . . . .	155
6.3.2	Calculs dans un anneau . . . . .	157
6.3.3	Sous-anneaux . . . . .	162
6.3.4	Morphismes d'anneaux . . . . .	164
6.3.5	Isomorphismes, endomorphismes, automorphismes . . . . .	166
6.3.6	Anneaux intègres . . . . .	168
<b>6.4</b>	<b>Corps . . . . .</b>	<b>.169</b>

---

## 6.1 Lois de composition internes

### 6.1.1 Définition

---

#### Définition 6.1 (Loi de composition interne)

Soit  $E$  un ensemble.

On appelle loi de composition interne sur  $E$  toute application de  $E \times E$  dans  $E$ .

---

### Remarque 6.2

Les lois de composition internes sont en général notées avec des symboles tels que :

$$+ \quad \times \quad \cdot \quad \wedge \quad \circ \quad * \quad \oplus \quad \otimes .$$

Si  $*$  est une loi de composition interne sur un ensemble  $E$  et  $x, y$  sont deux éléments de  $E$ , on préfère noter  $x * y$  plutôt que  $*(x, y)$  l'image du couple  $(x, y)$  par  $*$ .

---

### Exemple 6.3

- (1) L'addition et la multiplication sont des lois de composition internes sur  $\mathbb{N}$ , sur  $\mathbb{Z}$ , sur  $\mathbb{Q}$ , sur  $\mathbb{R}$ , sur  $\mathbb{C}$ , sur  $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ , sur  $\mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ ...
- (2) Si  $E$  est un ensemble, alors :
  - L'intersection est une loi de composition interne sur  $\mathcal{P}(E)$ .
  - La réunion est une loi de composition interne sur  $\mathcal{P}(E)$ .
  - La composition est une loi de composition interne sur  $\mathcal{F}(E, E)$ .
- (3) Le produit vectoriel est une loi de composition interne sur l'ensemble des vecteurs d'un espace euclidien orienté de dimension 3.

## 6.1.2 Associativité, commutativité

---

### Définition 6.4

Soit  $E$  un ensemble et  $*$  une loi de composition interne sur  $E$ .

On dit que  $*$  est associative si on a :

$$\forall x, y, z \in E, \quad x * (y * z) = (x * y) * z.$$

---

### Exemple 6.5

Parmi les lois de composition internes données à l'Exemple 6.3, toutes sont associatives, excepté le produit vectoriel.

Par exemple, on a bien

$$\forall x, y, z \in \mathbb{N}, \quad (x + y) + z = x + (y + z) .$$

En revanche, si l'on considère une base orthonormée directe  $(i, j, k)$ , on a :

$$\begin{cases} (i \wedge j) \wedge k = k \wedge j = -i \\ i \wedge (j \wedge k) = i \wedge 0 = 0 \end{cases}$$



---

**Définition 6.6**

Soient  $E$  un ensemble et  $*$  une loi de composition interne sur  $E$ .

On dit que  $*$  est commutative si on a :

$$\forall x, y \in E, \quad x * y = y * x.$$

---

*Exemple 6.7*

Parmi les lois de composition internes données à l'Exemple 6.3, toutes sont commutatives, exceptés le produit vectoriel et la composition.

### 6.1.3 Élément neutre, inverse

---

**Définition 6.8 (Élément neutre)**

Soient  $E$  un ensemble,  $*$  une loi de composition interne sur  $E$  et  $e$  un élément de  $E$ .

On dit que  $e$  est un élément neutre pour  $*$  si on a :

$$\forall x \in E, \quad e * x = x * e = x.$$

On dit alors que la loi  $*$  admet un élément neutre (ou, par abus, que  $E$  admet un élément neutre).

---

*Exemple 6.9*

Parmi les lois de composition internes données à l'Exemple 6.3, toutes admettent un élément neutre, excepté le produit vectoriel :

- (1)
  - La loi  $+$  admet  $0$  (ou  $(0)_n$ ) comme neutre.
  - La loi  $\times$  admet  $1$  (ou  $(1)_n$ ) comme neutre.
- (2)
  - La loi  $\cap$  admet  $E$  comme neutre.
  - La loi  $\cup$  admet  $\emptyset$  comme neutre.
  - La loi  $\circ$  admet  $\text{id}_E$  comme neutre.
- (3) La loi  $\wedge$  n'admet pas de neutre. Par l'absurde, soit  $v$  un élément neutre. On a  $\forall w$  vecteur,  $w \wedge v = v \wedge w = w$ . D'où, en prenant  $w = v$ ,  $0 = v$ . D'où  $\forall w$  vecteur,  $w = w \wedge 0 = 0$  : contradiction.

---

*Remarque 6.10*

Soient  $E$  un ensemble,  $*$  une loi de composition interne sur  $E$  et  $e$  un élément de  $E$ .

On dit que  $e$  est un élément neutre à droite pour  $*$  si on a :

$$\forall x \in E, \quad x * e = x.$$

Il n'est généralement pas suffisant que  $e$  soit un élément neutre à droite pour que  $e$  soit un élément neutre (cela suffit si  $*$  est commutative), comme le montre l'exemple suivant :

$\oplus$	0	1
0	0	1
1	0	0

$\oplus$  est bien une loi de composition interne sur  $\{0 ; 1\}$  et 0 est neutre à gauche mais pas à droite.

---

**Proposition 6.11 (Unicité de l'élément neutre)**

Soient  $E$  un ensemble et  $*$  une loi de composition interne sur  $E$ .

Alors il existe au plus un élément neutre pour  $*$ .

---

*Démonstration 6.12*

Soient  $e, e' \in E$  deux éléments neutres pour  $*$ . On a :

$$\forall x \in E, \quad x * e = e * x = x = e' * x = x * e'.$$

Montrons que  $e = e'$ .

On a :

$$\begin{aligned} e &= e * e' \quad \text{car } e' \text{ neutre} \\ &= e' \quad \text{car } e \text{ neutre} \end{aligned}$$

■

---

**Définition/Proposition 6.13 (Inverse d'un élément)**

Soient  $E$  un ensemble et  $*$  une loi de composition interne sur  $E$ .

On suppose que la loi  $*$  est associative et qu'elle admet un élément neutre noté  $e$ .

Soit  $x$  un élément de  $E$ .

On appelle inverse de  $x$  tout élément  $y \in E$  tel que :

$$y * x = x * y = e.$$

Il existe au plus un tel élément  $y$ .

S'il existe, on l'appelle donc l'inverse de  $x$  et on le note  $x^{-1}$ .

On dit alors que  $x$  est inversible.

---

*Démonstration 6.14*  
Soient  $y_1, y_2 \in E$  tels que  $\begin{cases} y_1 * x = x * y_1 = e \\ y_2 * x = x * y_2 = e \end{cases}$

Montrons que  $y_1 = y_2$ .

On a

$$(y_1 * x) * y_2 = y_1 * (x * y_2)$$

$$e * y_2 = y_1 * e$$

$$y_2 = y_1. \quad \blacksquare$$

---

*Exemple 6.15*

Soient  $E$  un ensemble et  $*$  une loi de composition interne associative sur  $E$  et admettant un élément neutre  $e$ .

Alors  $e$  est inversible, d'inverse lui-même :

$$e^{-1} = e.$$

---

*Démonstration 6.16*

On a  $e * e = e * e = e$ . Donc  $e$  inversible, d'inverse  $e$ . ■

---

*Exemple 6.17*

Soient  $E$  un ensemble et  $*$  une loi de composition interne associative sur  $E$  admettant un élément neutre  $e$ .

Soit  $a$  un élément inversible de  $E$ .

Alors l'inverse  $a^{-1}$  de  $a$  est inversible, d'inverse  $a$  :

$$(a^{-1})^{-1} = a.$$

---

*Démonstration 6.18*

On a  $a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$ . Donc  $a^{-1}$  est inversible, d'inverse  $a$ . ■

---

*Exemple 6.19*

Étudions les éléments inversibles des lois de composition internes associatives de l'Exemple 6.3 qui admettent un élément neutre :

- Pour  $(\mathbb{N}, +)$ , le neutre est 0 et il est le seul inversible.
- Pour  $(\mathbb{N}, \times)$ , le neutre est 1 et il est le seul inversible.
- Pour  $(\mathbb{Z}, +)$ , le neutre est 0 et tout élément admet un opposé.
- Pour  $(\mathbb{Z}, \times)$ , le neutre est 1 et 1 et  $-1$  sont les seuls éléments inversibles.
- Tout élément admet un opposé dans  $(\mathbb{Q}, +)$ ,  $(\mathbb{R}, +)$ ,  $(\mathbb{C}, +)$ ,  $(\mathbb{R}^{\mathbb{N}}, +)$  et  $(\mathbb{C}^{\mathbb{N}}, +)$ .
- 0 n'est pas inversible par  $\times$  dans  $\mathbb{Q}$ ,  $\mathbb{R}$ ,  $\mathbb{C}$ ,  $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  et  $\mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ .
- Pour  $(\mathcal{P}(E), \cap)$ , le neutre est  $E$ . Soit  $A \in \mathcal{P}(E)$ . On a

$$\begin{aligned} A \text{ inversible par } \cap &\iff \exists B \in \mathcal{P}(E), A \cap B = B \cap A = E \\ &\iff A = E \end{aligned}$$

donc  $E$  est le seul inversible.

- Pour  $(\mathcal{P}(E), \cup)$ , de même,  $\emptyset$  est le seul inversible.
- Pour  $(\mathcal{F}(E, E), \circ)$ , le neutre est  $\text{id}_E$ . Soit  $f \in \mathcal{F}(E, E)$ . On a

$$\begin{aligned} f \text{ inversible par } \circ &\iff \exists g \in \mathcal{F}(E, E), f \circ g = g \circ f = \text{id}_E \\ &\iff f \text{ est bijective} \end{aligned}$$

donc l'inverse de  $f$  est sa bijection réciproque  $f^{-1}$ .

---

**Proposition 6.20**

Soient  $E$  un ensemble et  $*$  une loi de composition interne associative sur  $E$  admettant un élément neutre  $e$ .

Si  $x$  et  $y$  sont inversibles, alors  $x * y$  est aussi inversible, d'inverse :

$$(x * y)^{-1} = y^{-1} * x^{-1}.$$

---

*Démonstration 6.21*

On a :

$$\begin{aligned}(x * y) * (y^{-1} * x^{-1}) &= x * (y * y^{-1}) * x^{-1} \\ &= x * e * x^{-1} \\ &= x * x^{-1} \\ &= e\end{aligned}$$

De même :

$$\begin{aligned}y^{-1} * x^{-1} * x * y &= y^{-1} * y \\ &= e\end{aligned}$$

Donc  $x * y$  est inversible, d'inverse  $y^{-1} * x^{-1}$ . ■

---

**Proposition 6.22 (Inversible  $\implies$  régulier)**

Soit  $E$  un ensemble muni d'une loi de composition interne associative  $*$  et admettant un élément neutre  $e$ .

Soient  $x, y, z \in E$ . On suppose que  $x$  est inversible.

Alors les conditions suivantes sont équivalentes :

- (1)  $y = z$
- (2)  $xy = xz$
- (3)  $yx = zx$

On dit que  $x$  est un élément régulier ou simplifiable.

---

*Démonstration 6.23*

(1)  $\implies$  (2) et (1)  $\implies$  (3) : Clair.

(2)  $\implies$  (1) : on multiplie à gauche par  $x^{-1}$ .

(3)  $\implies$  (1) : on multiplie à droite par  $x^{-1}$ . ■

---

**Notation 6.24**

Lorsqu'une loi de composition interne est notée  $*$ ,  $\times$ ,  $\cdot$ ,  $\otimes$  ou  $\circ$ , on dit qu'on utilise une notation multiplicative.

Au contraire, les notations telles que  $+$  ou  $\oplus$  sont dites additives.

L'usage est de n'employer des notations additives que pour des lois de composition commutatives.

L'usage est également :

- de réserver les notations  $1$  ou  $1_E$  pour l'élément neutre aux lois notées multiplicativement. Dans le cas d'une loi notée additivement, on préfère noter l'élément neutre  $0$  ou  $0_E$ .
- de réserver la notation  $x^{-1}$  pour l'inverse d'un élément  $x$  aux lois notées multiplicativement. Dans le cas d'une loi notée additivement, on préfère noter  $-x$  l'inverse de  $x$  et on l'appelle alors plutôt l'opposé de  $x$ .

Soit  $E$  un ensemble muni d'une loi de composition interne associative notée multiplicativement, par exemple  $*$ . Soient  $x \in E$  et  $n \in \mathbb{N}^*$ .

Le produit  $x * \cdots * x$  de  $n$  facteurs tous égaux à  $x$  est noté  $x^n$ .

Si, de plus,  $*$  admet un élément neutre  $1_E$ , on pose  $x^0 = 1_E$ .

Enfin, si  $x$  est inversible, on pose  $x^{-n} = (x^{-1})^n$ .

On fait de même pour les lois notées additivement, mais en utilisant encore des notations différentes :

Soit  $E$  un ensemble muni d'une loi de composition interne associative notée additivement, par exemple  $+$ . Soient  $x \in E$  et  $n \in \mathbb{N}^*$ .

La somme  $x + \cdots + x$  de  $n$  termes tous égaux à  $x$  est notée  $nx$  (ou  $n \cdot x$ ).

Si, de plus,  $+$  admet un élément neutre  $0_E$ , on pose  $0x = 0_E$ .

Enfin, si  $x$  est « inversible », on pose  $(-n)x = n(-x)$ .

Enfin, on utilisera pour une loi additive la notation  $\sum$  pour une somme et pour une loi multiplicative la notation  $\prod$  pour un produit.

Toutes ces différences entre lois notées multiplicativement et lois notées additivement ne reposent que dans la manière de noter les objets. Il n'y a aucune différence dans les concepts.

---

#### Remarque 6.25

Soit  $E$  un ensemble muni d'une loi de composition interne associative  $*$ .

Soient  $x, y \in E$  et  $n \in \mathbb{N}$ .

Attention à ne pas écrire en général  $(xy)^n = x^n y^n$ .

Cette formule n'est vraie que si  $x$  et  $y$  commutent.

### 6.1.4 Distributivité

---

#### Définition 6.26 (Distributivité)

Soit  $E$  un ensemble muni de deux lois de composition internes  $\oplus$  et  $\otimes$ .

On dit que la loi  $\otimes$  est distributive par rapport à la loi  $\oplus$  si on a :

$$\forall x, y, z \in E, \quad \begin{cases} x \otimes (y \oplus z) = x \otimes y \oplus x \otimes z \\ (y \oplus z) \otimes x = y \otimes x \oplus z \otimes x \end{cases}$$

---

*Remarque 6.27*

Soit  $E$  un ensemble muni de deux lois de composition internes  $\oplus$  et  $\otimes$ .

Si la loi  $\otimes$  est commutative, alors :

$$\otimes \text{ est distributive par rapport à } \oplus \iff \forall x, y, z \in E, \quad x \otimes (y \oplus z) = x \otimes y \oplus x \otimes z.$$

---

*Démonstration 6.28*

$\Rightarrow$  Claire.

$\Leftarrow$

Soient  $x, y, z \in E$ .

On a

$$\begin{aligned} (y \oplus z) \otimes x &= x \otimes (y \oplus z) \\ &= x \otimes y \oplus x \otimes z \\ &= y \otimes x \oplus z \otimes x \end{aligned}$$

■

---

*Exemple 6.29*

- Dans  $\mathbb{C}$ ,  $\times$  est distributif par rapport à  $+$ .

- Dans  $\mathcal{P}(E) : \forall A, B, C \in \mathcal{P}(E), \quad \begin{cases} A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C) \\ A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) \end{cases}$

Donc  $\cap$  est distributive par rapport à  $\cup$  et  $\cup$  est distributive par rapport à  $\cap$ .

- Dans  $\mathbb{N}$ ,  $+$  n'est pas distributive par rapport à  $\times$  :

$$1 + (2 \times 3) \neq (1 + 2) \times (1 + 3).$$

## 6.1.5 Parties stables

---

**Définition 6.30 (Partie stable)**

Soient  $E$  un ensemble et  $*$  une loi de composition interne sur  $E$ .

On dit qu'une partie  $A \subseteq E$  est stable par la loi  $*$  si on a :

$$\forall x, y \in A, \quad x * y \in A.$$

On peut alors définir une loi de composition interne sur  $A$  :

$$\begin{aligned} A \times A &\longrightarrow A \\ (x, y) &\longmapsto x * y \end{aligned}$$

qui est appelée la loi de composition interne induite par  $*$  sur  $A$ .

Cette loi est souvent encore notée  $*$  (abusivement).

---

*Exemple 6.31*

- $\mathbb{Z}$  est une partie stable de  $\mathbb{R}$  par  $+$  et  $\times$ .
- Soit  $E' \in \mathcal{P}(E)$ . Alors  $\mathcal{P}(E') \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(E))$  est stable par  $\cup$  et  $\cap$ .
- Notons  $\mathcal{P}_p(\llbracket 1 ; 10 \rrbracket)$  les parties de  $\llbracket 1 ; 10 \rrbracket$  de cardinal pair. Ce n'est une partie stable de  $\mathcal{P}(\llbracket 1 ; 10 \rrbracket)$  ni pour  $\cup$  ni pour  $\cap$ . En effet, on a :

$$\{1 ; 2\} \cup \{1 ; 3\} = \{1 ; 2 ; 3\} \notin \mathcal{P}_p(\llbracket 1 ; 10 \rrbracket) \quad \text{et} \quad \{1 ; 2\} \cap \{1 ; 3\} = \{1\} \notin \mathcal{P}_p(\llbracket 1 ; 10 \rrbracket).$$

## 6.2 Groupes

### 6.2.1 Définition

---

#### Définition 6.32 (Groupe)

Un groupe est un couple  $(G, *)$  où  $G$  est un ensemble et  $*$  une loi de composition interne sur  $G$  respectant les conditions suivantes :

- (1) La loi  $*$  est associative.
- (2) La loi  $*$  admet un élément neutre.
- (3) Tout élément de  $G$  possède un inverse.

On dit aussi que  $G$  est muni d'une structure de groupe, ou, par abus, que  $G$  est un groupe.

Si, de plus, la loi  $*$  est commutative, on dit que le groupe est abélien ou commutatif.

---

*Exemple 6.33 (Groupes abéliens)*

$$(\mathbb{Q}^*, \times) \quad (\mathbb{R}^*, \times) \quad (\mathbb{C}^*, \times) \quad \left((\mathbb{R}^*)^{\mathbb{N}}, \times\right) \quad \left((\mathbb{C}^*)^{\mathbb{N}}, \times\right)$$

---

*Exemple 6.34*

Il existe une unique structure de groupe sur  $\{0\}$  :

$\curvearrowright$	$+$	0
0	0	0



En effet, on a  $0 + (0 + 0) = (0 + 0) + 0 = 0$  donc  $+$  est une loi de groupe. On a aussi 0 neutre et 0 opposé de 0.

Sur  $\{0 ; 1\}$ , il existe deux structures de groupe :

Si 0 neutre :

$$\begin{array}{c|cc} \oplus & 0 & 1 \\ \hline 0 & 0 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 0 \end{array}$$

Si 1 neutre :

$$\begin{array}{c|cc} \otimes & 0 & 1 \\ \hline 0 & 1 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 1 \end{array}$$

### Exemple 6.35

Structure de groupe sur  $\{0 ; 1 ; 2\}$  dont 0 est le neutre :

$$\begin{array}{c|ccc} \oplus & 0 & 1 & 2 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 2 \\ \hline 1 & 1 & 2 & 0 \\ \hline 2 & 2 & 0 & 1 \end{array}$$

On remarque que cette loi est commutative.

### Exemple 6.36 (Produit de deux groupes)

Soient  $(G_1, *_1)$  et  $(G_2, *_2)$  deux groupes.

L'ensemble  $G_1 \times G_2$  est naturellement muni d'une structure de groupe, de loi :

$$\begin{array}{ccc} (G_1 \times G_2) \times (G_1 \times G_2) & \longrightarrow & G_1 \times G_2 \\ ((g_1, g_2), (g'_1, g'_2)) & \longmapsto & (g_1 *_1 g'_1, g_2 *_2 g'_2) \end{array}$$

Déterminons son neutre et l'inverse d'un élément  $(g_1, g_2)$  donné.

---

*Démonstration 6.37*

On note  $*$  la loi.

Montrons que  $*$  est associative :

Soient  $(g_1, g_2), (g'_1, g'_2), (g''_1, g''_2) \in G_1 \times G_2$ .

On a :

$$\begin{aligned}(g_1, g_2) * ((g'_1, g'_2) * (g''_1, g''_2)) &= (g_1, g_2) * (g'_1 *_1 g''_1, g'_2 *_2 g''_2) \\ &= (g_1 *_1 (g'_1 *_1 g''_1), g_2 *_2 (g'_2 *_2 g''_2)) \\ &= ((g_1 *_1 g'_1) *_1 g''_1, (g_2 *_2 g'_2) *_2 g''_2) \\ &= (g_1 *_1 g'_1, g_2 *_2 g'_2) * (g''_1, g''_2) \\ &= ((g_1, g_2) * (g'_1, g'_2)) * (g''_1, g''_2)\end{aligned}$$

Montrons que  $*$  admet un neutre :

On note  $e_1$  le neutre de  $G_1$  et  $e_2$  le neutre de  $G_2$ .

On remarque :

$$\forall (g_1, g_2) \in G_1 \times G_2, \begin{cases} (g_1, g_2) * (e_1, e_2) = (g_1 *_1 e_1, g_2 *_2 e_2) = (g_1, g_2) \\ (e_1, e_2) * (g_1, g_2) = (e_1 *_1 g_1, e_2 *_2 g_2) = (g_1, g_2) \end{cases}$$

Donc  $(e_1, e_2)$  est le neutre de  $*$ .

Montrons que tout élément admet un inverse :

Soit  $(g_1, g_2) \in G_1 \times G_2$ .

On remarque :

$$\begin{cases} (g_1, g_2) * (g_1^{-1}, g_2^{-1}) = (g_1 *_1 g_1^{-1}, g_2 *_2 g_2^{-1}) = (e_1, e_2) \\ (g_1^{-1}, g_2^{-1}) * (g_1, g_2) = (g_1^{-1} *_1 g_1, g_2^{-1} *_2 g_2) = (e_1, e_2) \end{cases}$$

Donc  $(g_1, g_2)$  est inversible, d'inverse  $(g_1^{-1}, g_2^{-1})$ . ■

---

*Remarque 6.38*

On a :

$$G_1 \times G_2 \text{ abélien} \iff \begin{cases} G_1 \text{ abélien} \\ G_2 \text{ abélien} \end{cases}$$

---

*Exemple 6.39 (Produit de groupes)*

Soient  $(G_1, *_1), \dots, (G_n, *_n)$  des groupes.

Le produit cartésien  $G_1 \times \dots \times G_n$  est naturellement muni d'une structure de groupe, de loi :

$$\begin{aligned} (G_1 \times \dots \times G_n) \times (G_1 \times \dots \times G_n) &\longrightarrow G_1 \times \dots \times G_n \\ ((g_1, \dots, g_n), (g'_1, \dots, g'_n)) &\longmapsto (g_1 *_1 g'_1, \dots, g_n *_n g'_n) \end{aligned}$$

Son neutre est  $(e_1, \dots, e_n)$  où  $\forall i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$ ,  $e_i$  neutre de  $G_i$ .

L'inverse d'un élément  $(g_1, \dots, g_n)$  est  $(g_1, \dots, g_n)^{-1} = (g_1^{-1}, \dots, g_n^{-1})$ .

---

*Démonstration 6.40*

Idem. ■

---

*Exemple 6.41*

Soit  $I$  un ensemble et  $G$  un groupe.

L'ensemble  $\mathcal{F}(I, G)$  est naturellement muni d'une structure de groupe.

Notons  $\times$  la loi de  $G$  et  $e$  son neutre.

On pose

$$\begin{aligned} * : \mathcal{F}(I, G)^2 &\longrightarrow \mathcal{F}(I, G) \\ (f, g) &\longmapsto \begin{array}{ccc} I & \longrightarrow & G \\ t & \longmapsto & f(t) \times g(t) \end{array} \end{aligned}$$

Montrons que  $*$  est associative :

Soient  $f, g, h \in \mathcal{F}(I, G)$ .

On a :

$$\begin{aligned} \forall t \in I, \quad f * (g * h)(t) &= f(t) \times (g * h)(t) \\ &= f(t) \times (g(t) \times h(t)) \\ &= (f(t) \times g(t)) \times h(t) && \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \text{car } \times \text{ est associative} \\ &= (f * g)(t) \times h(t) \\ &= (f * g) * h(t) \end{aligned}$$

Donc  $*$  est associative.

Montrons que  $*$  admet un élément neutre :

On pose  $f_1 : \begin{array}{ccc} I & \longrightarrow & G \\ t & \longmapsto & e \end{array}$ . Montrons que  $f_1$  est l'élément neutre de  $*$ .

Soit  $f \in \mathcal{F}(I, G)$ . Montrons que  $f_1 * f = f * f_1 = f$ .

On a

$$\forall t \in I, \begin{cases} (f_1 * f)(t) = f_1(t) \times f(t) = e \times f(t) = f(t) \\ (f * f_1)(t) = f(t) \times f_1(t) = f(t) \times e = f(t) \end{cases}$$

Donc  $f_1$  est l'élément neutre de  $*$ .

Montrons que tout élément de  $\mathcal{F}(I, G)$  est inversible.

Soit  $f \in \mathcal{F}(I, G)$ . On pose  $g : I \longrightarrow G$   
 $t \longmapsto f(t)^{-1}$ .

Montrons que  $f * g = g * f = f_1$ .

On a :

$$\forall t \in I, \begin{cases} (f * g)(t) = f(t) \times g(t) = f(t) \times f(t)^{-1} = e = f_1(t) \\ (g * f)(t) = g(t) \times f(t) = f(t)^{-1} \times f(t) = e = f_1(t) \end{cases}$$

Donc tout élément de  $\mathcal{F}(I, G)$  est inversible, d'inverse  $g$ .

*Remarque 6.42*

On a :

$$\mathcal{F}(I, G) \text{ abélien} \iff \begin{cases} G \text{ abélien} \\ \text{ou} \\ I = \emptyset \end{cases}$$

## 6.2.2 Sous-groupes

### Définition 6.43 (Sous-groupe)

Soit  $(G, *)$  un groupe. On note  $e$  son élément neutre.

Un sous-groupe de  $(G, *)$  (ou, par abus, de  $G$ ) est une partie  $H$  de  $G$  telle que :

- (1) L'élément neutre  $e$  appartient à  $H$ .
- (2) La partie  $H$  est stable par produit :  $\forall h_1, h_2 \in H, h_1 * h_2 \in H$ .
- (3) La partie  $H$  est stable par passage à l'inverse :  $\forall h \in H, h^{-1} \in H$ .

### Proposition 6.44

Tout sous-groupe d'un groupe  $G$  est naturellement un groupe. Sa loi est la loi induite par celle de  $G$ .

---

*Démonstration 6.45*

On note  $*$  la loi de  $G$ .

Soit  $H$  un sous-groupe de  $G$ .

Comme  $H$  est stable par  $*$ , on peut définir :

$$\begin{array}{ccc} *_H : & H^2 & \longrightarrow H \\ & (h_1, h_2) & \longmapsto h_1 * h_2 \end{array}$$

Montrons que  $*_H$  est associative :

On a bien

$$\forall h_1, h_2, h_3 \in H, \quad h_1 *_H (h_2 *_H h_3) = h_1 * (h_2 * h_3) = (h_1 * h_2) * h_3 = (h_1 *_H h_2) *_H h_3.$$

Montrons que  $*_H$  admet un élément neutre :

On a  $e \in H$  et

$$\forall h \in H, \quad \begin{cases} e *_H h = e * h = h \\ h *_H e = h * e = h \end{cases}$$

donc  $e$  est le neutre de  $*_H$ .

Montrons que tout élément de  $H$  est inversible par  $*_H$  :

Soit  $h \in H$ . On note  $h^{-1}$  son inverse dans  $G$ .

On a

$$\begin{cases} h^{-1} \in H \\ h *_H h^{-1} = h^{-1} *_H h = e \end{cases}$$

Donc  $(H, *_H)$  est un groupe. ■

---

*Remarque 6.46*

On a

$$H \text{ abélien} \iff G \text{ abélien}$$

---

*Remarque 6.47*

En pratique, on note également  $*$  la loi  $*_H$  de  $H$ .

---

**Proposition 6.48**

*Soit  $(G, *)$  un groupe. On note  $e$  son élément neutre.*

*Soit  $H$  une partie de  $G$ .*

*Alors  $H$  est un sous-groupe de  $G$  si, et seulement si, les conditions suivantes sont vérifiées :*

$$(4) \quad e \in H$$

$$(5) \quad \forall h_1, h_2 \in H, \quad h_1 * h_2^{-1} \in H$$

---

*Démonstration 6.49*

$\Rightarrow$

Supposons  $H$  sous-groupe de  $G$ .

On a clairement (4) selon (1).

Montrons (5).

Soient  $h_1, h_2 \in H$ .

On a  $h_2^{-1} \in H$  selon (3) donc  $h_1 * h_2^{-1} \in H$  selon (2).

$\Leftarrow$

Supposons (4) et (5).

On a (1) selon (4).

Montrons (3).

Soit  $h \in H$ .

On a  $e \in H$  selon (4) donc selon (5),  $e * h^{-1} \in H$  donc  $h^{-1} \in H$ .

Montrons (2).

Soient  $h_1, h_2 \in H$ .

On a  $h_2^{-1} \in H$  selon (3) donc  $h_1 * (h_2^{-1})^{-1} \in H$  donc  $h_1 * h_2 \in H$ . ■

---

*Exemple 6.50*

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

L'ensemble  $\mathbb{U}$  des nombres complexes de module 1 est un sous-groupe de  $\mathbb{C}^*$ .

L'ensemble  $\mathbb{U}_n$  des racines  $n$ -ièmes de l'unité est un sous-groupe de  $\mathbb{U}$ .

---

*Démonstration 6.51*

On sait que  $(\mathbb{C}^*, \times)$  est un groupe. Montrons que  $\mathbb{U}$  est un sous-groupe de  $\mathbb{C}^*$ .

On a  $1 \in \mathbb{U}$  et  $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{U}, \quad z_1 \times z_2^{-1} \in \mathbb{U}$  (car  $|z_1 \times z_2^{-1}| = \frac{|z_1|}{|z_2|} = \frac{1}{1} = 1$ ).

Donc  $\mathbb{U}$  est un sous-groupe de  $\mathbb{C}^*$ . Donc  $\mathbb{U}$  est un groupe.

Montrons que  $\mathbb{U}_n$  est un sous-groupe de  $\mathbb{U}$ .

On a  $\mathbb{U}_n \subseteq \mathbb{U}$  et  $1 \in \mathbb{U}_n$  et  $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{U}_n, z_1 \times z_2^{-1} \in \mathbb{U}_n$  car  $\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^n = \frac{z_1^n}{z_2^n} = \frac{1}{1} = 1$ .

Donc  $\mathbb{U}_n$  est un sous-groupe de  $\mathbb{U}$ . Donc c'est un groupe. ■

### 6.2.3 Morphismes de groupe

---

#### Définition 6.52 (Morphisme de groupes)

Soient  $(G_1, *_1)$  et  $(G_2, *_2)$  deux groupes.

On appelle morphisme de groupes de  $(G_1, *_1)$  vers  $(G_2, *_2)$  (ou, par abus, de  $G_1$  vers  $G_2$ ) toute application  $\varphi : G_1 \longrightarrow G_2$  telle que :

$$\forall g, g' \in G_1, \varphi(g *_1 g') = \varphi(g) *_2 \varphi(g').$$

L'ensemble des morphismes de groupes de  $G_1$  vers  $G_2$  est noté :

$$\text{Hom}(G_1, G_2).$$


---

#### Proposition 6.53

Soient  $(G_1, *_1)$  et  $(G_2, *_2)$  deux groupes et  $\varphi : G_1 \longrightarrow G_2$  un morphisme de groupes de  $(G_1, *_1)$  vers  $(G_2, *_2)$ . On note  $e_1$  et  $e_2$  les éléments neutres respectifs de  $G_1$  et  $G_2$ .

On a alors :

$$\varphi(e_1) = e_2$$

et :

$$\forall g \in G, \varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}.$$


---

#### Démonstration 6.54

On a  $e_1 *_1 e_1 = e_1$  donc :

$$\varphi(e_1 *_1 e_1) = \varphi(e_1)$$

$$\varphi(e_1) *_2 \varphi(e_1) = \varphi(e_1)$$

$$\varphi(e_1)^{-1} *_2 \varphi(e_1) *_2 \varphi(e_1) = \varphi(e_1)^{-1} *_2 \varphi(e_1)$$

$$e_2 *_2 \varphi(e_1) = e_2$$

$$\varphi(e_1) = e_2$$

Soit  $g \in G_1$ .

On a  $g *_1 g^{-1} = e_1$  donc :

$$\varphi(g *_1 g^{-1}) = \varphi(e_1)$$

$$\varphi(g) *_2 \varphi(g^{-1}) = e_2$$

$$\varphi(g)^{-1} *_2 \varphi(g) *_2 \varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1} *_2 e_2$$

$$\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$$

■

### Proposition 6.55

Soient  $(G_1, *_1)$  et  $(G_2, *_2)$  deux groupes et  $\varphi : G_1 \longrightarrow G_2$  un morphisme de groupes de  $(G_1, *_1)$  vers  $(G_2, *_2)$ .

Soient  $H_1$  un sous-groupe de  $G_1$  et  $H_2$  un sous-groupe de  $G_2$ .

Alors :

(1) L'image directe  $\varphi(H_1)$  est un sous-groupe de  $G_2$ .

(2) L'image réciproque  $\varphi^{-1}(H_2)$  est un sous-groupe de  $G_1$ .

*Démonstration 6.56 (1)*

Montrons que  $\varphi(H_1)$  est un sous-groupe de  $G_2$ .

On a  $\varphi(H_1) \subseteq G_2$ .

On note  $e_1$  l'élément neutre de  $G_1$  et  $e_2$  l'élément neutre de  $G_2$ .

On a  $e_1 \in H_1$  donc  $\varphi(e_1) \in \varphi(H_1)$  donc  $e_2 \in \varphi(H_1)$ .

Montrons que  $\forall y_1, y_2 \in \varphi(H_1), y_1 *_2 y_2^{-1} \in \varphi(H_1)$ .

Soient  $y_1, y_2 \in \varphi(H_1)$ . Soient  $x_1, x_2 \in H_1$  tels que 
$$\begin{cases} \varphi(x_1) = y_1 \\ \varphi(x_2) = y_2 \end{cases}$$

On a  $x_1 *_1 x_2^{-1} \in H_1$  donc  $\varphi(x_1 *_1 x_2^{-1}) \in \varphi(H_1)$ .

Or  $\varphi(x_1 *_1 x_2^{-1}) = \varphi(x_1) *_2 \varphi(x_2^{-1}) = \varphi(x_1) *_2 \varphi(x_2)^{-1} = y_1 *_2 y_2^{-1}$ .

Donc  $y_1 *_2 y_2^{-1} \in \varphi(H_1)$ .

Donc  $\varphi(H_1)$  est un sous-groupe de  $G_2$ .

■



---

*Démonstration 6.57 (2)*

Montrons que  $\varphi^{-1}(H_2)$  est un sous-groupe de  $G_1$ .

On a  $\varphi^{-1}(H_2) \subseteq G_1$ .

On note  $e_1$  l'élément neutre de  $G_1$  et  $e_2$  l'élément neutre de  $G_2$ .

On a  $e_1 \in \varphi^{-1}(H_2)$  car  $\varphi(e_1) = e_2 \in H_2$ .

Enfin, on a  $\forall x_1, x_2 \in \varphi^{-1}(H_2)$ ,  $\varphi(x_1 *_1 x_2^{-1}) = \varphi(x_1) *_2 \varphi(x_2^{-1}) = \varphi(x_1) *_2 \varphi(x_2)^{-1} \in H_2$  car  $H_2$  est un groupe.

Donc  $\forall x_1, x_2 \in \varphi^{-1}(H_2)$ ,  $x_1 *_1 x_2^{-1} \in \varphi^{-1}(H_2)$ .

Donc  $\varphi^{-1}(H_2)$  est un sous-groupe de  $G_1$ . ■

---

### Proposition 6.58

Soit  $G$  un groupe et  $H$  un sous-groupe de  $G$ .

L'application

$$\begin{aligned} i : H &\longrightarrow G \\ h &\longmapsto h \end{aligned}$$

est un morphisme de groupes.

---

*Démonstration 6.59*

On note  $*$  la loi de  $G$  et  $*_H$  la loi de  $H$  (induite).

On remarque :

$$\forall h_1, h_2 \in H, i(h_1 *_H h_2) = h_1 *_H h_2 = h_1 * h_2. \quad \blacksquare$$

---

*Exemple 6.60*

Soit  $I$  un ensemble,  $J$  une partie de  $I$  et  $G$  un groupe.

Alors l'application de restriction

$$\begin{aligned} \mathcal{F}(I, G) &\longrightarrow \mathcal{F}(J, G) \\ f &\longmapsto f|_J \end{aligned}$$

est un morphisme de groupes.

---

*Exemple 6.61*

La fonction  $\varphi : \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{U} \\ \theta & \longmapsto & e^{i\theta} \end{array}$  est un morphisme de groupes de  $(\mathbb{R}, +)$  vers  $(\mathbb{U}, \times)$ .

---

*Démonstration 6.62*

On a :

$$\forall \theta_1, \theta_2 \in \mathbb{R}, \quad \varphi(\theta_1 + \theta_2) = e^{i(\theta_1 + \theta_2)} = e^{i\theta_1} e^{i\theta_2} = \varphi(\theta_1) \varphi(\theta_2).$$

■

---

**Proposition 6.63 (Composition de morphismes de groupes)**

Soient  $G_1$ ,  $G_2$  et  $G_3$  des groupes et  $\varphi : G_1 \longrightarrow G_2$  et  $\psi : G_2 \longrightarrow G_3$  des morphismes de groupes.

Alors

$$\psi \circ \varphi : G_1 \longrightarrow G_3$$

est un morphisme de groupes.

---

*Démonstration 6.64*

On note  $*_1$  la loi de  $G_1$ ,  $*_2$  la loi de  $G_2$  et  $*_3$  la loi de  $G_3$ .

On a :

$$\begin{aligned} \forall g, g' \in G_1, \quad \psi \circ \varphi(g *_1 g') &= \psi(\varphi(g *_1 g')) \\ &= \psi(\varphi(g) *_2 \varphi(g')) \\ &= \psi(\varphi(g)) *_3 \psi(\varphi(g')) \\ &= \psi \circ \varphi(g) *_3 \psi \circ \varphi(g') \end{aligned}$$

Donc  $\psi \circ \varphi$  est un morphisme de groupes.

■

---

**Définition 6.65 (Noyau et image d'un morphisme)**

Soient  $G_1$  et  $G_2$  deux groupes et  $\varphi : G_1 \longrightarrow G_2$  un morphisme de groupes.

On note  $e_2$  le neutre de  $G_2$ .

L'image du morphisme  $\varphi$  est l'ensemble image de l'application  $\varphi$  :

$$\text{Im } \varphi = \{\varphi(g_1)\}_{g_1 \in G_1} = \{g_2 \in G_2 \mid \exists g_1 \in G_1, \varphi(g_1) = g_2\}.$$

Le noyau du morphisme  $\varphi$  est l'ensemble des éléments de  $G_1$  dont l'image par  $\varphi$  est le neutre de  $G_2$  :

$$\ker \varphi = \varphi^{-1}(\{e_2\}) = \{g_1 \in G_1 \mid \varphi(g_1) = e_2\}.$$

---

**Proposition 6.66**

Soient  $G_1$  et  $G_2$  deux groupes et  $\varphi : G_1 \longrightarrow G_2$  un morphisme de groupes.

Alors  $\ker \varphi$  est un sous-groupe de  $G_1$  et  $\text{Im } \varphi$  est un sous-groupe de  $G_2$ .

---

*Démonstration 6.67*

On a  $\text{Im } \varphi = \varphi(G_1)$  donc  $\text{Im } \varphi$  est l'image directe de  $G_2$  par  $\varphi$ .

Donc  $\text{Im } \varphi$  est un sous-groupe de  $G_2$  selon la Proposition 6.55 car  $\varphi$  est un morphisme de groupes et  $G_1$  est un sous-groupe de  $G_1$ .

$\ker \varphi$  est l'image réciproque de  $\{e_2\}$  par  $\varphi$ .

Donc  $\ker \varphi$  est un sous-groupe de  $G_1$  selon la Proposition 6.55 car  $\varphi$  est un morphisme de groupes et  $\{e_2\}$  est un sous-groupe de  $G_2$ . ■

---

### **Théorème 6.68**

*Soit  $\varphi : G_1 \longrightarrow G_2$  un morphisme de groupes.*

*On note  $e_1$  le neutre de  $G_1$ .*

*Alors  $\varphi$  est une application injective si, et seulement si, son noyau est « nul », c'est-à-dire :*

$$\ker \varphi = \{e_1\}.$$

---

*Démonstration 6.69*

On note  $e_2$  le neutre de  $G_2$ .

$\Rightarrow$

Supposons  $\varphi$  injectif.

Montrons que  $\ker \varphi = \{e_1\}$ .

$\supseteq$  On a  $\varphi(e_1) = e_2$  donc  $e_1 \in \varphi^{-1}(\{e_2\})$  donc  $\{e_1\} \subseteq \ker \varphi$ .

$\subseteq$  Soit  $x \in \ker \varphi$ . On a  $\varphi(x) = e_2 = \varphi(e_1)$ . Donc  $x = e_1$  car  $\varphi$  est injectif. Donc  $\ker \varphi \subseteq \{e_1\}$ .

Finalement, on a  $\ker \varphi = \{e_1\}$ .

$\Leftarrow$

Supposons  $\ker \varphi = \{e_1\}$ .

Montrons que  $\varphi$  est injectif.

Soient  $x, y \in G_1$  tels que  $\varphi(x) = \varphi(y)$ . Montrons que  $x = y$ .

On a :

$$\varphi(x) = \varphi(y)$$

$$\varphi(x) \varphi(y)^{-1} = e_2$$

$$\varphi(x) \varphi(y^{-1}) = e_2$$

$$\varphi(xy^{-1}) = e_2$$

Donc  $xy^{-1} \in \ker \varphi$  donc  $xy^{-1} = e_1$  car  $\ker \varphi = \{e_1\}$ .

Donc  $x = y$ .

Donc  $\varphi$  est injectif. ■

## 6.2.4 Isomorphismes, endomorphismes, automorphismes

---

### Définition 6.70 (Isomorphisme)

Soient  $G_1$  et  $G_2$  deux groupes.

Un isomorphisme de groupes de  $G_1$  vers  $G_2$  est un morphisme de groupes  $\varphi : G_1 \longrightarrow G_2$  bijectif.

---

### Théorème 6.71

Soient  $G_1, G_2$  et  $G_3$  des groupes.

Soient  $\varphi : G_1 \longrightarrow G_2$  et  $\psi : G_2 \longrightarrow G_3$  deux isomorphismes de groupes.

Alors  $\psi \circ \varphi : G_1 \longrightarrow G_3$  est un isomorphisme de groupes.

---

#### Démonstration 6.72

Comme  $\psi$  et  $\varphi$  sont des morphismes de groupes, d'après la Proposition 6.63,  $\psi \circ \varphi$  est un morphisme de groupes.

Comme  $\psi$  et  $\varphi$  sont des bijections, d'après la Proposition 4.46,  $\psi \circ \varphi$  est une bijection.

Donc  $\psi \circ \varphi$  est un isomorphisme de groupes. ■

---

### Théorème 6.73

Soit  $\varphi : G_1 \longrightarrow G_2$  un isomorphisme de groupes.

Alors la bijection réciproque  $\varphi^{-1} : G_2 \longrightarrow G_1$  est un isomorphisme de groupes.

---

#### Démonstration 6.74

On note  $*_1$  la loi de  $G_1$  et  $*_2$  la loi de  $G_2$ .

On sait déjà que  $\varphi^{-1}$  est une bijection (Définition/Proposition 4.48).

Montrons que  $\varphi^{-1} : G_2 \longrightarrow G_1$  est un morphisme de groupes.

Soient  $y, y' \in G_2$ .

On a  $\varphi \circ \varphi^{-1}(y) = y$  et  $\varphi \circ \varphi^{-1}(y') = y'$ .

Donc, comme  $\varphi$  est un morphisme de groupes, on a  $\varphi\left(\varphi^{-1}(y) *_1 \varphi^{-1}(y')\right) = y *_2 y'$ .

Donc  $\varphi^{-1}(y) *_1 \varphi^{-1}(y')$  est l'antécédent de  $y *_2 y'$  par  $\varphi$ , c'est-à-dire  $\varphi^{-1}(y) *_1 \varphi^{-1}(y') = \varphi^{-1}(y *_2 y')$ .

Donc  $\varphi^{-1}$  est un morphisme de groupes.

Donc  $\varphi^{-1}$  est un isomorphisme de groupes. ■

---

**Définition 6.75 (Endomorphisme)**

Soit  $G$  un groupe.

Un endomorphisme de groupe de  $G$  est un morphisme de groupes  $\varphi : G \longrightarrow G$ .

---

**Définition 6.76 (Automorphisme)**

Soit  $G$  un groupe.

Un automorphisme de groupe de  $G$  est un isomorphisme de groupes  $\varphi : G \longrightarrow G$ , c'est-à-dire un endomorphisme de  $G$  bijectif.

L'ensemble des automorphismes de groupe de  $G$  est noté  $\text{Aut}(G)$ .

---

*Exemple 6.77*

Soit  $G$  un groupe.

Alors  $(\text{Aut}(G), \circ)$  est un groupe appelé le groupe des automorphismes de  $G$ .

---

*Démonstration 6.78*

★★ EXERCICE ★★ ■

## 6.3 Anneaux

### 6.3.1 Définition

---

**Définition 6.79 (Anneau)**

Un anneau est un triplet  $(A, +, \times)$  où  $A$  est un ensemble et  $+$  et  $\times$  sont deux lois de composition internes sur  $A$  tels que les conditions suivantes soient vérifiées :

- (1)  $(A, +)$  est un groupe commutatif.
- (2) La loi  $\times$  est associative et admet un élément neutre.

(3) La loi  $\times$  est distributive par rapport à la loi  $+$ , c'est-à-dire :

$$\forall a, b, c \in A, \quad a \times (b + c) = a \times b + a \times c \quad \text{et} \quad (b + c) \times a = b \times a + c \times a.$$

On dit aussi que  $A$  est muni d'une structure d'anneau, ou, par abus, que  $A$  est un anneau.

Si, de plus, la loi  $\times$  est commutative, on dit que  $A$  est un anneau commutatif.

*Remarque 6.80*

La loi  $+$  est appelée l'addition de l'anneau.

La loi  $\times$  est appelée sa multiplication. On s'autorise à ne pas écrire son symbole (c'est-à-dire écrire  $ab$  au lieu de  $a \times b$ ).

L'élément neutre de  $+$  est généralement noté  $0$  ou  $0_A$  ; celui de  $\times$  est noté  $1$  ou  $1_A$ .

Si  $a$  est un élément de  $A$ , son « élément inverse » pour  $+$  est appelé son opposé et est noté  $-a$  (il existe car  $(A, +)$  est un groupe commutatif) ; son élément inverse pour  $\times$  est appelé son inverse et est noté  $a^{-1}$  (s'il existe.)

*Exemple 6.81*

On vérifie facilement que  $(\mathbb{Z}, +, \times)$ ,  $(\mathbb{Q}, +, \times)$ ,  $(\mathbb{R}, +, \times)$ ,  $(\mathbb{C}, +, \times)$ ,  $(\mathbb{R}^{\mathbb{N}}, +, \times)$  et  $(\mathbb{C}^{\mathbb{N}}, +, \times)$  sont des anneaux commutatifs.

*Exemple 6.82*

Soient  $(A_1, +_1, \times_1)$  et  $(A_2, +_2, \times_2)$  deux anneaux de neutres  $0_1, 1_1$  et  $0_2, 1_2$  respectivement.

L'ensemble  $A_1 \times A_2$  est naturellement muni d'une structure d'anneau, de lois

$$\begin{aligned} (A_1 \times A_2) \times (A_1 \times A_2) &\longrightarrow A_1 \times A_2 \\ ((a_1, a_2), (a'_1, a'_2)) &\longmapsto (a_1 +_1 a'_1, a_2 +_2 a'_2) \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} (A_1 \times A_2) \times (A_1 \times A_2) &\longrightarrow A_1 \times A_2 \\ ((a_1, a_2), (a'_1, a'_2)) &\longmapsto (a_1 \times_1 a'_1, a_2 \times_2 a'_2) \end{aligned}$$

Ses éléments neutres sont  $(0_1, 0_2)$  et  $(1_1, 1_2)$ .

*Exemple 6.83*

Soient  $I$  un ensemble et  $A$  un anneau.

$\mathcal{F}(I, A)$  est naturellement muni d'une structure d'anneau.

On note  $\begin{cases} + \text{ et } \times \text{ les lois de } A \\ 0 \text{ et } 1 \text{ les lois de } A \end{cases}$

Comme  $(A, +)$  est un groupe commutatif, on sait que  $\mathcal{F}(I, A)$  est un groupe commutatif pour la loi

$$\begin{array}{ccc} \oplus : \mathcal{F}(I, A)^2 & \longrightarrow & \mathcal{F}(I, A) \\ (f, g) & \longmapsto & \begin{array}{ccc} I & \longrightarrow & A \\ x & \longmapsto & f(x) + g(x) \end{array} \end{array}$$

dont le neutre est  $\begin{array}{ccc} I & \longrightarrow & A \\ x & \longmapsto & 0 \end{array}$  (cf. Exemple 6.41).

On pose d'autre part

$$\begin{array}{ccc} \otimes : \mathcal{F}(I, A)^2 & \longrightarrow & \mathcal{F}(I, A) \\ (f, g) & \longmapsto & \begin{array}{ccc} I & \longrightarrow & A \\ x & \longmapsto & f(x) \times g(x) \end{array} \end{array}$$

On vérifie facilement que  $\otimes$  est associative et qu'elle admet pour neutre  $\begin{array}{ccc} I & \longrightarrow & A \\ x & \longmapsto & 1 \end{array}$ .

Vérifions maintenant que  $\otimes$  est distributive par rapport à  $\oplus$ .

Soient  $f, g, h \in \mathcal{F}(I, A)$ .

Montrons que  $\begin{cases} f \otimes (g \oplus h) = f \otimes g \oplus f \otimes h & (1) \\ (g \oplus h) \otimes f = g \otimes f \oplus h \otimes f & (2) \end{cases}$

Soit  $x \in I$ .

On a :

$$\begin{aligned} [f \otimes (g \oplus h)](x) &= f(x) \times (g \oplus h)(x) \\ &= f(x) \times (g(x) + h(x)) && \left. \begin{array}{l} \text{par définition de } \oplus \\ \text{car } A \text{ est un anneau} \end{array} \right\} \\ &= f(x) \times g(x) + f(x) \times h(x) && \left. \begin{array}{l} \text{par définition de } \otimes \\ \text{par définition de } \oplus \end{array} \right\} \\ &= [f \otimes g](x) + [f \otimes h](x) \\ &= [(f \otimes g) \oplus (f \otimes h)](x) \end{aligned}$$

D'où (1).

On montre de même (2).

Donc  $\otimes$  est distributive par rapport à  $\oplus$ .

Donc  $(\mathcal{F}(I, A), +, \times)$  est un anneau.

### 6.3.2 Calculs dans un anneau

#### Proposition 6.84

Soit  $(A, +, \times)$  un anneau.

On note 0 son neutre pour +.

On a, pour tout élément  $a$  de  $A$  :

$$0 \times a = a \times 0 = 0.$$

On dit que l'élément  $0$  est absorbant pour le produit.

---

*Démonstration 6.85*

Soit  $a \in A$ .

On a :

$$\begin{array}{lcl} 1 + 0 = 1 & & \\ a(1 + 0) = a \times 1 & \left. \begin{array}{l} \downarrow \\ \downarrow \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{on multiplie à gauche par } a \\ \text{car } \times \text{ est distributive par rapport à } + \end{array} & \\ a \times 1 + a \times 0 = a \times 1 & & \\ a + a \times 0 = a & & \\ a \times 0 = 0 & \left. \begin{array}{l} \downarrow \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{on ajoute } -a \text{ de chaque côté} \end{array} & \blacksquare \end{array}$$

---

### Proposition 6.86

Soit  $(A, +, \times)$  un anneau.

On a :

$$\forall a, b \in A, \quad -(a \times b) = (-a) \times b = a \times (-b) \quad \text{et} \quad (-a) \times (-b) = ab.$$

---

*Démonstration 6.87*

Soient  $a, b \in A$ .

On a d'une part  $a(b - b) = a \times 0 = 0$  et d'autre part  $a(b - b) = ab + a(-b)$ .

Ainsi, on a  $ab + a(-b) = 0$ .

D'où, en ajoutant l'opposé de  $ab$  de chaque côté :  $a(-b) = -ab$ .

De même, on a :  $(-a)b + ab = (-a + a)b = 0 \times b = 0$  donc  $(-a)b = -ab$ .

Enfin, selon ce qui précède :  $(-a)(-b) = -a(-b) = -(-ab) = ab$ . ■

---

### Définition 6.88 (Anneau nul)

Un anneau  $(A, +, \times)$  est dit nul si  $A$  est un singleton.

---

### Proposition 6.89

Un anneau  $(A, +, \times)$  d'éléments neutres  $0$  et  $1$  est nul si, et seulement si, on a :  $0 = 1$ .



---

Démonstration 6.90

$\Rightarrow$  Si  $A$  est nul alors  $0 = 1$ .

$\Leftarrow$

Supposons  $0 = 1$ . Montrons que  $A$  est nul.

On a  $\forall a \in A, a = a \times 1 = a \times 0 = 0$ .

Donc  $\text{Card } A = 1$ . ■

---

**Proposition 6.91**

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . Soient  $A$  un anneau et  $a$  et  $b$  deux éléments de  $A$  tels que :

$$ab = ba$$

(on dit que les éléments  $a$  et  $b$  commutent).

On a :

(1) La formule du binôme de Newton :

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

(2) La factorisation de  $a^n - b^n$  :

$$a^n - b^n = (a - b) \sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-k-1}$$

---

Démonstration 6.92 (1)

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$  on pose  $\mathcal{P}(n) : (a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$ .

Si  $n = 0$ , on a :  $(a + b)^0 = 1$  et  $\sum_{k=0}^0 \binom{0}{k} a^k b^{0-k} = \binom{0}{0} a^0 b^0 = 1$  donc  $\mathcal{P}(0)$  est vraie.

Soit  $n \in \mathbb{N}$  tel que  $\mathcal{P}(n)$ . Montrons  $\mathcal{P}(n + 1)$  :

On a :

$$\begin{aligned}
(a+b)^{n+1} &= (a+b)(a+b)^n \\
&= (a+b) \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k} && \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \text{selon } \mathcal{P}(n) \\
&= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{k+1} b^{n-k} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} b a^k b^{n-k} \\
&= \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n}{k-1} a^k b^{n-k+1} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k+1} && \left. \begin{array}{l} \text{car } ba = ab \\ \text{car } \binom{n}{-1} = \binom{n}{n+1} = 0 \end{array} \right\} \\
&= \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n}{k-1} a^k b^{n-k+1} + \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n}{k} a^k b^{n-k+1} \\
&= \sum_{k=0}^{n+1} \left( \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} \right) a^k b^{n-k+1} \\
&= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} a^k b^{n-k+1}
\end{aligned}$$

D'où  $\mathcal{P}(n+1)$ .

Donc pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on a  $\mathcal{P}(n)$  par récurrence. ■

#### Démonstration 6.93 (2)

On a :

$$\begin{aligned}
(a-b) \sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-k-1} &= \sum_{k=0}^{n-1} (a^{k+1} b^{n-k-1} - b a^k b^{n-k-1}) \\
&= \sum_{k=0}^{n-1} (a^{k+1} b^{n-k-1} - a^k b^{n-k}) && \left. \begin{array}{l} \text{car } ba = ab \\ \text{somme télescopique} \end{array} \right\} \\
&= a^n b^0 - a^0 b^n \\
&= a^n - b^n
\end{aligned}$$
■

#### Exemple 6.94

Déterminons toutes les structures d'anneau sur  $\{0\}$ , puis sur  $\{0; 1\}$ .

L'unique structure d'anneau sur  $\{0\}$  est la suivante :

$\overset{\curvearrowright}{+}$	0
0	0

$\overset{\curvearrowright}{\times}$	0
0	0

On obtient bien une structure d'anneau :

- $(\{0\}, +)$  est bien un groupe commutatif (le groupe nul).
- $\times$  est associative et possède un neutre.
- $\times$  est bien distributive par rapport à  $+$  car

$$\forall a, b, c \in \{0\}, \quad a(b + c) = 0 = 0 + 0 = ab + ac.$$

Déterminons maintenant les structures d'anneau sur  $A = \{0; 1\}$ .

analyse

Comme  $\text{Card } A = 2$ , les lois  $+$  et  $\times$  n'admettent pas le même élément neutre.

Si le neutre de  $+$  est 0 et celui de  $\times$  est 1 :

$\overset{\curvearrowright}{+}$	0	1
0	0	1
1	1	0

$\overset{\curvearrowright}{\times}$	0	1
0	0	0
1	0	1

Si le neutre de  $+$  est 1 et celui de  $\times$  est 0 :

$\overset{\curvearrowright}{+}$	0	1
0	1	0
1	0	1

$\overset{\curvearrowright}{\times}$	0	1
0	0	1
1	1	1

synthèse

On admet qu'on obtient bien deux structures d'anneau (on obtient deux anneaux isomorphes à  $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ ).

### Définition 6.95 (Élément inversible d'un anneau)

Soient  $(A, +, \times)$  un anneau et  $a$  un élément de  $A$ .

On dit que  $a$  est inversible dans l'anneau  $A$  s'il est inversible pour la loi  $\times$ .

L'ensemble des éléments inversibles est souvent noté  $A^\times$ .

### Définition/Proposition 6.96 (Groupe des inversibles d'un anneau)

Soit  $(A, +, \times)$  un anneau.

On appelle groupe des inversibles de l'anneau  $A$  l'ensemble des éléments inversibles de  $A$ , muni de la loi  $\times$ .

C'est un groupe commutatif si l'anneau  $A$  est commutatif.

---

*Démonstration 6.97*

Montrons que l'application  $A^\times \times A^\times \longrightarrow A^\times$  est bien définie, c'est-à-dire que  $A^\times$  est une partie de  $A$  stable par  $\times$ .

Soient  $a, b \in A^\times$ . On sait que  $ab$  est inversible, d'inverse  $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$  (cf. Proposition 6.20).

Donc  $ab \in A^\times$  donc  $A^\times$  est stable par  $\times$ .

On a  $\forall a, b, c \in A^\times$ ,  $a(bc) = (ab)c$  donc  $\times$  est associative.

La loi  $\times$  admet 1 comme élément neutre dans  $A^\times$  car  $1 \in A^\times$  (cf. Exemple 6.15).

Tout élément de  $A^\times$  est inversible dans  $A^\times$  (cf. Exemple 6.17).

Donc  $A^\times$  est un groupe. ■

---

*Exemple 6.98*

Déterminons  $\mathbb{Z}^\times$ ,  $\mathbb{R}^\times$ ,  $\mathbb{C}^\times$  et  $(\mathbb{R}^N)^\times$ .

Dans  $(\mathbb{Z}, +, \times)$  (anneau de neutres 0 et 1), les seuls éléments inversibles sont 1 et -1 donc  $\mathbb{Z}^\times = \{-1 ; 1\}$ . Sa loi de groupe est :

$\times$	1	-1
1	1	-1
-1	-1	1

Dans  $(\mathbb{Q}, +, \times)$  (anneau de neutres 0 et 1), tous les éléments sont inversibles sauf 0 donc  $\mathbb{Q}^\times = \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ .

Idem dans  $(\mathbb{R}, +, \times)$  et  $(\mathbb{C}, +, \times)$  :  $\mathbb{R}^\times = \mathbb{R} \setminus \{0\}$  et  $\mathbb{C}^\times = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ .

Dans  $(\mathbb{R}^N, +, \times)$  (anneau de neutres  $(0)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(1)_{n \in \mathbb{N}}$ ), tous les éléments sont inversibles sauf les suites dont au moins un terme est nul donc  $(\mathbb{R}^N)^\times = (\mathbb{R}^*)^N$ .

### 6.3.3 Sous-anneaux

---

**Définition 6.99 (Sous-anneau)**

Soit  $(A, +, \times)$  un anneau. On note 0 et 1 ses neutres.

Un sous-anneau de  $(A, +, \times)$  (ou, par abus, de  $A$ ) est une partie  $B$  de  $A$  telle que :

- (1) Les éléments neutres 0 et 1 appartiennent à  $B$ .

(2) La partie  $B$  est stable par somme :

$$\forall b_1, b_2 \in B, \quad b_1 + b_2 \in B.$$

(3) La partie  $B$  est stable par produit :

$$\forall b_1, b_2 \in B, \quad b_1 \times b_2 \in B.$$

(4) La partie  $B$  est stable par passage à l'opposé :

$$\forall b \in B, \quad -b \in B.$$

---

**Proposition 6.100**

*Tout sous-anneau d'un anneau  $(A, +, \times)$  d'éléments neutres 0 et 1 est naturellement un anneau dont les lois sont celles induites par celles de  $A$ .*

---

*Démonstration 6.101*

Soit  $B$  un sous-anneau de  $A$ .

Selon (2) et (3),  $B$  est une partie de  $A$  stable par  $+$  et  $\times$  donc  $+$  et  $\times$  induisent des lois  $\oplus$  et  $\otimes$  sur  $B$ .

Montrons que  $(B, \oplus)$  est un groupe abélien.

On remarque que  $(B, \oplus)$  est un sous-groupe de  $(A, +)$  selon (1), (2) et (4) donc  $(B, \oplus)$  est un groupe abélien.

Montrons que  $\otimes$  est associative et possède un élément neutre :

$\otimes$  est associative car  $\times$  est associative et  $\otimes$  possède un neutre car  $1 \in B$  et  $\forall b \in B, \begin{cases} 1 \otimes b = 1 \times b = b \\ b \otimes 1 = b \times 1 = b \end{cases}$

$\otimes$  est distributive par rapport à  $\oplus$  car  $\times$  est distributive par rapport à  $+$ .

Donc  $(B, \oplus, \otimes)$  est un anneau. ■

---

**Proposition 6.102**

*Soient  $(A, +, \times)$  d'éléments neutres 0 et 1 et  $B$  une partie de  $A$ .*

*Alors  $B$  est un sous-anneau de  $A$  si, et seulement si, les conditions suivantes sont vérifiées :*

(5)  $1 \in B$

(6)  $\forall b_1, b_2 \in B, \quad b_1 - b_2 \in B$

(7)  $\forall b_1, b_2 \in B, \quad b_1 \times b_2 \in B$

---

Démonstration 6.103



Supposons (1), (2), (3) et (4).

On a clairement (5) et (7) selon (1) et (3).

Montrons (6) :

Soient  $b_1, b_2 \in B$ . On a  $-b_2 \in B$  selon (4) puis  $b_1 - b_2 = b_1 + (-b_2) \in B$  selon (2).

D'où (6).



Supposons (5), (6) et (7).

On a clairement (3) selon (7).

On a  $1 \in B$  selon (5) donc  $1 - 1 \in B$  selon (6), c'est-à-dire  $0 \in B$ . D'où (1).

Montrons (4) :

Soit  $b \in B$ . On a  $0 - b \in B$  selon (6) donc  $-b \in B$ . D'où (4).

Montrons (2) :

Soient  $b_1, b_2 \in B$ . On a  $-b_2 \in B$  selon (4). Donc  $b_1 - (-b_2) \in B$  selon (6). Donc  $b_1 + b_2 \in B$ . D'où (2). ■

---

Exemple 6.104

On vérifie facilement que  $\mathbb{Z}$  est un sous-anneau de  $\mathbb{Q}$  et de  $\mathbb{R}$ , que  $\mathbb{Q}$  est un sous-anneau de  $\mathbb{R}$ , que  $\mathbb{R}$  est un sous-anneau de  $\mathbb{C}$ , que  $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  est un sous-anneau de  $\mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ , ...

### 6.3.4 Morphismes d'anneaux

---

#### Définition 6.105 (Morphisme d'anneaux)

Soient  $(A_1, +_1, \times_1)$  et  $(A_2, +_2, \times_2)$  deux anneaux d'éléments neutres respectifs  $0_1$  et  $1_1$  et  $0_2$  et  $1_2$ .

On appelle morphisme d'anneaux de  $(A_1, +_1, \times_1)$  vers  $(A_2, +_2, \times_2)$  (ou, par abus, de  $A_1$  vers  $A_2$ ) toute application  $\varphi : A_1 \longrightarrow A_2$  telle que les conditions suivantes sont vérifiées :

$$(1) \quad \varphi(1_1) = 1_2$$

$$(2) \quad \forall a, a' \in A_1, \quad \varphi(a +_1 a') = \varphi(a) +_2 \varphi(a')$$

$$(3) \quad \forall a, a' \in A_1, \quad \varphi(a \times_1 a') = \varphi(a) \times_2 \varphi(a')$$

---

**Proposition 6.106**

Soient  $(A_1, +_1, \times_1)$  et  $(A_2, +_2, \times_2)$  deux anneaux d'éléments neutres pour l'addition respectifs  $0_1$  et  $0_2$ .

Soit  $\varphi : A_1 \longrightarrow A_2$  un morphisme d'anneaux.

Alors on a :

$$\varphi(0_1) = 0_2$$

et

$$\forall a \in A_1, \quad \varphi(-a) = -\varphi(a).$$

---

*Démonstration 6.107*

Montrons que  $\varphi(0_1) = 0_2$ . Comme  $\varphi$  est un morphisme d'anneaux de  $A_1$  vers  $A_2$ , c'est un morphisme de groupes de  $(A_1, +_1)$  vers  $(A_2, +_2)$ . On a alors  $\varphi(0_1) = 0_2$  (cf. Proposition 6.53).

De même, on a  $\forall a \in A_1, \quad \varphi(-a) = -\varphi(a)$  car  $\varphi$  est un morphisme de groupes de  $(A_1, +_1)$  vers  $(A_2, +_2)$  (cf. Proposition 6.53). ■

---

**Proposition 6.108**

Soit  $(A, +, \times)$  un anneau dont on note l'élément neutre pour la multiplication 1 et  $B$  un sous-anneau de  $A$ .

L'application

$$\begin{aligned} i : B &\longrightarrow A \\ b &\longmapsto b \end{aligned}$$

est un morphisme d'anneaux.

---

*Démonstration 6.109*

On a  $i(1) = 1$  et

$$\forall b_1, b_2 \in B, \quad \begin{cases} i(b_1 + b_2) = b_1 + b_2 = i(b_1) + i(b_2) \\ i(b_1 b_2) = b_1 b_2 = i(b_1) i(b_2) \end{cases}$$

■

---

*Exemple 6.110*

Soient  $(A_1, +_1, \times_1)$  et  $(A_2, +_2, \times_2)$  deux anneaux.

Les projections  $p_1 : A_1 \times A_2 \longrightarrow A_1$  et  $p_2 : A_1 \times A_2 \longrightarrow A_2$  sont des morphismes d'anneaux.

---

*Exemple 6.111*

Soit  $I$  un ensemble,  $J$  une partie de  $I$  et  $A$  un anneau.

Alors l'application de restriction

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}(I, A) & \longrightarrow & \mathcal{F}(J, A) \\ f & \longmapsto & f|_J \end{array}$$

est un morphisme d'anneaux.

---

**Proposition 6.112 (Composition de morphismes d'anneaux)**

Soient  $A_1, A_2$  et  $A_3$  des anneaux et  $\varphi : A_1 \longrightarrow A_2$  et  $\psi : A_2 \longrightarrow A_3$  des morphismes d'anneaux.

Alors

$$\psi \circ \varphi : A_1 \longrightarrow A_3$$

est un morphisme d'anneaux.

---

*Démonstration 6.113*

On note  $1_1, 1_2$  et  $1_3$  les neutres respectifs de  $A_1, A_2$  et  $A_3$  pour la multiplication et  $+_i$  et  $\times_i$  les lois de  $A_i$  pour tout  $i \in \llbracket 1 ; 3 \rrbracket$ .

On a  $\psi \circ \varphi (1_1) = \psi (\varphi (1_1)) = \psi (1_2) = 1_3$ .

Soient  $a, b \in A_1$ .

On a :

$$\begin{cases} \psi \circ \varphi (a +_1 b) = \psi (\varphi (a +_1 b)) = \psi (\varphi (a) +_2 \varphi (b)) = \psi (\varphi (a)) +_3 \psi (\varphi (b)) \\ \psi \circ \varphi (a \times_1 b) = \psi (\varphi (a) \times_2 \varphi (b)) = \psi (\varphi (a)) \times_3 \psi (\varphi (b)) \end{cases}$$

Donc  $\psi \circ \varphi$  est un morphisme d'anneaux de  $A_1$  vers  $A_3$ . ■

### 6.3.5 Isomorphismes, endomorphismes, automorphismes

---

**Définition 6.114 (Isomorphisme)**

Soient  $A_1$  et  $A_2$  deux anneaux.

Un isomorphisme d'anneaux de  $A_1$  vers  $A_2$  est un morphisme d'anneaux  $\varphi : A_1 \longrightarrow A_2$  bijectif.

---

*Oubli 6.115*

Un composée d'isomorphismes d'anneaux est un isomorphisme d'anneaux.



---

**Théorème 6.116**

Soit un isomorphisme d'anneaux  $\varphi : A_1 \longrightarrow A_2$ . Alors la bijection réciproque  $\varphi^{-1} : A_2 \longrightarrow A_1$  est un isomorphisme d'anneaux.

---

*Démonstration 6.117*

On note  $+_1$  et  $\times_1$  les lois de  $A_1$  et  $+_2$  et  $\times_2$  les lois de  $A_2$ . On note  $1_1$  et  $1_2$  les neutres de  $\times_1$  et  $\times_2$ .

On sait que  $\varphi^{-1}$  est une bijection de  $A_2$  vers  $A_1$ .

Montrons que  $\varphi^{-1}$  est un morphisme d'anneaux.

On a  $\varphi(1_1) = 1_2$  donc  $\varphi^{-1}(1_2) = 1_1$ .

Soient  $y, y' \in A_2$ . On a

$$\varphi\left(\varphi^{-1}(y) +_1 \varphi^{-1}(y')\right) = \varphi\left(\varphi^{-1}(y)\right) +_2 \varphi\left(\varphi^{-1}(y')\right) = y +_2 y'$$

donc  $\varphi^{-1}(y) +_1 \varphi^{-1}(y')$  est l'antécédent de  $y +_2 y'$  par  $\varphi$ , c'est-à-dire

$$\varphi^{-1}(y) +_1 \varphi^{-1}(y') = \varphi^{-1}(y +_2 y').$$

On montre de même  $\varphi^{-1}(y) \times_1 \varphi^{-1}(y') = \varphi^{-1}(y \times_2 y')$ .

Donc  $\varphi^{-1}$  est un morphisme d'anneaux.

Donc  $\varphi^{-1}$  est un isomorphisme d'anneaux. ■

---

**Définition 6.118 (Endomorphisme)**

Soit  $A$  un anneau.

Un endomorphisme d'anneau de  $A$  est un morphisme d'anneaux  $\varphi : A \longrightarrow A$ .

---

**Définition 6.119 (Automorphisme)**

Soit  $A$  un anneau.

Un automorphisme de  $A$  est un isomorphisme d'anneaux  $\varphi : A \longrightarrow A$ , c'est-à-dire un endomorphisme de  $A$  bijectif.

L'ensemble des automorphismes d'anneau de  $A$  est noté  $\text{Aut}(A)$ .

---

*Exemple 6.120*

Soit  $A$  un anneau.

Alors  $(\text{Aut}(A), \circ)$  est un groupe, appelé le groupe des automorphismes de  $A$ .

---

*Démonstration 6.121*

★★ EXERCICE ★★ ■

### 6.3.6 Anneaux intègres

---

**Définition 6.122 (Anneau intègre)**

Soit  $(A, +, \times)$  un anneau. On note 0 son élément neutre pour  $+$ .

On dit que  $(A, +, \times)$  est un anneau intègre s'il est non-nul, commutatif et « sans diviseurs de 0 » :

$$\left\{ \begin{array}{l} 0 \neq 1 \\ \forall a, b \in A, \quad ab = ba \\ \forall a, b \in A, \quad ab = 0 \iff \left\{ \begin{array}{l} a = 0 \\ \text{ou} \\ b = 0 \end{array} \right. \end{array} \right.$$

---

**Exemple 6.123**

Si  $A = \mathbb{Z}^2$  alors  $(1, 0) \times (0, 1) = (0, 0)$  donc  $A$  est un anneau non-intègre.

Si  $A = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  alors  $1_{\mathbb{R}_+} \times 1_{\mathbb{R}_-} = 0$  donc  $A$  est un anneau non-intègre.

Les anneaux usuels  $\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{Q}$ ,  $\mathbb{R}$  et  $\mathbb{C}$  sont intègres.

---

**Remarque 6.124**

Un anneau est intègre si, et seulement si,  $(S) : \left\{ \begin{array}{l} \text{il est non-nul} \\ \text{il est commutatif} \\ \text{tout élément non-nul est régulier pour le produit} \end{array} \right.$

---

**Démonstration 6.125**

Soit  $(A, +, \times)$  un anneau intègre.

Soit  $a \in A \setminus \{0\}$ . Montrons que  $a$  est régulier pour  $\times$ .

Soient  $b, c \in A$  tels que  $ab = ac$ .

On a :

$$\begin{array}{l} ab - ac = 0 \\ a(b - c) = 0 \\ b - c = 0 \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} ab - ac = 0 \\ a(b - c) = 0 \\ b - c = 0 \end{array}} \right\} \text{car } A \text{ est intègre et } a \neq 0$$
$$b = c$$



Soit  $A$  un anneau tel que  $(S)$  soit vérifié.

Montrons que  $A$  est intègre.

Soient  $a, b \in A$  tels que  $ab = 0$ . Montrons que  $a = 0$  ou  $b = 0$ .

Si  $a = 0$  : OK.

Si  $a \neq 0$  alors  $ab = a \times 0$  donc  $b = 0$  car  $a$  est régulier et non-nul.

Donc  $A$  est intègre. ■

## 6.4 Corps

---

### Définition 6.126 (Corps)

Un corps est un anneau non-nul, commutatif et dont tout élément non-nul est inversible, c'est-à-dire un anneau  $(K, +, \times)$  tel que les conditions suivantes soient satisfaites :

- (1)  $K$  n'est pas un singleton, c'est-à-dire  $0 \neq 1$ .
- (2)  $K$  est un anneau commutatif.
- (3)  $K^\times = K \setminus \{0\}$ .

On dit aussi que  $K$  est muni d'une structure de corps, ou, par abus, que  $K$  est un corps.

---

### Proposition 6.127

Si  $K$  est un corps alors  $K \setminus \{0\}$  est un groupe commutatif.

---

#### Démonstration 6.128

On sait que le groupe des inversibles d'un anneau est un groupe pour la loi  $\times$  donc  $(K^\times, \times)$  est un groupe (cf. Définition/Proposition 6.96).

De plus, on a  $K^\times = K \setminus \{0\}$  et  $\times$  est commutative.

Donc  $(K \setminus \{0\}, \times)$  est commutatif. ■

---

### Proposition 6.129

Tout corps est un anneau intègre.

---

*Démonstration 6.130*

C'est clair car le fait que tous les éléments non-nuls soient inversibles implique le fait que tous les éléments non-nuls soient réguliers. ■

---

*Exemple 6.131*

On vérifie facilement que  $(\mathbb{Q}, +, \times)$ ,  $(\mathbb{R}, +, \times)$  et  $(\mathbb{C}, +, \times)$  sont des corps.

---

*Exemple 6.132*

Soient  $(K_1, +_1, \times_1)$  et  $(K_2, +_2, \times_2)$  deux corps (donc deux anneaux dont on note  $0_1$  et  $1_1$  et  $0_2$  et  $1_2$  les neutres).

On a vu que  $K_1 \times K_2$  est naturellement muni d'une structure d'anneau (cf. Exemple 6.82).

Cependant, ce n'est pas un corps.

En effet, il n'est pas intègre :  $(1_1, 0_2) (0_1, 1_2) = (0_1, 0_2)$ .

---

*Exemple 6.133*

Soit  $I$  un ensemble et  $K$  un corps.

On a vu que  $\mathcal{F}(I, K)$  est naturellement muni d'une structure d'anneau (cf. Exemple 6.83).

Si  $I = \emptyset$  alors  $\mathcal{F}(I, K)$  n'est pas un corps car c'est l'anneau nul.

Si  $I = \{x\}$  est un singleton alors  $\varphi : K \longrightarrow \mathcal{F}(\{x\}, K)$  est un isomorphisme d'anneaux. Or

$$\begin{array}{ccc} \lambda & \longmapsto & \{x\} \longrightarrow K \\ & & x \longmapsto \lambda \end{array}$$

$K$  est un corps donc  $\mathcal{F}(I, K)$  est un corps.

Si  $I$  contient au moins deux éléments  $x$  et  $y$  avec  $x \neq y$  alors  $\mathcal{F}(I, K)$  est un anneau non-intègre car

$$\begin{array}{ccc} f : I \longrightarrow K & \text{et} & g : I \longrightarrow K \\ z \longmapsto \begin{cases} 1 & \text{si } z = x \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} & & z \longmapsto \begin{cases} 1 & \text{si } z = y \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \end{array} \quad \text{vérifient } f \neq 0, g \neq 0 \text{ et } fg = 0.$$

Donc  $\mathcal{F}(I, K)$  n'est pas un corps.

# Chapitre 7

## Limites de fonctions, continuité

### Sommaire

---

<b>7.1</b>	<b>Voisinages . . . . .</b>	<b>.172</b>
7.1.1	Définition . . . . .	172
7.1.2	Vocabulaire lié aux voisinages . . . . .	173
<b>7.2</b>	<b>Limite d'une fonction en un point de <math>\overline{\mathbb{R}}</math>. . . . .</b>	<b>.175</b>
7.2.1	Définition d'une limite . . . . .	176
7.2.2	Limites et ordre . . . . .	181
7.2.3	Compléments . . . . .	183
	7.2.3.1 Limites à droite/gauche . . . . .	183
	7.2.3.2 Limites par valeurs supérieures/inférieures . . . . .	184
7.2.4	Opérations sur les limites . . . . .	185
7.2.5	Caractérisation séquentielle de la limite . . . . .	189
7.2.6	Théorème de la limite monotone . . . . .	190
<b>7.3</b>	<b>Continuité. . . . .</b>	<b>.194</b>
7.3.1	Fonctions continues en un point . . . . .	194
	7.3.1.1 Définitions . . . . .	194
	7.3.1.2 Propriétés . . . . .	198
	7.3.1.3 Caractérisation séquentielle . . . . .	199
7.3.2	Fonctions continues . . . . .	200
	7.3.2.1 Définition . . . . .	200
	7.3.2.2 Propriétés . . . . .	200
	7.3.2.3 Caractérisation séquentielle . . . . .	201
	7.3.2.4 Exemples usuels . . . . .	201
	7.3.2.5 Remarque . . . . .	202
7.3.3	Fonctions continues sur un intervalle . . . . .	202
	7.3.3.1 Intervalles . . . . .	202
	7.3.3.2 Théorème des valeurs intermédiaires . . . . .	203
7.3.4	Fonctions continues sur un segment . . . . .	207
7.3.5	Fonctions continues injectives sur un intervalle . . . . .	209
7.3.6	Fonctions circulaires réciproques . . . . .	211
	7.3.6.1 Arcsin . . . . .	211
	7.3.6.2 Arccos . . . . .	213
	7.3.6.3 Arctan . . . . .	214
	7.3.6.4 Relations à connaître . . . . .	215

7.4	Propriétés plus fortes que la continuité . . . . .	217
7.4.1	Continuité uniforme . . . . .	217
7.4.2	Fonctions lipschitziennes . . . . .	220

---

## 7.1 Voisinages

### 7.1.1 Définition

#### Définition 7.1

Soit  $V \subseteq \mathbb{R}$ .

Soit  $a \in \mathbb{R}$ . On dit que  $V$  est un voisinage de  $a$  dans  $\mathbb{R}$  si on a :

$$\exists \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, ]a - \varepsilon ; a + \varepsilon[ \subseteq V.$$

On dit que  $V$  est un voisinage de  $+\infty$  dans  $\mathbb{R}$  si on a :

$$\exists \alpha \in \mathbb{R}, ]\alpha ; +\infty[ \subseteq V.$$

On dit que  $V$  est un voisinage de  $-\infty$  dans  $\mathbb{R}$  si on a :

$$\exists \alpha \in \mathbb{R}, ]-\infty ; \alpha[ \subseteq V.$$

#### Exemple 7.2

$\mathbb{R}$  est un voisinage de tout point  $a \in \overline{\mathbb{R}}$ .

$\mathbb{R}_+$  est un voisinage de  $+\infty$ .

Si  $a \in \mathbb{R}_+^*$  alors  $\mathbb{R}_+$  est un voisinage de  $a$  car  $]a - \varepsilon ; a + \varepsilon[ \subseteq \mathbb{R}_+$  avec  $\varepsilon = a$ .

$\mathbb{R}_+$  n'est pas un voisinage de 0 car  $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, ]0 - \varepsilon ; 0 + \varepsilon[ \not\subseteq \mathbb{R}_+$ .

Pour tout  $a \in \mathbb{R}_-$  on a :  $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, ]a - \varepsilon ; a + \varepsilon[ \not\subseteq \mathbb{R}_+$  car  $a \notin \mathbb{R}_+$ .

$\mathbb{R}_+$  n'est pas un voisinage de  $-\infty$ .

L'ensemble des points dont  $\mathbb{R}_+$  est un voisinage est donc  $]0 ; +\infty[$ .

L'ensemble des points dont  $[0 ; 1]$  est un voisinage est  $]0 ; 1[$ .

Soit  $a \in \mathbb{R}$ . On a  $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, ]a - \varepsilon ; a + \varepsilon[ \cap (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \neq \emptyset$  car  $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$  est dense dans  $\mathbb{R}$ .

Donc  $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, ]a - \varepsilon ; a + \varepsilon[ \not\subseteq \mathbb{Q}$ .

Donc  $\mathbb{Q}$  n'est le voisinage d'aucun réel.

De même,  $\mathbb{Q}$  n'est pas un voisinage de  $+\infty$  ni de  $-\infty$ .

---

**Notation 7.3**

Soit  $a \in \overline{\mathbb{R}}$ .

Dans ce cours, on notera  $\mathcal{V}(a)$  l'ensemble des voisinages de  $a$  dans  $\mathbb{R}$ .

---

**Proposition 7.4**

Soient  $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$ .

(1) Si  $a \in \mathbb{R}$  alors tout voisinage de  $a$  contient  $a$  :

$$\forall V \in \mathcal{V}(a), \quad a \in V.$$

(2) L'intersection de deux voisinages de  $a$  est encore un voisinage de  $a$  :

$$\forall V, W \in \mathcal{V}(a), \quad V \cap W \in \mathcal{V}(a).$$

(3) Si  $a \neq b$  alors  $a$  et  $b$  admettent des voisinages respectifs disjoints :

$$\exists V \in \mathcal{V}(a), \quad \exists W \in \mathcal{V}(b), \quad V \cap W = \emptyset.$$

---

Démonstration 7.5

★★ EXERCICE ★★

■

---

Remarque 7.6 (Reformulation de la définition d'une partie dense de  $\mathbb{R}$  (Définition 5.87))

Soit  $A \subseteq \mathbb{R}$ .

On a :

$$A \text{ dense dans } \mathbb{R} \iff \forall x \in \mathbb{R}, \quad \forall V \in \mathcal{V}(x), \quad A \cap V \neq \emptyset.$$

### 7.1.2 Vocabulaire lié aux voisinages

Si  $a \in \overline{\mathbb{R}}$ , on dit qu'une propriété est vraie « au voisinage de  $a$  » si elle est vraie sur un certain voisinage de  $a$ .

---

**Définition 7.7**

Soient  $a \in \overline{\mathbb{R}}$ ,  $A \subseteq \mathbb{R}$  et  $f : A \longrightarrow \mathbb{R}$ .

On dit que  $f$  est bornée au voisinage de  $a$  s'il existe un voisinage  $V$  de  $a$  tel que la restriction  $f|_{A \cap V}$  soit bornée :

$$\exists V \in \mathcal{V}(a), \quad \exists M \in \mathbb{R}_+, \quad \forall x \in A \cap V, \quad |f(x)| \leq M.$$

---

**Exemple 7.8**

La fonction  $\exp : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$  est bornée au voisinage de tout point  $a \in [-\infty ; +\infty[$ .

Elle n'est pas bornée au voisinage de  $+\infty$ .

---

**Démonstration 7.9**

On a  $\forall x \in ]a - 1 ; a + 1[$ ,  $0 < \exp x < e^{a+1}$  donc  $\exp$  est bornée au voisinage de  $a$ .

De plus,  $\forall x \in \mathbb{R}_-$ ,  $0 < \exp x \leq 1$  donc  $\exp$  est bornée au voisinage de  $-\infty$  (car  $\mathbb{R}_- \in \mathcal{V}(-\infty)$ ). ■

---

**Définition 7.10**

Soient  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $f, g \in \mathcal{F}(A, \mathbb{R})$  et  $a \in \overline{\mathbb{R}}$ .

On dit que  $f$  et  $g$  coïncident au voisinage de  $a$  si on a :

$$\exists V \in \mathcal{V}(a), \forall x \in A \cap V, f(x) = g(x).$$

---

**Rappel 7.11 (Extremum global)**

Soient  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $f : A \longrightarrow \mathbb{R}$  et  $a \in A$ .

On dit que  $f$  admet un maximum (global) en  $a$  si on a :  $\forall x \in A, f(x) \leq f(a)$ .

On dit que  $f$  admet un minimum (global) en  $a$  si on a :  $\forall x \in A, f(x) \geq f(a)$ .

On dit que  $f$  admet un extremum (global) en  $a$  si  $f$  admet un maximum ou un minimum en  $a$ .

---

**Définition 7.12 (Extremum local)**

Soient  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $f : A \longrightarrow \mathbb{R}$  et  $a \in A$ .

On dit que  $f$  admet un maximum local en  $a$  s'il existe un voisinage  $V$  de  $a$  tel que  $f|_{V \cap A}$  admette un maximum global en  $a$ , c'est-à-dire si on a :

$$\exists V \in \mathcal{V}(a), \forall x \in V \cap A, f(x) \leq f(a).$$

On dit que  $f$  admet un minimum local en  $a$  s'il existe un voisinage  $V$  de  $a$  tel que  $f|_{V \cap A}$  admette un minimum global en  $a$ , c'est-à-dire si on a :

$$\exists V \in \mathcal{V}(a), \forall x \in V \cap A, f(x) \geq f(a).$$


On dit que  $f$  admet un extremum local en  $a$  si  $f$  admet un maximum local ou un minimum local en  $a$ .



---

*Exemple 7.13*

Posons  $f : [0 ; 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R} :$   
 $x \longmapsto \sin x$



$f$  admet :

- un maximum global en  $\frac{\pi}{2}$  ;
- un minimum global en  $\frac{3\pi}{2}$  ;
- un maximum local en  $2\pi$  ;
- un minimum local en  $0$ .

---

*Remarque 7.14*

Pluriel de maximum : maxima ou maximums.

Pluriel de minimum : minima ou minimums.

Pluriel d'extremum : extrema ou extremums.

## 7.2 Limite d'une fonction en un point de $\overline{\mathbb{R}}$

Dans ce chapitre, on considère une fonction  $f : A \longrightarrow \mathbb{R}$  définie sur une partie  $A \subseteq \mathbb{R}$  et on définit sa limite en un point  $a \in \overline{\mathbb{R}}$ .

Pour cela, on suppose qu'il existe des points où la fonction  $f$  est définie et qui sont arbitrairement proches de  $a$  (autrement, la limite n'a pas de sens).

Précisément, on supposera que tout voisinage de  $a$  dans  $\mathbb{R}$  rencontre  $A$  :

$$\forall V \in \mathcal{V}(a), \quad V \cap A \neq \emptyset.$$

Si  $a = +\infty$ , cela signifie que  $A$  est une partie non-majorée de  $\mathbb{R}$ .

Si  $a = -\infty$ , cela signifie que  $A$  est une partie non-minorée de  $\mathbb{R}$ .

Si  $a \in \mathbb{R}$ , cela signifie :  $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists a' \in A, |a' - a| \leq \varepsilon$ .

### 7.2.1 Définition d'une limite

---

#### Définition/Proposition 7.15

Soient  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $f : A \longrightarrow \mathbb{R}$  et  $a, \ell \in \overline{\mathbb{R}}$ .

On suppose que tout voisinage de  $a$  dans  $\mathbb{R}$  rencontre  $A$  :

$$\forall V \in \mathcal{V}(a), V \cap A \neq \emptyset.$$

On dit que «  $f(x)$  tend vers  $\ell$  quand  $x$  tend vers  $a$  » ou que «  $f$  tend vers  $\ell$  en  $a$  » si on a :

$$\forall V \in \mathcal{V}(\ell), \exists W \in \mathcal{V}(a), \forall x \in W \cap A, f(x) \in V,$$

c'est-à-dire :

$$\forall V \in \mathcal{V}(\ell), \exists W \in \mathcal{V}(a), f(W \cap A) \subseteq V.$$

Unicité de la limite : il existe au plus un élément  $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$  tel que  $f$  tende vers  $\ell$  en  $a$ . S'il existe, on appelle cet élément  $\ell$  la limite de  $f$  en  $a$  et on le note :

$$\lim_a f \quad \text{ou} \quad \lim_{x \rightarrow a} f(x) \quad \text{ou} \quad \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in A}} f(x).$$

---

#### Démonstration 7.16

Soient  $\ell, \ell' \in \overline{\mathbb{R}}$  deux limites de  $f$  en  $a$ . Montrons que  $\ell = \ell'$ .

Par l'absurde, supposons  $\ell \neq \ell'$ .

Soient  $V \in \mathcal{V}(\ell)$  et  $V' \in \mathcal{V}(\ell')$  tels que  $V \cap V' = \emptyset$ .

Soit  $W \in \mathcal{V}(a)$  tel que  $f(W \cap A) \subseteq V$ .

Soit  $W' \in \mathcal{V}(a)$  tel que  $f(W' \cap A) \subseteq V'$ .

On pose  $W'' = W \cap W'$ . On a  $W'' \in \mathcal{V}(a)$  selon la Proposition 7.4.

De plus :

$$\begin{aligned} f(W'' \cap A) &\subseteq f(W \cap A) \cap f(W' \cap A) \\ &\subseteq V \cap V' \\ &= \emptyset : \text{contradiction.} \end{aligned}$$

■

---

*Remarque 7.17*

Lorsqu'on utilise une notation de limite dans une formule mathématique, on prétend que la limite existe.

Par exemple, la proposition «  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq 0$  » signifie que la limite existe et est non-nulle (ce n'est donc pas la négation de la proposition «  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$  »).

En revanche, si on écrit par exemple «  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  existe  $\iff \dots$  », on ne suppose pas a priori que la limite existe.

---

*Remarque 7.18*

La limite d'une fonction  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$  en  $+\infty$  coïncide avec celle de la suite  $(f(n))_{n \in \mathbb{N}}$ .

---

*Remarque 7.19*

Soient  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  et  $a, \ell \in \overline{\mathbb{R}}$ .

Si  $\ell \in \mathbb{R}$  alors on a

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \iff \lim_{x \rightarrow a} f(x) - \ell = 0.$$

Si  $a \in \mathbb{R}$  alors on a

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \iff \lim_{h \rightarrow 0} f(a + h) = \ell.$$

---

*Remarque 7.20*

Soient  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $f, g \in \mathcal{F}(A, \mathbb{R})$  et  $a \in \overline{\mathbb{R}}$ .

Si  $f$  et  $g$  coïncident au voisinage de  $a$  alors  $f$  admet une limite en  $a$  si, et seulement si,  $g$  admet une limite en  $a$ . Les deux limites sont alors égales.

---

**Proposition 7.21 (Reformulation de la Définition/Proposition 7.15 au cas par cas)**

Soient  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  et  $a, \ell \in \overline{\mathbb{R}}$ .

- Si  $a \in \mathbb{R}$  et  $\ell \in \mathbb{R}$  : on suppose  $\forall \delta \in \mathbb{R}_+^*, \exists x \in A, |x - a| \leq \delta$ . On a :

$$\ell = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \iff [\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists \delta \in \mathbb{R}_+^*, \forall x \in A, |x - a| \leq \delta \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon].$$

- Si  $a \in \mathbb{R}$  et  $\ell = +\infty$  : on suppose  $\forall \delta \in \mathbb{R}_+^*, \exists x \in A, |x - a| \leq \delta$ . On a :

$$\ell = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \iff [\forall \alpha \in \mathbb{R}, \exists \delta \in \mathbb{R}_+^*, \forall x \in A, |x - a| \leq \delta \implies f(x) \geq \alpha].$$

- Si  $a \in \mathbb{R}$  et  $\ell = -\infty$  : on suppose  $\forall \delta \in \mathbb{R}_+^*, \exists x \in A, |x - a| \leq \delta$ . On a :

$$\ell = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \iff [\forall \alpha \in \mathbb{R}, \exists \delta \in \mathbb{R}_+^*, \forall x \in A, |x - a| \leq \delta \implies f(x) \leq \alpha].$$

- Si  $a = +\infty$  et  $\ell \in \mathbb{R}$  : on suppose la partie  $A$  non-majorée. On a :

$$\ell = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \iff [\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists \beta \in \mathbb{R}, \forall x \in A, x \geq \beta \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon].$$

- Si  $a = +\infty$  et  $\ell = +\infty$  : on suppose la partie  $A$  non-majorée. On a :

$$\ell = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \iff [\forall \alpha \in \mathbb{R}, \exists \beta \in \mathbb{R}, \forall x \in A, x \geq \beta \implies f(x) \geq \alpha].$$

- Si  $a = +\infty$  et  $\ell = -\infty$  : on suppose la partie  $A$  non-majorée. On a :

$$\ell = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \iff [\forall \alpha \in \mathbb{R}, \exists \beta \in \mathbb{R}, \forall x \in A, x \geq \beta \implies f(x) \leq \alpha].$$

- Si  $a = -\infty$  et  $\ell \in \mathbb{R}$  : on suppose la partie  $A$  non-minorée. On a :

$$\ell = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \iff [\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists \beta \in \mathbb{R}, \forall x \in A, x \leq \beta \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon].$$

- Si  $a = -\infty$  et  $\ell = +\infty$  : on suppose la partie  $A$  non-minorée. On a :

$$\ell = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \iff [\forall \alpha \in \mathbb{R}, \exists \beta \in \mathbb{R}, \forall x \in A, x \leq \beta \implies f(x) \geq \alpha].$$

- Si  $a = -\infty$  et  $\ell = -\infty$  : on suppose la partie  $A$  non-minorée. On a :

$$\ell = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \iff [\forall \alpha \in \mathbb{R}, \exists \beta \in \mathbb{R}, \forall x \in A, x \leq \beta \implies f(x) \leq \alpha].$$

*Rappel 7.22 (Définition de  $a^b$ )*

Soient  $a, b \in \mathbb{R}$ .

L'expression  $a^b$  est définie dans plusieurs cas :

- Si  $b \in \mathbb{N}$  alors on pose

$$a^b = \underbrace{a \times \cdots \times a}_{b \text{ facteurs}}.$$

Autrement dit (définition par récurrence) :

$$\begin{cases} a^0 = 1 \\ \forall b \in \mathbb{N}, a^{b+1} = a \times a^b \end{cases}$$

- Si  $a \neq 0$  et  $b \in \mathbb{Z}$  : on étend la définition précédente en posant, si  $b$  est un entier strictement négatif :

$$a^b = \frac{1}{a^{-b}}.$$

- Si  $a > 0$  alors on pose

$$a^b = e^{b \ln a}.$$

- Si  $a = 0$  et  $b \geq 0$  alors on pose :

$$0^b = \begin{cases} 1 & \text{si } b = 0 \\ 0 & \text{si } b > 0 \end{cases}$$

Lorsque plusieurs cas s'appliquent, ils donnent le même résultat.

### Exemple 7.23

Soit  $\lambda \in \mathbb{R}$ . On a :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\lambda = \begin{cases} +\infty & \text{si } \lambda > 0 \\ 1 & \text{si } \lambda = 0 \\ 0 & \text{si } \lambda < 0 \end{cases} \quad \text{et} \quad \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x \in \mathbb{R}_+^*}} x^\lambda = \begin{cases} 0 & \text{si } \lambda > 0 \\ 1 & \text{si } \lambda = 0 \\ +\infty & \text{si } \lambda < 0 \end{cases}$$

### Démonstration 7.24

Si  $\lambda > 0$  :

Montrons que

$$\forall \alpha \in \mathbb{R}_+^*, \exists \beta \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}_+^*, x \geq \beta \implies x^\lambda \geq \alpha.$$

Soit  $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$ .

On a

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R}_+^*, x^\lambda \geq \alpha &\iff (x^\lambda)^{1/\lambda} \geq \alpha^{1/\lambda} \\ &\iff x \geq \alpha^{1/\lambda} \end{aligned}$$

car  $t \mapsto t^{1/\lambda} = e^{\ln t / \lambda}$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}_+^*$  car  $\lambda > 0$ .

Donc le réel  $\beta = \alpha^{1/\lambda}$  convient.

Donc  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\lambda = +\infty$ .

Montrons que

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists \delta \in \mathbb{R}_+^*, \forall x \in \mathbb{R}_+^*, x \leq \delta \implies |x^\lambda - 0| \leq \varepsilon.$$

Soit  $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$ .

On a

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R}_+^*, |x^\lambda - 0| \leq \varepsilon &\iff x^\lambda \leq \varepsilon \\ &\iff x \leq \varepsilon^{1/\lambda}. \end{aligned}$$

Donc  $\delta = \varepsilon^{1/\lambda}$  convient.

Donc  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x \in \mathbb{R}_+^*}} x^\lambda = 0$ .

Si  $\lambda = 0$  :

On a  $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, x^\lambda = 1$  donc

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} x^\lambda = 1 \\ \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x \in \mathbb{R}_+^*}} x^\lambda = 1 \end{cases}$$

Si  $\lambda < 0$  :

La fonction  $t \mapsto t^{1/\lambda} = e^{\ln t / \lambda}$  est strictement décroissante sur  $\mathbb{R}_+^*$ .

Montrons que

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists \beta \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}_+^*, x \geq \beta \implies |x^\lambda| \leq \varepsilon.$$

Soit  $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$ .

Le réel  $\beta = \varepsilon^{1/\lambda}$  convient.

Donc  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x^\lambda = 0$ .

Montrons que

$$\forall \alpha \in \mathbb{R}_+^*, \exists \delta \in \mathbb{R}_+^*, \forall x \in \mathbb{R}_+^*, x \leq \delta \implies x^\lambda \geq \alpha.$$

Soit  $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$ .

Le réel  $\delta = \alpha^{1/\lambda}$  convient car  $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, x \leq \delta \implies x^\lambda \geq \alpha$ .

Donc  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x \in \mathbb{R}_+^*}} x^\lambda = +\infty$ . ■

---

### Remarque 7.25

Soient  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  et  $a \in A$ .

On suppose que  $f$  est définie en  $a$ .

Si  $f$  admet une limite en  $a$  alors cette limite est  $f(a)$ .

---

### Démonstration 7.26

Supposons que  $f$  possède une limite  $\ell$  en  $a$ .

Montrons que  $\ell = f(a)$ .

On a

$$\forall V \in \mathcal{V}(\ell), \exists W \in \mathcal{V}(a), \forall x \in A \cap W, f(x) \in V.$$

Donc

$$\forall V \in \mathcal{V}(\ell), f(a) \in V$$

$$\text{car } \begin{cases} \forall W \in \mathcal{V}(a), a \in W \\ a \in A \end{cases} \quad \text{donc } a \in A \cap W.$$

Donc  $f(a) = \ell$  car sinon il existe  $V' \in \mathcal{V}(f(a))$  tel que  $\begin{cases} V \cap V' = \emptyset \\ f(a) \in V' \end{cases}$  donc  $f(a) \notin V$ . ■

## 7.2.2 Limites et ordre

### Proposition 7.27

Soient  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $a, \ell \in \overline{\mathbb{R}}$  et  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

On suppose

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell.$$

Si  $\lambda > \ell$  alors  $\lambda$  majore strictement  $f$  au voisinage de  $a$  :

$$\exists V \in \mathcal{V}(a), \forall x \in V \cap A, f(x) < \lambda.$$

Si  $\lambda < \ell$  alors  $\lambda$  minore strictement  $f$  au voisinage de  $a$  :

$$\exists V \in \mathcal{V}(a), \forall x \in V \cap A, f(x) > \lambda.$$

### Démonstration 7.28

Supposons  $\lambda > \ell$ .

Alors  $V = ]-\infty; \lambda[ \in \mathcal{V}(\ell)$ .

Donc il existe  $W \in \mathcal{V}(a)$  tel que

$$\forall x \in A, x \in W \implies f(x) \in V.$$

C'est-à-dire  $\forall x \in A, x \in W \implies f(x) < \lambda$ .

Si  $\lambda < \ell$  : idem en prenant  $V = ]\lambda; +\infty[$ . ■

### Corollaire 7.29

Soient  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  et  $a \in \overline{\mathbb{R}}$ .

Si  $f$  tend vers une limite finie en  $a$  alors  $f$  est bornée au voisinage de  $a$ .

Si  $f$  tend vers  $+\infty$  en  $a$  alors  $f$  est minorée au voisinage de  $a$ .

Si  $f$  tend vers  $-\infty$  en  $a$  alors  $f$  est majorée au voisinage de  $a$ .

---

*Démonstration 7.30*

Supposons que  $f$  tend vers une limite  $\ell \in \mathbb{R}$  en  $a$ .

On a  $\ell - 1 < \ell < \ell + 1$  donc

$$\begin{cases} \exists V_1 \in \mathcal{V}(a), \forall x \in A \cap V_1, \ell - 1 < f(x) \\ \exists V_2 \in \mathcal{V}(a), \forall x \in A \cap V_2, \ell + 1 > f(x) \end{cases}$$

selon la Proposition 7.27.

D'où, avec  $V = V_1 \cap V_2$  :

$$\forall x \in A \cap V, \ell - 1 < f(x) < \ell + 1$$

donc  $f$  est bornée au voisinage de  $a$ .

Supposons  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ .

On a  $0 < +\infty$ . Donc 0 minore strictement  $f$  au voisinage de  $a$  selon la Proposition 7.27.

Idem si  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$ . ■

---

**Corollaire 7.31 (Passage à la limite dans une inégalité, version 1)**

Soient  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $a \in \overline{\mathbb{R}}$  et  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

On suppose que  $f$  admet une limite en  $a$ .

Si  $f$  est minorée par  $\lambda$  au voisinage de  $a$ , c'est-à-dire  $\exists V \in \mathcal{V}(a), \forall x \in A \cap V, \lambda \leq f(x)$ , alors

$$\lambda \leq \lim_{x \rightarrow a} f(x).$$

Si  $f$  est majorée par  $\lambda$  au voisinage de  $a$ , c'est-à-dire  $\exists V \in \mathcal{V}(a), \forall x \in A \cap V, \lambda \geq f(x)$ , alors

$$\lambda \geq \lim_{x \rightarrow a} f(x).$$

---

*Démonstration 7.32*

On suppose  $\lambda \leq f$  au voisinage de  $a$ .

Montrons que  $\lambda \leq \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ .

Par l'absurde, supposons  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) < \lambda$ .

Alors  $\lambda$  majore strictement  $f$  au voisinage de  $a$  :

$$\exists V_2 \in \mathcal{V}(a), \forall x \in A \cap V_2, f(x) < \lambda.$$

Or on a :

$$\exists V_1 \in \mathcal{V}(a), \forall x \in A \cap V_1, \lambda \leq f(x).$$



Considérons de tels voisinages  $V_1, V_2$  de  $a$  et posons  $V = V_1 \cap V_2$ .

On a  $V \in \mathcal{V}(a)$  et  $\forall x \in A \cap V$ , 
$$\begin{cases} f(x) \geq \lambda \\ f(x) < \lambda \end{cases}$$

Donc  $A \cap V = \emptyset$  : contradiction avec l'existence de  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ .

Idem si  $\lambda \geq f$  au voisinage de  $a$ . ■

### Proposition 7.33 (Théorème des gendarmes)

Soient  $A \subseteq \mathbb{R}$ , trois fonctions  $f, g, h \in \mathcal{F}(A, \mathbb{R})$  et  $a \in \overline{\mathbb{R}}$ .

Si on a  $\forall x \in A$ ,  $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$  et si  $g$  et  $h$  admettent la même limite finie  $\ell$  en  $a$ , alors on a

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell.$$

Si on a  $\forall x \in A$ ,  $g(x) \leq f(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty$ , alors on a

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty.$$

Si on a  $\forall x \in A$ ,  $f(x) \leq h(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = -\infty$ , alors on a

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty.$$

NB : dans les trois cas, la proposition assure l'existence de la limite de  $f$  en  $a$ .

Démonstration 7.34

★★ Exercice ★★ (s'inspirer de la démonstration du théorème des gendarmes pour les suites (Démonstration 5.33 et Démonstration 5.69)). ■

## 7.2.3 Compléments

### 7.2.3.1 Limites à droite/gauche

#### Définition 7.35 (Limite à droite)

Soient  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  et  $a \in \mathbb{R}$ .

On appelle limite à droite de  $f$  en  $a$  la limite en  $a$ , si elle existe, de la restriction  $f|_{A \cap ]a; +\infty[}$ . On la note alors :

$$\lim_{a^+} f \quad \text{ou} \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \quad \text{ou} \quad \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} f(x).$$

NB : pour que cette limite existe, il faut en particulier que tout voisinage de  $a$  rencontre l'ensemble  $A \cap ]a; +\infty[$ .

---

**Définition 7.36 (Limite à gauche)**

Soient  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  et  $a \in \mathbb{R}$ .

On appelle limite à gauche de  $f$  en  $a$  la limite en  $a$ , si elle existe, de la restriction  $f|_{A \cap ]-\infty; a[}$ . On la note alors :

$$\lim_{a^-} f \quad \text{ou} \quad \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) \quad \text{ou} \quad \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x < a}} f(x).$$

NB : pour que cette limite existe, il faut en particulier que tout voisinage de  $a$  rencontre l'ensemble  $A \cap ]-\infty; a[$ .

---

**Exemple 7.37**

On a :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} [x] = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} [x] = -1.$$

---

**Proposition 7.38**

Soient  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $a \in \mathbb{R}$  et  $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$ .

On suppose que tout voisinage de  $a$  rencontre les ensembles  $A \cap ]-\infty; a[$  et  $A \cap ]a; +\infty[$ .

Si  $f$  n'est pas définie en  $a$  alors

$$\lim_a f = \ell \iff \lim_{a^-} f = \lim_{a^+} f = \ell.$$

Si  $f$  est définie en  $a$  alors

$$\lim_a f = \ell \iff \lim_{a^-} f = \lim_{a^+} f = f(a) = \ell.$$

### 7.2.3.2 Limites par valeurs supérieures/inférieures

---

**Notation 7.39 (Limite par valeurs supérieures)**

Soient  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $a \in \overline{\mathbb{R}}$  et  $\ell \in \mathbb{R}$ .

La notation  $\lim_a f = \ell^+$  signifie que  $f$  tend vers  $\ell$  en  $a$  et qu'on a  $f > \ell$  au voisinage de  $a$  :

$$\lim_a f = \ell^+ \iff \begin{cases} \lim_a f = \ell \\ \exists V \in \mathcal{V}(a), \forall x \in A \cap V, f(x) > \ell \end{cases}$$

On dit alors que  $f$  tend vers  $\ell$  en  $a$  par valeurs supérieures.

---

**Notation 7.40 (Limite par valeurs inférieures)**

Soient  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $a \in \overline{\mathbb{R}}$  et  $\ell \in \mathbb{R}$ .

La notation  $\lim_a f = \ell^-$  signifie que  $f$  tend vers  $\ell$  en  $a$  et qu'on a  $f < \ell$  au voisinage de  $a$  :

$$\lim_a f = \ell^- \iff \begin{cases} \lim_a f = \ell \\ \exists V \in \mathcal{V}(a), \forall x \in A \cap V, f(x) < \ell \end{cases}$$

On dit alors que  $f$  tend vers  $\ell$  en  $a$  par valeurs inférieures.

---

**Exemple 7.41**

On a :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0^+ \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} x = 0^- \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0^+ \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0^-.$$

## 7.2.4 Opérations sur les limites

---

**Proposition 7.42**

Soient  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $f, g \in \mathcal{F}(A, \mathbb{R})$  et  $a \in \overline{\mathbb{R}}$ .

Si  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$  et  $g$  bornée au voisinage de  $a$  alors

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) g(x) = 0$$

.

Si  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$  et  $g$  minorée au voisinage de  $a$  alors

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) + g(x) = +\infty$$

.

Si  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$  et  $g$  majorée au voisinage de  $a$  alors

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) + g(x) = -\infty$$

.

---

**Démonstration 7.43**

★★ **Exercice** ★★ (s'inspirer des démonstrations analogues sur les suites (Démonstration 5.43 et Démonstration 5.55)). ■

---

**Proposition 7.44 (Opérations algébriques sur les limites)**

Soient  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $f, g \in \mathcal{F}(A, \mathbb{R})$ ,  $a, \ell, \ell' \in \overline{\mathbb{R}}$  et  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ .

On suppose

$$\lim_a f = \ell \quad \text{et} \quad \lim_a g = \ell'.$$

Si la somme  $\ell + \ell'$  est bien définie dans  $\overline{\mathbb{R}}$  (c'est-à-dire si  $(\ell, \ell') \notin \{(-\infty, +\infty); (+\infty, -\infty)\}$ ), alors

$$\lim_a (f + g) = \ell + \ell'.$$

Plus généralement, si la combinaison linéaire  $\lambda\ell + \mu\ell'$  est bien définie dans  $\overline{\mathbb{R}}$ , alors

$$\lim_a (\lambda f + \mu g) = \lambda\ell + \mu\ell'.$$

Si le produit  $\ell\ell'$  est bien défini dans  $\overline{\mathbb{R}}$  (c'est-à-dire si  $(\ell, \ell') \notin \{(-\infty, 0); (+\infty, 0); (0; +\infty); (0; -\infty)\}$ ), alors

$$\lim_a fg = \ell\ell'.$$

Si  $\lim_a f = +\infty$  alors

$$\lim_a \frac{1}{f} = 0^+.$$

Si  $\lim_a f = -\infty$  alors

$$\lim_a \frac{1}{f} = 0^-.$$

Si  $\lim_a f = \ell \in \mathbb{R}^*$  alors

$$\lim_a \frac{1}{f} = \frac{1}{\ell}.$$

Si  $\lim_a f = 0^+$  alors

$$\lim_a \frac{1}{f} = +\infty.$$

Si  $\lim_a f = 0^-$  alors

$$\lim_a \frac{1}{f} = -\infty.$$

---

**Démonstration 7.45 (Somme)**

Supposons  $\ell, \ell' \in \mathbb{R}$ .

Montrons que  $\lim_a (f + g) = \ell + \ell'$ , c'est-à-dire :

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists V \in \mathcal{V}(a), \forall x \in A \cap V, |f(x) + g(x) - \ell - \ell'| \leq \varepsilon.$$

Soit  $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$ .

Soit  $V_1 \in \mathcal{V}(a)$  tel que  $\forall x \in A \cap V_1, |f(x) - \ell| \leq \frac{\varepsilon}{2}$ .

Soit  $V_2 \in \mathcal{V}(a)$  tel que  $\forall x \in A \cap V_2, |g(x) - \ell'| \leq \frac{\varepsilon}{2}$ .

Posons  $V = V_1 \cap V_2 \in \mathcal{V}(a)$ .

On a

$$\begin{aligned} \forall x \in A \cap V, |f(x) + g(x) - \ell - \ell'| &\leq |f(x) - \ell| + |g(x) - \ell'| \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} \\ &= \varepsilon \end{aligned}$$

Donc  $V$  convient.

Donc  $\lim_a (f + g) = \ell + \ell'$ .

Si  $\ell \in \{-\infty; +\infty\}$  ou  $\ell' \in \{-\infty; +\infty\}$ , alors  $\lim_a (f + g) = \ell + \ell'$  découle de la Proposition 7.42. ■

---

*Démonstration 7.46 (Autres opérations)*

★★ Exercice ★★ ■

---

**Proposition 7.47 (Composition de limites)**

Soient  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $B \subseteq \mathbb{R}$ ,  $f : A \longrightarrow B$ ,  $g : B \longrightarrow \mathbb{R}$  et  $a, b, c \in \overline{\mathbb{R}}$ .

On suppose

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b \quad \text{et} \quad \lim_{y \rightarrow b} g(y) = c.$$

Alors

$$\lim_{x \rightarrow a} g \circ f(x) = c.$$

---

*Démonstration 7.48*

Montrons que  $\lim_a g \circ f = c$ , c'est-à-dire

$$\forall V \in \mathcal{V}(c), \exists W \in \mathcal{V}(b), g \circ f(A \cap W) \subseteq V.$$

Soit  $V \in \mathcal{V}(c)$ .

Comme  $\lim_b g = c$ , il existe  $W_1 \in \mathcal{V}(b)$  tel que  $g(B \cap W_1) \subseteq V$ .

Comme  $\lim_a f = b$ , il existe  $W \in \mathcal{V}(a)$  tel que  $f(A \cap W) \subseteq W_1$ .

Ainsi, on a  $f(A \cap W) \subseteq W_1 \cap B$  car  $\text{Im } f \subseteq B$ .

Donc  $g(f(A \cap W)) \subseteq V$ .

C'est-à-dire  $g \circ f(A \cap W) \subseteq V$ .

Donc  $W$  convient.

D'où  $\lim_{x \rightarrow a} g \circ f(x) = c$ . ■

---

#### Remarque 7.49

On peut également composer des limites par valeurs supérieures avec des limites à droite ou des limites par valeurs inférieures avec des limites à gauche. Voir la proposition suivante, par exemple.

---

#### Proposition 7.50

Soient  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $B \subseteq \mathbb{R}$ ,  $f : A \rightarrow B$ ,  $g : B \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $a, c \in \overline{\mathbb{R}}$  et  $b \in \mathbb{R}$ .

On suppose

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b^+ \quad \text{et} \quad \lim_{y \rightarrow b^+} g(y) = c.$$

Alors

$$\lim_{x \rightarrow a} g \circ f(x) = c.$$

---

#### Corollaire 7.51 (Passage à la limite dans une inégalité, version 2)

Version 1 : Corollaire 7.31.

Soient  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $f, g \in \mathcal{F}(A, \mathbb{R})$  et  $a \in \overline{\mathbb{R}}$ .

On suppose que  $f$  et  $g$  admettent chacune une limite en  $a$  et qu'on a  $f \leq g$  au voisinage de  $a$ , c'est-à-dire :

$$\exists V \in \mathcal{V}(a), \quad \forall x \in A \cap V, \quad f(x) \leq g(x).$$

Alors

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow a} g(x).$$

---

#### Démonstration 7.52

Si  $\lim_a f$  et  $\lim_a g$  sont finies :

On a  $f \leq g$  au voisinage de  $a$ .

Donc  $0 \leq g - f$ .

Donc  $0 \leq \lim_a g - \lim_a f$  selon le Corollaire 7.31.

Donc  $\lim_a f \leq \lim_a g$ .

Si  $\lim_a f = +\infty$  alors  $\lim_a g = +\infty$  par le théorème des gendarmes.

Si  $\lim_a f = -\infty$  alors  $\lim_a f \leq \lim_a g$ .

Idem pour  $g$ . ■

## 7.2.5 Caractérisation séquentielle de la limite

### Proposition 7.53

Soient  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  et  $a, \ell \in \overline{\mathbb{R}}$ .

On suppose que tout voisinage de  $a$  rencontre  $A$ .

On a :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \iff \left[ \forall (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in A^{\mathbb{N}}, \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = \ell \right].$$

Autrement dit :  $f$  tend vers  $\ell$  en  $a$  si, et seulement si, pour toute suite  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  d'éléments de  $A$  qui tend vers  $a$ , la suite  $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$  tend vers  $\ell$ .

Démonstration 7.54

$\implies$

Supposons  $\lim_a f = \ell$ .

Soit  $(x_n)_n \in A^{\mathbb{N}}$  de limite  $a$ .

$$\text{On a } \begin{cases} \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a \\ \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \end{cases} \text{ donc}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = \ell.$$

$\impliedby$

Par contraposée :

Supposons que  $f$  ne tende pas vers  $\ell$  en  $a$ .

On a

$$\neg [\forall V \in \mathcal{V}(\ell), \exists W \in \mathcal{V}(a), \forall x \in A \cap W, f(x) \in V].$$

C'est-à-dire

$$\exists V \in \mathcal{V}(\ell), \forall W \in \mathcal{V}(a), \exists x \in A \cap W, f(x) \notin V.$$

Soit  $V$  un tel voisinage.

Supposons  $a \in \mathbb{R}$ .

On a

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \exists x_n \in A \cap \left] a - \frac{1}{n} ; a + \frac{1}{n} \right[ , f(x_n) \notin V.$$

En considérant pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$  un tel  $x_n$ , on obtient une suite  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*} \in A^{\mathbb{N}^*}$  telle que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \begin{cases} f(x_n) \notin V \\ |x_n - a| \leq \frac{1}{n} \end{cases}$$

On en déduit  $\lim_n x_n = a$  par le théorème des gendarmes.

Enfin,  $(f(x_n))_n$  ne tend pas vers  $\ell$  car  $\forall n \in \mathbb{N}^*, f(x_n) \notin V$ .

Supposons  $a = +\infty$ .

On prend cette fois  $W = [n ; +\infty[$  et on conclut de la même façon.

Si  $a = -\infty$ , idem avec  $W = ]-\infty ; n]$ . ■

---

### Exemple 7.55

Montrons que  $\sin$  n'admet pas de limite en  $+\infty$ .

Par l'absurde, supposons que  $\sin$  admet une limite  $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$  en  $+\infty$ .

En prenant  $\forall n \in \mathbb{N}, x_n = n\pi$ , on obtient une suite  $(x_n)_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  qui tend vers  $+\infty$ .

On a donc  $\lim_n \sin x_n = \ell$ .

Or  $\forall n \in \mathbb{N}, \sin x_n = 0$ .

Donc  $\ell = 0$ .

En prenant  $\forall n \in \mathbb{N}, y_n = \frac{\pi}{2} + 2n\pi$ , on obtient une suite  $(y_n)_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  qui tend vers  $+\infty$ .

On a donc  $\lim_n \sin y_n = \ell$ .

Or  $\forall n \in \mathbb{N}, \sin y_n = 1$ .

Donc  $\ell = 1$  : contradiction.

Donc  $\sin$  n'admet pas de limite en  $+\infty$ .

## 7.2.6 Théorème de la limite monotone



---

**Théorème 7.56 (Théorème de la limite monotone en  $+\infty$ )**

Soient  $A \subseteq \mathbb{R}$  et  $f : A \longrightarrow \mathbb{R}$ .

On suppose que  $f$  est monotone et que  $A$  est une partie de  $\mathbb{R}$  non-majorée.

Alors  $f$  admet une limite en  $+\infty$  :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \begin{cases} +\infty & \text{si } f \text{ est croissante et non-majorée} \\ \sup_A f & \text{si } f \text{ est croissante et majorée} \\ -\infty & \text{si } f \text{ est décroissante et non-minorée} \\ \inf_A f & \text{si } f \text{ est décroissante et minorée} \end{cases}$$

---

**Démonstration 7.57**

Supposons  $f$  croissante.

Si  $f$  est non-majorée :

Montrons que  $\lim_{+\infty} f = +\infty$ , c'est-à-dire

$$\forall \alpha \in \mathbb{R}, \exists \beta \in \mathbb{R}, \forall x \in A, x \geq \beta \implies f(x) \geq \alpha.$$

Soit  $\alpha \in \mathbb{R}$ .

Comme  $f$  n'est pas majorée, il existe  $\beta \in A$  tel que  $f(\beta) > \alpha$ .

Comme  $f$  est croissante, on a

$$\forall x \in A, x \geq \beta \implies f(x) \geq f(\beta) \geq \alpha.$$

Donc  $\beta$  convient et  $\lim_{+\infty} f = +\infty$ .

Si  $f$  est majorée :

La partie  $\text{Im } f$  de  $\mathbb{R}$  est non-vide car  $A$  est non-vide (car  $A$  est non-majorée) et majorée car  $f$  est majorée.

Donc  $f$  admet une borne supérieure  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

Montrons que  $\lim_{+\infty} f = \lambda$ , c'est-à-dire

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists \beta \in \mathbb{R}, \forall x \in A, x \geq \beta \implies |f(x) - \lambda| \leq \varepsilon.$$

Rappel :  $\lambda$  est caractérisée par 
$$\begin{cases} \forall x \in A, f(x) \leq \lambda \\ \forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists x \in A, \lambda - \varepsilon < f(x) \end{cases}$$

Soit  $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$ .

D'après la caractérisation de  $\lambda$ , il existe un point  $\beta \in A$  tel que  $\lambda - \varepsilon < f(\beta)$ .

On a

$$\forall x \in A, x \geq \beta \implies \lambda - \varepsilon < f(\beta) \leq f(x) \leq \lambda.$$

Donc

$$\forall x \in A, x \geq \beta \implies \lambda - \varepsilon \leq f(x) \leq \lambda + \varepsilon.$$

Donc

$$\forall x \in A, x \geq \beta \implies |f(x) - \lambda| \leq \varepsilon.$$

D'où  $\lim_{+\infty} f = \lambda$ .

Idem si  $f$  est décroissante. ■

### **Théorème 7.58 (Théorème de la limite monotone en $-\infty$ )**

Soient  $A \subseteq \mathbb{R}$  et  $f : A \longrightarrow \mathbb{R}$ .

On suppose que  $f$  est monotone et que  $A$  est une partie de  $\mathbb{R}$  non-minorée.

Alors  $f$  admet une limite en  $-\infty$  :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \begin{cases} -\infty & \text{si } f \text{ est croissante et non-minorée} \\ \inf_A f & \text{si } f \text{ est croissante et minorée} \\ +\infty & \text{si } f \text{ est décroissante et non-majorée} \\ \sup_A f & \text{si } f \text{ est décroissante et majorée} \end{cases}$$

### **Théorème 7.59 (Théorème de la limite monotone en à gauche d'un réel)**

Soient  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $f : A \longrightarrow \mathbb{R}$  et  $a \in \mathbb{R}$ .

On suppose que  $f$  est monotone et que tout voisinage de  $a$  rencontre l'ensemble  $B = A \cap ]-\infty ; a[$ .

Alors  $f$  admet une limite à gauche en  $a$  :

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \begin{cases} +\infty & \text{si } f \text{ est croissante et non-majorée sur } B \\ \sup_B f & \text{si } f \text{ est croissante et majorée sur } B \\ -\infty & \text{si } f \text{ est décroissante et non-minorée sur } B \\ \inf_B f & \text{si } f \text{ est décroissante et minorée sur } B \end{cases}$$

---

*Démonstration 7.60 (Si  $f$  est croissante et non-majorée sur  $B$ )*

Comme  $f$  n'est pas majorée sur  $B$ , on a

$$\forall \alpha \in \mathbb{R}, \exists b \in B, f(b) > \alpha.$$

Donc, comme  $f$  est croissante, on a

$$\forall \alpha \in \mathbb{R}, \exists b \in B, \forall x \in A \cap [b; a[, f(x) > \alpha.$$

Donc

$$\forall \alpha \in \mathbb{R}, \exists \delta \in \mathbb{R}_+^*, \forall x \in A \cap [a - \delta; a[, f(x) > \alpha$$

en prenant  $\delta = a - b$ .

Finalement :

$$\forall \alpha \in \mathbb{R}, \exists \delta \in \mathbb{R}_+^*, \forall x \in B, |x - a| \leq \delta \implies f(x) \geq \alpha.$$

Donc  $\lim_{a^-} f = +\infty$ . ■

---

*Démonstration 7.61 (Autres cas)*

★★ Exercice ★★ ■

---

### **Théorème 7.62 (Théorème de la limite monotone en à droite d'un réel)**

Soient  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $f : A \longrightarrow \mathbb{R}$  et  $a \in \mathbb{R}$ .

On suppose que  $f$  est monotone et que tout voisinage de  $a$  rencontre l'ensemble  $B = A \cap ]a; +\infty[$ .

Alors  $f$  admet une limite à droite en  $a$  :

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \begin{cases} -\infty & \text{si } f \text{ est croissante et non-minorée sur } B \\ \inf_B f & \text{si } f \text{ est croissante et minorée sur } B \\ +\infty & \text{si } f \text{ est décroissante et non-majorée sur } B \\ \sup_B f & \text{si } f \text{ est décroissante et majorée sur } B \end{cases}$$

---

### **Bilan 7.63**

Une fonction monotone admet une limite à droite et une limite à gauche partout où son ensemble de définition le permet.

---

### Exemple 7.64

Étudions les limites de la fonction « partie entière » :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \lfloor x \rfloor \end{aligned}$$

Comme  $f$  est croissante sur  $\mathbb{R}$ , selon le théorème de la limite monotone, elle admet une limite en  $+\infty$ , en  $-\infty$  et à droite et à gauche en tout point  $a \in \mathbb{R}$ .

On a  $\lim_{+\infty} f = +\infty$ .

En effet, cette limite existe et en posant  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $x_n = n$ , on obtient une suite  $(x_n)_n$  qui tend vers  $+\infty$  et on a  $\lim_{+\infty} f = \lim_n f(x_n) = +\infty$ .

On a de même  $\lim_{-\infty} f = -\infty$  en prenant  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $x_n = -n$ .

Soit  $a \in \mathbb{R}$ .

On a

$$\begin{cases} \lim_{a^+} f = \lfloor a \rfloor \\ \lim_{a^-} f = \begin{cases} a - 1 & \text{si } a \in \mathbb{Z} \\ \lfloor a \rfloor & \text{sinon} \end{cases} \end{cases}$$

En effet :

Si  $a \notin \mathbb{Z}$ , on a

$$\forall x \in \underbrace{[\lfloor a \rfloor ; \lfloor a \rfloor + 1[}_{\text{voisinage de } a}, \quad f(x) = \lfloor a \rfloor.$$

Donc au voisinage de  $a$ ,  $f$  est constante et égale à  $\lfloor a \rfloor$ .

Donc  $\lim_{a^+} f = \lim_{a^-} f = \lfloor a \rfloor$ .

Sinon, on a

$$\forall x \in [a ; a + 1[, \quad f(x) = a$$

donc  $\lim_{a^+} f = a = \lfloor a \rfloor$  et

$$\forall x \in [a - 1 ; a[, \quad f(x) = a - 1$$

donc  $\lim_{a^-} f = a - 1$ .

## 7.3 Continuité

### 7.3.1 Fonctions continues en un point

#### 7.3.1.1 Définitions

---

**Définition 7.65 (Continuité en un point)**

Soient  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $f : A \longrightarrow \mathbb{R}$  et  $a \in A$ .

On suppose que  $f$  est définie en  $a$ .

On dit que  $f$  est continue en  $a$  si  $f$  admet une limite en  $a$ , c'est-à-dire, selon la Remarque 7.25 si

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

---

*Remarque 7.66*

Pour qu'une fonction soit continue en un point, il faut qu'elle soit définie en ce point.

Si une fonction est continue en un point, elle est bornée au voisinage de ce point (selon le Corollaire 7.29).

---

*Remarque 7.67*

Soient  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $f, g \in \mathcal{F}(A, \mathbb{R})$  et  $a \in A$ .

Si  $f$  et  $g$  coïncident au voisinage de  $a$ , alors  $f$  est continue en  $a$  si, et seulement si,  $g$  est continue en  $a$ .

---

*Démonstration 7.68*

Découle de la Remarque 7.20. ■

---

*Exemple 7.69*

Montrons que la fonction  $\sin : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$  est continue en 0.

On a

$$\sin \text{ continu en } 0 \iff \lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0.$$

Or on a vu  $\forall x \in \mathbb{R}, |\sin x| \leq |x|$  donc d'après le théorème des gendarmes :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0.$$

Donc  $\sin$  est continu en 0.

---

**Définition 7.70 (Continuité à droite d'un point)**

Soient  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $f : A \longrightarrow \mathbb{R}$  et  $a \in A$ .

On dit que  $f$  est continue à droite de  $a$  si on a

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a).$$

---

*Remarque 7.71 (Reformulation)*

Soient  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  et  $a \in A$ .

Alors  $f$  est continue à droite en  $a$  si, et seulement si, on a :

- (1) Tout voisinage de  $a$  rencontre l'ensemble  $A \cap ]a ; +\infty[$ .
- (2) La restriction  $f|_{A \cap ]a ; +\infty[}$  est continue en  $a$ .

---

**Définition 7.72 (Continuité à gauche d'un point)**

Soient  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  et  $a \in A$ .

On dit que  $f$  est continue à gauche de  $a$  si on a

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a).$$

---

*Remarque 7.73 (Reformulation)*

Soient  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  et  $a \in A$ .

Alors  $f$  est continue à gauche en  $a$  si, et seulement si, on a :

- (1) Tout voisinage de  $a$  rencontre l'ensemble  $A \cap ]-\infty ; a[$ .
- (2) La restriction  $f|_{A \cap ]-\infty ; a[}$  est continue en  $a$ .

---

*Exemple 7.74*

La fonction « partie entière » :  $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  est

$$x \mapsto [x]$$

$$\begin{cases} \text{continue en tout point } a \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z} \\ \text{continue à droite en tout point} \\ \text{non-continue à gauche} \end{cases}$$

---

**Définition 7.75 (Prolongement par continuité en un point)**

Soient  $A \subseteq \mathbb{R}$  et  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ .

Soit  $a \in \mathbb{R} \setminus A$  tel que tout voisinage de  $a$  rencontre  $A$  :

$$\forall V \in \mathcal{V}(a), V \cap A \neq \emptyset.$$

On appelle prolongement par continuité de  $f$  en  $a$  toute fonction  $g : A \cup \{a\} \rightarrow \mathbb{R}$  vérifiant :

$$\begin{cases} g|_A = f \\ g \text{ est continue en } a \end{cases}$$

---

**Proposition 7.76**

Soient  $A \subseteq \mathbb{R}$  et  $f : A \longrightarrow \mathbb{R}$ .

Soit  $a \in \mathbb{R} \setminus A$  tel que tout voisinage de  $a$  rencontre  $A$ .

Le prolongement par continuité de  $f$  en  $a$  est unique.

Il existe si, et seulement si, la fonction  $f$  admet une limite finie  $\ell$  en  $a$ .

L'unique prolongement par continuité de  $f$  en  $a$  est alors :

$$\begin{aligned} g : A \cup \{a\} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in A \\ \ell & \text{si } x = a \end{cases} \end{aligned}$$

---

*Démonstration 7.77*

unicité

Soit  $g : A \cup \{a\} \longrightarrow \mathbb{R}$  telle que  $\begin{cases} g|_A = f \\ g \text{ continue en } a \end{cases}$

On a

$$\begin{cases} \forall x \in A, \quad g(x) = f(x) \\ g(a) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \end{cases}$$

Donc  $g$  est unique et pour que  $g$  existe, il faut que  $f$  admette une limite finie en  $a$ .

existence

Montrons que

$$f \text{ prolongeable par continuité} \iff f \text{ admet une limite finie en } a.$$

$\implies$  Déjà vu.

$\impliedby$

Supposons  $\lim_a f = \ell \in \mathbb{R}$ .

Posons  $g : A \cup \{a\} \longrightarrow \mathbb{R}$

$$x \longmapsto \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in A \\ \ell & \text{si } x = a \end{cases}$$

On a

$$\begin{cases} g|_A = f \\ \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \ell = g(a) \end{cases}$$

Donc  $f$  est prolongeable par continuité, de prolongement  $g$ . ■

---

*Exemple 7.78*

Montrons que les fonctions

$$\begin{array}{lll} f : \mathbb{R}^* \longrightarrow \mathbb{R} & \text{et} & g : \mathbb{R}^* \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto x \sin \frac{1}{x} & & x \longmapsto \sin \frac{1}{x} \end{array}$$

sont respectivement prolongeable par continuité en 0 et non-prolongeable par continuité en 0.

On remarque  $\forall x \in \mathbb{R}^*, \left| x \sin \frac{1}{x} \right| \leq |x|$ .

Or  $\lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0$ .

Donc d'après le théorème des gendarmes,  $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0 \in \mathbb{R}$ .

Donc  $f$  est prolongeable par continuité en 0.

Montrons que  $g$  n'admet aucune limite finie en 0.

Supposons par l'absurde  $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \ell \in \mathbb{R}$ .

Posons

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \begin{cases} x_n = \frac{1}{n\pi} \\ y_n = \frac{1}{2n\pi + \pi/2} \end{cases}$$

On a  $\lim_n x_n = \lim_n y_n = 0$  donc

$$\lim_n g(x_n) = \lim_n g(y_n) = \ell.$$

Or on a  $\begin{cases} \lim_n g(x_n) = 0 \\ \lim_n g(y_n) = 1 \end{cases}$  donc  $0 = 1$  : contradiction.

Donc  $g$  n'admet aucune limite finie en 0.

Donc  $g$  n'est pas prolongeable par continuité en 0.

### 7.3.1.2 Propriétés

---

**Proposition 7.79 (Opérations algébriques)**

Soient  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $a \in A$ ,  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$  et  $f, g \in \mathcal{F}(A, \mathbb{R})$  continues en  $a$ .

La fonction  $f + g$  est continue en  $a$ .

La fonction  $\lambda f + \mu g$  est continue en  $a$ .

La fonction  $fg$  est continue en  $a$ .



Si  $f(a) \neq 0$  alors la fonction  $\frac{1}{f}$  est continue en  $a$ .

Si  $g(a) \neq 0$  alors la fonction  $\frac{f}{g}$  est continue en  $a$ .

---

*Démonstration 7.80*

Découle de la Proposition 7.44. ■

---

**Proposition 7.81 (Composition)**

Soient  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $B \subseteq \mathbb{R}$ ,  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $g : B \rightarrow \mathbb{R}$  et  $a \in A$ .

On suppose que  $f$  est continue en  $a$  et que  $g$  est continue en  $f(a)$ .

Alors  $g \circ f$  est continue en  $a$ .

---

*Démonstration 7.82*

Découle de la Proposition 7.47. ■

### 7.3.1.3 Caractérisation séquentielle

---

**Proposition 7.83 (Caractérisation séquentielle de la continuité en un point)**

Soient  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  et  $a \in A$ .

On a :

$$f \text{ continue en } a \iff \left[ \forall (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in A^{\mathbb{N}}, \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = f(a) \right].$$

Autrement dit :  $f$  est continue en  $a$  si, et seulement si, pour toute suite  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  d'éléments de  $A$  qui tend vers  $a$ , la suite  $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$  tend vers  $f(a)$ .

---

*Démonstration 7.84*

Découle de la Proposition 7.53. ■

## 7.3.2 Fonctions continues

### 7.3.2.1 Définition

---

#### Définition 7.85 (Continuité)

Soient  $A \subseteq \mathbb{R}$  et  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ .

On dit que  $f$  est continue si  $f$  est continue en tout point de  $A$  :

$$\forall a \in A, \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

---

#### Exemple 7.86

Les fonctions

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & [x] \end{array} \quad \text{et} \quad \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^* & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \frac{1}{x} \end{array}$$

sont continues.

### 7.3.2.2 Propriétés

---

#### Proposition 7.87 (Restriction)

Soient  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $B \subseteq A$  et  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ .

Alors la restriction  $f|_B$  est continue.

---

#### Proposition 7.88 (Opérations algébriques)

Soient  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $f, g \in \mathcal{F}(A, \mathbb{R})$  continues et  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ .

La fonction  $f + g$  est continue.

La fonction  $\lambda f + \mu g$  est continue.

La fonction  $fg$  est continue.

Si  $\forall a \in A, f(a) \neq 0$  alors la fonction  $\frac{1}{f}$  est continue.

Si  $\forall a \in A, g(a) \neq 0$  alors la fonction  $\frac{f}{g}$  est continue.

---

#### Démonstration 7.89

Découle de la Proposition 7.79. ■

---

**Proposition 7.90 (Composition)**

Soient  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $B \subseteq \mathbb{R}$ ,  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  et  $g : B \rightarrow \mathbb{R}$ .

On suppose que  $f$  est continue (sur  $A$ ) et que  $g$  est continue (sur  $B$ ).

Alors  $g \circ f$  est continue (sur  $A$ ).

---

*Démonstration 7.91*

Découle de la Proposition 7.81. ■

### 7.3.2.3 Caractérisation séquentielle

---

**Proposition 7.92 (Caractérisation séquentielle de la continuité)**

Soient  $A \subseteq \mathbb{R}$  et  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ .

On a :

$$f \text{ est continue} \iff \left[ \forall (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in A^{\mathbb{N}}, \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n \in A \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = f\left(\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n\right) \right].$$

Autrement dit :  $f$  est continue si, et seulement si, pour toute suite convergente  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  d'éléments de  $A$  dont la limite  $\ell$  appartient à  $A$ , la suite  $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$  converge vers  $f(\ell)$ .

---

*Démonstration 7.93*

Découle de la Proposition 7.83. ■

### 7.3.2.4 Exemples usuels

---

**Proposition 7.94**

Les fonctions

$$\exp : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad \ln : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R} \quad \sin : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad \cos : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad \tan : \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left] -\frac{\pi}{2} + k\pi ; \frac{\pi}{2} + k\pi \right[ \rightarrow \mathbb{R}$$

et, pour tout  $\alpha \in \mathbb{R}$ ,

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}_+^* & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & x^\alpha \end{array}$$

sont continues.

---

*Démonstration 7.95*

★★ Admis ★★ ■

### 7.3.2.5 Remarque

---

#### Remarque 7.96

Soient  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $B \subseteq \mathbb{R}$  et  $f : A \longrightarrow \mathbb{R}$ .

Ne pas confondre :

- (1) La restriction  $f|_B$  est continue.
- (2) La fonction  $f$  est continue en tout point de  $B$ .

On a (1)  $\implies$  (2) mais l'implication réciproque est fausse en général.

Cela dit, dans le cas particulier où  $B$  est un voisinage d'un réel  $x$ , la continuité de  $f|_B$  implique la continuité de  $f$  en  $x$  (selon la Remarque 7.67).

---

#### Exemple 7.97

La fonction « partie entière » :

$$\begin{array}{ccc} f : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & [x] \end{array}$$

$f|_{[0;1[}$  est continue mais la proposition

$$\forall x \in [0 ; 1[ , \quad f \text{ est continue en } x$$

est fausse.

## 7.3.3 Fonctions continues sur un intervalle

### 7.3.3.1 Intervalles

---

#### Rappel 7.98

On appelle intervalle de  $\mathbb{R}$  toute partie  $I \subseteq \mathbb{R}$  telle que :

$$\forall a, b \in I, \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad a < x < b \implies x \in I.$$

---

### Théorème 7.99 (Description des intervalles de $\mathbb{R}$ )

Les intervalles de  $\mathbb{R}$  sont les parties de  $\mathbb{R}$  de la forme :

- $[a ; b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$  avec  $a, b \in \mathbb{R}$
- $[a ; b[ = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$  avec  $a \in \mathbb{R}$  et  $b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ .

- $]a ; b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$  avec  $a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$  et  $b \in \mathbb{R}$ .
- $]a ; b[ = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$  avec  $a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$  et  $b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ .

NB : l'ensemble vide est bien un intervalle, on l'obtient en prenant  $a > b$ .

---

*Démonstration 7.100*

★★ Exercice ★★ (cf. Exercice 7.17). ■

---

### Définition 7.101 (Segment)

On appelle segment tout intervalle de la forme  $[a ; b]$  où  $a, b \in \mathbb{R}$  tels que  $a \leq b$ .

---

*Remarque 7.102*

L'ensemble vide est un intervalle mais pas un segment.

### 7.3.3.2 Théorème des valeurs intermédiaires

---

#### Théorème 7.103 (Théorème des valeurs intermédiaires)

Soient  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$ ,  $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$  continue et  $x_1, x_2 \in I$ .

Tout réel compris entre  $f(x_1)$  et  $f(x_2)$  admet un antécédent par  $f$  :

$$\forall y \in \mathbb{R}, f(x_1) < y < f(x_2) \implies [\exists x \in I, f(x) = y].$$

---

*Démonstration 7.104*

On pose  $\begin{cases} a_0 = \min \{x_1 ; x_2\} \\ b_0 = \max \{x_1 ; x_2\} \end{cases}$

Quitte à remplacer  $f$  par  $-f$ , on suppose  $f(a_0) < f(b_0)$ .

Soit  $y \in ]f(a_0) ; f(b_0)[$ .

Montrons que  $y \in \text{Im } f$ .

On construit par récurrence la suite croissante  $(a_n)_n$  et la suite décroissante  $(b_n)_n$  telles que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \begin{cases} f(a_n) \leq y \leq f(b_n) \\ b_n - a_n = \frac{b_0 - a_0}{2^n} \end{cases}$$

Soit  $n \in \mathbb{N}$  tel que 
$$\begin{cases} f(a_n) \leq y \leq f(b_n) \\ b_n - a_n = \frac{b_0 - a_0}{2^n} \end{cases}$$

Si  $f\left(\frac{b_n + a_n}{2}\right) \leq y$  on pose 
$$\begin{cases} a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2} \\ b_{n+1} = b_n \end{cases}$$

Sinon, on pose 
$$\begin{cases} a_{n+1} = a_n \\ b_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2} \end{cases}$$

D'où les deux suites.

$(a_n)_n$  et  $(b_n)_n$  sont adjacentes donc convergentes et de même limite  $\ell$ .

De plus, on a  $a_0 \leq \ell \leq b_0$  et  $a_0, b_0 \in I$  donc  $\ell \in I$ .

On a 
$$\begin{cases} \lim_n a_n = \lim_n b_n = \ell \in I \\ f \text{ continue en } \ell \end{cases} \quad \text{donc}$$

$$\lim_n f(a_n) = \lim_n f(b_n) = f(\ell).$$

Enfin, on a  $\forall n \in \mathbb{N}, f(a_n) \leq y \leq f(b_n)$  donc par passage à la limite :

$$f(\ell) \leq y \leq f(\ell).$$

Donc  $y = f(\ell)$ .

Donc  $y \in \text{Im } f$ . ■

### Corollaire 7.105 (L'image continue d'un intervalle est un intervalle)

Soient  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$  et  $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$  continue.

Alors l'image directe  $f(I)$  est un intervalle de  $\mathbb{R}$ .

*Démonstration 7.106*

Soient  $y_1, y_2 \in f(I)$  et  $y \in \mathbb{R}$ .

Supposons  $y_1 \leq y \leq y_2$ .

Montrons que  $y \in f(I)$ .

Soient  $x_1, x_2 \in I$  tels que 
$$\begin{cases} y_1 = f(x_1) \\ y_2 = f(x_2) \end{cases}$$

On a  $f(x_1) \leq y \leq f(x_2)$ ,  $f$  est continue et  $I$  est un intervalle donc selon le théorème des valeurs intermédiaires, il existe  $x \in I$  tel que

$$f(x) = y.$$

Donc  $y \in f(I)$ . ■

---

*Remarque 7.107*

Le corollaire précédent est lui aussi appelé « théorèmes des valeurs intermédiaires ».

---

*Exemple 7.108*

Montrons par des exemples que :

- l'image d'un intervalle borné par une fonction continue peut être un intervalle non-borné ;
- l'image d'un intervalle non-borné par une fonction continue peut être un intervalle borné ;
- l'image d'un intervalle ouvert par une fonction continue peut être un segment.

Soit  $f : x \mapsto \frac{1}{x}$ . On a  $f(]0 ; 1]) = [1 ; +\infty[$ .

On a  $\sin(\mathbb{R}) = [-1 ; 1]$ .

On a  $\sin(]0 ; 4\pi[) = [-1 ; 1]$ .

---

**Corollaire 7.109 (TVI appliqué aux fonctions strictement monotones)**

Soient  $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$  tels que  $a < b$ ,  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$  de bornes  $a$  et  $b$  et  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  continue et strictement monotone.

Alors  $f$  est bijective de l'intervalle  $I$  vers l'intervalle  $f(I)$ .

On a :

Si  $f$  est croissante et  $I = [a ; b]$  alors  $f(I) = [f(a) ; f(b)]$ .

Si  $f$  est décroissante et  $I = [a ; b]$  alors  $f(I) = [f(b) ; f(a)]$ .

Si  $f$  est croissante et  $I = [a ; b[$  alors  $f(I) = \left[ f(a) ; \lim_b f \right[$ .

Si  $f$  est décroissante et  $I = [a ; b[$  alors  $f(I) = \left] \lim_b f ; f(a) \right]$ .

Si  $f$  est croissante et  $I = ]a ; b]$  alors  $f(I) = \left] \lim_a f ; f(b) \right]$ .

Si  $f$  est décroissante et  $I = ]a ; b]$  alors  $f(I) = \left[ f(b) ; \lim_a f \right[$ .

Si  $f$  est croissante et  $I = ]a ; b[$  alors  $f(I) = \left] \lim_a f ; \lim_b f \right[$ .

Si  $f$  est décroissante et  $I = ]a ; b[$  alors  $f(I) = \left] \lim_b f ; \lim_a f \right[$ .

Pour ne pas allonger inutilement l'énoncé, on a supposé implicitement :

- que  $a$  n'est pas égal à  $+\infty$  (car  $a < b$ ), ni à  $-\infty$  si  $a \in I$  (car  $I \subseteq \mathbb{R}$ );
- que  $b$  n'est pas égal à  $-\infty$  (car  $a < b$ ), ni à  $+\infty$  si  $b \in I$  (car  $I \subseteq \mathbb{R}$ ).

*Démonstration 7.110 (Cas où  $f$  est croissante et  $I = [a ; b]$ )*

$f$  est continue et  $I$  est un intervalle donc  $f(I)$  est un intervalle selon le théorème des valeurs intermédiaires.

$f$  est strictement monotone donc c'est une injection et donc une bijection de  $I$  vers  $f(I)$ .

Déterminons  $f(I)$  :

Supposons  $f$  croissante et  $I = [a ; b]$ .

On a  $\forall x \in I, a \leq x \leq b$  donc  $\forall x \in I, f(a) \leq f(x) \leq f(b)$ .

Donc  $f(I) = [f(a) ; f(b)]$ . ■

*Démonstration 7.111 (Cas où  $f$  est croissante et  $I = [a ; b[$ )*

$f$  est continue et  $I$  est un intervalle donc  $f(I)$  est un intervalle selon le théorème des valeurs intermédiaires.

$f$  est strictement monotone donc c'est une injection et donc une bijection de  $I$  vers  $f(I)$ .

Déterminons  $f(I)$  :

Supposons  $f$  croissante et  $I = [a ; b[$ .

On a  $\forall x \in I, f(a) \leq f(x)$  donc  $\min f(I) = f(a)$ .

Supposons  $f$  non-majorée, c'est-à-dire  $f(I)$  non-majoré.

Comme  $f$  est croissante et non-majorée, d'après le théorème de la limite monotone, on a  $f(I) = [f(a) ; +\infty[ = \left[ f(a) ; \lim_b f \right[$ .

Supposons  $f$  majorée.

D'après le théorème de la limite monotone, on a  $\lim_b f = \sup_I f = \sup f(I)$ .

Donc  $f(I) = \left[ f(a) ; \lim_b f \right[$  ou  $f(I) = \left[ f(a) ; \lim_b f \right]$  car  $f(I)$  est un intervalle,  $\min f(I) = f(a)$  et  $\sup f(I) = \lim_b f$ .

Montrons que  $\lim_b f \notin f(I)$ .

Par l'absurde, supposons  $\lim_b f \in f(I)$ .

Soit  $c \in I$  tel que  $f(c) = \lim_b f$ .



On a

$$\forall x \in [c ; b[ , \quad f(c) \leq f(x) \leq \sup_I f = f(c) .$$

Donc  $f$  est constante sur  $[c ; b[$  : contradiction.

Donc  $\lim_b f \notin f(I)$ .

$$\text{Donc } f(I) = \left[ f(a) ; \lim_b f \right[ .$$

■

---

*Démonstration 7.112 (Autres cas)*

★★ Exercice ★★

■

### 7.3.4 Fonctions continues sur un segment

---

#### **Théorème 7.113 (Théorème des bornes atteintes)**

Soit  $f : [a ; b] \longrightarrow \mathbb{R}$  une fonction continue sur un segment  $[a ; b]$  de  $\mathbb{R}$ .

Alors  $f$  admet un minimum et un maximum.

---

*Rappel 7.114 (Cf. Exercice 5.15)*

Soit  $A \subseteq \mathbb{R}$ .

Si  $A$  est non-majorée alors il existe une suite d'éléments de  $A$  qui tend vers  $+\infty$ .

Si  $\lambda = \sup A$  alors il existe une suite d'éléments de  $A$  qui tend vers  $\lambda$ .

---

*Démonstration 7.115*

Montrons que  $f$  est majorée :

Par l'absurde, supposons  $f$  non-majorée, c'est-à-dire  $\text{Im } f$  non-majoré.

Soit  $(y_n)_n \in (\text{Im } f)^{\mathbb{N}}$  telle que  $\lim_n y_n = +\infty$ .

Soit  $(x_n)_n \in [a ; b]^{\mathbb{N}}$  telle que  $\forall n \in \mathbb{N}, \quad f(x_n) = y_n$ .

On a  $\lim_n f(x_n) = +\infty$ .

Comme  $(x_n)_n$  est bornée, d'après le théorème de Bolzano-Weierstrass, il existe  $\varphi : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$  strictement croissante telle que  $(x_{\varphi(n)})_n$  soit convergente.

On pose  $\ell = \lim_n x_{\varphi(n)}$ .

On a  $\forall n \in \mathbb{N}, a \leq x \leq b$  donc par passage à la limite :  $a \leq \ell \leq b$ . Donc  $\ell \in [a ; b]$ .

Donc  $f$  est continue en  $\ell$ .

Donc  $f(\ell) = \lim_n f(x_{\varphi(n)})$ .

Or  $(f(x_{\varphi(n)}))_n$  tend vers  $+\infty$  car c'est une suite extraite de  $(f(x_n))_n$  : contradiction.

Donc  $f$  est majorée.

Donc  $f([a ; b])$  est une partie non-vide et majorée de  $\mathbb{R}$ , qui admet donc une borne supérieure.

Donc  $\sup_{[a;b]} f$  existe.

Comme précédemment, on construit  $(x_n)_n \in [a ; b]^{\mathbb{N}}$  telle que  $\lim_n f(x_n) = \sup_{[a;b]} f$ .

Selon le théorème de Bolzano-Weierstrass, il existe  $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  strictement croissante telle que  $(x_{\varphi(n)})_n$  soit convergente vers  $\ell \in \mathbb{R}$ .

Comme précédemment, on montre que  $\ell \in [a ; b]$ .

On a  $\begin{cases} \lim_n x_{\varphi(n)} = \ell \\ f \text{ continue en } \ell \end{cases}$

Donc  $\lim_n f(x_{\varphi(n)}) = f(\ell)$ .

Donc  $\sup_{[a;b]} f = f(\ell)$ .

Donc  $\max_{[a;b]} f = f(\ell)$ .

On montre de même le minimum. ■

---

#### Remarque 7.116

On énonce parfois ainsi le théorème des bornes atteintes : « toute fonction continue sur un segment est bornée et atteint ses bornes ».

---

### Corollaire 7.117 (L'image continue d'un segment est un segment)

Soit  $f : [a ; b] \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction continue sur un segment  $[a ; b]$  de  $\mathbb{R}$ .

Alors l'image directe  $f([a ; b])$  est un segment de  $\mathbb{R}$ .

---

#### Démonstration 7.118

$f([a ; b])$  :

- est un intervalle d'après le théorème des valeurs intermédiaires car  $f$  est continue et  $[a ; b]$  est un intervalle ;

- admet un maximum et un minimum d'après le théorème des bornes atteintes car  $f$  est continue et  $[a ; b]$  est un segment.

Donc  $f([a ; b])$  est un segment. ■

### 7.3.5 Fonctions continues injectives sur un intervalle

#### Théorème 7.119

Soient  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$  et  $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$  continue et injective.

Alors  $f$  est monotone.

---

Démonstration 7.120

★★ Exercice ★★ Cf. Exercice 7.31. ■

---

#### Corollaire 7.121 (Reformulation du Théorème 7.119)

Soient  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$  et  $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$  continue.

Alors

$$f \text{ est strictement monotone} \iff f \text{ est injective.}$$

---

Démonstration 7.122

$\implies$  Évident.

$\impliedby$  Théorème 7.119. ■

---

#### Théorème 7.123

Soient  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$  et  $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$  continue et strictement monotone.

Alors  $f$  est une injection et donc une bijection de  $I$  vers  $\text{Im } f$ .

Sa bijection réciproque  $f^{-1} : \text{Im } f \longrightarrow I$  est continue et strictement monotone.

Précisément :  $f^{-1}$  est strictement croissante si  $f$  est strictement croissante et strictement décroissante si  $f$  est strictement décroissante.

---

*Démonstration 7.124*

Montrons que  $f^{-1}$  est strictement monotone.

Supposons  $f$  strictement croissante.

Soient  $y_1, y_2 \in \text{Im } f$  tels que  $y_1 < y_2$ .

$$\text{On a } \begin{cases} f(f^{-1}(y_1)) < f(f^{-1}(y_2)) \\ f \text{ strictement croissante} \end{cases}$$

Donc  $f^{-1}(y_1) < f^{-1}(y_2)$ .

Donc  $f^{-1}$  est strictement croissante.

Idem si  $f$  est strictement décroissante.

Montrons que  $f^{-1}$  est continue.

Supposons  $f$  strictement croissante.

Soit  $y_0 \in \text{Im } f$ .

Montrons que  $f^{-1}$  est continue en  $y_0$ .

On pose  $x_0 = f^{-1}(y_0)$ . Montrons que  $\lim_{y_0} f^{-1} = x_0$ , c'est-à-dire

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists W \in \mathcal{V}(y_0), \forall y \in \text{Im } f \cap W, |f^{-1}(y) - x_0| \leq \varepsilon.$$

Soit  $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$ .

Si  $x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon \in I$  alors on pose  $W = ]f(x_0 - \varepsilon); f(x_0 + \varepsilon)[$  un voisinage de  $y_0$  car  $f$  est strictement croissante.

On a  $\forall y \in W, x_0 - \varepsilon < f^{-1}(y) < x_0 + \varepsilon$ .

Donc  $W$  convient.

Si  $x_0 - \varepsilon \in I$  et  $x_0 + \varepsilon \notin I$  : idem avec  $W = ]f(x_0 - \varepsilon); +\infty[$ .

Etc.

Donc  $f^{-1}$  continue. ■

---

*Exemple 7.125 (Continuité de la fonction racine carrée)*

La bijection  $f : \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}_+$  est continue et strictement monotone sur l'intervalle  $\mathbb{R}_+$ .

$$x \longmapsto x^2$$

Sa bijection réciproque  $f^{-1} : \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}_+$  est donc continue.

$$x \longmapsto \sqrt{x}$$

---

*Exemple 7.126*

Soient  $A = [0 ; 1[ \cup [2 ; 3[$  et  $B = [0 ; 2[$ .

On a

$$\begin{aligned} f : A &\longrightarrow B \\ x &\longmapsto \begin{cases} x & \text{si } x \in [0 ; 1[ \\ x - 1 & \text{si } x \in [2 ; 3[ \end{cases} \end{aligned}$$

strictement croissante et continue mais

$$\begin{aligned} f^{-1} : B &\longrightarrow A \\ y &\longmapsto \begin{cases} y & \text{si } y \in [0 ; 1[ \\ y + 1 & \text{sinon} \end{cases} \end{aligned}$$

n'est pas continue.

D'où l'importance d'avoir un intervalle.

## 7.3.6 Fonctions circulaires réciproques

### 7.3.6.1 Arcsin

---

#### Définition/Proposition 7.127 (Fonction Arcsin)

La fonction

$$\begin{aligned} \left[ \frac{-\pi}{2} ; \frac{\pi}{2} \right] &\longrightarrow \mathbb{R} \\ \theta &\longmapsto \sin \theta \end{aligned}$$

est continue et strictement croissante sur l'intervalle  $\left[ \frac{-\pi}{2} ; \frac{\pi}{2} \right]$ .


Elle est donc bijective de l'intervalle  $\left[ \frac{-\pi}{2} ; \frac{\pi}{2} \right]$  vers l'intervalle  $\left[ \sin \frac{-\pi}{2} ; \sin \frac{\pi}{2} \right] = [-1 ; 1]$  (selon le Corollaire 7.109).

Sa bijection réciproque est appelée la fonction arcsinus et est notée Arcsin :

$$\text{Arcsin} : [-1 ; 1] \longrightarrow \left[ \frac{-\pi}{2} ; \frac{\pi}{2} \right].$$

Elle est continue et strictement croissante (selon le Théorème 7.123).

Allure du graphe :




---

**Proposition 7.128 (Caractérisation)**

Si  $x \in [-1 ; 1]$ , l'angle  $\text{Arcsin } x$  est l'unique angle  $\theta \in \left[-\frac{\pi}{2} ; \frac{\pi}{2}\right]$  dont le sinus est  $x$ .

On a donc :

$$\forall x \in [-1 ; 1], \forall \theta \in \mathbb{R}, \theta = \text{Arcsin } x \iff \begin{cases} \sin \theta = x \\ -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

---

Exemple 7.129 (Valeurs à connaître)

$x$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{\sqrt{2}}$	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\text{Arcsin } x$	$-\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{6}$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$

---

**Proposition 7.130**

La fonction  $\text{Arcsin}$  est impaire.

---

Remarque 7.131

On a

$$\forall x \in [-1 ; 1], \sin(\text{Arcsin } x) = x$$

mais

$$\forall \theta \in \mathbb{R}, \text{Arcsin}(\sin x) = \theta \iff -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}.$$

**Définition/Proposition 7.132 (Fonction Arccos)**

La fonction

$$\begin{aligned} [0 ; \pi] &\longrightarrow \mathbb{R} \\ \theta &\longmapsto \cos \theta \end{aligned}$$

est continue et strictement décroissante sur l'intervalle  $[0 ; \pi]$ .


Elle est donc bijective de l'intervalle  $[0 ; \pi]$  vers l'intervalle  $[\cos \pi ; \cos 0] = [-1 ; 1]$  (selon le Corollaire 7.109).

Sa bijection réciproque est appelée la fonction arccosinus et est notée Arccos :

$$\text{Arccos} : [-1 ; 1] \longrightarrow [0 ; \pi] .$$

Elle est continue et strictement décroissante (selon le Théorème 7.123).

Allure du graphe :

**Proposition 7.133 (Caractérisation)**

Si  $x \in [-1 ; 1]$ , l'angle  $\text{Arccos } x$  est l'unique angle  $\theta \in [0 ; \pi]$  dont le cosinus est  $x$ .

On a donc :

$$\forall x \in [-1 ; 1], \forall \theta \in \mathbb{R}, \theta = \text{Arccos } x \iff \begin{cases} \cos \theta = x \\ 0 \leq \theta \leq \pi \end{cases}$$

---

Exemple 7.134 (Valeurs à connaître)

$x$	$-1$	$\frac{-\sqrt{3}}{2}$	$\frac{-1}{\sqrt{2}}$	$\frac{-1}{2}$	$0$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$1$
$\text{Arccos } x$	$\pi$	$\frac{5\pi}{6}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{6}$	$0$

---

**Proposition 7.135**

La fonction  $\text{Arccos}$  n'est ni paire ni impaire.

**7.3.6.3 Arctan**

---

**Définition/Proposition 7.136 (Fonction Arctan)**

La fonction

$$\begin{array}{ccc} \left] \frac{-\pi}{2} ; \frac{\pi}{2} \right[ & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ \theta & \longmapsto & \tan \theta \end{array}$$

est continue et strictement croissante sur l'intervalle  $\left] \frac{-\pi}{2} ; \frac{\pi}{2} \right[$ .

Elle est donc bijective de l'intervalle  $\left] \frac{-\pi}{2} ; \frac{\pi}{2} \right[$  vers l'intervalle  $\left] \lim_{(-\pi/2)^+} \tan ; \lim_{(\pi/2)^-} \tan \right[ = \mathbb{R}$  (selon le Corollaire 7.109).


Sa bijection réciproque est appelée la fonction arctangente est notée  $\text{Arctan}$  :

$$\text{Arctan} : \mathbb{R} \longrightarrow \left] \frac{-\pi}{2} ; \frac{\pi}{2} \right[.$$

Elle est continue et strictement croissante (selon le Théorème 7.123).

Allure du graphe :






---

**Proposition 7.137 (Caractérisation)**

Si  $x \in \mathbb{R}$ , l'angle  $\text{Arctan } x$  est l'unique angle  $\theta \in \left] -\frac{\pi}{2} ; \frac{\pi}{2} \right[$  dont la tangente est  $x$ .

On a donc :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall \theta \in \mathbb{R}, \theta = \text{Arctan } x \iff \begin{cases} \tan \theta = x \\ -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

---

*Exemple 7.138 (Valeurs à connaître)*

$x$	$-\sqrt{3}$	$-1$	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$	$0$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	$1$	$\sqrt{3}$
$\text{Arctan } x$	$-\frac{\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{6}$	$0$	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$

---

**Proposition 7.139**

La fonction  $\text{Arctan}$  est impaire.

### 7.3.6.4 Relations à connaître

---

**Proposition 7.140**

On a :

$$(1) \quad \forall x \in [-1 ; 1], \quad \operatorname{Arcsin} x + \operatorname{Arccos} x = \frac{\pi}{2}$$

$$(2) \quad \forall x \in [-1 ; 1], \quad \cos (\operatorname{Arcsin} x) = \sin (\operatorname{Arccos} x) = \sqrt{1-x^2}$$

---

*Démonstration 7.141 (1)*

Soit  $x \in [-1 ; 1]$ .

Montrons que  $\operatorname{Arcsin} x = \frac{\pi}{2} - \operatorname{Arccos} x$ .

On a

$$\sin \left( \frac{\pi}{2} - \operatorname{Arccos} x \right) = \cos (\operatorname{Arccos} x) = x.$$

De plus, on a  $0 \leq \operatorname{Arccos} x \leq \pi$  donc

$$\frac{-\pi}{2} \leq \frac{\pi}{2} - \operatorname{Arccos} x \leq \frac{\pi}{2}.$$

Donc  $\frac{\pi}{2} - \operatorname{Arccos} x = \operatorname{Arcsin} x$ .

D'où l'égalité. ■

---

*Démonstration 7.142 (2)*

Soit  $x \in [-1 ; 1]$ .

Montrons que  $\cos (\operatorname{Arcsin} x) = \sqrt{1-x^2}$ .

On a  $\cos^2 (\operatorname{Arcsin} x) + \sin^2 (\operatorname{Arcsin} x) = 1$  donc

$$\cos^2 (\operatorname{Arcsin} x) = 1 - \sin^2 (\operatorname{Arcsin} x) = 1 - x^2.$$

De plus, on a  $\frac{-\pi}{2} \leq \operatorname{Arcsin} x \leq \frac{\pi}{2}$  donc

$$\cos (\operatorname{Arcsin} x) \geq 0.$$

Donc  $\cos (\operatorname{Arcsin} x) = \sqrt{1-x^2}$ .

Idem pour  $\sin (\operatorname{Arccos} x)$ . ■

## 7.4 Propriétés plus fortes que la continuité

### 7.4.1 Continuité uniforme

---

**Définition 7.143 (Continuité uniforme)**

Soient  $A \subseteq \mathbb{R}$  et  $f : A \longrightarrow \mathbb{R}$ .

On dit que  $f$  est uniformément continue si on a :

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists \delta \in \mathbb{R}_+^*, \forall x, y \in A, |x - y| \leq \delta \implies |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon.$$

---

*Remarque 7.144*

Ne pas confondre la continuité et la continuité uniforme.

Soient  $A \subseteq \mathbb{R}$  et  $f : A \longrightarrow \mathbb{R}$ .

La fonction  $f$  est continue si, et seulement si, on a :

$$\forall x \in A, \forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists \delta \in \mathbb{R}_+^*, \forall y \in A, |x - y| \leq \delta \implies |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon.$$

---

**Proposition 7.145**

*Toute fonction uniformément continue est continue.*

---

*Démonstration 7.146*

Si  $f$  est uniformément continue, on a :

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists \delta \in \mathbb{R}_+^*, \forall x, y \in A, |x - y| \leq \delta \implies |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon$$

où  $\delta$  est indépendant de  $x$ .

Cela implique

$$\forall x \in A, \forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists \delta \in \mathbb{R}_+^*, \forall y \in A, |x - y| \leq \delta \implies |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon$$

où  $\delta$  dépend de  $x$ . ■

---

**Exercice 7.147**

Les fonctions suivantes sont-elles uniformément continues ?

$$\begin{array}{lll} f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} & g : [0 ; 1] \longrightarrow \mathbb{R} & h : \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto x^2 & x \longmapsto x^2 & x \longmapsto \sqrt{x} \end{array}$$

*Indication :* pour l'étude de  $h$ , on pourra montrer que

$$\forall x, y \in \mathbb{R}_+, \sqrt{x+y} \leq \sqrt{x} + \sqrt{y}.$$

---

*Correction 7.148 (f)*

Posons  $\varepsilon = 1$ .

On a

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad |f(x) - f(y)| = |x^2 - y^2| = |x - y| |x + y|.$$

Soit  $\delta \in \mathbb{R}_+^*$ .

On remarque

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad |f(x) - f(x + \delta)| = |2x + \delta| \delta.$$

Donc  $\lim_{x \rightarrow +\infty} |f(x) - f(x + \delta)| > 1$ .

Donc  $f$  n'est pas uniformément continue.

---

*Correction 7.149 (g)*

Montrons que  $g$  est uniformément continue, c'est-à-dire

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \quad \exists \delta \in \mathbb{R}_+^*, \quad \forall x, y \in [0 ; 1], \quad |x - y| \leq \delta \implies |g(x) - g(y)| \leq \varepsilon.$$

Soit  $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$ .

On a

$$\forall x, y \in [0 ; 1], \quad |g(x) - g(y)| = |x + y| |x - y| \leq 2 |x - y|.$$

Donc  $\delta = \frac{\varepsilon}{2}$  convient car on a

$$\forall x, y \in [0 ; 1], \quad |x - y| \leq \delta \implies |g(x) - g(y)| \leq 2 \times \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Donc  $g$  est uniformément continue.

---

*Correction 7.150 (h)*

On a  $\forall x, y \in \mathbb{R}_+, \quad \sqrt{x+y} \leq \sqrt{x} + \sqrt{y}$ .

En effet :

$$\begin{aligned} \forall x, y \in \mathbb{R}_+, \quad \sqrt{x+y} \leq \sqrt{x} + \sqrt{y} &\iff x+y \leq x+y+2\sqrt{xy} \\ &\iff 0 \leq 2\sqrt{xy} \end{aligned}$$

ce qui est vrai

Soient  $a, b \in \mathbb{R}_+$ .

Si  $a \leq b$  alors  $0 \leq \sqrt{b} - \sqrt{a} = \sqrt{a+b-a} - \sqrt{a}$  donc  $|\sqrt{b} - \sqrt{a}| \leq \sqrt{b-a}$ .

Si  $a \geq b$ , de même, on a  $|\sqrt{b} - \sqrt{a}| \leq \sqrt{a-b}$ .

Donc  $\forall a, b \in \mathbb{R}_+, \left| \sqrt{a} - \sqrt{b} \right| \leq \sqrt{|a - b|}$ .

Montrons que  $h$  est uniformément continue, c'est-à-dire

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists \delta \in \mathbb{R}_+^*, \forall x, y \in \mathbb{R}_+, |x - y| \leq \delta \implies |h(x) - h(y)| \leq \varepsilon.$$

Soit  $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$ . Posons  $\delta = \varepsilon^2$ .

On a :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}_+, |x - y| \leq \delta \implies |h(x) - h(y)| \leq \sqrt{\delta} = \varepsilon.$$

Donc  $\delta$  convient.

Donc  $h$  est uniformément continue.

---

### **Théorème 7.151 (Théorème de Heine)**

Soient  $a, b \in \mathbb{R}$  tels que  $a < b$ . Soit  $f : [a ; b] \longrightarrow \mathbb{R}$  continue.

Alors  $f$  est uniformément continue.

---

#### *Démonstration 7.152*

Par l'absurde, supposons

$$\exists \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \forall \delta \in \mathbb{R}_+^*, \exists x, y \in [a ; b], \begin{cases} |x - y| \leq \delta \\ |f(x) - f(y)| > \varepsilon \end{cases}$$

Soit un tel  $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$ .

On a en particulier

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \exists x_n, y_n \in [a ; b], \begin{cases} |x_n - y_n| \leq \frac{1}{n} \\ |f(x_n) - f(y_n)| > \varepsilon \end{cases}$$

En considérant de tels  $x_n, y_n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , on obtient deux suites  $(x_n)_n, (y_n)_n \in [a ; b]^{\mathbb{N}^*}$  telles que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \begin{cases} |x_n - y_n| \leq \frac{1}{n} \\ |f(x_n) - f(y_n)| > \varepsilon \end{cases}$$

Comme  $(x_n)_n$  est bornée, d'après le théorème de Bolzano-Weierstrass, il existe  $\varphi : \mathbb{N}^* \longrightarrow \mathbb{N}^*$  strictement croissante telle que  $(x_{\varphi(n)})_n$  soit convergente.

Comme  $(y_{\varphi(n)})_n$  est bornée, d'après le théorème de Bolzano-Weierstrass, il existe  $\psi : \mathbb{N}^* \longrightarrow \mathbb{N}^*$  strictement croissante telle que  $(y_{\varphi \circ \psi(n)})_n$  soit convergente.

Ainsi,  $(x_{\varphi \circ \psi(n)})_n$  converge car c'est une suite extraite d'une suite convergente.

On pose  $x = \lim_n x_{\varphi \circ \psi(n)}$  et  $y = \lim_n y_{\varphi \circ \psi(n)}$ .

On a

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad |x_{\varphi \circ \psi(n)} - y_{\varphi \circ \psi(n)}| \leq \frac{1}{\varphi \circ \psi(n)}.$$

D'où, par passage à la limite :  $|x - y| \leq 0$  donc  $x = y$ .

D'autre part, on a :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad |f(x_{\varphi \circ \psi(n)}) - f(y_{\varphi \circ \psi(n)})| \geq \varepsilon.$$

D'où, par passage à la limite :  $|f(x) - f(y)| \geq \varepsilon$  : contradiction car  $x = y$ . ■

## 7.4.2 Fonctions lipschitziennes

---

### Définition 7.153 (Fonction lipschitzienne)

Soient  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $f : A \longrightarrow \mathbb{R}$  et  $k \in \mathbb{R}_+$ .

On dit que  $f$  est  $k$ -lipschitzienne si on a :

$$\forall x, y \in A, \quad |f(x) - f(y)| \leq k |x - y|.$$

On dit que  $f$  est lipschitzienne si elle est  $K$ -lipschitzienne pour un certain  $K \in \mathbb{R}_+$  :

$$\exists K \in \mathbb{R}_+, \quad \forall x, y \in A, \quad |f(x) - f(y)| \leq K |x - y|.$$

---

### Proposition 7.154

*Toute fonction lipschitzienne est uniformément continue.*

---

#### Démonstration 7.155

Soient  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $f : A \longrightarrow \mathbb{R}$  et  $k \in \mathbb{R}_+$ .

On suppose que  $f$  est  $k$ -lipschitzienne.

Montrons que  $f$  est uniformément continue, c'est-à-dire

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \quad \exists \delta \in \mathbb{R}_+^*, \quad \forall x, y \in A, \quad |x - y| \leq \delta \implies |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon.$$

Soit  $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$ . On pose  $\delta = \frac{\varepsilon}{k}$ .

On a

$$\forall x, y \in A, \quad |x - y| \leq \delta \implies |f(x) - f(y)| \leq k\delta = \varepsilon.$$

Donc  $\delta$  convient.

Donc  $f$  est uniformément continue. ■

---

**Bilan 7.156**

Soient  $A \subseteq \mathbb{R}$  et  $f : A \longrightarrow \mathbb{R}$ .

On a :

$$f \text{ lipschitzienne} \implies f \text{ uniformément continue} \implies f \text{ continue.}$$

---

**Exercice 7.157**

Les fonctions suivantes sont-elles lipschitziennes ?

$$\begin{array}{lll} f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} & g : [0 ; 1] \longrightarrow \mathbb{R} & h : \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto x^2 & x \longmapsto x^2 & x \longmapsto \sqrt{x} \end{array}$$

---

*Correction 7.158 (f)*

On a vu que  $f$  n'est pas uniformément continue donc par contraposée,  $f$  n'est pas lipschitzienne (cf. Correction 7.148).

---

*Correction 7.159 (g)*

Montrons que  $g$  est lipschitzienne, c'est-à-dire

$$\exists k \in \mathbb{R}_+, \forall x, y \in [0 ; 1], |g(x) - g(y)| \leq k |x - y|.$$

On a :

$$\begin{aligned} \forall x, y \in [0 ; 1], |g(x) - g(y)| &= |x^2 - y^2| \\ &= |x - y| |x + y| \\ &\leq 2 |x - y| \end{aligned}$$

Donc  $g$  est 2-lipschitzienne.

Donc  $g$  est lipschitzienne.

---

*Correction 7.160 (h)*

Montrons que  $h$  n'est pas lipschitzienne.

Par l'absurde, supposons  $h$  lipschitzienne, c'est-à-dire :

$$\exists k \in \mathbb{R}_+, \forall x, y \in \mathbb{R}_+, |\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leq k |x - y|.$$

En particulier, on a

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \left| \sqrt{\frac{1}{n}} - \sqrt{0} \right| \leq k \left| \frac{1}{n} - 0 \right|.$$

Donc

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \frac{1}{\sqrt{n}} \leq \frac{k}{n}.$$

Donc  $\forall n \in \mathbb{N}^*, \sqrt{n} \leq k$  : contradiction.

Donc  $h$  n'est pas lipschitzienne.

# Chapitre 8

## Arithmétique

### Sommaire

---

<b>8.1</b>	<b>Rappels &amp; compléments</b>	<b>. 222</b>
8.1.1	Division euclidienne	222
8.1.2	Divisibilité	223
8.1.3	Congruences	224
8.1.4	Sous-groupes	226
<b>8.2</b>	<b>PGCD</b>	<b>. 229</b>
8.2.1	PGCD de deux entiers	229
8.2.1.1	Définition	229
8.2.1.2	Preuve algébrique	232
8.2.1.3	Preuve algorithmique, algorithme d'Euclide	233
8.2.1.4	Propriétés	234
8.2.2	Relation de Bézout	235
8.2.2.1	Définition	235
8.2.2.2	Preuve algébrique	235
8.2.2.3	Preuve algorithmique, algorithme d'Euclide étendu	236
8.2.3	PGCD de plusieurs entiers	237
<b>8.3</b>	<b>Entiers premiers entre eux</b>	<b>. 238</b>
8.3.1	Cas de deux entiers	238
8.3.2	Cas de plusieurs entiers	241
<b>8.4</b>	<b>PPCM</b>	<b>. 242</b>
<b>8.5</b>	<b>Nombres premiers</b>	<b>. 246</b>
8.5.1	Définition	246
8.5.2	Théorème fondamental	248
8.5.3	Valuations $p$ -adiques	250
<b>8.6</b>	<b>Petit théorème de Fermat</b>	<b>. 253</b>

---

### 8.1 Rappels & compléments

#### 8.1.1 Division euclidienne



---

**Définition/Proposition 8.1 (Division euclidienne dans  $\mathbb{Z}$ )**

Soient  $a \in \mathbb{Z}$  et  $b \in \mathbb{N}^*$ .

Il existe un unique couple  $(q, r) \in \mathbb{Z}^2$  tel que :

$$\begin{cases} a = qb + r \\ 0 \leq r < b \end{cases}$$

L'entier  $q$  est appelé le quotient de la division euclidienne de  $a$  par  $b$ .

L'entier  $r$  est appelé le reste de la division euclidienne de  $a$  par  $b$ .

---

*Exemple 8.2*

Divisions euclidiennes de 37 et -37 par 10 :

$$37 = 3 \times 10 + 7 \quad \text{et} \quad -37 = (-4) \times 10 + 3.$$

---

*Démonstration 8.3*

Cf. Démonstration 3.41. ■

## 8.1.2 Divisibilité

---

**Définition 8.4 (Divisibilité dans  $\mathbb{Z}$ )**

Soient  $a, b \in \mathbb{Z}$ . Si on a

$$\exists c \in \mathbb{Z}, \quad ac = b$$

alors on dit que

- $a$  divise  $b$  ;
- $a$  est un diviseur de  $b$  ;
- $b$  est un multiple de  $a$  ;
- $b$  est divisible par  $a$ .

---

**Notation 8.5**

Soient  $a, b \in \mathbb{Z}$ .

- La notation  $a \mid b$  signifie «  $a$  divise  $b$  » ;
- L'ensemble  $\{ac\}_{c \in \mathbb{Z}}$  des multiples de  $a$  est noté  $a\mathbb{Z}$  :

$$a\mathbb{Z} = \{ac\}_{c \in \mathbb{Z}} = \{x \in \mathbb{Z} \mid a \mid x\}.$$

- Dans ce cours, on notera  $\text{div}(b)$  l'ensemble des diviseurs positifs de  $b$  :

$$\text{div}(b) = \{x \in \mathbb{N} \mid x \mid b\}.$$

---

**Proposition 8.6 (Divisibilité dans  $\mathbb{Z}$ )**

La relation binaire  $|$  sur  $\mathbb{Z}$  est réflexive et transitive (mais pas antisymétrique donc ce n'est pas une relation d'ordre sur  $\mathbb{Z}$ ).

On a :  $\forall a, b \in \mathbb{Z}, (a | b \text{ et } b | a) \iff a = \pm b$ .

On a :

- $\forall a, b \in \mathbb{Z}, \forall n \in \mathbb{Z}, a | b \implies na | nb$  ;
- $\forall a, b \in \mathbb{Z}, \forall n \in \mathbb{Z}^*, a | b \iff na | nb$ .

---

**Proposition 8.7 (Divisibilité dans  $\mathbb{N}$ )**

La relation binaire  $|$  sur  $\mathbb{N}$  est une relation d'ordre sur  $\mathbb{N}$ .

Pour cette relation d'ordre, 0 est le plus grand élément de  $\mathbb{N}$  et 1 le plus petit :  $\forall n \in \mathbb{N}, n | 0 \text{ et } 1 | n$ .

On a :  $\forall a, b \in \mathbb{Z}, a | b \implies (a \leq b \text{ ou } b = 0)$ .

### 8.1.3 Congruences

---

**Définition 8.8**

Soient  $a, b, n \in \mathbb{Z}$ .

On dit que «  $a$  est congru à  $b$  modulo  $n$  » et on note  $a \equiv b [n]$  si on a :

$$\exists k \in \mathbb{Z}, a = b + kn.$$

On a donc :

$$\begin{aligned} a \equiv b [n] &\iff \exists k \in \mathbb{Z}, a = b + kn \\ &\iff n | (a - b). \end{aligned}$$

---

*Remarque 8.9*

Soit  $n \in \mathbb{Z}$ .

La relation « être congrus modulo  $n$  » est une relation d'équivalence sur  $\mathbb{Z}$ .

---

*Remarque 8.10*

Soient  $x \in \mathbb{Z}$  et  $n \in \mathbb{N}^*$ .

On note  $q$  et  $r$  le quotient et le reste de la division euclidienne de  $x$  par  $n$ .

On a :

- $x \equiv r [n]$  ;
- $n | x \iff r = 0$ .

---

**Proposition 8.11 (Opérations sur les congruences)**

Soient  $a, b, c, d, n \in \mathbb{Z}$ .

On suppose  $a \equiv b [n]$  et  $c \equiv d [n]$ .

On a :

- somme :  $a + c \equiv b + d [n]$  ;
- produit :  $ac \equiv bd [n]$  ;
- puissance :  $\forall k \in \mathbb{N}, a^k \equiv b^k [n]$ .

---

**Proposition 8.12**

Soient  $a, b, n \in \mathbb{Z}$ .

- Pour tout  $\lambda \in \mathbb{Z}^*$ , on a :  $a \equiv b [n] \iff \lambda a \equiv \lambda b [\lambda n]$ .
- Pour tout diviseur  $d$  de  $n$ , on a :  $a \equiv b [n] \implies a \equiv b [d]$ .

---

**Exemple 8.13 (Élément non-régulier modulo  $n$ )**

Trouvons  $\lambda, x, y, n \in \mathbb{Z}$  tels que :

$$\lambda \neq 0 \quad \text{et} \quad \lambda x \equiv \lambda y [n] \quad \text{et} \quad x \not\equiv y [n].$$

On remarque que  $\lambda = 2, x = 3, y = 0$  et  $n = 6$  conviennent.

En effet, on a

$$2 \neq 0 \quad \text{et} \quad 2 \times 3 \equiv 2 \times 0 [6] \quad \text{et} \quad 3 \not\equiv 0 [6].$$

---

**Exemple 8.14**

Calculons 20.222.023 modulo 9, modulo 11 et modulo 999.

On a

$$\begin{aligned} 20.222.023 &= 2 \times 10^7 + 2 \times 10^5 + 2 \times 10^4 + 2 \times 10^3 + 2 \times 10^1 + 3 \times 10^0 \\ &\equiv 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 3 [9] \quad \text{car } 10 \equiv 1 [9] \\ &\equiv 13 [9] \\ &\equiv 4 [9]. \end{aligned}$$

De plus,  $10 \equiv -1 [11]$  donc on a

$$\begin{aligned} 20.222.023 &\equiv -2 - 2 - 2 + 2 - 2 + 3 [11] \\ &\equiv -3 [11] \\ &\equiv 8 [11]. \end{aligned}$$

Enfin, comme  $1.000 \equiv 1 [999]$ , on a

$$\begin{aligned} 20.222.023 &= 20 \times 1000^2 + 222 \times 1000^1 + 23 \times 1000^0 \\ &\equiv 20 + 222 + 23 [999] \\ &\equiv 265 [999]. \end{aligned}$$

## 8.1.4 Sous-groupes

### Proposition 8.15 (Intersection de sous-groupes)

Soit  $(G, *)$  un groupe et  $(H_i)_{i \in I}$  une famille de sous-groupes de  $G$ .

Alors l'intersection  $\bigcap_{i \in I} H_i$  de ces sous-groupes est un sous-groupe de  $G$ .

*Démonstration 8.16*

Cf. Exercice 6.15. ■

### Définition/Proposition 8.17 (Somme de sous-groupes)

Soit  $(G, +)$  un groupe abélien. Soient  $H_1, H_2$  des sous-groupes de  $G$ .

On appelle somme de  $H_1$  et  $H_2$  et on note  $H_1 + H_2$  l'ensemble :

$$\begin{aligned} H_1 + H_2 &= \{g \in G \mid \exists h_1 \in H_1, \exists h_2 \in H_2, g = h_1 + h_2\} \\ &= \{h_1 + h_2\}_{(h_1, h_2) \in H_1 \times H_2} \end{aligned}$$

On a :

- (1) l'ensemble  $H_1 + H_2$  est un sous-groupe de  $G$  ;
- (2) la loi  $+$  est une loi de composition interne sur l'ensemble des sous-groupes de  $G$  ;
- (3) cette loi  $+$  est associative et commutative.

*Démonstration 8.18 (1)*

Montrons que  $H_1 + H_2$  est un sous-groupe de  $G$ .

On note 0 le neutre de  $G$ .

On a  $H_1 + H_2 \subseteq G$ .

Comme  $H_1$  et  $H_2$  sont des sous-groupes de  $G$ ,  $0 \in H_1$  et  $0 \in H_2$  donc  $0 = 0 + 0 \in H_1 + H_2$ .

Soient  $h, h' \in H_1 + H_2$ .

Montrons que  $h - h' \in H_1 + H_2$ .

Soient  $h_1, h'_1 \in H_1$  et  $h_2, h'_2 \in H_2$  tels que

$$h = h_1 + h_2 \quad \text{et} \quad h' = h'_1 + h'_2.$$

On a

$$\begin{aligned} h - h' &= h_1 + h_2 - h'_1 - h'_2 \\ &= \underbrace{h_1 - h'_1}_{\in H_1} + \underbrace{h_2 - h'_2}_{\in H_2} \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} h - h' &= h_1 + h_2 - h'_1 - h'_2 \\ &= \underbrace{h_1 - h'_1}_{\in H_1} + \underbrace{h_2 - h'_2}_{\in H_2} \end{aligned}} \right\} \text{car groupes abéliens}$$

Donc  $h - h' \in H_1 + H_2$ .

Donc  $H_1 + H_2$  est un sous-groupe de  $G$ . ■

---

*Démonstration 8.19 (2)*

Clair. ■

---

*Démonstration 8.20 (3)*

Montrons que  $+$  est associative :

Soient  $H_1, H_2, H_3$  des sous-groupes de  $G$ .

Montrons que  $H_1 + (H_2 + H_3) = (H_1 + H_2) + H_3$ .

On a  $H_1 + (H_2 + H_3) \subseteq G$  et  $(H_1 + H_2) + H_3 \subseteq G$ .

Soit  $g \in G$ .

On a

$$\begin{aligned} g \in (H_1 + H_2) + H_3 &\iff \exists h \in H_1 + H_2, \exists h_3 \in H_3, g = h + h_3 \\ &\iff \exists h_1 \in H_1, \exists h_2 \in H_2, \exists h_3 \in H_3, g = (h_1 + h_2) + h_3 \\ &\iff \exists h_1 \in H_1, \exists h_2 \in H_2, \exists h_3 \in H_3, g = h_1 + h_2 + h_3 \\ &\iff \exists h_1 \in H_1, \exists h \in H_2 + H_3, g = h_1 + h \\ &\iff g \in H_1 + (H_2 + H_3) \end{aligned}$$

Donc  $+$  est associative.

Montrons que  $+$  est commutative :

On a  $H_1 + H_2 \subseteq G$  et  $H_2 + H_1 \subseteq G$ .

Soit  $g \in G$ .

On a

$$\begin{aligned} g \in H_1 + H_2 &\iff \exists h_1 \in H_1, \exists h_2 \in H_2, g = h_1 + h_2 \\ &\iff \exists h_2 \in H_2, \exists h_1 \in H_1, g = h_2 + h_1 \\ &\iff g \in H_2 + H_1 \end{aligned}$$

Donc  $+$  est commutative. ■

---

### **Théorème 8.21 (Sous-groupes de $\mathbb{Z}$ )**

*Les sous-groupes de  $(\mathbb{Z}, +)$  sont les ensembles de la forme  $n\mathbb{Z}$  où  $n \in \mathbb{N}$ .*

---

*Démonstration 8.22*

Montrons que les sous-groupes de  $(\mathbb{Z}, +)$  sont les parties de la forme  $n\mathbb{Z} = \{nk\}_{k \in \mathbb{Z}}$  où  $n \in \mathbb{N}$ .

On a

$$n\mathbb{Z} = \{\dots; -2n; -n; 0; n; 2n; \dots\}.$$

$\supseteq$

Soit  $n \in \mathbb{N}$ .

Montrons que  $n\mathbb{Z}$  est un sous-groupe de  $(\mathbb{Z}, +)$ .

On a  $n\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}$ .

On a  $0 \in n\mathbb{Z}$  car  $0 = n \times 0$ .

Soient  $x, y \in n\mathbb{Z}$ .

Montrons que  $x - y \in n\mathbb{Z}$ .

Soient  $x', y' \in \mathbb{Z}$  tels que  $x = nx'$  et  $y = ny'$ .

On a

$$x - y = nx' - ny' = n \underbrace{(x' - y')}_{\in \mathbb{Z}}.$$

Donc  $x - y \in n\mathbb{Z}$ .

Donc  $n\mathbb{Z}$  est un sous-groupe de  $(\mathbb{Z}, +)$ .

$\subseteq$

Soit  $H$  un sous-groupe de  $(\mathbb{Z}, +)$ .

On pose  $E = H \cap \mathbb{N}^*$ .

Si  $E = \emptyset$  :

Montrons que  $H = 0\mathbb{Z} = \{0\}$ .

Par l'absurde, soit  $x \in H \setminus \{0\}$ .

Si  $x > 0$  alors  $x \in E$  : contradiction car  $E = \emptyset$ .

Si  $x < 0$  alors  $-x \in E$  : contradiction car  $E = \emptyset$ .

Donc  $H = \{0\} = 0\mathbb{Z}$ .

Supposons  $E \neq \emptyset$ .

On pose  $n = \min E$  ( $n$  existe car  $E$  est une partie non-vide de  $\mathbb{N}$ ).

Montrons que  $H = n\mathbb{Z}$ .

$\supseteq$

Montrons que  $\forall k \in \mathbb{N}, nk \in H$  par récurrence sur  $k$ .

Initialisation : on a  $0 \in H$  et  $0 = 0 \times n$ .

Hérédité : soit  $k \in \mathbb{N}$  tel que  $nk \in H$ .

On a  $n(k+1) = nk + n \in H$  car  $H$  est un sous-groupe de  $\mathbb{Z}$  et  $nk, n \in H$ .

Conclusion :  $\forall k \in \mathbb{N}, nk \in H$ .

On en déduit que  $\forall k \in \mathbb{N}, -nk \in H$  car  $H$  est un sous-groupe de  $\mathbb{Z}$ .

Donc  $\forall k \in \mathbb{Z}, nk \in H$ .

D'où  $n\mathbb{Z} \subseteq H$ .

$\square$

Soit  $h \in H$ .

On a  $n \in \mathbb{N}^*$ .

On note  $q$  et  $r$  le quotient et le reste de la division euclidienne de  $h$  par  $n$ .

$$\text{On a donc } \begin{cases} h = nq + r \\ 0 \leq r < n \end{cases}$$

On a  $h, n \in H$  donc  $r = h - nq \in H$ .

Donc  $r = 0$  car  $n$  est le plus petit élément strictement positif de  $H$ .

Donc  $h = qn \in n\mathbb{Z}$ . ■

## 8.2 PGCD

### 8.2.1 PGCD de deux entiers

#### 8.2.1.1 Définition

---

**Définition 8.23**

Soient  $a, b \in \mathbb{Z}$ .

On rappelle qu'on note  $\text{div}(a)$  l'ensemble des diviseurs positifs de  $a$ .

Les diviseurs positifs communs à  $a$  et  $b$  sont les éléments de l'ensemble  $\text{div}(a) \cap \text{div}(b)$ .

Si celui-ci possède un plus grand élément pour la relation d'ordre  $|$ , on l'appelle le plus grand commun diviseur de  $a$  et  $b$  et on le note  $a \wedge b$ .

---

*Exemple 8.24*

On a

$$\operatorname{div}(12) = \{1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 12\} \quad \text{et} \quad \operatorname{div}(15) = \{1 ; 3 ; 5 ; 15\}.$$

Donc les diviseurs communs à 12 et 15 sont :

$$\operatorname{div}(12) \cap \operatorname{div}(15) = \{1 ; 3\}.$$

Donc le PGCD de 12 et 15 est :

$$12 \wedge 15 = 3.$$

---

*Remarque 8.25*

Soient  $a, b \in \mathbb{Z}$ .

Le PGCD de  $a$  et  $b$  existe si, et seulement si, le PGCD de  $|a|$  et  $|b|$  existe.

On a alors

$$a \wedge b = |a| \wedge |b|.$$

---

*Démonstration 8.26*

Clair car  $\operatorname{div}(a) \cap \operatorname{div}(b) = \operatorname{div}(|a|) \cap \operatorname{div}(|b|)$ . ■

---

*Remarque 8.27*

On a, pour tout  $a \in \mathbb{Z}$  :

$$a \wedge 0 = |a| \quad \text{et} \quad a \wedge 1 = 1.$$

---

*Remarque 8.28*

Soient  $a, b \in \mathbb{Z}$ .

(1) Le PGCD de  $a$  et  $b$ , s'il existe, est le diviseur commun à  $a$  et  $b$  positif et divisible par tous leurs autres diviseurs communs.

(2) Il est donc caractérisé par :

$$a \wedge b \geqslant 0 \quad \text{et} \quad \operatorname{div}(a) \cap \operatorname{div}(b) = \operatorname{div}(a \wedge b).$$

(3) Si  $a = b = 0$  alors  $0 \wedge 0 = 0$ .

Sinon, le plus grand diviseur commun à  $a$  et  $b$  pour l'ordre  $|$  est aussi le plus grand diviseur commun à  $a$  et  $b$  pour l'ordre  $\leqslant$  selon la Proposition 8.7.



---

*Démonstration 8.29 (2)*

Soit  $n \in \mathbb{Z}$  tel que  $n \geq 0$  et  $\text{div}(a) \cap \text{div}(b) = \text{div}(n)$ .

Montrons que  $n$  est le PGCD de  $a$  et  $b$ .

On a  $n \in \text{div}(n)$  donc  $n \in \text{div}(a) \cap \text{div}(b)$  donc

$$n \mid a \quad \text{et} \quad n \mid b.$$

Donc  $n$  est un diviseur commun à  $a$  et  $b$ .

Montrons que  $n$  est le plus grand d'entre eux.

Soit  $d$  un diviseur commun à  $a$  et  $b$ .

On a  $d \in \text{div}(a) \cap \text{div}(b)$  donc  $d \in \text{div}(n)$ .

Donc  $d \mid n$ . ■

---

### **Lemme 8.30**

Soient  $a, b, n \in \mathbb{N}$  tels que  $a \equiv b [n]$ .

Alors  $a$  et  $n$  admettent un PGCD si, et seulement si,  $b$  et  $n$  admettent un PGCD.

On a alors

$$a \wedge n = b \wedge n.$$

---

*Démonstration 8.31*

Il suffit de montrer que  $\text{div}(a) \cap \text{div}(b) = \text{div}(b) \cap \text{div}(a)$ .

$\subseteq$

Soient  $d \in \text{div}(a) \cap \text{div}(b)$  et  $k \in \mathbb{Z}$  tel que  $b = a + kn$ .

On a  $d \mid a$  et  $d \mid kn$  donc  $d \mid b$ .

Donc  $d \in \text{div}(b) \cap \text{div}(a)$ .

$\supseteq$  Idem. ■

---

*Remarque 8.32*

Soient  $a, b \in \mathbb{Z}$ .

On a

$$a \wedge b = |a| \iff a \mid b.$$

---

*Démonstration 8.33*

$\Rightarrow$

Supposons  $a \wedge b = |a|$ .

On a  $a \mid |a|$  et  $|a| \mid b$ .

Donc  $a \mid b$ .

$\Leftarrow$

Supposons  $a \mid b$ .

On a  $|a| \mid a$  et  $|a| \mid b$ .

Donc  $|a| \in \operatorname{div}(a) \cap \operatorname{div}(b)$ .

De plus, on a  $\forall d \in \operatorname{div}(a) \cap \operatorname{div}(b), d \mid |a|$ .

Donc  $|a| = a \wedge b$ . ■

---

*Remarque 8.34*

Soient  $a, b \in \mathbb{N}$ .

Alors  $a \wedge b = \inf \{a ; b\}$  pour l'ordre  $\mid$ , sous réserve d'existence.

### 8.2.1.2 Preuve algébrique

---

#### **Proposition 8.35**

Soient  $a, b \in \mathbb{Z}$ .

Alors  $a$  et  $b$  admettent un PGCD.

---

*Démonstration 8.36*

L'ensemble  $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$  est un sous-groupe de  $\mathbb{Z}$  (cf. Définition/Proposition 8.17 et Théorème 8.21).

Il existe donc  $n \in \mathbb{Z}$  tel que  $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = n\mathbb{Z}$ .

Montrons que  $n$  est le PGCD de  $a$  et  $b$ .

On a  $n \geq 0$ .

De plus, on a  $a \in a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$  car  $a = 1 \times a + 0 \times b$  donc  $a \in n\mathbb{Z}$  donc  $n \mid a$ .

De même,  $n \mid b$ .

Soient  $d \in \operatorname{div}(a) \cap \operatorname{div}(b)$  et  $k, \ell \in \mathbb{Z}$  tels que  $dk = a$  et  $d\ell = b$ .

On a  $n \in n\mathbb{Z}$  donc  $n \in a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$ .

Soient  $u, v \in \mathbb{Z}$  tels que  $n = ua + vb$ .

On a  $n = udk + vdl = d(uk + vl)$  donc  $d \mid n$ .

Donc  $n$  est le PGCD de  $a$  et  $b$ . ■

### 8.2.1.3 Preuve algorithmique, algorithme d'Euclide

On définit une fonction récursive  $\text{pgcd} : \mathbb{Z}^2 \longrightarrow \mathbb{N}$ .

Montrons que la fonction termine toujours et que  $\text{pgcd}(a, b)$  renvoie le PGCD de  $a$  et  $b$  pour tout  $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$ .

---

#### Algorithme 8.37 (Algorithme d'Euclide)

Si  $a < 0$  ou  $b < 0$ , on renvoie  $\text{pgcd}(|a|, |b|)$ .

Si  $b = 0$ , on renvoie  $a$ .

Sinon :

- on fait la division euclidienne de  $a$  par  $b$  :  $\begin{cases} a = qb + r \\ 0 \leq r < b \end{cases}$  ;
- on a  $a \equiv r [b]$  donc on renvoie  $\text{pgcd}(b, r)$ .

---

#### Démonstration 8.38 (Terminaison)

Montrons que l'algorithme termine toujours.

Soit  $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$ .

Par l'absurde, supposons que l'algorithme ne termine jamais :

$$\text{pgcd}(a, b) \longrightarrow \underbrace{\text{pgcd}(a_1, b_1) \longrightarrow \text{pgcd}(a_2, b_2) \longrightarrow \dots}_{\text{arguments} \geq 0}$$

Pour tout  $k \in \mathbb{N}^*$ , on a  $\begin{cases} a_{k+1} = b_k \\ 0 \leq b_{k+1} < b_k \end{cases}$

Donc  $(b_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$  est une suite strictement décroissante d'entiers naturels : contradiction.

Donc l'algorithme termine toujours. ■

---

*Exemple 8.39*

Calculons le PGCD de 1024 et 1000 :

$$1024 = 1 \times 1000 + 24$$

$$1000 = 41 \times 24 + 16$$

$$24 = 1 \times 16 + 8$$

$$16 = 2 \times 8 + 0$$

Donc  $1024 \wedge 1000 = 8$ .

#### 8.2.1.4 Propriétés

---

**Proposition 8.40**

Soient  $a, b, \lambda \in \mathbb{Z}$ .

On a :

$$(\lambda a) \wedge (\lambda b) = |\lambda| (a \wedge b).$$

---

*Démonstration 8.41*

Montrons que  $\lambda (a \wedge b) \mid (\lambda a) \wedge (\lambda b)$ .

On a  $a \wedge b$  divise  $a$  et  $b$ .

Donc  $\lambda (a \wedge b)$  divise  $\lambda a$  et  $\lambda b$ .

Donc  $\lambda (a \wedge b) \mid (\lambda a) \wedge (\lambda b)$ .

Montrons que  $(\lambda a) \wedge (\lambda b) \mid \lambda (a \wedge b)$ .

On a  $\lambda$  divise  $\lambda a$  et  $\lambda b$ .

Donc  $\lambda \mid (\lambda a) \wedge (\lambda b)$ .

Soit  $d \in \mathbb{Z}$  tel que  $(\lambda a) \wedge (\lambda b) = d\lambda$ .

On a  $(\lambda a) \wedge (\lambda b)$  divise  $\lambda a$  et  $\lambda b$ .

Donc  $d\lambda$  divise  $\lambda a$  et  $\lambda b$ .

Supposons  $\lambda \neq 0$ .

Alors  $d$  divise  $a$  et  $b$ .

Donc  $d \mid a \wedge b$ .

Donc  $d\lambda \mid \lambda (a \wedge b)$ .

Donc  $(\lambda a) \wedge (\lambda b) \mid \lambda (a \wedge b)$ .

Si  $\lambda = 0$  : la proposition est vraie aussi car 
$$\begin{cases} (\lambda a) \wedge (\lambda b) = 0 \\ \lambda (a \wedge b) = 0 \end{cases}$$

Finalement, les entiers  $\lambda (a \wedge b)$  et  $(\lambda a) \wedge (\lambda b)$  se divisent mutuellement.

Donc  $|\lambda (a \wedge b)| = |(\lambda a) \wedge (\lambda b)|$ .

Donc  $|\lambda| (a \wedge b) = (\lambda a) \wedge (\lambda b)$ . ■

## 8.2.2 Relation de Bézout

### 8.2.2.1 Définition

---

#### Définition/Proposition 8.42 (Relation de Bézout)

Soient  $a, b \in \mathbb{Z}$ .

Alors il existe des entiers  $u, v \in \mathbb{Z}$  tels que :

$$ua + vb = a \wedge b.$$

Une telle écriture s'appelle une relation de Bézout.

Elle n'est pas unique.

---

#### Démonstration 8.43 (Absence d'unicité)

Soient  $u, v \in \mathbb{Z}$  tels que

$$ua + vb = a \wedge b.$$

On a alors

$$(u - b) a + (v + a) b = a \wedge b.$$

Donc le couple  $(u', v') = (u - b, v + a)$  convient aussi. ■

### 8.2.2.2 Preuve algébrique

---

#### Proposition 8.44

Soient  $a, b \in \mathbb{Z}$ .

Alors  $a$  et  $b$  admettent une relation de Bézout.

---

*Démonstration 8.45*

On a vu que  $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = (a \wedge b)\mathbb{Z}$ .

On a  $a \wedge b \in (a \wedge b)\mathbb{Z}$  donc  $a \wedge b \in a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$ .

Donc on a

$$\exists u, v \in \mathbb{Z}, \quad a \wedge b = ua + bv.$$

■

### 8.2.2.3 Preuve algorithmique, algorithme d'Euclide étendu

Écrivons  $\text{bezout}(a, b)$  où  $a, b \in \mathbb{Z}$  et qui renvoie  $u, v, d$  tels que 
$$\begin{cases} d = a \wedge b \\ ua + vb = a \wedge b \end{cases}$$

---


**Algorithme 8.46 (Algorithme d'Euclide étendu, en langage Python)**

```
1 def bezout(a, b):
2     if a < 0:
3         u, v, d = bezout(-a, b)
4         return -u, v, d
5     if b < 0:
6         u, v, d = bezout(a, -b)
7         return u, -v, d
8     elif b == 0:
9         return 1, 0, a
10    else:
11        q, r = a // b, a % b
12        u, v, d = bezout(b, r)
13        return v, u - v * q, d
```

---

*Exemple 8.47*

Déterminons le PGCD et une relation de Bézout de 14 et 9 :



Donc

$$14 \wedge 9 = 1 \quad \text{et} \quad 1 = 2 \times 14 - 3 \times 9.$$

### 8.2.3 PGCD de plusieurs entiers

---

*Remarque 8.48*

La loi  $\wedge$  est une loi de composition interne associative et commutative sur  $\mathbb{Z}$ .

---

*Démonstration 8.49*

La loi  $\wedge$  est clairement commutative.

Montrons qu'elle est associative.

Soient  $a, b, c \in \mathbb{Z}$ .

On a

$$\operatorname{div}(a) \cap \operatorname{div}(b) \cap \operatorname{div}(c) = \operatorname{div}(a) \cap \operatorname{div}(b \wedge c) = \operatorname{div}(a \wedge (b \wedge c))$$

et

$$\operatorname{div}(a) \cap \operatorname{div}(b) \cap \operatorname{div}(c) = \operatorname{div}(a \wedge b) \cap \operatorname{div}(c) = \operatorname{div}((a \wedge b) \wedge c).$$

Donc  $a(b \wedge c)$  et  $(a \wedge b) \wedge c$  se divisent mutuellement.

De plus, ce sont des entiers positifs.

Donc ils sont égaux. ■

---

#### Définition/Proposition 8.50

Soient  $r \in \mathbb{N}^*$  et  $a_1, \dots, a_r \in \mathbb{Z}$ .

Les diviseurs positifs communs à  $a_1, \dots, a_r$  sont les diviseurs de  $a_1 \wedge \dots \wedge a_r$ .

Ce nombre est le PGCD de  $a_1, \dots, a_r$ .

---

#### Proposition 8.51

Soient  $r \in \mathbb{N}^*$  et  $a_1, \dots, a_r, \lambda \in \mathbb{Z}$ .

On a :

$$(\lambda a_1) \wedge \dots \wedge (\lambda a_r) = |\lambda| (a_1 \wedge \dots \wedge a_r).$$

---

*Démonstration 8.52*

Découle de la Proposition 8.40 par récurrence sur  $r \in \mathbb{N}^*$ . ■

## 8.3 Entiers premiers entre eux

### 8.3.1 Cas de deux entiers

---

**Définition 8.53 (Entiers premiers entre eux)**

Deux entiers  $a, b \in \mathbb{Z}$  sont dits premiers entre eux s'ils vérifient :

$$a \wedge b = 1.$$

Cela signifie que leurs seuls diviseurs communs sont 1 et  $-1$ .

---

**Théorème 8.54 (Théorème de Bézout)**

Soient  $a, b \in \mathbb{Z}$ .

On a :

$$a \text{ et } b \text{ premiers entre eux} \iff \exists u, v \in \mathbb{Z}, \quad ua + vb = 1.$$

---

*Démonstration 8.55*

$\Rightarrow$  Déjà vu (cf. Définition/Proposition 8.42).

$\Leftarrow$

Supposons qu'il existe  $u, v \in \mathbb{Z}$  tels que  $ua + bv = 1$ .

On a  $a \wedge b$  divise  $a$  et  $b$ .

Donc  $a \wedge b \mid ua + vb$ .

Donc  $a \wedge b \mid 1$ .

Donc  $a \wedge b = 1$  car  $a \wedge b \in \mathbb{N}$ . ■

---

**Proposition 8.56**

Soient  $\lambda, x, y, n \in \mathbb{Z}$ .

On suppose que  $\lambda$  et  $n$  sont premiers entre eux.

Alors :

$$x \equiv y [n] \iff \lambda x \equiv \lambda y [n].$$



---

*Démonstration 8.57*

Soient  $u, v \in \mathbb{Z}$  tels que  $u\lambda + vn = 1$ .

On a  $u\lambda \equiv 1 [n]$ .

Montrons l'équivalence.

$\Rightarrow$  Vraie : il suffit de multiplier par  $\lambda$ .

$\Leftarrow$  Vraie : il suffit de multiplier par  $u$ . ■

---

**Lemme 8.58 (Lemme de Gauss)**

Soient  $a, b, n \in \mathbb{Z}$ .

On suppose :

$$n \mid ab \quad \text{et} \quad n \wedge b = 1.$$

Alors :

$$n \mid a.$$

---

*Démonstration 8.59*

Soient  $u, v \in \mathbb{Z}$  tels que  $un + vb = 1$ .

On a  $n \mid ab$ . Soit  $k \in \mathbb{Z}$  tel que  $nk = ab$ .

On a  $a(un + vb) = a$  donc  $nau + vnk = a$ .

Donc  $n(au + vk) = a$ .

Donc  $n \mid a$ . ■

---

*Remarque 8.60 (Forme irréductible d'un rationnel)*

Soit  $q \in \mathbb{Q}$ .

Il existe un unique couple  $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$  tel que :

$$q = \frac{a}{b} \quad \text{et} \quad a \wedge b = 1.$$

---

*Démonstration 8.61*

Soit  $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$  tel que  $q = \frac{a}{b}$ .

existence

On pose  $a' = \frac{a}{a \wedge b}$  et  $b' = \frac{b}{a \wedge b}$  (on a  $a' \in \mathbb{Z}$  et  $b' \in \mathbb{N}^*$  car  $a \wedge b$  divise  $a$  et  $b$ ).

On a  $q = \frac{a'}{b'}$ .

Montrons que  $a' \wedge b' = 1$ .

Comme  $a \wedge b \geq 0$ , d'après la Proposition 8.40, on a

$$a \wedge b = ((a \wedge b) a') \wedge ((a \wedge b) \wedge b) = (a \wedge b) (a' \wedge b').$$

Or  $a \wedge b \neq 0$  donc  $1 = a' \wedge b'$ .

unicité

Soit  $(a'', b'') \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$  tel que 
$$\begin{cases} a'' \wedge b'' = 1 \\ q = \frac{a''}{b''} \end{cases}$$

Montrons que  $(a', b') = (a'', b'')$ .

On a  $\frac{a'}{b'} = \frac{a''}{b''}$  donc  $a' b'' = b' a''$ .

Donc  $b'' \mid b' a''$  et  $b'' \wedge a'' = 1$  donc  $b'' \mid b'$  selon le lemme de Gauss.

De même,  $b' \mid b''$  donc  $b' = b''$  donc  $a' = a''$ . ■

---

### Proposition 8.62

Soient  $a, b, n \in \mathbb{Z}$ .

On suppose

$$a \wedge n = 1 \quad \text{et} \quad b \wedge n = 1.$$

Alors

$$ab \wedge n = 1.$$

---

*Démonstration 8.63*

Soient  $u, v, u', v' \in \mathbb{Z}$  tels que 
$$\begin{cases} ua + vn = 1 \\ u'b + v'n = 1 \end{cases}$$

On a, par produit :

$$\underbrace{uu'}_{\in \mathbb{Z}} ab + n \underbrace{(uav' + vbu' + vv'n)}_{\in \mathbb{Z}} = 1$$

Donc  $ab \wedge n = 1$ . ■

---

**Corollaire 8.64**

Soient  $r \in \mathbb{N}^*$  et  $a_1, \dots, a_r, n \in \mathbb{Z}$ .

On suppose

$$\forall k \in \llbracket 1 ; r \rrbracket, \quad a_k \wedge n = 1.$$

Alors

$$(a_1 \dots a_r) \wedge n = 1.$$

---

*Démonstration 8.65*

Par récurrence immédiate sur  $r \in \mathbb{N}^*$ . ■

---

**Proposition 8.66**

Soient  $a, b, n \in \mathbb{Z}$ .

On suppose

$$a \mid n \quad \text{et} \quad b \mid n \quad \text{et} \quad a \wedge b = 1.$$

Alors

$$ab \mid n.$$

---

*Démonstration 8.67*

Comme  $a \mid n$ , il existe  $\lambda \in \mathbb{Z}$  tel que  $a\lambda = n$ .

On a  $b \mid a\lambda$  et  $b \wedge a = 1$ .

Donc selon le lemme de Gauss :  $b \mid \lambda$ .

Donc  $ab \mid a\lambda$ .

Donc  $ab \mid n$ . ■

### 8.3.2 Cas de plusieurs entiers

---

**Définition 8.68**

Soient  $r \in \mathbb{N}^*$  et  $a_1, \dots, a_r \in \mathbb{Z}$ .

On dit que les entiers  $a_1, \dots, a_r$  sont premiers entre eux deux à deux si on a :

$$\forall i, j \in \llbracket 1 ; r \rrbracket, \quad i \neq j \implies a_i \wedge a_j = 1.$$

On dit que les entiers  $a_1, \dots, a_r$  sont premiers entre eux dans leur ensemble si  $a_1 \wedge \dots \wedge a_r = 1$ . Cela signifie que leurs seuls diviseurs communs sont 1 et  $-1$ .

---

*Remarque 8.69*

Soient  $r \in \mathbb{N} \setminus \{0 ; 1\}$  et  $a_1, \dots, a_r \in \mathbb{Z}$ .

«  $a_1, \dots, a_r$  sont premiers entre eux deux à deux » implique «  $a_1, \dots, a_r$  sont premiers entre eux dans leur ensemble ».

L'implication réciproque est fausse, par exemple : 6, 10 et 15 sont premiers entre eux dans leur ensemble mais pas deux à deux.

## 8.4 PPCM

---

**Définition/Proposition 8.70**

Soient  $a, b \in \mathbb{Z}$ .

Dans l'ensemble ordonné  $(\mathbb{N}, |)$ , il existe un plus petit multiple commun positif à  $a$  et  $b$  appelé le « Plus Petit Commun Multiple » (PPCM) et noté  $a \vee b$ .

$$\text{On a } \begin{cases} a \vee b \geq 0 \\ a \mid a \vee b \\ b \mid a \vee b \\ \forall m \in \mathbb{N}, [a \mid m \text{ et } b \mid m] \implies a \vee b \mid m \end{cases}$$

---

*Démonstration 8.71*

L'ensemble  $a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z}$  est un sous-groupe de  $(\mathbb{Z}, +)$ .

Donc il existe  $\mu \in \mathbb{N}$  tel que  $a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z} = \mu\mathbb{Z}$ .

On a  $\mu \geq 0$ .

Comme  $\mu \in a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z}$ , on a  $\begin{cases} a \mid \mu \\ b \mid \mu \end{cases}$

Enfin, soit  $m \in \mathbb{N}$  tel que  $\begin{cases} a \mid m \\ b \mid m \end{cases}$

On a  $m \in a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z}$  donc  $m \in \mu\mathbb{Z}$ .

Donc  $\mu \mid m$ . ■

---

*Remarque 8.72*

On a :

- $\forall a, b \in \mathbb{Z}, a \vee b = |a| \vee |b|$
- $\forall a, b \in \mathbb{N}, a \vee b = \sup \{a ; b\}$  dans  $(\mathbb{N}, |)$

---

**Proposition 8.73**

$\vee$  est une loi de composition interne associative et commutative sur  $\mathbb{Z}$ .

---

*Démonstration 8.74*

$\vee$  est clairement commutative.

Montrons que  $\vee$  est associative.

Soient  $a, b, c \in \mathbb{Z}$ .

D'une part,

$$a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z} \cap c\mathbb{Z} = (a \vee b)\mathbb{Z} \cap c\mathbb{Z} = ((a \vee b) \vee c)\mathbb{Z}.$$

D'autre part,

$$a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z} \cap c\mathbb{Z} = a\mathbb{Z} \cap (b \vee c)\mathbb{Z} = (a \vee (b \vee c))\mathbb{Z}.$$

Donc  $(a \vee b) \vee c$  et  $a \vee (b \vee c)$  se divisent mutuellement.

De plus, ils appartiennent à  $\mathbb{N}$  donc ils égaux. ■

---

**Définition 8.75**

Soient  $r \in \mathbb{N}^*$  et  $a_1, \dots, a_r \in \mathbb{Z}$ .

L'élément  $a_1 \vee \dots \vee a_r$  est le plus petit (pour  $|$ ) multiple commun à  $a_1, \dots, a_r$ .

On l'appelle le PPCM de  $a_1, \dots, a_r$ .

---

*Exemple 8.76*

$9 \vee 12 = 36$  car  $9\mathbb{N} = \{0 ; 9 ; 18 ; 27 ; 36 ; \dots\}$  et  $12\mathbb{N} = \{0 ; 12 ; 24 ; 36 ; \dots\}$ .

On a

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \begin{cases} n \vee 1 = |n| \\ n \vee 0 = 0 \\ n \vee 2 = \begin{cases} n & \text{si } n \text{ est pair} \\ 2n & \text{sinon} \end{cases} \end{cases}$$

---

*Remarque 8.77*

Soient  $a, b \in \mathbb{Z}$ .

On a

$$a \vee b = |b| \iff a \mid b.$$

---

*Démonstration 8.78*

$\Rightarrow$

Supposons  $a \vee b = |b|$ .

On a  $a \mid |b|$ .

Or  $|b| \mid b$ .

Donc  $a \mid b$ .

$\Leftarrow$

Supposons  $a \mid b$ .

On a

$$\forall m \in \mathbb{N}, [a \mid m \text{ et } b \mid m] \iff b \mid m.$$

Donc  $a \vee b = |b|$ . ■

---

**Proposition 8.79**

On a

$$(1) \forall a, b, \lambda \in \mathbb{Z}, (\lambda a) \vee (\lambda b) = |\lambda| (a \vee b)$$

$$(2) \forall r \in \mathbb{N}^*, \forall a_1, \dots, a_r, \lambda \in \mathbb{Z}, (\lambda a_1) \vee \dots \vee (\lambda a_r) = |\lambda| (a_1 \vee \dots \vee a_r)$$

---

*Démonstration 8.80 (1)*

Montrons que  $(\lambda a) \vee (\lambda b) \mid \lambda (a \vee b)$ .

On a  $\lambda a$  et  $\lambda b$  divisent  $\lambda (a \vee b)$  donc  $(\lambda a) \vee (\lambda b) \mid \lambda (a \vee b)$ .

Montrons que  $\lambda (a \vee b) \mid (\lambda a) \vee (\lambda b)$ .

On a  $\lambda \mid (\lambda a) \vee (\lambda b)$  (car  $\lambda \mid \lambda a \mid (\lambda a) \vee (\lambda b)$ ).

Soit  $m \in \mathbb{Z}$  tel que  $\lambda m = (\lambda a) \vee (\lambda b)$ .

C'est-à-dire, en supposant  $\lambda \neq 0$  :  $a \vee b \mid m$ .

On a  $\lambda a$  et  $\lambda b$  divisent  $(\lambda a) \vee (\lambda b)$  donc  $\lambda a$  et  $\lambda b$  divisent  $\lambda m$ .

Donc  $a$  et  $b$  divisent  $m$  car  $\lambda \neq 0$ .

Donc  $a \vee b \mid m$ .

Donc  $\lambda(a \vee b) \mid \lambda m$ .

Finalement,  $(\lambda a) \vee (\lambda b)$  et  $\lambda(a \vee b)$  se divisent mutuellement donc ils ont même valeur absolue. ■

---

*Démonstration 8.81 (2)*

Découle de (1) par récurrence sur  $r \in \mathbb{N}^*$ . ■

---

**Proposition 8.82**

Soient  $a, b \in \mathbb{Z}$ .

On a

$$(a \vee b)(a \wedge b) = |ab|.$$

---

*Démonstration 8.83*

Si  $a \wedge b = 1$  :

On a, selon la Proposition 8.66 :

$$\forall m \in \mathbb{Z}, \quad \begin{cases} a \mid m \\ b \mid m \end{cases} \iff ab \mid m.$$

Donc  $a \vee b = |ab|$  donc  $(a \vee b)(a \wedge b) = |ab|$ .

Sinon :

On pose  $a' = \frac{a}{a \wedge b}$  et  $b' = \frac{b}{a \wedge b}$ .

Alors  $a' \in \mathbb{Z}$  et  $b' \in \mathbb{N}^*$  (cf. Démonstration 8.61).

On a donc, selon le cas précédent :  $(a' \vee b')(a' \wedge b') = |a'b'|$ .

Puis, en multipliant de chaque côté par  $(a \wedge b)^2$  :

$$\left[ \underbrace{((a \wedge b) a')}_a \wedge \underbrace{((a \wedge b) b')}_b \right] \left[ \underbrace{((a \wedge b) a')}_a \vee \underbrace{((a \wedge b) b')}_b \right] = |(a \wedge b) a' (a \wedge b) b'| = |ab|. \quad \blacksquare$$

## 8.5 Nombres premiers

### 8.5.1 Définition

---

**Définition 8.84 (Nombre premier)**

On appelle nombre premier tout entier  $p \in \llbracket 2 ; +\infty \llbracket$  dont les seuls diviseurs positifs sont 1 et lui-même.

L'ensemble des nombres premiers est souvent noté  $\mathbb{P}$  :

$$\forall p \in \mathbb{Z}, p \in \mathbb{P} \iff [p \geq 2 \text{ et } \text{div}(p) = \{1 ; p\}].$$

---

**Définition 8.85 (Nombre composé)**

On appelle nombre composé tout entier  $n \in \llbracket 2 ; +\infty \llbracket$  qui n'est pas un nombre premier, c'est-à-dire vérifiant :

$$\exists a, b \in \llbracket 2 ; +\infty \llbracket, ab = n.$$

---

*Exemple 8.86*

Les entiers 0 et 1 ne sont ni des nombres premiers, ni des nombres composés.

Les entiers 2, 3, 5, 7, 11 sont des nombres premiers.

Les entiers 4, 6, 8, 9, 10 sont des nombres composés.

---

*Remarque 8.87*

Soient  $p \in \mathbb{P}$  et  $n \in \mathbb{Z}$ .

On a

$$p \nmid n \iff p \wedge n = 1.$$

---

*Démonstration 8.88*

Si  $p \mid n$  alors  $p \wedge n = |n|$ .

$$\text{Si } p \nmid n \text{ alors } \begin{cases} p \wedge n \in \text{div}(p) \\ p \wedge n \in \text{div}(n) \end{cases}$$

$$\text{Donc } \begin{cases} p \wedge n \in \{1 ; p\} \\ p \wedge n \neq p \end{cases}$$

Donc  $p \wedge n = 1$ .

Finalement,  $p \wedge n = 1 \iff p \nmid n$ . ■



---

**Lemme 8.89**

Soit  $n \in \llbracket 2 ; +\infty \llbracket$ .

Alors  $n$  admet un diviseur premier.

---

*Démonstration 8.90*

On raisonne par récurrence forte sur  $n$ .

On pose

$$\forall n \in \llbracket 2 ; +\infty \llbracket, \mathcal{P}(n) : [\exists p \in \mathbb{P}, p \mid n].$$

On a  $2 \mid 2$ . D'où  $\mathcal{P}(2)$ .

Soit  $n \in \llbracket 3 ; +\infty \llbracket$  tel que  $\forall k \in \llbracket 2 ; n-1 \rrbracket, \mathcal{P}(k)$ .

Montrons  $\mathcal{P}(n)$ .

Si  $n \in \mathbb{P}$  alors on a  $\mathcal{P}(n)$  car  $n \mid n$ .

Sinon,  $n$  admet un diviseur positif autre que 1 et lui-même qu'on note  $d$ .

On a  $1 < d < n$ .

Selon  $\mathcal{P}(d)$ , il existe  $p \in \mathbb{P}$  tel que  $p \mid d$ .

D'où  $p \mid n$ .

D'où, par récurrence forte,  $\forall n \in \llbracket 2 ; +\infty \llbracket, \mathcal{P}(n)$ . ■

---

**Théorème 8.91**

Il existe une infinité de nombres premiers.

---

*Démonstration 8.92*

Soit  $n \in \mathbb{N}$ .

Posons  $N = n! + 1$ . On a  $N \geq 2$ .

Soit  $p \in \mathbb{P}$  tel que  $p \mid N$  (un tel  $p$  existe selon le lemme précédent).

On a  $p \mid n! + 1$ .

Montrons que  $p > n$ .

Par l'absurde, si  $p \leq n$  alors  $p \mid n!$  donc  $p \mid 1$  : contradiction.

On a donc montré  $\forall n \in \mathbb{N}, \exists p \in \mathbb{P}, p > n$ .

Donc  $\mathbb{P}$  n'est pas majorée.

Donc  $\mathbb{P}$  n'est pas finie. ■

---

*Remarque 8.93 (Crible d'Eratosthène)*

Soit  $N \in \llbracket 2 ; +\infty \rrbracket$ .

Tout nombre composé  $n \in \llbracket 1 ; N \rrbracket$  admet un diviseur premier  $p$  tel que  $p \leqslant \sqrt{n}$ .

---

*Démonstration 8.94*

Soit un nombre composé  $n \in \llbracket 1 ; N \rrbracket$ .

Il existe  $a, b \in \mathbb{N}$  tels que 
$$\begin{cases} ab = n \\ 2 \leqslant a < n \\ 2 \leqslant b < n \end{cases}$$

Quitte à échanger  $a$  et  $b$ , on peut supposer  $a \leqslant \sqrt{n}$ .

Soit, selon le lemme précédent,  $p \in \mathbb{P}$  tel que  $p \mid a$ .

On a 
$$\begin{cases} p \mid n & \text{car } p \mid a \text{ et } a \mid n \\ p \leqslant \sqrt{n} & \text{car } p \leqslant a \leqslant \sqrt{n} \end{cases}$$

On peut ainsi déterminer tous les nombres premiers de  $\llbracket 1 ; N \rrbracket$ . ■

---

*Exemple 8.95*

Avec  $N = 25$  (et donc  $\sqrt{N} = 5$ ) :

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25

## 8.5.2 Théorème fondamental

Le théorème suivant affirme que tout entier strictement positif s'écrit comme produit de nombres premiers, de façon unique à l'ordre des facteurs près.

---

**Théorème 8.96 (Théorème fondamental de l'arithmétique)**

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

Alors  $n$  s'écrit de façon unique sous la forme :

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_r^{\alpha_r} \quad \text{où} \quad \begin{cases} r \in \mathbb{N} \\ p_1, p_2, \dots, p_r \in \mathbb{P} \\ p_1 < p_2 < \dots < p_r \\ \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r \in \mathbb{N}^* \end{cases}$$

---

*Démonstration 8.97*

Pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , on note  $\mathcal{P}(n)$  la proposition « le théorème est vrai pour  $n$  ».

On raisonne par récurrence forte.

On a clairement  $\mathcal{P}(1)$  car 1 est le « produit vide » (avec  $r = 0$ ), et seulement le produit vide.

On a clairement  $\mathcal{P}(2)$  car  $2 = p_1^{\alpha_1}$  avec  $r = 1$ ,  $p_1 = 2$  et  $\alpha_1 = 1$ .

Soit  $n \in \llbracket 3 ; +\infty \rrbracket$  tel que  $\forall k \in \llbracket 1 ; n-1 \rrbracket$ ,  $\mathcal{P}(k)$ .

Montrons  $\mathcal{P}(n)$ .

existence

Si  $n \in \mathbb{P}$  alors l'existence est claire.

Sinon, il existe  $a, b \in \mathbb{N}$  tels que 
$$\begin{cases} n = ab \\ 2 \leq a < n \\ 2 \leq b < n \end{cases}$$

Selon  $\mathcal{P}(a)$ , l'entier  $a$  est produit de nombres premiers.

Selon  $\mathcal{P}(b)$ , l'entier  $b$  est produit de nombres premiers.

Donc  $n$  est produit de nombres premiers.

unicité

Soient  $r, s \in \mathbb{N}$ ,  $p_1, \dots, p_r, q_1, \dots, q_s \in \mathbb{P}$  et  $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \beta_1, \dots, \beta_s \in \mathbb{N}^*$  tels que

$$\begin{cases} n = p_1^{\alpha_1} \dots p_r^{\alpha_r} = q_1^{\beta_1} \dots q_s^{\beta_s} \\ p_1 < \dots < p_r \\ q_1 < \dots < q_s \end{cases}$$

Montrons que  $p_1 = q_1$ .

Par l'absurde, supposons  $p_1 \neq q_1$ .

Si  $p_1 < q_1$  alors  $\forall \ell \in \llbracket 1 ; s \rrbracket$ ,  $p_1 < q_\ell$ .

Donc  $\forall \ell \in \llbracket 1 ; s \rrbracket$ ,  $p_1 \wedge q_\ell = 1$ .

D'où par produit, selon la Proposition 8.66,  $p_1 \wedge (q_1^{\beta_1} \dots q_s^{\beta_s}) = 1$ .

Donc  $p_1 \wedge n = 1$  et  $p_1 \mid n$  : contradiction.

Si  $q_1 < p_1$ , on montre de même que  $q_1 \wedge n = 1$  : contradiction.

Donc  $p_1 = q_1$ .

Ainsi,  $\frac{n}{p_1} = p_1^{\alpha_1-1} \dots p_r^{\alpha_r} = q_1^{\beta_1-1} \dots q_s^{\beta_s}$ .

Selon la partie unicité de  $\mathcal{P}\left(\frac{n}{p_1}\right)$ , on a

$$\begin{cases} r = t \\ \forall k \in \llbracket 2 ; s \rrbracket, \begin{cases} p_k = q_k \\ \alpha_k = \beta_k \end{cases} \\ \alpha_1 = \beta_1 \end{cases}$$

D'où l'unicité.

D'où  $\mathcal{P}(n)$ .

Donc  $\forall n \in \mathbb{N}^*, \mathcal{P}(n)$ . ■

### 8.5.3 Valuations $p$ -adiques

---

#### Définition 8.98 (Valuation $p$ -adique)

Pour tout entier strictement positif  $n \in \mathbb{N}^*$  et tout nombre premier  $p \in \mathbb{P}$ , on note  $v_p(n)$  l'exposant de  $p$  dans la décomposition de  $|n|$  en produit de nombres premiers.

---

#### Exemple 8.99

On a  $40 = 2^3 \times 5$ .

Donc

$$v_2(40) = 3 \quad v_5(40) = 1 \quad \forall p \in \mathbb{P} \setminus \{2 ; 5\}, v_p(40) = 0.$$

---

#### Notation 8.100 (Fonction signum)

On pose

$$\begin{aligned} \text{sg} : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ -1 & \text{si } x < 0 \end{cases} \end{aligned}$$

---

**Notation 8.101**

Soit  $n \in \mathbb{Z}^*$ .

La valuation  $p$ -adique de  $n$  est nulle pour tous les nombres premiers  $p \in \mathbb{P}$  sauf un nombre fini d'entre eux (on dit que la famille  $(v_p(n))_{p \in \mathbb{P}}$  est une famille d'entiers « presque tous nuls »).

Pour cette raison, on s'autorise à définir le « produit infini » :

$$\prod_{p \in \mathbb{P}} p^{v_p(n)}$$

comme étant le produit de ses facteurs différents de 1.

Sa valeur est donc en fait un produit fini :

$$\prod_{p \in \mathbb{P}} p^{v_p(n)} = \prod_{\substack{p \in \mathbb{P} \\ v_p(n) \neq 0}} p^{v_p(n)}.$$

---

**Corollaire 8.102**

On a, selon le théorème fondamental de l'arithmétique :

$$\forall n \in \mathbb{Z}^*, \quad n = \text{sg}(n) \times \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{v_p(n)}.$$

---

**Proposition 8.103 (Valuations d'un produit)**

Soient  $a, b \in \mathbb{Z}^*$ .

On a :

$$\forall p \in \mathbb{P}, \quad v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b).$$

---

*Démonstration 8.104*

$$\text{On a } \begin{cases} a = \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{v_p(a)} \\ b = \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{v_p(b)} \end{cases} \text{ donc}$$

$$ab = \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{v_p(a) + v_p(b)} = \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{v_p(ab)}.$$

D'où l'égalité, par unicité de l'écriture de  $ab$  en produit de nombres premiers. ■

---

**Proposition 8.105 (Caractérisation de la divisibilité)**

Soient  $a, b \in \mathbb{Z}^*$ .

On a

$$a \mid b \iff \forall p \in \mathbb{P}, \quad v_p(a) \leq v_p(b).$$

---

*Démonstration 8.106*



Supposons  $\forall p \in \mathbb{P}, \quad v_p(a) \leq v_p(b)$ .

Alors on a

$$b = \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{v_p(b)} = \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{v_p(a)} \times \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{v_p(b) - v_p(a)} = |a| \times \underbrace{\prod_{p \in \mathbb{P}} p^{v_p(b) - v_p(a)}}_{\substack{\text{entiers presque tous nuls} \\ \in \mathbb{N}}}$$

Donc  $|a| \mid |b|$ .

Donc  $a \mid b$ .



Supposons  $a \mid b$ .

Soit  $c \in \mathbb{Z}$  tel que  $ac = b$ .

Comme  $b \neq 0$ , on a  $c \neq 0$ .

On a

$$\left( \text{sg}(a) \times \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{v_p(a)} \right) \left( \text{sg}(c) \times \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{v_p(c)} \right) = \text{sg}(b) \times \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{v_p(b)}$$

D'où, selon l'unicité de l'écriture d'un entier en produit de nombres premiers :

$$\forall p \in \mathbb{P}, \quad v_p(a) + \underbrace{v_p(c)}_{\in \mathbb{N}} = v_p(b).$$

Donc  $\forall p \in \mathbb{P}, \quad v_p(a) \leq v_p(b)$ . ■

---

*Remarque 8.107 (Caractérisation de  $v_p(n)$ )*

En particulier, si  $n \in \mathbb{Z}^*$  et  $p \in \mathbb{P}$ , alors

$$\forall \alpha \in \mathbb{N}, \quad \alpha = v_p(n) \iff \begin{cases} p^\alpha \mid n \\ p^{\alpha+1} \nmid n \end{cases}$$

---

**Proposition 8.108 (PGCD et PPCM)**

Soient  $a, b \in \mathbb{Z}^*$ .

On a :

$$a \wedge b = \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{\min\{v_p(a); v_p(b)\}} \quad \text{et} \quad a \vee b = \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{\max\{v_p(a); v_p(b)\}}$$

---

*Démonstration 8.109*

Posons  $d = \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{\min\{v_p(a); v_p(b)\}}$ .

Montrons que  $a \wedge b = d$ .

On a  $d \mid a$  et  $d \mid b$  selon la Proposition 8.105.

On a  $d \geq 0$ .

Enfin, soit  $e \in \mathbb{N}$  tel que  $e \mid a$  et  $e \mid b$ .

On a  $e \neq 0$  (car  $a \neq 0$ ).

On a donc, selon la Proposition 8.105 :

$$\forall p \in \mathbb{P}, \quad \begin{cases} v_p(e) \leq v_p(a) \\ v_p(e) \leq v_p(b) \end{cases}$$

Donc  $\forall p \in \mathbb{P}, \quad v_p(e) \leq \min\{v_p(a); v_p(b)\} = v_p(d)$ .

D'où  $e \mid d$  selon la Proposition 8.105.

Finalement,  $d = a \wedge b$ .

Idem pour  $a \vee b$ . ■

## 8.6 Petit théorème de Fermat

---

**Lemme 8.110**

Soient  $p \in \mathbb{P}$  et  $k \in \llbracket 1; p-1 \rrbracket$ .

Alors  $p \mid \binom{p}{k}$ .

---

Démonstration 8.111

$$\text{On a } \binom{p}{k} = \frac{p!}{k! (p-k)!}.$$

$$\text{Donc } p! = \binom{p}{k} k! (p-k)!.$$

$$\text{Donc } p \mid \binom{p}{k} k! (p-k)!.$$

$$\text{Or } p \wedge k! = 1 \text{ car } k < p \text{ et } p \wedge (p-k)! = 1 \text{ car } k > 0.$$

$$\text{Donc } p \wedge k! (p-k)! = 1.$$

$$\text{Donc } p \mid \binom{p}{k} \text{ selon le lemme de Gauss.}$$

■

---

### **Théorème 8.112 (Petit théorème de Fermat)**

Soit  $p \in \mathbb{P}$ .

On a, pour tout  $x \in \mathbb{Z}$  :

$$x^p \equiv x [p].$$

De plus, pour tout entier  $x$  qui n'est pas divisible par  $p$  :

$$x^{p-1} \equiv 1 [p].$$

---

Démonstration 8.113

Montrons que  $\forall x \in \mathbb{N}, \underbrace{x^p \equiv x [p]}_{\mathcal{P}(x)}$  par récurrence sur  $x \in \mathbb{N}$ .

On a clairement  $\mathcal{P}(0)$  et  $\mathcal{P}(1)$ .

Soit  $x \in \mathbb{N}$  tel que  $\mathcal{P}(x)$ .

Montrons  $\mathcal{P}(x+1)$ .

On a

$$\begin{aligned} (x+1)^p &\equiv \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} x^k [p] \\ &\equiv x^0 + x^p [p] \\ &\equiv 1 + x [p] \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \text{car } \binom{p}{k} \equiv 0 [p] \text{ si } 1 \leq k \leq p-1 \\ \text{selon } \mathcal{P}(x) \end{array} \right\}$$

D'où  $\mathcal{P}(x+1)$ .

Ainsi,  $\forall x \in \mathbb{N}, x^p \equiv x [p]$ .



Enfin, si  $x \in \mathbb{Z}$  alors il existe  $y \in \mathbb{N}$  tel que  $x \equiv y [p]$ .

On a alors  $x^p \equiv y^p \equiv y \equiv x [p]$ . ■

# Chapitre 9

## Fonctions dérivables

### Sommaire

---

<b>9.1</b>	<b>Étude locale . . . . .</b>	<b>257</b>
9.1.1	Définitions . . . . .	257
9.1.2	Opérations sur les dérivées . . . . .	259
9.1.3	Fonctions de classe $\mathcal{C}^k$ . . . . .	262
9.1.4	Extrema locaux . . . . .	265
<b>9.2</b>	<b>Étude globale . . . . .</b>	<b>266</b>
9.2.1	Égalité des accroissements finis . . . . .	266
9.2.2	Inégalité des accroissements finis . . . . .	267
9.2.3	Cas des fonctions à valeurs complexes . . . . .	270
9.2.4	Fonctions croissantes . . . . .	271
9.2.5	Théorème de la limite de la dérivée . . . . .	274
9.2.6	Fonctions usuelles . . . . .	276
9.2.6.1	exp . . . . .	277
9.2.6.2	ln . . . . .	277
9.2.6.3	sh & ch . . . . .	278
9.2.6.4	sin & cos . . . . .	279
9.2.6.5	tan . . . . .	279
9.2.6.6	Arctan . . . . .	279
9.2.6.7	Fonctions puissance . . . . .	279
9.2.6.8	$x \mapsto a^x$ . . . . .	279
9.2.6.9	Arcsin . . . . .	280
9.2.6.10	Arccos . . . . .	280
<b>9.3</b>	<b>Fonctions convexes . . . . .</b>	<b>280</b>
9.3.1	Preliminaires . . . . .	280
9.3.2	Définition . . . . .	281
9.3.3	Propriétés . . . . .	283
9.3.4	Fonctions convexes dérivables . . . . .	286

---

Dans tout ce chapitre, on note  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$  qui contient au moins deux points (c'est-à-dire un intervalle qui n'est ni l'ensemble vide, ni un singleton).

## 9.1 Étude locale

### 9.1.1 Définitions

---

#### Définition 9.1 (Dérivée)

Soient  $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$  et  $a \in I$ .

On dit que  $f$  est dérivable en  $a$  si la limite

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \neq a}} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

existe et est finie.

Elle est alors notée  $f'(a)$ ,  $Df(a)$ ,  $\frac{df}{dx}(a)$  ou  $\frac{df}{dt}(a)$ .

Notons  $J$  l'ensemble des points (de  $I$ ) où  $f$  est dérivable.

On appelle dérivée de  $f$  la fonction

$$\begin{array}{ccc} J & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & f'(x) \end{array}$$

On dit que  $f$  est dérivable (sur  $I$ ) si  $f$  est dérivable en tout point de  $I$  (c'est-à-dire  $J = I$ ).

---

#### Définition 9.2 (Dérivée à droite, à gauche)

Soient  $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$  et  $a \in I$ .

On dit que  $f$  est dérivable à droite en  $a$  si la limite

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

existe et est finie (il faut donc que l'intervalle  $I \cap ]a ; +\infty[$  soit non vide).

Cette limite est alors notée  $f'_d(a)$ .

On dit que  $f$  est dérivable à gauche en  $a$  si la limite

$$\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

existe et est finie (il faut donc que l'intervalle  $I \cap ]-\infty ; a[$  soit non vide).

Cette limite est alors notée  $f'_g(a)$ .

---

*Remarque 9.3*

Si  $I = [a ; b]$ , où  $a$  et  $b$  sont deux réels tels que  $a < b$ , alors :

La fonction  $f$  est dérivable en  $a$  si, et seulement si, elle est dérivable à droite en  $a$ .

La fonction  $f$  est dérivable en  $b$  si, et seulement si, elle est dérivable à gauche en  $b$ .

Soit  $c \in ]a ; b[$ . La fonction  $f$  est dérivable en  $c$  si, et seulement si, elle est dérivable à droite et à gauche en  $c$  et  $f'_d(c) = f'_g(c)$ .

---

*Exemple 9.4*

La fonction « carré »  $x \mapsto x^2$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$ .

En 0, la fonction « valeur absolue »  $x \mapsto |x|$  est dérivable à droite et à gauche, mais n'est pas dérivable.

---

**Proposition 9.5 (Dérivable  $\implies$  continue)**

Soient  $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$  et  $a \in I$ .

Si  $f$  est dérivable en  $a$ , alors  $f$  est continue en  $a$ .

Si  $f$  est dérivable, alors  $f$  est continue.

---

*Démonstration 9.6*

Supposons  $f$  dérivable en  $a$ .

Alors  $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \neq a}} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$  existe et est finie et  $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \neq a}} x - a = 0$  donc par produit,  $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \neq a}} f(x) - f(a) = 0$ .

Enfin,  $f(x) - f(a) = 0$  si  $x = a$ .

Donc  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ .

Donc  $f$  est continue. ■

---

*Remarque 9.7*

Soient  $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$  et  $a \in I$ .

Si  $f$  est dérivable à droite en  $a$ , alors  $f$  est continue à droite en  $a$ .

Si  $f$  est dérivable à gauche en  $a$ , alors  $f$  est continue à gauche en  $a$ .

## 9.1.2 Opérations sur les dérivées

---

### Proposition 9.8

Soient  $f, g \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$  et  $a \in I$ .

On suppose que  $f$  et  $g$  sont dérivables en  $a$ .

Alors :

(1)  $f + g$  est dérivable en  $a$  et on a :

$$(f + g)'(a) = f'(a) + g'(a).$$

(2) Plus généralement, si  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$  alors  $\lambda f + \mu g$  est dérivable en  $a$  et on a :

$$(\lambda f + \mu g)'(a) = \lambda f'(a) + \mu g'(a).$$

(3)  $fg$  est dérivable en  $a$  et on a :

$$(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a).$$

(4) Si  $g(a) \neq 0$  alors  $\frac{1}{g}$  est dérivable en  $a$  et on a :

$$\left(\frac{1}{g}\right)'(a) = \frac{-g'(a)}{g^2(a)}.$$

(5) Si  $g(a) \neq 0$  alors  $\frac{f}{g}$  est dérivable en  $a$  et on a :

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g^2(a)}.$$

---

Démonstration 9.9 (1 et 2)

Clair. ■

---

Démonstration 9.10 (3)

On a :

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{a\}, \quad \frac{f(x)g(x) - f(a)g(a)}{x - a} &= \frac{f(x)g(x) - f(x)g(a) + f(x)g(a) - f(a)g(a)}{x - a} \\ &= f(x) \frac{g(x) - g(a)}{x - a} + \frac{f(x) - f(a)}{x - a} g(a) \\ &\xrightarrow{x \rightarrow a} f(a)g'(a) + f'(a)g(a). \end{aligned} \quad \blacksquare$$

---

Démonstration 9.11 (4)

On a :

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{a\}, \quad \frac{\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{g(a)}}{x - a} &= \frac{1}{g(x)} \times \frac{1}{g(a)} \times \frac{g(a) - g(x)}{x - a} \\ &\xrightarrow{x \rightarrow a} \frac{-g'(a)}{g^2(a)}. \end{aligned}$$

$g$  est non-nulle au voisinage de  $a$  car  $g(a) \neq 0$  et  $g$  est continue en  $a$ . ■

---

Démonstration 9.12 (5)

$f$  et  $\frac{1}{g}$  sont dérivables en  $a$  donc leur produit aussi.

On a :

$$\begin{aligned} \left(f \times \frac{1}{g}\right)'(a) &= f'(a) \times \frac{1}{g(a)} + f(a) \times \left(\frac{1}{g}\right)'(a) \\ &= \frac{f'(a)}{g(a)} - \frac{f(a) g'(a)}{g^2(a)} \\ &= \frac{f'(a) g(a) - f(a) g'(a)}{g^2(a)}. \end{aligned}$$

■

---

### Corollaire 9.13

Soient  $f, g \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$  dérivables.

Alors les fonctions  $f + g$  et  $fg$  sont dérivables sur  $I$  et, si  $g$  ne s'annule pas, les fonctions  $\frac{1}{g}$  et  $\frac{f}{g}$  sont dérivables sur  $I$ .

---

### Proposition 9.14

Soient  $J$  un intervalle de  $\mathbb{R}$  contenant au moins deux points,  $f : I \rightarrow J$ ,  $g : J \rightarrow \mathbb{R}$  et  $a \in I$ .

On suppose  $f$  dérivable en  $a$  et  $g$  dérivable en  $f(a)$ .

Alors  $g \circ f$  est dérivable en  $a$  et on a :

$$(g \circ f)'(a) = f'(a) g'(f(a)).$$

---

Démonstration 9.15

★★ Admis provisoirement ★★ (cf. chapitre « Relations de comparaison »). ■

---

**Corollaire 9.16**

Soient  $J$  un intervalle de  $\mathbb{R}$  contenant au moins deux points,  $f : I \longrightarrow J$  et  $g : J \longrightarrow \mathbb{R}$  dérivables.

Alors  $g \circ f$  est dérivable et on a :

$$\forall x \in I, (g \circ f)'(x) = f'(x) g'(f(x)).$$

---

**Exemple 9.17**

Étudions la fonction  $f : x \longmapsto \sqrt{1 + \ln x}$ .

On a :

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R}, f(x) \text{ bien défini} &\iff 1 + \ln x \geq 0 \\ &\iff \ln x \geq -1 \\ &\iff x \geq \frac{1}{e}. \end{aligned}$$

$$\text{Donc } \forall x \in \left] \frac{1}{e} ; +\infty \right[, f'(x) = \frac{1}{x} \times \frac{1}{2\sqrt{1 + \ln x}} = \frac{1}{2x\sqrt{1 + \ln x}}.$$

---

**Théorème 9.18 (Dérivée de la bijection réciproque)**

Soit  $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$  dérivable et strictement monotone.

La fonction  $f : I \longrightarrow f(I)$  est bijective ; on note  $f^{-1} : f(I) \longrightarrow I$  sa bijection réciproque.

Soit  $y \in f(I)$ .

Si  $f'(f^{-1}(y)) \neq 0$  alors  $f^{-1}$  est dérivable en  $y$  et on a :

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}.$$

Si  $f'(f^{-1}(y)) = 0$  alors  $f^{-1}$  n'est pas dérivable en  $y$ . Son graphe admet une tangente verticale au point  $(y, f^{-1}(y))$ .

---

**Démonstration 9.19**

Cf. TD. ■

### 9.1.3 Fonctions de classe $\mathcal{C}^k$

---

**Définition 9.20 (Fonction de classe  $\mathcal{C}^k$ )**

Soient  $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$  et  $k \in \mathbb{N}$ .

On dit que  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^k$  sur  $I$  si elle est  $k$  fois dérivable sur  $I$  et si sa dérivée  $k$ -ème est continue.

On dit que  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $I$  si elle est de classe  $\mathcal{C}^n$  sur  $I$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

---

**Notation 9.21**

Soit  $n \in \mathbb{N}$ .

L'ensemble des fonctions de classe  $\mathcal{C}^n$  (respectivement  $\mathcal{C}^\infty$ ) de  $I$  dans  $\mathbb{R}$  est noté :

$$\mathcal{C}^n(I, \mathbb{R}) \text{ (respectivement } \mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{R}) \text{)}.$$

Si  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^n$  sur  $I$ , les dérivées successives de  $f$  sont notées :

$$f^{(0)} = f \quad f^{(1)} = f' \quad f^{(2)} = f'' \quad f^{(3)} \quad \dots \quad f^{(n)}.$$

Elles vérifient la relation de récurrence :

$$\forall k \in \llbracket 0 ; n-1 \rrbracket, \quad \left(f^{(k)}\right)' = (f')^{(k)} = f^{(k+1)}.$$

---

*Remarque 9.22*

La suite d'ensembles  $(\mathcal{C}^n(I, \mathbb{R}))_{n \in \mathbb{N}}$  peut être définie par récurrence par :

$$\begin{cases} \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R}) \text{ est l'ensemble des fonctions continues de } I \text{ dans } \mathbb{R} \\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad \mathcal{C}^{n+1}(I, \mathbb{R}) = \{f \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R}) \mid f \text{ est dérivable et } f' \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})\} \end{cases}$$

Enfin, on peut poser :

$$\mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{R}) = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R}).$$

On a

$$\mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{R}) \subseteq \dots \subseteq \mathcal{C}^2(I, \mathbb{R}) \subseteq \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R}) \subseteq \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R}) \subseteq \mathcal{F}(I, \mathbb{R}).$$

---

**Proposition 9.23**

Soient  $n \in \mathbb{N}$  et  $f, g \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ .

Alors leur somme  $f + g$  est de classe  $\mathcal{C}^n$  et on a :

$$(f + g)^{(n)} = f^{(n)} + g^{(n)}.$$

Plus généralement, si  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ , alors  $\lambda f + \mu g$  est de classe  $\mathcal{C}^n$  et on a :

$$(\lambda f + \mu g)^{(n)} = \lambda f^{(n)} + \mu g^{(n)}.$$



**Proposition 9.25 (Formule de Leibniz)**

Soit  $n \in \mathbb{N}$  et  $f, g \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ .

Alors leur produit  $fg$  est de classe  $\mathcal{C}^n$  et on a :

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}.$$

*Démonstration 9.26*

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on note  $\mathcal{P}(n)$  la proposition :

$$\forall f, g \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R}), \quad fg \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R}) \quad \text{et} \quad (fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}.$$

Si  $f$  et  $g$  sont continues, alors  $fg$  est continue et on a  $(fg)^{(0)} = fg = \binom{0}{0} f^{(0)} g^{(0)} = \sum_{k=0}^0 \binom{0}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$ .

D'où  $\mathcal{P}(0)$ .

Soit  $n \in \mathbb{N}$  tel que  $\mathcal{P}(n)$ . Montrons  $\mathcal{P}(n+1)$ .

Soient  $f, g \in \mathcal{C}^{n+1}(I, \mathbb{R})$ .

Alors on a  $f, g \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$  donc selon  $\mathcal{P}(n)$ , on a :  $(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$ .

Les fonctions  $f^{(k)}$  et  $g^{(n-k)}$  sont dérivables pour tout  $k \in \llbracket 0 ; n \rrbracket$ .

On a donc :

$$\begin{aligned} \left( (fg)^{(n)} \right)' &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \left( f^{(k+1)} g^{(n-k)} + f^{(k)} g^{(n-k+1)} \right) \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k+1)} g^{(n-k)} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k+1)} \\ &= \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n}{k-1} f^{(k)} g^{(n-k+1)} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k+1)} \\ &= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n}{k-1} f^{(k)} g^{(n-k+1)} + \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k+1)} \quad \leftarrow \text{car } \binom{n}{-1} = \binom{n}{n+1} = 0 \\ &= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k+1)}. \end{aligned}$$

De plus,  $f^{(k)}$  et  $g^{(n-k+1)}$  sont continues pour tout  $k \in \llbracket 0 ; n+1 \rrbracket$  donc  $(fg)^{(n+1)}$  est continue.

Donc  $fg$  est de classe  $\mathcal{C}^{n+1}$ .

D'où  $\mathcal{P}(n+1)$ .

Donc  $\forall n \in \mathbb{N}, \mathcal{P}(n)$ . ■

---

*Remarque 9.27*

Soit  $n \in \mathbb{N}$ .

Les ensembles  $\mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$  et  $\mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{R})$  sont des sous-anneaux de  $(\mathcal{F}(I, \mathbb{R}), +, \times)$ .

---

*Démonstration 9.28*

★★ Exercice ★★ ■

---

**Proposition 9.29 (Autres opérations)**

Soient  $n \in \mathbb{N}$ .

Soient  $f, g \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ . Si  $g$  ne s'annule pas, alors les fonctions  $\frac{1}{g}$  et  $\frac{f}{g}$  sont de classe  $\mathcal{C}^n$ .

Soient  $J$  un intervalle de  $\mathbb{R}$  contenant au moins deux points,  $f \in \mathcal{C}^n(I, J)$  et  $g \in \mathcal{C}^n(J, \mathbb{R})$ . Alors  $g \circ f$  est de classe  $\mathcal{C}^n$ .

Soient  $J$  un intervalle de  $\mathbb{R}$  contenant au moins deux points et  $f \in \mathcal{C}^n(I, J)$  telle que

$$\forall x \in I, f'(x) \neq 0.$$

Alors la bijection réciproque de  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^n$  sur  $J$ .

---

*Démonstration 9.30 (Composition et bijection réciproque)*

★★ Admis ★★ ■

---

*Démonstration 9.31 (Quotient, non-exigible)*

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on note  $\mathcal{P}(n)$  la proposition

$$\forall f, g \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R}), [\forall x \in I, g(x) \neq 0] \implies \frac{f}{g} \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R}).$$

Le quotient de deux fonctions continues est continu donc on a  $\mathcal{P}(0)$ .

Soit  $n \in \mathbb{N}$  tel que  $\mathcal{P}(n)$ . Montrons  $\mathcal{P}(n+1)$ .

Soient  $f, g \in \mathcal{C}^{n+1}(I, \mathbb{R})$ .

$$\text{On a } \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}.$$

Or  $f'$  et  $g'$  sont de classe  $\mathcal{C}^n$  car  $f$  et  $g$  sont de classe  $\mathcal{C}^{n+1}$  et donc de classe  $\mathcal{C}^n$ .

Donc  $f'g - fg'$  et  $g^2$  sont de classe  $\mathcal{C}^n$ .

Donc selon  $\mathcal{P}(n)$ ,  $\frac{f'g - fg'}{g^2}$  est de classe  $\mathcal{C}^n$ .

Donc  $\left(\frac{f}{g}\right)'$  est de classe  $\mathcal{C}^n$ .

Donc  $\frac{f}{g}$  est de classe  $\mathcal{C}^{n+1}$ .

D'où  $\mathcal{P}(n+1)$ .

Donc  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $\mathcal{P}(n)$ . ■

### 9.1.4 Extrema locaux

#### **Théorème 9.32**

Soient  $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$  et  $a \in I$ .

On suppose que  $f$  admet un extremum local en  $a$ , que  $f$  est dérivable en  $a$  et que  $I$  est un voisinage de  $a$  (c'est-à-dire :  $\exists \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, ]a - \varepsilon ; a + \varepsilon[ \subseteq I$ ).

Alors on a :

$$f'(a) = 0.$$

---

*Démonstration 9.33*

Soit  $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$  tel que  $]a - \varepsilon ; a + \varepsilon[ \subseteq I$ .

Quitte à remplacer  $f$  par  $-f$ , on suppose que  $f$  admet un minimum local en  $a$ .

Soit  $\delta \in ]0 ; \varepsilon[$  tel que  $\forall x \in ]a - \delta ; a + \delta[$ ,  $f(a) \leq f(x)$ .

$$\text{On a donc } \begin{cases} \forall x \in ]a ; a + \delta[, \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \geq 0 \\ \forall x \in ]a - \delta ; a[, \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq 0 \end{cases}$$

$$\text{D'où, par passage à la limite quand } x \longrightarrow a : \begin{cases} f'(a) \geq 0 \\ f'(a) \leq 0 \end{cases}$$

Donc  $f'(a) = 0$ . ■

---

*Remarque 9.34*

Ainsi, si  $I$  est un intervalle ouvert et si la fonction  $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$  est dérivable, on a, pour tout  $a \in I$  :

$$f \text{ admet un extremum local en } a \implies f'(a) = 0.$$

L'implication réciproque est généralement fausse, comme le montre l'exemple de la fonction « cube »  $f : x \longmapsto x^3$ . En effet, on a  $f'(0) = 0$  mais  $f$  n'admet ni minimum local, ni maximum local en 0 (car  $\forall x \in \mathbb{R}_-^*, f(x) < f(0)$  et  $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, f(x) > f(0)$ ).

## 9.2 Étude globale

### 9.2.1 Égalité des accroissements finis

---

**Théorème 9.35 (Théorème de Rolle)**

Soient  $a, b \in \mathbb{R}$  tels que  $a < b$  et  $f : [a ; b] \longrightarrow \mathbb{R}$ .

$$\text{On suppose que } \begin{cases} f \text{ est continue sur } [a ; b] \\ f \text{ est dérivable sur } ]a ; b[ \\ f(a) = f(b) \end{cases}$$

Alors on a

$$\exists c \in ]a ; b[, \quad f'(c) = 0.$$

---

*Démonstration 9.36*

Comme  $f$  est continue sur un segment, elle admet un minimum  $m \in \mathbb{R}$  et un maximum  $M \in \mathbb{R}$ .

Si  $M = m$  alors  $f$  est constante donc  $f' = 0$  sur  $]a ; b[$  donc  $c = \frac{a+b}{2}$  convient.

Supposons  $M \neq m$ .

Si  $f(a) = m$  alors  $f(a) \neq M$ .

Soit  $c \in [a ; b]$  tel que  $f(c) = M$ .

On a  $c \neq a$  et  $c \neq b$ .

$$\text{Donc } \begin{cases} f \text{ est dérivable en } c \\ f \text{ admet un extremum (local) en } c \\ ]a ; b[ \text{ est un voisinage de } c \end{cases}$$

Donc  $f'(c) = 0$ , donc  $c$  convient.

Si  $f(a) \neq m$  : idem en considérant  $c \in [a ; b]$  tel que  $f(c) = m$ . ■

---

**Corollaire 9.37 (Égalité des accroissements finis)**

Soient  $a, b \in \mathbb{R}$  tels que  $a < b$  et  $f : [a ; b] \longrightarrow \mathbb{R}$ .

On suppose que  $\begin{cases} f \text{ est continue sur } [a ; b] \\ f \text{ est dérivable sur } ]a ; b[ \end{cases}$

Alors on a

$$\exists c \in ]a ; b[, \quad f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

---

*Démonstration 9.38*

Posons  $g : [a ; b] \longrightarrow \mathbb{R}$   
$$x \longmapsto f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}x$$

On remarque que  $\begin{cases} g \text{ est continue sur } [a ; b] \\ g \text{ est dérivable sur } ]a ; b[ \\ g(b) = g(a) \end{cases}$

Donc selon le théorème de Rolle, il existe  $c \in ]a ; b[$  tel que  $g'(c) = 0$ .

$$\text{Donc } f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0.$$

$$\text{D'où } f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

■

### 9.2.2 Inégalité des accroissements finis

---

**Théorème 9.39 (Inégalité des accroissements finis)**

Soient  $a, b \in \mathbb{R}$  tels que  $a < b$ ,  $f : [a ; b] \longrightarrow \mathbb{R}$  et  $m, M \in \mathbb{R}$ .

On suppose que  $\begin{cases} f \text{ est continue sur } [a ; b] \\ f \text{ est dérivable sur } ]a ; b[ \\ \forall x \in ]a ; b[, \quad m \leq f'(x) \leq M \end{cases}$

Alors on a

$$m(b - a) \leq f(b) - f(a) \leq M(b - a).$$

---

*Démonstration 9.40*

Selon l'égalité des accroissements finis, il existe  $c \in ]a ; b[$  tel que  $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ .

Or  $m \leq f'(c) \leq M$  donc  $m \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq M$ .

D'où  $m(b - a) \leq f(b) - f(a) \leq M(b - a)$ . ■

---

*Remarque 9.41*

En supposant seulement  $\forall x \in ]a ; b[ , f'(x) \leq M$ , on obtient seulement

$$f(b) - f(a) \leq M(b - a)$$

.

De même, en supposant seulement  $\forall x \in ]a ; b[ , m \leq f'(x)$ , on obtient seulement

$$m(b - a) \leq f(b) - f(a)$$

.

---

### Corollaire 9.42

Soient  $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$  dérivable et  $k \in \mathbb{R}_+$ .

On a

$$f \text{ } k\text{-lipschitzienne} \iff \forall x \in I, |f'(x)| \leq k.$$

---

*Démonstration 9.43*

$\Rightarrow$

Supposons  $f$   $k$ -lipschitzienne.

Montrons que  $\forall x \in I, |f'(x)| \leq k$ .

Soit  $x \in I$ .

On a  $\forall y \in I, |f(y) - f(x)| \leq k|y - x|$ .

Donc  $\forall y \in I \setminus \{x\}, \left| \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \right| \leq k$ .

D'où, par passage à la limite quand  $y \longrightarrow x : |f'(x)| \leq k$ .

$\Leftarrow$

Supposons  $\forall x \in I, |f'(x)| \leq k$ .

Montrons que  $\forall a, b \in I, |f(b) - f(a)| \leq k|b - a|$ .

Soient  $a, b \in I$ .

Si  $a = b$ , on a le résultat.

$$\text{Si } a < b, \text{ on a } \begin{cases} f \text{ continue sur } [a ; b] \\ f \text{ dérivable sur } ]a ; b[ \\ \forall x \in ]a ; b[, -k \leq f'(x) \leq k \end{cases}$$

Donc selon l'inégalité des accroissements finis, on a

$$-k(b-a) \leq f(b) - f(a) \leq k(b-a).$$

Donc  $|f(b) - f(a)| \leq k|b - a|$ .

Si  $a > b$  : idem en échangeant  $a$  et  $b$ . ■

### Corollaire 9.44

Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  dérivable.

Alors

$$f \text{ lipschitzienne} \iff f' \text{ bornée.}$$

### Exemple 9.45

La fonction  $\sin : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  est 1-lipschitzienne.

$$\text{En effet, on a } \begin{cases} \mathbb{R} \text{ est un intervalle} \\ \sin \text{ est dérivable sur } \mathbb{R} \\ \forall x \in \mathbb{R}, |\sin' x| = |\cos x| \leq 1 \end{cases}$$

Donc  $\sin$  est 1-lipschitzienne.

### Exemple 9.46

Les fonctions  $\exp, \ln$  et  $\begin{matrix} \mathbb{R}_+^* & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \sqrt{x} \end{matrix}$  en sont pas lipschitziennes car leurs dérivées ne sont pas bornées.

### Exemple 9.47

On retrouve  $\forall x \in \mathbb{R}, |\sin x| \leq |x|$ .

### Exemple 9.48

La fonction  $\begin{matrix} f : \mathbb{R}_- & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & e^x \end{matrix}$  est 1-lipschitzienne car  $\mathbb{R}$  est un intervalle et

$$\forall x \in \mathbb{R}_-, |f'(x)| = |e^x| \leq 1.$$

---

*Exemple 9.49*

La fonction  $f = \text{sg}|_{\mathbb{R}^*}$ , c'est-à-dire  $f : \mathbb{R}^* \longrightarrow \mathbb{R}$  est dérivable, de dérivée nulle.

$$x \longmapsto \begin{cases} -1 & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Cependant, on ne peut pas en déduire qu'elle est lipschitzienne car  $\mathbb{R}^*$  n'est pas un intervalle.

Montrons que  $f$  n'est pas lipschitzienne.

Par l'absurde, supposons que  $f$  est lipschitzienne.

Soit  $k \in \mathbb{R}_+$  tel que  $\forall x, y \in \mathbb{R}^*, |\text{sg } x - \text{sg } y| \leq k |x - y|$ .

On a  $\forall n \in \mathbb{N}^*, \left| \text{sg } \frac{1}{n} - \text{sg } \frac{-1}{n} \right| \leq k \left| \frac{1}{n} - \frac{-1}{n} \right|$ .

Donc  $\forall n \in \mathbb{N}^*, 2 \leq \frac{2k}{n}$ .

D'où  $\forall n \in \mathbb{N}^*, n \leq k$ .

Donc  $k$  majore  $\mathbb{N}^*$  : contradiction.

Donc  $f$  n'est pas lipschitzienne.

### 9.2.3 Cas des fonctions à valeurs complexes

Soient  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$  tel que  $\text{Card } I \geq 2$  et  $f : I \longrightarrow \mathbb{C}$  où  $f_1, f_2 \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ .

$$x \longmapsto f_1(x) + i f_2(x)$$

---

**Définition 9.50**

On dit que  $f$  est continue si, et seulement si,  $f_1$  et  $f_2$  sont continues.

On dit que  $f$  est dérivable si, et seulement si,  $f_1$  et  $f_2$  sont dérivables.

---

*Remarque 9.51*

Le théorème de Rolle et l'égalité des accroissements finis sont faux pour les fonctions à valeurs complexes. En revanche l'inégalité des accroissements finis reste vraie.

---

*Exemple 9.52*

On pose  $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{C}$

$$x \longmapsto e^{ix}$$

On a  $f(0) = f(2\pi)$  mais  $f'$  ne s'annule jamais sur  $[0 ; 2\pi]$ .



---

**Théorème 9.53 (Inégalité des accroissements finis)**

Soient  $a, b \in \mathbb{R}$  tels que  $a < b$ ,  $f : [a ; b] \longrightarrow \mathbb{C}$  une fonction continue sur  $[a ; b]$  et dérivable sur  $]a ; b[$  et  $M \in \mathbb{R}_+$  tel que

$$\forall t \in [a ; b], \quad |f'(t)| \leq M.$$

On a :

$$|f(b) - f(a)| \leq M(b - a).$$

---

*Démonstration 9.54*

Si  $f(a) = f(b)$  : on a l'inégalité.

Supposons  $f(a) \neq f(b)$ .

Posons  $g = f \times e^{-i \arg(f(b)-f(a))}$  de sorte que :

$$g(b) - g(a) = (f(b) - f(a)) e^{-i \arg(f(b)-f(a))} \in \mathbb{R}_+.$$

On a  $|f(b) - f(a)| = g(b) - g(a)$ .

Posons  $g = g_1 + i g_2$  où  $g_1, g_2 \in \mathcal{F}([a ; b], \mathbb{R})$ .

En appliquant l'inégalité des accroissements finis à  $g_1$ , on a :

$$\begin{aligned} g(b) - g(a) = g_1(b) - g_1(a) \\ \leq M(b - a) \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \forall t \in ]a ; b[, \quad |g'_1(t)| = \\ |\operatorname{Re} g'(t)| \leq |g'(t)| = |f'(t)| \leq M \end{array} \right\} \quad \blacksquare$$

## 9.2.4 Fonctions croissantes

---

**Théorème 9.55**

Soit  $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$  dérivable.

On a :

$$(1) \quad f \text{ constante} \iff \forall x \in I, \quad f'(x) = 0$$

$$(2) \quad f \text{ croissante} \iff \forall x \in I, \quad f'(x) \geq 0$$

$$(3) \quad f \text{ décroissante} \iff \forall x \in I, \quad f'(x) \leq 0$$

$$(4) \quad f \text{ strictement croissante} \iff \begin{cases} \forall x \in I, \quad f'(x) \geq 0 \\ \forall a, b \in I, \quad a < b \implies [\exists x \in ]a ; b[, \quad f'(x) > 0] \end{cases}$$

$$(5) \quad f \text{ strictement croissante} \iff \begin{cases} \forall x \in I, \quad f'(x) \geq 0 \\ f' \text{ ne s'annule qu'en un nombre fini de points} \end{cases}$$

$$(6) \ f \text{ strictement décroissante} \iff \begin{cases} \forall x \in I, \ f'(x) \leq 0 \\ \forall a, b \in I, \ a < b \implies [\exists x \in ]a; b[, \ f'(x) < 0] \end{cases}$$

$$(7) \ f \text{ strictement décroissante} \iff \begin{cases} \forall x \in I, \ f'(x) \leq 0 \\ f' \text{ ne s'annule qu'en un nombre fini de points} \end{cases}$$

*Démonstration 9.56 (2)*

$\implies$

Supposons  $f$  croissante.

Soit  $x \in I$ .

Montrons que  $f'(x) \geq 0$ .

On remarque  $\forall y \in I \setminus \{x\}, \ \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \geq 0$ .

D'où, par passage à la limite quand  $y \longrightarrow x : f'(x) \geq 0$ .

$\impliedby$

Supposons  $\forall x \in I, \ f'(x) \geq 0$ .

Montrons que  $f$  est croissante, c'est-à-dire  $\forall a, b \in I, \ a \leq b \implies f(a) \leq f(b)$ .

Soient  $a, b \in I$  tels que  $a \leq b$ .

Si  $a = b$  : on a le résultat.

Si  $a < b$  :

$$\text{On a } \begin{cases} f \text{ continue sur } [a; b] \\ f \text{ dérivable sur } ]a; b[ \\ \forall x \in ]a; b[, \ 0 \leq f'(x) \end{cases}$$

D'où, selon l'inégalité des accroissements finis :  $0(b - a) \leq f(b) - f(a)$ .

Donc  $f(a) \leq f(b)$ . ■

*Démonstration 9.57 (3)*

Idem. ■

*Démonstration 9.58 (1)*

Découle de (2) et (3). ■

---

Démonstration 9.59 (4)

$\Rightarrow$

Supposons  $f$  strictement croissante.

On a  $f$  croissante donc  $f' \geq 0$  selon (2).

Montrons que  $\forall a, b \in I, a < b \implies [\exists c \in ]a ; b[, f'(c) > 0]$ .

Par l'absurde, soient  $a, b \in I$  tels que  $\begin{cases} a < b \\ \forall c \in ]a ; b[, f'(c) \leq 0 \end{cases}$

On a  $\begin{cases} a < b \\ f \text{ continue sur } [a ; b] \\ f \text{ dérivable sur } ]a ; b[ \\ f' = 0 \end{cases}$

Donc  $f(a) = f(b)$  : contradiction.

$\Leftarrow$

Supposons  $\begin{cases} f' \geq 0 \\ \forall a, b \in I, a < b \implies [\exists c \in ]a ; b[, f'(c) > 0] \end{cases}$

Montrons que  $f$  est strictement croissante.

On a  $f$  croissante car  $f' \geq 0$  selon (2).

Soient  $a, b \in I$  tels que  $a < b$ .

Montrons que  $f(a) < f(b)$ .

Si  $f(a) > f(b)$  : impossible car  $f$  est croissante.

Si  $f(a) = f(b)$  alors on a  $\forall c \in [a ; b], f(a) \leq f(c) \leq f(b) = f(a)$ .

Donc  $f$  est constante sur  $[a ; b]$ .

Donc  $\forall c \in [a ; b], f'(c) = 0$  : impossible.

Donc  $f(a) < f(b)$ .

Donc  $f$  est strictement croissante. ■

---

Démonstration 9.60 (5)

Découle de (4). ■

---

Démonstration 9.61 (6 et 7)

Idem que (4) et (5). ■

## 9.2.5 Théorème de la limite de la dérivée

### Théorème 9.62 (Théorème de la limite de la dérivée)

Soient  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  et  $a \in I$ .

$$\text{On suppose } \begin{cases} f \text{ continue sur } I \\ f \text{ dérivable sur } I \setminus \{a\} \\ \ell = \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \neq a}} f'(x) \text{ existe} \end{cases}$$

Si  $\ell$  est finie alors  $f$  est dérivable en  $a$ , de dérivée  $f'(a) = \ell$ .

Si  $\ell$  est infinie alors  $f$  n'est pas dérivable en  $a$ . Son graphe admet une tangente verticale.

#### Remarque 9.63

On a

$$f \text{ dérivable en } a \iff \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \neq a}} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \text{ existe et est finie.}$$

#### Démonstration 9.64

Supposons  $\ell$  finie.

Montrons que  $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \neq a}} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \ell$ , c'est-à-dire

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists \delta \in \mathbb{R}_+^*, \forall x \in I \setminus \{a\}, |x - a| \leq \delta \implies \left| \frac{f(x) - f(a)}{x - a} - \ell \right| \leq \varepsilon.$$

Soit  $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$ .

Soit  $\delta \in \mathbb{R}_+^*$  tel que  $\forall c \in I \setminus \{a\}, |c - a| \leq \delta \implies |f'(c) - \ell| \leq \varepsilon$ .

Un tel  $\delta$  existe car on a  $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \neq a}} f'(x) = \ell$ .

Montrons que  $\delta$  convient, c'est-à-dire

$$\forall x \in I \setminus \{a\}, |x - a| \leq \delta \implies \left| \frac{f(x) - f(a)}{x - a} - \ell \right| \leq \varepsilon.$$

Soit  $x \in I \setminus \{a\}$  tel que  $|x - a| \leq \delta$ .

Si  $a < x$  :

$$\text{On a } \begin{cases} f \text{ continue sur } [a; x] \text{ (car } I \text{ est un intervalle)} \\ f \text{ dérivable sur } ]a; x[ \end{cases}$$

Donc selon l'égalité des accroissements finis, il existe  $c_x \in ]a ; x[$  tel que  $\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(c_x)$ .

On a  $|c_x - a| \leq \delta$  car  $a < c_x < x < a + \delta$ .

Donc  $|f'(c_x) - \ell| \leq \varepsilon$  (par définition de  $\delta$ ).

Donc  $\left| \frac{f(x) - f(a)}{x - a} - \ell \right| \leq \varepsilon$ .

Si  $x < a$  : idem en appliquant l'égalité des accroissements finis sur  $[x ; a]$ .

Donc  $\delta$  convient.

Donc  $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \neq a}} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \ell = \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \neq a}} f'(x)$ .

Si  $\ell = \pm\infty$ , on montre de la même façon que  $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \neq a}} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \ell$ . ■

### Exercice 9.65

Soit  $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$ .

On pose

$$f : \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto x^\alpha = \begin{cases} e^{\alpha \ln x} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

- (1) Montrer que  $f$  est continue en 0.
- (2) Donner une CNS sur  $\alpha$  pour que  $f$  soit dérivable en 0.

#### Correction 9.66 (1)

On a  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\alpha \ln x} = 0$ .

Donc  $f$  est continue en 0.

#### Correction 9.67 (2)

On a  $f$  continue sur  $\mathbb{R}_+$  et  $f$  dérivable sur  $\mathbb{R}_+^*$ .

On a  $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, f'(x) = \frac{\alpha}{x} e^{\alpha \ln x} = \frac{\alpha}{x} x^\alpha = \alpha x^{\alpha-1}$ .

Donc  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } \alpha - 1 > 0 \\ +\infty & \text{si } \alpha - 1 < 0 \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$

Donc d'après le théorème de la limite de la dérivée :

$$\begin{aligned}
 f \text{ dérivable en } 0 &\iff \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) \text{ finie} \\
 &\iff \alpha - 1 \geq 0 \\
 &\iff \alpha \geq 1.
 \end{aligned}$$

## 9.2.6 Fonctions usuelles

Les fonctions suivantes sont dérivables sur leur ensemble de définition :

La fonction :	définie sur :	est dérivable, de dérivée :
exp	$\mathbb{R}$	exp
ln	$\mathbb{R}_+^*$	$x \mapsto \frac{1}{x}$
sh	$\mathbb{R}$	ch
ch	$\mathbb{R}$	sh
sin	$\mathbb{R}$	cos
cos	$\mathbb{R}$	$-\sin$
tan	$\mathbb{R} \setminus \left(\frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}\right)$	$1 + \tan^2 = \frac{1}{\cos^2}$
Arctan	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$
$x \mapsto x^n$ avec $n \in \mathbb{N}^*$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto nx^{n-1}$
$x \mapsto x^n$ avec $n \in -\mathbb{N}^*$	$\mathbb{R}^*$	$x \mapsto nx^{n-1}$
$x \mapsto x^\alpha$ avec $\alpha \in ]1 ; +\infty[ \setminus \mathbb{Z}$	$\mathbb{R}_+$	$x \mapsto \alpha x^{\alpha-1}$
$x \mapsto x^\alpha$ avec $\alpha \in ]-\infty ; 0[ \setminus \mathbb{Z}$	$\mathbb{R}_+^*$	$x \mapsto \alpha x^{\alpha-1}$
$x \mapsto a^x$ avec $a \in \mathbb{R}_+^*$	$\mathbb{R}_+^*$	$x \mapsto (\ln a) a^x$

Les fonctions suivantes sont continues sur leur ensemble de définition, mais ne sont pas dérivables en tout point :

La fonction :	est dérivable sur :	de dérivée :
$\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ $x \longmapsto  x $	$\mathbb{R}^*$	$x \longmapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x > 0 \\ -1 & \text{si } x < 0 \end{cases}$
Arcsin (définie sur $[-1 ; 1]$ )	$] -1 ; 1[$	$x \longmapsto \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
Arccos (définie sur $[-1 ; 1]$ )	$] -1 ; 1[$	$x \longmapsto \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}$ avec $\alpha \in ]0 ; 1[$ $x \longmapsto x^\alpha$	$\mathbb{R}_+^*$	$x \longmapsto \alpha x^{\alpha-1}$

### 9.2.6.1 exp


La fonction exp est dérivable, de dérivée exp (admis) et de classe  $\mathcal{C}^\infty$ .

### 9.2.6.2 ln

La fonction exp est continue et strictement croissante sur l'intervalle  $\mathbb{R}$ .

Elle est donc bijective de  $\mathbb{R}$  vers  $\left] \lim_{-\infty} \exp ; \lim_{+\infty} \exp \right[ = ]0 ; +\infty[ = \mathbb{R}_+^*$ .

On appelle  $\ln : \mathbb{R}_+^* \longrightarrow \mathbb{R}$  sa bijection réciproque :



La bijection exp est de classe  $\mathcal{C}^\infty$  et sa dérivée ne s'annule jamais.

Donc  $\ln$  est de classe  $\mathcal{C}^\infty$  et, selon le théorème de dérivation de la bijection réciproque, on a :

$$\begin{aligned}\forall y \in \mathbb{R}_+^*, \quad \ln' y &= \frac{1}{\exp'(\ln y)} \\ &= \frac{1}{\exp(\ln y)} \\ &= \frac{1}{y}.\end{aligned}$$


### 9.2.6.3 sh & ch

On pose :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \begin{cases} \operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} & (\text{sinus hyperbolique}) \\ \operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} & (\text{cosinus hyperbolique}) \end{cases}$$

On a  $\forall x \in \mathbb{R}, \quad \operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = 1$ .

Graphes :





La fonction  $\text{ch}$  est paire et on a  $\text{ch}' = \text{sh}$ .

La fonction  $\text{sh}$  est impaire et on a  $\text{sh}' = \text{ch}$ .

#### 9.2.6.4 $\sin$ & $\cos$

Les fonctions  $\sin$  et  $\cos$  sont de classe  $\mathcal{C}^\infty$  et on a  $\sin' = \cos$  et  $\cos' = -\sin$  (admis).

#### 9.2.6.5 $\tan$

La fonction  $\tan$  est de classe  $\mathcal{C}^\infty$  et on a  $\tan' = 1 + \tan^2 = \frac{1}{\cos^2}$  (admis).

#### 9.2.6.6 $\text{Arctan}$

On sait que la fonction  $\text{Arctan} : \mathbb{R} \longrightarrow \left] -\frac{\pi}{2} ; \frac{\pi}{2} \right[$  est la bijection réciproque de  $f = \tan \big|_{\left] -\pi/2 ; \pi/2 \right[}$ .

Comme  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^\infty$  et sa dérivée ne s'annule pas, on sait que  $f^{-1} = \text{Arctan}$  est de classe  $\mathcal{C}^\infty$  et qu'on a :

$$\begin{aligned} \forall y \in \mathbb{R}, \quad \text{Arctan}' y &= \frac{1}{f'(\text{Arctan } y)} \\ &= \frac{1}{\tan'(\text{Arctan } y)} \\ &= \frac{1}{1 + \tan^2(\text{Arctan } y)} \\ &= \frac{1}{1 + y^2}. \end{aligned}$$

#### 9.2.6.7 Fonctions puissance

La fonction  $x \mapsto x^\alpha$ , où  $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ , est définie sur  $\begin{cases} \mathbb{R}_+^* & \text{si } \alpha < 0 \\ \mathbb{R}_+ & \text{si } \alpha \geq 0 \end{cases}$

La fonction  $x \mapsto x^n$ , où  $n \in \mathbb{Z}$ , est définie sur  $\begin{cases} \mathbb{R}^* & \text{si } n < 0 \\ \mathbb{R} & \text{si } n \geq 0 \end{cases}$

Les fonctions sont de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $\mathbb{R}_+^*$ .

#### 9.2.6.8 $x \mapsto a^x$

Soit  $a \in \mathbb{R}_+^*$ .

On remarque que  $a^x = e^{x \ln a}$  donc sa dérivée est  $x \mapsto (\ln a) e^{x \ln a} = (\ln a) a^x$ .

### 9.2.6.9 Arcsin

La fonction

$$\begin{array}{ccc} f : \left[ \frac{-\pi}{2} ; \frac{\pi}{2} \right] & \longrightarrow & [-1 ; 1] \\ \theta & \longmapsto & \sin \theta \end{array}$$

est dérivable et bijective.

Sa bijection réciproque est Arcsin.

On a

$$\begin{aligned} \forall t \in [-1 ; 1], \text{ Arcsin est dérivable en } t &\iff f'(\text{Arcsin } t) \neq 0 \\ &\iff \cos(\text{Arcsin } t) \neq 0 \\ &\iff \sqrt{1-t^2} \neq 0 \\ &\iff t \neq \pm 1. \end{aligned}$$

On en déduit :

$$\begin{aligned} \forall t \in ]-1 ; 1[, \text{ Arcsin}' t &= \frac{1}{f'(\text{Arcsin } t)} \\ &= \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} \end{aligned}$$

En  $t = \pm 1$ , la fonction Arcsin n'est pas dérivable et son graphe admet une tangente verticale.

### 9.2.6.10 Arccos

On sait qu'on a  $\forall t \in [-1 ; 1], \text{ Arccos } t = \frac{\pi}{2} - \text{Arcsin } t$ .

Donc Arccos est dérivable sur  $] -1 ; 1[$ , de dérivée  $t \mapsto \frac{-1}{\sqrt{1-t^2}}$  et son graphe admet une tangente verticale en  $t = \pm 1$ .

## 9.3 Fonctions convexes

### 9.3.1 Préliminaires

---

*Remarque 9.68 (Paramétrage d'un segment de  $\mathbb{R}$ )*

Soient  $a, b \in \mathbb{R}$ .

L'ensemble image de la fonction

$$\begin{array}{ccc} f : [0 ; 1] & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ t & \longmapsto & (1-t)a + tb \end{array}$$

est le segment de  $\mathbb{R}$  d'extrémités  $a$  et  $b$ , c'est-à-dire  $\begin{cases} [a ; b] & \text{si } a \leq b \\ [b ; a] & \text{sinon} \end{cases}$

---

*Remarque 9.69 (Paramétrage d'un segment de droite dans  $\mathbb{R}^2$ )*

Soient  $A = (x_A, y_A)$ ,  $B = (x_B, y_B) \in \mathbb{R}^2$ .

L'ensemble image de la fonction

$$\begin{aligned} F : [0 ; 1] &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ t &\longmapsto (1-t)A + tB = ((1-t)x_A + tx_B, (1-t)y_A + ty_B) \end{aligned}$$

est le segment de droite  $[A ; B]$ .

---

**Définition 9.70 (Vocabulaire : graphe, corde, sécante)**

Soit  $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ .

On rappelle que le graphe de  $f$  est l'ensemble :

$$\Gamma_f = \{(x, y) \in I \times \mathbb{R} \mid f(x) = y\} \subseteq \mathbb{R}^2.$$

Soient  $x_1, x_2 \in I$  tels que  $x_1 \neq x_2$ .

Notons  $M_1$  et  $M_2$  les points du graphe de  $f$  d'abscisses respectives  $x_1$  et  $x_2$  :

$$M_1 = (x_1, f(x_1)) \quad \text{et} \quad M_2 = (x_2, f(x_2)).$$

Le segment de droite  $[M_1 ; M_2]$  est appelé la corde de  $\Gamma_f$  en  $x_1$  et  $x_2$ .

La droite  $(M_1 M_2)$  est appelée la sécante à  $\Gamma_f$  en  $x_1$  et  $x_2$ .

### 9.3.2 Définition

---

**Définition 9.71 (Fonction convexe, fonction concave)**

Soit  $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ .

On dit que  $f$  est une fonction convexe si elle vérifie :

$$\forall x, y \in I, \quad \forall t \in [0 ; 1], \quad f((1-t)x + ty) \leqslant (1-t)f(x) + tf(y).$$

On dit que  $f$  est une fonction concave si elle vérifie :

$$\forall x, y \in I, \quad \forall t \in [0 ; 1], \quad f((1-t)x + ty) \geqslant (1-t)f(x) + tf(y).$$

---

*Remarque 9.72*

Pour qu'une fonction soit convexe ou concave, il faut que son ensemble de définition soit un intervalle.

---

*Exemple 9.73*

Les fonctions  $\exp$  et  $x \mapsto x^2$  sont convexes.

La fonction  $\ln$  est concave.

La fonction  $\sin$  n'est ni convexe ni concave.

---

*Remarque 9.74*

Soit  $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ .

On a :

$$f \text{ concave} \iff -f \text{ convexe.}$$

Dans la suite de ce cours, on se concentrera sur les fonctions convexes.

---

**Proposition 9.75 (Inégalité de Jensen)**

Soient  $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}_+$  et  $x_1, \dots, x_n \in I$ .

On suppose que  $f$  est convexe et qu'on a  $\lambda_1 + \dots + \lambda_n = 1$ .

Alors :

$$f(\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n) \leq \lambda_1 f(x_1) + \dots + \lambda_n f(x_n).$$

---

*Démonstration 9.76*

Pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , on note  $\mathcal{P}(n)$  la proposition :

$$\forall \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}_+, \forall x_1, \dots, x_n \in I, \lambda_1 + \dots + \lambda_n = 1 \implies f(\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n) \leq \lambda_1 f(x_1) + \dots + \lambda_n f(x_n).$$

On a  $\mathcal{P}(1)$ .

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$  tel que  $\mathcal{P}(n)$ . Montrons  $\mathcal{P}(n+1)$ .

Soient  $\lambda_1, \dots, \lambda_{n+1} \in \mathbb{R}_+$  et  $x_1, \dots, x_{n+1} \in I$  tels que  $\lambda_1 + \dots + \lambda_{n+1} = 1$ .

Si  $\lambda_1 + \dots + \lambda_n = 0$  et  $\lambda_{n+1} = 1$  alors on a  $f\left(\sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i f(x_i)$ . Donc on a  $\mathcal{P}(n+1)$ .

Supposons  $\lambda_1 + \dots + \lambda_n \neq 0$ .

On a :

$$\begin{aligned} f\left(\sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i x_i\right) &= f\left((\lambda_1 + \dots + \lambda_n) \sum_{i=1}^n \frac{\lambda_i}{\lambda_1 + \dots + \lambda_n} x_i + \lambda_{n+1} x_{n+1}\right) \\ &\leq (\lambda_1 + \dots + \lambda_n) f\left(\sum_{i=1}^n \frac{\lambda_i}{\lambda_1 + \dots + \lambda_n} x_i\right) + \lambda_{n+1} f(x_{n+1}) \\ &\leq (\lambda_1 + \dots + \lambda_n) \sum_{i=1}^n \frac{\lambda_i}{\lambda_1 + \dots + \lambda_n} f(x_i) + \lambda_{n+1} f(x_{n+1}) \\ &= \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i f(x_i). \end{aligned} \quad \begin{array}{l} \text{car } f \text{ est convexe} \\ \text{selon } \mathcal{P}(n) \end{array}$$

D'où  $\mathcal{P}(n+1)$ .

Donc par récurrence sur  $n \in \mathbb{N}^*$ , on a  $\forall n \in \mathbb{N}^*, \mathcal{P}(n)$ . ■

### 9.3.3 Propriétés

Par définition, une fonction convexe est une fonction qui est définie sur un intervalle et dont le graphe est situé en dessous de ses cordes. La proposition suivante précise la position du graphe par rapport à ses sécantes.

---

**Proposition 9.77 (Position du graphe par rapport à ses sécantes)**

Soient  $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$  et  $a, b \in I$  tels que  $a < b$ .

On considère la sécante  $\Delta$  au graphe  $\Gamma_f$  en  $a$  et  $b$ .

Le graphe de  $f$  est situé :

- en dessous de sa sécante  $\Delta$  sur  $[a ; b]$  ;
- au dessus de sa sécante  $\Delta$  sur  $I \cap (]-\infty ; a] \cup [b ; +\infty[)$ .

---

*Démonstration 9.78*

Soit  $s \in ]-\infty ; 0[ \cup ]1 ; +\infty[$ .

Supposons  $(1-s)a + sb \in I$ .

Il s'agit de montrer  $(1-s)f(a) + sf(b) \leq f((1-s)a + sb)$ .

Posons  $c = (1-s)a + sb = a + s(b-a)$ .

Supposons  $s > 1$  (c'est-à-dire  $a < b < c$ ).

On a  $\left(1 - \frac{1}{s}\right)a + \frac{1}{s}c = b$  avec  $\frac{1}{s} \in [0 ; 1]$ .

D'où, comme  $f$  est convexe :  $f(b) \leq \left(1 - \frac{1}{s}\right)f(a) + \frac{1}{s}f(c)$ .

D'où, en multipliant par  $s$  :  $(1-s)f(a) + sf(b) \leq f(c)$ .

Supposons  $s < 0$  (c'est-à-dire  $c < a < b$ ).

On a  $\frac{1}{1-s}c - \frac{s}{1-s}b = a$ , c'est-à-dire  $\left(1 - \frac{1}{1-s}\right)b + \frac{1}{1-s}c = a$ .

D'où, comme  $f$  est convexe :  $f(a) \leq \left(1 - \frac{1}{1-s}\right)f(b) + \frac{1}{1-s}f(c)$ .

D'où, en multipliant par  $s$  :  $f(c) \geq (1-s)f(a) + sf(b)$ . ■

---

**Proposition 9.79 (Inégalité des pentes)**

Soit  $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ .

Pour tous  $a, b \in I$  tels que  $a \neq b$ , on note  $\tau(a, b)$  le taux d'accroissement de  $f$  entre  $a$  et  $b$  :

$$\tau(a, b) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

NB : cette notation n'est pas officielle.

Les propositions suivantes sont équivalentes :

(1) La fonction  $f$  est convexe

(2)  $\forall a, b, c \in I, a < b < c \implies \tau(a, b) \leq \tau(a, c) \leq \tau(b, c)$

(3)  $\forall a, b, c \in I, a < b < c \implies \tau(a, b) \leq \tau(b, c)$

---

Démonstration 9.80 ((1)  $\implies$  (2))

Soient  $a, b, c \in I$  tels que  $a < b < c$ .

On suppose  $f$  convexe.

Posons  $t = \frac{b - a}{c - a}$ .

On a  $0 \leq t \leq 1$  et  $t(c - a) = b - a$  donc  $(1 - t)a + tc = b$ .

Donc, comme  $f$  est convexe, on a  $f(b) \leq (1 - t)f(a) + tf(c)$ .

Donc  $f(b) - f(a) \leq t(f(c) - f(a))$ .

Donc  $\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq \frac{t(f(c) - f(a))}{b - a}$ .

Donc  $\tau(a, b) \leq \tau(a, c)$ .

De même, comme  $t(c - a) = b - a$ , on a  $(1 - t)(c - a) = (c - a) - (b - a) = c - b$ .

Et comme  $t(f(c) - f(a)) \geq f(b) - f(a)$ , on a :

$$(1 - t)(f(c) - f(a)) \leq f(a) - f(b) + f(c) - f(a) = f(c) - f(b).$$

D'où  $\frac{(1 - t)(f(c) - f(a))}{c - b} \leq \frac{f(c) - f(b)}{c - b}$ .

Donc  $\tau(a, c) \leq \tau(b, c)$ . ■

---

Démonstration 9.81 ((2)  $\implies$  (3))

Clair. ■

---

Démonstration 9.82 ((3)  $\implies$  (1))

Supposons (3).

Montrons que  $f$  est convexe.

Soient  $a, c \in I$  et  $t \in [0 ; 1]$ .

Montrons qu'on a

$$f((1-t)a + tc) \leq (1-t)f(a) + tf(c) \quad (*)$$

Quitte à remplacer  $a, c, t$  par  $c, a, 1-t$ , on peut supposer  $a \leq c$ .

Posons  $b = (1-t)a + tc$ .

On a  $a \leq b \leq c$ .

Si  $a = c$ ,  $t = 0$  ou  $t = 1$ , alors (\*) est claire.

On suppose  $a \neq c$ ,  $t \neq 0$  et  $t \neq 1$ .

D'où  $a < b < c$ .

Il s'agit de montrer  $f(b) \leq (1-t)f(a) + tf(c)$ .

$$\text{On a } \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq \frac{f(c) - f(b)}{c - b}.$$

Or  $b - a = t(c - a)$  et  $c - b = (1-t)(c - a)$ .

$$\text{D'où } \frac{f(b) - f(a)}{t(c - a)} \leq \frac{f(c) - f(b)}{(1-t)(c - a)}.$$

D'où, en multipliant par  $t(1-t)(c - a) > 0$  :  $(1-t)(f(b) - f(a)) \leq t(f(c) - f(b))$ .

Donc  $f(b) \leq (1-t)f(a) + tf(c)$ .

Donc  $f$  est convexe. ■

La proposition suivante est une simple reformulation de la proposition précédente :

---

**Proposition 9.83 (Croissance des pentes)**

Soit  $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ .

On pose

$$\begin{array}{ccc} \forall a \in I, & g_a : I \setminus \{a\} & \longrightarrow \mathbb{R} \\ & x & \longmapsto \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \end{array}$$

On a alors :

$$f \text{ est convexe} \iff \forall a \in I, g_a \text{ est croissante.}$$

---

Démonstration 9.84

$\Rightarrow$

Supposons  $f$  convexe.

Soit  $a \in I$ .

Montrons que  $g_a$  est croissante.

Soient  $x, y \in I$  tels que  $x < y$ .

Montrons que  $g_a(x) \leq g_a(y)$ .

Selon la Proposition 9.79, on a :

- Si  $a < x < y$  : on a  $\tau(a, x) \leq \tau(a, y)$ . Donc  $g_a(x) \leq g_a(y)$ .
- Si  $x < a < y$  : on a  $\tau(x, a) \leq \tau(a, y)$ . Donc  $g_a(x) \leq g_a(y)$ .
- Si  $x < y < a$  : on a  $\tau(x, a) \leq \tau(y, a)$ . Donc  $g_a(x) \leq g_a(y)$ .

$\Leftarrow$

Supposons  $\forall a \in I, g_a$  est croissante.

Montrons que  $f$  est convexe.

Soient  $a, b, c \in I$  tels que  $a < b < c$ .

Comme  $g_a$  est croissante, on a  $g_a(a) \leq g_a(b)$ .

Donc  $\tau(a, b) \leq \tau(b, c)$ .

Donc d'après la Proposition 9.79,  $f$  est convexe. ■

### 9.3.4 Fonctions convexes dérivables

---

#### Proposition 9.85

Soit  $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$  dérivable.

On a

$$f \text{ est convexe} \iff f' \text{ est croissante.}$$



---

Démonstration 9.86



Supposons  $f$  convexe.

Montrons que  $f'$  est croissante.

Soient  $x, y \in I$  tels que  $x < y$ .

Montrons que  $f'(x) \leq f'(y)$ .

On a, selon la Proposition 9.79 :

- $\forall z \in ]x ; y[ , \tau(x, z) \leq \tau(x, y)$
- $\forall z \in ]x ; y[ , \tau(x, y) \leq \tau(z, y)$ .

D'où, par passage à la limite quand  $z \rightarrow x^+ : f'(x) \leq \tau(x, y)$ .

Et, par passage à la limite quand  $z \rightarrow y^- : \tau(x, y) \leq f'(y)$ .

Finalement, on a  $f'(x) \leq f'(y)$ .

Donc  $f'$  est croissante.



Supposons  $f'$  croissante.

Montrons que  $f$  est convexe.

Soient  $a, b, c \in I$  tels que  $a < b < c$ .

Montrons que  $\tau(a, b) \leq \tau(b, c)$ .

La fonction  $f$  est  $\begin{cases} \text{continue sur } [a ; b] \\ \text{dérivable sur } ]a ; b[ \end{cases}$  et  $\begin{cases} \text{continue sur } [b ; c] \\ \text{dérivable sur } ]b ; c[ \end{cases}$

Selon l'égalité des accroissements finis, il existe  $x, y \in I$  tels que  $a < x < b < y < c$  et

$$\tau(a, b) = f'(x) \quad \text{et} \quad \tau(b, c) = f'(y).$$

Or  $f'$  est croissante donc  $f'(x) \leq f'(y)$ .

Donc  $\tau(a, b) \leq \tau(b, c)$ .

Donc  $f$  est convexe. ■

---

**Corollaire 9.87**

Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ .

On a :

$$f \text{ est convexe} \iff f'' \geq 0.$$

---

### Exemple 9.88

On en déduit facilement la convexité (*i.e.* le caractère convexe ou concave) des fonctions usuelles :

- $\exp$  est convexe car  $\exp'' = \exp \geq 0$ .
- $\ln$  est concave car  $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \ln'' x = \frac{-1}{x^2} \leq 0$ .
- $\cos$  n'est ni convexe ni concave sur  $\mathbb{R}$  (car  $\cos'' 0 = -1 < 0$  et  $\cos'' \pi = 1 > 0$ ).
- $\operatorname{Arccos}$  est concave sur  $[0 ; 1]$  et convexe sur  $[-1 ; 0]$  car  $t \mapsto \frac{-1}{\sqrt{1-t^2}}$  est décroissante sur  $[0 ; 1]$  et croissante sur  $[-1 ; 0]$ .
- $\operatorname{Arctan}$  est concave sur  $\mathbb{R}_+$  et convexe sur  $\mathbb{R}_-$  car  $t \mapsto \frac{1}{1+t^2}$  est décroissante sur  $\mathbb{R}_+$  et croissante sur  $\mathbb{R}_-$ .
- $\tan$  est convexe sur  $\left[0 ; \frac{\pi}{2}\right]$  et concave sur  $\left[\frac{-\pi}{2} ; 0\right]$  car  $1 + \tan^2$  est croissante sur  $\left[0 ; \frac{\pi}{2}\right]$  et décroissante sur  $\left[\frac{-\pi}{2} ; 0\right]$ .

---

### Exercice 9.89

Étudier la convexité de la fonction  $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$  .  
$$x \longmapsto \ln(1+x^2)$$

---

#### Correction 9.90

On a  $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = 2x \times \frac{1}{1+x^2} = \frac{2x}{1+x^2}$ .

$$\text{Donc } \forall x \in \mathbb{R}, f''(x) = \frac{2(1+x^2) - 2x \times 2x}{(1+x^2)^2} = \frac{2(1-x^2)}{(1+x^2)^2}.$$

Donc

$$\begin{aligned} f''(x) \geq 0 &\iff x^2 \leq 1 \\ &\iff |x| \leq 1 \\ &\iff x \in [-1 ; 1]. \end{aligned}$$

Donc  $f$  est convexe sur  $[-1 ; 1]$  et concave sur  $]-\infty ; -1]$  et sur  $[1 ; +\infty[$ .

---

### Exercice 9.91 (Inégalité arithmético-géométrique)

Soient  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}_+$ .

Montrer :

$$\sqrt[n]{x_1 \dots x_n} \leq \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}.$$

---

*Correction 9.92*

Si l'un des réels  $x_1, \dots, x_n$  est nul, l'inégalité est claire.

Supposons  $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}_+^*$ .

On a  $\exp$  convexe sur  $\mathbb{R}$ .

On considère les points  $\ln x_1, \dots, \ln x_n \in \mathbb{R}$ .

D'après l'inégalité de Jensen, on a :

$$\exp\left(\frac{\ln x_1 + \dots + \ln x_n}{n}\right) \leq \frac{\exp(\ln x_1) + \dots + \exp(\ln x_n)}{n}.$$

Donc  $(\exp(\ln x_1 + \dots + \ln x_n))^{1/n} \leq \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}$ .

D'où  $(x_1 \dots x_n)^{1/n} \leq \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}$ .

---

**Proposition 9.93**

Soit  $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$  convexe et dérivable.

Le graphe de  $f$  est situé au dessus de ses tangentes.

---

*Démonstration 9.94*

Soit  $a \in I$ .

On note  $\Gamma_f$  le graphe de  $f$  et  $T$  sa tangente en  $a$ .

On a

$$\Gamma_f : y = f(x) \quad \text{et} \quad T : y = f'(a)(x - a) + f(a).$$


$$\begin{array}{lcl} \text{Posons } \delta : I & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & f(x) - (f'(a)(x - a) + f(a)) \end{array}$$

Il s'agit de montrer que  $\forall x \in I, \delta(x) \geq 0$ .

On a  $\forall x \in I, \delta'(x) = f'(x) - f'(a)$ .

Or  $f$  est convexe donc  $f'$  est croissante donc  $\forall x \in I, \begin{cases} \delta'(x) \geq 0 & \text{si } x \geq a \\ \delta'(x) \leq 0 & \text{si } x \leq a \end{cases}$

On a donc le tableau de variations suivant :

$x$	$a$
$\delta$	

D'où  $\forall x \in I, \delta(x) \geq 0$ .

Donc  $\Gamma_f$  est situé au dessus de  $T$ . ■

---

**Exercice 9.95**

Montrer les encadrements suivants :

$$(1) \quad \forall \theta \in \left[0; \frac{\pi}{4}\right], \quad \theta \leq \tan \theta \leq \frac{4}{\pi} \theta$$

$$(2) \quad \forall \theta \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right], \quad \frac{2}{\pi} \theta \leq \sin \theta \leq \theta$$

---

*Correction 9.96 (1)*

La fonction  $\tan$  est convexe sur  $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$  car sa dérivée  $\tan' = 1 + \tan^2$  est croissante sur  $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$ .

On en déduit d'une part que son graphe est situé au dessus de sa tangente en  $\theta = 0$ , c'est-à-dire  $y = \tan'(0)(\theta - 0) + \tan(0) = \theta$ .

Donc  $\forall \theta \in \left[0; \frac{\pi}{4}\right], \quad \theta \leq \tan \theta$ .

On en déduit d'autre part que son graphe est situé en dessous de sa corde entre 0 et  $\frac{\pi}{4}$ , c'est-à-dire  $\forall \theta \in \left[0; \frac{\pi}{4}\right], \quad \tan \theta \leq \frac{4}{\pi} \theta$ .

D'où l'encadrement.

---

*Correction 9.97 (2)*

La fonction  $\sin$  est concave sur  $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$  car sa dérivée  $\sin' = \cos$  est décroissante sur  $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ .

On en déduit d'une part que son graphe est situé en dessous de sa tangente en 0, c'est-à-dire  $y = \sin'(0)(\theta - 0) + \sin(0) = 0$ .

Donc  $\forall \theta \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right], \quad \sin \theta \leq \theta$ .

On en déduit d'autre part que son graphe est situé au dessus de sa corde entre 0 et  $\frac{\pi}{2}$ , c'est-à-dire  $\forall \theta \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right], \quad \frac{2}{\pi} \theta \leq \sin \theta$ .

D'où l'encadrement.

# Chapitre 10

## Polynômes, fractions rationnelles

### Sommaire

---

<b>10.1</b>	<b>Polynômes . . . . .</b>	<b>292</b>
10.1.1	Anneau des polynômes . . . . .	292
10.1.2	Degré . . . . .	296
10.1.3	Division euclidienne . . . . .	300
10.1.4	Divisibilité . . . . .	302
10.1.5	Racines . . . . .	304
10.1.6	Fonctions polynomiales . . . . .	306
10.1.7	Dérivation . . . . .	307
<b>10.2</b>	<b>Arithmétique des polynômes . . . . .</b>	<b>309</b>
10.2.1	Idéal d'un anneau commutatif . . . . .	309
10.2.2	PGCD . . . . .	314
10.2.2.1	PGCD de deux polynômes . . . . .	314
10.2.2.2	Propriétés . . . . .	317
10.2.2.3	Algorithme d'Euclide . . . . .	318
10.2.2.4	PGCD de plusieurs polynômes . . . . .	320
10.2.3	Polynômes premiers entre eux . . . . .	321
10.2.3.1	Cas de deux polynômes . . . . .	321
10.2.3.2	Cas de plusieurs polynômes . . . . .	323
10.2.4	PPCM . . . . .	323
10.2.4.1	PPCM de deux polynômes . . . . .	323
10.2.4.2	PPCM de plusieurs polynômes . . . . .	326
10.2.5	Polynômes irréductibles . . . . .	327
10.2.5.1	Définition . . . . .	327
10.2.5.2	Polynômes irréductibles sur $\mathbb{C}$ et $\mathbb{R}$ . . . . .	330
10.2.6	Théorème fondamental de l'arithmétique des polynômes . . . . .	332
10.2.6.1	Cas général . . . . .	332
10.2.6.2	Polynômes à coefficients complexes . . . . .	335
10.2.6.3	Polynômes à coefficients réels . . . . .	337
<b>10.3</b>	<b>Racines des polynômes . . . . .</b>	<b>339</b>
10.3.1	Multiplicités . . . . .	339
10.3.2	Nombre de racines d'un polynôme . . . . .	341
10.3.3	Polynômes interpolateurs de Lagrange . . . . .	342
10.3.4	Polynômes scindés . . . . .	344

<b>10.4</b>	<b>Fractions rationnelles . . . . .</b>	<b>347</b>
10.4.1	Corps des fractions rationnelles . . . . .	347
10.4.2	Degré . . . . .	350
10.4.3	Racines, pôles . . . . .	354
10.4.4	Dérivation . . . . .	355
10.4.5	Décomposition en éléments simples . . . . .	356
10.4.5.1	Le théorème . . . . .	356
10.4.5.2	Quelques méthodes de calcul . . . . .	361

---

Dans tout ce chapitre, on considère un corps  $(\mathbb{K}, +, \times)$ .

En pratique, aux concours, on se limite à  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ , voire parfois  $\mathbb{Q}$ .

## 10.1 Polynômes

### 10.1.1 Anneau des polynômes

Il n'est pas difficile de donner une construction rigoureuse de l'anneau des polynômes, mais c'est hors programme (et cela n'apporte rien en pratique). On se contente donc de la « définition » suivante, qui décrit ce qu'il faut savoir.

---

#### Définition 10.1

L'anneau des polynômes en l'indéterminée  $X$  à coefficients dans  $\mathbb{K}$  est un anneau commutatif noté  $(\mathbb{K}[X], +, \times)$  tel que :

- (1) Le corps  $(\mathbb{K}, +, \times)$  est un sous-anneau de  $(\mathbb{K}[X], +, \times)$ .
- (2) Il existe un élément  $X \in \mathbb{K}[X]$  appelé l'indéterminée.
- (3) Tout élément  $P \in \mathbb{K}[X]$  s'écrit de façon unique sous la forme :

$$P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \quad \text{où : } \begin{cases} n \in \mathbb{N} \\ \forall k \in \llbracket 0 ; n \rrbracket, a_k \in \mathbb{K} \end{cases}$$

à des termes nuls près.

Cette écriture est appelée l'écriture canonique du polynôme.

Le coefficient  $a_k$  est appelé le coefficient de  $P$  de degré  $k$ .

---

#### Remarque 10.2

- Le point (1) signifie que  $\mathbb{K}$  est inclus dans  $\mathbb{K}[X]$  et que, pour tout  $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ , la somme  $\lambda + \mu$  et le produit  $\lambda\mu$  ont même valeur dans  $\mathbb{K}$  et dans  $\mathbb{K}[X]$ .

- Dans le point (3), l'unicité de l'écriture à des termes nuls près signifie :

$$\forall m, n \in \mathbb{N}, \forall a_0, \dots, a_n, b_0, \dots, b_m \in \mathbb{K}, \left\{ \begin{array}{l} n \leq m \\ \sum_{k=0}^n a_k X^k = \sum_{k=0}^m b_k X^k \end{array} \right\} \implies \left\{ \begin{array}{l} \forall k \in \llbracket 0 ; n \rrbracket, a_k = b_k \\ \forall k \in \llbracket n+1 ; m \rrbracket, b_k = 0 \end{array} \right.$$

- L'indéterminée est parfois aussi notée  $Y$ ,  $Z$  ou  $T$ . L'anneau des polynômes est alors noté  $\mathbb{K}[Y]$ ,  $\mathbb{K}[Z]$  ou  $\mathbb{K}[T]$ .
- Les éléments  $\lambda \in \mathbb{K}$  sont appelés polynômes constants. Leur écriture canonique est  $\lambda X^0$  ou simplement  $\lambda$ . On appelle polynôme nul le polynôme  $0 = 0X^0$ .
- On pourrait tout aussi bien considérer l'anneau  $\mathbb{A}[X]$  des polynômes à coefficients dans un anneau commutatif  $\mathbb{A}$ , mais dans ce chapitre, on ne s'intéresse qu'au cas où les polynômes sont à coefficients dans un corps.

*Remarque 10.3 (Structure de l'anneau  $\mathbb{K}[X]$ )*

Soient deux polynômes  $A = \sum_{k=0}^n a_k X^k$  et  $B = \sum_{k=0}^m b_k X^k$  avec  $m, n \in \mathbb{N}$  et  $a_0, \dots, a_n, b_0, \dots, b_m \in \mathbb{K}$ .

- Quitte à ajouter des termes nuls, on peut supposer  $m = n$ .

La somme de  $A$  et  $B$  est le polynôme  $C = \sum_{k=0}^n c_k X^k$  défini par :

$$\forall k \in \llbracket 0 ; n \rrbracket, c_k = a_k + b_k.$$

- On pose :  $\forall k \in \llbracket n+1 ; +\infty \rrbracket, a_k = 0$  et  $\forall k \in \llbracket m+1 ; +\infty \rrbracket, b_k = 0$ .

Le produit de  $A$  et  $B$  est le polynôme  $D = \sum_{k=0}^{m+n} d_k X^k$  défini par :

$$\forall k \in \llbracket 0 ; m+n \rrbracket, d_k = \sum_{j=0}^k a_j b_{k-j}.$$

- Les éléments neutres de l'anneau  $\mathbb{K}[X]$  sont les polynômes constants  $0 = 0X^0$  et  $1 = 1X^0$ .

---

**Notation 10.4**

Soit  $A$  un anneau. On suppose que  $\mathbb{K}$  est un sous-anneau de  $A$ .

Soient  $P \in \mathbb{K}[X]$  et  $x \in A$ .

On considère l'écriture canonique de  $P$  :

$$P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \quad \text{où : } \begin{cases} n \in \mathbb{N} \\ \forall k \in \llbracket 0 ; n \rrbracket, a_k \in \mathbb{K} \end{cases}$$

On note  $P(x)$  l'élément de  $A$  défini par :

$$P(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k.$$

On dit que  $P(x)$  est l'élément obtenu en évaluant  $P$  en  $x$ .

Cela ne signifie pas que  $P$  est considéré comme une fonction : il n'y a pas d'ensemble de définition bien défini, on peut « évaluer »  $P$  en n'importe quel élément d'un anneau contenant  $\mathbb{K}$  comme sous-anneau.

---

*Exemple 10.5 (mêmes notations)*

- Si  $A = \mathbb{K}$  alors la notation  $P(\lambda)$  est valide pour tout  $\lambda \in \mathbb{K}$ .
- En particulier, si  $A = \mathbb{K} = \mathbb{R}$  et  $P = X^2 + 1$  alors la notation  $P(\lambda)$  est valide pour tout  $\lambda \in \mathbb{R}$  mais aussi pour tout  $\lambda \in \mathbb{C}$ . On a :

$$P(0) = 1 \quad P(1) = 2 \quad P(i) = 0.$$

- Si  $A = \mathbb{K}[X]$  alors la notation  $P(Q)$  est valide pour tout  $Q \in \mathbb{K}[X]$ . On dit que  $P(Q)$  est la composition des polynômes  $P$  et  $Q$ .  
Par exemple, si  $P = X^2 + 1$  alors  $P(Q) = Q^2 + 1 \in \mathbb{K}[X]$ .  
La composition des polynômes  $P$  et  $Q$  est parfois aussi notée  $P \circ Q$ .
- Dans les exemples qui précèdent, on a considéré des anneaux commutatifs, mais ce n'est pas nécessaire. En deuxième année, on appliquera très souvent des polynômes  $P \in \mathbb{K}[X]$  à des matrices carrées à coefficients dans  $\mathbb{K}$ , et l'anneau formé par ces matrices n'est pas commutatif.

---

*Remarque 10.6 (Rédaction)*

- Quand on évalue le polynôme  $P$  en  $i$  ou en  $X^2$ , on ne doit surtout pas écrire « on pose  $X = i$  » ou « on pose  $X = X^2$  ».
- La notation  $P(X)$  désigne la composition des polynômes  $P$  et  $X$ , c'est-à-dire  $P$ . On peut donc écrire au choix « le polynôme  $P(X) = X^2 + 1$  » ou « le polynôme  $P = X^2 + 1$  », il n'y a aucune différence, alors que si  $f$  est une fonction, il ne faut surtout pas confondre  $f$  et  $f(x)$ .



---

**Proposition 10.7**

Soit  $A$  un anneau et  $x \in A$ . On suppose que  $\mathbb{K}$  est un sous-anneau de  $A$ .

Alors il existe un unique morphisme d'anneaux  $\varphi : \mathbb{K}[X] \longrightarrow A$  tel que :

$$\varphi(X) = x \quad \text{et} \quad \forall \lambda \in \mathbb{K}, \quad \varphi(\lambda) = \lambda.$$

---

*Démonstration 10.8*

analyse

Soit  $\varphi : \mathbb{K}[X] \longrightarrow A$  tel que  $\varphi(X) = x$  et  $\varphi|_{\mathbb{K}} = \text{id}_{\mathbb{K}}$ .

On montre par une récurrence immédiate :  $\forall n \in \mathbb{N}, \quad \varphi(X^n) = x^n$ .

Soit  $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$  avec  $\begin{cases} n \in \mathbb{N} \\ a_0, \dots, a_n \in \mathbb{K} \end{cases}$ .

On a

$$\begin{aligned} \varphi(P) &= \sum_{k=0}^n \varphi(a_k X^k) \\ &= \sum_{k=0}^n \varphi(a_k) \varphi(X^k) \quad \left. \begin{array}{l} \text{car } \varphi \text{ morphisme d'anneaux} \\ \swarrow \end{array} \right\} \\ &= \sum_{k=0}^n a_k x^k \\ &= P(x). \end{aligned}$$

Ainsi, on a :  $\forall P \in \mathbb{K}[X], \quad \varphi(P) = P(x)$ .

synthèse

$$\begin{array}{ccc} \text{Posons } \varphi : \mathbb{K}[X] & \longrightarrow & A \\ P & \longmapsto & P(x) \end{array}.$$

On a :

- $\varphi(X) = x$
- $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \quad \varphi(\lambda) = \lambda$

- $\varphi$  est un morphisme d'anneaux :

$$\varphi(1) = 1 \quad \text{et} \quad \forall P, Q \in \mathbb{K}[X], \quad \begin{cases} \varphi(P+Q) = (P+Q)(x) = P(x) + Q(x) = \varphi(P) + \varphi(Q) \\ \varphi(PQ) = PQ(x) = P(x)Q(x) = \varphi(P)\varphi(Q) \end{cases}$$

conclusion

Le morphisme existe et est unique. ■

---

**Définition 10.9 (Conjugaison)**

Soit un polynôme à coefficients complexes  $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{C}[X]$  (avec  $n \in \mathbb{N}$  et  $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{C}$ ).

On appelle conjugué de  $P$  le polynôme :

$$\bar{P} = \sum_{k=0}^n \bar{a}_k X^k.$$

---

*Remarque 10.10*

On a :  $\forall P \in \mathbb{C}[X], P = \bar{P} \iff P \in \mathbb{R}[X]$ .

---

**Proposition 10.11**

La conjugaison  $\mathbb{C}[X] \longrightarrow \mathbb{C}[X]$  est un automorphisme d'anneaux.  
$$P \longmapsto \bar{P}$$

---

*Démonstration 10.12*

★★ EXERCICE ★★

■

## 10.1.2 Degré

---

**Définition 10.13 (Degré d'un polynôme)**

Soit un polynôme  $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$  (avec  $n \in \mathbb{N}$  et  $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{K}$ ).

Le degré de  $P$  est défini par :

$$\deg P = \begin{cases} -\infty & \text{si } P = 0 \\ \max \{k \in \llbracket 0 ; n \rrbracket \mid a_k \neq 0\} & \text{sinon} \end{cases}$$

---

**Proposition 10.14**

Soient  $A, B \in \mathbb{K}[X]$ . On a :

(1)  $\deg(A + B) \leq \max \{\deg A ; \deg B\}$  avec égalité si  $\deg A \neq \deg B$ .

(2)  $\deg(AB) = \deg A + \deg B$ .

(3) Si  $B$  non-constant alors  $\deg(A(B)) = (\deg A) \times (\deg B)$ .

---

*Démonstration 10.15 (notations pour les démonstrations suivantes)*

Soient  $m, n \in \mathbb{N}$  et  $a_0, \dots, a_n, b_0, \dots, b_m \in \mathbb{K}$  tels que  $A = \sum_{k=0}^n a_k X^k$  et  $B = \sum_{k=0}^m b_k X^k$ .

On pose  $\begin{cases} \forall k \in \llbracket n+1 ; +\infty \llbracket, & a_k = 0 \\ \forall k \in \llbracket m+1 ; +\infty \llbracket, & b_k = 0 \end{cases}$

On pose  $\begin{cases} C = \sum_{k=0}^p c_k X^k = A + B & \text{avec } \begin{cases} p = \max\{m ; n\} \\ c_0, \dots, c_p \in \mathbb{K} \end{cases} \\ D = \sum_{k=0}^{m+n} d_k X^k = AB & \text{avec } d_0, \dots, d_{m+n} \in \mathbb{K} \end{cases}$

---

*Démonstration 10.16 (1)*

On a :  $\begin{cases} \forall k > \deg A, & a_k = 0 \\ \forall k > \deg B, & b_k = 0 \end{cases}$

Donc  $\forall k \in \llbracket \max\{\deg A ; \deg B\} + 1 ; p \rrbracket, c_k = a_k + b_k = 0$ .

Donc  $\deg C \leq \max\{\deg A ; \deg B\}$ .

Supposons  $\deg A \neq \deg B$ , par exemple  $\deg A < \deg B$ .

On a :  $\max\{\deg A ; \deg B\} = \deg B$ .

Et :  $c_{\deg B} = \underbrace{a_{\deg B}}_{=0} + \underbrace{b_{\deg B}}_{\neq 0} \neq 0$ .

Donc  $\deg C \leq \deg B$  donc  $\deg C = \deg B$ . ■

---

*Démonstration 10.17 (2)*

Si  $A$  ou  $B$  est nul, alors  $\deg(AB) = -\infty = \deg A + \deg B$ .

Supposons  $A$  et  $B$  non-nuls.

On a :  $\begin{cases} a_{\deg A} \neq 0 & \text{et } \forall k > \deg A, & a_k = 0 \\ b_{\deg B} \neq 0 & \text{et } \forall k > \deg B, & b_k = 0 \end{cases}$

Montrons que  $\deg(AB) = \deg A + \deg B$ .

Si  $k > \deg A + \deg B$  alors  $d_k = \sum_{j=0}^k a_j b_{k-j} = 0$  car  $\forall j \in \llbracket 0 ; k \rrbracket, j > \deg A$  ou  $k - j > \deg B$  (car  $j + k - j > \deg A + \deg B$ ).

Si  $k = \deg A + \deg B$  alors  $d_k = \sum_{j=0}^k a_j b_{k-j} = a_{\deg A} + b_{\deg B} \neq 0$  car si  $j > \deg A$  alors  $a_j = 0$  et si  $j < \deg A$  alors  $k - j > \deg B$  donc  $b_{k-j} = 0$ . ■

*Démonstration 10.18 (3)*

On a  $A(B) = \sum_{k=0}^n a_k B^k$ .

On suppose  $B$  non-constant.

On a  $(\deg B)^{\deg A} = (\deg A)(\deg B)$ .

Donc, comme  $a_{\deg A} \neq 0$  :

$$\deg(a_{\deg A} B^{\deg B}) = (\deg A)(\deg B) \quad \text{et} \quad \forall k \in \llbracket 0 ; \deg A - 1 \rrbracket, \quad \deg(a_k B^k) < (\deg A)(\deg B).$$

Donc  $\deg\left(\sum_{k=0}^{\deg A - 1} a_k B^k\right) < (\deg A)(\deg B)$ .

Donc selon (1) :  $\deg(A \circ B) = (\deg A)(\deg B)$ . ■

### Notation 10.19

Soit  $n \in \mathbb{N}$ .

On pose :

$$\mathbb{K}_n[X] = \{P \in \mathbb{K}[X] \mid \deg P \leq n\}.$$

Autrement dit :

$$\mathbb{K}_n[X] = \left\{ P \in \mathbb{K}[X] \mid \exists a_0, \dots, a_n \in \mathbb{K}, \quad P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \right\}.$$

### Remarque 10.20

- Si  $n = 0$  alors  $\mathbb{K}_0[X] = \mathbb{K}$  est l'ensemble des polynômes constants.
- Si  $n \in \mathbb{N}^*$  alors  $\mathbb{K}_n[X]$  est un sous-groupe de  $(\mathbb{K}[X], +)$  (mais pas un sous-anneau de  $(\mathbb{K}[X], +, \times)$  car il n'est pas stable par produit).  
Le groupe  $(\mathbb{K}_n[X], +)$  est isomorphe au groupe  $\mathbb{K}^{n+1}$ .

---

**Proposition 10.21 (Propriétés de l'anneau  $\mathbb{K}[X]$ )**

(1) L'anneau  $(\mathbb{K}[X], +, \times)$  est intègre.

(2) Les éléments inversibles de  $\mathbb{K}[X]$  sont les polynômes constants non-nuls :

$$\mathbb{K}[X]^\times = \mathbb{K} \setminus \{0\}.$$

---

*Démonstration 10.22 (1)*

On sait que  $\mathbb{K}[X]$  est non-nul et commutatif.

Soient  $P, Q \in \mathbb{K}[X]$  tels que  $PQ = 0$ .

On a  $\deg(PQ) = -\infty$ .

$$\text{Donc } \underbrace{\deg P}_{\in \mathbb{N} \cup \{-\infty\}} + \underbrace{\deg Q}_{\in \mathbb{N} \cup \{-\infty\}} = -\infty.$$

Donc  $\deg P = -\infty$  ou  $\deg Q = -\infty$ .

Donc  $P = 0$  ou  $Q = 0$ . Donc  $\mathbb{K}[X]$  est intègre. ■

---

*Démonstration 10.23 (2)*

analyse

Soit  $P \in \mathbb{K}[X]^\times$ .

On a  $PP^{-1} = 1$ .

Donc  $\deg(PP^{-1}) = \deg 1$ .

$$\text{Donc } \underbrace{\deg P}_{\in \mathbb{N} \cup \{-\infty\}} + \underbrace{\deg P^{-1}}_{\in \mathbb{N} \cup \{-\infty\}} = 0.$$

Donc  $\deg P = \deg P^{-1} = 0$ .

Donc  $P$  constant non-nul.

synthèse

Soit  $P \in \mathbb{K}[X]$  tel que  $\deg P = 0$ .

On a  $P = \lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$ .

Donc  $P$  inversible :  $\lambda \times \frac{1}{\lambda} = 1$ .

conclusion

Les polynômes inversibles sont les polynômes constants non-nuls. ■

---

**Définition 10.24 (Coefficient dominant)**

Le coefficient dominant d'un polynôme non-nul  $P$  est le coefficient de  $P$  de degré  $\deg P$ .

Un polynôme unitaire est un polynôme non-nul dont le coefficient dominant vaut 1.

---

*Exemple 10.25*

- Le coefficient dominant du polynôme  $P = 7X^5 - 3X^2 + 5$  vaut 7.
- Le coefficient dominant du polynôme  $Q = X^3 + 3X^2 + 3X + 1$  vaut 1 donc  $Q$  est unitaire.

### 10.1.3 Division euclidienne

---

**Définition/Proposition 10.26 (Division euclidienne dans  $\mathbb{K}[X]$ )**

Soient  $A, B \in \mathbb{K}[X]$ . On suppose  $B \neq 0$ .

Il existe un unique couple  $(Q, R) \in \mathbb{K}[X]^2$  tel que :

$$\begin{cases} A = QB + R \\ \deg R < \deg B \end{cases}$$

Le polynôme  $Q$  est appelé le quotient de la division euclidienne de  $A$  par  $B$ .

Le polynôme  $R$  est appelé le reste de la division euclidienne de  $A$  par  $B$ .

---

*Démonstration 10.27*

unicité

Soient  $Q_1, R_1, Q_2, R_2 \in \mathbb{K}[X]$  tels que 
$$\begin{cases} A = Q_1B + R_1 = Q_2B + R_2 \\ \deg R_1 < \deg B \\ \deg R_2 < \deg B \end{cases}$$

On a 
$$\begin{cases} (Q_1 - Q_2)B = R_2 - R_1 \\ \deg(R_2 - R_1) < \deg B \end{cases} \text{ donc } \deg((Q_1 - Q_2)B) < \deg B \text{ donc } \deg(Q_1 - Q_2) + \deg B < \deg B.$$

Donc  $\deg(Q_1 - Q_2) = -\infty$  donc  $Q_1 = Q_2$  donc  $R_1 - R_2 = 0 \times B = 0$ .

Donc  $(Q_1, R_1) = (Q_2, R_2)$ .

existence

On fixe le polynôme  $B \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$ .

Si  $B$  est constant, la proposition est vraie car  $\forall A \in \mathbb{K}[X], A = QB$  avec  $Q = \frac{A}{B}$ .

Supposons  $B$  non-constant. Montrons que  $\forall n \in \mathbb{N}, \forall A \in \mathbb{K}_n[X], \exists Q, R \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}, \begin{cases} A = QB + R \\ \deg R < \deg B \end{cases}$

$\underbrace{\hspace{15em}}_{\mathcal{P}(n)}$

Par récurrence sur  $n \in \mathbb{N}$  :

Soit  $A \in \mathbb{K}_0[X]$ . On a  $\begin{cases} A = 0 \times B + A \\ \deg A = 0 < \deg B \end{cases}$  donc  $Q = 0$  et  $R = A$  conviennent. D'où  $\mathcal{P}(0)$ .

Soit  $n \in \mathbb{N}$  tel que  $\mathcal{P}(n)$ . Montrons  $\mathcal{P}(n+1)$ .

Soit  $A \in \mathbb{K}_{n+1}[X]$ .

Il existe  $a_0, \dots, a_{n+1} \in \mathbb{K}$  tels que  $A = a_{n+1}X^{n+1} + \dots + a_0X^0$ .

Si  $n+1 < \deg B$  alors le couple  $(Q, R) = (0, A)$  convient.

Supposons  $n+1 \geq \deg B$ .

Posons  $m = \deg B$  et  $B = b_mX^m + \dots + b_0X^0$  (avec  $b_0, \dots, b_m \in \mathbb{K}$  et  $b_m \neq 0$ ).

Posons  $A_1 = A - \frac{a_{n+1}}{b_m}X^{n+1-m}B$ .

On a  $\begin{cases} \deg A \leq n+1 \\ \deg \left( \frac{a_{n+1}}{b_m}X^{n+1-m}B \right) \leq n+1 \end{cases}$

Donc  $\deg A_1 \leq n+1$ .

De plus, le coefficient de degré  $n+1$  de  $A_1$  est :  $a_{n+1} - \frac{a_{n+1}}{b_m}b_m = 0$ .

Donc  $\deg A_1 < n+1$ .

Donc il existe  $Q_1, R_1 \in \mathbb{K}[X]$  tels que  $\begin{cases} A_1 = Q_1B + R_1 \\ \deg R_1 < \deg B \end{cases}$

Finalement, on a  $\begin{cases} A = \left( Q_1 + \frac{a_{n+1}}{b_m}X^{n+1-m} \right) B + R_1 \\ \deg R_1 < \deg B \end{cases}$

D'où  $\mathcal{P}(n+1)$ .

D'où  $\forall n \in \mathbb{N}, \mathcal{P}(n)$ .

D'où l'existence car  $\mathbb{K}[X] = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{K}_n[X]$ . ■

---

*Exemple 10.28*

Calculons la division euclidienne de  $2X^3 + 3X^2 + 1$  par  $X^2 + 1$  :

$$\begin{array}{r|l} 2X^3 + 3X^2 & + 1 \\ - 2X^3 & - 2X \\ \hline & 3X^2 - 2X + 1 \\ & - 3X^2 & - 3 \\ \hline & & - 2X - 2 \end{array}$$

Donc  $2X^3 + 3X^2 + 1 = \underbrace{(2X + 3)}_{\text{quotient}} (X^2 + 1) + \underbrace{(-2X - 2)}_{\text{reste}}$  et  $\deg(-2X - 2) < \deg(X^2 + 1)$ .

De même, on a :

$$\begin{array}{r|l} 3X^4 & + X + 1 \\ - 3X^4 - 6X^3 & \\ \hline & - 6X^3 \\ & 6X^3 + 12X^2 \\ \hline & 12X^2 & + X \\ & - 12X^2 - 24X \\ \hline & & - 23X & + 1 \\ & & 23X + 46 \\ \hline & & & 47 \end{array}$$

Donc  $3X^4 + X + 1 = \underbrace{(3X^3 - 6X^2 + 12X - 23)}_{\text{quotient}} (X + 2) + \underbrace{47}_{\text{reste}}$  et  $\deg 47 < \deg(X + 2)$ .

#### 10.1.4 Divisibilité

---

**Définition 10.29 (Divisibilité dans  $\mathbb{K}[X]$ )**

Soient  $A, B \in \mathbb{K}[X]$ .

Si on a :

$$\exists C \in \mathbb{K}[X], \quad AC = B$$

alors on dit que

- $A$  divise  $B$  ;
- $A$  est un diviseur de  $B$  ;
- $B$  est un multiple de  $A$  ;
- $B$  est divisible par  $A$ .



---

**Notation 10.30**

Soient  $A, B \in \mathbb{K}[X]$ .

La notation  $A \mid B$  signifie «  $A$  divise  $B$  ».

L'ensemble  $\{AC\}_{C \in \mathbb{K}[X]}$  des multiples de  $A$  est noté  $A\mathbb{K}[X]$  :

$$A\mathbb{K}[X] = \{AC\}_{C \in \mathbb{K}[X]} = \{P \in \mathbb{K}[X] \mid A \mid P\}.$$

Dans ce cours, on notera  $\text{div}(B)$  (notation non-officielle) l'ensemble des polynômes nuls ou unitaires qui divisent  $B$  :

$$\text{div}(B) = \{P \in \mathbb{K}[X] \mid P \mid B \text{ et } (P = 0 \text{ ou } P \text{ unitaire})\}.$$

---

*Remarque 10.31 (Lien avec la division euclidienne)*

Soient  $A, B \in \mathbb{K}[X]$ . On suppose  $B \neq 0$ .

On note  $R$  le reste de la division euclidienne de  $A$  par  $B$ .

Alors :

$$B \mid A \iff R = 0.$$

---

**Proposition 10.32 (Divisibilité dans  $\mathbb{K}[X]$ )**

(1) La relation binaire  $\mid$  sur  $\mathbb{K}[X]$  est réflexive et transitive (mais pas antisymétrique, donc ce n'est pas une relation d'ordre sur  $\mathbb{K}[X]$ ).

(2) On a :

$$\forall A, B, C \in \mathbb{K}[X], A \mid B \implies CA \mid CB$$

et :

$$\forall A, B \in \mathbb{K}[X], \forall C \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}, A \mid B \iff CA \mid CB.$$

(3) On a :

$$\forall A, B \in \mathbb{K}[X], A \mid B \implies (\deg A \leq \deg B \text{ ou } B = 0).$$

---

**Définition/Proposition 10.33**

Soient  $A, B \in \mathbb{K}[X]$ .

On a :

$$(A \mid B \text{ et } B \mid A) \iff \exists \lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\}, A = \lambda B.$$

Lorsque ces propositions sont vérifiées, on dit que  $A$  et  $B$  sont associés.

---

Démonstration 10.34

$\Rightarrow$

Supposons  $A \mid B$  et  $B \mid A$ .

Soient  $C, D \in \mathbb{K}[X]$  tels que  $AC = B$  et  $BD = A$ . On a  $A = BD = ACD$ .

Si  $A \neq 0$  alors  $CD = 1$  donc  $D$  inversible (d'inverse  $C$ ). Donc  $D = \lambda$  où  $\lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$  et  $A = \lambda B$ .

Si  $A = 0$  alors  $B = 0$  car  $A \mid B$  et  $\lambda = 1$  convient.

$\Leftarrow$

Claire : on a  $B = \frac{1}{\lambda}A$ . ■

---

### Proposition 10.35 (Divisibilité entre polynômes unitaires)

Notons  $\mathcal{U}$  l'ensemble des polynômes de  $\mathbb{K}[X]$  nuls ou unitaires :

$$\begin{aligned}\mathcal{U} &= \text{div}(0) \\ &= \{P \in \mathbb{K}[X] \mid \exists n \in \mathbb{N}, \exists R \in \mathbb{K}_n[X], P = X^{n+1} + R\} \cup \{0; 1\}.\end{aligned}$$

(1) La relation binaire  $\mid$  sur  $\mathcal{U}$  est une relation d'ordre sur  $\mathcal{U}$ .

(2) Pour cette relation d'ordre, le polynôme nul est le plus grand élément de  $\mathcal{U}$  et le polynôme constant 1 est le plus petit :

$$\forall P \in \mathcal{U}, P \mid 0 \quad \text{et} \quad 1 \mid P.$$

## 10.1.5 Racines

---

### Définition 10.36 (Racine)

Soit  $P \in \mathbb{K}[X]$ .

On appelle racine de  $P$  (dans  $\mathbb{K}$ ) tout élément  $\lambda \in \mathbb{K}$  tel que  $P(\lambda) = 0$ .

---

Exemple 10.37

Le polynôme  $X^2 + 1$  admet  $i$  et  $-i$  comme racines dans  $\mathbb{C}$ . Il n'admet aucune racine dans  $\mathbb{R}$ .

Tout polynôme de degré 1 admet exactement une racine.

---

**Théorème 10.38 (Théorème de d'Alembert-Gauss)**

Tout polynôme non-constant à coefficients complexes admet une racine :

$$\forall P \in \mathbb{C}[X], \deg P \geq 1 \implies \exists \lambda \in \mathbb{C}, P(\lambda) = 0.$$

---

*Démonstration 10.39*

★★ ADMIS ★★ (hors programme). ■

---

**Proposition 10.40 (Racines complexes des polynômes réels)**

Soit  $P \in \mathbb{R}[X]$ . Soit  $\lambda \in \mathbb{C}$  une racine complexe de  $P$ .

Alors  $\bar{\lambda}$  est racine de  $P$ .

---

*Démonstration 10.41*

On a  $P(\lambda) = 0$  donc  $\overline{P(\lambda)} = 0$  donc  $\overline{P}(\bar{\lambda}) = 0$ .

Or  $P = \overline{P}$  car  $P \in \mathbb{R}[X]$ .

Donc  $P(\bar{\lambda}) = 0$ .

Donc  $\bar{\lambda}$  est racine de  $P$ . ■

---

**Proposition 10.42**

Soit  $P \in \mathbb{K}[X]$ . Soit  $\lambda \in \mathbb{K}$ .

On a :

$$\lambda \text{ racine de } P \iff (X - \lambda) \mid P.$$

---

*Démonstration 10.43*

Notons  $Q$  et  $R$  le quotient et le reste de la division euclidienne de  $P$  par  $X - \lambda$  :

$$P = (X - \lambda)Q + R \quad \text{et} \quad \deg R < \deg(X - \lambda).$$

On a donc  $R = \mu$  avec  $\mu \in \mathbb{K}$ .

On a :

$$\begin{aligned} \lambda \text{ racine de } P &\iff P(\lambda) = 0 \\ &\iff (\lambda - \lambda)Q(\lambda) + \mu = 0 \\ &\iff \mu = 0 \\ &\iff R = 0 \\ &\iff (X - \lambda) \mid P. \end{aligned}$$

■

## 10.1.6 Fonctions polynomiales

---

### Définition 10.44 (Fonction polynomiale associée à un polynôme)

Soit un polynôme  $P \in \mathbb{K}[X]$ .

Soient  $n \in \mathbb{N}$  et  $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{K}$  tels que  $P = a_n X^n + \dots + a_0 X^0$ .

On appelle fonction polynomiale associée à  $P$  la fonction :

$$\begin{aligned} \tilde{P} : \mathbb{K} &\longrightarrow \mathbb{K} \\ x &\longmapsto P(x) = a_n x^n + \dots + a_0 x^0 \end{aligned}$$

---

### Proposition 10.45 (Anneau des fonctions polynomiales)

*L'application*

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{K}[X] &\longrightarrow \mathcal{F}(\mathbb{K}, \mathbb{K}) \\ P &\longmapsto \tilde{P} \end{aligned}$$

*est un morphisme d'anneaux.*

*En particulier, l'ensemble  $\text{Im } \varphi$  des fonctions polynomiales de  $\mathbb{K}$  dans  $\mathbb{K}$  est un sous-anneau de  $\mathcal{F}(\mathbb{K}, \mathbb{K})$ .*

---

*Démonstration 10.46*

★★ EXERCICE ★★

■

---

*Remarque 10.47*

On a aussi :

$$\forall P, Q \in \mathbb{K}[X], \quad \widetilde{P \circ Q} = \tilde{P} \circ \tilde{Q}.$$

---

*Remarque 10.48*

On verra plus loin que si  $\mathbb{K}$  est infini, alors  $\varphi$  est un isomorphisme d'anneaux. Ainsi, lorsque  $\mathbb{K}$  est infini, deux polynômes à coefficients dans  $\mathbb{K}$  sont égaux si, et seulement si, leur fonction polynomiale associée sont égales.

Cela est faux lorsque le corps  $\mathbb{K}$  est fini puisque dans ce cas, il y a une infinité de polynômes à coefficients dans  $\mathbb{K}$  mais seulement un nombre fini de fonctions polynomiales. Le petit théorème de Fermat donne un exemple de polynôme non-nul dont la fonction polynomiale associée est nulle :  $X^p - X$ .

## 10.1.7 Dérivation

### Définition 10.49 (Polynôme dérivé d'un polynôme)

Soit  $P \in \mathbb{K}[X]$  d'écriture canonique :

$$P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \quad \text{où : } \begin{cases} n \in \mathbb{N} \\ \forall k \in \llbracket 0 ; n \rrbracket, a_k \in \mathbb{K} \end{cases}$$

On appelle polynôme dérivé de  $P$  le polynôme :

$$P' = \sum_{k=1}^n k a_k X^{k-1}.$$

---

*Remarque 10.50 (Lien entre dérivation des polynômes et dérivation des fonctions)*

Soit  $P \in \mathbb{R}[X]$ .

La fonction polynomiale associée à  $P'$  est la dérivée de la fonction polynomiale associée à  $P$  :

$$\widetilde{P'} = (\widetilde{P})'.$$

En particulier, toute fonction polynomiale est de classe  $\mathcal{C}^\infty$ .

---

### Proposition 10.51 (Opérations algébriques sur les dérivés)

Soient  $P, Q \in \mathbb{K}[X]$  et  $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ .

*Somme : on a*

$$(P + Q)' = P' + Q'.$$

*Combinaison linéaire : on a, plus généralement*

$$(\lambda P + \mu Q)' = \lambda P' + \mu Q'.$$

*Produit : on a*

$$(PQ)' = P'Q + PQ'.$$

*Composition : on a*

$$(P \circ Q)' = Q' \times (P' \circ Q).$$

---

*Démonstration 10.52*

★★ EXERCICE ★★

■

---

**Proposition 10.53 (Formule de Leibniz pour les polynômes)**

Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Soient  $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ .

On a :

$$(PQ)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} P^{(k)} Q^{(n-k)}.$$

---

*Démonstration 10.54*

★★ **EXERCICE** ★★ (par récurrence, exactement comme on a démontré la formule de Leibniz pour les fonctions). ■

---

*Remarque 10.55*

Soient  $n \in \mathbb{N}$  et  $P_1, \dots, P_n \in \mathbb{K}[X]$ .

On a :

$$(P_1 \dots P_n)' = \sum_{k=0}^n P_1 \dots P_{k-1} P_k' P_{k+1} \dots P_n.$$

---

**Proposition 10.56 (Degré du polynôme dérivé)**

On suppose ici que  $\mathbb{K}$  est un sous-corps de  $\mathbb{C}$ .

Soit  $P \in \mathbb{K}[X]$ .

On a :

$$\deg P' = \begin{cases} \deg P - 1 & \text{si } P \text{ non-constant, c'est-à-dire si } \deg P \geq 1 \\ -\infty & \text{si } P \text{ constant, c'est-à-dire si } \deg P \leq 0 \end{cases}$$

En particulier, on a :  $P \text{ constant} \iff P' = 0$ .

---

**Proposition 10.57 (Formule de Taylor pour les polynômes)**

On suppose ici que  $\mathbb{K}$  est un sous-corps de  $\mathbb{C}$ .

Soit  $P \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$  un polynôme de degré  $n \in \mathbb{N}$ . Soit  $\lambda \in \mathbb{K}$ .

On a :

$$P = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(\lambda)}{k!} (X - \lambda)^k.$$

---

*Démonstration 10.58*

Montrons que  $\forall n \in \mathbb{N}, \forall P \in \mathbb{K}_n[X], P = \underbrace{\sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(\lambda)}{k!} (X - \lambda)^k}_{\mathcal{P}(n)}$  par récurrence sur  $n \in \mathbb{N}$ .

Soit  $P = \mu \in \mathbb{K}_0[X]$ . On a  $\begin{cases} P^{(0)}(\lambda) = \mu \\ \forall k \in \mathbb{N}^*, P^{(k)}(\lambda) = 0 \end{cases}$  donc la somme vaut  $\frac{\mu}{0!} (X - \lambda)^0 = \mu$ . D'où  $\mathcal{P}(0)$ .

Soit  $n \in \mathbb{N}$  tel que  $\mathcal{P}(n)$ . Soit  $P \in \mathbb{K}_{n+1}[X]$ . On a  $P' \in \mathbb{K}_n[X]$  donc selon  $\mathcal{P}(n)$  :

$$\begin{aligned} P' &= \sum_{k=0}^n \frac{(P')^{(k)}}{k!} (X - \lambda)^k \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k+1)}}{k!} (X - \lambda)^k \end{aligned}$$

$$\text{Donc } P' - \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k+1)}}{k!} (X - \lambda)^k = 0.$$

$$\text{Donc } \left( P - \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k+1)}}{(k+1)!} (X - \lambda)^{k+1} \right)' = 0.$$

Donc le polynôme  $Q = P - \sum_{\ell=1}^{n+1} \frac{P^{(\ell)}}{\ell!} (X - \lambda)^\ell$  est constant.

$$\text{Or } Q(\lambda) = P(\lambda) - 0 \text{ donc } P - \sum_{\ell=1}^{n+1} \frac{P^{(\ell)}}{\ell!} (X - \lambda)^\ell = P(\lambda) = \frac{P^{(0)}}{0!} (X - \lambda)^0.$$

D'où  $\mathcal{P}(n+1)$ .

D'où  $\forall n \in \mathbb{N}, \mathcal{P}(n)$ . ■

## 10.2 Arithmétique des polynômes

### 10.2.1 Idéal d'un anneau commutatif

---

**Définition 10.59 (Idéal d'un anneau commutatif)**

Soit  $(A, +, \times)$  un anneau commutatif.

On appelle idéal de  $A$  toute partie  $I \subseteq A$  telle que :

- (1)  $I$  est un sous-groupe de  $(A, +)$ .

$$(2) \quad \forall a \in A, \quad \forall x \in I, \quad ax \in I.$$

---

**Proposition 10.60**

Soit  $(A, +, \times)$  un anneau commutatif. Soit  $I \subseteq A$ .

Alors la partie  $I$  est un idéal de  $A$  si, et seulement si, elle vérifie :

$$(3) \quad 0_A \in I.$$

$$(4) \quad \forall x, y \in I, \quad x + y \in I.$$

$$(5) \quad \forall a \in A, \quad \forall x \in I, \quad ax \in I.$$

---

*Démonstration 10.61*



Supposons (1) et (2).

Alors on a (3) et (4) car  $I$  est un sous-groupe de  $A$  et on a (5) car on a (2).



Supposons (3), (4) et (5).

Alors (1) est vraie selon (3) et (4) et (2) est vraie selon (5). ■

---

*Exemple 10.62*

Soit  $(A, +, \times)$  un anneau commutatif dont on note  $0_A$  l'élément neutre pour la loi  $+$ .

Le singleton  $\{0\}$  et l'ensemble en  $A$  tout-entier sont des idéaux de l'anneau commutatif  $A$ .

On appelle ces idéaux les idéaux triviaux de  $A$ .

---

*Exemple 10.63*

Soient  $(A, +, \times)$  et  $a \in A$ .

L'ensemble des multiples de  $a$  :

$$aA = \{b \in A \mid \exists c \in A, \quad b = ca\}$$

est un idéal de  $A$ .



---

*Démonstration 10.64*

On a  $0 \in aA$  car  $0 = 0 \times a$ .

Si  $x, y \in A$ , il existe  $b, c \in A$  tels que  $x = ba$  et  $y = ca$ .

Donc  $x + y = (b + c)a \in aA$ .

Si  $x \in aA$  et  $b \in A$ , il existe  $c \in A$  tel que  $x = ac$  et on a  $bx = (bc)a \in aA$ . ■

---

*Exemple 10.65*

Les idéaux de l'anneau  $(\mathbb{Z}, +, \times)$  sont les sous-groupes du groupe  $(\mathbb{Z}, +)$ .

---

*Démonstration 10.66*

Tout idéal de  $\mathbb{Z}$  est un sous-groupe de  $\mathbb{Z}$ .

Réciproquement, si  $H$  est un sous-groupe de  $\mathbb{Z}$  :

Soit  $h \in H$ .

On a  $-h \in H$  et  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $\begin{cases} nh \in H \\ -nh \in H \end{cases}$  donc  $\forall n \in \mathbb{Z}$ ,  $nh \in H$ .

Donc  $H$  est un idéal de  $\mathbb{Z}$ . ■

---

*Exemple 10.67*

Soient  $(A, +, \times)$  et  $(B, +, \times)$  deux anneaux et  $\varphi : A \longrightarrow B$  un morphisme d'anneaux.

On suppose que l'anneau  $A$  est commutatif.

On note  $0_B$  l'élément neutre de  $B$  pour la loi  $+$ .

On appelle noyau du morphisme d'anneaux  $\varphi$  le noyau de  $\varphi$  vu comme un morphisme de groupes de  $(A, +)$  vers  $(B, +)$ , c'est-à-dire :

$$\ker \varphi = \varphi^{-1}(\{0_B\}) = \{x \in A \mid \varphi(x) = 0_B\}.$$

Alors  $\ker \varphi$  est un idéal de  $A$ .

---

*Démonstration 10.68*

On sait que  $\ker \varphi$  est un sous-groupe de  $(A, +)$ .

De plus, si  $a \in A$  et  $x \in \ker \varphi$ , alors  $\varphi(ax) = \varphi(a)\varphi(x) = \varphi(a) \times 0 = 0$ .

Donc  $ax \in \ker \varphi$ .

Donc  $\ker \varphi$  est un idéal de  $A$ . ■

---

**Proposition 10.69 (Intersection d'idéaux)**

Soient  $(A, +, \times)$  un anneau commutatif et  $(I_j)_{j \in J}$  une famille d'idéaux de  $A$ .

Alors l'intersection  $\bigcap_{j \in J} I_j$  est un idéal de  $A$ .

---

*Démonstration 10.70*

Pour tout  $j \in J$ ,  $I_j$  est un sous-groupe de  $(A, +)$  donc  $\bigcap_{j \in J} I_j$  est un sous-groupe de  $(A, +)$ .

Soient  $a \in A$  et  $x \in \bigcap_{j \in J} I_j$ .

On a  $\forall j \in J$ ,  $ax \in I_j$  car  $x \in I_j$  et  $I_j$  est un idéal de  $A$ .

Donc  $ax \in \bigcap_{j \in J} I_j$ .

Donc  $\bigcap_{j \in J} I_j$  est un idéal de  $A$ . ■

---

**Définition/Proposition 10.71 (Somme d'idéaux)**

Soient  $(A, +, \times)$  un anneau commutatif et  $I_1, I_2$  deux idéaux de  $A$ .

On appelle somme de  $I_1$  et  $I_2$  et on note  $I_1 + I_2$  l'ensemble :

$$\begin{aligned} I_1 + I_2 &= \{x \in A \mid \exists x_1 \in I_1, \exists x_2 \in I_2, x = x_1 + x_2\} \\ &= \{x_1 + x_2\}_{(x_1, x_2) \in I_1 \times I_2} \end{aligned}$$

On a :

- (1) L'ensemble  $I_1 + I_2$  est un idéal de  $A$ .
- (2) La loi  $+$  est une loi de composition interne sur l'ensemble des idéaux de  $A$ .
- (3) Cette loi  $+$  est associative et commutative.

---

*Démonstration 10.72 (1)*

On a  $I_1 + I_2 \subseteq A$  et  $\underbrace{0}_{\in A} = \underbrace{0}_{\in I_1} + \underbrace{0}_{\in I_2} \in I_1 + I_2$ .

Enfin, si  $x \in I_1 + I_2$  et  $a \in A$ , il existe  $x_1 \in I_1$  et  $x_2 \in I_2$  tels que  $x = x_1 + x_2$ .

D'où  $ax = \underbrace{ax_1}_{\in I_1} + \underbrace{ax_2}_{\in I_2} \in I_1 + I_2$ .

Donc  $I_1 + I_2$  est un idéal de  $A$ . ■

---

*Démonstration 10.73 (2 et 3)*

Clair car la loi  $+$  de  $A$  est associative et commutative. ■

---

**Théorème 10.74 (Idéaux de  $\mathbb{Z}$ )**

*Les idéaux de l'anneau commutatif  $(\mathbb{Z}, +, \times)$  sont les ensembles de la forme  $n\mathbb{Z}$  où  $n \in \mathbb{N}$ .*

---

*Démonstration 10.75*

On a vu à l'Exemple 10.65 que les idéaux de  $\mathbb{Z}$  sont ses sous-groupes donc le théorème n'est qu'un reformulation de la description des sous-groupes de  $\mathbb{Z}$  (cf. Théorème 8.21). ■

---

**Théorème 10.76 (Idéaux de  $\mathbb{K}[X]$ )**

*Les idéaux de l'anneau commutatif  $(\mathbb{K}[X], +, \times)$  sont les ensembles de la forme  $\mathbb{K}[X]P$  où  $P \in \mathbb{K}[X]$ , c'est-à-dire les idéaux formés des multiples d'un polynôme donné.*

---

*Démonstration 10.77*

$\supseteq$

On a déjà vu que pour tout  $P \in \mathbb{K}[X]$ ,  $\mathbb{K}[X]P$  est un idéal de  $\mathbb{K}[X]$  (Exemple 10.63).

$\subseteq$

Soit  $I$  un idéal de  $\mathbb{K}[X]$ .

Si  $I = \{0\}$  alors  $I = \mathbb{K}[X]P$  en prenant  $P = 0$ .

On suppose  $I \neq \{0\}$ .

On a  $I \setminus \{0\} \neq \emptyset$  donc  $\{\deg P\}_{P \in I \setminus \{0\}}$  est une partie non-vide de  $\mathbb{N}$ .

Soit  $P \in I \setminus \{0\}$  tel que  $\deg P$  soit minimal (c'est-à-dire tel que  $\forall Q \in I \setminus \{0\}, \deg P \leq \deg Q$ ).

Montrons que  $I = \mathbb{K}[X]P$ .

$\supseteq$  On a  $\forall Q \in \mathbb{K}[X], QP \in I$  donc  $\mathbb{K}[X]P \subseteq I$ .

$\subseteq$

Soit  $A \in I$ .

On note  $Q$  et  $R$  le quotient et le reste de la division euclidienne de  $A$  par  $P$ .

$$\text{On a } \begin{cases} A = QP + R \\ \deg R < \deg P \end{cases}$$

On a  $R \in I$  car  $R = A - QP$  et  $A, P \in I$ .

Donc  $R = 0$  car  $\deg R < \deg P$ .

Donc  $A = QP \in \mathbb{K}[X]P$ . ■

---

*Remarque 10.78 (Hors-programme)*

Soit  $(A, +, \times)$  un anneau commutatif.

On appelle idéal principal de  $A$  tout idéal de la forme  $aA$  où  $a \in A$ , c'est-à-dire tout idéal formé des multiples d'un élément de  $A$  (cf. Exemple 10.63).

On dit que  $A$  est un anneau principal si  $A$  est un anneau intègre et si tout idéal de  $A$  est principal.

On peut résumer le Théorème 10.74 et le Théorème 10.76 en disant que les anneaux  $\mathbb{Z}$  et  $\mathbb{K}[X]$  sont des anneaux principaux.

## 10.2.2 PGCD

L'étude du PGCD de deux polynômes dans  $\mathbb{K}[X]$  se fait exactement de la même façon que celle du PGCD de deux entiers dans  $\mathbb{Z}$  (et, plus généralement, on pourrait traiter de la même façon le PGCD de deux éléments dans un anneau principal).

Afin d'alléger l'exposé, on se contente de la preuve algébrique de l'existence du PGCD et de la relation de Bézout, mais on aurait aussi pu en donner, comme pour les entiers, une preuve algorithmique basée sur l'algorithme d'Euclide.

### 10.2.2.1 PGCD de deux polynômes

---

#### Définition/Théorème 10.79

Soient  $A, B \in \mathbb{K}[X]$ .

On rappelle qu'on note  $\text{div}(A)$  l'ensemble des diviseurs de  $A$  nuls ou unitaires.

Les diviseurs nuls ou unitaires communs à  $A$  et  $B$  sont les éléments de l'ensemble  $\text{div}(A) \cap \text{div}(B)$ .

On munit cet ensemble de la relation d'ordre  $|$  (la divisibilité est bien une relation d'ordre sur cet ensemble selon la Proposition 10.35).

L'ensemble  $\text{div}(A) \cap \text{div}(B)$  possède un plus grand élément appelé le plus grand diviseur commun à  $A$  et  $B$  et noté  $A \wedge B$ .

---

#### Démonstration 10.80

L'ensemble  $\mathbb{K}[X]A + \mathbb{K}[X]B$  est un idéal de  $\mathbb{K}[X]$  donc il existe  $D_1 \in \mathbb{K}[X]$  tel que  $\mathbb{K}[X]A + \mathbb{K}[X]B = \mathbb{K}[X]D_1$ .

$$\text{Posons } D = \begin{cases} D_1 & \text{si } D_1 = 0 \\ \frac{1}{\lambda}D_1 & \text{sinon, en notant } \lambda \text{ le coefficient dominant de } D_1 \end{cases}$$

Ainsi, on a  $\begin{cases} D \text{ nul ou unitaire} \\ \mathbb{K}[X] A + \mathbb{K}[X] B = \mathbb{K}[X] D \end{cases}$

On a  $A = 1A + 0B \in \mathbb{K}[X] A + \mathbb{K}[X] B$  donc  $A \in \mathbb{K}[X] D$  donc  $D \mid A$ .

On montre de même  $D \mid B$ .

Soit  $C \in \mathbb{K}[X]$  divisant  $A$  et  $B$ .

Soient  $C_1, C_2 \in \mathbb{K}[X]$  tels que  $CC_1 = A$  et  $CC_2 = B$ .

On a  $D \in \mathbb{K}[X] D$  donc  $D \in \mathbb{K}[X] A + \mathbb{K}[X] B$ .

Soient  $U, V \in \mathbb{K}[X]$  tels que  $UA + VB = D$ .

On a  $D = UCC_1 + VCC_2 = C(UC_1 + VC_2)$ .

Donc  $C \mid D$ .

Donc  $D$  est le plus grand élément de  $\text{div}(A) \cap \text{div}(B)$  pour  $\mid$ . ■

#### Exemple 10.81

Posons  $A = X^2 - 1$  et  $B = X^2 - X$ .

Alors  $A \wedge B = X - 1$ .

#### Démonstration 10.82

On a  $A = (X - 1)(X + 1)$  et  $B = (X - 1)X$ .

Donc  $X - 1$  divise  $A$  et  $B$ .

De plus,  $X - 1$  est unitaire.

Quels sont les diviseurs unitaires de  $A$  ?

analyse

Soient  $A_1 \in \mathbb{K}[X]$  un diviseur de  $A$  et  $A_2 \in \mathbb{K}[X]$  tel que  $A_1 A_2 = A$ .

On a  $\deg A_1 + \deg A_2 = \deg A$  et  $\begin{cases} A_1 \neq 0 \\ A_2 \neq 0 \end{cases}$

Donc  $\deg A_1 \in \{0 ; 1 ; 2\}$ .

Si  $\deg A_1 = 0$  alors  $A_1$  est constant et non-nul.

Si  $\deg A_1 = 1$  alors  $A_1$  admet une unique racine qui doit être racine de  $A$ , i.e. 1 ou  $-1$ .

Si  $\deg A_1 = 2$  alors  $A_2$  est constant et non-nul, donc  $A_1$  est associé à  $A$ .

Si, de plus,  $A_1$  est unitaire, alors  $A_1 = 1$ ,  $A_1 = X - 1$ ,  $A_1 = X + 1$  ou  $A_1 = X^2 - 1$ .

### synthèse

Ces quatre polynômes divisent  $A$  et sont unitaires.

### conclusion

On a  $\operatorname{div}(A) = \{1; X-1; X+1; X^2-1\}$ .

De même, on a  $\operatorname{div}(B) = \{1; X-1; X; X^2-X\}$ .

Donc  $\operatorname{div}(A) \cap \operatorname{div}(B) = \{1; X-1\}$ .

Donc  $A \wedge B = X-1$ . ■

### Remarque 10.83

Soit  $A \in \mathbb{K}[X]$ .

On a  $A \wedge 1 = 1$ .

Si  $A = 0$  alors  $A \wedge 0 = 0$ ; sinon  $A \wedge 0$  est l'unique polynôme unitaire associé à  $A$ .

### Remarque 10.84

Soient  $A, B \in \mathbb{K}[X]$ .

(1) Le polynôme  $A \wedge B$  est le diviseur commun à  $A$  et  $B$  nul ou unitaire et qui est divisible par tous les autres diviseurs communs à  $A$  et  $B$ .

(2) Il est donc caractérisé par :

$$A \wedge B \text{ nul ou unitaire} \quad \text{et} \quad \operatorname{div}(A) \cap \operatorname{div}(B) = \operatorname{div}(A \wedge B)$$

ou par :

$$A \wedge B \text{ nul ou unitaire} \quad \text{et} \quad \forall P \in \mathbb{K}[X], P \mid A \wedge B \iff [P \mid A \text{ et } P \mid B].$$

(3) Si  $A = B = 0$  alors  $0 \wedge 0 = 0$ .

Sinon,  $A \wedge B$  est le polynôme unitaire du plus haut degré qui divise  $A$  et  $B$  (selon la Proposition 10.32).

### Démonstration 10.85 (2)

Soit  $P \in \mathbb{K}[X]$ .

Montrons qu'on a  $P \mid A \wedge B \iff [P \mid A \text{ et } P \mid B]$ .

$\implies$  Si  $P \mid A \wedge B$  alors  $P \mid A$  car  $A \wedge B \mid A$  et  $P \mid B$  car  $A \wedge B \mid B$ .

$\impliedby$

Supposons  $P \mid A$  et  $P \mid B$ .

On pose  $P_1$  le polynôme nul ou unitaire associé à  $P$  :

$$P_1 = \begin{cases} P_1 = 0 & \text{si } P = 0 \\ P_1 = \frac{1}{\lambda}P & \text{en notant } \lambda \text{ le coefficient dominant de } P \end{cases}$$

On a  $P_1 \mid P$ ,  $P \mid A$  et  $P \mid B$ .

Donc  $P_1 \mid A$  et  $P_1 \mid B$ .

Donc  $P_1 \mid A \wedge B$ .

Donc  $P \mid A \wedge B$ . ■

*Remarque 10.86*

Soient  $A, B \in \mathbb{K}[X]$ .

Le polynôme  $A \wedge B$  est nul si, et seulement si, on a  $A = B = 0$ .

Si  $A$  ou  $B$  est non-nul, on impose systématiquement au polynôme  $A \wedge B$  d'être unitaire.

En revanche, on s'autorise parfois à appeler « plus grand commun diviseur de  $A$  et  $B$  » tout polynôme  $P$  associé à  $A$  et  $B$ , même s'il n'est pas unitaire.

Ainsi, on dit que  $2X - 2$  est un PGCD de  $X^2 - 1$  et  $X^2 - X$ .

### 10.2.2.2 Propriétés

#### **Proposition 10.87**

Soient  $A, B, P \in \mathbb{K}[X]$ .

Les polynômes  $PA \wedge PB$  et  $P \times (A \wedge B)$  sont associés.

*Démonstration 10.88*

Montrons que  $P \times (A \wedge B)$  divise  $PA \wedge PB$ .

On a  $A \wedge B$  divise  $A$  et  $B$ .

Donc  $P \times (A \wedge B)$  divise  $PA$  et  $PB$ .

Donc  $P \times (A \wedge B)$  divise  $PA \wedge PB$ .

Montrons que  $PA \wedge PB$  divise  $P \times (A \wedge B)$ .

On a  $P$  divise  $PA$  et  $PB$ .

Donc  $P$  divise  $PA \wedge PB$ .

Soit  $Q \in \mathbb{K}[X]$  tel que  $PA \wedge PB = PQ$ .

On remarque que  $PQ$  divise  $PA$  et  $PB$ .

Donc, en supposant que  $P \neq 0$ , on a  $Q$  divise  $A$  et  $B$ .

Donc  $Q$  divise  $A \wedge B$ .

Donc  $PA \wedge PB = PQ$  divise  $P \times (A \wedge B)$ .

Ceci est également vrai si  $P = 0$ .

Finalement, comme les deux polynômes se divisent mutuellement, ils sont associés. ■

---

**Définition/Proposition 10.89 (Relation de Bézout)**

Soient  $A, B \in \mathbb{K}[X]$ .

Il existe  $U, V \in \mathbb{K}[X]$  tels que

$$UA + VB = A \wedge B.$$

Une telle écriture s'appelle une relation de Bézout.

Elle n'est pas unique.

---

*Démonstration 10.90*

On a vu que  $\mathbb{K}[X]A + \mathbb{K}[X]B = \mathbb{K}[X](A \wedge B)$ .

On a  $A \wedge B \in \mathbb{K}[X](A \wedge B)$  donc  $A \wedge B \in \mathbb{K}[X]A + \mathbb{K}[X]B$ .

Donc il existe  $U, V \in \mathbb{K}[X]$  tels que  $A \wedge B = UA + VB$ .

Ces polynômes ne sont pas unique car si  $(U, V)$  convient,  $(U + B, V + A)$  convient aussi. ■

### 10.2.2.3 Algorithme d'Euclide

Les deux lemmes suivants servent à justifier l'algorithme d'Euclide.

---

**Lemme 10.91**

Soient  $A, B \in \mathbb{K}[X]$  tels que  $B \neq 0$ .

On note  $R$  le reste de la division euclidienne de  $A$  par  $B$ .

Alors

$$A \wedge B = R \wedge B.$$



---

*Démonstration 10.92*

C'est clair car les polynômes qui divisent  $A$  et  $B$  sont ceux qui divisent  $R$  et  $B$ . ■

---

**Lemme 10.93**

Soient  $A, B \in \mathbb{K}[X]$ .

On définit le polynôme  $A_1$  en posant :

- si  $A = 0$  alors  $A_1 = 0$  ;
- sinon  $A_1$  est l'unique polynôme unitaire associé à  $A$ .

On a :

$$A \wedge B = A_1 \iff A \mid B.$$

---

*Démonstration 10.94*

$\Rightarrow$

Comme  $A$  et  $A_1$  sont associés, ils se divisent mutuellement.

On a  $A \mid A_1$  et  $A_1 = A \wedge B \mid B$ .

D'où  $A \mid B$ .

$\Leftarrow$

Supposons  $A \mid B$ .

Alors les diviseurs communs à  $A$  et  $B$  sont les diviseurs de  $A$ , c'est-à-dire les diviseurs de  $A_1$ .

Donc  $A \wedge B = A_1$ . ■

---

**Algorithme 10.95 (Algorithme d'Euclide)**

Cf. Algorithme 8.37.

---

**Algorithme 10.96 (Algorithme d'Euclide étendu)**

Cf. Algorithme 8.46 (même principe).

#### 10.2.2.4 PGCD de plusieurs polynômes

---

##### Proposition 10.97

La loi  $\wedge$  est une loi de composition interne sur  $\mathbb{K}[X]$ .

Elle est associative et commutative.

---

*Démonstration 10.98*

★★ Exercice ★★ (cf. Démonstration 8.49). ■

---

##### Définition/Proposition 10.99

Soient  $r \in \mathbb{N}^*$  et  $A_1, \dots, A_r \in \mathbb{K}[X]$ .

Les diviseurs communs à  $A_1, \dots, A_r$  sont les diviseurs du polynôme  $A_1 \wedge \dots \wedge A_r$ .

Ce polynôme est appelé le plus grand commun diviseur des polynômes  $A_1, \dots, A_r$ .

---

*Démonstration 10.100*

★★ Exercice ★★ ■

---

##### Proposition 10.101

Soient  $r \in \mathbb{N}^*$  et  $A_1, \dots, A_r, P \in \mathbb{K}[X]$ .

Les polynômes  $PA_1 \wedge \dots \wedge PA_r$  et  $P \times (A_1 \wedge \dots \wedge A_r)$  sont associés.

---

*Démonstration 10.102*

Découle de la Proposition 10.87 par récurrence sur  $r \in \mathbb{N}^*$ . ■

---

##### Définition/Proposition 10.103 (Relation de Bézout pour $r \in \mathbb{N}^*$ polynômes)

Soient  $r \in \mathbb{N}^*$  et  $A_1, \dots, A_r \in \mathbb{K}[X]$ .

Alors il existe  $U_1, \dots, U_r \in \mathbb{K}[X]$  tels que

$$U_1 A_1 + \dots + U_r A_r = A_1 \wedge \dots \wedge A_r.$$

Une telle écriture est appelée une relation de Bézout. Elle n'est pas unique.

---

*Démonstration 10.104*

On raisonne par récurrence sur  $r \in \llbracket 2 ; +\infty \rrbracket$ .

Pour tout  $r \geq 2$ , on note  $\mathcal{P}(r)$  la proposition

$$\forall A_1, \dots, A_r \in \mathbb{K}[X], \exists U_1, \dots, U_r \in \mathbb{K}[X], U_1 A_1 + \dots + U_r A_r = A_1 \wedge \dots \wedge A_r.$$

D'après la Définition/Proposition 10.89, on a  $\mathcal{P}(2)$ .

Soit  $r \in \llbracket 2 ; +\infty \rrbracket$  tel que  $\mathcal{P}(r)$ .

Soient  $A_1, \dots, A_{r+1} \in \mathbb{K}[X]$ .

Selon  $\mathcal{P}(r)$ , il existe  $U_1, \dots, U_r \in \mathbb{K}[X]$  tels que  $U_1 A_1 + \dots + U_r A_r = A_1 \wedge \dots \wedge A_r$ .

Selon  $\mathcal{P}(2)$ , il existe  $U, V \in \mathbb{K}[X]$  tels que  $U \times (A_1 \wedge \dots \wedge A_r) + V A_{r+1} = (A_1 \wedge \dots \wedge A_r) \wedge A_{r+1}$ .

Finalement :

$$UU_1 A_1 + \dots + UU_r A_r + V A_{r+1} = A_1 \wedge \dots \wedge A_{r+1}.$$

D'où  $\mathcal{P}(r+1)$ .

Donc on a  $\forall r \in \llbracket 2 ; +\infty \rrbracket, \mathcal{P}(r)$ . ■

## 10.2.3 Polynômes premiers entre eux

Les démonstrations sont laissées en exercice (*cf.* 8.3).

### 10.2.3.1 Cas de deux polynômes

---

#### Définition 10.105 (Polynômes premiers entre eux)

Deux polynômes  $A, B \in \mathbb{K}[X]$  sont dits premiers entre eux s'ils vérifient

$$A \wedge B = 1.$$

Cela signifie que leurs seuls diviseurs communs sont les polynômes inversibles.

---

#### Théorème 10.106 (Théorème de Bézout)

Soient  $A, B \in \mathbb{K}[X]$ .

On a

$$A \text{ et } B \text{ sont premiers entre eux} \iff \exists U, V \in \mathbb{K}[X], UA + VB = 1.$$

---

**Lemme 10.107 (Lemme de Gauss)**

Soient  $A, B, P \in \mathbb{K}[X]$ .

On suppose

$$P \mid AB \quad \text{et} \quad P \wedge B = 1.$$

Alors

$$P \mid A.$$

---

**Proposition 10.108**

Soient  $A, B, P \in \mathbb{K}[X]$ .

On suppose

$$A \wedge P = 1 \quad \text{et} \quad B \wedge P = 1.$$

Alors

$$P \wedge AB = 1.$$

---

**Corollaire 10.109**

Soient  $r \in \mathbb{N}^*$  et  $A_1, \dots, A_r \in \mathbb{K}[X]$ .

On suppose

$$\forall k \in \llbracket 1 ; r \rrbracket, \quad A_k \wedge P = 1.$$

Alors

$$P \wedge A_1 \dots A_r = 1.$$

---

**Proposition 10.110**

Soient  $A, B, P \in \mathbb{K}[X]$ .

On suppose

$$A \mid P \quad \text{et} \quad B \mid P \quad \text{et} \quad A \wedge B = 1.$$

Alors

$$AB \mid P.$$

### 10.2.3.2 Cas de plusieurs polynômes

---

**Définition 10.111**

Soient  $r \in \mathbb{N}^*$  et  $A_1, \dots, A_r \in \mathbb{K}[X]$ .

On dit que les polynômes  $A_1, \dots, A_r$  sont premiers entre eux deux à deux si on a

$$\forall i, j \in \llbracket 1 ; r \rrbracket, i \neq j \implies A_i \wedge A_j = 1.$$

On dit que les polynômes  $A_1, \dots, A_r$  sont premiers entre eux dans leur ensemble si

$$A_1 \wedge \dots \wedge A_r = 1.$$

---

*Remarque 10.112*

Soient  $r \in \llbracket 2 ; +\infty \rrbracket$  et  $A_1, \dots, A_r \in \mathbb{K}[X]$ .

La proposition «  $A_1, \dots, A_r$  sont premiers entre eux deux à deux » implique la proposition «  $A_1, \dots, A_r$  sont premiers entre eux dans leur ensemble ».

L'implication réciproque est fausse.

## 10.2.4 PPCM

### 10.2.4.1 PPCM de deux polynômes

---

**Définition/Proposition 10.113**

Soient  $A, B \in \mathbb{K}[X]$ .

Notons  $\mathcal{U}$  l'ensemble des polynômes de  $\mathbb{K}[X]$  nuls ou unitaires.

On a vu que la relation  $|$  est une relation d'ordre sur cet ensemble (*cf.* Proposition 10.35).

Dans cet ensemble ordonné  $(\mathcal{U}, |)$ , il existe un plus petit multiple commun à  $A$  et  $B$ , c'est-à-dire un polynôme  $A \vee B \in \mathbb{K}[X]$  tel que

$$A \vee B \in \mathcal{U} \quad \text{et} \quad \begin{cases} A \mid A \vee B \\ B \mid A \vee B \end{cases} \quad \text{et} \quad \forall M \in \mathbb{K}[X], \quad \begin{cases} A \mid M \\ B \mid M \end{cases} \implies A \vee B \mid M.$$

Ce polynôme  $A \vee B$  est appelé le plus petit commun multiple de  $A$  et  $B$ .

---

*Démonstration 10.114*

Posons  $I = \mathbb{K}[X] A \cap \mathbb{K}[X] B$ .

$I$  est un idéal de  $\mathbb{K}[X]$  car c'est l'intersection de deux idéaux.

Soit  $P \in \mathbb{K}[X]$  tel que  $I = \mathbb{K}[X] P$ .

Quitte à multiplier  $P$  par un élément non-nul de  $\mathbb{K}$ , on peut supposer  $P \in \mathcal{U}$ .

On a  $P \in \mathbb{K}[X] A$  donc  $A \mid P$  et  $P \in \mathbb{K}[X] B$  donc  $B \mid P$ .

Soit  $M \in \mathbb{K}[X]$  tel que 
$$\begin{cases} A \mid M \\ B \mid M \end{cases}$$

On a  $M \in \mathbb{K}[X] A$  et  $M \in \mathbb{K}[X] B$  donc  $M \in I$ .

Donc  $P \mid M$ . ■

---

*Exemple 10.115*

On pose  $A = X^2 - 1$  et  $B = X^2 - X$ .

Alors  $A \vee B = X^3 - X$ .

---

*Démonstration 10.116*

On a  $X^3 - X$  unitaire.

$X^3 - X$  est un multiple commun à  $A$  et  $B$  car  $X^3 - X = X(X^2 - 1) = (X + 1)(X^2 - X)$ .

Soit  $M \in \mathbb{K}[X]$  tel que  $A \mid M$  et  $B \mid M$ .

On a 
$$\begin{cases} (X + 1)(X - 1) \mid M \\ X(X - 1) \mid M \end{cases} \quad \text{donc} \quad \begin{cases} X + 1 \mid M \\ X(X - 1) \mid M \end{cases}$$

De plus, on a  $(X + 1) \wedge (X^2 - X) = 1$  car  $(X - 2)(X + 1) - (X^2 - X) = 2$ .

Donc  $(X + 1)X(X - 1) \mid M$ .

Donc  $X(X - 1)(X + 1) = X^3 - X = A \vee B$ . ■

---

*Remarque 10.117*

Soit  $A \in \mathbb{K}[X]$ .

On a  $A \vee 0 = 0$ .

Si  $A \neq 0$  alors  $A \vee 1 = 0$ . Sinon,  $A \vee 1$  est l'unique polynôme unitaire associé à  $A$ .

---

*Remarque 10.118*

Soient  $A, B \in \mathbb{K}[X]$ .

Le PPCM de  $A$  et  $B$  est le multiple commun à  $A$  et  $B$  nul ou unitaire et qui divise tous les autres multiples communs à  $A$  et  $B$ .

Il est donc caractérisé par :

$$A \vee B \text{ nul ou unitaire} \quad \text{et} \quad \mathbb{K}[X] A \cap \mathbb{K}[X] B = \mathbb{K}[X] (A \vee B)$$

ou par

$$A \vee B \text{ nul ou unitaire} \quad \text{et} \quad \forall P \in \mathbb{K}[X], \quad A \vee B \mid P \iff [A \mid P \text{ et } B \mid P].$$

Si  $A = 0$  ou  $B = 0$  alors  $A \vee B = 0$ .

Sinon,  $A \vee B$  est le polynôme unitaire de plus bas degré qui est multiple de  $A$  et  $B$  (selon la Proposition 10.32).

---

*Remarque 10.119*

Soient  $A, B \in \mathbb{K}[X]$ .

Le polynôme  $A \vee B$  est nul si, et seulement si, on a  $A = B = 0$ .

Si  $A$  ou  $B$  est non-nul, on impose systématiquement au polynôme noté  $A \vee B$  d'être unitaire.

En revanche, on s'autorise parfois à appeler « plus petit commun multiple de  $A$  et  $B$  » tout polynôme  $P$  associé à  $A \vee B$ , même s'il n'est pas unitaire.

Ainsi, on dit que  $2X^3 - 2X$  est un PPCM de  $X^2 - 1$  et  $X^2 - X$ .

---

*Remarque 10.120*

Soient  $A, B \in \mathbb{K}[X]$ .

On définit le polynôme  $A_1$  en posant :

- si  $A = 0$  alors  $A_1 = 0$  ;
- si  $A \neq 0$  alors  $A_1$  est l'unique polynôme unitaire associé à  $A$ .

On a

$$A \vee B = A_1 \iff B \mid A.$$

---

**Proposition 10.121**

Soient  $A, B, P \in \mathbb{K}[X]$ .

Les polynômes  $PA \vee PB$  et  $P \times (A \vee B)$  sont associés.

---

*Démonstration 10.122*

Si  $P = 0$ , la proposition est vraie.

Supposons  $P \neq 0$ .

Montrons que  $PA \vee PB$  divise  $P \times (A \vee B)$ .

On a  $A$  et  $B$  divisent  $A \vee B$ .

Donc  $PA$  et  $PB$  divisent  $P \times (A \vee B)$ .

Donc  $PA \vee PB$  divise  $P \times (A \vee B)$ .

Montrons que  $P \times (A \vee B)$  divise  $PA \vee PB$ .

On remarque que  $P$  divise  $PA \vee PB$  (car  $P \mid PA \mid PA \vee PB$ ).

Soit  $M \in \mathbb{K}[X]$  tel que  $MP = PA \vee PB$ .

On a  $PA$  et  $PB$  divisent  $MP$ .

Comme  $P \neq 0$ , on en déduit  $A$  et  $B$  divisent  $M$ .

Donc  $A \vee B$  divise  $M$ .

Donc  $P \times (A \vee B)$  divise  $PM$ .

Donc  $P \times (A \vee B)$  divise  $PA \vee PB$ .

Conclusion : les polynômes  $PA \vee PB$  et  $P \times (A \vee B)$  sont associés. ■

---

### **Proposition 10.123**

*Soient  $A, B \in \mathbb{K}[X]$ .*

*Les polynômes  $(A \vee B)(A \wedge B)$  et  $AB$  sont associés.*

---

*Démonstration 10.124*

★★ Exercice ★★ ■

#### **10.2.4.2 PPCM de plusieurs polynômes**

---

### **Proposition 10.125**

*La loi  $\vee$  est une loi de composition interne sur  $\mathbb{K}[X]$ .*

*Elle est associative et commutative.*



---

Démonstration 10.126

★★ Exercice ★★

■

---

**Définition/Proposition 10.127**

Soient  $r \in \mathbb{N}^*$  et  $A_1, \dots, A_r \in \mathbb{K}[X]$ .

Les diviseurs communs à  $A_1, \dots, A_r$  sont les diviseurs du polynôme  $A_1 \vee \dots \vee A_r$ .

Ce polynôme et ses polynômes associés sont appelés les plus petits communs multiples des polynômes  $A_1, \dots, A_r$ .

---

Démonstration 10.128

★★ Exercice ★★

■

---

**Proposition 10.129**

Soient  $r \in \mathbb{N}^*$  et  $A_1, \dots, A_r, P \in \mathbb{K}[X]$ .

Les polynômes  $PA_1 \vee \dots \vee PA_r$  et  $P \times (A_1 \vee \dots \vee A_r)$  sont associés.

---

Démonstration 10.130

Découle de la Proposition 10.121 par récurrence sur  $r \in \mathbb{N}^*$ .

■

## 10.2.5 Polynômes irréductibles

### 10.2.5.1 Définition

---

**Définition 10.131 (Polynôme irréductible)**

Un polynôme  $P \in \mathbb{K}[X]$  est dit irréductible sur  $\mathbb{K}$  ou dans  $\mathbb{K}[X]$  s'il est non-constant et s'il n'est pas le produit de deux polynômes non-constants :

$$\begin{cases} P \text{ non-constant} \\ \forall Q_1, Q_2 \in \mathbb{K}[X], P = Q_1 Q_2 \implies [Q_1 \text{ constant ou } Q_2 \text{ constant}] \end{cases}$$

On a donc

$$\forall P \in \mathbb{K}[X], P \text{ irréductible} \iff [P \notin \mathbb{K} \text{ et } \text{div}(P) = \{1; P_1\}]$$

avec  $P_1$  l'unique polynôme unitaire associé à  $P$ .

---

Démonstration 10.132

$\Rightarrow$

Supposons  $P$  irréductible.

Alors  $P \notin \mathbb{K}$  (en particulier,  $P \neq 0$ ).

Déterminons  $\text{div}(P)$  :

analyse

Soit  $D \in \text{div}(P)$ .

On a  $D \neq 0$  car  $P \neq 0$  donc  $D$  est unitaire.

Soit  $Q \in \mathbb{K}[X]$  tel que  $P = QD$ .

Si  $D$  est constant alors  $D = 1$  car  $D$  est unitaire.

Si  $Q$  est constant alors  $Q$  est constant et non-nul (car  $P \neq 0$ ) donc  $D$  est unitaire et associé à  $P$  donc  $D = P_1$ .

synthèse 1 et  $P_1$  divisent  $P$  et sont irréductibles.

conclusion On a  $\text{div}(P) = \{1 ; P_1\}$ .

$\Leftarrow$

Supposons  $P \notin \mathbb{K}$  et  $\text{div}(P) = \{1 ; P_1\}$ .

Montrons que  $P$  est irréductible.

On a bien  $P$  non-constant.

Soient  $Q_1, Q_2 \in \mathbb{K}[X]$  tels que  $P = Q_1Q_2$ .

Comme  $P \neq 0$ , on a  $Q_1 \neq 0$  et  $Q_2 \neq 0$ .

On note  $\lambda_1$  le coefficient dominant de  $Q_1$ .

On a  $P = \left(\frac{1}{\lambda_1}Q_1\right)\lambda_1Q_2$  donc  $\frac{1}{\lambda_1}Q_1 \in \text{div}(P) = \{1 ; P_1\}$ .

Si  $\frac{1}{\lambda_1}Q_1 = 1$  alors  $Q_1$  est constant.

Si  $\frac{1}{\lambda_1}Q_1 = P_1$  alors  $Q_1$  est associé à  $P$ .

Donc  $\deg Q_1 = \deg P$ .

Or  $P = Q_1Q_2$  donc  $\deg P = \deg Q_1 + \deg Q_2$ .

Donc  $\deg Q_2 = 0$  donc  $Q_2$  est constant. ■

---

*Remarque 10.133*

On n'impose pas aux polynômes irréductibles d'être unitaires.

---

*Exemple 10.134*

- (1) Tout polynôme de degré 1 est irréductible.
- (2) Le polynôme  $P = X^2 + 1$  est irréductible sur  $\mathbb{R}$  mais pas sur  $\mathbb{C}$ .

---

*Démonstration 10.135 (1)*

Soit  $P \in \mathbb{K}[X]$  tel que  $\deg P = 1$ .

Montrons que  $P$  est irréductible.

On a  $P$  non-constant.

Soient  $Q_1, Q_2 \in \mathbb{K}[X]$  tels que  $P = Q_1 Q_2$ .

On a  $P \neq 0$  donc  $Q_1 \neq 0$  et  $Q_2 \neq 0$ .

On a  $1 = \deg P = \deg Q_1 + \deg Q_2$ .

Donc  $\deg Q_1 = 0$  ou  $\deg Q_2 = 0$ .

Donc  $Q_1$  constant ou  $Q_2$  constant.

Donc  $P$  est irréductible. ■

---

*Démonstration 10.136 (2)*

On a  $X^2 + 1 = (X - i)(X + i)$  donc  $P$  n'est pas irréductible sur  $\mathbb{C}$ .

Montrons que  $P$  est irréductible sur  $\mathbb{R}$ .

On a  $P$  non-constant.

Soient  $Q_1, Q_2 \in \mathbb{R}[X]$  tels que  $P = Q_1 Q_2$ .

On a  $2 = \deg P = \deg Q_1 + \deg Q_2$ .

Donc  $(\deg Q_1, \deg Q_2) \in \{(2, 0) ; (1, 1) ; (0, 2)\}$ .

Supposons par l'absurde  $(\deg Q_1, \deg Q_2) = (1, 1)$ .

Alors  $Q_1$  et  $Q_2$  admettent chacun une racine dans  $\mathbb{R}$ .

Donc  $P$  admet une racine dans  $\mathbb{R}$  : contradiction.

Donc  $(\deg Q_1, \deg Q_2) \in \{(2, 0) ; (0, 2)\}$ .

Donc  $Q_1$  ou  $Q_2$  est constant.

Donc  $P$  est irréductible. ■

---

*Remarque 10.137*

Soit  $P \in \mathbb{K}[X]$  irréductible.

(1) Si  $P$  admet une racine alors  $\deg P = 1$ .

(2) D'où, par contraposée : si  $\deg P \geq 2$  alors  $P$  n'admet aucune racine.

---

*Démonstration 10.138*

Montrons (1).

Supposons que  $P$  admet une racine  $\lambda \in \mathbb{K}$ .

Alors  $X - \lambda \mid P$ .

Soit  $Q \in \mathbb{K}[X]$  tel que  $(X - \lambda)Q = P$ .

Comme  $P$  est irréductible, on a  $X - \lambda$  constant ou  $Q$  constant.

Donc  $Q$  est constant.

De plus,  $Q \neq 0$  car  $P \neq 0$ .

Donc  $\deg Q = 0$  et  $\deg P = \deg(X - \lambda) + \deg Q = 1 + 0 = 1$ . ■

---

*Remarque 10.139*

Soient  $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ .

On suppose que  $P$  est irréductible.

Alors

$$P \nmid Q \iff P \wedge Q = 1.$$

### 10.2.5.2 Polynômes irréductibles sur $\mathbb{C}$ et $\mathbb{R}$

---

#### **Théorème 10.140**

*Les polynômes irréductibles dans  $\mathbb{C}[X]$  sont ceux de degré 1.*

---

*Démonstration 10.141*

$\supseteq$  On a déjà vu que tout polynôme de degré 1 est irréductible.

$\subseteq$

Soit  $P \in \mathbb{C}[X]$  irréductible.

Selon le théorème de D'Alembert-Gauss,  $P$  admet une racine car  $P$  n'est pas constant.

Donc  $\deg P = 1$  (selon la Remarque 10.137). ■

---

**Théorème 10.142**

Les polynômes irréductibles dans  $\mathbb{R}[X]$  sont ceux de degré 1 et ceux de la forme

$$aX^2 + bX + c$$

$$\text{où } \begin{cases} a, b, c \in \mathbb{R} \\ a \neq 0 \\ \Delta = b^2 - 4ac < 0 \end{cases}$$

---

Démonstration 10.143

$\supseteq$

Tout polynôme de degré 1 est irréductible.

Soient  $a, b, c \in \mathbb{R}$  tels que  $\begin{cases} a \neq 0 \\ \Delta = b^2 - 4ac < 0 \end{cases}$

Le polynôme  $P = aX^2 + bX + c$  n'admet aucune racine dans  $\mathbb{R}$ .

On a  $P$  non-constant.

Soient  $Q_1, Q_2 \in \mathbb{R}[X]$  tels que  $P = Q_1 Q_2$ .

On a  $2 = \deg P = \deg Q_1 + \deg Q_2$ .

De plus,  $\deg Q_1 \neq 1$  car sinon  $Q_1$  admettrait une racine dans  $\mathbb{R}$  et  $P$  aussi.

Donc  $(Q_1, Q_2) \in \{(0, 2); (2, 0)\}$ .

Donc  $Q_1$  ou  $Q_2$  constant.

Donc  $P$  est irréductible.

$\subseteq$

Soit  $P \in \mathbb{R}[X]$  irréductible.

On a  $P$  non-constant.

D'après le théorème de D'Alembert-Gauss, il existe une racine complexe de  $P$ .

Soit  $\lambda \in \mathbb{C}$  tel que  $P(\lambda) = 0$ .

Si  $\lambda \in \mathbb{R}$  alors  $X - \lambda \mid P$  (dans  $\mathbb{R}[X]$ ).

Soit  $Q \in \mathbb{R}[X]$  tel que  $(X - \lambda)Q = P$ .

Comme  $P$  est irréductible,  $X - \lambda$  ou  $Q$  est constant donc  $Q$  est constant.

Donc  $\deg P = 1$  car  $Q \neq 0$ .

Si  $\lambda \notin \mathbb{R}$  alors  $P(\bar{\lambda}) = 0$ .

Donc  $X - \lambda$  et  $X - \bar{\lambda}$  divisent  $P$ .

Or  $(X - \lambda) \wedge (X - \bar{\lambda}) = 1$  car  $\lambda \neq \bar{\lambda}$ .

Donc  $(X - \lambda)(X - \bar{\lambda}) \mid P$  selon la Proposition 10.110.

Donc  $X^2 - (\lambda + \bar{\lambda})X + \lambda\bar{\lambda} = X^2 - 2\operatorname{Re}(\lambda)X + |\lambda|^2 \in \mathbb{R}[X]$ .

Ainsi  $X^2 - 2\operatorname{Re}(\lambda)X + |\lambda|^2 \mid P$ .

Donc il existe  $Q \in \mathbb{R}[X]$  tel que  $(X^2 - 2\operatorname{Re}(\lambda)X + |\lambda|^2)Q = P$  avec nécessairement  $Q$  constant car  $P$  est irréductible et  $Q \neq 0$  car  $P \neq 0$ .

Finalement, on a

$$\exists a \in \mathbb{R}^*, \quad ax^2 - 2a\operatorname{Re}(\lambda)x + |\lambda|^2 a = P$$

et  $\Delta < 0$  car  $P$  n'a pas de racine réelle. ■

## 10.2.6 Théorème fondamental de l'arithmétique des polynômes

### 10.2.6.1 Cas général

Le théorème suivant affirme que tout polynôme non-constant s'écrit de façon unique comme le produit de polynômes irréductibles, à l'ordre des facteurs près et à des facteurs inversibles près :

---

#### **Théorème 10.144**

Soit  $P \in \mathbb{K}[X] \setminus \mathbb{K}$ .

Alors il existe un entier  $r \in \mathbb{N}^*$  et des polynômes irréductibles  $A_1, \dots, A_r \in \mathbb{K}[X]$  tels que

$$P = A_1 \dots A_r.$$

De plus, si l'on a une autre décomposition

$$P = B_1 \dots B_s$$

avec  $s \in \mathbb{N}^*$  et  $B_1, \dots, B_s \in \mathbb{K}[X]$  des polynômes irréductibles, alors il existe une bijection  $\sigma : \llbracket 1 ; r \rrbracket \longrightarrow \llbracket 1 ; s \rrbracket$  telle que

$$\forall k \in \llbracket 1 ; r \rrbracket, \quad A_k \text{ et } B_{\sigma(k)} \text{ sont associés.}$$

---

#### *Démonstration 10.145*

Pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , on note  $\mathcal{P}(n)$  la proposition : « tout polynôme  $P$  de degré  $n$  s'écrit comme le produit de polynômes irréductibles, de façon unique à l'ordre des facteurs près et à des constantes multiplicatives non-nulles près ».

Soit  $P \in \mathbb{K}[X]$  tel que  $\deg P = 1$ .

existence On a  $P = P$  et  $P$  est irréductible.

unicité

Soient  $B_1, \dots, B_s \in \mathbb{K}[X]$  irréductibles et tels que  $P = B_1 \dots B_s$ .

On a  $\forall j \in \llbracket 1 ; s \rrbracket$ ,  $\deg B_j \geq 1$  (car  $B_j$  est non-constant).

$$\text{Donc } 1 = \deg P = \sum_{j=1}^s \deg B_j \geq \sum_{j=1}^s 1 = s.$$

Donc  $s \leq 1$ .

De plus,  $s \neq 0$  (sinon  $P = 1$  est constant).

Donc  $s = 1$ .

Donc  $P = B_1$ .

D'où  $\mathcal{P}(1)$ .

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$  tel que  $\forall k \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$ ,  $\mathcal{P}(k)$ .

existence

Soit  $P \in \mathbb{K}[X]$  tel que  $\deg P = n + 1$ .

Si  $P$  est irréductible,  $P = P$  convient.

Supposons  $P$  non-irréductible.

Il existe  $Q_1, Q_2 \in \mathbb{K}[X]$  non-constants tels que  $P = Q_1 Q_2$ .

$$\text{On a } n + 1 = \deg P = \underbrace{\deg Q_1}_{\geq 1} + \underbrace{\deg Q_2}_{\geq 1}.$$

Donc  $\deg Q_1 \leq n$  et  $\deg Q_2 \leq n$ .

Selon l'hypothèse de récurrence,  $Q_1$  et  $Q_2$  sont produits de polynômes irréductibles donc leur produit  $P$  l'est aussi.

unicité

Soient  $r, s \in \mathbb{N}^*$  et  $A_1, \dots, A_r, B_1, \dots, B_s \in \mathbb{K}[X]$  irréductibles.

Supposons  $P = A_1 \dots A_r = B_1 \dots B_s$ .

Comme  $A_1$  est irréductible, on a

$$\forall j \in \llbracket 1 ; s \rrbracket, \left| \begin{array}{l} A_1 \mid B_j \\ \text{ou} \\ A_1 \wedge B_j = 1 \end{array} \right.$$

Si  $\forall j \in \llbracket 1 ; s \rrbracket$ ,  $A_1 \wedge B_j = 1$  alors  $A_1 \wedge (B_1 \dots B_s) = 1$  donc  $A_1 \wedge P = 1$  : contradiction car  $A_1 \mid P$ .

Donc il existe  $j \in \llbracket 1 ; s \rrbracket$  tel que  $A_1 \mid B_j$  donc  $A_1$  est associé à  $B_j$  car  $A_1$  est non-constant et  $B_j$  est

irréductible.

Soit  $\lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$  tel que  $B_j = \lambda A_1$ .

Quitte à renuméroter  $B_1, \dots, B_s$  et à remplacer  $B_1$  par  $\frac{1}{\lambda} B_1$  et  $B_2$  par  $\lambda B_2$ , on a  $A_1 = B_1$  donc

$$A_2 \dots A_r = B_2 \dots B_s$$

car  $\mathbb{K}[X]$  est intègre.

Posons  $Q = A_2 \dots A_r$ .

On a  $\deg Q \leq n$ .

Selon l'hypothèse de récurrence appliquée à  $Q$ , il existe  $\sigma : \llbracket 2 ; r \rrbracket \longrightarrow \llbracket 1 ; s \rrbracket$  une bijection telle que

$$\forall i \in \llbracket 1 ; r \rrbracket, A_i \text{ et } B_{\sigma(i)} \text{ sont associés.}$$

$$\begin{aligned} \text{Alors } \tilde{\sigma} : \llbracket 1 ; r \rrbracket &\longrightarrow \llbracket 1 ; s \rrbracket \quad \text{vérifie} \\ i &\longmapsto \begin{cases} 1 & \text{si } i = 1 \\ \sigma(i) & \text{si } i \geq 2 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\forall i \in \llbracket 1 ; r \rrbracket, A_i \text{ et } B_{\tilde{\sigma}(i)} \text{ sont associés.}$$

D'où l'unicité.

Donc, par récurrence forte,  $\forall n \in \mathbb{N}^*, \mathcal{P}(n)$ . ■

### Corollaire 10.146 (Reformulation)

Soit  $P \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$ .

On note  $\lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$  le coefficient dominant de  $P$ .

Alors il existe  $r \in \mathbb{N}$ ,  $A_1, \dots, A_r \in \mathbb{K}[X]$  irréductibles, unitaires et deux à deux distincts et  $\alpha_1, \dots, \alpha_r \in \mathbb{N}^*$  tels que

$$P = \lambda A_1^{\alpha_1} \dots A_r^{\alpha_r}.$$

De plus, si l'on a une autre décomposition

$$P = \mu B_1^{\beta_1} \dots B_s^{\beta_s}$$

avec  $\mu \in \mathbb{K}$ ,  $s \in \mathbb{N}$ ,  $B_1, \dots, B_s \in \mathbb{K}[X]$  irréductibles, unitaires et deux à deux distincts, et  $\beta_1, \dots, \beta_s \in \mathbb{N}^*$ , alors  $\lambda = \mu$  et il existe une bijection  $\sigma : \llbracket 1 ; r \rrbracket \longrightarrow \llbracket 1 ; s \rrbracket$  telle que

$$\forall k \in \llbracket 1 ; r \rrbracket, A_k = B_{\sigma(k)} \quad \text{et} \quad \alpha_k = \beta_{\sigma(k)}.$$



### 10.2.6.2 Polynômes à coefficients complexes

---

#### Théorème 10.147

Soit  $P \in \mathbb{C}[X] \setminus \{0\}$ .

Alors  $P$  s'écrit de façon unique, à permutation de facteurs près :

$$P = \mu (X - \lambda_1)^{\alpha_1} \dots (X - \lambda_r)^{\alpha_r} \quad \text{où} \quad \begin{cases} \mu \in \mathbb{C}^* \\ r \in \mathbb{N} \\ \lambda_1, \dots, \lambda_r \in \mathbb{C} \text{ deux à deux distincts} \\ \alpha_1, \dots, \alpha_r \in \mathbb{N}^* \end{cases}$$

Le coefficient dominant de  $P$  est  $\mu$ .

Les racines de  $P$  sont  $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ .

Pour tout  $j \in \llbracket 1 ; r \rrbracket$ , l'entier  $\alpha_j$  est appelé multiplicité de la racine  $\lambda_j$ .

Le polynôme  $P$  admet  $r$  racines comptées sans multiplicité et  $\alpha_1 + \dots + \alpha_r$  racines comptées avec multiplicité.

---

#### Exercice 10.148 (À retenir)

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

Décomposer le polynôme  $X^n - 1$  en produit de polynômes irréductibles sur  $\mathbb{C}$ .

---

#### Correction 10.149

Le coefficient dominant de  $X^n - 1$  est 1.

Les racines de  $X^n - 1$  sont les éléments de  $\mathbb{U}_n$  (il y en a  $n$ ).

Notons  $\alpha_\omega \in \mathbb{N}^*$  la multiplicité de  $\omega \in \mathbb{U}_n$ .

On a  $X^n - 1 = 1 \times \prod_{\omega \in \mathbb{U}_n} (X - \omega)^{\alpha_\omega}$ .

Donc  $\deg(X^n - 1) = \sum_{\omega \in \mathbb{U}_n} \deg(X - \omega)^{\alpha_\omega}$ .

Donc  $n = \sum_{\omega \in \mathbb{U}_n} \alpha_\omega$ .

Donc  $\forall \omega \in \mathbb{U}_n, \alpha_\omega = 1$ .

Finalement :

$$X^n - 1 = \prod_{\omega \in \mathbb{U}_n} (X - \omega).$$

---

**Proposition 10.150**

Soient  $P, Q \in \mathbb{C}[X]$ .

Alors  $P$  et  $Q$  sont premiers entre eux si, et seulement si,  $P$  et  $Q$  n'ont aucune racine commune.

Autrement dit, par contraposée :

$$P \wedge Q \neq 1 \iff \exists \lambda \in \mathbb{C}, P(\lambda) = Q(\lambda) = 0.$$

---

**Démonstration 10.151**

S'il existe une racine  $\lambda \in \mathbb{C}$  commune à  $P$  et  $Q$ , alors  $X - \lambda$  divise  $P$  et  $Q$ .

Donc  $X - \lambda \mid P \wedge Q$ .

Donc  $P \wedge Q \neq 1$ .

S'il n'existe aucune racine commune à  $P$  et  $Q$  :

Décomposons  $P$  et  $Q$  en produits de polynômes irréductibles :  $\begin{cases} P = \lambda (X - \lambda_1) \dots (X - \lambda_\alpha) \\ Q = \mu (X - \mu_1) \dots (X - \mu_\beta) \end{cases}$  où

$$\begin{cases} \alpha, \beta \in \mathbb{N} \\ \lambda, \mu \in \mathbb{C}^* \\ \lambda_1, \dots, \lambda_\alpha, \mu_1, \dots, \mu_\beta \in \mathbb{C} \end{cases}$$

On a  $\{\lambda_1 ; \dots ; \lambda_\alpha\} \cap \{\mu_1 ; \dots ; \mu_\beta\} = \emptyset$ .

Soit  $j \in \llbracket 1 ; \beta \rrbracket$ .

On a  $\forall i \in \llbracket 1 ; \alpha \rrbracket, (X - \lambda_i) \wedge (X - \mu_j) = 1$  car  $\lambda_i \neq \mu_j$ .

Donc, selon le Corollaire 10.109, on a

$$\lambda \prod_{i=1}^{\alpha} (X - \lambda_i) \wedge (X - \mu_j) = 1.$$

D'où, selon le Corollaire 10.109, on a

$$\lambda \prod_{i=1}^{\alpha} (X - \lambda_i) \wedge \mu \prod_{j=1}^{\beta} (X - \mu_j) = 1.$$

Donc  $P \wedge Q = 1$ . ■

---

**Proposition 10.152**

Soient  $P, Q \in \mathbb{C}[X] \setminus \{0\}$ .

Alors  $P$  divise  $Q$  si, et seulement si, toute racine  $\lambda$  de  $P$  est racine de  $Q$  avec une multiplicité comme racine de  $Q$  au moins égale à sa multiplicité comme racine de  $P$ .

---

Exemple 10.153

$$\text{On a } 2(X-1)^\alpha (X+i)^\beta \mid (X-1)^2 (X+i)^3 \iff \begin{cases} \alpha \leq 2 \\ \beta \leq 3 \end{cases}$$

### 10.2.6.3 Polynômes à coefficients réels

---

#### Théorème 10.154

Soit  $P \in \mathbb{R}[X] \setminus \{0\}$ .

Alors  $P$  s'écrit de façon unique, à permutation des facteurs près :

$$P = \mu \times (X - \lambda_1)^{\alpha_1} \dots (X - \lambda_r)^{\alpha_r} \times (X^2 + b_1X + c_1)^{\beta_1} \dots (X^2 + b_sX + c_s)^{\beta_s}$$

où  $\left\{ \begin{array}{l} \mu \in \mathbb{R}^* \\ r, s \in \mathbb{N} \\ \lambda_1, \dots, \lambda_r \in \mathbb{R} \text{ deux à deux distincts} \\ (b_1, c_1), \dots, (b_s, c_s) \in \mathbb{R}^2 \text{ deux à deux distincts} \\ \text{les facteurs de degré 2 sont irréductibles, c'est-à-dire } \forall i \in \llbracket 1 ; s \rrbracket, b_i^2 - 4c_i < 0 \\ \alpha_1, \dots, \alpha_r, \beta_1, \dots, \beta_s \in \mathbb{N}^* \end{array} \right.$

Le coefficient dominant de  $P$  est  $\mu$ .

Les racines réelles de  $P$  sont  $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ .

Pour tout  $j \in \llbracket 1 ; r \rrbracket$ , l'entier  $\alpha_j$  est appelé multiplicité de la racine  $\lambda_j$ .

Le polynôme  $P$  admet  $r$  racines réelles comptées sans multiplicité et  $\alpha_1 + \dots + \alpha_r$  racines comptées avec multiplicité.

---

#### Exercice 10.155 (À retenir)

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

Décomposer le polynôme  $X^n - 1$  en produit de polynômes irréductibles sur  $\mathbb{R}$ .

---

Correction 10.156

On a vu

$$X^n - 1 = \prod_{\omega \in \mathbb{U}_n} (X - \omega) = \prod_{k=0}^{n-1} \left( X - e^{\frac{2ik\pi}{n}} \right).$$

Si  $n$  est pair, on a  $n = 2m$  où  $m = \frac{n}{2}$ .

Donc  $\mathbb{U}_n = \{-1 ; 1\} \cup \bigcup_{k=1}^{m-1} \left\{ e^{\frac{2ik\pi}{n}} ; e^{\frac{-2ik\pi}{n}} \right\}$ .

D'où

$$\begin{aligned} X^n - 1 &= (X - 1)(X + 1) \prod_{k=1}^{m-1} \left( X - e^{\frac{2ik\pi}{n}} \right) \left( X - e^{\frac{-2ik\pi}{n}} \right) \\ &= (X - 1)(X + 1) \prod_{k=1}^{\frac{n}{2}-1} \left( X^2 - 2 \cos \left( \frac{2k\pi}{n} \right) X + 1 \right) \end{aligned}$$

Si  $n$  est impair, on a  $n = 2m + 1$  avec  $m = \frac{n-1}{2}$ .

On obtient de même  $\mathbb{U}_n = \{1\} \cup \bigcup_{k=1}^m \left\{ e^{\frac{2ik\pi}{n}} ; e^{\frac{-2ik\pi}{n}} \right\}$ .

Donc

$$X^n - 1 = (X - 1) \prod_{k=1}^{\frac{n-1}{2}} \left( X^2 - 2 \cos \left( \frac{2k\pi}{n} \right) X + 1 \right).$$

*Exemple 10.157*

On a

$$\begin{aligned} X^4 - 1 &= (X^2 - 1)(X^2 + 1) \\ &= (X - 1)(X + 1)(X^2 + 1) \end{aligned}$$

et

$$X^5 - 1 = (X - 1) \left( X^2 - 2 \cos \left( \frac{2\pi}{5} \right) X + 1 \right) \left( X^2 - 2 \cos \left( \frac{4\pi}{5} \right) X + 1 \right).$$

**Proposition 10.158 (Racines complexes de polynômes réels)**

Soient  $P \in \mathbb{R}[X]$  et  $\lambda \in \mathbb{C}$  une racine de  $P$ .

On sait, d'après la Proposition 10.40, que  $\bar{\lambda}$  est racine de  $P$ .

Les racines  $\lambda$  et  $\bar{\lambda}$  ont même multiplicité.

*Démonstration 10.159*

On considère la décomposition de  $P$  en produit d'irréductibles sur  $\mathbb{C}$  :

$$P = \mu (X - \lambda_1)^{\alpha_1} \dots (X - \lambda_r)^{\alpha_r}$$

où  $\begin{cases} \mu \in \mathbb{C}^* \\ \lambda_1, \dots, \lambda_r \in \mathbb{C} \text{ deux à deux distincts} \\ \alpha_1, \dots, \alpha_r \in \mathbb{N}^* \end{cases}$

On pose  $\lambda = \lambda_1$ .

En conjuguant, on a

$$\overline{P} = \overline{\mu} \left( X - \overline{\lambda_1} \right)^{\alpha_1} \dots \left( X - \overline{\lambda_r} \right)^{\alpha_r} = P.$$

Selon l'unicité de l'écriture en produit d'irréductibles, il existe  $k \in \llbracket 1 ; r \rrbracket$  tel que  $(X - \lambda_1)^{\alpha_1} = (X - \lambda_k)^{\alpha_k}$ .

Donc  $\lambda_k = \overline{\lambda}$  et  $\alpha_k = \alpha_1$ .

Or  $\alpha_k$  est la multiplicité de la racine  $\overline{\lambda}$  de  $P$  et  $\alpha_1$  est la multiplicité de la racine  $\lambda$  de  $P$ . ■

## 10.3 Racines des polynômes

### 10.3.1 Multiplicités

---

**Définition 10.160 (Multiplicité d'une racine)**

Soient  $P \in \mathbb{K}[X]$  non-nul et  $\lambda \in \mathbb{K}$  une racine de  $P$ .

On a vu, à la Proposition 10.42, que  $X - \lambda$  divise  $P$ .

On appelle multiplicité de  $\lambda$  comme racine de  $P$  l'exposant de  $X - \lambda$  dans la décomposition de  $P$  en produit de polynômes irréductibles.

On dit que  $\lambda$  est racine simple de  $P$  si sa multiplicité vaut 1 ; sinon on dit que  $\lambda$  est racine multiple de  $P$ .

---

*Exemple 10.161*

Pour le polynôme  $P = X^2 (X - 4)^3 (X - 7) \in \mathbb{R}[X]$  :

- 0 est racine de multiplicité 2 (ou « racine double »)
- 4 est racine de multiplicité 3 (ou « racine triple »)
- et 7 est racine simple.

Ainsi,  $P$  admet :

- 3 racines comptées sans multiplicité
- 6 racines comptées avec multiplicité.

---

*Remarque 10.162*

Soient  $P \in \mathbb{K}[X]$  non-nul et  $\lambda \in \mathbb{K}$  une racine de  $P$ .

La multiplicité de  $\lambda$  est l'entier  $\alpha \in \mathbb{N}^*$  caractérisé par :

$$\begin{cases} (X - \lambda)^\alpha \mid P \\ (X - \lambda)^{\alpha+1} \nmid P \end{cases}$$

En particulier,  $\lambda$  est racine multiple de  $P$  si, et seulement si, on a :

$$(X - \lambda)^2 \mid P.$$

---

**Proposition 10.163 (Caractérisation à l'aide des dérivés)**

Soient  $P \in \mathbb{K}[X]$  non-nul et  $\lambda \in \mathbb{K}$  une racine de  $P$ .

La multiplicité de  $\lambda$  est l'entier  $\alpha \in \mathbb{N}^*$  caractérisé par :

$$\begin{cases} \forall j \in \llbracket 0 ; \alpha - 1 \rrbracket, P^{(j)}(\lambda) = 0 \\ P^{(\alpha)}(\lambda) \neq 0 \end{cases}$$

En particulier,  $\lambda$  est racine multiple de  $P$  si, et seulement si, on a :

$$P(\lambda) = P'(\lambda) = 0.$$

---

*Démonstration 10.164*

On note  $n$  le degré de  $P$  et  $\lambda$  le coefficient dominant de  $P$ .

On a  $P^{(n)} = \lambda n!$  donc  $P^{(n)}(\lambda) = \lambda n! \neq 0$ .

On note  $\gamma \in \mathbb{N}$  le plus petit entier tel que  $P^{(\gamma)}(\lambda) \neq 0$  (toute partie non-vidée de  $\mathbb{N}$  admet un minimum).

$$\text{On a } \begin{cases} \forall k \in \llbracket 0 ; \gamma - 1 \rrbracket, P^{(k)}(\lambda) = 0 \\ P^{(\gamma)}(\lambda) \neq 0 \end{cases}$$

Donc selon la formule de Taylor pour les polynômes :

$$\begin{aligned} P &= \sum_{k=\gamma}^n \frac{P^{(k)}(\lambda)}{k!} (X - \lambda)^k \\ &= (X - \lambda)^\gamma Q \text{ où } Q = \sum_{k=\gamma}^n \frac{P^{(k)}(\lambda)}{k!} (X - \lambda)^{k-\gamma} \end{aligned}$$

$$\text{et } Q(\lambda) = \frac{P^{(\gamma)}(\lambda)}{\gamma!} \neq 0.$$

Donc  $X - \lambda \nmid Q$  donc

$$\begin{cases} (X - \lambda)^\gamma \mid P \\ (X - \lambda)^{\gamma+1} \nmid P \end{cases}$$

Donc la multiplicité de  $\lambda$  comme racine de  $P$  est  $\gamma$ . ■

### 10.3.2 Nombre de racines d'un polynôme

---

#### Proposition 10.165

Soit  $P \in \mathbb{K}[X]$  de degré  $n \in \mathbb{N}$ .

Alors  $P$  admet au plus  $n$  racines comptées avec multiplicité.

En particulier,  $P$  admet au plus  $n$  racines comptées sans multiplicité.

---

*Démonstration 10.166*

Notons  $\lambda_1, \dots, \lambda_r$  les racines de  $P$  deux à deux distinctes et  $\alpha_1, \dots, \alpha_r$  leurs multiplicités respectives, avec  $r \in \mathbb{N}$ .

On a  $(X - \lambda_1)^{\alpha_1} \dots (X - \lambda_r)^{\alpha_r} \mid P$ .

Or, comme  $P \neq 0$ , on a

$$\deg((X - \lambda_1)^{\alpha_1} \dots (X - \lambda_r)^{\alpha_r}) \leq \deg P.$$

Donc (avec multiplicité) :

$$\alpha_1 + \dots + \alpha_r \leq n.$$

Donc (sans multiplicité) :

$$r \leq n. \quad \text{■}$$

---

#### Corollaire 10.167

Soient  $n \in \mathbb{N}$  et  $P \in \mathbb{K}_n[X]$ .

Si  $P$  admet  $n + 1$  racines alors  $P = 0$ .

---

#### Corollaire 10.168

Soit  $P \in \mathbb{K}[X]$ .

Si  $P$  admet une infinité de racines alors  $P = 0$ .

---

**Corollaire 10.169**

On note  $\text{Pol}(\mathbb{K}, \mathbb{K})$  l'ensemble des fonctions polynomiales de  $\mathbb{K}$  dans  $\mathbb{K}$  (c'est un sous-anneau de  $\mathcal{F}(\mathbb{K}, \mathbb{K})$  selon la Proposition 10.45).

Si  $\mathbb{K}$  est infini, alors l'application

$$\begin{array}{ccc} \varphi : \mathbb{K}[X] & \longrightarrow & \text{Pol}(\mathbb{K}, \mathbb{K}) \\ P & \longmapsto & \tilde{P} \end{array}$$

est un isomorphisme d'anneaux.

---

**Démonstration 10.170**

On a déjà vu que  $\varphi$  est un morphisme d'anneaux (cf. Proposition 10.45).

$\varphi$  est clairement une surjection.

Montrons que  $\varphi$  est injective.

Soient  $P, Q \in \mathbb{K}[X]$  tels que  $\varphi(P) = \varphi(Q)$ .

On a  $\varphi(P - Q) = 0$ , c'est-à-dire

$$\forall \lambda \in \mathbb{K}, (P - Q)(\lambda) = 0.$$

Donc  $P - Q$  admet une infinité de racines (car  $\mathbb{K}$  est infini).

Donc  $P - Q = 0$  donc  $P = Q$  donc  $\varphi$  est injectif. ■

### 10.3.3 Polynômes interpolateurs de Lagrange

---

**Définition/Proposition 10.171 (Polynôme interpolateur de Lagrange)**

Soient  $x_0, \dots, x_n \in \mathbb{K}$  deux à deux distincts et  $y_0, \dots, y_n \in \mathbb{K}$ .

Les polynômes  $L_0, \dots, L_n \in \mathbb{K}_n[X]$  définis par :

$$\forall j \in \llbracket 0 ; n \rrbracket, L_j = \prod_{k \in \llbracket 0 ; n \rrbracket \setminus \{j\}} \frac{X - x_k}{x_j - x_k}$$

vérifient

$$\forall i, j \in \llbracket 0 ; n \rrbracket, L_j(x_i) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

Le polynôme

$$y_0 L_0 + \dots + y_n L_n$$

est l'unique polynôme  $P \in \mathbb{K}_n[X]$  tel que

$$\forall k \in \llbracket 0 ; n \rrbracket, P(x_k) = y_k.$$



---

Démonstration 10.172

unicité

Soient  $P, Q \in \mathbb{K}_n[X]$  tel que  $\forall k \in \llbracket 0 ; n \rrbracket$ ,  $P(x_k) = Q(x_k) = y_k$ .

On a  $\forall k \in \llbracket 0 ; n \rrbracket$ ,  $(P - Q)(x_k) = 0$ .

Donc  $P - Q$  admet  $n + 1$  racines et  $P - Q \in \mathbb{K}_n[X]$ .

Donc  $P - Q = 0$ .

Donc  $P = Q$ . ■

---

**Exercice 10.173**

Donner l'unique polynôme  $P \in \mathbb{R}_3[X]$  tel que

$$\begin{cases} P(-2) = -30 \\ P(0) = -4 \\ P(1) = 3 \\ P(2) = 22 \end{cases}$$

---

Correction 10.174

On pose

$$\begin{aligned} P &= -30 \frac{(X-0)(X-1)(X-2)}{(-2-0)(-2-1)(-2-2)} - 4 \frac{(X+2)(X-1)(X-2)}{(0+2)(0-1)(0-2)} + 3 \frac{(X+2)(X-0)(X-2)}{(1+2)(1-0)(1-2)} \\ &\quad + 22 \frac{(X+2)(X-0)(X-1)}{(2+2)(2-0)(2-1)} \\ &= \frac{30}{24} (X^2 - X)(X-2) - (X^2 + X - 2)(X-2) - (X^2 + 2X)(X-2) + \frac{22}{8} (X^2 + 2X)(X-1) \\ &= \frac{5}{4} (X^3 - 3X^2 + 2X) - (X^3 - X^2 - 4X + 4) - (X^3 - 4X) + \frac{11}{4} (X^3 + X^2 - 2X) \\ &= 2X^3 + 5X - 4 \end{aligned}$$

---

**Exercice 10.175**

On garde les notations de la Définition/Proposition 10.171.

Compléter les égalités suivantes :

(1)  $\forall P \in \mathbb{K}_n[X], P(x_0)L_0 + \cdots + P(x_n)L_n =$

(2)  $L_0 + \cdots + L_n =$

---

*Correction 10.176*

On a :

$$(1) \quad \forall P \in \mathbb{K}_n[X], \quad P(x_0)L_0 + \cdots + P(x_n)L_n = P$$

$$(2) \quad L_0 + \cdots + L_n = 1$$

### 10.3.4 Polynômes scindés

---

#### Définition 10.177 (Polynôme scindé)

Soit  $P \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$ .

On dit que  $P$  est scindé (sur  $\mathbb{K}$ ) s'il est produit de polynômes de degré 1, c'est-à-dire s'il admet  $\deg P$  racines comptées avec multiplicité.

---

*Exemple 10.178*

Le polynôme  $X^2 + 1$  est scindé sur  $\mathbb{C}$  mais pas sur  $\mathbb{R}$ .

---

#### Proposition 10.179

Sur  $\mathbb{C}$ , tout polynôme est scindé.

Sur  $\mathbb{R}$ , un polynôme est scindé si, et seulement si, dans sa décomposition en produit d'irréductibles, il n'y a aucun polynôme de degré 2. Cela revient à dire que toutes les racines complexes du polynôme sont réelles.

---

#### Définition 10.180

Soit  $P \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$ .

On dit que  $P$  est scindé à racines simples (sur  $\mathbb{K}$ ) s'il est scindé (sur  $\mathbb{K}$ ) et si toutes ses racines sont simples (c'est-à-dire de multiplicité 1).

Cela revient à dire que  $P$  admet  $\deg P$  racines comptées sans multiplicité.

---

#### Bilan 10.181

Soit  $P \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$ .

On note  $n$  le nombre de racines de  $P$  comptées sans multiplicité.

On note  $N$  le nombre de racines de  $P$  comptées avec multiplicité.

On a

$$\underset{(1)}{n} \leq \underset{(2)}{N} \leq \deg P.$$

De plus :

- (1) est une égalité si, et seulement si,  $P$  est à racines simples.
- (2) est une égalité si, et seulement si,  $P$  est scindé.
- (1) et (2) sont des égalités si, et seulement si,  $P$  est scindé à racines simples.

---

### Définition 10.182 (Polynômes symétriques élémentaires)

Soit

$$P = a_n X^n + \cdots + a_0 X^0 \in \mathbb{K}[X]$$

un polynôme de degré  $n \in \mathbb{N}$ , où  $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{K}$ .

On suppose ce polynôme scindé :

$$P = \mu (X - \lambda_1) \dots (X - \lambda_n),$$

où  $\mu, \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ .

Les polynômes symétriques élémentaires en les racines de  $P$  sont les sommes  $\sigma_1, \dots, \sigma_n$  définies par :

$$\forall k \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, \quad \sigma_k = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} \lambda_{i_1} \times \dots \times \lambda_{i_k}.$$

---

#### Exemple 10.183

Si  $n = 3$ , on a :

$$\sigma_1 = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3$$

$$\sigma_2 = \lambda_1 \lambda_2 + \lambda_1 \lambda_3 + \lambda_2 \lambda_3$$

$$\sigma_3 = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3.$$

Si  $n = 4$ , on a :

$$\sigma_1 = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4$$

$$\sigma_2 = \lambda_1 \lambda_2 + \lambda_1 \lambda_3 + \lambda_1 \lambda_4 + \lambda_2 \lambda_3 + \lambda_2 \lambda_4 + \lambda_3 \lambda_4$$

$$\sigma_3 = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 + \lambda_1 \lambda_2 \lambda_4 + \lambda_1 \lambda_3 \lambda_4 + \lambda_2 \lambda_3 \lambda_4$$

$$\sigma_4 = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \lambda_4.$$

---

**Proposition 10.184 (Relations coefficients/racines)**

On garde les notations de la définition précédente.

Les polynômes symétriques élémentaires en les racines de  $P$  s'expriment en fonction des coefficients de  $P$  :

$$\forall k \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, \quad \sigma_k = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} \lambda_{i_1} \times \dots \times \lambda_{i_k} = (-1)^k \frac{a_{n-k}}{a_n}.$$

En particulier, la somme et le produit des racines de  $P$ , comptées avec multiplicité, se lisent facilement sur les coefficients de  $P$  :

$$\lambda_1 + \dots + \lambda_n = \frac{-a_{n-1}}{a_n} \quad \text{et} \quad \lambda_1 \dots \lambda_n = (-1)^n \frac{a_0}{a_n}.$$

---

*Démonstration 10.185 (Idée)*

On développe :

$$P = \mu (X - \lambda_1) \dots (X - \lambda_n) = \mu X^n - \mu \sigma_1 X^{n-1} + \mu \sigma_2 X^{n-2} + \dots + (-1)^n \mu \sigma_n.$$

$$\text{D'où } P = \sum_{k=0}^n (-1)^k \mu \sigma_k X^{n-k}.$$

$$\text{Or } P = \sum_{k=0}^n a_{n-k} X^{n-k}.$$

$$\text{Donc } \forall k \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, \quad (-1)^k \mu \sigma_k = a_{n-k}.$$

$$\text{Donc } \forall k \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, \quad \sigma_k = (-1)^k \frac{a_{n-k}}{a_n} \quad (\text{car } a_n = \mu).$$

On en déduit

$$\sum_{k=1}^n \lambda_k = \frac{-a_{n-1}}{a_n} \quad \text{et} \quad \prod_{k=1}^n \lambda_k = (-1)^n \frac{a_0}{a_n}.$$

■

---

**Exercice 10.186**

On pose  $P = X^3 + 3X^2 + 1$ .

- (1) Montrer que toutes les racines complexes de  $P$  sont simples.
- (2) Calculer la somme des carrés des racines complexes de  $P$ .

---

*Correction 10.187 (1)*

On a  $P' = 3X^2 + 6X = X(3X + 6)$ .

Donc  $P'$  a pour racines 0 et  $-2$ .

Or  $P(0) = 1 \neq 0$  et  $P(-2) = 5 \neq 0$ .

Donc  $P'$  et  $P$  n'admettent aucune racine commune.

Donc  $P$  n'admet aucune racine double.

Donc toutes les racines de  $P$  sont simples.

---

*Correction 10.188 (2)*

Notons  $x, y, z \in \mathbb{C}$  les racines de  $P$ .

On a  $(x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2xz + 2yz$ .

Donc

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + z^2 &= (x + y + z)^2 - 2(xy + xz + yz) \\ &= \sigma_1^2 - 2\sigma_2 \\ &= (-3)^2 - 2 \times 0 \\ &= 9. \end{aligned}$$

## 10.4 Fractions rationnelles

### 10.4.1 Corps des fractions rationnelles

Le corps  $\mathbb{K}(X)$  se construit à partir de l'anneau intègre  $\mathbb{K}[X]$  exactement comme le corps  $\mathbb{Q}$  se construit à partir de l'anneau intègre  $\mathbb{Z}$  (plus généralement, on peut associer à tout anneau intègre sont « corps des fractions »).

Cette construction n'est pas difficile, mais elle est hors-programme (et n'apporte rien en pratique). On se contente donc de la définition suivante, qui décrit ce qu'il faut savoir en admettant l'existence du corps  $\mathbb{K}(X)$ .

---

**Définition 10.189 (Fractions rationnelles)**

Le corps des fractions rationnelles en l'indéterminée  $X$  à coefficients dans  $\mathbb{K}$  est un corps noté  $(\mathbb{K}(X), +, \times)$  tel que :

- (1) L'anneau  $\mathbb{K}[X]$  est un sous-anneau de  $(\mathbb{K}(X), +, \times)$ .
- (2) Tout élément de  $\mathbb{K}(X)$  est le quotient de deux éléments de  $\mathbb{K}[X]$  :

$$\forall F \in \mathbb{K}(X), \exists A \in \mathbb{K}[X], \exists B \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}, F = \frac{A}{B}.$$

À retenir :

- Les fractions rationnelles sont les quotients  $\frac{A}{B}$  où  $A \in \mathbb{K}[X]$  et  $B \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$ .
- Savoir reconnaître deux écritures de la même fraction rationnelle :

$$\forall A, C \in \mathbb{K}[X], \forall B, D \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}, \quad \frac{A}{B} = \frac{C}{D} \iff AD = BC.$$

- Tout polynôme  $A \in \mathbb{K}[X]$  est une fraction rationnelle :  $A = \frac{A}{1}$ .
- Connaître enfin la structure de corps  $(\mathbb{K}(X), +, \times)$  :

On considère des polynômes  $A, C \in \mathbb{K}[X]$  et  $B, D \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$ .

On a la somme et le produit :

$$\frac{A}{B} + \frac{C}{D} = \frac{AD + BC}{BD} \quad \text{et} \quad \frac{A}{B} \times \frac{C}{D} = \frac{AC}{BD}.$$

L'élément neutre de la somme est la fraction rationnelle nulle, qui est aussi le polynôme nul :  
 $0 = \frac{0}{1}$ .

L'élément neutre du produit est le polynôme constant 1 :  $1 = \frac{1}{1}$ .

L'opposé de  $\frac{A}{B}$  est  $\frac{-A}{B}$ .

Si  $A \neq 0$ , l'inverse de  $\frac{A}{B}$  est  $\frac{B}{A}$ .

---

### Définition/Proposition 10.190 (Forme irréductible d'une fraction rationnelle)

Soit  $F \in \mathbb{K}(X)$ .

Il existe un unique couple  $(A, B) \in \mathbb{K}[X] \times (\mathbb{K}[X] \setminus \{0\})$  tel que :

$$F = \frac{A}{B} \quad \text{et} \quad A \wedge B = 1 \quad \text{et} \quad B \text{ est unitaire.}$$

On appelle forme irréductible de  $F$  toute écriture de  $F$  sous la forme

$$F = \frac{A}{B} \quad \text{avec} \quad A \wedge B = 1.$$

---

*Démonstration 10.191*

★★ Exercice ★★ (cf. Démonstration 8.61). ■

---

**Notation 10.192**

Soit  $\mathbb{L}$  un corps tel que  $\mathbb{K}$  soit un sous-anneau de  $\mathbb{L}$ .

Soient  $F \in \mathbb{K}(X)$  et  $x \in \mathbb{L}$ .

On considère une forme irréductible de  $F$  :

$$F = \frac{A}{B} \quad \text{avec} \quad \begin{cases} A \in \mathbb{K}[X] \\ B \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\} \\ A \wedge B = 1 \end{cases}$$

On a déjà défini les éléments  $A(x) \in \mathbb{L}$  et  $B(x) \in \mathbb{L}$  (cf. Notation 10.4).

Si  $B(x) \neq 0$  alors on note  $F(x)$  l'élément de  $\mathbb{L}$  :

$$F(x) = \frac{A(x)}{B(x)}.$$

On dit que  $F(x)$  est l'élément obtenu en évaluant  $F$  en  $x$ .

---

*Exemple 10.193*

On garde les notations précédentes.

Si  $\mathcal{L}(=, \mathbb{K})$  alors la notation  $F(\lambda)$  est valide pour tout  $\lambda \in \mathbb{K}$  qui n'est pas racine de  $B$ .

Si  $\mathcal{L}(=, \mathbb{K}(X))$  alors la notation  $F(G)$  est valide pour tout  $G \in \mathbb{K}(X)$  sauf les polynômes constants qui sont racines de  $B$ .

On dit que  $F(G)$  est la composition des fractions rationnelles  $F$  et  $G$  (qu'on note parfois  $F \circ G$ ).

En particulier, on a le droit d'écrire  $F = F(X)$ .

---

**Définition 10.194 (Conjugaison)**

Soient  $F = \frac{A}{B} \in \mathbb{C}(X)$  (avec  $A \in \mathbb{C}[X]$  et  $B \in \mathbb{C}[X] \setminus \{0\}$ ).

On appelle conjuguée de  $F$  la fraction rationnelle

$$\overline{F} = \frac{\overline{A}}{\overline{B}}.$$

Elle ne dépend pas du choix de  $A$  et  $B$ .

---

**Proposition 10.195**

*La conjugaison*

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{C}(X) & \longrightarrow & \mathbb{C}(X) \\ F & \longmapsto & \overline{F} \end{array}$$

*est un automorphisme d'anneau.*

---

*Démonstration 10.196*

★★ Exercice ★★

■

## 10.4.2 Degré

---

**Définition 10.197 (Degré d'une fraction rationnelle)**

Soit  $F = \frac{A}{B} \in \mathbb{K}(X)$  (avec  $A \in \mathbb{K}[X]$  et  $B \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$ ).

Le degré de  $F$  est :

$$\deg F = \deg A - \deg B.$$

Le degré de  $F$  ne dépend pas du choix de  $A$  et  $B$ , et appartient à  $\mathbb{Z} \cup \{-\infty\}$ .

Si  $F$  est un polynôme, son degré comme fraction rationnelle coïncide avec son degré comme polynôme.

---

**Proposition 10.198**

Soient  $F, G \in \mathbb{K}(X)$ .

On a :

$$(1) \quad \deg(F + G) \leq \max\{\deg F; \deg G\} \text{ avec égalité si } \deg F \neq \deg G$$

$$(2) \quad \deg FG = \deg F + \deg G$$

$$(3) \quad \deg \frac{1}{F} = -\deg F.$$

---

*Démonstration 10.199 (Globale)*

Soient  $A, C \in \mathbb{K}[X]$  et  $B, D \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$  tels que  $F = \frac{A}{B}$  et  $G = \frac{C}{D}$ .

■



---

*Démonstration 10.200 (1)*

On a :

$$\begin{aligned}\deg(F + G) &= \deg\left(\frac{A}{B} + \frac{C}{D}\right) \\ &= \deg\frac{AD + BC}{BD} \\ &= \deg(AD + BC) - \deg BD \\ &\leq \max\{\deg AD ; \deg BC\} - \deg BD \quad (*) \\ &= \max\{\deg AD - \deg BD ; \deg BC - \deg BD\} \\ &= \max\{\deg A - \deg B ; \deg C - \deg D\} \\ &= \max\{\deg F ; \deg G\}.\end{aligned}$$

On a :

$$\begin{aligned} (*) \text{ est une égalité } &\iff \deg AD \neq \deg BC \\ &\iff \deg A + \deg D \neq \deg B + \deg C \\ &\iff \deg \frac{A}{B} \neq \deg \frac{C}{D} \\ &\iff \deg F \neq \deg G. \quad \blacksquare\end{aligned}$$

---

*Démonstration 10.201 (2)*

On a :

$$\begin{aligned}\deg FG &= \deg \frac{AC}{BD} \\ &= \deg AC - \deg BD \\ &= \deg A + \deg C - \deg B - \deg D \\ &= \deg \frac{A}{B} + \deg \frac{C}{D} \\ &= \deg F + \deg G. \quad \blacksquare\end{aligned}$$

---

*Démonstration 10.202 (3)*

On a :

$$\begin{aligned}\deg \frac{1}{F} &= \deg \frac{B}{A} \\ &= \deg B - \deg A \\ &= -\deg F. \quad \blacksquare\end{aligned}$$

---

**Définition/Proposition 10.203 (Partie entière d'une fraction rationnelle)**

Soit  $F \in \mathbb{K}(X)$ .

Il existe un unique couple  $(E, G) \in \mathbb{K}[X] \times \mathbb{K}(X)$  tel que 
$$\begin{cases} F = E + G \\ \deg G < 0 \end{cases}$$

Le polynôme  $E$  est appelé la partie entière de  $F$ .

---

*Démonstration 10.204*

existence

Soient  $A \in \mathbb{K}[X]$  et  $B \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$  tels que  $F = \frac{A}{B}$ .

Soient  $Q, R \in \mathbb{K}[X]$  le quotient et le reste de la division euclidienne de  $A$  par  $B$  : 
$$\begin{cases} A = QB + R \\ \deg R < \deg B \end{cases}$$

On a :

$$\begin{aligned} F &= \frac{A}{B} \\ &= \frac{QB + R}{B} \\ &= \underbrace{Q}_{\in \mathbb{K}[X]} + \underbrace{\frac{R}{B}}_{\substack{\in \mathbb{K}(X) \\ \deg < 0}} \end{aligned}$$

unicité

Soient  $E_1, E_2 \in \mathbb{K}[X]$  et  $G_1, G_2 \in \mathbb{K}(X)$  tels que 
$$\begin{cases} F = E_1 + G_1 = E_2 + G_2 \\ \deg G_1 < 0 \\ \deg G_2 < 0 \end{cases}$$

On a  $E_1 - E_2 = G_2 - G_1$ .

Donc  $\deg \underbrace{(E_1 - E_2)}_{\in \mathbb{N} \cup \{-\infty\}} = \deg \underbrace{(G_2 - G_1)}_{< 0}$ .

Donc  $\deg(E_1 - E_2) = -\infty$ .

Donc  $E_1 = E_2$ .

Donc  $G_1 = G_2$ . ■

---

*Remarque 10.205*

Soient  $A \in \mathbb{K}[X]$  et  $B \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$ .

La partie entière de la fraction rationnelle  $\frac{A}{B}$  est :

- nulle si, et seulement si,  $\deg A < \deg B$  ;
- de degré  $\deg A - \deg B$  sinon.

---

**Exercice 10.206**

Donner la partie entière de  $F = \frac{X+1}{X-1}$  et de  $G = \frac{X^8+7}{X^4+X^2-1}$ .

---

*Correction 10.207*

On a

$$\begin{aligned} F &= \frac{X+1}{X-1} \\ &= \frac{X-1+2}{X-1} \\ &= \underbrace{1}_{\in \mathbb{R}[X]} + \underbrace{\frac{2}{X-1}}_{\deg < 0} \end{aligned}$$

Donc la partie entière de  $F$  est 1.

On calcule la division euclidienne de  $X^8+7$  par  $X^4+X^2-1$  :

$$\begin{array}{r} X^8 \qquad \qquad \qquad + 7 \quad \Big| \quad X^4 + X^2 - 1 \\ \underline{-X^8 - X^6 \quad + X^4} \qquad \qquad \qquad \\ \qquad -X^6 \quad + X^4 \qquad \qquad \qquad \\ \qquad \underline{X^6 \quad + X^4 \quad - X^2} \qquad \qquad \qquad \\ \qquad \qquad 2X^4 \quad - X^2 + 7 \\ \qquad \qquad \underline{-2X^4 - 2X^2 + 2} \qquad \qquad \qquad \\ \qquad \qquad \qquad -3X^2 + 9 \end{array}$$

Donc  $X^8+7 = (X^4+X^2-1)(X^4-X^2+2) - 3X^2+9$ .

Donc  $G = X^4 - X^2 + 2 + \underbrace{\frac{-3X^2+9}{X^4+X^2-1}}_{\deg < 0}$ .

Donc la partie entière de  $G$  est  $X^4 - X^2 + 2$ .

### 10.4.3 Racines, pôles

---

#### Définition 10.208 (Racines, pôles)

Soit  $F \in \mathbb{K}(X)$ .

On considère une forme irréductible de  $F$  :

$$F = \frac{A}{B} \quad \text{avec} \quad \begin{cases} A \in \mathbb{K}[X] \\ B \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\} \\ A \wedge B = 1 \end{cases}$$

On appelle racines de  $F$  les racines de  $A$  et pôles de  $F$  les racines de  $B$ .

De plus, la multiplicité d'une racine de  $F$  est sa multiplicité comme racine de  $A$  et la multiplicité d'un pôle de  $F$  est sa multiplicité comme racine de  $B$ .

---

*Exemple 10.209*

$$\text{Si } F = \frac{(X-1)(X+2)^3}{(X-4)(X-5)^6} \text{ alors } \begin{cases} 1 \text{ est racine simple de } F \\ -2 \text{ est racine triple de } F \\ 4 \text{ est pôle simple de } F \\ 5 \text{ est pôle sextuple de } F \end{cases}$$

---

#### Proposition 10.210

Soit  $F \in \mathbb{K}(X)$ .

Alors  $F$  admet une infinité de racines si, et seulement si,  $F$  est nulle.

---

*Démonstration 10.211*

Soient  $A, B \in \mathbb{K}[X]$  tels que  $\begin{cases} F = \frac{A}{B} \\ A \wedge B = 1 \end{cases}$

Les racines de  $F$  sont les racines de  $A$ .

Donc on a :

$$\begin{aligned} F \text{ admet une infinité de racines} &\iff A \text{ admet une infinité de racines} \\ &\iff A = 0 \\ &\iff F = 0. \end{aligned}$$

■

---

*Remarque 10.212*

Soit  $F \in \mathbb{K}(X)$ .

$F$  admet un nombre fini de pôles.

---

**Définition 10.213 (Fonction rationnelle)**

Soit  $F \in \mathbb{K}(X)$ .

On note  $Z$  l'ensemble des pôles de  $F$  (c'est une partie finie de  $\mathbb{K}$ ).

La fonction rationnelle associée à  $F$  est la fonction

$$\begin{array}{ccc} \tilde{F} : \mathbb{K} \setminus Z & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ x & \longmapsto & F(x) \end{array}$$

#### 10.4.4 Dérivation

---

**Définition/Proposition 10.214 (Dérivée d'une fraction rationnelle)**

Soient  $F \in \mathbb{K}(X)$  et  $A \in \mathbb{K}[X]$  et  $B \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$  tels que  $F = \frac{A}{B}$ .

La fraction rationnelle

$$\frac{A'B - AB'}{B^2}$$

ne dépend pas du choix de  $A$  et  $B$ .

On l'appelle la fraction rationnelle dérivée de  $F$  et on la note  $F'$ .

---

*Remarque 10.215 (Lien entre dérivation des fractions rationnelles et des fonctions)*

Soit  $F \in \mathbb{R}(X)$ .

La fonction rationnelle associée à  $F'$  est la dérivée de la fonction rationnelle associée à  $F$  :

$$\widetilde{F'} = \left( \tilde{F} \right)'.$$

En particulier, toute fonction rationnelle est de classe  $\mathcal{C}^\infty$ .

---

**Proposition 10.216 (Opérations algébriques sur les dérivées)**

Soient  $F, G \in \mathbb{K}(X)$  et  $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ .

On a la somme :

$$(F + G)' = F' + G'.$$

On a, plus généralement :

$$(\lambda F + \mu G)' = \lambda F' + \mu G'.$$

On a le produit :

$$(FG)' = F'G + FG'.$$

On a le quotient :

$$\left(\frac{F}{G}\right)' = \frac{F'G - FG'}{G^2}.$$

On a la composition :

$$(F \circ G)' = G' \times (F' \circ G).$$

---

Démonstration 10.217

★★ Exercice ★★

■

## 10.4.5 Décomposition en éléments simples

### 10.4.5.1 Le théorème

---

**Définition 10.218 (Élément simple)**

On appelle élément simple (sur  $\mathbb{K}$ ) toute fraction rationnelle  $F$  de la forme

$$F = \frac{P}{Q^\alpha} \quad \text{avec} \quad \begin{cases} P, Q \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\} \\ \alpha \in \mathbb{N}^* \\ Q \text{ irréductible (sur } \mathbb{K}) \\ \deg P < \deg Q \end{cases}$$

---

Exemple 10.219

Éléments simples sur  $\mathbb{R}$  et sur  $\mathbb{C}$  :

$$\frac{4}{X+1} \quad \frac{5}{(X+1)^3} \quad \frac{1}{X^5}$$

Éléments simples sur  $\mathbb{R}$  mais pas sur  $\mathbb{C}$  :

$$\frac{2X+1}{X^2+1} \quad \frac{X}{(X^2+1)^3}$$

---

*Remarque 10.220*

Le principal résultat de ce paragraphe affirme que toute fraction rationnelle s'écrit de façon unique comme la somme d'un polynôme et d'éléments simples.

Il faut savoir écrire le théorème sur  $\mathbb{C}$  et sur  $\mathbb{R}$ .

Voici d'abord la forme générale du théorème (hors-programme, mais elle peut aider à mieux retenir les deux formes au programme) :

---

**Théorème 10.221 (Décomposition en éléments simples sur  $\mathbb{K}$ )**

Soit  $F \in \mathbb{K}(X)$ .

Soient  $A \in \mathbb{K}[X]$  et  $B \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$  tels que :

$$F = \frac{A}{B} \quad \text{et} \quad A \wedge B = 1 \quad \text{et} \quad B \text{ est unitaire.}$$

Considérons la décomposition de  $B$  en produit de polynômes irréductibles : soient les polynômes irréductibles unitaires deux à deux distincts  $Q_1, \dots, Q_r \in \mathbb{K}[X]$  (avec  $r \in \mathbb{N}$ ) et les entiers  $\alpha_1, \dots, \alpha_r \in \mathbb{N}^*$  tels que :

$$B = Q_1^{\alpha_1} \dots Q_r^{\alpha_r}.$$

Alors il existe un polynôme  $E \in \mathbb{K}[X]$  et un polynôme  $P_{i\gamma}$  pour tout couple d'entiers  $(i, \gamma)$  tel que  $1 \leq i \leq r$  et  $1 \leq \gamma \leq \alpha_i$  tels que :

$$\frac{A}{B} = E + \sum_{i=1}^r \sum_{\gamma=1}^{\alpha_i} \frac{P_{i\gamma}}{Q_i^\gamma} \quad \text{et} \quad \forall i \in \llbracket 1 ; r \rrbracket, \quad \forall \gamma \in \llbracket 1 ; \alpha_i \rrbracket, \quad \deg P_{i\gamma} < \deg Q_i.$$

Ces polynômes  $E$  et  $P_{i\gamma}$  sont uniques.

Le polynôme  $E$  est la partie entière de  $F$ .

---

*Démonstration 10.222*

★★ **Admis** ★★ (hors-programme). ■

---

**Théorème 10.223 (Décomposition en éléments simples sur  $\mathbb{C}$ )**

Soit  $F \in \mathbb{C}(X)$ .

Soient  $A \in \mathbb{C}[X]$  et  $B \in \mathbb{C}[X] \setminus \{0\}$  tels que

$$F = \frac{A}{B} \quad \text{et} \quad A \wedge B = 1 \quad \text{et} \quad B \text{ est unitaire.}$$

Considérons la décomposition de  $B$  en produit de polynômes irréductibles sur  $\mathbb{C}$  :

$$B = (X - \lambda_1)^{\alpha_1} \dots (X - \lambda_r)^{\alpha_r} \quad \text{avec} \quad \begin{cases} r \in \mathbb{N} \\ \lambda_1, \dots, \lambda_r \in \mathbb{C} \text{ deux à deux distincts} \\ \alpha_1, \dots, \alpha_r \in \mathbb{N}^* \end{cases}$$

Alors il existe un polynôme  $E \in \mathbb{C}[X]$  et un nombre complexe  $x_{i\gamma}$  pour tout couple d'entiers  $(i, \gamma)$  tel que  $1 \leq i \leq r$  et  $1 \leq \gamma \leq \alpha_i$  tels que :

$$\frac{A}{B} = E + \sum_{i=1}^r \sum_{\gamma=1}^{\alpha_i} \frac{x_{i\gamma}}{(X - \lambda_i)^\gamma}.$$

Ce polynôme  $E$  et ces nombres complexes  $x_{i\gamma}$  sont uniques.

Le polynôme  $E$  est la partie entière de  $F$ .

Démonstration 10.224

★★ Admis ★★ (hors-programme ; découle du Théorème 10.221). ■

### Théorème 10.225 (Décomposition en éléments simples sur $\mathbb{R}$ )

Soit  $F \in \mathbb{R}(X)$ .

Soient  $A \in \mathbb{R}[X]$  et  $B \in \mathbb{R}[X] \setminus \{0\}$  tels que

$$F = \frac{A}{B} \quad \text{et} \quad A \wedge B = 1 \quad \text{et} \quad B \text{ est unitaire.}$$

Considérons la décomposition de  $B$  en produit de polynômes irréductibles sur  $\mathbb{R}$  :

$$B = (X - \lambda_1)^{\alpha_1} \dots (X - \lambda_r)^{\alpha_r} \times (X^2 + b_1X + c_1)^{\beta_1} \dots (X^2 + b_sX + c_s)^{\beta_s}$$

$$\text{avec} \left\{ \begin{array}{l} r, s \in \mathbb{N} \\ \lambda_1, \dots, \lambda_r \in \mathbb{R} \text{ deux à deux distincts} \\ (b_1, c_1), \dots, (b_s, c_s) \in \mathbb{R}^2 \text{ deux à deux distincts} \\ \text{les facteurs de degré 2 sont irréductibles, c'est-à-dire } \forall i \in \llbracket 1 ; s \rrbracket, b_i^2 - 4c_i < 0 \\ \alpha_1, \dots, \alpha_r, \beta_1, \dots, \beta_s \in \mathbb{N}^* \end{array} \right.$$

Alors il existe :

- un polynôme  $E \in \mathbb{R}[X]$  ;
- un réel  $x_{i\gamma}$  pour tout couple d'entiers  $(i, \gamma)$  tel que  $1 \leq i \leq r$  et  $1 \leq \gamma \leq \alpha_i$  ;
- deux réels  $y_{i\gamma}, z_{i\gamma}$  pour tout couple d'entiers  $(i, \gamma)$  tel que  $1 \leq i \leq s$  et  $1 \leq \gamma \leq \beta_i$

tels que :

$$\frac{A}{B} = E + \sum_{i=1}^r \sum_{\gamma=1}^{\alpha_i} \frac{x_{i\gamma}}{(X - \lambda_i)^\gamma} + \sum_{i=1}^s \sum_{\gamma=1}^{\beta_i} \frac{y_{i\gamma}X + z_{i\gamma}}{(X^2 + b_iX + c_i)^\gamma}.$$

Ce polynôme  $E$  et ces réels  $x_{i\gamma}, y_{i\gamma}, z_{i\gamma}$  sont uniques.

Le polynôme  $E$  est la partie entière de  $F$ .



★★ Admis ★★ (hors-programme ; découle du Théorème 10.221). ■

### Définition 10.227 (Partie polaire associée au pôle $\lambda$ )

Soient  $F \in \mathbb{K}(X)$  et  $\lambda \in \mathbb{K}$  un pôle de  $F$  dont on note  $\alpha$  la multiplicité.

On appelle partie polaire de  $F$  associée au pôle  $\lambda$  la somme des éléments simples de pôle  $\lambda$  dans la décomposition en éléments simples de  $F$ .

Elle est de la forme

$$\sum_{\gamma=1}^{\alpha} \frac{x_{\gamma}}{(X-\lambda)^{\gamma}} \quad \text{avec } x_1, \dots, x_{\alpha} \in \mathbb{K}$$

et  $\lambda$  n'est pas un pôle de

$$F - \sum_{\gamma=1}^{\alpha} \frac{x_{\gamma}}{(X-\lambda)^{\gamma}}.$$

### Exemple 10.228

On a les décompositions en éléments simples suivantes :

- Sur  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$  :

$$\frac{X^8 + X + 1}{X^4(X-1)^3} = X + 3 + \underbrace{\frac{22}{X-1} - \frac{3}{(X-1)^2} + \frac{3}{(X-1)^3}}_{\text{partie polaire associée à 1}} - \underbrace{\frac{16}{X} - \frac{9}{X^2} - \frac{4}{X^3} - \frac{1}{X^4}}_{\text{partie polaire associée à 0}}$$

- Sur  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  :

$$\frac{4}{X^4 - 1} = \frac{1}{X-1} - \frac{1}{X+1} - \frac{2}{X^2 + 1}$$

- Sur  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$  :

$$\frac{4}{X^4 - 1} = \frac{1}{X-1} - \frac{1}{X+1} + \frac{i}{X-i} - \frac{i}{X+i}$$

### Remarque 10.229

Il est simple de calculer des décompositions en éléments simples avec Python en utilisant le module `sympy`.

Par exemple :

```
>>> from sympy import apart, pprint
>>> from sympy.abc import x
>>> apart(1 / (x ** 2 + x))
-1/(x + 1) + 1/x
>>> pprint(apart(1 / (x ** 2 + x)))
      1      1
- ---- + -
  x + 1   x
```

---

*Remarque 10.230*

On verra que pour primitiver une fonction rationnelle réelle, on décompose la fraction rationnelle correspondante en éléments simples sur  $\mathbb{R}$ .

On se ramène ainsi, via des changements de variables affines, à primitiver par rapport à  $t$  des expressions de la forme

$$\frac{1}{t - \lambda} \quad \frac{1}{(t - \lambda)^\alpha} \quad \frac{t}{1 + t^2} \quad \frac{t}{(1 + t^2)^\alpha} \quad \frac{1}{1 + t^2} \quad \frac{1}{(1 + t^2)^\alpha}$$

avec  $\lambda \in \mathbb{R}$  et  $\alpha \in \llbracket 2 ; +\infty \rrbracket$ .

---

*Remarque 10.231*

La décomposition en éléments simples suivantes est à retenir. On l'énonce sous deux formes équivalentes :

---

**Proposition 10.232** (Décomposition en éléments simples de  $\frac{P'}{P}$  quand  $P$  est scindé)

Soit  $P \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$  scindé sur  $\mathbb{K}$ .

On a

$$\frac{P'}{P} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{X - \lambda_k}$$

où  $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$  sont les racines de  $P$  comptées avec multiplicité.

---

**Proposition 10.233** (Décomposition en éléments simples de  $\frac{P'}{P}$  quand  $P$  est scindé)

Soit  $P \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$  scindé sur  $\mathbb{K}$ .

On a

$$\frac{P'}{P} = \sum_{j=1}^r \frac{\alpha_j}{X - \mu_j}$$

où  $\mu_1, \dots, \mu_r \in \mathbb{K}$  sont les racines de  $P$  comptées sans multiplicité et  $\alpha_1, \dots, \alpha_r \in \mathbb{N}^*$  leurs multiplicités respectives.

---

*Démonstration 10.234*

On a, en notant  $\mu$  le coefficient dominant de  $P$  :

$$P = \mu (X - \lambda_1) \dots (X - \lambda_n).$$

Donc

$$\begin{aligned} \frac{P'}{P} &= \frac{\mu \sum_{k=1}^n \prod_{j \in \llbracket 1; n \rrbracket \setminus \{k\}} (X - \lambda_j)}{\mu \prod_{j=1}^n (X - \lambda_j)} \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{X - \lambda_k}. \end{aligned}$$

■

---

Exemple 10.235

Si  $P = 5(X - 7)^3(X - 9)$  alors

$$\frac{P'}{P} = \frac{3}{X-7} + \frac{1}{X-9}.$$

#### 10.4.5.2 Quelques méthodes de calcul

---

Remarque 10.236

Les méthodes qui suivent servent à obtenir la décomposition en éléments simples d'une fraction rationnelle de degré strictement négatif.

---

#### Méthode 10.237 (Fonctionne à tous les coups, mais à éviter car très calculatoire)

Mettre au même dénominateur puis identifier.

Cette méthode peut aussi être utilisée après les autres pour trouver les coefficients qui résistent.

---

Exemple 10.238

On pose  $F = \frac{X}{X^2 - 1}$ .

On a  $X^2 - 1 = (X - 1)(X + 1)$ .

La partie entière de  $F$  est nulle car  $\deg F < 0$ .

On a  $F = \frac{a}{X-1} + \frac{b}{X+1}$  avec  $a, b \in \mathbb{R}$ .

Donc  $F = \frac{a(X+1) + b(X-1)}{(X-1)(X+1)} = \frac{(a+b)X + a-b}{X^2-1}$ .

Donc  $\begin{cases} a+b=1 \\ a-b=0 \end{cases}$

Donc  $a = b = 0,5$ .

D'où

$$F = \frac{0,5}{X+1} + \frac{0,5}{X-1}.$$

---

#### Méthode 10.239 (Classique)

Si  $\lambda$  est un pôle de multiplicité  $\alpha$  de  $F$  : multiplier par  $(X - \lambda)^\alpha$  puis évaluer en  $\lambda$ .

---

Exemple 10.240

On pose  $F = \frac{X^4 + 1}{(X - 1)^2 (X - 2)^3}$ .

On a  $F = 0 + \frac{a}{X - 1} + \frac{b}{(X - 1)^2} + \frac{c}{X - 2} + \frac{d}{(X - 2)^2} + \frac{e}{(X - 2)^3}$  avec  $a, b, c, d, e \in \mathbb{R}$ .

On multiplie par  $(X - 1)^2$  et on évalue en 1 ; on obtient  $b = -2$ .

On multiplie par  $(X - 2)^3$  et on évalue en 2 ; on obtient  $e = 17$ .

On a donc

$$F = \frac{a}{X - 1} - \frac{2}{(X - 1)^2} + \frac{c}{X - 2} + \frac{d}{(X - 2)^2} + \frac{17}{(X - 2)^3}.$$

De plus, on a

$$\forall t \in \mathbb{R} \setminus \{1; 2\}, \quad t \frac{t^4 + 1}{(t - 1)^2 (t - 2)^3} = \frac{at}{t - 1} - \frac{2t}{(t - 1)^2} + \frac{ct}{t - 2} + \frac{dt}{(t - 2)^2} + \frac{17t}{(t - 2)^3}.$$

Donc quand  $t \rightarrow +\infty : 1 = a + c$ .

★★ Fin en exercice ★★

---

### Méthode 10.241 (Pour obtenir des informations sur les coefficients)

- Évaluer la fraction rationnelle en un point.
- Multiplier la fraction rationnelle par une puissance de  $X$  et évaluer sa limite en  $+\infty$ .

---

### Méthode 10.242 (Cas d'une fraction rationnelle réelle)

- On peut faire sa décomposition en éléments simples sur  $\mathbb{C}$  puis regrouper les éléments simples conjugués pour en déduire la décomposition en éléments simples sur  $\mathbb{R}$ .
- Lorsqu'on fait sa décomposition en éléments simples sur  $\mathbb{C}$ , on peut remarquer que la partie polaire de pôle  $\lambda$  et la partie polaire de pôle  $\bar{\lambda}$  sont conjuguées (d'après l'unicité de la décomposition en éléments simples).

---

Exemple 10.243

On pose  $F = \frac{X + 1}{X^2 + X + 1} \in \mathbb{R}(X)$ .

La partie entière de  $F$  est nulle car  $\deg F < 0$ .

On a  $X^2 + X + 1 = (X - j)(X - j^2)$ .

D'où la décomposition en éléments simples :

$$F = \frac{a}{X - j} + \frac{b}{X - j^2} \quad \text{avec } a, b \in \mathbb{C}.$$

Or  $F = \overline{F} = \frac{\overline{a}}{X - j^2} + \frac{\overline{b}}{X - j}$  (car  $j^2 = \overline{j}$ ).

D'où, par unicité de la décomposition en éléments simples :  $\begin{cases} a = \overline{b} \\ \overline{a} = b \end{cases}$

On multiplie par  $X - j$  et on évalue en  $j$  ; on obtient

$$\begin{aligned} a &= \frac{j+1}{j-j^2} \\ &= \frac{-j^2}{i\sqrt{3}} \\ &= \frac{ij^2}{\sqrt{3}} \\ &= \frac{e^{-\frac{i\pi}{6}}}{\sqrt{3}} \end{aligned}$$

D'où

$$F = \frac{\frac{e^{-\frac{i\pi}{6}}}{\sqrt{3}}}{X - j} + \frac{\frac{e^{\frac{i\pi}{6}}}{\sqrt{3}}}{X - j^2}.$$

*Exemple 10.244*  
On pose  $F = \frac{1}{X(X^2+1)^2}$ .

Déterminons la décomposition en éléments simples de  $F$  sur  $\mathbb{C}$  puis sur  $\mathbb{R}$ .

La partie entière de  $F$  est nulle car  $\deg F < 0$ .

On a  $X(X^2+1)^2 = X(X+i)^2(X-i)^2$ .

D'où la décomposition en éléments simples sur  $\mathbb{C}$  :

$$F = \frac{a}{X} + \frac{b}{X-i} + \frac{c}{(X-i)^2} + \frac{d}{X+i} + \frac{e}{(X+i)^2} \quad \text{avec } a, b, c, d, e \in \mathbb{C}.$$

Or  $F = \overline{F} = \frac{\overline{a}}{X} + \frac{\overline{b}}{X+i} + \frac{\overline{c}}{(X+i)^2} + \frac{\overline{d}}{X-i} + \frac{\overline{e}}{(X-i)^2}$ .

D'où, par une unicité de la décomposition en éléments simples :  $\begin{cases} a = \overline{a} \\ b = \overline{d} \\ e = \overline{c} \end{cases}$

On multiplie par  $X$  et on évalue en  $0$  ; on obtient  $a = 1$ .

On multiplie par  $(X-i)^2$  et on évalue en  $i$  ; on obtient  $c = \frac{i}{4}$ .

On multiplie par  $X$  et on prend la limite en  $+\infty$  ; on obtient  $b = \frac{-1}{2}$ .

Finalement,  $F$  est impaire donc on a

$$\begin{aligned} F &= -F(-X) \\ &= \frac{-a}{-X} + \frac{-b}{-X-i} + \frac{-c}{(-X-i)^2} + \frac{-d}{-X+i} + \frac{-e}{(-X+i)^2} \\ &= \frac{a}{X} + \frac{b}{X+i} - \frac{c}{(X+i)^2} + \frac{d}{X-i} - \frac{e}{(X-i)^2}. \end{aligned}$$

D'où, par unicité de la décomposition en éléments simples :  $\begin{cases} b = d \\ c = -e \end{cases}$

D'où

$$F = \frac{a}{X} + \frac{b}{X-i} + \frac{c}{(X-i)^2} + \frac{b}{X+i} - \frac{c}{(X+i)^2}.$$

D'où la décomposition en éléments simples sur  $\mathbb{C}$  :

$$F = \frac{1}{X} - \frac{1}{2(X-i)} + \frac{i}{4(X-i)^2} - \frac{1}{2(X+i)} - \frac{i}{4(X+i)^2}.$$

On en déduit la décomposition en éléments simples sur  $\mathbb{R}$  :

$$\begin{aligned} F &= \frac{1}{X} - \frac{1}{2} \left( \frac{1}{X+i} + \frac{1}{X-i} \right) + \frac{i}{4} \left( \frac{1}{(X-i)^2} - \frac{1}{(X+i)^2} \right) \\ &= \frac{1}{X} - \frac{1}{2} \times \frac{2X}{X^2+1} + \frac{i}{4} \times \frac{4iX}{(X^2+1)^2} \\ &= \frac{1}{X} - \frac{X}{X^2+1} - \frac{X}{(X^2+1)^2}. \end{aligned}$$

*Remarque 10.245 (Astuce)*

On aurait aussi pu ruser :

$$\begin{aligned} \frac{1}{X(X^2+1)^2} &= \frac{X^2+1-X^2}{X(X^2+1)^2} \\ &= \frac{1}{X(X^2+1)} - \frac{X}{(X^2+1)^2} \\ &= \frac{X^2+1-X^2}{X(X^2+1)} - \frac{X}{(X^2+1)^2} \\ &= \frac{1}{X} - \frac{X}{X^2+1} - \frac{X}{(X^2+1)^2}. \end{aligned}$$

---

**Méthode 10.246**

La proposition suivante :

---

**Proposition 10.247 (Cas des pôles simples)**

Soient  $F = \frac{A}{B} \in \mathbb{K}(X)$  une fraction rationnelle écrite sous forme irréductible et  $\lambda \in \mathbb{K}$  un pôle simple de  $F$  (c'est-à-dire une racine simple de  $B$ ).

Alors l'élément simple de pôle  $\lambda$  dans la décomposition en éléments simples de  $F$  est :

$$\frac{\frac{A(\lambda)}{B'(\lambda)}}{X - \lambda}.$$

---

*Démonstration 10.248*

On sait que la décomposition en éléments simples de  $F$  s'écrit

$$\frac{A}{B} = \underbrace{\frac{\mu}{X - \lambda}}_{\text{partie polaire associée à } \lambda} + \underbrace{G}_{\text{la somme des autres parties polaires et de la partie entière de } F}$$

où  $\mu \in \mathbb{K}$  et  $G \in \mathbb{K}(X)$  telle que  $\lambda$  n'est pas un pôle de  $G$ .

$\lambda$  est racine simple de  $B$  donc  $X - \lambda \mid B$ .

Soit  $Q \in \mathbb{K}[X]$  tel que  $B = (X - \lambda)Q$ .

On a  $B' = Q + (X - \lambda)Q'$ .

Donc  $B'(\lambda) = Q(\lambda) + 0$ .

En multipliant la décomposition en éléments simples par  $X - \lambda$ , on a :

$$\frac{A}{Q} = \mu + (X - \lambda)G.$$

Puis en évaluant en  $\lambda$  :  $\frac{A(\lambda)}{Q(\lambda)} = \mu$ .

D'où

$$\mu = \frac{A(\lambda)}{B'(\lambda)}.$$

■

---

**Exercice 10.249**

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

On pose  $F = \frac{1}{X^n - 1}$ .

- (1) Donner la décomposition en éléments simples de  $F$  sur  $\mathbb{C}$ .
- (2) En déduire la décomposition en éléments simples de  $F$  sur  $\mathbb{R}$ .

---

*Correction 10.250 (1)*

La partie entière de  $F$  est nulle car  $\deg F < 0$ .

On a  $X^n - 1 = \prod_{\omega \in \mathbb{U}_n} (X - \omega)$ .

Donc on a la décomposition en éléments simples suivante :

$$F = \sum_{\omega \in \mathbb{U}_n} \frac{\mu_\omega}{X - \omega}.$$

D'après la Proposition 10.247, on a

$$\forall \omega \in \mathbb{U}_n, \quad \mu_\omega = \frac{1}{n\omega^{n-1}} = \frac{\omega}{n} \text{ car } \omega^n = 1.$$

D'où la décomposition en éléments simples sur  $\mathbb{C}$  :

$$F = \sum_{\omega \in \mathbb{U}_n} \frac{\omega}{n(X - \omega)}.$$

---

*Correction 10.251 (2)*

Si  $\omega = e^{\frac{2ik\pi}{n}}$  avec  $k \in \llbracket 0 ; n-1 \rrbracket$ , alors

$$\begin{aligned} \frac{\omega}{X - \omega} + \frac{\bar{\omega}}{X - \bar{\omega}} &= \frac{\omega(X - \bar{\omega}) + \bar{\omega}(X - \omega)}{(X - \omega)(X - \bar{\omega})} \\ &= \frac{2(\operatorname{Re} \omega)X - 2}{X^2 - 2(\operatorname{Re} \omega)X + 1} \\ &= \frac{2\left(\cos \frac{2k\pi}{n}\right)X - 2}{X^2 - 2\left(\cos \frac{2k\pi}{n}\right)X + 1}. \end{aligned}$$

Donc, si  $n$  est pair, on a la décomposition en éléments simples sur  $\mathbb{R}$  suivante :

$$F = \frac{1}{n(X-1)} + \frac{-1}{n(X+1)} + \frac{2}{n} \sum_{k=1}^{\frac{n}{2}-1} \frac{\left(\cos \frac{2k\pi}{n}\right)X - 1}{X^2 - 2\left(\cos \frac{2k\pi}{n}\right)X + 1}.$$



Et si  $n$  est impair, on a la décomposition en éléments simples sur  $\mathbb{R}$  suivante :

$$F = \frac{1}{n(X-1)} + \frac{2}{n} \sum_{k=1}^{\frac{n+1}{2}} \frac{\left(\cos \frac{2k\pi}{n}\right) X - 1}{X^2 - 2\left(\cos \frac{2k\pi}{n}\right) X + 1}.$$

# Chapitre 11

## Intégrales sur un segment

### Sommaire

---

<b>11.1</b>	<b>Définitions.</b>	<b>368</b>
11.1.1	Subdivisions d'un segment	368
11.1.2	Fonctions en escalier	369
11.1.3	Fonctions continues par morceaux	370
11.1.4	Intégrales	372
11.1.4.1	Intégrale d'une fonction en escalier	372
11.1.4.2	Intégrale d'une fonction continue par morceaux	373
<b>11.2</b>	<b>Propriétés.</b>	<b>376</b>
11.2.1	Premières propriétés	376
11.2.2	Sommes de Riemann	379
11.2.3	Théorème fondamental	381
11.2.4	Intégration par parties	384
11.2.5	Formules de Taylor	386
11.2.6	Changements de variable	388
11.2.7	Symétries	390
<b>11.3</b>	<b>Techniques de calcul</b>	<b>391</b>
11.3.1	Utiliser les nombres complexes	391
11.3.2	Primitives des fonctions rationnelles	392
11.3.3	Fonctions rationnelles en $e^t$	395
11.3.4	Règle de Bioche	396

---

Dans ce chapitre, on définit l'intégrale d'une fonction continue par morceaux sur un segment. L'étude des intégrales de fonctions sur un intervalle autre qu'un segment sera faite en deuxième année.

Dans tout le chapitre, on pose  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$  et on considère un segment  $[a ; b]$  de  $\mathbb{R}$  (avec  $a, b \in \mathbb{R}$  tels que  $a < b$ ).

### 11.1 Définitions

#### 11.1.1 Subdivisions d'un segment

---

**Définition 11.1**

On appelle subdivision de  $[a ; b]$  toute suite finie strictement croissante  $\sigma = (x_0, x_1, \dots, x_n)$  d'éléments de  $[a ; b]$  telle que

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = b.$$

L'application qui à une telle subdivision associe l'ensemble fini  $\{x_1 ; x_2 ; \dots ; x_{n-1}\}$  est une bijection de l'ensemble des subdivisions de  $[a ; b]$  vers l'ensemble des parties finies de  $]a ; b[$ .

En pratique, on s'autorise à voir les subdivisions comme des ensembles finis et à parler, par exemple, de la subdivision réunion de deux subdivisions.

---

**Définition 11.2**

Soient  $\sigma$  et  $\sigma'$  deux subdivisions du segment  $[a ; b]$ .

On dit que  $\sigma'$  est plus fine que  $\sigma$  si on a

$$\sigma \subseteq \sigma'.$$

C'est-à-dire, du point de vue des suites finies :  $\sigma$  est une suite extraite de  $\sigma'$ .

---

*Remarque 11.3*

Pour toutes subdivisions  $\sigma_1$  et  $\sigma_2$  de  $[a ; b]$ , il existe une subdivision  $\sigma_3$  plus fine que  $\sigma_1$  et  $\sigma_2$ .

---

**Définition 11.4**

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

On appelle subdivision régulière de pas  $\frac{1}{n}$  la subdivision  $a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$  définie par :

$$\forall k \in \llbracket 0 ; n \rrbracket, \quad x_k = a + \frac{k}{n} (b - a).$$

## 11.1.2 Fonctions en escalier

---

**Définition 11.5**

On dit qu'une fonction  $\varphi : [a ; b] \longrightarrow \mathbb{K}$  est en escalier s'il existe une subdivision  $a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$  de  $[a ; b]$  telle que :

$$\forall j \in \llbracket 0 ; n - 1 \rrbracket, \quad \varphi|_{]x_j ; x_{j+1}[} \text{ est constante,}$$

c'est-à-dire si :

$$\forall j \in \llbracket 0 ; n - 1 \rrbracket, \quad \forall t \in ]x_j ; x_{j+1}[ , \quad \varphi(t) = \varphi\left(\frac{x_j + x_{j+1}}{2}\right).$$

Une telle subdivision est dite adaptée à  $\varphi$ .

---

*Exemple 11.6*

La restriction à tout segment de la fonction « partie entière » est en escalier.

La restriction à tout segment de la fonction « signum » est en escalier.

---

**Notation 11.7 (Non-officielle)**

On notera  $\text{Esc}([a ; b], \mathbb{K})$  l'ensemble des fonctions en escalier de  $[a ; b]$  vers  $\mathbb{K}$ .

C'est un sous-anneau de  $(\mathcal{F}([a ; b], \mathbb{K}), +, \times)$ .

---

*Remarque 11.8*

Soient  $\varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{F}([a ; b], \mathbb{R})$ .

On pose  $\varphi = \varphi_1 + i\varphi_2 \in \mathcal{F}([a ; b], \mathbb{C})$ .

Alors la fonction  $\varphi$  est en escalier si, et seulement si,  $\varphi_1$  et  $\varphi_2$  sont en escalier.

---

*Remarque 11.9*

Soit  $\varphi \in \mathcal{F}([a ; b], \mathbb{R})$  une fonction en escalier.

Alors l'ensemble image  $\text{Im } \varphi$  est fini.

En particulier, la fonction  $\varphi$  est bornée.

---

### 11.1.3 Fonctions continues par morceaux

---

**Définition 11.10 (Fonction continue par morceaux sur un segment)**

On dit qu'une fonction  $f : [a ; b] \longrightarrow \mathbb{K}$  est continue par morceaux s'il existe une subdivision  $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$  de  $[a ; b]$  telle que :

$$\forall j \in \llbracket 0 ; n-1 \rrbracket, \quad f|_{]x_j ; x_{j+1}[} \text{ admet un prolongement continu à } [x_j ; x_{j+1}],$$

c'est-à-dire si

$$\begin{cases} \forall j \in \llbracket 0 ; n-1 \rrbracket, \quad f|_{]x_j ; x_{j+1}[} \text{ est continue} \\ \forall j \in \llbracket 0 ; n-1 \rrbracket, \quad f \text{ admet une limite finie à droite en } x_j \\ \forall j \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, \quad f \text{ admet une limite finie à gauche en } x_j \end{cases}$$

Une telle subdivision est dite adaptée à  $f$ .

---

*Exemple 11.11*

Toute fonction en escalier est continue par morceaux.

Toute fonction continue est continue par morceaux.

La fonction  $f : [0 ; 1] \longrightarrow \mathbb{R}$  n'est pas continue par morceaux (elle est continue sur  $]0 ; 1]$  mais n'admet pas de limite finie en  $0^+$ ).

$$x \longmapsto \begin{cases} \sin \frac{1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

---

**Notation 11.12 (Non-officielle)**

On notera  $\mathcal{C}_m^0([a ; b], \mathbb{K})$  l'ensemble des fonctions continues par morceaux de  $[a ; b]$  vers  $\mathbb{K}$ .

C'est un sous-anneau de l'anneau  $(\mathcal{F}([a ; b], \mathbb{K}), +, \times)$ .

---

*Remarque 11.13*

Soient  $\varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{F}([a ; b], \mathbb{R})$ .

On pose  $\varphi = \varphi_1 + i\varphi_2 \in \mathcal{F}([a ; b], \mathbb{C})$ .

Alors la fonction  $\varphi$  est continue par morceaux si, et seulement si,  $\varphi_1$  et  $\varphi_2$  sont continues par morceaux.

---

*Remarque 11.14*

Toute fonction continue par morceaux sur un segment est bornée (mais n'atteint pas forcément ses bornes).

---

*Remarque 11.15*

Toute fonction continue par morceaux est la somme d'une fonction continue et d'une fonction en escalier.

---

*Démonstration 11.16*

On raisonne par récurrence sur le nombre (nécessairement fini) de points où la fonction continue par morceaux n'est pas continue.

★★ **Exercice** ★★ : montrer que l'écriture comme somme d'une fonction continue et d'une fonction en escalier est unique à une constante additive près. ■

## 11.1.4 Intégrales

### 11.1.4.1 Intégrale d'une fonction en escalier

---

#### Définition 11.17

Soient  $\varphi \in \text{Esc}([a; b], \mathbb{K})$  et  $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$  une subdivision adaptée à  $\varphi$ .

La valeur de la somme

$$\sum_{j=0}^{n-1} (x_{j+1} - x_j) \varphi\left(\frac{x_j + x_{j+1}}{2}\right)$$

ne dépend pas de la subdivision choisie.

On l'appelle intégrale de  $\varphi$  sur  $[a; b]$  et on la note :

$$\int_{[a;b]} \varphi \quad \text{ou} \quad \int_a^b \varphi(t) dt \quad \text{ou} \quad \int_a^b \varphi.$$

---

#### Exemple 11.18

On a :

$$\begin{aligned} \int_{-1}^2 \lfloor t \rfloor dt &= \sum_{j=0}^1 (x_{j+1} - x_j) \left\lfloor \frac{x_j + x_{j+1}}{2} \right\rfloor \\ &= (0 + 1) \left\lfloor \frac{0 - 1}{2} \right\rfloor + (1 - 0) \left\lfloor \frac{1 + 0}{2} \right\rfloor + (2 - 1) \left\lfloor \frac{2 + 1}{2} \right\rfloor \\ &= -1 + 0 + 1 \\ &= 0 \end{aligned}$$

---

#### Remarque 11.19

Les propriétés suivantes (laissées en exercice) sont utiles pour définir l'intégrale d'une fonction continue par morceaux.

---

#### Proposition 11.20 (Linéarité de l'intégrale)

On a :

$$\forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, \quad \forall \varphi, \psi \in \text{Esc}([a; b], \mathbb{K}), \quad \int_{[a;b]} (\lambda\varphi + \mu\psi) = \lambda \int_{[a;b]} \varphi + \mu \int_{[a;b]} \psi.$$

On dit que l'application  $\text{Esc}([a; b], \mathbb{K}) \longrightarrow \mathbb{K}$  est linéaire (cela signifie que l'image d'une

$$\varphi \longmapsto \int_{[a;b]} \varphi$$

combinaison linéaire est la combinaison linéaire des images).

---

**Proposition 11.21 (Positivité et croissance de l'intégrale)**

Soient  $a, b \in \mathbb{R}$  tels que  $a \leq b$  et  $\varphi, \psi \in \text{Esc}([a; b], \mathbb{K})$ .

On a

$$\varphi \geq 0 \implies \int_a^b \varphi(t) dt \geq 0 \quad (\text{positivité})$$

et

$$\varphi \leq \psi \implies \int_a^b \varphi(t) dt \leq \int_a^b \psi(t) dt \quad (\text{croissance}).$$

#### 11.1.4.2 Intégrale d'une fonction continue par morceaux

---

**Définition/Théorème 11.22 (Cas d'une fonction à valeurs réelles)**

Soit  $f \in \mathcal{C}_m^0([a; b], \mathbb{K})$ .

On note  $\mathcal{E}_-$  l'ensemble des fonctions en escalier inférieures à  $f$  :

$$\mathcal{E}_- = \{\varphi \in \text{Esc}([a; b], \mathbb{K}) \mid \varphi \leq f\}$$

et  $\mathcal{E}_+$  l'ensemble des fonctions en escalier supérieures à  $f$  :

$$\mathcal{E}_+ = \{\psi \in \text{Esc}([a; b], \mathbb{K}) \mid f \leq \psi\}.$$

Les bornes supérieure et inférieure suivantes sont bien définies :

$$I_-(f) = \sup_{\varphi \in \mathcal{E}_-} \int_{[a;b]} \varphi \quad \text{et} \quad I_+(f) = \inf_{\psi \in \mathcal{E}_+} \int_{[a;b]} \psi.$$

De plus, elles ont la même valeur, que l'on appelle intégrale de  $f$  sur  $[a; b]$  et qu'on note :

$$\int_{[a;b]} f \quad \text{ou} \quad \int_a^b f(t) dt \quad \text{ou} \quad \int_a^b f.$$

En résumé :

$$\int_{[a;b]} f = I_-(f) = I_+(f).$$

---

**Démonstration 11.23**

L'ensemble  $\left\{ \int_{[a;b]} \varphi \right\}_{\varphi \in \mathcal{E}_-}$  est une partie non-vide de  $\mathbb{R}$  car  $f$  est continue par morceaux sur son segment, donc bornée, donc minorée par un réel  $m \in \mathbb{R}$  et donc la fonction constante égale à  $m$  appartient à  $\mathcal{E}_-$ , et majorée car  $f$  est majorée par un réel  $M \in \mathbb{R}$  qui vérifie :

$$\forall \varphi \in \mathcal{E}_-, \quad \varphi \leq f \leq M$$

et donc, selon la Proposition 11.21 :

$$\forall \varphi \in \mathcal{E}_-, \int_{[a;b]} \varphi \leq \int_{[a;b]} M = (b-a) M.$$

Donc cet ensemble admet une borne supérieure. Donc  $I_-(f)$  est bien définie.

Idem pour  $I_+(f)$ .

Montrons que  $I_-(f) = I_+(f)$ .

⊆

On a

$$\forall \varphi \in \mathcal{E}_-, \forall \psi \in \mathcal{E}_+, \varphi \leq f \leq \psi.$$

D'où, selon la Proposition 11.21 :

$$\forall \varphi \in \mathcal{E}_-, \forall \psi \in \mathcal{E}_+, \int_{[a;b]} \varphi \leq \int_{[a;b]} \psi.$$

Donc, par définition de  $I_+(f)$  :

$$\forall \varphi \in \mathcal{E}_-, \int_{[a;b]} \varphi \leq I_+(f).$$

Et donc, par définition de  $I_-$  :

$$I_-(f) \leq I_+(f).$$

⊇

Soit  $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$ .

Comme  $f$  est continue par morceaux, il existe  $f_0 \in \mathcal{C}^0([a; b], \mathbb{R})$  et  $\varphi_0 \in \text{Esc}([a; b], \mathbb{K})$  telles que  $f = f_0 + \varphi_0$ .

Comme  $f_0$  est continue sur un segment, elle est uniformément continue d'après le théorème de Heine.

Il existe donc  $\delta \in \mathbb{R}_+^*$  tel que

$$\forall x, y \in [a; b], |x - y| \leq \delta \implies |f_0(x) - f_0(y)| \leq \varepsilon.$$

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$  tel que  $\frac{b-a}{n} \leq \delta$  (un tel entier existe car  $\lim_n \frac{b-a}{n} = 0$ ).

On définit  $\varphi \in \mathcal{E}_-$  et  $\psi \in \mathcal{E}_+$  en posant  $\forall k \in \llbracket 0; n \rrbracket$ ,  $x_k = a + k \frac{b-a}{n}$  et  $\varphi(b) = \psi(b) = f(b)$  et

$$\forall k \in \llbracket 0; n-1 \rrbracket, \forall t \in [x_k; x_{k+1}[ , \begin{cases} \varphi(t) = \min_{[x_k; x_{k+1}[} f_0 \\ \psi(t) = \max_{[x_k; x_{k+1}[} f_0 \end{cases}$$

De plus, on a :

$$\forall k \in \llbracket 0; n-1 \rrbracket, \forall x, y \in [x_k; x_{k+1}[ , |x - y| \leq \frac{b-a}{n} \leq \delta.$$



Donc, par définition de  $\delta$  :

$$\forall k \in \llbracket 0 ; n-1 \rrbracket, \left| \min_{[x_k; x_{k+1}[} f_0 - \max_{[x_k; x_{k+1}[} f_0 \right| \leq \varepsilon.$$

D'où  $\forall t \in [a ; b]$ ,  $|\varphi(t) - \psi(t)| \leq \varepsilon$  donc  $\forall t \in [a ; b]$ ,  $\psi(t) - \varphi(t) \leq \varepsilon$ .

D'où  $\psi \leq \varphi + \varepsilon$ .

Finalement, on a obtenu :

$$\begin{cases} \varphi \leq f_0 \leq \psi \\ \psi \leq \varphi + \varepsilon \end{cases}$$

D'où, en posant  $\varphi_1 = \varphi + \varphi_0$  et  $\psi_1 = \psi + \psi_0$  :

$$\begin{cases} \varphi_1 \leq f \leq \psi_1 \\ \psi_1 \leq \varphi_1 + \varepsilon \end{cases}$$

On a donc  $\varphi_1 \in \mathcal{E}_-$  et  $\psi_1 \in \mathcal{E}_+$  donc

$$\begin{cases} \int_a^b \varphi_1 \leq I_-(f) \\ \int_a^b \psi_1 \geq I_+(f) \end{cases}$$

Or  $\psi_1 \leq \varphi_1 + \varepsilon$  donc

$$\int_a^b \psi_1 \leq \int_a^b \varphi_1 + (b-a)\varepsilon.$$

D'où

$$I_+(f) \leq \int_a^b \psi_1 \leq \int_a^b \varphi_1 + (b-a)\varepsilon \leq I_-(f) + (b-a)\varepsilon.$$

D'où, avec  $\varepsilon \rightarrow 0$  :

$$I_+(f) \leq I_-(f).$$

Donc  $I_-(f) = I_+(f)$ . ■

#### Remarque 11.24

Seule l'intégration des fonctions continues par morceaux est au programme, mais la construction précédente (due au mathématicien Gaston Darboux) s'applique à toute fonction  $f$  bornée sur  $[a ; b]$  (afin que les ensembles  $\mathcal{E}_-$  et  $\mathcal{E}_+$  ne soient pas vides) et telle que  $I_-(f) = I_+(f)$ . Une telle fonction est dite Riemann-intégrable ou Darboux-intégrable.

Par exemple, la fonction  $f$  de l'Exemple 11.11 n'est pas continue par morceaux mais est Riemann-intégrable.

Il existe une autre théorie plus récente (1901) et plus satisfaisante pour définir l'intégrale d'une fonction réelle ou complexe, due à Henri Lebesgue (hors-programme).

---

**Définition 11.25 (Cas d'une fonction à valeurs complexes)**

Soit  $f \in \mathcal{C}_m^0([a; b], \mathbb{C})$ .

On note  $f_1, f_2 \in \mathcal{C}_m^0([a; b], \mathbb{R})$  les fonctions réelles telles que  $f = f_1 + i f_2$ .

L'intégrale de  $f$  sur  $[a; b]$  est définie par :

$$\int_{[a;b]} f = \int_{[a;b]} f_1 + i \int_{[a;b]} f_2.$$

---

*Remarque 11.26 (Pour se ramener à des fonctions continues)*

Soient  $f \in \mathcal{C}_m^0([a; b], \mathbb{K})$  et  $a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$  une subdivision adaptée à  $f$ , c'est-à-dire telle que pour tout  $j \in \llbracket 0; n-1 \rrbracket$ , la fonction  $f|_{[x_j; x_{j+1}[}$  admet un prolongement continu  $g_j : [x_j; x_{j+1}] \rightarrow \mathbb{K}$ .

L'intégrale de  $f$  sur  $[a; b]$  est alors

$$\int_{[a;b]} f = \int_a^b f(t) dt = \sum_{j=0}^{n-1} \int_{x_j}^{x_{j+1}} g_j(t) dt.$$

---

**Notation 11.27 (Généralisation)**

Soit  $f \in \mathcal{C}_m^0([a; b], \mathbb{K})$ .

On pose :

$$\forall x, y \in [a; b], \quad \int_x^y f(t) dt = \begin{cases} \int_{[x;y]} f & \text{si } x < y \\ - \int_{[x;y]} f & \text{si } x > y \\ 0 & \text{si } x = y \end{cases}$$

## 11.2 Propriétés

### 11.2.1 Premières propriétés

---

**Proposition 11.28 (Linéarité de l'intégrale)**

On a :

$$\forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, \quad \forall f, g \in \mathcal{C}_m^0([a; b], \mathbb{K}), \quad \int_{[a;b]} (\lambda f + \mu g) = \lambda \int_{[a;b]} f + \mu \int_{[a;b]} g.$$

On dit que l'application  $\mathcal{C}_m^0([a; b], \mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$  est linéaire.

$$f \mapsto \int_{[a;b]} f$$

---

*Remarque 11.29*

Soient  $f, g \in \mathcal{C}_m^0([a; b], \mathbb{K})$ .

Si  $f$  et  $g$  coïncident sauf en un nombre fini de points, alors

$$\int_{[a;b]} f = \int_{[a;b]} g.$$

---

*Démonstration 11.30*

$g - f$  est une fonction en escalier nulle partout sauf en un nombre fini de points donc  $\int_a^b (g - f) = 0$ .

D'où, par linéarité de l'intégrale :  $\int_a^b g - \int_a^b f = 0$ . ■

---

**Proposition 11.31 (Relation de Chasles)**

Soit  $f \in \mathcal{C}_m^0([a; b], \mathbb{K})$ .

On a :

$$\forall x, y, z \in [a; b], \quad \int_x^y f(t) dt = \int_x^z f(t) dt + \int_z^y f(t) dt.$$

---

**Proposition 11.32 (Inégalité triangulaire intégrale<sup>1</sup>)**

On a :

$$\forall f \in \mathcal{C}_m^0([a; b], \mathbb{K}), \quad \left| \int_{[a;b]} f \right| \leq \int_{[a;b]} |f|.$$

---

**Proposition 11.33 (Positivité et croissance de l'intégrale)**

Soient  $a, b \in \mathbb{R}$  tels que  $a \leq b$  et  $f, g \in \mathcal{C}_m^0([a; b], \mathbb{K})$ .

On a

$$f \geq 0 \implies \int_a^b f(t) dt \geq 0 \quad (\text{positivité})$$

et

$$f \leq g \implies \int_a^b f(t) dt \leq \int_a^b g(t) dt \quad (\text{croissance}).$$

---

1. Dans les programmes précédents (donc dans les annales de concours), cette inégalité était appelée « inégalité de la moyenne ».

---

*Démonstration 11.34 (Positivité)*

Supposons  $f \geq 0$ .

La fonction nulle  $\varphi_0 : [a ; b] \longrightarrow \mathbb{K}$  appartient à  $\mathcal{E}_-$  donc on a

$$t \longmapsto 0$$

$$\int_a^b f = \sup_{\varphi \in \mathcal{E}_-} \int_a^b \varphi \geq \int_a^b \varphi_0.$$

■

---

*Démonstration 11.35 (Croissance)*

Supposons  $f \leq g$ .

Alors  $0 \leq g - f$ .

Donc selon la positivité de l'intégrale, on a  $0 \leq \int_a^b (g - f)$ .

D'où, par linéarité de l'intégrale :  $0 \leq \int_a^b g - \int_a^b f$ .

■

---

**Proposition 11.36**

On suppose  $a < b$ .

Soit  $f : [a ; b] \longrightarrow \mathbb{R}$  continue.

On a

$$\left[ f \geq 0 \quad \text{et} \quad \int_a^b f(t) dt = 0 \right] \implies f = 0.$$

*NB : l'implication est fausse pour les fonctions continues par morceaux.*

---

*Démonstration 11.37*

On suppose  $f$  continue et positive.

Montrons que  $\int_a^b f(t) dt = 0 \implies f = 0$  par contraposée.

Supposons  $f \neq 0$ .

Montrons que  $\int_a^b f(t) dt \neq 0$ .

Soit  $x_0 \in [a ; b]$  tel que  $f(x_0) \neq 0$ .

Supposons  $x_0 \neq a$  et  $x_0 \neq b$ .

On a  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$  car  $f$  est continue en  $x_0$  et  $f(x_0) > 0$  car  $f(x_0) \neq 0$  et  $f \geq 0$ .

Donc  $\frac{f(x_0)}{2} < \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ .

Il existe  $\delta \in \mathbb{R}_+^*$  tel que

$$\begin{cases} ]x_0 - \delta ; x_0 + \delta[ \subseteq [a ; b] \\ \forall t \in ]x_0 - \delta ; x_0 + \delta[ , \quad \frac{f(x_0)}{2} < f(t) \end{cases}$$

car  $[a ; b]$  est un voisinage de  $x_0$  et car  $f$  est continue en  $x_0$ .

Posons  $\varphi : [a ; b] \rightarrow \mathbb{R}$

$$t \mapsto \begin{cases} \frac{f(x_0)}{2} & \text{si } |t - x_0| \leq \delta \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

On a  $\varphi \leq f$  donc par croissance de l'intégrale, on a

$$0 < \delta f(x_0) = 2\delta \frac{f(x_0)}{2} = \int_a^b \varphi \leq \int_a^b f.$$

De même si  $x_0 = a$  ou  $x_0 = b$ , on obtient  $\int_a^b f \geq \delta \frac{f(x_0)}{2} > 0$ . ■

## 11.2.2 Sommes de Riemann

### Proposition 11.38 (Convergence des sommes de Riemann)

Soit  $f \in \mathcal{C}_m^0([a ; b], \mathbb{K})$ .

On a :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right) = \int_a^b f(t) dt.$$

*Démonstration 11.39 (Cas où  $f$  est une fonction lipschitzienne)*

On pose  $\forall k \in \llbracket 0 ; n-1 \rrbracket$ ,  $x_k = a + k \frac{b-a}{n}$ .

On pose  $\forall n \in \mathbb{N}^*$ ,  $R_n(f) = \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k)$ .

On a :

$$\begin{aligned} \int_a^b f(t) dt - R_n(f) &= \sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(t) dt - \sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x_k) dt \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} [f(t) - f(x_k)] dt. \end{aligned}$$

Soit  $K \in \mathbb{R}_+$  tel que  $f$  est  $K$ -lipschitzienne.

On a :

$$\forall k \in \llbracket 0 ; n-1 \rrbracket, \quad \forall t \in [x_k ; x_{k+1}], \quad |f(t) - f(x_k)| \leq K |t - x_k|.$$

Donc on a :

$$\begin{aligned} \forall k \in \llbracket 0 ; n-1 \rrbracket, \quad \left| \int_{x_k}^{x_{k+1}} [f(t) - f(x_k)] dt \right| &\leq \int_{x_k}^{x_{k+1}} |f(t) - f(x_k)| dt && \text{(inégalité triangulaire intégrale)} \\ &\leq \int_{x_k}^{x_{k+1}} K (t - x_k) dt && \text{(croissance de l'intégrale)} \\ &= \left[ K \frac{(t - x_k)^2}{2} \right]_{x_k}^{x_{k+1}} \\ &= \frac{K}{2} \left( \frac{b - a}{n} \right)^2 \end{aligned}$$

D'où :

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f(t) dt - R_n(f) \right| &\leq \sum_{k=0}^{n-1} \left| \int_{x_k}^{x_{k+1}} [f(t) - f(x_k)] dt \right| \\ &\leq \sum_{k=0}^{n-1} \frac{K}{2} \frac{(b - a)^2}{n^2} \\ &= \frac{K}{2} \frac{(b - a)^2}{n}. \end{aligned}$$

$$\text{Or } \lim_n \frac{K}{2} \frac{(b - a)^2}{n} = 0.$$

Donc selon le théorème des gendarmes,  $\lim_n R_n(f) = \int_a^b f(t) dt$ .

L'autre limite en découle car on a

$$\frac{b - a}{n} \sum_{k=1}^n f(x_k) = R_n(f) + \frac{b - a}{n} (f(b) - f(a)) \quad \text{et} \quad \begin{cases} \lim_n R_n(f) = \int_a^b f(t) dt \\ \lim_n \frac{b - a}{n} (f(b) - f(a)) = 0 \end{cases}$$

■

---

*Démonstration 11.40 (Cas où  $f$  est une fonction continue)*

Cf. Exercice 11.25.

■

### 11.2.3 Théorème fondamental

#### Définition 11.41

On appelle primitive d'une fonction  $f$  toute fonction dérivable  $F$  dont la dérivée est  $f$  :

$$F' = f.$$

#### Proposition 11.42 (Unicité à une constante additive près)

Soient  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$  et  $f : I \longrightarrow \mathbb{K}$ .

On suppose que  $F_1, F_2 \in \mathcal{F}(I, \mathbb{K})$  sont des primitives de  $f$ .

Alors

$$\exists c \in \mathbb{K}, F_2 = F_1 + c.$$

*Démonstration 11.43*

On a  $(F_2 - F_1)' = f - f = 0$ .

Donc la fonction  $F_2 - F_1$  est constante sur l'intervalle  $I$  :  $\exists c \in \mathbb{K}, F_2 - F_1 = c$ .

Donc  $\exists c \in \mathbb{K}, F_2 = F_1 + c$ . ■

#### Théorème 11.44 (Théorème fondamental de l'analyse)

Soient  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$ ,  $f : I \longrightarrow \mathbb{K}$  continue et  $x_0 \in I$ .

Alors la fonction

$$\begin{aligned} F : I &\longrightarrow \mathbb{K} \\ x &\longmapsto \int_{x_0}^x f(t) \, dt \end{aligned}$$

est une primitive de  $f$  sur  $I$  (c'est l'unique primitive de  $f$  qui s'annule en  $x_0$ ).

*Démonstration 11.45*

Soit  $x \in I$ .

Montrons que  $\lim_{\substack{x' \rightarrow x \\ x' \neq x}} \frac{F(x') - F(x)}{x' - x} = f(x)$ , c'est-à-dire

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists \delta \in \mathbb{R}_+^*, \forall x' \in I, |x' - x| \leq \delta \implies \left| \frac{F(x') - F(x)}{x' - x} - f(x) \right| \leq \varepsilon.$$

Soit  $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$ .

Soit  $\delta \in \mathbb{R}_+^*$  tel que

$$\forall x'' \in I, |x - x''| \leq \delta \implies |f(x) - f(x'')| \leq \varepsilon.$$

Un tel  $\delta$  existe car  $f$  est continue en  $x$ .

Soit  $x' \in I$  tel que  $|x - x'| \leq \delta$ .

On a, selon la relation de Chasles :

$$F(x') - F(x) = \int_x^{x'} f(t) dt.$$

D'où

$$\begin{aligned} |F(x') - F(x) - (x' - x) f(x)| &= \left| \int_x^{x'} f(t) dt - \int_x^{x'} f(x) dt \right| \\ &= \left| \int_x^{x'} (f(t) - f(x)) dt \right| \\ &\leq \left| \int_x^{x'} |f(t) - f(x)| dt \right| \\ &\leq \left| \int_x^{x'} \varepsilon dt \right| \\ &= \varepsilon |x' - x|. \end{aligned}$$

D'où, si  $x \neq x'$  :

$$\left| \frac{F(x') - F(x)}{x' - x} \right| \leq \varepsilon.$$

Donc  $\delta$  convient.

D'où  $F'(x) = f(x)$ . ■

### Corollaire 11.46 (Existence de primitives)

*Toute fonction continue sur un intervalle admet une primitive.*

### Exercice 11.47

Donner une primitive des fonctions suivantes (à l'aide d'une intégrale) :

(1)  $\text{Arctan} : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$

(2)  $f : x \longmapsto \frac{1}{\sqrt{\text{Arcsin } x}}$



---

*Correction 11.48 (1)*

On a la primitive de Arctan suivante :

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \int_0^x \text{Arctan } t \, dt \end{array}$$

---

*Correction 11.49 (2)*

$f$  est bien définie sur  $]0 ; 1]$ .

On a la primitive suivante :

$$\begin{array}{ccc} ]0 ; 1] & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \int_1^x \frac{dt}{\sqrt{\text{Arcsin } t}} \end{array}$$

---

**Corollaire 11.50**

Soient  $f : [a ; b] \longrightarrow \mathbb{K}$  continue et  $F : [a ; b] \longrightarrow \mathbb{K}$  une primitive de  $f$ .

Alors

$$\int_a^b f(t) \, dt = F(b) - F(a).$$

L'accroissement  $F(b) - F(a)$  est noté :

$$[F(t)]_a^b \quad \text{ou} \quad [F(t)]_{t=a}^b.$$

---

*Démonstration 11.51*

Posons  $G : [a ; b] \longrightarrow \mathbb{K}$

$$x \longmapsto \int_a^x f(t) \, dt$$

Les fonctions  $F$  et  $G$  sont des primitives de  $f$  sur l'intervalle  $[a ; b]$ .

Il existe donc  $c \in \mathbb{K}$  tel que  $\forall x \in [a ; b], \quad G(x) = F(x) + c$ .

En particulier, si  $x = a : 0 = G(a) = F(a) + c$ .

Donc  $c = -F(a)$  et  $\forall x \in [a ; b], \quad G(x) = F(x) - F(a)$ .

D'où, en prenant  $x = b$  :

$$\int_a^b f(t) \, dt = G(b) = F(b) - F(a).$$

■

---

**Corollaire 11.52**

Soit  $g \in \mathcal{C}^1([a; b], \mathbb{K})$ .

On a :

$$g(b) - g(a) = \int_a^b g'(t) dt.$$

---

*Démonstration 11.53*

Découle du Corollaire 11.50 en prenant  $\begin{cases} f = g' \\ F = g \end{cases}$

■

## 11.2.4 Intégration par parties

---

**Proposition 11.54**

Soient  $f, g \in \mathcal{C}^1([a; b], \mathbb{K})$ .

On a

$$\int_a^b f(t) g'(t) dt = [f(t) g(t)]_a^b - \int_a^b f'(t) g(t) dt.$$

---

*Démonstration 11.55*

La fonction  $fg$  est de classe  $\mathcal{C}^1$ .

On a donc :

$$\begin{aligned} [f(t) g(t)]_a^b &= \int_a^b (fg)'(t) dt \\ &= \int_a^b f'(t) g(t) dt + \int_a^b g'(t) f(t) dt. \end{aligned}$$

■

---

**Exercice/Exemple 11.56**

(1) Calculer une primitive de  $\ln$  sur  $\mathbb{R}_+^*$ .

(2) Calculer  $\int_0^1 \operatorname{Arctan} t dt$ .

(3) Calculer une primitive de  $t \mapsto t^2 \ln t$  sur  $\mathbb{R}_+^*$ .

(4) Calculer une primitive de  $t \mapsto te^t$  sur  $\mathbb{R}$ .

(5) Calculer une primitive de  $t \mapsto t^2 \cos t$  sur  $\mathbb{R}$ .

---

*Correction 11.57 (1)*

On a la primitive

$$\begin{aligned}x \mapsto \int_1^x \ln t \, dt &= [t \ln t]_1^x - \int_1^x t \frac{1}{t} \, dt \\&= x \ln x - (x - 1)\end{aligned}$$

Donc une autre primitive est  $x \mapsto x \ln x - x$ .

---

*Correction 11.58 (2)*

On a :

$$\begin{aligned}\int_0^1 \operatorname{Arctan} t \, dt &= [t \operatorname{Arctan} t]_0^1 - \int_0^1 \frac{t}{1+t^2} \, dt \\&= \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{2t}{t^2+1} \, dt \\&= \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \left[ \ln(t^2+1) \right]_0^1 \\&= \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \ln 2.\end{aligned}$$

---

*Correction 11.59 (3)*

On a la primitive

$$\begin{aligned}x \mapsto \int_1^x t^2 \ln t \, dt &= \left[ \frac{t^3}{3} \ln t \right]_1^x - \int_1^x \frac{t^3}{3} \times \frac{1}{t} \, dt \\&= \frac{x^3 \ln x}{3} - \left[ \frac{t^3}{9} \right]_1^x \\&= \frac{x^3 \ln x}{3} - \frac{x^3}{9} + \frac{1}{9} \\&= \frac{x^3 (3 \ln x - 1) + 1}{9}.\end{aligned}$$

---

*Correction 11.60 (4)*

On a la primitive

$$\begin{aligned}x \mapsto \int_0^x t e^t \, dt &= [t e^t]_0^x - \int_0^x e^t \, dt \\&= x e^x - e^x + 1 \\&= e^x (x - 1) + 1.\end{aligned}$$

---

Correction 11.61 (5)

On a la primitive

$$\begin{aligned}x &\mapsto \int_0^x t^2 \cos t \, dt = [t^2 \sin t]_0^x - \int_0^x 2t \sin t \, dt \\&= x^2 \sin x - [-2t \cos t]_0^x + \int_0^x -2 \cos t \, dt \\&= x^2 \sin x + 2x \cos x - 2 \sin x.\end{aligned}$$

## 11.2.5 Formules de Taylor

---

**Théorème 11.62 (Formule de Taylor avec reste intégral)**

Soient  $n \in \mathbb{N}$  et  $f \in \mathcal{C}^{n+1}([a; b], \mathbb{K})$ .

On a

$$f(b) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k + \int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) \, dt.$$

---

Démonstration 11.63

On raisonne par récurrence finie.

On note

$$\forall m \in \llbracket 0; n \rrbracket, \quad f(b) = \underbrace{\sum_{k=0}^m \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k + \int_a^b \frac{(b-t)^m}{m!} f^{(m+1)}(t) \, dt}_{\mathcal{P}(m)}.$$

On a bien  $f(b) = f(a) + \int_a^b f'(t) \, dt$  car  $f \in \mathcal{C}^1([a; b], \mathbb{K})$ , d'où  $\mathcal{P}(0)$ .

Soit  $m \in \llbracket 0; n-1 \rrbracket$  tel que  $\mathcal{P}(m)$ .

Montrons  $\mathcal{P}(m+1)$ .

On peut intégrer la fonction  $t \mapsto \frac{(b-t)^m}{m!} f^{(m+1)}(t)$  car les fonctions  $t \mapsto \frac{-(b-t)^{m+1}}{(m+1)!}$  et  $f^{(m+1)}$  sont de classe  $\mathcal{C}^1$ .

D'où

$$\begin{aligned}\int_a^b \frac{(b-t)^m}{m!} f^{(m+1)}(t) \, dt &= \left[ \frac{-(b-t)^{m+1}}{(m+1)!} f^{(m+1)}(t) \right]_a^b - \int_a^b \frac{-(b-t)^{m+1}}{(m+1)!} f^{(m+2)}(t) \, dt \\&= 0 - \frac{-(b-a)^{m+1}}{(m+1)!} f^{(m+1)}(a) + \int_a^b \frac{(b-t)^{m+1}}{(m+1)!} f^{(m+2)}(t) \, dt.\end{aligned}$$

D'où, selon  $\mathcal{P}(m)$  :

$$\begin{aligned} f(b) &= \sum_{k=0}^m \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k + \frac{(b-a)^{m+1}}{(m+1)!} f^{(m+1)}(a) + \int_a^b \frac{(b-t)^{m+1}}{(m+1)!} f^{(m+2)}(t) dt \\ &= \sum_{k=0}^{m+1} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k + \int_a^b \frac{(b-t)^{m+1}}{(m+1)!} f^{(m+2)}(t) dt. \end{aligned}$$

D'où  $\mathcal{P}(m+1)$ .

D'où, par récurrence :  $\mathcal{P}(n)$ . ■

### Corollaire 11.64 (Inégalité de Taylor-Lagrange)

Soient  $n \in \mathbb{N}$ ,  $f \in \mathcal{C}^{n+1}([a; b], \mathbb{K})$  et  $M \in \mathbb{R}_+$  tel que  $\forall x \in [a; b], \quad |f^{(n+1)}(x)| \leq M$ .

Alors

$$\left| f(b) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k \right| \leq \frac{M}{(n+1)!} (b-a)^{n+1}.$$

### Démonstration 11.65

On a, selon la formule de Taylor avec reste intégral :

$$\begin{aligned} \left| f(b) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k \right| &= \left| \int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt \right| \\ &\leq \int_a^b \left| \frac{(b-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) \right| dt && \left. \begin{array}{l} \text{inégalité triangulaire} \\ \text{intégrale} \end{array} \right\} \\ &\leq \int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!} M dt && \left. \begin{array}{l} \text{croissance de l'intégrale} \end{array} \right\} \\ &\leq \frac{M}{n!} \left[ \frac{(b-t)^{n+1}}{n+1} \right]_a^b \\ &= \frac{M}{n!} \left( 0 - \frac{(b-a)^{n+1}}{n+1} \right) \\ &= \frac{M}{(n+1)!} (b-a)^{n+1}. \end{aligned} \quad \text{■}$$

### Exemple 11.66

Soit  $x \in \mathbb{R}_+$ .

Prenons  $a = 0$ ,  $b = x$ ,  $f = \exp$  et  $n = 3$ .

On a

$$\begin{aligned} \left| e^x - \left( 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} \right) \right| &\leq \frac{\max_{[0;x]} \exp}{4!} x^4 \\ &= \frac{e^x x^4}{24}. \end{aligned}$$

## 11.2.6 Changements de variable

### Théorème 11.67

Soient  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$ ,  $f \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$  et  $u \in \mathcal{C}^1([a; b], \mathbb{R})$  telle que  $\text{Im } u \subseteq I$ .

On a

$$\int_{u(a)}^{u(b)} f(t) dt = \int_a^b f(u(s)) u'(s) ds.$$

On dit qu'on fait le changement de variable  $\begin{cases} t = u(s) \\ dt = u'(s) ds \end{cases}$

### Démonstration 11.68

Posons  $g : [a; b] \longrightarrow \mathbb{R}$

$$x \longmapsto \int_{u(a)}^{u(x)} f(t) dt - \int_a^x f(u(s)) u'(s) ds$$

Montrons que  $g$  est dérivable.

La fonction  $[a; b] \longrightarrow \mathbb{K}$  est continue car  $\begin{cases} f \text{ est continue} \\ u \text{ est de classe } \mathcal{C}^1 \end{cases}$

$$s \longmapsto f(u(s)) u'(s)$$

Donc  $x \longmapsto \int_a^x f(u(s)) u'(s) ds$  est dérivable de dérivée  $x \longmapsto f(u(x)) u'(x)$ .

La fonction  $I \longrightarrow \mathbb{K}$  est dérivable car  $f$  est continue, de dérivée  $y \longmapsto f(y)$ .

$$y \longmapsto \int_{u(a)}^y f(t) dt$$

De plus,  $u$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  donc par composition de fonctions dérivables :  $[a; b] \longrightarrow \mathbb{K}$

$$x \longmapsto \int_{u(a)}^{u(x)} f(t) dt$$

est dérivable de dérivée  $[a; b] \longrightarrow \mathbb{K}$

$$x \longmapsto u'(x) f(u(x))$$

Finalement,  $g$  est dérivable de dérivée nulle.

Donc  $g$  est constante sur l'intervalle  $[a; b]$ .

Enfin,  $g(a) = 0 - 0 = 0$ .

Donc  $g$  est nulle, d'où la formule énoncée. ■

### Remarque 11.69

Si  $f$  était continue par morceaux alors  $s \longmapsto f(u(s)) u'(s)$  pourrait ne pas être continue par morceaux.

---

**Exercice/Exemple 11.70**

- (1) Calculer  $I = \int_{-1}^0 \frac{t}{t^2 + 2t + 2} dt$ .
- (2) Calculer une primitive de  $\frac{1}{\operatorname{ch}}$ .
- (3) Calculer une primitive de  $f : x \mapsto \frac{1}{x \ln x \ln(\ln x)}$ .

---

*Correction 11.71 (1)*

On a  $I = \int_{-1}^0 \frac{t}{(t+1)^2 + 1} dt$ .

On fait le changement de variable

$$\begin{cases} u = t + 1 \\ du = dt \end{cases} \iff \begin{cases} t = u - 1 \\ dt = du \end{cases}$$

Donc

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \frac{u-1}{u^2+1} du \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{2u}{u^2+1} du - \int_0^1 \frac{du}{u^2+1} \\ &= \frac{1}{2} \left[ \ln(u^2+1) \right]_0^1 - [\operatorname{Arctan} u]_0^1 \\ &= \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

---

*Correction 11.72 (2)*

Une primitive de  $\frac{1}{\operatorname{ch}}$  est  $F : x \mapsto \int_0^x \frac{1}{\operatorname{ch} t} dt = \int_0^x \frac{2}{e^t + e^{-t}} dt$ .

On fait le changement de variable

$$\begin{cases} u = e^t \\ du = e^t dt \end{cases} \iff \begin{cases} t = \ln u \\ dt = \frac{du}{u} \end{cases}$$

On a

$$\begin{aligned} F : x \mapsto \int_0^x \frac{2}{e^t + e^{-t}} dt &= \int_1^{e^x} \frac{2}{u^2 + 1} du \\ &= 2 [\operatorname{Arctan} u]_1^{e^x} \\ &= 2 \operatorname{Arctan} e^x - \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

---

*Correction 11.73 (3)*

Une primitive de  $f$  est  $F : x \mapsto \int_{10}^x \frac{1}{t \ln t \ln(\ln t)} dt$ .

On fait le changement de variable

$$\begin{cases} u = \ln t \\ du = \frac{dt}{t} \end{cases} \iff \begin{cases} t = e^u \\ dt = e^u du \end{cases}$$

Donc

$$\begin{aligned} F : x \mapsto \int_{\ln 10}^{\ln x} \frac{e^u}{e^u u \ln u} du &= \int_{\ln 10}^{\ln x} \frac{1}{u \ln u} du \\ &= \int_{\ln 10}^{\ln x} \frac{\frac{1}{u}}{\ln u} du \\ &= [\ln |\ln u|]_{\ln 10}^{\ln x} \\ &= \ln(\ln(\ln x)) - \ln(\ln(\ln 10)). \end{aligned}$$

Donc une primitive de  $f$  est  $x \mapsto \ln(\ln(\ln x))$ .

---

## Notation 11.74 (Officielle)

On peut noter  $x \mapsto \int_{-x}^x f(t) dt$  une primitive de la fonction continue  $f$ .

## 11.2.7 Symétries

---

### Proposition 11.75

Soient  $\alpha \in \mathbb{R}_+$  et  $f \in \mathcal{C}_m^0([- \alpha ; \alpha ], \mathbb{K})$ .

Si  $f$  est impaire alors

$$\int_{-\alpha}^{\alpha} f(t) dt = 0.$$

Si  $f$  est paire, alors

$$\int_{-\alpha}^{\alpha} f(t) dt = 2 \int_0^{\alpha} f(t) dt.$$



---

*Démonstration 11.76 (Dans le cas continu)*

On a

$$\begin{aligned}\int_{-\alpha}^0 f(t) dt &= \int_{\alpha}^0 -f(-u) du \quad \text{avec} \quad \begin{cases} u = -t \\ du = -dt \end{cases} \quad \text{car} \quad \begin{cases} f \text{ est de classe } \mathcal{C}^0 \\ t \mapsto -t \text{ est de classe } \mathcal{C}^1 \end{cases} \\ &= \int_0^{\alpha} f(-u) du \\ &= \begin{cases} -\int_0^{\alpha} f(u) du & \text{si } f \text{ est impaire} \\ \int_0^{\alpha} f(u) du & \text{si } f \text{ est paire} \end{cases}\end{aligned}$$

D'où le résultat (car  $\int_{-\alpha}^{\alpha} f(t) dt = \int_{-\alpha}^0 f(t) dt + \int_0^{\alpha} f(t) dt$ ). ■

---

**Proposition 11.77**

Soient  $f \in \mathcal{C}_m^0(\mathbb{R}, \mathbb{K})$  et  $T \in \mathbb{R}_+^*$ .

On suppose que  $f$  est  $T$ -périodique.

Alors

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \int_x^{x+T} f(t) dt = \int_0^T f(t) dt.$$

---

*Démonstration 11.78 (Dans le cas continu)*

On pose  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K}$

$$x \mapsto \int_x^{x+T} f(t) dt$$

$$\text{On a } \forall x \in \mathbb{R}, \quad g(x) = \int_0^{x+T} f(t) dt - \int_0^x f(t) dt.$$

Donc  $g$  est dérivable et  $\forall x \in \mathbb{R}, \quad g'(x) = f(x+T) - f(x) = 0$ .

Donc  $g$  est constante sur l'intervalle  $\mathbb{R}$ .

D'où le résultat. ■

## 11.3 Techniques de calcul

### 11.3.1 Utiliser les nombres complexes

---

*Rappel 11.79*

Soit  $\alpha \in \mathbb{C}$ .

La fonction  $\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{C}$  est dérivable de dérivée  $\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{C}$   
 $x \longmapsto e^{\alpha x} \qquad x \longmapsto \alpha e^{\alpha x}$

---

*Exemple 11.80*

Calculons une primitive de  $f : x \longmapsto e^{2x} \sin x$ .

On a  $f = \operatorname{Im} g$  en posant  $g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{C}$   
 $x \longmapsto e^{(2+i)x}$

On a

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R}, \quad \int^x g(t) dt &= \int^x e^{(2+i)t} dt \\ &= \left[ \frac{1}{2+i} e^{(2+i)t} \right]^x \\ &= \frac{1}{2+i} e^{(2+i)x} \\ &= \frac{(2-i) e^{(2+i)x}}{5} \\ &= \frac{2}{5} e^{2x} \cos x + \frac{2i}{5} e^{2x} \sin x - \frac{i}{5} e^{2x} \cos x + \frac{1}{5} e^{2x} \sin x. \end{aligned}$$

Donc  $\int^x f(t) dt = \frac{e^{2x}}{5} (2 \sin x - \cos x)$ .

### 11.3.2 Primitives des fonctions rationnelles

---

*Exemple 11.81*

Calculons une primitive de  $f : x \longmapsto \frac{3}{x^3 - 1}$  (sur  $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ ).

Calculons la décomposition en éléments simples de  $\frac{3}{X^3 - 1}$ .

On a  $X^3 - 1 = (X - 1)(X^2 + X + 1)$ .

Donc  $\frac{3}{X^3 - 1} = \frac{a}{X - 1} + \frac{bX + c}{X^2 + X + 1}$  avec  $a, b, c \in \mathbb{R}$ .

Donc  $\frac{3}{X^3 - 1} = \frac{a(X^2 + X + 1) + (X - 1)(bX + c)}{X^3 - 1}$ .

Donc  $3 = aX^2 + aX + a + bX^2 + (c - b)X - c$ .

$$\text{Donc } \begin{cases} a + b = 0 \\ a - b + c = 0 \\ a - c = 3 \end{cases}$$

$$\text{Donc } \begin{cases} a = 1 \\ b = -1 \\ c = -2 \end{cases}$$

$$\text{Donc } \frac{3}{X^3 - 1} = \frac{1}{X - 1} - \frac{X + 2}{X^2 + X + 1}.$$

D'où

$$\int^x \frac{3}{t^3 - 1} dt = \int^x \frac{dt}{t - 1} - \int^x \frac{t + 2}{t^2 + t + 1} dt.$$

$$\text{Or } \int^x \frac{dt}{t - 1} = [\ln |t - 1|]^x = \ln |x - 1|.$$

$$\text{De plus, } \int^x \frac{t + 2}{t^2 + t + 1} dt = \int^x \frac{t + 2}{\left(t + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} dt = \int^x \frac{t + 2}{\frac{3}{4} \left( \left( \frac{2}{\sqrt{3}} \left( t + \frac{1}{2} \right) \right)^2 + 1 \right)} dt.$$

On fait le changement de variable

$$\begin{cases} u = \frac{2}{\sqrt{3}} \left( t + \frac{1}{2} \right) \\ du = \frac{2}{\sqrt{3}} dt \end{cases} \iff \begin{cases} t = \frac{\sqrt{3}}{2} u - \frac{1}{2} \\ dt = \frac{\sqrt{3}}{2} du \end{cases}$$

D'où

$$\begin{aligned} \int^x \frac{t + 2}{t^2 + t + 1} dt &= \int^{\frac{2}{\sqrt{3}}(x+\frac{1}{2})} \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}u - \frac{1}{2} + 2}{\frac{3}{4}(u^2 + 1)} du \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}} \int^{\frac{2}{\sqrt{3}}(x+\frac{1}{2})} \frac{\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}}{u^2 + 1} du \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}} \left[ \frac{\sqrt{3}}{4} \ln(u^2 + 1) + \frac{3}{2} \operatorname{Arctan} u \right]^{\frac{2}{\sqrt{3}}(x+\frac{1}{2})} \\ &= \frac{1}{2} \ln \left( \frac{4}{3} \left( x + \frac{1}{2} \right)^2 + 1 \right) + \sqrt{3} \operatorname{Arctan} \left( \frac{2}{\sqrt{3}} \left( x + \frac{1}{2} \right) \right) \\ &= \frac{1}{2} \ln \left( \frac{4}{3} (x^2 + x + 1) \right) + \sqrt{3} \operatorname{Arctan} \frac{2x + 1}{\sqrt{3}}. \end{aligned}$$

Donc une primitive de  $f$  est

$$x \longmapsto \ln |x - 1| - \frac{1}{2} \ln \left( \frac{4}{3} (x^2 + x + 1) \right) - \sqrt{3} \operatorname{Arctan} \frac{2x + 1}{\sqrt{3}}.$$

---

**Proposition 11.82**

On peut primitiver toute fonction rationnelle en écrivant sa décomposition en éléments simples sur  $\mathbb{R}$ .

---

*Remarque 11.83*

C'est suffisant, pas nécessaire.

Par exemple : 
$$\int_0^1 \frac{t^7}{t^8+1} dt = \left[ \frac{1}{8} \ln(t^8+1) \right]_0^1 = \frac{\ln 2}{8}.$$

---

*Démonstration 11.84*

On peut primitiver chaque terme de la décomposition en éléments simples sur  $\mathbb{R}$  :

La partie entière : c'est un polynôme.

Les termes de la forme  $t \mapsto \frac{1}{t-\lambda}$  avec  $\lambda \in \mathbb{R}$  : primitive

$$t \mapsto \ln |t - \lambda|.$$

Les termes de la forme  $t \mapsto \frac{1}{(t-\lambda)^\alpha} = (t-\lambda)^{-\alpha}$  où  $\begin{cases} \lambda \in \mathbb{R} \\ \alpha \in \llbracket 2 ; +\infty \llbracket \end{cases}$  : primitive

$$t \mapsto \frac{1}{1-\alpha} (t-\lambda)^{1-\alpha}.$$

Les termes de la forme  $t \mapsto \frac{\lambda t + \mu}{t^2 + bt + c}$  avec  $\begin{cases} \lambda, \mu \in \mathbb{R} \\ b, c \in \mathbb{R} \text{ tels que } \Delta = b^2 - 4c < 0 \end{cases}$  :

Par un changement de variable affine, on se ramène à

$$\int^y \frac{\lambda' u + \mu'}{u^2 + 1} du = \frac{\lambda'}{2} \ln(y^2 + 1) + \mu' \operatorname{Arctan} y$$

et

$$\begin{aligned} \int^x \frac{dt}{t^2 + bt + c} &= \int^x \frac{dt}{\left(t + \frac{b}{2}\right)^2 - \frac{b^2}{4} + c} \\ &= \int^x \frac{dt}{\left(t + \frac{b}{2}\right)^2 - \underbrace{\frac{\Delta}{4}}_{>0}} \\ &= \int^x \frac{dt}{-\frac{\Delta}{4} \left( \left( \frac{\sqrt{-\Delta}}{2} \left(t + \frac{b}{2}\right) \right)^2 + 1 \right)}. \end{aligned}$$

D'où ce qu'on voulait par le changement de variable  $u = \frac{\sqrt{-\Delta}}{2} \left( t + \frac{b}{2} \right)$ .

Les termes de la forme  $t \mapsto \frac{\lambda t + \mu}{(t^2 + bt + c)^\alpha}$  avec  $\begin{cases} \alpha \in \llbracket 2 ; +\infty \llbracket \\ \lambda, \mu, b, c \in \mathbb{R} : \\ b^2 - 4c < 0 \end{cases}$

Quitte à faire un changement de variable affine, on peut supposer  $b = 0$  et  $c = 1$ . Il suffit donc de savoir calculer

$$\int_0^x \frac{\lambda t + \mu}{(t^2 + 1)^\alpha} dt = \underbrace{\lambda \int_0^x t (t^2 + 1)^{-\alpha} dt}_{\frac{\lambda}{2(1-\alpha)} (x^2+1)^{1-\alpha}} + \underbrace{\mu \int_0^x \frac{dt}{(t^2 + 1)^\alpha}}_{I_\alpha(x)}.$$

Reste à calculer  $I_\alpha(x)$  par récurrence sur  $\alpha$ , à l'aide d'une intégration par partie.

En effet :

$$\begin{aligned} \int_0^x (t^2 + 1)^{-\alpha} dt &= \left[ t (t^2 + 1)^{-\alpha} \right]_0^x - \int_0^x t \times 2t (-\alpha) (t^2 + 1)^{-\alpha-1} dt \\ &= \frac{x}{(x^2 + 1)^\alpha} + 2\alpha \int_0^x (t^2 + 1 - 1) (t^2 + 1)^{-\alpha-1} dt \\ &= \frac{x}{(x^2 + 1)^\alpha} + 2\alpha I_\alpha(x) - 2\alpha I_{\alpha+1}(x). \end{aligned}$$

$$\text{D'où } (1 - 2\alpha) I_\alpha(x) = \frac{x}{(x^2 + 1)^\alpha} - 2\alpha I_{\alpha+1}(x).$$

On connaît  $I_1(x)$  (cf. termes de la forme  $t \mapsto \frac{1}{(t - \lambda)^\alpha}$ ).

On en déduit  $I_2, I_3, \dots$  ■

### 11.3.3 Fonctions rationnelles en $e^t$

---

*Exemple 11.85*

$$t \mapsto \frac{1}{\operatorname{ch} t} = \frac{2}{e^t + e^{-t}} = \frac{2e^t}{e^{2t} + 1} \quad \text{et} \quad t \mapsto \frac{e^{2t} + 1}{e^t - 1}$$

---

#### Proposition 11.86

*On remarque*

$$\forall F \in \mathbb{K}(X), \quad \int^x F(e^t) dt = \int^{e^x} \frac{F(u)}{u} du$$

en opérant le changement de variable

$$\begin{cases} u = e^t \\ du = e^t dt \end{cases} \iff \begin{cases} t = \ln u \\ dt = \frac{du}{u} \end{cases}$$

Or  $\frac{F}{X} \in \mathbb{K}(X)$  donc on sait primitiver.

### 11.3.4 Règle de Bioche

---

#### Méthode 11.87

Pour calculer  $\int F(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$  :

- Si  $F(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$  est invariant quand on remplace  $\theta$  par  $-\theta$  :

faire le changement de variable  $t = \cos \theta$ .

- Si  $F(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$  est invariant quand on remplace  $\theta$  par  $\pi - \theta$  :

faire le changement de variable  $t = \sin \theta$ .

- Si  $F(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$  est invariant quand on remplace  $\theta$  par  $\pi + \theta$  :

faire le changement de variable  $t = \tan \theta$ .

- Dans tous les cas, on peut

faire le changement de variable  $t = \tan \frac{\theta}{2}$ .

---

#### Exercice/Exemple 11.88

Calculer une primitive de  $x \mapsto \frac{\sin^3 x}{1 + \cos^2 x}$ .

---

*Correction 11.89*

On a la primitive

$$x \mapsto \int^x \frac{\sin^3 \theta}{1 + \cos^2 \theta} d\theta.$$

On fait le changement de variable  $\begin{cases} t = \cos \theta \\ dt = -\sin \theta d\theta \end{cases}$

Donc

$$\begin{aligned}x &\longmapsto \int^x \frac{\sin^3 \theta}{1 + \cos^2 \theta} \, \mathrm{d}\theta = \int^x \frac{-1 + \cos^2 \theta}{1 + \cos^2 \theta} (-\sin \theta) \, \mathrm{d}\theta \\&= \int^{\cos x} \frac{-1 + t^2}{1 + t^2} \, \mathrm{d}t \\&= \int^{\cos x} \frac{t^2 + 1 - 2}{t^2 + 1} \, \mathrm{d}t \\&= \int^{\cos x} \left(1 - \frac{2}{t^2 + 1}\right) \, \mathrm{d}t \\&= \cos x - 2 \operatorname{Arctan}(\cos x) .\end{aligned}$$

# Chapitre 12

## Espaces vectoriels

### Sommaire

---

<b>12.1</b>	<b>Espaces vectoriels, sous-espaces vectoriels</b>	<b>399</b>
12.1.1	Espaces vectoriels	399
12.1.2	Sous-espaces vectoriels	403
12.1.3	Sommes, sommes directes	405
<b>12.2</b>	<b>Applications linéaires</b>	<b>409</b>
12.2.1	Définitions	409
12.2.2	Opérations sur les applications linéaires	410
12.2.2.1	Cas des applications linéaires	410
12.2.2.2	Cas des endomorphismes	412
12.2.3	Applications linéaires et sous-espaces vectoriels	413
12.2.4	Projecteurs	417
12.2.5	Symétries	422
12.2.6	Isomorphismes, automorphismes	424
<b>12.3</b>	<b>Familles de vecteurs</b>	<b>426</b>
12.3.1	Familles libres	426
12.3.2	Familles génératrices	431
12.3.3	Bases	433
12.3.4	Pivot de Gauss pour les systèmes linéaires	436
12.3.5	Familles de vecteurs et applications linéaires	439
12.3.5.1	Image d'une famille par une application linéaire	439
12.3.5.2	Application linéaire définie par l'image d'une base	441
12.3.6	Extension aux familles quelconques	441
12.3.6.1	Combinaisons linéaires	442
12.3.6.2	Familles génératrices	443
12.3.6.3	Familles libres	443
12.3.6.4	Bases	444
12.3.6.5	Cas des ensembles de vecteurs	444
<b>12.4</b>	<b>Géométrie affine</b>	<b>444</b>
12.4.1	Translations	444
12.4.2	Sous-espaces affines	445
12.4.3	Équations linéaires	448

---

Dans tout le chapitre, on considère un corps  $\mathbb{K}$  (en pratique,  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ ).



---

**Notation 12.1**

Soient  $p \in \mathbb{N}$  et  $x_1, \dots, x_p \in \mathbb{K}$ .

On s'autorise à écrire le  $p$ -uplet  $(x_1, \dots, x_p)$  verticalement (écriture « matricielle ») :

$$(x_1, \dots, x_p) = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^p.$$

## 12.1 Espaces vectoriels, sous-espaces vectoriels

### 12.1.1 Espaces vectoriels

---

**Définition 12.2 ( $\mathbb{K}$ -espace vectoriel)**

On appelle  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel (ou espace vectoriel sur  $\mathbb{K}$ ) tout triplet  $(E, +, \cdot)$  où  $(E, +)$  est un groupe abélien et  $\cdot$  est une application (appelée parfois loi externe) :

$$\begin{aligned} \mathbb{K} \times E &\longrightarrow E \\ (\lambda, x) &\longmapsto \lambda \cdot x = \lambda x \end{aligned}$$

qui vérifient

$$\begin{cases} \forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall x, y \in E, \lambda \cdot (x + y) = \lambda \cdot x + \lambda \cdot y \\ \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, \forall x \in E, (\lambda + \mu) \cdot x = \lambda \cdot x + \mu \cdot x \\ \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, \forall x \in E, (\lambda \mu) \cdot x = \lambda \cdot (\mu \cdot x) \\ \forall x \in E, 1_{\mathbb{K}} \cdot x = x \end{cases}$$

Les éléments de  $E$  sont appelés les vecteurs.

Les éléments de  $\mathbb{K}$  sont appelés les scalaires.

L'élément neutre du groupe abélien  $(E, +)$  est noté  $0$  ou  $0_E$ . Il est appelé le vecteur nul de  $E$ .

Par abus, on dit que  $E$  est un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Un espace vectoriel est nécessairement non-vide (puisqu'il contient son vecteur nul). Si  $E$  ne contient pas d'autre vecteur que le vecteur nul (c'est-à-dire si  $E = \{0_E\}$ ), on dit que  $E$  est l'espace vectoriel nul.

---

**Définition 12.3 (Combinaison linéaire)**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $x_1, \dots, x_n \in E$  (où  $n \in \mathbb{N}$ ).

On appelle combinaison linéaire de  $x_1, \dots, x_n$  tout vecteur de la forme :

$$\lambda_1 \cdot x_1 + \dots + \lambda_n \cdot x_n$$

avec  $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ .

---

#### Exemple 12.4

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . Alors  $\mathbb{K}^n$  est naturellement un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

$\mathbb{K}[X]$  est naturellement un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Soit  $\Omega$  un ensemble quelconque. L'ensemble  $\mathcal{F}(\Omega, \mathbb{K})$  des fonctions de  $\Omega$  dans  $\mathbb{K}$  est naturellement un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

L'ensemble  $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$  des suites d'éléments de  $\mathbb{K}$  est naturellement un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Soient  $E_1, \dots, E_m$  des  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. On rappelle que l'ensemble produit  $E_1 \times \dots \times E_m$  est formé des  $m$ -uplets de la forme  $(x_1, \dots, x_m)$  où  $x_1 \in E_1, \dots, x_m \in E_m$ . L'ensemble  $E_1 \times \dots \times E_m$  est naturellement un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

---

#### Reformulation 12.5 (Concrète)

La reformulation suivante n'est ici que pour faire le point sur les opérations autorisées dans un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel (à lire simplement, la définition à connaître est la Définition 12.2).

Un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel est un triplet  $(E, +, \cdot)$  où  $E$  est un ensemble,  $+$  est une fonction de  $E \times E$  dans  $E$  et  $\cdot$  est une fonction de  $\mathbb{K} \times E$  dans  $E$  :

$$\begin{array}{ccc} E \times E & \longrightarrow & E \\ (x, y) & \longmapsto & x + y \end{array} \quad \text{et} \quad \begin{array}{ccc} \mathbb{K} \times E & \longrightarrow & E \\ (\lambda, x) & \longmapsto & \lambda \cdot x = \lambda x \end{array}$$

qui vérifient

$$\left\{ \begin{array}{l} \forall x, y, z \in E, \quad (x + y) + z = x + (y + z) \\ \forall x, y \in E, \quad x + y = y + x \\ \exists 0_E \in E, \quad \forall x \in E, \quad x + 0_E = x \\ \forall x \in E, \quad \exists -x \in E, \quad x + (-x) = 0_E \end{array} \right.$$

et

$$\left\{ \begin{array}{l} \forall \lambda \in \mathbb{K}, \quad \forall x, y \in E, \quad \lambda \cdot (x + y) = \lambda \cdot x + \lambda \cdot y \\ \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, \quad \forall x \in E, \quad (\lambda + \mu) \cdot x = \lambda \cdot x + \mu \cdot x \\ \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, \quad \forall x \in E, \quad (\lambda \mu) \cdot x = \lambda \cdot (\mu \cdot x) \\ \forall x \in E, \quad 1_{\mathbb{K}} \cdot x = x \end{array} \right.$$

Le vecteur  $0_E$  est en fait unique. Il est appelé le vecteur nul de  $E$ .

Pour tout vecteur  $x \in E$ , le vecteur  $-x$  est unique et appelé l'opposé de  $x$ . Pour simplifier, on note  $y - x$  pour  $y + (-x)$ .

---

#### Reformulation 12.6 (Abstraite)

Un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel est un groupe abélien  $(E, +)$  muni d'un morphisme d'anneaux  $\mathbb{K} \longrightarrow \text{Hom}(E, E)$ .

---

*Remarque 12.7*

On a vu à l'Exemple 12.4 que  $\mathbb{K}$  est naturellement un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel (en prenant  $n = 1$ ). La loi  $\cdot$  coïncide alors avec la loi produit du corps  $\mathbb{K}$ ; les éléments de  $\mathbb{K}$  peuvent alors être vus comme des scalaires ou comme des vecteurs.

Si  $E$  est un  $\mathbb{C}$ -espace vectoriel, alors  $E$  est naturellement un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel (en ne gardant de la loi  $\mathbb{C} \times E \longrightarrow E$  que sa restriction  $\mathbb{R} \times E \longrightarrow E$ ).

---

**Exercice 12.8**

(1) On considère le  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel  $\mathbb{R}[X]$ .

Le vecteur  $X^2 - 1$  est-il combinaison linéaire des vecteurs  $X - 1$  et  $X + 1$  ?

Le vecteur  $X^2 - 1$  est-il combinaison linéaire des vecteurs  $X^2 + X$  et  $X + 1$  ?

(2) On considère le  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel  $\mathbb{R}^4$ .

Le vecteur  $(2, 2, 2, 2)$  est-il combinaison linéaire des vecteurs  $(1, 2, 0, 0)$  et  $(0, 1, -1, -1)$  ?

Le vecteur  $(1, 0, 0, 0)$  est-il combinaison linéaire des vecteurs  $(1, 2, 0, 0)$  et  $(0, 1, -1, -1)$  ?

---

*Correction 12.9 (1)*

On a  $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \deg(\lambda(X - 1) + \mu(X + 1)) \leq 1$  donc  $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \lambda(X - 1) + \mu(X + 1) \neq X^2 - 1$ . Donc  $X^2 - 1$  n'est pas une combinaison linéaire de  $X - 1$  et  $X + 1$ .

De plus, on a  $X^2 - 1 = 1 \cdot (X^2 + X) - 1 \cdot (X + 1)$  donc  $X^2 - 1$  est une combinaison linéaire de  $X^2 + X$  et  $X + 1$ .

---

*Correction 12.10 (2)*

On a  $(2, 2, 2, 2) = 2 \cdot (1, 2, 0, 0) - 2 \cdot (0, 1, -1, -1)$  donc  $(2, 2, 2, 2)$  est combinaison linéaire de  $(1, 2, 0, 0)$  et  $(0, 1, -1, -1)$ .

$$\text{On a } \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \lambda(1, 2, 0, 0) + \mu(0, 1, -1, -1) = (1, 0, 0, 0) \iff \begin{cases} \lambda = 1 \\ 2\lambda + \mu = 0 \\ -\mu = 0 \\ -\mu = 0 \end{cases} : \text{impossible}$$

Donc  $(1, 0, 0, 0)$  n'est pas combinaison linéaire de  $(1, 2, 0, 0)$  et  $(0, 1, -1, -1)$ .

---

**Proposition 12.11**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel,  $\lambda \in \mathbb{K}$  un scalaire et  $x \in E$  un vecteur.

On a

$$\lambda \cdot x = 0_E \iff \begin{cases} \lambda = 0_{\mathbb{K}} \\ \text{ou} \\ x = 0_E \end{cases}$$

---

*Démonstration 12.12*

Supposons  $\lambda = 0$ .

Montrons que  $\lambda \cdot x = 0_E$ .

On a  $\lambda + 1_{\mathbb{K}} = 1_{\mathbb{K}}$ .

Donc  $(\lambda + 1_{\mathbb{K}}) \cdot x = 1_{\mathbb{K}} \cdot x$ .

Donc  $\lambda \cdot x + 1_{\mathbb{K}} \cdot x = 1_{\mathbb{K}} \cdot x$ .

Donc  $\lambda \cdot x = 0_E$  car  $(E, +)$  est un groupe.

D'où l'équivalence.

Supposons  $\lambda \neq 0_{\mathbb{K}}$ .

Alors  $\lambda$  est inversible car  $\mathbb{K}$  est un corps.

On a

$$\begin{aligned}\lambda \cdot x = 0_E &\implies \lambda^{-1} \cdot (\lambda \cdot x) = \lambda^{-1} \cdot 0_E \\ &\implies (\lambda^{-1} \lambda) \cdot x = 0_E \\ &\implies 1_{\mathbb{K}} \cdot x = 0_E \\ &\implies x = 0_E \\ &\implies \lambda \cdot x = 0_E\end{aligned}$$

Donc  $\lambda \cdot x \iff x = 0_E$ .

D'où l'équivalence. ■

---

**Proposition 12.13**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel,  $\lambda \in \mathbb{K}$  un scalaire et  $x \in E$  un vecteur.

On a

$$(-\lambda) \cdot x = \lambda \cdot (-x) = -(\lambda \cdot x)$$

et

$$(-\lambda) \cdot (-x) = \lambda \cdot x.$$

---

*Démonstration 12.14*

On remarque

$$(-\lambda) \cdot x + \lambda \cdot x = (-\lambda + \lambda) \cdot x = 0_{\mathbb{K}} \cdot x = 0_E.$$

Donc  $(-\lambda) \cdot x = -(\lambda \cdot x)$ .

De même :

$$\lambda \cdot (-x) + \lambda \cdot x = \lambda \cdot (x - x) = \lambda \cdot 0_E = 0_E.$$

Donc  $\lambda \cdot (-x) = -(\lambda \cdot x)$ .

Enfin :

$$(-\lambda) \cdot (-x) = -(\lambda \cdot (-x)) = -((-\lambda) \cdot x) = \lambda x.$$

■

## 12.1.2 Sous-espaces vectoriels

### Définition 12.15

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel dont on note  $0_E$  l'élément neutre et  $F$  une partie de  $E$ .

On dit que  $F$  est un sous- $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de  $E$  (ou sous-espace vectoriel de  $E$ ) si les conditions suivantes sont vérifiées :

(1)  $0_E \in F$

(2) La partie  $F$  est « stable par combinaison linéaire » :

$$\forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{K}, \forall x_1, x_2 \in F, \lambda_1 \cdot x_1 + \lambda_2 \cdot x_2 \in F.$$

### Proposition 12.16

Tout sous-espace vectoriel  $F$  d'un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel  $(E, +, \cdot)$  est naturellement un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel : ses lois sont celles induites par celles de  $E$ .

#### Démonstration 12.17

On note  $0_E$  le vecteur nul de  $E$ .

Montrons que  $F$  est un sous-groupe de  $(E, +)$ .

On a

$$\begin{cases} 0_E \in F \\ \forall x, y \in F, x - y = 1_{\mathbb{K}} \cdot x + (-1_{\mathbb{K}}) \cdot y \in F \end{cases}$$

Donc  $F$  est un sous-groupe de  $(E, +)$ .

Donc la loi  $+$  de  $E$  induit une loi de groupe abélien  $F \times F \longrightarrow F$   
 $(x, y) \longmapsto x + y$

On a

$$\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall x \in F, \lambda \cdot x \in F$$

car  $\lambda \cdot x = \lambda \cdot x + 0_{\mathbb{K}} \cdot 0_E \in F$ .

Donc la loi externe  $\cdot$  induite  $\mathbb{K} \times F \longrightarrow F$  est bien définie.  
 $(\lambda, x) \longmapsto \lambda \cdot x$

Enfin, les quatre propriétés sont clairement conservées.

■

---

*Exemple 12.18*

Soient  $n \in \mathbb{N}$  et  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$  contenant au moins deux points.

L'ensemble  $\mathcal{C}^n(I, \mathbb{K})$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathcal{F}(I, \mathbb{K})$  et est donc muni d'une structure naturelle de  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

---

**Proposition 12.19 (Intersection de sous-espaces vectoriels)**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel,  $I$  un ensemble quelconque et  $(F_i)_{i \in I}$  une famille de sous-espaces vectoriels de  $E$ .

Alors  $\bigcap_{i \in I} F_i$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ .

---

*Démonstration 12.20*

On a  $\forall i \in I, 0_E \in F_i$  donc  $0_E \in \bigcap_{i \in I} F_i$ .

Soient  $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$  et  $x, y \in \bigcap_{i \in I} F_i$ .

On a  $\forall i \in I, x, y \in F_i$ .

Donc  $\forall i \in I, \lambda \cdot x + \mu \cdot y \in F_i$ .

Donc  $\lambda \cdot x + \mu \cdot y \in \bigcap_{i \in I} F_i$ . ■

---

*Exemple 12.21*

Soit  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$  contenant au moins deux points.

L'ensemble  $\mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{K})$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathcal{F}(I, \mathbb{K})$  car c'est l'intersection des sous-espaces vectoriels  $\mathcal{C}^n(I, \mathbb{K})$  où  $n \in \mathbb{N}$ .

---

**Définition/Proposition 12.22**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $x_1, \dots, x_n \in E$ .

On appelle sous-espace vectoriel engendré par  $x_1, \dots, x_n$  et on note  $\text{Vect}(x_1, \dots, x_n)$  le plus petit sous-espace vectoriel de  $E$  qui contient  $x_1, \dots, x_n$ .

Ses éléments sont les combinaisons linéaires en  $x_1, \dots, x_n$  :

$$\text{Vect}(x_1, \dots, x_n) = \{\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n\}_{\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}}$$

---

*Démonstration 12.23*

Notons  $F$  l'ensemble des combinaisons linéaires en  $x_1, \dots, x_n$  :

$$F = \{\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n\}_{\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}}$$

Montrons que  $F$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ .

On a  $0_E = 0_{\mathbb{K}}x_1 + \dots + 0_{\mathbb{K}}x_n$  donc  $0_E \in F$ .

De plus, si  $x, x' \in F$  alors il existe  $\lambda_1, \dots, \lambda_n, \lambda'_1, \dots, \lambda'_n \in \mathbb{K}$  tels que

$$x = \lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n \quad \text{et} \quad x' = \lambda'_1 x_1 + \dots + \lambda'_n x_n.$$

Soient  $\mu, \mu' \in \mathbb{K}$ .

On a

$$\mu x + \mu' x' = (\mu \lambda_1 + \mu' \lambda'_1) x_1 + \dots + (\mu \lambda_n + \mu' \lambda'_n) x_n.$$

Donc  $\mu x + \mu' x' \in F$ .

Donc  $F$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ .

On a  $x_1, \dots, x_n \in F$  car  $\forall k \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, \quad x_k = \sum_{i=1}^n \delta_{ki} x_i$  où  $\delta_{ki} = \begin{cases} 1 & \text{si } k = i \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$  (c'est le symbole de Kronecker).

Enfin, si  $G$  est un sous-espace vectoriel de  $E$  contenant  $x_1, \dots, x_n$  alors on a

$$\forall \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}, \quad \lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n \in G$$

donc  $F \subseteq G$ .

Donc  $F$  est le plus petit sous-espace vectoriel de  $E$  contenant  $x_1, \dots, x_n$ . ■

### 12.1.3 Sommes, sommes directes

---

#### Définition/Proposition 12.24 (Somme de deux sous-espaces vectoriels)

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $F$  et  $G$  deux sous-espaces vectoriels de  $E$ .

L'ensemble des vecteurs de la forme  $y+z$ , où  $y \in F$  et  $z \in G$ , est un sous-espace vectoriel de  $E$ , appelé somme des sous-espaces vectoriels  $F$  et  $G$ . On le note  $F+G$  :

$$F+G = \{y+z\}_{(y,z) \in F \times G} = \{x \in E \mid \exists y \in F, \exists z \in G, x = y+z\}.$$

---

**Définition 12.25 (Somme directe)**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $F$  et  $G$  deux sous-espaces vectoriels de  $E$ .

On dit que  $F$  et  $G$  sont en somme directe si l'écriture de tout vecteur de  $F + G$  sous la forme  $y + z$  est unique, où  $y \in F$  et  $z \in G$ , c'est-à-dire si :

$$\forall x \in F + G, \exists! (y, z) \in F \times G, x = y + z.$$

La somme de  $F$  et  $G$  est alors appelée somme directe de  $F$  et  $G$  et est notée

$$F \oplus G.$$

---

**Proposition 12.26**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $F$  et  $G$  deux sous-espaces vectoriels de  $E$ .

Alors  $F$  et  $G$  sont en somme directe si, et seulement si, leur intersection est le sous-espace vectoriel nul :

$$F \cap G = \{0_E\}.$$

---

*Démonstration 12.27*

Montrons l'équivalence

$$F \text{ et } G \text{ sont en somme directe} \iff F \cap G = \{0_E\}.$$

$\Rightarrow$

$\supseteq$  Claire.

$\subseteq$

Soit  $x \in F \cap G$ .

On a

$$x = \underbrace{x}_{\in F} + \underbrace{0_E}_{\in G} = \underbrace{0_E}_{\in F} + \underbrace{x}_{\in G}.$$

Donc comme  $F$  et  $G$  sont en somme directe :  $(x, 0_E) = (0_E, x)$ .

Donc  $x = 0_E$ .

Donc  $F \cap G = \{0_E\}$ .

$\Leftarrow$

Supposons  $F \cap G = \{0_E\}$ .

Montrons que  $F$  et  $G$  sont en somme directe.

Soient  $x_F, y_F \in F$  et  $x_G, y_G \in G$  tels que  $x_F + x_G = y_F + y_G$ .



$$\text{Donc } \underbrace{x_F - y_F}_{\in F} = \underbrace{y_G - x_G}_{\in G}.$$

$$\text{Donc } \begin{cases} x_F - y_F \in F \cap G = \{0_E\} \\ y_G - x_G \in F \cap G = \{0_E\} \end{cases}$$

$$\text{Donc } \begin{cases} x_F - y_F = 0_E \\ y_G - x_G = 0_E \end{cases}$$

$$\text{Donc } (x_F, x_G) = (y_F, y_G).$$

Donc l'écriture est unique.

Donc  $F$  et  $G$  sont en somme directe. ■

### Définition 12.28 (Supplémentaire)

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $F$  et  $G$  deux sous-espaces vectoriels de  $E$ .

On dit que  $G$  est un supplémentaire de  $F$  dans  $E$  (ou que  $F$  et  $G$  sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires dans  $E$ ) si on a :

$$E = F \oplus G,$$

$$\text{c'est-à-dire } \begin{cases} F \cap G = \{0_E\} \\ E = F + G \end{cases}$$

#### Exemple 12.29

- (1) En voyant  $\mathbb{C}$  comme un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel, on a  $\mathbb{C} = \mathbb{R} \oplus i\mathbb{R}$ .
- (2) On considère le  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel  $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ . On note  $F$  (respectivement  $G$ ) l'ensemble des fonctions paires (respectivement impaires) de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ . Alors  $F$  et  $G$  sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires dans  $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ .
- (3) Soit  $n \in \mathbb{N}$  et  $Q \in \mathbb{K}[X]$  un polynôme de degré  $n+1$ . On note  $\mathbb{K}[X]_Q$  l'ensemble des multiples de  $Q$  dans  $\mathbb{K}[X]$ . Il admet pour supplémentaire l'espace des polynômes de degré au plus  $n$  :

$$\mathbb{K}[X] = \mathbb{K}[X]_Q \oplus \mathbb{K}_n[X].$$

#### Démonstration 12.30 (2)

Montrons que  $F \cap G = \{0\}$ .

Soit  $f \in F \cap G$ .

On a  $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = f(-x) = -f(x)$  donc  $f = 0$ .

Donc  $F \cap G = \{0\}$ .

Donc  $F$  et  $G$  sont en somme directe.

Montrons que  $F + G = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ .

$\subseteq$  Claire.

$\supseteq$

Soit  $f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ .

On remarque

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} + \frac{f(x) - f(-x)}{2}.$$

Donc  $f = g + h$  en posant  $g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$  et  $h : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$

$$x \longmapsto \frac{f(x) + f(-x)}{2} \quad x \longmapsto \frac{f(x) - f(-x)}{2}$$

De plus, on a  $g \in F$  et  $h \in G$ .

Donc  $f \in F + G$ .

Conclusion : on a montré  $\begin{cases} F \cap G = \{0\} \\ F + G = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \end{cases}$  donc  $F \oplus G = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ .

Donc  $F$  et  $G$  sont supplémentaires dans  $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ . ■

*Démonstration 12.31 (3)*

Montrons que  $\mathbb{K}[X]Q \cap \mathbb{K}_n[X] = \{0\}$ .

Soit  $P \in \mathbb{K}[X]Q \cap \mathbb{K}_n[X]$ .

Comme  $P \in \mathbb{K}[X]Q$ , il existe  $A \in \mathbb{K}[X]$  tel que  $P = AQ$ .

On a donc  $\deg P = \underbrace{\deg A}_{\in \mathbb{N} \cup \{-\infty\}} + \underbrace{\deg Q}_{=n+1} \leq n$ .

Donc  $\deg P = -\infty$  donc  $P = 0$ .

Donc  $\mathbb{K}[X]Q \cap \mathbb{K}_n[X] = \{0\}$ .

Montrons que  $\mathbb{K}[X]Q + \mathbb{K}_n[X] = \mathbb{K}[X]$ .

Soit  $P \in \mathbb{K}[X]$ .

On note  $A$  et  $B$  le quotient et le reste de la division euclidienne de  $P$  par  $Q$  : on a  $P = AQ + B$  avec

$$\begin{cases} AQ \in \mathbb{K}[X]Q \\ B \in \mathbb{K}_n[X] \end{cases}$$

Donc  $P \in \mathbb{K}[X]Q + \mathbb{K}_n[X]$ .

Finalement :

$$\mathbb{K}[X] = \mathbb{K}[X]Q \oplus \mathbb{K}_n[X].$$
■

---

*Remarque 12.32*

- Ne pas confondre supplémentaire et complémentaire. Le complémentaire d'un sous-espace vectoriel n'est jamais un sous-espace vectoriel car il ne contient pas le vecteur nul.
- Ne pas confondre « deux sous-espaces vectoriels sont en somme directe » et « deux sous-espaces vectoriels sont supplémentaires ».
- Il n'y a pas unicité du supplémentaire d'un sous-espace vectoriel, sauf dans le cas des deux sous-espaces vectoriels triviaux : si  $E$  est un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, le seul supplémentaire de  $\{0_E\}$  dans  $E$  est  $E$  ; le seul supplémentaire de  $E$  dans  $E$  est  $\{0_E\}$ .

## 12.2 Applications linéaires

### 12.2.1 Définitions

---

#### Définition 12.33 (Application linéaire)

Soient  $E$  et  $F$  deux  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et  $u : E \longrightarrow F$ .

On dit que  $u$  est une application linéaire si on a :

$$\forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, \forall x, y \in E, \quad u(\lambda x + \mu y) = \lambda u(x) + \mu u(y).$$

L'ensemble des applications linéaires de  $E$  dans  $F$  est noté  $\mathcal{L}(E, F)$ .

---

#### Définition 12.34 (Endomorphisme)

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Un endomorphisme de  $E$  est une application linéaire de  $E$  dans  $E$ .

L'ensemble des endomorphismes de  $E$  est noté  $\mathcal{L}(E)$ .

---

#### Définition 12.35 (Forme linéaire)

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Une forme linéaire sur  $E$  est une application linéaire de  $E$  dans  $\mathbb{K}$ .

L'ensemble des formes linéaires sur  $E$  est noté  $E^*$  et est appelé le dual de  $E$ .

---

*Exemple 12.36*

L'application

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C}_m^0([a; b], \mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ f & \longmapsto & \int_{[a; b]} f \end{array}$$

est une forme linéaire.

---

*Remarque 12.37*

Si  $E$  et  $F$  sont des  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels alors on a

$$\mathcal{L}(E) = \mathcal{L}(E, E) \quad \text{et} \quad E^* = \mathcal{L}(E, \mathbb{K}).$$

---

*Exemple 12.38 (Homothéties)*

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $\lambda \in \mathbb{K}$ .

On appelle homothétie de rapport  $\lambda$  l'endomorphisme

$$\begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & E \\ x & \longmapsto & \lambda \cdot x \end{array}$$

Cet endomorphisme est aussi noté  $\lambda \text{id}_E$ .

L'endomorphisme nul est une homothétie (de rapport 0).

L'application  $\text{id}_E$  est une homothétie (de rapport 1).

---

*Exemple 12.39*

Autres exemples d'endomorphismes : les opérateurs de dérivation

$$\begin{array}{ccc} D : \mathbb{K}[X] & \longrightarrow & \mathbb{K}[X] \\ P & \longmapsto & P' \end{array} \quad \text{et} \quad \begin{array}{ccc} D : \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \\ f & \longmapsto & f' \end{array}$$

## 12.2.2 Opérations sur les applications linéaires

### 12.2.2.1 Cas des applications linéaires

---

**Proposition 12.40**

*Une composée d'applications linéaires est linéaire.*

---

*Démonstration 12.41*

Soient  $E, F, G$  des  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et  $u \in \mathcal{L}(E, F)$  et  $v \in \mathcal{L}(F, G)$ .

Montrons que  $v \circ u \in \mathcal{L}(E, G)$ .

Soient  $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$  et  $x, y \in E$ .

On a

$$\begin{aligned} v \circ u (\lambda x + \mu y) &= v (\lambda u(x) + \mu u(y)) && \text{car } u \text{ est linéaire} \\ &= \lambda v \circ u (x) + \mu v \circ u (y) && \text{car } v \text{ est linéaire} \end{aligned}$$

Donc  $v \circ u$  est linéaire. ■

---

**Notation 12.42**

Soient  $E, F, G$  des  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et  $u \in \mathcal{L}(E, F)$  et  $v \in \mathcal{L}(F, G)$ .

La composée de  $u$  et  $v$  est souvent notée  $vu$  au lieu de  $v \circ u$ .

---

**Proposition 12.43**

Soient  $E$  et  $F$  deux  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels.

L'ensemble des applications linéaires de  $E$  dans  $F$  est naturellement muni d'une structure de  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel  $(\mathcal{L}(E, F), +, \cdot)$  dont le vecteur nul (noté  $0$  ou  $0_{\mathcal{L}(E, F)}$ ) est l'application identiquement nulle (i.e. en tout point) de  $E$  dans  $F$ .

En particulier,  $\mathcal{L}(E)$  et  $E^*$  sont des  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels.

---

*Démonstration 12.44*

Montrons que  $\mathcal{L}(E, F)$  est un sous-espace vectoriel de  $(\mathcal{F}(E, F), +, \cdot)$ .

Montrons que  $0_{\mathcal{F}(E, F)} \in \mathcal{L}(E, F)$ .

On a

$$\begin{aligned} \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, \forall x, y \in E, \quad 0_{\mathcal{F}(E, F)} (\lambda x + \mu y) &= 0_F \\ &= \lambda 0_F + \mu 0_F \\ &= \lambda 0_{\mathcal{F}(E, F)} (x) + \mu 0_{\mathcal{F}(E, F)} (y). \end{aligned}$$

Donc  $0_{\mathcal{F}(E, F)} \in \mathcal{L}(E, F)$ .

Soient  $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$  et  $u, v \in \mathcal{L}(E, F)$ .

Montrons que  $\lambda u + \mu v \in \mathcal{L}(E, F)$ .

Soient  $\omega_1, \omega_2 \in \mathbb{K}$  et  $x_1, x_2 \in E$ .

On a

$$\begin{aligned}(\lambda u + \mu v)(\omega_1 x_1 + \omega_2 x_2) &= \lambda u(\omega_1 x_1 + \omega_2 x_2) + \mu v(\omega_1 x_1 + \omega_2 x_2) \\&= \lambda(\omega_1 u(x_1) + \omega_2 u(x_2)) + \mu(\omega_1 v(x_1) + \omega_2 v(x_2)) \\&= \omega_1(\lambda u(x_1) + \mu v(x_1)) + \omega_2(\lambda u(x_2) + \mu v(x_2)) \\&= \omega_1(\lambda u + \mu v)(x_1) + \omega_2(\lambda u + \mu v)(x_2).\end{aligned}$$

Donc  $\lambda u + \mu v \in \mathcal{L}(E, F)$ .

Donc  $\mathcal{L}(E, F)$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathcal{F}(E, F)$ .

Donc  $\mathcal{L}(E, F)$  est un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. ■

### 12.2.2.2 Cas des endomorphismes

---

#### Notation 12.45

Soient  $E$  un espace vectoriel,  $u \in \mathcal{L}(E)$  et  $k \in \mathbb{N}$ .

L'itéré  $k$ -ème de  $u$  est souvent noté  $u^k$  (au lieu de  $u^{\circ k}$ ).

---

#### Proposition 12.46

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

L'ensemble des endomorphismes de  $E$  est naturellement muni d'une structure d'anneau  $(\mathcal{L}(E), +, \circ)$ .

Ses éléments neutres sont l'application identiquement nulle  $0 = 0_{\mathcal{L}(E)}$  pour  $+$  et l'application identité  $\text{id}_E$  pour  $\circ$ .

En effet :

$$\forall u \in \mathcal{L}(E), \quad u \circ 0 = 0 \circ u = 0 \quad \text{et} \quad u \circ \text{id}_E = \text{id}_E \circ u = u.$$

L'anneau  $\mathcal{L}(E)$  n'est pas commutatif en général.

---

#### Démonstration 12.47

On sait que  $(\mathcal{L}(E), +, \cdot)$  est un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Donc  $(\mathcal{L}(E), +)$  est un groupe abélien.

La loi  $\circ$  est associative et elle admet  $\text{id}_E$  comme élément neutre.

Montrons que  $\circ$  est distributive par rapport à  $+$ .

Soient  $u, v, w \in \mathcal{L}(E)$ .

On a  $\forall x \in E, (u + v)w(x) = uw(x) + vw(x) = (uw + vw)(x)$ .

Donc  $(u + v)w = uw + vw$ .

De plus :

$$\begin{aligned} \forall x \in E, \quad u(v + w)(x) &= u(v(x) + w(x)) \\ &= uv(x) + uw(x) \\ &= (uv + uw)(x). \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} \forall x \in E, \quad u(v + w)(x) &= u(v(x) + w(x)) \\ &= uv(x) + uw(x) \\ &= (uv + uw)(x). \end{aligned}} \right\} \text{car } u \text{ est linéaire}$$

Donc  $u(v + w) = uv + uw$ .

Donc  $\circ$  est distributive par rapport à  $+$ .

Donc  $(\mathcal{L}(E), +, \circ)$  est un anneau. ■

*Remarque 12.48*

$(\mathcal{F}(E, E), +, \circ)$  n'est pas un anneau.

### Proposition 12.49

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $u, v \in \mathcal{L}(E)$  deux endomorphismes qui commutent :  $uv = vu$ .

On a la formule du binôme de Newton :

$$\forall m \in \mathbb{N}, \quad (u + v)^m = \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} u^k v^{m-k}$$

et

$$\forall m \in \mathbb{N}, \quad u^m - v^m = (u - v) \sum_{k=0}^{m-1} u^k v^{m-1-k}.$$

## 12.2.3 Applications linéaires et sous-espaces vectoriels

### Proposition 12.50

Soient  $E$  et  $F$  deux  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels,  $u \in \mathcal{L}(E, F)$  et  $x_1, \dots, x_n \in E$ .

On a

$$u(\text{Vect}(x_1, \dots, x_n)) = \text{Vect}(u(x_1), \dots, u(x_n)).$$

*Démonstration 12.51*

On a

$$\begin{aligned} u(\text{Vect}(x_1, \dots, x_n)) &= u(\{\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n\}_{\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}}) \\ &= \{u(\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n)\}_{\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}} \\ &= \{\lambda_1 u(x_1) + \dots + \lambda_n u(x_n)\}_{\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}} \\ &= \text{Vect}(u(x_1), \dots, u(x_n)). \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} u(\text{Vect}(x_1, \dots, x_n)) &= u(\{\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n\}_{\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}}) \\ &= \{u(\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n)\}_{\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}} \\ &= \{\lambda_1 u(x_1) + \dots + \lambda_n u(x_n)\}_{\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}} \end{aligned}} \right\} \text{car } u \text{ est linéaire}$$

■

---

*Exemple 12.52*

Considérons l'endomorphisme  $D : \mathbb{K}[X] \longrightarrow \mathbb{K}[X]$   
 $P \longmapsto P'$

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

Alors

$$D(\mathbb{K}_n[X]) = \mathbb{K}_{n-1}[X].$$

---

*Démonstration 12.53*

On a

$$\mathbb{K}_n[X] = \{a_n X^n + \dots + a_0 X^0\}_{a_0, \dots, a_n \in \mathbb{K}} = \text{Vect}(X^n, \dots, X^0).$$

En particulier,  $\mathbb{K}_n[X]$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{K}[X]$ .

On a

$$\begin{aligned} D(\mathbb{K}_n[X]) &= D(\text{Vect}(X^n, \dots, X^0)) \\ &= \text{Vect}(D(X^n), \dots, D(X^0)) && \left. \begin{array}{l} \downarrow \\ \text{car } D \text{ est linéaire} \end{array} \right\} \\ &= \text{Vect}(nX^{n-1}, \dots, 4X^3, 3X^2, 2X, 1, 0) \\ &= \text{Vect}(X^{n-1}, \dots, X^3, X^2, X, 1) \\ &= \mathbb{K}_{n-1}[X]. \end{aligned}$$

■

---

**Proposition 12.54**

Soient  $E$  et  $F$  deux  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels,  $u \in \mathcal{L}(E, F)$ ,  $E_1$  un sous-espace vectoriel de  $E$  et  $F_1$  un sous-espace vectoriel de  $F$ .

Alors

$$u^{-1}(F_1) \text{ est un sous-espace vectoriel de } E$$

et

$$u(E_1) \text{ est un sous-espace vectoriel de } F.$$

---

*Démonstration 12.55*

Montrons que  $u^{-1}(F_1)$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ .

On a  $u^{-1}(F_1) \subseteq E$ .

On a  $u(0_E) = 0_F$  car  $u$  est linéaire donc  $u(0_E) \in F_1$  donc  $0_E \in u^{-1}(F_1)$ .

Montrons que  $u^{-1}(F_1)$  est stable par combinaison linéaire.

Soient  $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$  et  $x, y \in u^{-1}(F_1)$ .



Montrons que  $\lambda x + \mu y \in u^{-1}(F_1)$ .

Comme  $u$  est linéaire, on a

$$u(\lambda x + \mu y) = \underbrace{\lambda u(x)}_{\substack{\in F_1 \text{ car} \\ x \in u^{-1}(F_1)}} + \underbrace{\mu u(y)}_{\substack{\in F_1 \text{ car} \\ y \in u^{-1}(F_1)}}.$$

Donc  $u(\lambda x + \mu y) \in F_1$  car  $F_1$  est un sous-espace vectoriel de  $F$ .

Donc  $\lambda u(x) + \mu u(y) \in u^{-1}(F_1)$ .

Donc  $u^{-1}(F_1)$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ .

Montrons que  $u(E_1)$  est un sous-espace vectoriel de  $F$ .

On a  $u(E_1) \subseteq F$ .

On a  $0_F = u(0_E)$  et  $0_E \in E_1$  donc  $0_F \in u(E_1)$ .

Montrons que  $u(E_1)$  est stable par combinaison linéaire.

Soient  $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{K}$  et  $y_1, y_2 \in u(E_1)$ .

Montrons que  $\lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2 \in u(E_1)$ .

Soient  $x_1, x_2 \in E_1$  tels que  $\begin{cases} y_1 = u(x_1) \\ y_2 = u(x_2) \end{cases}$

On a

$$\begin{aligned} \lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2 &= \lambda_1 u(x_1) + \lambda_2 u(x_2) \\ &= u(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2) \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} \lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2 &= \lambda_1 u(x_1) + \lambda_2 u(x_2) \\ &= u(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2) \end{aligned}} \right\} \text{car } u \text{ est linéaire}$$

et  $\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 \in E_1$  car  $E_1$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ .

Donc  $\lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2 \in u(E_1)$ .

Donc  $u(E_1)$  est un sous-espace vectoriel de  $F$ . ■

### Définition 12.56 (Noyau et image d'une application linéaire)

Soient  $E$  et  $F$  deux  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et  $u \in \mathcal{L}(E, F)$ .

On note  $0_F$  l'élément neutre de  $F$ .

L'image de  $u$  est l'ensemble image de l'application  $u$  :

$$\text{Im } u = \{u(x)\}_{x \in E} = \{y \in F \mid \exists x \in E, u(x) = y\} = u(E).$$

Le noyau de  $u$  est l'ensemble des vecteurs de  $E$  d'image nulle :

$$\ker u = u^{-1}(\{0_F\}) = \{x \in E \mid u(x) = 0_F\}.$$

---

**Proposition 12.57**

Soient  $E$  et  $F$  deux  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et  $u \in \mathcal{L}(E, F)$ .

Alors  $\ker u$  est un sous-espace vectoriel de  $E$  et  $\operatorname{Im} u$  est un sous-espace vectoriel de  $F$ .

---

*Démonstration 12.58*

$\ker u$  est l'image réciproque de  $\{0_F\}$  par  $u$ .

Or  $u$  est linéaire et  $\{0_F\}$  est un sous-espace vectoriel de  $F$ .

Donc  $\ker u$  est un sous-espace vectoriel de  $E$  selon la Proposition 12.54.

De même,  $\operatorname{Im} u = u(E)$  est l'image directe de  $E$  par  $u$ .

Or  $u$  est linéaire et  $E$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ .

Donc  $\operatorname{Im} u$  est un sous-espace vectoriel de  $F$  selon la Proposition 12.54. ■

---

**Théorème 12.59**

Soient  $E$  et  $F$  deux  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et  $u \in \mathcal{L}(E, F)$ .

On note  $0_E$  l'élément neutre de  $E$ .

Alors  $u$  est injective si, et seulement si, son noyau est « nul », c'est-à-dire

$$u \text{ est injective} \iff \ker u = \{0_E\}.$$

---

*Démonstration 12.60 (Découle du théorème analogue pour les groupes (cf. Théorème 6.68))*

$\implies$

Supposons  $u$  injective.

Alors  $0_F$  n'admet d'autre antécédent que  $0_E$  par  $u$ .

Donc  $\ker u = \{0_E\}$ .

$\impliedby$

Supposons  $\ker u = \{0_E\}$ .

Montrons que  $u$  est injective.

Soient  $x, y \in E$  tels que  $u(x) = u(y)$ .

On a  $u(x) - u(y) = 0_F$  donc  $u(x - y) = 0_F$  car  $u$  est linéaire.

Donc  $x - y \in \ker u$ .

Donc  $x - y = 0_E$  donc  $x = y$ .

Donc  $u$  est injective. ■

## 12.2.4 Projecteurs

---

### Définition/Proposition 12.61

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $F$  et  $G$  deux sous-espaces vectoriels supplémentaires dans  $E$ .

Le projecteur  $p_F$  sur  $F$  parallèlement à  $G$  et le projecteur  $p_G$  sur  $G$  parallèlement à  $F$  sont les endomorphismes de  $E$  caractérisés par :

$$\forall x \in E, \begin{cases} x = p_F(x) + p_G(x) \\ p_F(x) \in F \\ p_G(x) \in G \end{cases}$$

On a

$$\operatorname{Im} p_F = F \quad \text{et} \quad \ker p_F = G.$$

---

*Démonstration 12.62* ( $\operatorname{Im} p_F$ )

On a, par définition de  $p_F$  :  $\operatorname{Im} p_F \subseteq F$ .

Montrons que  $\operatorname{Im} p_F \supseteq F$ .

Soit  $x \in F$ .

Montrons que  $x \in \operatorname{Im} p_F = F$ .

On a  $x = \underbrace{x}_{\in F} + \underbrace{0_E}_{\in G}$  donc  $p_F(x) = x$ .

Donc  $x \in \operatorname{Im} p_F$ .

D'où  $\operatorname{Im} p_F = F$ . ■

---

*Démonstration 12.63* ( $\ker p_F = G$ )

$\supseteq$

Soit  $x \in G$

On a  $x = \underbrace{0_E}_{\in F} + \underbrace{x}_{\in G}$  donc  $p_F(x) = 0_E$ .

Donc  $x \in \ker p_F$ .

$\subseteq$

Soit  $x \in \ker p_F$ .

On a  $x = p_F(x) + p_G(x) = p_G(x) \in G$ .

D'où l'égalité. ■

---

**Définition 12.64**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $p \in \mathcal{L}(E)$ .

On dit que  $p$  est un projecteur s'il existe deux sous-espaces vectoriels  $F$  et  $G$  supplémentaires dans  $E$  tels que  $p$  soit le projecteur sur  $F$  parallèlement à  $G$ .

---

*Exemple 12.65 (On reprend les couples de supplémentaires de l'Exemple 12.29)*

(1) On a vu  $\mathbb{C} = \mathbb{R} \oplus i\mathbb{R}$ .

Le projecteur sur  $\mathbb{R}$  parallèlement à  $i\mathbb{R}$  est

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{C} & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ z & \longmapsto & \operatorname{Re} z \end{array}$$

Le projecteur sur  $i\mathbb{R}$  parallèlement à  $\mathbb{R}$  est

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{C} & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ z & \longmapsto & i \operatorname{Im} z \end{array}$$

(2) On a vu  $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) = F \oplus G$  où  $F$  (respectivement  $G$ ) est l'ensemble des fonctions paires (respectivement impaires) de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ .

Les projecteurs  $p_F$  et  $p_G$  associés à cette décomposition de  $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  en somme directe sont :

$$\begin{array}{ccccc} p_F : \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \\ f & \longmapsto & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & & x & \longmapsto & \frac{f(x) + f(-x)}{2} \end{array}$$

et

$$\begin{array}{ccccc} p_G : \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \\ f & \longmapsto & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & & x & \longmapsto & \frac{f(x) - f(-x)}{2} \end{array}$$

(3) Soient  $n \in \mathbb{N}$  et  $Q \in \mathbb{K}[X]$  un polynôme de degré  $n+1$ .

On a vu  $\mathbb{K}[X] = \mathbb{K}[X]Q \oplus \mathbb{K}_n[X]$ .

Le projecteur sur  $\mathbb{K}_n[X]$  parallèlement à  $\mathbb{K}[X]Q$  est l'application qui à tout polynôme  $P \in \mathbb{K}[X]$  associe le reste de sa division euclidienne par  $Q$ .

---

**Proposition 12.66**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $p \in \mathcal{L}(E)$ .

Alors  $p$  est un projecteur si, et seulement si,  $p^2 = p$  (c'est-à-dire  $p \circ p = p$ ).

Précisément,  $p$  est alors le projecteur sur  $\operatorname{Im} p$  parallèlement à  $\ker p$ .



Supposons que  $p$  est un projecteur.

Soient  $F$  et  $G$  deux sous-espaces vectoriels de  $E$  tels que  $\begin{cases} E = F \oplus G \\ p \text{ est le projecteur sur } F \text{ parallèlement à } G \end{cases}$

Montrons que  $p^2 = p$ .

Soit  $x \in E$ .

On a  $p(x) \in F$  donc  $p(x) = \underbrace{p(x)}_{\in F} + \underbrace{0_E}_{\in G}$ .

Donc  $p(p(x)) = p(x)$ .

Donc  $p^2 = p$ .



Supposons  $p^2 = p$ .

Posons  $F = \text{Im } p$  et  $G = \ker p$ .

Montrons que  $F$  et  $G$  sont supplémentaires dans  $E$ .

Montrons que  $F \cap G = \{0_E\}$ .

Soit  $y \in F \cap G$ .

Comme  $y \in F$ , il existe  $x \in E$  tel que  $y = p(x)$ .

Comme  $y \in G$ , on a  $p(y) = 0_E$ .

Donc  $p(p(x)) = p^2(x) = p(x) = 0_E$ .

Donc  $y = 0_E$ .

Montrons que  $F + G = E$ .

Soit  $x \in E$ .

On remarque  $x = \underbrace{x - p(x)}_{\in \ker p} + \underbrace{p(x)}_{\in \text{Im } p}$ .  
car  $p(x - p(x)) = p(x) - p^2(x) = 0_E$

Donc  $F + G = E$ .

Finalement,  $F \oplus G = E$ .

Notons  $p_F$  le projecteur sur  $F$  parallèlement à  $G$ .

Montrons que  $p = p_F$ .

Soit  $x \in E$ .

$$\text{On a } x = \underbrace{p(x)}_{\in F} + \underbrace{x - p(x)}_{\in G}.$$

Donc  $p_F(x) = p(x)$  donc  $p = p_F$ .

Donc  $p$  est un projecteur. ■

---

**Proposition 12.68**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $p$  un projecteur de  $E$ .

Alors  $\text{Im } p$  est l'ensemble des points fixes de  $p$  :

$$\text{Im } p = \{x \in E \mid p(x) = x\} = \ker(p - \text{id}_E).$$

---

*Démonstration 12.69*

On remarque

$$\begin{aligned} \forall x \in E, \quad x \in \ker(p - \text{id}_E) &\iff (p - \text{id}_E)(x) = 0_E \\ &\iff p(x) - x = 0_E \\ &\iff p(x) = x \end{aligned}$$

donc  $\ker(p - \text{id}_E)$  est l'ensemble des points fixes de  $p$ .

Montrons que  $\text{Im } p = \{x \in E \mid p(x) = x\}$ .

$\supseteq$  Soit  $x \in E$  tel que  $p(x) = x$ . Alors  $x \in \text{Im } p$ .

$\subseteq$

Soit  $y \in \text{Im } p$ .

Il existe  $x \in E$  tel que  $y = p(x)$ .

Donc  $p(y) = p(p(x))$ .

Donc  $p(y) = p^2(x) = p(x) = y$ . ■

---

**Proposition 12.70**

Soient  $E$  et  $F$  deux  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels,  $E_1$  et  $E_2$  deux sous-espaces vectoriels supplémentaires dans  $E$  et  $u_1 \in \mathcal{L}(E_1, F)$  et  $u_2 \in \mathcal{L}(E_2, F)$ .

Alors il existe une unique application linéaire  $u \in \mathcal{L}(E, F)$  telle que

$$u|_{E_1} = u_1 \quad \text{et} \quad u|_{E_2} = u_2.$$

Elle est donnée par :

$$\forall x \in E, \quad u(x) = u_1(p_1(x)) + u_2(p_2(x))$$

où  $p_1$  (respectivement  $p_2$ ) est le projecteur sur  $E_1$  (respectivement  $E_2$ ) parallèlement à  $E_2$  (respectivement  $E_1$ ).

---

*Démonstration 12.71*

Déterminons les applications linéaires  $u \in \mathcal{L}(E, F)$  telles que  $u|_{E_1} = u_1$  et  $u|_{E_2} = u_2$ .

analyse

Soient  $u \in \mathcal{L}(E, F)$  telle que  $\begin{cases} u|_{E_1} = u_1 \\ u|_{E_2} = u_2 \end{cases}$  et  $x \in E$ .

On a  $x = \underbrace{p_1(x)}_{\in E_1} + \underbrace{p_2(x)}_{\in E_2}$ .

Comme  $u$  est linéaire, on a

$$\begin{aligned} u(x) &= u(p_1(x)) + u(p_2(x)) \\ &= u_1(p_1(x)) + u_2(p_2(x)). \end{aligned}$$

Donc  $u = u_1 p_1 + u_2 p_2$ .

synthèse

Posons  $u = \underbrace{\underbrace{u_1}_{\in \mathcal{L}(E_1, F)} \underbrace{p_1}_{\in \mathcal{L}(E, E_1)}}_{\in \mathcal{L}(E, F)} + \underbrace{\underbrace{u_2}_{\in \mathcal{L}(E_2, F)} \underbrace{p_2}_{\in \mathcal{L}(E, E_2)}}_{\in \mathcal{L}(E, F)}.$

On a  $u \in \mathcal{L}(E, F)$ .

De plus, on a :

$$\begin{aligned} \forall x \in E_1, \quad u(x) &= u_1(p_1(x)) + u_2(p_2(x)) \\ &= u_1(x) + u_2(0_E) \\ &= u_1(x) \end{aligned}$$

donc  $u|_{E_1} = u_1$ .

On montre de même  $u|_{E_2} = u_2$ .

conclusion

$u_1 p_1 + u_2 p_2$  est l'unique  $u \in \mathcal{L}(E, F)$  telle que  $u|_{E_1} = u_1$  et  $u|_{E_2} = u_2$ . ■

---

*Remarque 12.72*

On peut reformuler la proposition précédente (dont on garde les notations) en écrivant que l'application

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(E, F) &\longrightarrow \mathcal{L}(E_1, F) \times \mathcal{L}(E_2, F) \\ u &\longmapsto (u|_{E_1}, u|_{E_2}) \end{aligned}$$

est une bijection.

## 12.2.5 Symétries

Dans ce paragraphe, on suppose que le corps  $\mathbb{K}$  considéré est un sous-corps de  $\mathbb{C}$ .

---

### Définition/Proposition 12.73

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $F$  et  $G$  deux sous-espaces vectoriels supplémentaires dans  $E$ .

On note  $p_F$  (respectivement  $p_G$ ) le projecteur sur  $F$  (respectivement  $G$ ) parallèlement à  $G$  (respectivement  $F$ ).

On appelle symétrie par rapport à  $F$  parallèlement à  $G$  l'endomorphisme  $s \in \mathcal{L}(E)$  tel que :

$$\begin{cases} \forall x_F \in F, & s(x_F) = x_F \\ \forall x_G \in G, & s(x_G) = -x_G \end{cases}$$

Selon la Proposition 12.70, cela définit bien l'endomorphisme  $s$ .

En d'autres termes, on a :

$$s = p_F - p_G.$$

D'où les relations :

$$s = 2p_F - \text{id}_E \quad \text{et} \quad p_F = \frac{1}{2}(\text{id}_E + s).$$

On a enfin :

$$F = \ker(s - \text{id}_E) \quad \text{et} \quad G = \ker(s + \text{id}_E).$$

---

### Démonstration 12.74

Soient  $x \in E$  et  $x_F \in F$  et  $x_G \in G$  tels que  $x = x_F + x_G$ .

On a  $s(x) = x_F - x_G$ .

On a

$$\begin{aligned} x \in \ker(s - \text{id}_E) &\iff s(x) = x \\ &\iff x_F - x_G = x_F + x_G \\ &\iff -x_G = x_G \\ &\iff x_G = 0 \\ &\iff x \in F. \end{aligned}$$

Donc  $F = \ker(s - \text{id}_E)$ .

De même, on a

$$\begin{aligned} x \in \ker(s + \text{id}_E) &\iff s(x) = -x \\ &\iff x_F - x_G = -x_F - x_G \\ &\iff x_F = -x_F \\ &\iff x_F = 0 \\ &\iff x \in G. \end{aligned}$$



Donc  $G = \ker (s + \text{id}_E)$ . ■

---

**Définition 12.75**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $s \in \mathcal{L}(E)$ .

On dit que  $s$  est une symétrie s'il existe deux sous-espaces vectoriels  $F$  et  $G$  supplémentaires dans  $E$  tels que  $s$  soit la symétrie par rapport à  $F$  parallèlement à  $G$ .

---

**Proposition 12.76**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $s \in \mathcal{L}(E)$ .

Alors  $s$  est une symétrie si, et seulement si,  $s^2 = \text{id}_E$  (c'est-à-dire  $s \circ s = \text{id}_E$ ).

Précisément,  $s$  est alors la symétrie par rapport à  $\ker (s - \text{id}_E)$  parallèlement à  $\ker (s + \text{id}_E)$ .

---

*Démonstration 12.77*



Supposons  $s^2 = \text{id}_E$ .

Montrons que  $E = \ker (s - \text{id}_E) \oplus \ker (s + \text{id}_E)$ , c'est-à-dire

$$\forall x \in E, \exists! (x_1, x_{-1}) \in \ker (s - \text{id}_E) \times \ker (s + \text{id}_E), \quad x = x_1 + x_{-1}.$$

Soit  $x \in E$ .

analyse

Soit  $(x_1, x_{-1}) \in \ker (s - \text{id}_E) \times \ker (s + \text{id}_E)$  tel que  $x = x_1 + x_{-1}$ .

On a  $x_1 \in \ker (s - \text{id}_E)$  donc  $s(x_1) = x_1$ .

On a  $x_{-1} \in \ker (s + \text{id}_E)$  donc  $s(x_{-1}) = -x_{-1}$ .

Or  $x = x_1 + x_{-1}$  donc  $s(x) = s(x_1) + s(x_{-1}) = x_1 - x_{-1}$ .

Donc

$$x_1 = \frac{x + s(x)}{2} \quad \text{et} \quad x_{-1} = \frac{x - s(x)}{2}.$$

synthèse

Posons  $x_1 = \frac{x + s(x)}{2}$  et  $x_{-1} = \frac{x - s(x)}{2}$ .

On a  $s(x_1) = \frac{s(x) + s^2(x)}{2} = \frac{s(x) + x}{2} = x_1$ .

On a  $s(x_{-1}) = \frac{s(x) - s^2(x)}{2} = \frac{s(x) - x}{2} = -x_{-1}$ .

$$\text{On a } x_1 + x_{-1} = \frac{x + s(x)}{2} + \frac{x - s(x)}{2} = \frac{2x}{2} = x.$$

conclusion D'où l'existence et l'unicité de  $x_1$  et  $x_{-1}$ .

Montrons que  $s$  est une symétrie par rapport à  $\ker(s - \text{id}_E)$  parallèlement à  $\ker(s + \text{id}_E)$ .

On a

$$\begin{aligned} \forall x_1 \in \ker(s - \text{id}_E), \forall x_{-1} \in \ker(s + \text{id}_E), \quad s(x_1 + x_{-1}) &= s(x_1) + s(x_{-1}) \\ &= x_1 - x_{-1}. \end{aligned}$$

D'où le résultat.

$\Rightarrow$

Supposons que  $s$  est une symétrie.

Alors il existe  $F$  et  $G$  deux sous-espaces vectoriels de  $E$  tels que  $E = F \oplus G$  et  $s$  est la symétrie par rapport à  $F$  parallèlement à  $G$  :

$$\forall x_F \in F, \forall x_G \in G, \quad s(x_F + x_G) = x_F - x_G.$$

On remarque :

$$\forall x_F \in F, \forall x_G \in G, \quad s^2(x_F + x_G) = s(x_F - x_G) = x_F + x_G.$$

Donc  $s^2 = \text{id}_E$ . ■

*Exemple 12.78*

L'application suivante est une symétrie :

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \\ f & \longmapsto & \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ & & x \longmapsto f(-x) \end{array}$$

*Remarque 12.79*

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $s$  une symétrie de  $E$ .

On a  $s^2 = \text{id}_E$  donc  $s$  est surjective et injective donc  $\begin{cases} \ker s = \{0_E\} \\ \text{Im } s = E \end{cases}$

## 12.2.6 Isomorphismes, automorphismes

---

**Définition 12.80 (Isomorphisme)**

Soient  $E$  et  $F$  deux  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels.

On appelle isomorphisme (de  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels) de  $E$  vers  $F$  toute application linéaire  $u : E \longrightarrow F$  qui est une bijection de  $E$  vers  $F$ .

Lorsqu'il existe un isomorphisme de  $E$  vers  $F$ , on dit que  $E$  et  $F$  sont des espaces vectoriels isomorphes.

---

**Proposition 12.81**

Soient  $E$ ,  $F$  et  $G$  des  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et  $u : E \longrightarrow F$  et  $v : F \longrightarrow G$  deux isomorphismes de  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels.

Alors  $vu : E \longrightarrow G$  est un isomorphisme de  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels.

---

*Démonstration 12.82*

★★ Exercice ★★

■

---

**Proposition 12.83**

Si  $u : E \longrightarrow F$  est un isomorphisme de  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels alors sa bijection réciproque  $u^{-1} : F \longrightarrow E$  est aussi un isomorphisme de  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels.

---

*Démonstration 12.84*

On a  $u^{-1} : F \longrightarrow E$ .

Montrons que  $u^{-1}$  est linéaire.

Soient  $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{K}$  et  $y_1, y_2 \in F$ .

$$\text{Posons } \begin{cases} x_1 = u^{-1}(y_1) \\ x_2 = u^{-1}(y_2) \end{cases}$$

$$\text{On a } \begin{cases} y_1 = u(x_1) \\ y_2 = u(x_2) \end{cases}$$

Donc comme  $u$  est linéaire :  $\lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2 = u(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2)$ .

Donc

$$u^{-1}(\lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2) = \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 = \lambda_1 u^{-1}(y_1) + \lambda_2 u^{-1}(y_2).$$

Donc  $u^{-1}$  est linéaire.

■

---

**Définition 12.85 (Automorphisme)**

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Un automorphisme de  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de  $E$  est un isomorphisme  $u : E \longrightarrow E$  de  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de  $E$  vers  $E$ , c'est-à-dire un endomorphisme de  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de  $E$  bijectif.

L'ensemble des automorphismes de  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de  $E$  est appelé le groupe linéaire de  $E$  et est noté  $\text{GL}(E)$ .

---

**Proposition 12.86**

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Alors  $(\text{GL}(E), \circ)$  est un groupe.

Son élément neutre est  $\text{id}_E$ .

L'inverse  $u^{-1}$  d'un élément  $u \in \text{GL}(E)$  est sa bijection réciproque.

Rappel : on a

$$\forall u, v \in \text{GL}(E), (u \circ v)^{-1} = v^{-1} \circ u^{-1}.$$

---

*Démonstration 12.87*

On sait que  $(S_E, \circ)$  est un groupe (où  $S_E$  est l'ensemble des bijections de  $E$  dans  $E$ ) et que dans ce groupe, l'élément neutre est  $\text{id}_E$  et l'inverse d'un élément  $f$  est sa bijection réciproque  $f^{-1}$ .

Montrons que  $\text{GL}(E)$  est un sous-groupe de  $S_E$ .

On a  $\text{GL}(E) \subseteq S_E$ .

On a  $\text{id}_E \in \text{GL}(E)$ .

Soient  $u, v \in \text{GL}(E)$ .

Alors  $u \circ v \in \text{GL}(E)$  ( $u \circ v$  est une bijection car  $u$  et  $v$  sont des bijections et  $u \circ v$  est linéaire car  $u$  et  $v$  sont linéaires).

De plus,  $u^{-1} \in \text{GL}(E)$  selon la Proposition 12.83.

Donc  $\text{GL}(E)$  est un sous-groupe de  $S_E$ .

Donc  $\text{GL}(E)$  est un groupe. ■

## 12.3 Familles de vecteurs

### 12.3.1 Familles libres

---

**Définition 12.88**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, un entier  $p \in \mathbb{N}^*$  et une famille de vecteurs  $\mathcal{F} = (x_1, \dots, x_p) \in E^p$ .

On dit que  $\mathcal{F}$  est une famille libre (sur  $\mathbb{K}$ ) ou que les vecteurs  $x_1, \dots, x_p$  sont linéairement indépendants (sur  $\mathbb{K}$ ) si :

$$\forall \lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{K}, \quad \lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_p x_p = 0_E \implies (\lambda_1, \dots, \lambda_p) = (0, \dots, 0).$$

Si la famille  $\mathcal{F}$  n'est pas libre, on dit qu'elle est liée.

---

*Exemple 12.89*

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $x \in E$ .

Alors la famille  $(x)$  est liée si, et seulement si, le vecteur  $x$  est nul.

---

*Démonstration 12.90*

Découle de la Proposition 12.11. ■

---

**Exercice/Exemple 12.91**

On pose

$$E = \mathbb{R}^2 \quad v_1 = (1, 0) \quad v_2 = (1, 1) \quad v_3 = (0, 1).$$

Montrer :

- (1) que la famille  $(v_1, v_2) \in E^2$  est libre.
- (2) que la famille  $(v_1, v_2, v_3) \in E^3$  est liée.

---

*Correction 12.92 (2)*

On a  $v_1 - v_2 + v_3 = (0, 0)$  or  $(1, -1, 1) \neq (0, 0, 0)$  donc  $(v_1, v_2, v_3)$  est liée.

---

*Correction 12.93 (1)*

Soient  $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$  tels que  $\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 = 0$ .

Montrons que  $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$ .

$$\text{On a } \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ donc } \begin{pmatrix} \lambda_1 + \lambda_2 \\ \lambda_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Donc } \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ \lambda_2 = 0 \end{cases} \text{ donc } \lambda_2 = 0 \text{ et } \lambda_1 = 0.$$

Donc  $(v_1, v_2)$  est libre.

---

*Remarque 12.94*

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel,  $p \in \mathbb{N}^*$  et  $\mathcal{F} = (x_1, \dots, x_p) \in E^p$ .

(1) Le fait que la famille  $\mathcal{F}$  soit libre ne dépend pas de l'ordre de ses vecteurs :

$$\forall \sigma \in \mathcal{S}_p, (x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(p)}) \text{ est libre} \iff (x_1, \dots, x_p) \text{ est libre.}$$

(2) Si la famille  $\mathcal{F}$  contient le vecteur nul, alors elle est liée.

(3) Pour que  $\mathcal{F}$  soit libre, il faut que ses vecteurs soient deux à deux distincts.

(4) Soit  $\mathcal{G} = (x_1, \dots, x_p, \dots, x_m) \in E^m$  une famille contenant  $\mathcal{F}$  (avec  $m \geq p$ ).

On a l'implication

$$\mathcal{F} \text{ est liée} \implies \mathcal{G} \text{ est liée.}$$

On a donc aussi, en contraposant :

$$\mathcal{G} \text{ est libre} \implies \mathcal{F} \text{ est libre.}$$

---

*Démonstration 12.95 (2)*

Soit  $k \in \llbracket 1 ; p \rrbracket$  tel que  $x_k = 0_E$ .

On a

$$0_{\mathbb{K}} \cdot x_1 + \dots + 0_{\mathbb{K}} \cdot x_{k-1} + 1_{\mathbb{K}} \cdot x_k + 0_{\mathbb{K}} \cdot x_{k+1} + \dots + 0_{\mathbb{K}} \cdot x_p = 0_E.$$

Donc  $(x_1, \dots, x_p)$  est liée. ■

---

*Démonstration 12.96 (3)*

Soient  $k, \ell \in \llbracket 1 ; p \rrbracket$  tels que  $k < \ell$  et  $x_k = x_\ell$ .

On a

$$0x_1 + \dots + 0x_{k-1} + x_k + 0x_{k+1} + \dots + 0x_{\ell-1} - x_\ell + 0x_{\ell+1} + \dots + 0x_p = 0.$$

Donc  $(x_1, \dots, x_p)$  est liée. ■

---

*Démonstration 12.97 (4)*

Supposons que  $\mathcal{F}$  est liée.

Soient  $\lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{K}$  tels que 
$$\begin{cases} \lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_p x_p = 0 \\ (\lambda_1, \dots, \lambda_p) \neq (0, \dots, 0) \end{cases}$$

Posons  $\forall k \in \llbracket p+1 ; m \rrbracket, \lambda_k = 0$ .

On a 
$$\begin{cases} \lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_m x_m = 0 \\ (\lambda_1, \dots, \lambda_m) \neq (0, \dots, 0) \end{cases}$$

Donc  $\mathcal{G}$  est liée. ■

---

**Proposition 12.98**

Une famille est liée si, et seulement si, l'un de ses vecteurs est combinaison linéaire de ses autres vecteurs.

---

*Démonstration 12.99*

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $(x_1, \dots, x_p) \in E^p$ .

$\Rightarrow$

Supposons que  $(x_1, \dots, x_p)$  est liée.

Soient  $\lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{K}$  tels que 
$$\begin{cases} \lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_p x_p = 0_E \\ (\lambda_1, \dots, \lambda_p) \neq (0, \dots, 0) \end{cases}$$

Soit  $k \in \llbracket 1 ; p \rrbracket$  tel que  $\lambda_k \neq 0$ .

On remarque :

$$x_k = \sum_{j \in \llbracket 1 ; p \rrbracket \setminus \{k\}} \frac{-\lambda_j}{\lambda_k} x_j.$$

Donc  $x_k \in \text{Vect}(x_1, \dots, x_{k-1}, x_{k+1}, \dots, x_p)$ .

$\Leftarrow$

Supposons que l'un des vecteurs de  $(x_1, \dots, x_p)$  est combinaison linéaire des autres.

Montrons que  $(x_1, \dots, x_p)$  est liée.

Quitte à permuter les vecteurs de la famille, on peut supposer  $x_1 \in \text{Vect}(x_2, \dots, x_p)$ .

Soient  $\mu_2, \dots, \mu_p \in \mathbb{K}$  tels que  $x_1 = \mu_2 x_2 + \dots + \mu_p x_p$ .

On remarque 
$$\begin{cases} x_1 - \mu_2 x_2 - \dots - \mu_p x_p = 0_E \\ (1, -\mu_2, \dots, -\mu_p) \neq (0, \dots, 0) \end{cases}$$

Donc  $(x_1, \dots, x_p)$  est liée. ■

---

**Définition 12.100**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $x, y \in E$ .

On dit que les vecteurs  $x$  et  $y$  sont colinéaires si la famille  $(x, y)$  est liée, c'est-à-dire si

$$\exists \lambda \in \mathbb{K}, y = \lambda x \quad \text{ou} \quad \exists \lambda \in \mathbb{K}, x = \lambda y.$$

---

*Exemple 12.101*

Soit une famille de polynômes non-nuls  $\mathcal{F} = (P_1, \dots, P_r) \in \mathbb{K}[X]^r$  de degrés deux à deux distincts, c'est-à-dire telle que :

$$\forall i, j \in \llbracket 1 ; r \rrbracket, \quad i \neq j \implies \deg P_i \neq \deg P_j.$$

Alors  $\mathcal{F}$  est libre.

---

*Démonstration 12.102*

Posons  $\forall i \in \llbracket 1 ; r \rrbracket, \quad \begin{cases} \mu_i \text{ le coefficient dominant de } P_i \\ d_i = \deg P_i \in \mathbb{N} \end{cases}$

Quitte à permuter les vecteurs de la famille, on peut supposer  $d_1 > d_2 > \dots > d_r$ .

Montrons que  $(P_1, \dots, P_r)$  est libre.

Soient  $\lambda_1, \dots, \lambda_r \in \mathbb{K}$  tels que  $\lambda_1 P_1 + \dots + \lambda_r P_r = 0$ .

Montrons que  $\lambda_1 = \dots = \lambda_r = 0$ .

Le coefficient de degré  $d_1$  de  $\lambda_1 P_1 + \dots + \lambda_r P_r$  est  $\lambda_1 \mu_1$ .

Donc  $\lambda_1 \mu_1 = 0$  or  $\mu_1 \neq 0$  donc  $\lambda_1 = 0$ .

Donc  $\lambda_2 P_2 + \dots + \lambda_r P_r = 0$ .

On continue de même (récurrence finie) :  $\lambda_2 = 0$  puis  $\lambda_3 = 0$ , etc...

Donc  $(P_1, \dots, P_r)$  est libre. ■

---

*Exemple 12.103*

$(X^5 - X^3 + 1, X^2, X^4 - X, 5)$  est une famille libre de  $\mathbb{K}[X]$  car c'est une famille de polynômes non-nuls de degrés deux à deux distincts.

---

**Proposition 12.104**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel,  $(x_1, \dots, x_n) \in E^n$  une famille libre de  $E$  et  $x_{n+1} \in E$ .

Alors  $(x_1, \dots, x_{n+1})$  est une famille libre si, et seulement si,  $x_{n+1} \notin \text{Vect}(x_1, \dots, x_n)$ .



---

*Démonstration 12.105*

Par contraposée, montrons que  $(x_1, \dots, x_{n+1})$  est liée  $\iff x_{n+1} \in \text{Vect}(x_1, \dots, x_n)$ .

$\Leftarrow$  Vraie selon la Proposition 12.98.

$\Rightarrow$

Supposons que  $(x_1, \dots, x_{n+1})$  est liée.

Soient  $\lambda_1, \dots, \lambda_{n+1} \in \mathbb{K}$  tels que 
$$\begin{cases} \lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_{n+1} x_{n+1} = 0_E \\ (\lambda_1, \dots, \lambda_{n+1}) \neq (0, \dots, 0) \end{cases}$$

Montrons que  $\lambda_{n+1} \neq 0$ .

Par l'absurde, supposons  $\lambda_{n+1} = 0$ .

On a 
$$\begin{cases} \lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n = 0 \\ (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \neq (0, \dots, 0) \end{cases}$$

Donc  $(x_1, \dots, x_n)$  est liée : contradiction.

Donc  $\lambda_{n+1} \neq 0$ .

Donc  $x_{n+1} = \frac{-\lambda_1}{\lambda_{n+1}} x_1 + \dots + \frac{-\lambda_n}{\lambda_{n+1}} x_n$ .

Donc  $x_{n+1} \in \text{Vect}(x_1, \dots, x_n)$ . ■

### 12.3.2 Familles génératrices

---

**Définition 12.106**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $(x_1, \dots, x_p) \in E^p$  une famille d'éléments de  $E$ .

On dit que  $(x_1, \dots, x_p)$  est une famille génératrice de  $E$  ou que la famille  $(x_1, \dots, x_p)$  engendre  $E$  si tout vecteur de  $E$  est combinaison linéaire de ses vecteurs, c'est-à-dire si

$$E = \text{Vect}(x_1, \dots, x_p),$$

c'est-à-dire :

$$\forall x \in E, \exists \lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{K}, x = \lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_p x_p.$$

---

*Remarque 12.107*

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel,  $p \in \mathbb{N}^*$  et  $\mathcal{F} = (x_1, \dots, x_p) \in E^p$ .

(1) Le fait que  $\mathcal{F}$  soit une famille génératrice de  $E$  ne dépend pas de l'ordre de ses vecteurs :

$$\forall \sigma \in S_p, (x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(p)}) \text{ engendre } E \iff (x_1, \dots, x_p) \text{ engendre } E.$$

(2) Soit  $\mathcal{G} = (x_1, \dots, x_p, \dots, x_m) \in E^m$  une famille contenant  $\mathcal{F}$  (avec  $m \geq p$ ).

On a l'implication

$$\mathcal{F} \text{ est g  n  ratrice} \implies \mathcal{G} \text{ est g  n  ratrice.}$$

---

### Proposition 12.108

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel,  $m, n \in \mathbb{N}^*$ ,  $(x_1, \dots, x_n) \in E^n$  une famille quelconque de vecteurs de  $E$  et  $(y_1, \dots, y_m) \in E^m$  une famille g  n  ratrice de  $E$ .

Alors  $(x_1, \dots, x_n)$  est une famille g  n  ratrice de  $E$  si, et seulement si :

$$\forall j \in \llbracket 1 ; m \rrbracket, \quad y_j \in \text{Vect}(x_1, \dots, x_n).$$

---

*D  monstration 12.109*

$\implies$  Claire.

$\impliedby$

Supposons  $\forall j \in \llbracket 1 ; m \rrbracket, \quad y_j \in \text{Vect}(x_1, \dots, x_n)$ .

Soit  $(a_{ij})_{(i,j) \in \llbracket 1;n \rrbracket \times \llbracket 1;m \rrbracket} \in \mathbb{K}^{\llbracket 1;n \rrbracket \times \llbracket 1;m \rrbracket}$  tels que

$$\forall j \in \llbracket 1 ; m \rrbracket, \quad y_j = \sum_{i=1}^n a_{ij} x_i.$$

Montrons que  $(x_1, \dots, x_n)$  est g  n  ratrice de  $E$ .

Soit  $x \in E$ .

Montrons que  $x \in \text{Vect}(x_1, \dots, x_n)$ .

Comme  $(y_1, \dots, y_m)$  est g  n  ratrice de  $E$ , il existe  $b_1, \dots, b_m \in \mathbb{K}$  tels que

$$x = \sum_{j=1}^m b_j y_j.$$

On a donc

$$\begin{aligned} x &= \sum_{j=1}^m b_j \sum_{i=1}^n a_{ij} x_i \\ &= \sum_{i=1}^n \underbrace{\sum_{j=1}^m a_{ij} b_j}_{\in \mathbb{K}} x_i \\ &\in \text{Vect}(x_1, \dots, x_n). \end{aligned}$$

■

### 12.3.3 Bases

---

#### Définition 12.110

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $(e_1, \dots, e_p) \in E^p$  une famille d'éléments de  $E$ .

On dit que  $(e_1, \dots, e_p)$  est une base de  $E$  si c'est une famille libre et génératrice de  $E$ .

Il est équivalent de dire que tout vecteur de  $E$  s'écrit de façon unique comme combinaison linéaire des vecteurs de la famille :

$$\forall x \in E, \exists ! (\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in \mathbb{K}^p, x = \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_p e_p.$$

On appelle alors  $(\lambda_1, \dots, \lambda_p)$  les coordonnées du vecteur  $x$  dans la base  $(e_1, \dots, e_p)$ .

---

*Exemple 12.111 (Base canonique de  $\mathbb{K}^n$ )*

Posons :

$$\forall k \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, e_k = (\delta_{1k}, \delta_{2k}, \dots, \delta_{nk}) \in \mathbb{K}^n$$

(autrement dit, le  $n$ -uplet  $e_k$  a tous ses coefficients nuls sauf le  $k$ -ème qui vaut 1).

La famille  $(e_1, \dots, e_n) \in (\mathbb{K}^n)^n$  est une base de  $\mathbb{K}^n$  appelée la base canonique de  $\mathbb{K}^n$ .

---

*Exemple 12.112 (Base canonique de  $\mathbb{K}_n[X]$ )*

La famille

$$(1, X, X^2, \dots, X^n)$$

est une base de  $\mathbb{K}_n[X]$  appelée la base canonique de  $\mathbb{K}_n[X]$ .

---

#### Exercice/Exemple 12.113

On pose

$$E = \mathbb{R}^2 \quad v_1 = (1, 0) \quad v_2 = (1, 1).$$

Montrer que la famille  $(v_1, v_2) \in E^2$  est une base de  $E$  et donner les coordonnées d'un vecteur quelconque  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ .

Soient  $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$  et  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ .

On a

$$\begin{aligned} \lambda v_1 + \mu v_2 = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &\iff \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \\ &\iff \begin{cases} \lambda + \mu = x \\ \mu = y \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} \lambda = x - y \\ \mu = y \end{cases} \end{aligned}$$

Donc tout vecteur  $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$  s'écrit de façon unique comme combinaison linéaire de  $v_1$  et  $v_2$ .

Donc  $(v_1, v_2)$  est une base de  $\mathbb{R}^2$ .

De plus, on a obtenu les coordonnées de  $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$  dans la base  $(v_1, v_2)$  :

$$(x - y, y).$$

---

**Proposition 12.115**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $(x_1, \dots, x_p) \in E^p$  une famille d'éléments de  $E$ .

Considérons l'application linéaire

$$\begin{aligned} \varphi : \quad \mathbb{K}^p &\longrightarrow E \\ (\lambda_1, \dots, \lambda_p) &\longmapsto \lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_p x_p \end{aligned}$$

On a les équivalences suivantes :

$$\begin{aligned} (x_1, \dots, x_p) \text{ est une famille libre} &\iff \varphi \text{ est injective} \\ (x_1, \dots, x_p) \text{ est une famille génératrice de } E &\iff \varphi \text{ est surjective} \\ (x_1, \dots, x_p) \text{ est une base de } E &\iff \varphi \text{ est un isomorphisme} \end{aligned}$$

---

**Démonstration 12.116**

On a :

$$\begin{aligned} (x_1, \dots, x_p) \text{ est libre} &\iff [\forall (\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in \mathbb{K}^p, \lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_p x_p = 0_E \implies (\lambda_1, \dots, \lambda_p) = (0, \dots, 0)] \\ &\iff [\forall (\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in \mathbb{K}^p, (\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in \ker \varphi \implies (\lambda_1, \dots, \lambda_p) = (0, \dots, 0)] \\ &\iff \ker \varphi = \{0_E\} \\ &\iff \varphi \text{ est injective.} \end{aligned}$$

De plus :

$$\begin{aligned}(x_1, \dots, x_p) \text{ est g  n  ratrice de } E &\iff \forall x \in E, \exists (\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in \mathbb{K}^p, x = \varphi((\lambda_1, \dots, \lambda_p)) \\ &\iff \varphi \text{ est une surjection de } \mathbb{K}^p \text{ vers } E.\end{aligned}$$

Enfin :

$$\begin{aligned}(x_1, \dots, x_p) \text{ est une base de } E &\iff (x_1, \dots, x_p) \text{ est libre et g  n  ratrice de } E \\ &\iff \varphi \text{ est injective et surjective} \\ &\iff \varphi \text{ est bijective.}\end{aligned}$$

■

---

### Proposition 12.117

Soit  $n \in \mathbb{N}$ .

On consid  re une famille de polyn  mes  $\mathcal{B} = (P_0, \dots, P_n) \in \mathbb{K}_n[X]^{n+1}$  «    degr  s   chelonn  s », c'est-  -dire telle que

$$\forall k \in \llbracket 0 ; n \rrbracket, \deg P_k = k.$$

Alors  $\mathcal{B}$  est une base de  $\mathbb{K}_n[X]$ .

---

#### D  monstration 12.118

On sait que  $\mathcal{B}$  est une famille libre (selon l'Exemple 12.101).

Montrons que  $\mathcal{B}$  est g  n  ratrice de  $\mathbb{K}_n[X]$ .

Montrons que  $\forall k \in \llbracket 0 ; n \rrbracket, \underbrace{\forall P \in \mathbb{K}_k[X], P \in \text{Vect}(P_0, \dots, P_k)}_{\mathcal{P}(k)}$  par r  currence sur  $k$ .

Soit  $P \in \mathbb{K}_0[X]$ .

On a  $P_0$  constant et non-nul et  $P$  constant donc  $P = \frac{P}{P_0}P_0$  avec  $\frac{P}{P_0} \in \mathbb{K}$ .

Donc  $P \in \text{Vect}(P_0)$ .

D'o    $\mathcal{P}(0)$ .

Soit  $k \in \llbracket 0 ; n-1 \rrbracket$  tel que  $\mathcal{P}(k)$ .

Montrons  $\mathcal{P}(k+1)$ .

Soient  $P \in \mathbb{K}_{k+1}[X]$  et  $a_0, \dots, a_{k+1} \in \mathbb{K}$  tels que

$$P = a_{k+1}X^{k+1} + \dots + a_0X^0.$$

On note  $\mu$  le coefficient dominant de  $P_{k+1}$ .

On a

$$\begin{cases} \deg \left( P - \frac{a_{k+1}}{\mu} P_{k+1} \right) \leq k+1 \text{ car } \begin{cases} \deg P \leq k+1 \\ \deg P_{k+1} \leq k+1 \end{cases} \\ \text{le coefficient de degré } k+1 \text{ de } P - \frac{a_{k+1}}{\mu} P_{k+1} \text{ vaut } a_{k+1} - \frac{a_{k+1}}{\mu} \mu = 0 \end{cases}$$

Donc  $P - \frac{a_{k+1}}{\mu} P_{k+1} \in \mathbb{K}_k[X]$ .

Selon  $\mathcal{P}(k)$ , il existe  $\omega_0, \dots, \omega_k \in \mathbb{K}$  tels que

$$P - \frac{a_{k+1}}{\mu} P_{k+1} = \omega_0 P_0 + \dots + \omega_k P_k.$$

Finalement, on a :

$$P = \omega_0 P_0 + \dots + \omega_k P_k + \frac{a_{k+1}}{\mu} P_{k+1}.$$

Donc  $P \in \text{Vect}(P_0, \dots, P_{k+1})$ .

D'où  $\mathcal{P}(k+1)$ .

On a  $\mathcal{P}(n)$  donc  $\mathbb{K}_n[X] = \text{Vect}(\mathcal{B})$ .

Donc  $\mathcal{B}$  est une famille génératrice de  $\mathbb{K}_n[X]$ .

Finalement,  $\mathcal{B}$  est une base de  $\mathbb{K}_n[X]$ . ■

### 12.3.4 Pivots de Gauss pour les systèmes linéaires

Soient  $n, p \in \mathbb{N}^*$  et deux familles de scalaires :

$$(a_{ij})_{(i,j) \in \llbracket 1;n \rrbracket \times \llbracket 1;p \rrbracket} \in \mathbb{K}^{\llbracket 1;n \rrbracket \times \llbracket 1;p \rrbracket} \quad \text{et} \quad (b_1, \dots, b_n) \in \mathbb{K}^n.$$

Considérons le système linéaire de  $n$  équations à  $p$  inconnues suivant :

$$(S) \begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1p}x_p = b_1 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + \dots + a_{np}x_p = b_n \end{cases}$$

On peut dire au choix :

- que ses inconnues sont les scalaires  $x_1, \dots, x_p \in \mathbb{K}$ .
- que son inconnue est le  $p$ -uplet  $(x_1, \dots, x_p) \in \mathbb{K}^p$ .

L'ensemble solution  $\mathcal{S} \subseteq \mathbb{K}^p$  de  $(S)$  est l'ensemble des  $p$ -uplets qui vérifient  $(S)$ .

On dit que  $(S)$  est un système linéaire homogène si  $b_1 = \dots = b_n = 0$ .

On a

$\mathcal{S}$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{K}^p \iff (S)$  est un système linéaire homogène.

L'algorithme du « pivot de Gauss » permet de résoudre le système  $(S)$  en raisonnant par équivalences, en appliquant au système les transformations suivantes :

- $L_i \leftrightarrow L_j$  : échange des lignes  $L_i$  et  $L_j$ .
- $L_i \leftarrow \lambda L_i$  : multiplication de la ligne  $L_i$  par  $\lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$ .
- $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$  : ajout à  $L_i$  de  $\lambda L_j$  où  $\lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$ .

De plus, si le système  $(S)$  est linéaire homogène, il permet d'obtenir une base de l'espace vectoriel  $\mathcal{S}$ .

### Exercice/Exemple 12.119

Soient  $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ .

Résoudre les systèmes linéaires suivants en appliquant l'algorithme du pivot de Gauss.

Donner une base de l'ensemble solution de chaque système linéaire homogène.

$$(S_1) \begin{cases} 2x + 3y = -1 \\ x + 2y = -3 \end{cases} \quad (S_2) \begin{cases} x + 2y - z = \alpha \\ 2x + 5y + 3z = \beta \\ 3x + 7y + 2z = \gamma \end{cases} \quad (S_3) \begin{cases} a + 2b + c + 3d = 0 \\ 3a + 7b + 3c + 6d = 0 \\ a + 3b + c = 0 \end{cases} \quad (S_4) \quad 8a + 4b - 2c + d = 0$$

*Correction 12.120 (1)*

On a

$$\begin{aligned} (S_1) &\iff \begin{cases} 2x + 3y = -1 \\ x + 2y = -3 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x + 2y = -3 \\ 2x + 3y = -1 \end{cases} \quad L_1 \leftrightarrow L_2 \\ &\iff \begin{cases} x + 2y = -3 \\ -y = 5 \end{cases} \quad L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \\ &\iff \begin{cases} x = 7 \\ y = -5 \end{cases} \end{aligned}$$

Donc  $\mathcal{S}_1 = \{(7, -5)\}$ .

---

*Correction 12.121 (2)*

On a

$$\begin{aligned}(S_2) &\iff \begin{cases} x + 2y - z = \alpha \\ 2x + 5y + 3z = \beta \\ 3x + 7y + 2z = \gamma \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x + 2y - z = \alpha \\ y + 5z = \beta - 2\alpha & L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \\ y + 5z = \gamma - 3\alpha & L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x + 2y - z = \alpha \\ y + 5z = \beta - 2\alpha \\ 0 = \gamma - \beta - \alpha \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x - 11z = 5\alpha - 2\beta & L_1 \leftarrow L_1 - 2L_2 \\ y + 5z = \beta - 2\alpha \\ 0 = \gamma - \beta - \alpha \end{cases}\end{aligned}$$

Si  $\gamma - \beta - \alpha \neq 0$  alors  $\mathcal{S}_2 = \emptyset$ .

Supposons  $\gamma - \beta - \alpha = 0$ .

Alors

$$\mathcal{S}_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 5\alpha - 2\beta \\ \beta - 2\alpha \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 11 \\ -5 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}_{\lambda \in \mathbb{R}}$$

De plus, si  $\alpha = \beta = \gamma = 0$  alors  $(S_2)$  est homogène et  $\mathcal{S}_2$  est un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de base  $\left( \begin{pmatrix} 11 \\ -5 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ .

---

*Correction 12.122 (3)*

On a

$$\begin{aligned}(S_3) &\iff \begin{cases} a + 2b + c + 3d = 0 \\ 3a + 7b + 3c + 6d = 0 \\ a + 3b + c = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} a + 2b + c + 3d = 0 \\ b - 3d = 0 & L_2 \leftarrow L_2 - 3L_1 \\ b - 3d = 0 & L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} a + c + 9d = 0 & L_1 \leftarrow L_1 - 2L_2 \\ b - 3d = 0 \end{cases}\end{aligned}$$



Donc

$$\mathcal{S}_3 = \left\{ \lambda \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} -9 \\ 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}_{(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2}$$

Donc  $\mathcal{S}_3$  est un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de base  $\left( \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -9 \\ 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ .

*Correction 12.123 (4)*

On a

$$\begin{aligned} (S_4) &\iff 8a + 4b - 2c + d = 0 \\ &\iff d + 8a + 4b - 2c = 0 \end{aligned}$$

On a

$$\begin{aligned} \forall \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4, \quad \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} \in \mathcal{S}_4 &\iff d = -8a - 4b + 2c \\ &\iff \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ -8a - 4b + 2c \end{pmatrix} \\ &\iff \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -8 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Donc

$$\mathcal{S}_4 = \text{Vect} \left( \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -8 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$$

et  $\left( \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -8 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$  est une base de  $\mathcal{S}_4$ .

## 12.3.5 Familles de vecteurs et applications linéaires

### 12.3.5.1 Image d'une famille par une application linéaire

---

**Proposition 12.124**

Soient  $E$  et  $F$  deux  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels,  $u \in \mathcal{L}(E, F)$  et  $(x_1, \dots, x_p) \in E^p$  une famille de vecteurs de  $E$ .

On a :

- (1) Si  $(x_1, \dots, x_p)$  est libre et  $u$  injective, alors  $(u(x_1), \dots, u(x_p))$  est libre.
- (2) Si  $(x_1, \dots, x_p)$  est génératrice de  $E$  et  $u$  surjective, alors  $(u(x_1), \dots, u(x_p))$  est génératrice de  $F$ .
- (3) Si  $(x_1, \dots, x_p)$  est une base de  $E$  et  $u$  un isomorphisme, alors  $(u(x_1), \dots, u(x_p))$  est une base de  $F$ .

---

*Démonstration 12.125 (1)*

On suppose que  $(x_1, \dots, x_p)$  est libre et  $u$  injective.

Soient  $\lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{K}$  tels que  $\lambda_1 u(x_1) + \dots + \lambda_p u(x_p) = 0_F$ .

Montrons que  $\lambda_1 = \dots = \lambda_p = 0$ .

Comme  $u$  est linéaire, on a  $u(\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_p x_p) = 0_F$ .

Donc, comme  $u$  est injective, on a  $\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_p x_p = 0_E$ .

Donc, comme  $(x_1, \dots, x_p)$  est libre, on a  $\lambda_1 = \dots = \lambda_p = 0$ .

Donc  $(u(x_1), \dots, u(x_p))$  est libre. ■

---

*Démonstration 12.126 (2)*

Supposons que  $(x_1, \dots, x_p)$  engendre  $E$  et que  $u$  est surjective.

On a

$$\begin{aligned} \text{Vect}(u(x_1), \dots, u(x_p)) &= u(\text{Vect}(x_1, \dots, x_p)) \\ &= u(E) \\ &= F \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \downarrow \text{car } (x_1, \dots, x_p) \text{ engendre } E \\ \downarrow \text{car } u \text{ est surjective} \end{array} \right\}$$

Donc  $(u(x_1), \dots, u(x_p))$  engendre  $F$ . ■

---

*Démonstration 12.127 (3)*

Découle de (1) et (2). ■

### 12.3.5.2 Application linéaire définie par l'image d'une base

#### Proposition 12.128

Soient  $E$  et  $F$  deux  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels,  $(e_1, \dots, e_p)$  une base de  $E$  et  $(y_1, \dots, y_p)$  une famille d'éléments de  $F$ .

Alors

$$\exists ! u \in \mathcal{L}(E, F), \quad \forall j \in \llbracket 1 ; p \rrbracket, \quad u(e_j) = y_j.$$

*Démonstration 12.129*

Pour tout vecteur  $x \in E$ , on note  $(e_1^*(x), \dots, e_p^*(x))$  les coordonnées de  $x$  dans la base  $(e_1, \dots, e_p)$ . Autrement dit, on a

$$\begin{cases} e_1^*(x), \dots, e_p^*(x) \in \mathbb{K} \\ x = e_1^*(x) e_1 + \dots + e_p^*(x) e_p \end{cases}$$

analyse

Soit  $u \in \mathcal{L}(E, F)$  tel que  $\forall j \in \llbracket 1 ; p \rrbracket, \quad u(e_j) = y_j$ .

On a  $\forall x \in E, \quad x = e_1^*(x) e_1 + \dots + e_p^*(x) e_p$ .

Donc comme  $u$  est linéaire, on a :

$$\begin{aligned} \forall x \in E, \quad u(x) &= e_1^*(x) u(e_1) + \dots + e_p^*(x) u(e_p) \\ &= e_1^*(x) y_1 + \dots + e_p^*(x) y_p. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{D'où } u : E &\longrightarrow F \\ x &\longmapsto e_1^*(x) y_1 + \dots + e_p^*(x) y_p \end{aligned}$$

synthèse

$$\begin{aligned} \text{Posons } u : E &\longrightarrow F \\ x &\longmapsto e_1^*(x) y_1 + \dots + e_p^*(x) y_p \end{aligned}$$

$u$  est clairement linéaire car  $e_1^*, \dots, e_p^*$  sont linéaires.

On a

$$\forall j \in \llbracket 1 ; p \rrbracket, \quad u(e_j) = e_1^*(e_j) y_1 + \dots + e_p^*(e_j) y_p = \delta_{1j} y_1 + \dots + \delta_{pj} y_p = y_j. \quad \blacksquare$$

### 12.3.6 Extension aux familles quelconques

Dans ce paragraphe, on étend ce qu'on a vu précédemment à des familles de vecteurs indicées par un ensemble quelconque (éventuellement infini).

### 12.3.6.1 Combinaisons linéaires

---

**Définition 12.130 (Famille de scalaires « presque tous nuls »)**

Soient  $I$  un ensemble et  $(\lambda_i)_{i \in I} \in \mathbb{K}^I$  une famille de scalaires indicée par  $I$ .

On appelle support de la famille  $(\lambda_i)_{i \in I} \in \mathbb{K}^I$  l'ensemble

$$\text{Supp } (\lambda_i)_{i \in I} = \{i \in I \mid \lambda_i \neq 0\}.$$

Cette famille est dite à support fini si son support est fini. Si l'ensemble  $I$  est infini, on dit alors aussi que c'est une famille de scalaires presque tous nuls.

L'ensemble des familles de scalaires indicées par  $I$  à support fini est souvent noté  $\mathbb{K}^{(I)}$  :

$$\mathbb{K}^{(I)} = \{(\lambda_i)_{i \in I} \in \mathbb{K}^I \mid \text{Card Supp } (\lambda_i)_{i \in I} < +\infty\}.$$

Si  $I$  est fini, on a  $\mathbb{K}^{(I)} = \mathbb{K}^I$ .

---

**Notation 12.131**

Soient  $I$  un ensemble,  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $\mathcal{F} = (x_i)_{i \in I} \in E^I$  une famille de vecteurs de  $E$ .

Si  $(\lambda_i)_{i \in I} \in \mathbb{K}^{(I)}$  est une famille de scalaires à support fini, on pose :

$$\sum_{i \in I} \lambda_i x_i = \sum_{i \in \text{Supp } \mathcal{F}} \lambda_i x_i.$$

Ainsi, on s'autorise à écrire une somme éventuellement infinie  $\sum_{i \in I} \lambda_i x_i$  car on la voit comme une somme finie.

---

**Définition 12.132 (Combinaison linéaire, généralisation de la Définition 12.3)**

Soient  $I$  un ensemble,  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $\mathcal{F} = (x_i)_{i \in I} \in E^I$  une famille de vecteurs de  $E$ .

On appelle combinaison linéaire de  $\mathcal{F}$  tout vecteur de la forme :

$$\sum_{i \in I} \lambda_i x_i$$

où  $(\lambda_i)_{i \in I} \in \mathbb{K}^{(I)}$  est une famille de scalaires à support fini.

---

**Définition/Proposition 12.133**

Soient  $I$  un ensemble,  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $\mathcal{F} = (x_i)_{i \in I} \in E^I$  une famille de vecteurs de  $E$ .

On appelle sous-espace vectoriel engendré par  $\mathcal{F}$  et on note  $\text{Vect}(\mathcal{F})$  le plus petit sous-espace vectoriel de  $E$  qui contient les vecteurs de  $\mathcal{F}$ .

Ses éléments sont les combinaisons linéaires de  $\mathcal{F}$ .

---

*Exemple 12.134*

Considérons le  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel  $\mathbb{K}[X]$  et la famille  $\mathcal{F} = (X^n)_{n \in \mathbb{N}}$ .

Alors

$$\text{Vect}(\mathcal{F}) = \mathbb{K}[X].$$

### 12.3.6.2 Familles génératrices

---

**Définition 12.135**

Soient  $I$  un ensemble,  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $\mathcal{F} = (x_i)_{i \in I} \in E^I$  une famille de vecteurs de  $E$ .

On dit que  $\mathcal{F}$  est une famille génératrice de  $E$  ou que la famille  $\mathcal{F}$  engendre  $E$  si tout vecteur de  $E$  est combinaison linéaire des vecteurs de  $\mathcal{F}$ , c'est-à-dire si :

$$E = \text{Vect}(\mathcal{F}),$$

c'est-à-dire :

$$\forall x \in E, \exists (\lambda_i)_{i \in I} \in \mathbb{K}^{(I)}, x = \sum_{i \in I} \lambda_i x_i.$$

### 12.3.6.3 Familles libres

---

**Définition 12.136**

Soient  $I$  un ensemble,  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $\mathcal{F} = (x_i)_{i \in I} \in E^I$  une famille de vecteurs de  $E$ .

On dit que  $\mathcal{F}$  est une famille libre si :

$$\forall (\lambda_i)_{i \in I} \in \mathbb{K}^{(I)}, \sum_{i \in I} \lambda_i x_i = 0_E \implies [\forall i \in I, \lambda_i = 0].$$

Si la famille  $\mathcal{F}$  n'est pas libre, on dit qu'elle est liée.

---

*Remarque 12.137*

Soient  $I$  un ensemble,  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $\mathcal{F} = (x_i)_{i \in I} \in E^I$  une famille de vecteurs de  $E$ .

Alors la famille  $\mathcal{F}$  est libre si, et seulement si, pour tous  $p \in \mathbb{N}^*$  et tous  $i_1, \dots, i_p \in I$  deux à deux distincts, la famille  $(x_{i_1}, \dots, x_{i_p})$  est libre.

---

*Exemple 12.138*

Soient  $I$  un ensemble et  $\mathcal{F} = (P_i)_{i \in I} \in \mathbb{K}[X]^I$  une famille de polynômes non-nuls de degrés deux à deux distincts, c'est-à-dire telle que :

$$\forall i, j \in I, i \neq j \implies \deg P_i \neq \deg P_j.$$

Alors  $\mathcal{F}$  est libre.

#### 12.3.6.4 Bases

---

##### Définition 12.139

Soient  $I$  un ensemble,  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $\mathcal{F} = (e_i)_{i \in I} \in E^I$  une famille de vecteurs de  $E$ .

On dit que  $\mathcal{F}$  est une base de  $E$  si c'est une famille libre et génératrice de  $E$ .

Il est équivalent de dire que tout vecteur de  $E$  s'écrit de façon unique comme combinaison linéaire des vecteurs de la famille :

$$\forall x \in E, \exists! (\lambda_i)_{i \in I} \in \mathbb{K}^{(I)}, x = \sum_{i \in I} \lambda_i e_i.$$

On appelle alors  $(\lambda_i)_{i \in I}$  les coordonnées du vecteur  $x$  dans la base  $\mathcal{F}$ .

---

*Exemple 12.140 (Base canonique de  $\mathbb{K}[X]$ )*

La famille

$$(X^n)_{n \in \mathbb{N}}$$

est une base de  $\mathbb{K}[X]$  appelée la base canonique de  $\mathbb{K}[X]$ .

#### 12.3.6.5 Cas des ensembles de vecteurs

---

##### Définition 12.141 (Parties libres, génératrices)

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

On dit qu'une partie  $A \subseteq E$  est :

- libre si la famille  $(x)_{x \in A}$  est libre.
- génératrice si la famille  $(x)_{x \in A}$  est génératrice de  $E$ .
- une base de  $E$  si la famille  $(x)_{x \in A}$  est une base de  $E$ .

## 12.4 Géométrie affine

### 12.4.1 Translations

---

**Définition 12.142 (Translation)**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $v \in E$ .

On appelle translation de vecteur  $v$  la fonction :

$$\begin{aligned} E &\longrightarrow E \\ x &\longmapsto x + v \end{aligned}$$

---

*Remarque 12.143*

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $v \in E$ .

L'image du vecteur nul par la translation de vecteur  $v$  est le vecteur  $v$ .

En particulier, une translation n'est jamais un endomorphisme, sauf si  $v = 0$  (dans ce cas, la translation de vecteur  $v$  est l'application identité  $\text{id}_E$ ).

## 12.4.2 Sous-espaces affines

---

**Définition/Proposition 12.144 (Sous-espace affine d'un espace vectoriel)**

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

On appelle sous-espace affine de  $E$  toute partie  $A \subseteq E$  de la forme :

$$A = v_1 + A_0 = \{v_1 + v_0\}_{v_0 \in A_0}$$

où  $v_1 \in E$  et  $A_0$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ .

On dit que  $v_1 + A_0$  est le sous-espace affine de direction  $A_0$  passant par  $v_1$ .

(1) On a alors nécessairement :

$$A_0 = \{v - v'\}_{v, v' \in A}.$$

En particulier, l'espace vectoriel  $A_0$  est unique. Il est appelé la direction du sous-espace affine  $A$ .

(2) En revanche, le vecteur  $v_1$  n'est pas unique en général car tout vecteur de  $A$  convient :

$$\forall v_2 \in A, \quad A = v_2 + A_0.$$

---

*Démonstration 12.145 (1)*

Montrons que  $A_0 = \{v - v'\}_{v, v' \in A}$ .

$\supseteq$

Soient  $v, v' \in A$ .

Montrons que  $v - v' \in A_0$ .

Il existe  $v_0, v'_0 \in A_0$  tels que  $\begin{cases} v = v_1 + v_0 \\ v' = v_1 + v'_0 \end{cases}$

On a

$$\begin{aligned} v - v' &= v_1 + v_0 - (v_1 + v'_0)' \\ &= v_0 - v'_0 \\ &\in A_0 \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} v - v' &= v_1 + v_0 - (v_1 + v'_0)' \\ &= v_0 - v'_0 \\ &\in A_0 \end{aligned}} \right\} \text{car } A_0 \text{ est un sous-espace vectoriel}$$

$\subseteq$

Soit  $v_0 \in A_0$ .

On a  $\begin{cases} v_1 + v_0 \in A \\ v_1 + 0_E \in A \end{cases}$

D'où

$$v_0 = v_1 + v_0 - (v_1 + 0_E) \in \{v - v'\}_{v, v' \in A}.$$

■

---

*Démonstration 12.146 (2)*

Soit  $v_2 \in A$ .

Montrons que  $A = v_2 + A_0$ , c'est-à-dire  $v_1 + A_0 = v_2 + A_0$ .

On a  $v_2 = v_1 + v_0$  où  $v_0 \in A_0$ .

Donc

$$v_2 + A_0 = v_1 + v_0 + A_0 = v_1 + A_0 \text{ car } v_0 \in A_0.$$

■

---

*Remarque 12.147*

Les sous-espaces affines de  $E$  sont les images des sous-espaces vectoriels de  $E$  par les translations de  $E$ .



---

*Exemple 12.148*

Soit  $E$  un espace vectoriel.

Alors

- L'ensemble  $E$  est un sous-espace affine de  $E$ , de direction  $E$ .
- Tout singleton de  $E$  est un sous-espace affine de  $E$ , de direction  $\{0_E\}$ .
- Tout sous-espace vectoriel  $F$  de  $E$  est un sous-espace affine de  $E$ , de direction  $F$ .
- L'ensemble vide n'est pas un sous-espace affine de  $E$ .

---

*Exemple 12.149*

Prenons  $E = \mathbb{R}^3$  et considérons le système suivant, d'inconnue  $(x, y, z) \in E$  :

$$(S) \begin{cases} x + y - 4z = 1 \\ x - y - 2z = 3 \end{cases}$$

Son ensemble solution  $A$  est un sous-espace affine de  $E$ .

---

*Démonstration 12.150*

On a

$$\begin{aligned} (S) &\iff \begin{cases} x + y - 4z = 1 \\ x - y - 2z = 3 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x + y - 4z = 1 \\ -2y + 2z = 2 \end{cases} \quad L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ &\iff \begin{cases} x - 3z = 2 & L_1 \leftarrow L_1 + \frac{1}{2}L_2 \\ y - z = -1 & L_2 \leftarrow \frac{-1}{2}L_2 \end{cases} \end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned} A &= \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}_{\lambda \in \mathbb{R}} \\ &= \text{Vect} \left( \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) + \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Donc  $A$  est le sous-espace affine de  $E$  passant par  $\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$  et dirigé par  $\text{Vect} \left( \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ . ■

---

**Proposition 12.151 (Intersection de sous-espaces affines)**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $(A_i)_{i \in I}$  une famille de sous-espaces affines de  $E$ .

Pour tout  $i \in I$ , on note  $A_i'$  la direction de  $A_i$ .

Alors l'intersection  $\bigcap_{i \in I} A_i$  est soit l'ensemble vide, soit un sous-espace affine de  $E$  de direction  $\bigcap_{i \in I} A_i'$ .

---

*Démonstration 12.152*

Supposons  $\bigcap_{i \in I} A_i \neq \emptyset$ .

Soit  $x \in \bigcap_{i \in I} A_i$ .

Montrons que  $\bigcap_{i \in I} A_i = x + \bigcap_{i \in I} A_i'$ .

$\subseteq$

Soit  $y \in \bigcap_{i \in I} A_i$ .

On a  $\forall i \in I, y \in A_i = x + A_i'$ .

Donc pour tout  $i \in I$ , il existe  $z_i \in A_i'$  tel que  $y = x + z_i$ .

D'où  $\forall i \in I, y - x = z_i \in A_i'$ .

Donc  $y - x \in \bigcap_{i \in I} A_i'$ .

D'où  $y = x + y - x \in x + \bigcap_{i \in I} A_i'$ .

$\supseteq$

Soit  $y \in x + \bigcap_{i \in I} A_i'$ .

Alors  $\forall j \in I, y \in x + A_j'$  car  $A_j' \subseteq \bigcap_{i \in I} A_i'$ .

Donc  $y \in \bigcap_{j \in I} (x + A_j') = \bigcap_{j \in I} A_j$ . ■

### 12.4.3 Équations linéaires

---

**Définition 12.153 (Équation linéaire)**

Soient  $E$  et  $F$  deux  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels,  $u \in \mathcal{L}(E, F)$  et  $y \in F$ .

L'équation suivante, d'inconnue  $x \in E$ , est appelée équation linéaire :

$$u(x) = y.$$

---

**Exemple 12.154 (Système linéaire)**

Le système suivant :

$$(S) \begin{cases} x + y - 4z = 1 \\ x - y - 2z = 3 \end{cases}$$

peut être vu comme une équation linéaire.

Posons  $u : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2 \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^2)$  et  $Y = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ .

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \longmapsto \begin{pmatrix} x + y - 4z \\ x - y - 2z \end{pmatrix}$$

Alors  $(S) \iff u(X) = Y$  : équation linéaire d'inconnue  $X \in \mathbb{R}^3$ .

---

**Exemple 12.155 (Équation différentielle linéaire)**

L'équation différentielle

$$(E) \quad y'' + y = \cos t$$

peut être vue comme une équation linéaire.

Posons  $u : \mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \longrightarrow \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  et  $z = \cos \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ .

$$y \longmapsto y'' + y$$

Alors  $(E) \iff u(y) = z$  : équation linéaire d'inconnue  $y \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ .

---

**Exemple 12.156 (Polynômes interpolateurs de Lagrange)**

Soient  $x_0, \dots, x_n \in \mathbb{R}$  deux à deux distincts et  $y_0, \dots, y_n \in \mathbb{R}$ .

Le système suivant, d'inconnue  $P \in \mathbb{R}[X]$  :

$$(S) \begin{cases} P(x_0) = y_0 \\ \vdots \\ P(x_n) = y_n \end{cases}$$

peut être vu comme une équation linéaire.

Posons  $u : \mathbb{R}[X] \longrightarrow \mathbb{R}^{n+1} \in \mathcal{L}(\mathbb{R}[X], \mathbb{R}^{n+1})$  et  $Y = (y_0, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$ .

$$P \longmapsto (P(x_0), \dots, P(x_n))$$

Alors  $(S) \iff u(P) = Y$  : équation linéaire d'inconnue  $P \in \mathbb{R}[X]$ .

---

**Proposition 12.157 (Ensemble solution d'une équation linéaire)**

Soient  $E$  et  $F$  deux  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels,  $u \in \mathcal{L}(E, F)$  et  $y \in F$ .

L'ensemble solution  $\mathcal{S}$  de l'équation linéaire suivante, d'inconnue  $x \in E$  :

$$u(x) = y$$

est soit l'ensemble vide, soit un sous-espace affine de  $E$  de direction  $\ker u$ .

---

*Démonstration 12.158*

Supposons  $\mathcal{S} \neq \emptyset$ .

Soit  $x_1 \in \mathcal{S}$ .

On a :

$$\begin{aligned} \forall x \in E, \quad u(x) = y &\iff u(x) = u(x_1) \\ &\iff u(x - x_1) = 0 \\ &\iff x - x_1 \in \ker u \\ &\iff \exists x_0 \in \ker u, \quad x - x_1 = x_0 \\ &\iff \exists x_0 \in \ker u, \quad x = x_0 + x_1 \\ &\iff x \in \ker u + x_1. \end{aligned}$$

Donc  $\mathcal{S} = x_1 + \ker u$ . ■

# Chapitre 13

## Équations différentielles

### Sommaire

---

<b>13.1</b>	<b>Équations différentielles linéaires du premier ordre . . . . .</b>	<b>451</b>
13.1.1	Cadre . . . . .	451
13.1.2	Cas homogène . . . . .	452
13.1.3	Méthode de variation de la constante . . . . .	454
13.1.4	Conséquences de la linéarité . . . . .	455
13.1.5	Méthode de résolution . . . . .	457
	13.1.5.1 Résolution de l'équation homogène associée . . . . .	457
	13.1.5.2 Recherche d'une solution particulière de $(E)$ . . . . .	457
	13.1.5.3 Conclusion . . . . .	457
<b>13.2</b>	<b>Équations différentielles linéaires du second ordre à coefficients constants</b>	<b>459</b>
13.2.1	Cadre . . . . .	459
13.2.2	Conséquences de la linéarité . . . . .	460
13.2.3	Cas homogène . . . . .	461
	13.2.3.1 Cas complexe . . . . .	462
	13.2.3.2 Cas réel . . . . .	464
13.2.4	Second membre de la forme « polynôme $\times$ exponentielle » . . . . .	465
<b>13.3</b>	<b>Changements de variable . . . . .</b>	<b>471</b>
<b>13.4</b>	<b>Problèmes de raccord. . . . .</b>	<b>471</b>

---

On pose  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ .

### 13.1 Équations différentielles linéaires du premier ordre

#### 13.1.1 Cadre

On considère :

- $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$  ;
- $a, b \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{K})$  ;

- éventuellement  $t_0 \in I$  et  $v_0 \in \mathbb{K}$ ;
- l'équation différentielle linéaire du premier ordre  $(E) \quad y' + a(t)y = b(t)$ .

Résoudre<sup>1</sup> l'équation différentielle  $(E)$ , c'est déterminer quelles sont les fonctions  $y \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{K})$  qui sont solutions de  $(E)$ , c'est-à-dire qui vérifient :

$$\forall t \in I, \quad y'(t) + a(t)y(t) = b(t).$$

L'ensemble solution de l'équation différentielle  $E$  est l'ensemble des solutions de  $(E)$  :

$$\mathcal{S} = \{y \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{K}) \mid \forall t \in I, \quad y'(t) + a(t)y(t) = b(t)\}.$$

L'équation différentielle  $(E)$  est dite homogène si  $b$  est la fonction identiquement nulle.

On appelle équation homogène associée à  $(E)$  l'équation différentielle linéaire homogène du premier ordre :  $(E_0) \quad y' + a(t)y = 0$ .

Lorsque l'on recherche la<sup>2</sup> solution de  $(E)$  qui vérifie de plus une condition initiale, on dit qu'on résout le problème de Cauchy :

$$\begin{cases} y' + a(t)y = b(t) \\ y(t_0) = v_0 \end{cases}$$

---

#### Exemple 13.1

- Équation différentielle linéaire homogène du premier ordre :

$$y' + (3 \ln t + 1)y = 0.$$

- Équation différentielle linéaire du premier ordre :

$$y' - \frac{\ln t}{t}y = t.$$

- Problème de Cauchy :

$$\begin{cases} y' + ty = t \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

### 13.1.2 Cas homogène

---

#### Proposition 13.2

Soient  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$ ,  $a \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{K})$  et  $A : I \longrightarrow \mathbb{K}$  une primitive de  $a$ .

Les solutions de l'équation différentielle linéaire homogène du premier ordre

$$(E_0) \quad y' + a(t)y = 0$$

sont les fonctions de la forme

$$y_0 : \begin{array}{ccc} I & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ t & \longmapsto & \lambda e^{-A(t)} \end{array} \quad \text{où } \lambda \in \mathbb{K}.$$

---

1. On dit aussi « intégrer l'équation différentielle  $(E)$  ».

2. On verra que cette solution existe et est unique.

---

*Démonstration 13.3*

Soit  $y \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{K})$ .

On a

$$\begin{aligned} y \text{ est solution de } (E_0) &\iff \forall t \in I, \quad y'(t) + a(t)y(t) = 0 \\ &\iff \forall t \in I, \quad y'(t)e^{A(t)} + a(t)y(t)e^{A(t)} = 0 \\ &\iff \forall t \in I, \quad (ye^A)'(t) = 0 \\ &\iff \exists \lambda \in \mathbb{K}, \quad \forall t \in I, \quad y(t)e^{A(t)} = \lambda \\ &\iff \exists \lambda \in \mathbb{K}, \quad \forall t \in I, \quad y(t) = \lambda e^{-A(t)}. \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \\ \end{array} \right\} \begin{array}{l} \\ \\ \text{car } I \text{ est un} \\ \text{intervalle} \end{array}$$

■

---

**Exercice/Exemple 13.4**

Résoudre sur l'intervalle  $\mathbb{R}_+^*$  l'équation différentielle homogène

$$(E_0) \quad y' + \frac{1}{t}y = 0.$$

---

*Correction 13.5*

Une primitive de  $a : t \mapsto \frac{1}{t}$  est  $A : t \mapsto \ln t$ .

Donc les solutions de  $(E_0)$  sont les fonctions de la forme

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}_+^* & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ t & \longmapsto & \lambda e^{-\ln t} = \frac{\lambda}{t} \end{array}$$

où  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

---

**Exercice/Exemple 13.6**

Résoudre sur l'intervalle  $\mathbb{R}_+^*$  l'équation différentielle homogène

$$(E_0) \quad y' + (\ln t)y = 0.$$

---

*Correction 13.7*

Une primitive de  $t \mapsto \ln t$  est  $t \mapsto t \ln t - t$ .

Donc les solutions de  $(E_0)$  sont les fonctions de la forme

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}_+^* & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ t & \longmapsto & \lambda e^{-t \ln t + t} = \lambda t^{-t} e^t = \lambda \left(\frac{e}{t}\right)^t \end{array}$$

où  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

### 13.1.3 Méthode de variation de la constante

---

#### Remarque 13.8

Il existe beaucoup de méthodes dites de « variation de la constante ». Elles permettent de trouver une/des/les solutions d'une équation différentielle linéaire à partir d'une solution non-nulle de l'équation différentielle linéaire homogène associée.

On montre dans ce paragraphe comment obtenir une solution (particulière) d'une équation différentielle linéaire à partir d'une solution de l'équation différentielle linéaire homogène associée.

---

#### Méthode 13.9 (Méthode de variation de la constante)

Soient  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$  et  $a, b \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{K})$ .

On considère l'équation différentielle linéaire

$$(E) \quad y' + a(t)y = b(t)$$

et son équation homogène associée

$$(E_0) \quad y' + a(t)y = 0.$$

On suppose que  $y_0 \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{K})$  est une solution de  $(E_0)$  qui ne s'annule jamais.

On peut en déduire une solution de  $(E)$  sous la forme

$$t \mapsto \lambda(t) y_0(t)$$

où  $\lambda \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{K})$ .

En particulier, l'ensemble solution de  $(E)$  est non-vidé.

---

#### Démonstration 13.10

Soit  $\lambda \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{K})$ .

On pose  $y_1 = \lambda y_0$ .

On a

$$\begin{aligned} y_1 \text{ est solution de } (E) &\iff \forall t \in I, (\lambda y_0)'(t) + a(t)(\lambda y_0)(t) = b(t) \\ &\iff \forall t \in I, \lambda'(t)y_0(t) + \underbrace{\lambda(t)y_0'(t) + a(t)\lambda(t)y_0(t)}_{=0 \text{ car } y_0 \text{ est solution de } (E_0)} = b(t) \\ &\iff \forall t \in I, \lambda'(t) = \frac{b(t)}{y_0(t)}. \end{aligned}$$

La fonction  $\frac{b}{y_0}$  est continue sur  $I$  donc elle admet une primitive  $\lambda \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{K})$ .

Alors  $y_1$  est solution de  $(E)$ . ■



---

**Exercice/Exemple 13.11**

Trouver une solution sur l'intervalle  $\mathbb{R}_+^*$  de l'équation différentielle

$$(E) \quad y' + \frac{1}{t}y = 1.$$

---

*Correction 13.12*

On a l'équation homogène associée à  $(E)$  :  $(E_0) \quad y' + \frac{1}{t}y = 0$ .

Les solutions de  $(E_0)$  sont les fonctions de la forme  $\mathbb{R}_+^* \longrightarrow \mathbb{R}$  où  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

$$t \longmapsto \frac{\lambda}{t}$$

Soit  $\lambda \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+^*, \mathbb{R})$ .

On pose  $y_1 : t \longmapsto \frac{\lambda(t)}{t}$ .

On a

$$\begin{aligned} y_1 \text{ est solution de } (E) &\iff \forall t \in \mathbb{R}_+^*, \quad y_1'(t) + \frac{1}{t}y_1(t) = 1 \\ &\iff \forall t \in \mathbb{R}_+^*, \quad \frac{\lambda'(t)t - \lambda(t)}{t^2} + \frac{\lambda(t)}{t^2} = 1 \\ &\iff \forall t \in \mathbb{R}_+^*, \quad \frac{\lambda'(t)t}{t^2} = 1 \\ &\iff \forall t \in \mathbb{R}_+^*, \quad \frac{\lambda'(t)}{t} = 1 \\ &\iff \forall t \in \mathbb{R}_+^*, \quad \lambda'(t) = t \\ &\iff \forall t \in \mathbb{R}_+^*, \quad \lambda(t) = \frac{t^2}{2} \end{aligned}$$

Donc  $t \longmapsto \frac{t}{2}$  est solution de  $(E)$ .

### 13.1.4 Conséquences de la linéarité

---

**Proposition 13.13 (Structure de l'ensemble solution)**

Soient  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$  et  $a, b \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{K})$ .

On considère l'équation différentielle linéaire

$$(E) \quad y' + a(t)y = b(t)$$

et son équation homogène associée

$$(E_0) \quad y' + a(t)y = 0.$$

(1) L'ensemble solution  $\mathcal{S}_0$  de  $(E_0)$  est un espace vectoriel.

(2) L'ensemble solution  $\mathcal{S}$  de  $(E)$  est un espace affine de direction  $\mathcal{S}_0$ .

---

Démonstration 13.14

Posons

$$\begin{array}{ccc} u : \mathcal{C}^1(I, \mathbb{K}) & \longrightarrow & \mathcal{C}^0(I, \mathbb{K}) \\ y & \longmapsto & y' + ay \end{array}$$

On a  $u \in \mathcal{L}(\mathcal{C}^1(I, \mathbb{K}), \mathcal{C}^0(I, \mathbb{K}))$ .

On a  $\mathcal{S}_0 = \ker u$  donc  $\mathcal{S}_0$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathcal{C}^1(I, \mathbb{K})$ .

$\mathcal{S}$  est l'ensemble solution de l'équation linéaire  $u(y) = b$  d'inconnue  $y \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{K})$ .

Selon la Méthode 13.9, on a  $\mathcal{S} \neq \emptyset$  donc  $\mathcal{S}$  est un sous-espace affine de  $\mathcal{C}^1(I, \mathbb{K})$  de direction  $\ker u = \mathcal{S}_0$ . ■

---

**Proposition 13.15 (Principe de superposition)**

Soient  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$ ,  $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{K}$  et  $a, b_1, b_2 \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{K})$ .

Si  $y_1 \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{K})$  est solution de

$$(E_1) \quad y' + a(t)y = b_1(t)$$

et  $y_2 \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{K})$  est solution de

$$(E_2) \quad y' + a(t)y = b_2(t)$$

alors  $\lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2$  est solution de

$$(E) \quad y' + a(t)y = \lambda_1 b_1(t) + \lambda_2 b_2(t).$$

---

Démonstration 13.16

★★ Exercice ★★ ■

---

**Proposition 13.17**

Soient  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$  et  $a \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$  et  $b \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{C})$ .

Si  $z \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{C})$  est solution de

$$y' + a(t)y = b(t)$$

alors  $\operatorname{Re} z$  est solution de

$$y' + a(t)y = \operatorname{Re} b(t)$$

et  $\operatorname{Im} z$  est solution de

$$y' + a(t)y = \operatorname{Im} b(t).$$

---

Démonstration 13.18

★★ Exercice ★★ ■

### 13.1.5 Méthode de résolution

Soient  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$  et  $a, b \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{K})$ .

On considère l'équation différentielle linéaire

$$(E) \quad y' + a(t)y = b(t).$$

#### 13.1.5.1 Résolution de l'équation homogène associée

Soit  $A : I \rightarrow \mathbb{K}$  une primitive de  $a$  sur  $I$ .

Selon la Proposition 13.2, les solutions de l'équation homogène associée à  $(E)$  :

$$(E_0) \quad y' + a(t)y = 0$$

sont les fonctions de la forme

$$y_0 : \begin{array}{ll} I & \longrightarrow \mathbb{K} \\ t & \longmapsto \lambda e^{-A(t)} \end{array} \quad \text{où } \lambda \in \mathbb{K}.$$

#### 13.1.5.2 Recherche d'une solution particulière de $(E)$

On obtient une solution particulière de  $(E)$ , que l'on note  $y_1$  :

- soit en remarquant qu'il existe une solution « évidente » ;
- soit en utilisant la méthode de variation de la constante (en utilisant la Proposition 13.15 et la Proposition 13.17 si cela allège les calculs).

#### 13.1.5.3 Conclusion

Les solutions de  $(E)$  sont les fonctions de la forme

$$y : \begin{array}{ll} I & \longrightarrow \mathbb{K} \\ t & \longmapsto \lambda e^{-A(t)} + y_1(t) \end{array} \quad \text{où } \lambda \in \mathbb{K}.$$

S'il existe une condition initiale, on trouve la valeur de la constante  $\lambda$  pour que la condition initiale soit vérifiée (cette valeur existe et est unique).

---

#### Exercice/Exemple 13.19

Résoudre l'équation différentielle

$$(E) \quad y' - \frac{1}{t}y = 1 + \frac{2}{t} + t^2 \sin t$$

sur l'intervalle  $\mathbb{R}_+^*$ .

---

*Correction 13.20*

On a l'équation homogène associée  $(E_0) \quad y' - \frac{1}{t}y = 0$ .

Les solutions de  $(E_0)$  sont les fonctions de la forme  $\begin{array}{ccc} \mathbb{R}_+^* & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ t & \longmapsto & \lambda t \end{array}$  où  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

Déterminons une solution particulière de  $(E_1) \quad y' - \frac{1}{t}y = 1$ .

Soit  $\lambda \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+^*, \mathbb{R})$ .

Posons  $y_1 : t \longmapsto \lambda(t)t$ .

On a

$$\begin{aligned} y_1 \text{ est solution de } (E_1) &\iff \forall t \in \mathbb{R}_+^*, \quad \lambda'(t)t + \lambda(t) - \lambda(t) = 1 \\ &\iff \forall t \in \mathbb{R}_+^*, \quad \lambda'(t)t = 1 \\ &\iff \forall t \in \mathbb{R}_+^*, \quad \lambda'(t) = \frac{1}{t} \\ &\iff \lambda = \ln \end{aligned}$$

Donc  $y_1 : t \longmapsto t \ln t$  est solution de  $(E_1)$ .

On remarque que  $y_2 : t \longmapsto -1$  est solution de  $(E_2) \quad y' - \frac{1}{t}y = \frac{1}{t}$ .

Déterminons une solution particulière de  $(E_3) \quad y' - \frac{1}{t}y = t^2 e^{it}$ .

Soit  $\lambda \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+^*, \mathbb{C})$ .

Posons  $y_3 : t \longmapsto \lambda(t)t$ .

On a

$$\begin{aligned} y_3 \text{ est solution de } (E_3) &\iff \forall t \in \mathbb{R}_+^*, \quad \lambda'(t)t + \lambda(t) - \lambda(t) = t^2 e^{it} \\ &\iff \forall t \in \mathbb{R}_+^*, \quad \lambda'(t)t = t^2 e^{it} \\ &\iff \forall t \in \mathbb{R}_+^*, \quad \lambda'(t) = t e^{it} \\ &\iff \forall t \in \mathbb{R}_+^*, \quad \lambda(t) = \int^t x e^{ix} dx \\ &\iff \forall t \in \mathbb{R}_+^*, \quad \lambda(t) = [-i e^{ix} x]^t - \int^t -i e^{ix} dx \\ &\iff \forall t \in \mathbb{R}_+^*, \quad \lambda(t) = -i t e^{it} + e^{it} \\ &\iff \forall t \in \mathbb{R}_+^*, \quad \lambda(t) = e^{it} (1 - it) \end{aligned}$$

Donc  $y_3 : t \longmapsto t e^{it} (1 - it)$  est solution de  $(E_3)$ .

On a

$$\begin{aligned}
 \forall t \in \mathbb{R}_+^*, \quad \operatorname{Im} y_3(t) &= \operatorname{Im} (te^{it} (1 - it)) \\
 &= \operatorname{Im} (t (\cos t + i \sin t) (1 - it)) \\
 &= t \sin t - t^2 \cos t \\
 &= t (\sin t - t \cos t).
 \end{aligned}$$

On en déduit, par le principe de superposition, que

$$y_4 : t \mapsto t \ln t - 2 + t (\sin t - t \cos t)$$

est solution de  $(E)$ .

Finalement, les solutions de  $(E)$  sont les fonctions de la forme

$$\begin{array}{ccc}
 \mathbb{R}_+^* & \longrightarrow & \mathbb{R} \\
 t & \longmapsto & \lambda t + t \mapsto t \ln t - 2 + t (\sin t - t \cos t)
 \end{array}$$

où  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

## 13.2 Équations différentielles linéaires du second ordre à coefficients constants

### 13.2.1 Cadre

On considère :

- un intervalle  $I$  de  $\mathbb{R}$  ;
- des scalaires  $a, b, c \in \mathbb{K}$  avec  $a \neq 0$  ;
- une fonction continue  $f \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{K})$  ;
- éventuellement trois éléments  $t_0 \in I$  et  $v_0, w_0 \in \mathbb{K}$  ;
- l'équation différentielle linéaire du second ordre à coefficients constants

$$(E) \quad ay'' + by' + cy = f(t).$$

Résoudre<sup>3</sup> l'équation différentielle  $(E)$ , c'est déterminer quelles sont les fonctions  $y \in \mathcal{C}^2(I, \mathbb{K})$  qui sont solutions de  $(E)$ , c'est-à-dire qui vérifient

$$\forall t \in I, \quad ay''(t) + by'(t) + cy(t) = f(t).$$

---

3. On dit aussi « intégrer l'équation différentielle  $(E)$  ».

L'ensemble solution de l'équation différentielle  $(E)$  est l'ensemble des solutions de  $(E)$  :

$$\mathcal{S} = \{y \in \mathcal{C}^2(I, \mathbb{K}) \mid \forall t \in I, \quad ay''(t) + by'(t) + cy(t) = f(t)\}.$$

L'équation différentielle  $(E)$  est dite homogène si  $f$  est la fonction identiquement nulle.

On appelle équation homogène associée à  $(E)$  l'équation différentielle linéaire homogène du second ordre

$$(E_0) \quad ay'' + by' + cy = 0.$$

Lorsque l'on recherche la<sup>4</sup> solution de  $(E)$  qui vérifie de plus une condition initiale, on dit qu'on résout le problème de Cauchy :

$$\begin{cases} ay'' + by' + cy = f(t) \\ y(t_0) = v_0 \\ y'(t_0) = w_0 \end{cases}$$

### Exemple 13.21

- Équation différentielle linéaire homogène du second ordre à coefficients constants :

$$y'' + 2y' + y = 0.$$

- Équation différentielle linéaire du second ordre à coefficients constants :

$$y'' + 2y' + y = \cos t.$$

- Problème de Cauchy :

$$\begin{cases} y'' + 2y' + y = \cos t \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 1 \end{cases}$$

## 13.2.2 Conséquences de la linéarité

### Proposition 13.22 (Structure de l'ensemble solution)

Soient  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$ ,  $a, b, c \in \mathbb{K}$  tels que  $a \neq 0$  et  $f \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{K})$ .

On considère l'équation différentielle linéaire

$$(E) \quad ay'' + by' + cy = f(t)$$

et son équation homogène associée

$$(E_0) \quad ay'' + by' + cy = 0.$$

- (1) L'ensemble solution  $\mathcal{S}_0$  de  $(E_0)$  est un espace vectoriel.
- (2) L'ensemble solution  $\mathcal{S}$  de  $(E)$  est un espace affine de direction  $\mathcal{S}_0$ .

4. Cette solution existe et est unique.

---

Démonstration 13.23

Cf. Démonstration 13.14 en admettant que  $\mathcal{S}$  est non-vidé. ■

---

**Proposition 13.24 (Principe de superposition)**

Soient  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$ ,  $\lambda_1, \lambda_2, a, b, c \in \mathbb{K}$  tels que  $a \neq 0$  et  $f_1, f_2 \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{K})$ .

Si  $y_1 \in \mathcal{C}^2(I, \mathbb{K})$  est solution de

$$(E_1) \quad ay'' + by' + cy = f_1(t)$$

et  $y_2 \in \mathcal{C}^2(I, \mathbb{K})$  est solution de

$$(E_2) \quad ay'' + by' + cy = f_2(t)$$

alors  $\lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2$  est solution de

$$(E) \quad ay'' + by' + cy = \lambda_1 f_1(t) + \lambda_2 f_2(t).$$

---

Démonstration 13.25

★★ Exercice ★★ ■

---

**Proposition 13.26**

Soient  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$ ,  $a, b, c \in \mathbb{R}$  avec  $a \neq 0$  et  $f \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{C})$ .

Si  $z \in \mathcal{C}^2(I, \mathbb{C})$  est solution de

$$ay'' + by' + cy = f(t)$$

alors  $\operatorname{Re} z$  est solution de

$$ay'' + by' + cy = \operatorname{Re} f(t)$$

et  $\operatorname{Im} z$  est solution de

$$ay'' + by' + cy = \operatorname{Im} f(t).$$

---

Démonstration 13.27

★★ Exercice ★★ ■

### 13.2.3 Cas homogène

---

Remarque 13.28

Attention à ne jamais appliquer les résultats de ce paragraphe à des équations différentielles linéaires homogènes du second ordre à coefficients non-constants.

### 13.2.3.1 Cas complexe

#### Proposition 13.29

Soient  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$  et  $a, b, c \in \mathbb{C}$  tels que  $a \neq 0$ .

On considère l'équation différentielle linéaire homogène du second ordre

$$(E_0) \quad ay'' + by' + cy = 0.$$

On lui associe son équation caractéristique :

$$ax^2 + bx + c = 0$$

d'inconnue  $x \in \mathbb{C}$  et dont on note  $\Delta$  le discriminant.

Si  $\Delta \neq 0$  alors l'équation caractéristique admet deux solutions distinctes  $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$  et les solutions de  $(E_0)$  sur  $I$  sont les fonctions de la forme

$$\begin{aligned} I &\longrightarrow \mathbb{C} && \text{où } \lambda, \mu \in \mathbb{C}. \\ t &\longmapsto \lambda e^{\alpha t} + \mu e^{\beta t} \end{aligned}$$

Si  $\Delta = 0$  alors l'équation caractéristique admet une unique solution (double)  $\alpha \in \mathbb{C}$  et les solutions de  $(E_0)$  sur  $I$  sont les fonctions de la forme

$$\begin{aligned} I &\longrightarrow \mathbb{C} && \text{où } \lambda, \mu \in \mathbb{C}. \\ t &\longmapsto (\lambda t + \mu) e^{\alpha t} \end{aligned}$$

---

#### Démonstration 13.30

Soient  $\alpha \in \mathbb{C}$  tel que  $a\alpha^2 + b\alpha + c = 0$  et  $y \in \mathcal{C}^2(I, \mathbb{C})$ .

On pose  $\lambda : \begin{aligned} I &\longrightarrow \mathbb{C} \\ t &\longmapsto e^{-\alpha t} y(t) \end{aligned}$  de sorte qu'on a  $\begin{cases} \forall t \in I, y(t) = \lambda(t) e^{\alpha t} \\ \lambda \in \mathcal{C}^2(I, \mathbb{C}) \end{cases}$

On a, selon la formule de Leibniz :

$$\begin{aligned} y \text{ est solution de } (E_0) &\iff \forall t \in I, a \left( \lambda''(t) e^{\alpha t} + 2\alpha \lambda'(t) e^{\alpha t} + \underbrace{\alpha^2 \lambda(t) e^{\alpha t}}_{\star} \right) + b \left( \lambda'(t) e^{\alpha t} + \underbrace{\alpha \lambda(t) e^{\alpha t}}_{\star} \right) \\ &\quad + \underbrace{c \lambda(t)}_{\star} = 0 \\ &\iff \forall t \in I, a \lambda''(t) + 2a\alpha \lambda'(t) + b \lambda'(t) = 0 \\ &\iff \lambda' \text{ est solution de } (E'_0) \quad z' + \left( 2\alpha + \frac{b}{a} \right) z = 0. \end{aligned}$$

$\star$  : s'annulent car  $a\alpha^2 + b\alpha + c = 0$ .

On note  $\alpha, \beta$  les racines de  $aX^2 + bX + c$  (c'est-à-dire  $\beta = \alpha$  si  $\Delta = 0$ ).



On sait que  $\alpha + \beta = \frac{-b}{a}$  donc

$$2\alpha + \frac{b}{a} = 2\alpha - \alpha - \beta = \alpha - \beta.$$

Si  $\Delta \neq 0$  :

Réolvons  $(E'_0)$ .

Une primitive de  $t \mapsto \alpha - \beta$  est  $t \mapsto (\alpha - \beta)t$  donc les solutions de  $(E'_0)$  sont les fonctions de la forme

$$t \mapsto \mu e^{-(\alpha-\beta)t} = \mu e^{(\beta-\alpha)t} \quad \text{où } \mu \in \mathbb{C}.$$

Réolvons maintenant  $(E_0)$ .

On a :

$$\begin{aligned} y \text{ est solution de } (E_0) &\iff \lambda' \text{ est solution de } (E'_0) \\ &\iff \exists \mu \in \mathbb{C}, \forall t \in I, \lambda'(t) = \mu e^{(\beta-\alpha)t} \\ &\iff \exists \mu, \nu \in \mathbb{C}, \forall t \in I, \lambda(t) = \frac{\mu}{\beta-\alpha} e^{(\beta-\alpha)t} + \nu \\ &\iff \exists \mu', \nu \in \mathbb{C}, \forall t \in I, \lambda(t) = \mu' e^{(\beta-\alpha)t} + \nu \\ &\iff \exists \mu', \nu \in \mathbb{C}, \forall t \in I, y(t) = \mu' e^{\beta t} + \nu e^{\alpha t} \end{aligned}$$

Les solutions de  $(E_0)$  sont donc les fonctions de la forme

$$t \mapsto \mu' e^{\beta t} + \nu e^{\alpha t}$$

où  $\mu', \nu \in \mathbb{C}$ .

Si  $\Delta = 0$  :

On a :

$$\begin{aligned} y \text{ est solution de } (E_0) &\iff \lambda' \text{ est solution de } z' = 0 \\ &\iff \lambda'' = 0 \\ &\iff \exists \mu \in \mathbb{C}, \forall t \in I, \lambda'(t) = \mu \\ &\iff \exists \mu, \nu \in \mathbb{C}, \forall t \in I, \lambda(t) = \mu t + \nu \\ &\iff \exists \mu, \nu \in \mathbb{C}, \forall t \in I, y(t) = (\mu t + \nu) e^{\alpha t} \end{aligned}$$

Les solutions de  $(E_0)$  sont donc les fonctions de la forme

$$t \mapsto (\mu t + \nu) e^{\alpha t} \quad \text{où } \mu, \nu \in \mathbb{C}.$$

■

---

### Exercice/Exemple 13.31

Donner les solutions complexes sur l'intervalle  $\mathbb{R}$  de l'équation différentielle

$$(E_0) \quad y'' + 2y' + y = 0.$$

---

*Correction 13.32*

L'unique solution de l'équation caractéristique  $x^2 + 2x + 1 = 0$  est  $-1$ .

Donc les solutions de  $(E_0)$  sont les fonctions de la forme

$$t \mapsto (\lambda t + \mu) e^{-t}$$

où  $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$ .

---

### Exercice/Exemple 13.33

Donner les solutions complexes sur l'intervalle  $\mathbb{R}$  de l'équation différentielle

$$(E_0) \quad y'' + y' + y = 0.$$

---

*Correction 13.34*

Les solutions de l'équation caractéristique  $x^2 + x + 1 = 0$  sont  $j$  et  $j^2$ .

Donc les solutions de  $(E_0)$  sont les fonctions de la forme

$$t \mapsto \lambda e^{jt} + \mu e^{j^2 t}$$

où  $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$ .

### 13.2.3.2 Cas réel

---

#### Proposition 13.35

Soient  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$  et  $a, b, c \in \mathbb{R}$  tels que  $a \neq 0$ .

On considère l'équation différentielle linéaire homogène du second ordre

$$(E_0) \quad ay'' + by' + cy = 0.$$

On lui associe son équation caractéristique :

$$ax^2 + bx + c = 0$$

d'inconnue  $x \in \mathbb{R}$  et dont on note  $\Delta$  le discriminant.

Si  $\Delta > 0$  alors l'équation caractéristique admet deux solutions distinctes  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$  et les solutions de  $(E_0)$  sur  $I$  sont les fonctions de la forme

$$\begin{array}{lll} I & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ t & \longmapsto & \lambda e^{\alpha t} + \mu e^{\beta t} \end{array} \quad \text{où } \lambda, \mu \in \mathbb{R}.$$

Si  $\Delta = 0$  alors l'équation caractéristique admet une unique solution (double)  $\alpha \in \mathbb{R}$  et les solutions de  $(E_0)$  sur  $I$  sont les fonctions de la forme

$$\begin{aligned} I &\longrightarrow \mathbb{R} && \text{où } \lambda, \mu \in \mathbb{R}. \\ t &\longmapsto (\lambda t + \mu) e^{\alpha t} \end{aligned}$$

Si  $\Delta < 0$  alors l'équation caractéristique admet deux solutions complexes conjuguées  $\alpha + i\beta$  et  $\alpha - i\beta$  avec  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$  et les solutions de  $(E_0)$  sont les fonctions de la forme

$$\begin{aligned} I &\longrightarrow \mathbb{R} && \text{où } \lambda, \mu \in \mathbb{R}. \\ t &\longmapsto (\lambda \cos(\beta t) + \mu \sin(\beta t)) e^{\alpha t} \end{aligned}$$

---

Démonstration 13.36

★★ Exercice ★★ (déduire le cas réel du cas complexe). ■

---

### Exercice/Exemple 13.37

Donner les solutions réelles sur l'intervalle  $\mathbb{R}$  de l'équation différentielle

$$(E_0) \quad y'' + y' + y = 0.$$

---

Correction 13.38

Les solutions de l'équation caractéristique  $x^2 + x + 1 = 0$  sont  $\frac{-1}{2} \pm i \frac{\sqrt{3}}{2}$ .

Donc les solutions de  $(E_0)$  sont les fonctions de la forme

$$t \longmapsto \left( \lambda \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) + \mu \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) \right) e^{-\frac{t}{2}}$$

avec  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ .

## 13.2.4 Second membre de la forme « polynôme $\times$ exponentielle »

---

### Méthode 13.39

Soient  $a, b, c, \gamma \in \mathbb{K}$  tels que  $a \neq 0$  et  $P \in \mathbb{K}[X]$ .

Pour trouver une solution de

$$(E) \quad ay'' + by' + cy = P(t) e^{\gamma t},$$

on la cherche sous la forme

$$Q(t) e^{\gamma t}$$

avec  $Q \in \mathbb{K}[X]$  de degré

$$\begin{cases} \deg P & \text{si } \gamma \text{ n'est pas racine de } aX^2 + bX + c \\ \deg P + 1 & \text{si } \gamma \text{ est racine simple de } aX^2 + bX + c \\ \deg P + 2 & \text{si } \gamma \text{ est racine double de } aX^2 + bX + c \end{cases}$$

---

**Exercice/Exemple 13.40**

Résoudre les équations différentielles suivantes :

(1)  $(E) \quad y'' - 3y' + 2y = \operatorname{ch} t$

(2)  $(E) \quad y'' - y = t \operatorname{sh} t$

(3)  $(E) \quad y'' + y = \sin t$

---

*Correction 13.41 (1)*

Résolvons l'équation homogène associée à  $(E)$  :

$$(E_0) \quad y'' - 3y' + 2y = 0.$$

L'équation caractéristique  $x^2 - 3x + 2 = 0$  admet pour solutions 1 et 2.

Les solutions de  $(E_0)$  sont donc les fonctions de la forme

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ t & \longmapsto & \lambda e^t + \mu e^{2t} \end{array} \quad \text{où } \lambda, \mu \in \mathbb{R}.$$

Cherchons une solutions particulière de  $(E)$ .

On pose

$$(E_1) \quad y'' - 3y' + 2y = e^t \quad \text{et} \quad (E_2) \quad y'' - 3y' + 2y = e^{-t}.$$

Déterminons une solution particulière de  $(E_1)$ .

---

*Brouillon*  
On a  $P(t) e^{\gamma t}$  avec  $\begin{cases} P = 1 \text{ donc } \deg P = 0 \\ \gamma = 1 \text{ racine simple de } X^2 - 3X + 2 \end{cases}$

Donc on cherche une solution de la forme

$$Q(t) e^{\gamma t}$$

avec  $\deg Q = 0 + 1 = 1$ , c'est-à-dire de la forme

$$(at + b) e^t.$$

*Remarque* : on peut ici considérer que  $b = 0$  car  $be^t$  est solution de  $(E_0)$ .

---

Soit  $a \in \mathbb{R}$ .

On pose  $y_1 : t \mapsto ate^t$ .

On a

$$\forall t \in \mathbb{R}, \begin{cases} y_1'(t) = ae^t(1+t) \\ y_1''(t) = ae^t(t+2) \end{cases}$$

D'où :

$$\begin{aligned} y_1 \text{ est solution de } (E_1) &\iff \forall t \in \mathbb{R}, ae^t(t+2) - 3ae^t(t+1) + 2ate^t = e^t \\ &\iff \forall t \in \mathbb{R}, ate^t + 2ae^t - 3ate^t - 3ae^t + 2ate^t = e^t \\ &\iff \forall t \in \mathbb{R}, -ae^t = e^t \\ &\iff a = -1 \end{aligned}$$

Donc  $y_1 : t \mapsto -te^t$  est solution de  $(E_1)$ .

Déterminons une solution particulière de  $(E_2)$ .

---

*Brouillon*  
On a  $P(t)e^{\gamma t}$  avec  $\begin{cases} P = 1 \text{ donc } \deg P = 0 \\ \gamma = -1 \text{ pas racine de } X^2 - 3X + 2 \end{cases}$

Donc on cherche une solution de la forme

$$Q(t)e^{\gamma t}$$

avec  $\deg Q = 0$ , c'est-à-dire de la forme

$$ae^{-t}.$$

---

Soit  $a \in \mathbb{R}$ .

On pose  $y_2 : t \mapsto ae^{-t}$ .

On a

$$\forall t \in \mathbb{R}, \begin{cases} y_2'(t) = -ae^{-t} \\ y_2''(t) = ae^{-t} \end{cases}$$

D'où :

$$\begin{aligned} y_2 \text{ est solution de } (E_2) &\iff \forall t \in \mathbb{R}, ae^{-t} + 3ae^{-t} + 2ae^{-t} = e^{-t} \\ &\iff \forall t \in \mathbb{R}, 6ae^{-t} = e^{-t} \\ &\iff a = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

Donc  $y_2 : t \mapsto \frac{e^{-t}}{6}$  est solution de  $(E_2)$ .

Ainsi, comme on a  $\forall t \in \mathbb{R}, \text{ ch } t = \frac{e^t + e^{-t}}{2}$ , d'après le principe de superposition :

$$y_3 : t \mapsto -\frac{te^t}{2} + \frac{e^{-t}}{12}$$

est solution de  $(E)$ .

Finalement, les solutions de  $(E)$  sont les fonctions de la forme

$$t \mapsto \lambda e^t + \mu e^{2t} - \frac{te^t}{2} + \frac{e^{-t}}{12} \quad \text{où } \lambda, \mu \in \mathbb{R}.$$

---

*Correction 13.42 (2)*

Résolvons l'équation homogène associée à  $(E)$  :

$$(E_0) \quad y'' - y = 0.$$

Les solutions de l'équation caractéristique  $x^2 - 1 = 0$  sont 1 et  $-1$ .

Les solutions de  $(E_0)$  sont donc les fonctions de la forme

$$t \mapsto \lambda e^t + \mu e^{-t} \quad \text{où } \lambda, \mu \in \mathbb{R}.$$

Cherchons une solution particulière de  $(E)$ .

On pose

$$(E_1) \quad y'' - y = te^t \quad \text{et} \quad (E_2) \quad y'' - y = te^{-t}$$

Déterminons une solution particulière de  $(E_1)$ .

---

*Brouillon*  
On a  $P(t) e^{\gamma t}$  avec  $\begin{cases} P = X \text{ donc } \deg P = 1 \\ \gamma = 1 \text{ racine simple de } X^2 - 1 \end{cases}$

Donc on cherche une solution de la forme

$$Q(t) e^{\gamma t}$$

avec  $\deg Q = 1 + 1 = 2$ , c'est-à-dire de la forme

$$(at^2 + bt) e^t.$$

---

Soient  $a, b \in \mathbb{R}$ .

On pose  $y_1 : t \mapsto (at^2 + bt) e^t$ .

On a

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad \begin{cases} y_1'(t) = e^t (2at + b + at^2 + bt) = e^t (at^2 + (2a + b)t + b) \\ y_1''(t) = e^t (at^2 + (2a + b)t + b + 2at + 2a + b) = e^t (at^2 + (4a + b)t + 2(a + b)) \end{cases}$$

D'où :

$$\begin{aligned}
 y_1 \text{ est solution de } (E_1) &\iff \forall t \in \mathbb{R}, e^t \left( at^2 + (4a+b)t + 2(a+b) \right) - e^t \left( at^2 + bt \right) = te^t \\
 &\iff \forall t \in \mathbb{R}, 4at + 2a + 2b = t \\
 &\iff \forall t \in \mathbb{R}, (4a-1)t + 2a + 2b = 0 \\
 &\iff \begin{cases} 2a + 2b = 0 \\ 4a - 1 = 0 \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} a = \frac{1}{4} \\ b = -\frac{1}{4} \end{cases}
 \end{aligned}$$

Donc  $y_1 : t \mapsto \frac{1}{4} (t^2 - t) e^t$  est solution de  $(E_1)$ .

Déterminons une solution particulière de  $(E_2)$ .

*Brouillon*  
 On a  $P(t) e^{\gamma t}$  avec  $\begin{cases} P = X \text{ donc } \deg P = 1 \\ \gamma = -1 \text{ racine simple de } X^2 - 1 \end{cases}$

Donc on cherche une solution de la forme

$$Q(t) e^{\gamma t}$$

avec  $\deg Q = 2$  donc de la forme

$$(at^2 + bt) e^{-t}.$$

Soient  $a, b \in \mathbb{R}$ .

On pose  $y_2 : t \mapsto (at^2 + bt) e^{-t}$ .

On a

$$\forall t \in \mathbb{R}, \begin{cases} y_2'(t) = e^{-t} (-at^2 - bt + 2at + b) \\ y_2''(t) = e^{-t} (at^2 + bt - 2at - b - 2at - b + 2a) = e^{-t} (at^2 + (b-4a)t + 2a - 2b) \end{cases}$$

D'où :

$$\begin{aligned}
 y_2 \text{ est solution de } (E_2) &\iff \forall t \in \mathbb{R}, e^{-t} \left( at^2 + (b-4a)t + 2a - 2b \right) - \left( at^2 + bt \right) e^{-t} = te^{-t} \\
 &\iff \forall t \in \mathbb{R}, -(4a+1)t + 2a - 2b = 0 \\
 &\iff \begin{cases} -4a - 1 = 0 \\ 2a - 2b = 0 \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} a = -\frac{1}{4} \\ b = -\frac{1}{4} \end{cases}
 \end{aligned}$$

Donc  $y_2 : t \mapsto \frac{-1}{4} (t^2 + t) e^{-t}$  est solution de  $(E_2)$ .

Finalement, les solutions de  $(E)$  sont les fonctions de la forme

$$t \mapsto \lambda e^t + \mu e^{-t} + \frac{1}{8} (t^2 - t) e^t + \frac{1}{8} (t^2 + t) e^{-t} \quad \text{où } \lambda, \mu \in \mathbb{R}.$$

*Correction 13.43 (3)*

Résolvons l'équation homogène associée à  $(E)$  :

$$(E_0) \quad y'' + y = 0.$$

Les solutions de l'équation caractéristique  $x^2 + x = 0$  sont  $i$  et  $-i$ .

Les solutions de  $(E_0)$  sont donc les fonctions de la forme

$$t \mapsto \lambda \cos t + \mu \sin t \quad \text{où } \lambda, \mu \in \mathbb{R}.$$

Déterminons une solution particulière de  $(E_1) \quad y'' + y = e^{it}$ .

*Brouillon*

On a  $P(t) e^{\gamma t}$  avec  $\begin{cases} P = 1 \text{ donc } \deg P = 0 \\ \gamma = i \text{ racine simple de } X^2 + X \end{cases}$

Donc on cherche une solution de la forme

$$Q(t) e^{\gamma t}$$

avec  $\deg Q = 1$ , c'est-à-dire de la forme

$$ate^{it}.$$

Soit  $a \in \mathbb{R}$ .

On pose  $y_1 : t \mapsto ate^{it}$ .

On a

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad \begin{cases} y_1'(t) = a(e^{it} + ite^{it}) = ae^{it}(it + 1) \\ y_1''(t) = a(ie^{it}(it + 1) + ie^{it}) = aie^{it}(it + 2) \end{cases}$$

D'où :

$$\begin{aligned} y_1 \text{ est solution de } (E_1) &\iff \forall t \in \mathbb{R}, \quad aie^{it}(it + 2) + ate^{it} = e^{it} \\ &\iff 2ai = 1 \\ &\iff a = \frac{-i}{2} \end{aligned}$$

Donc  $y_1 : t \mapsto \frac{-i}{2} te^{it}$  est solution de  $(E_1)$ .



De plus, on a :

$$\begin{aligned}\forall t \in \mathbb{R}, \operatorname{Im} y_1(t) &= \operatorname{Im} \left( \frac{-i}{2} t (\cos t + i \sin t) \right) \\ &= \operatorname{Im} \left( \frac{-i}{2} t \cos t + \frac{1}{2} t \sin t \right) \\ &= \frac{-1}{2} t \cos t\end{aligned}$$

Finalement, les solutions de  $(E)$  sont les fonctions de la forme

$$t \longmapsto \lambda \cos t + \mu \sin t - \frac{1}{2} t \cos t \quad \text{où } \lambda, \mu \in \mathbb{R}.$$

### 13.3 Changements de variable

*Cf.* Exercice 13.20.

### 13.4 Problèmes de raccord

*Cf.* Exercice 13.11.

# Chapitre 14

## Espaces vectoriels de dimension finie

### Sommaire

---

<b>14.1</b>	<b>Familles de vecteurs</b>	<b>.473</b>
14.1.1	Quelques rappels	473
14.1.2	Cardinaux des familles libres / génératrices	473
14.1.3	Théorème de la base incomplète	475
<b>14.2</b>	<b>Dimension</b>	<b>.477</b>
14.2.1	Définition	477
14.2.2	Exemples	479
<b>14.3</b>	<b>Familles de vecteurs en dimension finie</b>	<b>.481</b>
<b>14.4</b>	<b>Sous-espaces vectoriels en dimension finie</b>	<b>.484</b>
14.4.1	Dimension d'un sous-espace vectoriel	484
14.4.2	Rang d'une famille de vecteurs	486
14.4.3	Sommes directes en dimension finie	488
14.4.4	Supplémentaire en dimension finie	490
<b>14.5</b>	<b>Autres exemples de dimensions</b>	<b>.491</b>
14.5.1	Dimension d'un produit d'espaces vectoriels	491
14.5.2	Dimension de $\mathcal{L}(E, F)$	492
<b>14.6</b>	<b>Rang d'une application linéaire</b>	<b>.493</b>
14.6.1	Définition	493
14.6.2	Théorème du rang	496
14.6.3	Applications	497
14.6.3.1	Isomorphismes en dimension finie	497
14.6.3.2	Formule de Grassmann	499
14.6.3.3	Supplémentaires	500
<b>14.7</b>	<b>Hyperplans</b>	<b>.501</b>
14.7.1	Hyperplans en dimension quelconque	501
14.7.2	Hyperplans en dimension finie	504
14.7.3	Intersections d'hyperplans en dimension finie	506

---

On considère un corps  $\mathbb{K}$  (en pratique,  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ , voire  $\mathbb{Q}$ ).

## 14.1 Familles de vecteurs

### 14.1.1 Quelques rappels

---

#### Rappel 14.1

Soient  $E$  et  $F$  deux  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels,  $u \in \mathcal{L}(E, F)$  et  $x_1, \dots, x_n \in E$ .

On a

$$u(\text{Vect}(x_1, \dots, x_n)) = \text{Vect}(u(x_1), \dots, u(x_n)).$$

---

#### Rappel 14.2

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel,  $(x_1, \dots, x_n) \in E^n$  une famille libre de  $E$  et  $x_{n+1} \in E$ .

Alors  $(x_1, \dots, x_{n+1})$  est libre si, et seulement si,  $x_{n+1} \notin \text{Vect}(x_1, \dots, x_n)$ .

---

#### Rappel 14.3

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel,  $n, m \in \mathbb{N}^*$ ,  $(x_1, \dots, x_n) \in E^n$  une famille quelconque de vecteurs de  $E$  et  $(y_1, \dots, y_m) \in E^m$  une famille génératrice de  $E$ .

Alors  $(x_1, \dots, x_n)$  est une famille génératrice de  $E$  si, et seulement si :

$$\forall j \in \llbracket 1 ; m \rrbracket, y_j \in \text{Vect}(x_1, \dots, x_n).$$

---

#### Rappel 14.4

Soient  $E$  et  $F$  deux  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels,  $u \in \mathcal{L}(E, F)$  et  $(x_1, \dots, x_p) \in E^p$  une famille de vecteurs de  $E$ .

On a :

- (1) Si  $(x_1, \dots, x_p)$  est libre et  $u$  injective, alors  $(u(x_1), \dots, u(x_p))$  est libre.
- (2) Si  $(x_1, \dots, x_p)$  engendre  $E$  et  $u$  est surjective, alors  $(u(x_1), \dots, u(x_p))$  engendre  $F$ .
- (3) Si  $(x_1, \dots, x_p)$  est une base de  $E$  et  $u$  un isomorphisme, alors  $(u(x_1), \dots, u(x_p))$  est une base de  $F$ .

### 14.1.2 Cardinaux des familles libres / génératrices

---

**Lemme 14.5**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel,  $n, m \in \mathbb{N}$  et  $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m \in E$ .

On suppose que  $(x_1, \dots, x_n) \in E^n$  est libre et que  $(y_1, \dots, y_m)$  est génératrice de  $E$ .

Alors on a :

$$n \leq m.$$

---

*Démonstration 14.6*

On raisonne par l'absurde : supposons  $n > m$ .

*Idée :* On va montrer qu'on peut remplacer un par un chaque vecteur de la famille génératrice par un vecteur de la famille libre, et cela en conservant une famille génératrice de  $E$ . Les vecteurs de la famille libre qui restent seront des combinaisons linéaires des autres vecteurs de la famille libre : contradiction.

*Démonstration formelle :*

Pour tout  $k \in \llbracket 0 ; m \rrbracket$ , on note  $\mathcal{P}(k)$  la propriété :

$$\exists i_{k+1}, \dots, i_m \in \llbracket 1 ; m \rrbracket, (x_1, \dots, x_k, y_{i_{k+1}}, \dots, y_{i_m}) \text{ est génératrice de } E.$$

Montrons  $\mathcal{P}(k)$  pour tout  $k \in \llbracket 0 ; m \rrbracket$  par une récurrence finie sur  $k$ .

La propriété  $\mathcal{P}(0)$  est vraie : il suffit de poser  $i_1 = 1, \dots, i_m = m$  et la famille  $(y_{i_1}, \dots, y_{i_m})$  est bien une famille génératrice de  $E$ .

Soit  $k \in \llbracket 0 ; m-1 \rrbracket$  tel que  $\mathcal{P}(k)$ .

Considérons  $i_{k+1}, \dots, i_m \in \llbracket 1 ; m \rrbracket$  tels que

$$\mathcal{G} = (x_1, \dots, x_k, y_{i_{k+1}}, \dots, y_{i_m})$$

soit une famille génératrice de  $E$ .

Soient  $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{K}$  tels que

$$(R) \quad x_{k+1} = \lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_k x_k + \lambda_{k+1} y_{i_{k+1}} + \dots + \lambda_m y_{i_m}$$

(de tels scalaires existent par hypothèse).

Les coefficients  $\lambda_{k+1}, \dots, \lambda_m$  ne sont pas tous nuls, car sinon on aurait  $x_{k+1} \in \text{Vect}(x_1, \dots, x_k)$  alors que la famille  $(x_1, \dots, x_n)$  est libre.

Soit  $p \in \llbracket k+1 ; m \rrbracket$  tel que  $\lambda_p \neq 0$ .

Quitte à renuméroter les entiers  $i_{k+1}, \dots, i_m$ , on peut supposer  $p = k+1$ .

Montrons que

$$\mathcal{F} = (x_1, \dots, x_k, x_{k+1}, y_{i_{k+2}}, \dots, y_{i_m})$$

est une famille génératrice de  $E$ .

Pour cela, selon le Rappel 14.3, il suffit de montrer que chaque vecteur de la famille  $\mathcal{G}$  appartient à  $\text{Vect}(\mathcal{F})$ .

On a, selon la relation (R) :

$$y_{i_{k+1}} = \frac{-\lambda_1}{\lambda_{k+1}}x_1 + \cdots + \frac{-\lambda_k}{\lambda_{k+1}}x_k + \frac{1}{\lambda_{k+1}}x_{k+1} + \frac{-\lambda_{k+2}}{\lambda_{k+1}}y_{i_{k+2}} + \cdots + \frac{-\lambda_m}{\lambda_{k+1}}y_{i_m}$$

donc  $y_{i_{k+1}} \in \text{Vect}(\mathcal{F})$ .

C'est clair pour les autres vecteurs de  $\mathcal{G}$  (ils appartiennent à  $\text{Vect}(\mathcal{F})$  car ils appartiennent à  $\mathcal{F}$ ).

Ainsi, la famille  $\mathcal{F}$  est génératrice de  $E$  et la propriété  $\mathcal{P}(k+1)$  est donc vraie.

On a donc, par récurrence (finie) :  $\forall k \in \llbracket 0 ; m \rrbracket$ ,  $\mathcal{P}(k)$  est vraie.

En particulier (en prenant  $k = m$ ) : la famille  $(x_1, \dots, x_m)$  est génératrice de  $E$  donc

$$x_{m+1} \in \text{Vect}(x_1, \dots, x_m).$$

On a donc bien une contradiction car la famille  $(x_1, \dots, x_n)$  est libre.

Donc  $n \leq m$ . ■

### 14.1.3 Théorème de la base incomplète

#### Théorème 14.7

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel,  $n, m \in \mathbb{N}$  et  $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m \in E$ .

On suppose que  $(x_1, \dots, x_n) \in E^n$  est libre et que  $(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m)$  est génératrice de  $E$ .

Alors il existe des éléments  $i_1, \dots, i_r \in \llbracket 1 ; m \rrbracket$  tels que la famille

$$(x_1, \dots, x_n, y_{i_1}, \dots, y_{i_r})$$

soit une base de  $E$ .

#### Démonstration 14.8

*Idée* : si  $(x_1, \dots, x_n)$  est déjà une base de  $E$ , le théorème est vrai (en prenant  $r = 0$ ). Sinon, la famille libre  $(x_1, \dots, x_n)$  n'est pas une famille génératrice de  $E$ . Selon le Rappel 14.3, il existe un élément de la famille génératrice  $(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m)$  qui n'est pas combinaison linéaire de  $x_1, \dots, x_n$  : considérons un tel élément  $y_{i_1}$  (où  $i_1 \in \llbracket 1 ; m \rrbracket$ ). Selon le Rappel 14.2, la famille  $(x_1, \dots, x_n, y_{i_1})$  est libre. On continue ensuite à rajouter des éléments parmi  $y_1, \dots, y_m$  à la famille libre jusqu'à ce qu'on obtienne une famille génératrice (à chaque étape, la famille reste libre), et on finit par obtenir une base.

*Démonstration formelle* :

Posons :

$$J = \left\{ p \in \llbracket 0 ; m \rrbracket \mid \exists i_1, \dots, i_p \in \llbracket 1 ; m \rrbracket, (x_1, \dots, x_n, y_{i_1}, \dots, y_{i_p}) \text{ est libre} \right\}.$$

L'ensemble  $J$  est une partie de  $\mathbb{N}$  non-vide (car elle contient 0) et majorée (par  $m$ ). Elle admet donc un plus grand élément ; notons le  $r$ .

Soient  $i_1, \dots, i_r \in \llbracket 1 ; m \rrbracket$  tels que la famille  $(x_1, \dots, x_n, y_{i_1}, \dots, y_{i_r})$  soit libre.

Montrons que la famille  $(x_1, \dots, x_n, y_{i_1}, \dots, y_{i_r})$  est une base de  $E$  : il s'agit de montrer qu'elle est génératrice de  $E$ .

Raisonnons par l'absurde : on suppose qu'elle ne l'est pas.

D'après le Rappel 14.3, la famille  $(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m)$  étant génératrice, elle contient un élément qui n'est pas combinaison linéaire de  $x_1, \dots, x_n, y_{i_1}, \dots, y_{i_r}$ .

Considérons un tel élément  $y_{i_{r+1}}$  (où  $i_{r+1} \in \llbracket 1 ; m \rrbracket$ ).

Finalement, la famille  $(x_1, \dots, x_n, y_{i_1}, \dots, y_{i_r})$  est libre, on lui ajoute un vecteur qui n'est pas combinaison linéaire de ses éléments, donc d'après le Rappel 14.2, la famille qu'on obtient est libre :

$$(x_1, \dots, x_n, y_{i_1}, \dots, y_{i_{r+1}}) \text{ est libre.}$$

Donc  $r + 1$  appartient à  $J$ , ce qui contredit le fait que  $r$  soit le plus grand élément de  $J$ .

Donc la famille libre  $(x_1, \dots, x_n, y_{i_1}, \dots, y_{i_r})$  est génératrice de  $E$  : c'est une base. ■

### **Théorème 14.9 (Reformulation)**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel,  $(x_k)_{k \in K} \in E^K$  une famille de vecteurs de  $E$  indexée par un ensemble fini  $K$  et  $I \subseteq K$ .

On suppose que  $(x_k)_{k \in I}$  est libre et que  $(x_k)_{k \in K}$  est génératrice de  $E$ .

Alors il existe un ensemble  $J$  tel que

$$I \subseteq J \subseteq K \quad \text{et} \quad (x_k)_{k \in J} \text{ est une base de } E.$$

### **Corollaire 14.10 (Théorème de la base extraite)**

De toute famille génératrice finie d'un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, on peut extraire une base.

*Démonstration 14.11*

Découle du Théorème 14.7 (en prenant  $n = 0$ ). ■

### **Corollaire 14.12 (Théorème de la base incomplète)**

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Si  $E$  admet une famille génératrice finie, alors toute famille libre de  $E$  peut être complétée en une base de  $E$  (finie).

*Démonstration 14.13*

Découle du Théorème 14.7. ■

## 14.2 Dimension

### 14.2.1 Définition

---

**Définition/Théorème 14.14**

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Si  $E$  admet une base finie, alors toutes les bases de  $E$  sont finies et on le même nombre d'éléments, appelé dimension de  $E$  et noté  $\dim E$ .

Si  $E$  n'admet aucune base finie, alors on dit que  $E$  est de dimension infinie et on pose  $\dim E = +\infty$ .

---

*Démonstration 14.15*

Supposons que  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  est une base finie de  $E$ .

Soit  $\mathcal{B}' = (x_i)_{i \in I}$  une base de  $E$  (où  $I$  est un ensemble quelconque).

Montrons que  $\text{Card } I \leq n$ .

Par l'absurde, si  $\text{Card } I \geq n + 1$  alors il existe  $i_1, \dots, i_{n+1} \in I$  deux à deux distincts.

On a  $\begin{cases} (x_{i_1}, \dots, x_{i_{n+1}}) \text{ est une famille libre de vecteurs de } E \\ (e_1, \dots, e_n) \text{ est une famille génératrice de } E \end{cases}$  : contradiction selon le Lemme 14.5.

En particulier, on a montré que  $I$  est fini.

Montrons que  $\text{Card } I \geq n$ .

On a

$$\begin{cases} (e_1, \dots, e_n) \text{ est une famille libre de vecteurs de } E \\ (x_i)_{i \in I} \text{ est une famille génératrice de } E \end{cases}$$

Donc  $n \leq \text{Card } I$  selon le Lemme 14.5.

Donc  $\text{Card } I = n$ .

D'où le résultat. ■

---

**Proposition 14.16 (Espaces vectoriels de dimension infinie)**

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Les propositions suivantes sont équivalentes :

- (1)  $E$  est de dimension infinie (i.e.  $E$  n'admet aucune base finie)
- (2)  $E$  n'admet aucune famille génératrice finie

(3)  $\forall n \in \mathbb{N}, \exists x_1, \dots, x_n \in E, (x_1, \dots, x_n)$  est une famille libre

(4) Il existe une famille libre infinie de vecteurs de  $E$

---

Démonstration 14.17 ((2)  $\implies$  (1))

Claire. ■

---

Démonstration 14.18 ((1)  $\implies$  (2))

Découle du théorème de la base extraite (Corollaire 14.10). ■

---

Démonstration 14.19 ((4)  $\implies$  (3))

Claire car toute sous-famille d'une famille libre est libre. ■

---

Démonstration 14.20 ((3)  $\implies$  (2))

Supposons (3).

Par l'absurde, soit  $(x_1, \dots, x_m)$  une famille génératrice finie de  $E$  (où  $m \in \mathbb{N}$ ).

Selon (3) et le Lemme 14.5, on a

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \leq m : \text{contradiction.} \quad \text{■}$$

---

Démonstration 14.21 ((2)  $\implies$  (4))

Supposons (2).

On construit par récurrence une suite  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$  de la façon suivante :

On considère  $x_0 \in E \setminus \{0\}$ .

Soient  $n \in \mathbb{N}$  et  $x_0, \dots, x_n \in E$  tels que  $(x_0, \dots, x_n)$  est libre.

Selon (2),  $(x_0, \dots, x_n)$  n'est pas une famille génératrice de  $E$ .

Donc il existe  $x_{n+1} \in E$  tel que  $x_{n+1} \notin \text{Vect}(x_0, \dots, x_n)$ .

Donc  $(x_0, \dots, x_{n+1})$  est libre.

On construit ainsi par récurrence une suite  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$  telle que

$$\forall n \in \mathbb{N}, (x_0, \dots, x_n) \text{ est libre.}$$

Déduisons-en que  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est libre.

Soit  $I \subseteq \mathbb{N}$  tel que  $I$  est fini.



Montrons que  $(x_n)_{n \in I}$  est libre.

Soit  $N \in \mathbb{N}$  un majorant de  $I$ .

$(x_n)_{n \in I}$  est une sous-famille de la famille libre  $(x_n)_{n \in [0;N]}$ .

Donc  $(x_n)_{n \in I}$  est libre.

Donc  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est libre. ■

---

**Définition 14.22**

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

On a  $\dim E = 0$  si, et seulement si,  $E$  est l'espace vectoriel nul :  $E = \{0_E\}$ .

Si  $\dim E = 1$ , on dit que  $E$  est une droite vectorielle (cela revient à dire qu'on a  $E = \text{Vect}(x)$  où  $x$  est un vecteur non-nul).

Si  $\dim E = 2$ , on dit que  $E$  est un plan vectoriel (cela revient à dire qu'on a  $E = \text{Vect}(x, y)$  où  $x$  et  $y$  sont deux vecteurs non-colinéaires).

---

**Définition 14.23**

On appelle dimension d'un sous-espace affine la dimension de sa direction.

Une droite affine est un sous-espace affine de dimension 1.

Un plan affine est un sous-espace affine de dimension 2.

## 14.2.2 Exemples

---

**Exercice/Exemple 14.24**

Donner la dimension des espaces vectoriels suivants :

(1)  $\mathbb{K}^n$  (où  $n \in \mathbb{N}^*$ )

(2)  $\mathbb{K}_n[X]$  (où  $n \in \mathbb{N}$ )

(3)  $\mathbb{K}[X]$

(4)  $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$

(5) On prend  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ .

L'ensemble solution  $\mathcal{S}_0$  de l'équation différentielle linéaire homogène du premier ordre :

$$(E_0) \quad y' + a(t)y = 0$$

où  $I$  est un intervalle de  $\mathbb{R}$  tel que  $\text{Card } I \geq 2$  et  $a \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{K})$ .

(6) On prend  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ .

L'ensemble solution  $\mathcal{S}_0$  de l'équation différentielle linéaire homogène du second ordre :

$$(E_0) \quad ay'' + by' + cy = 0$$

où  $a, b, c \in \mathbb{K}$  tels que  $a \neq 0$ .

---

#### Correction 14.25

(1) On a  $\dim \mathbb{K}^n = n$  car la base canonique de  $\mathbb{K}^n$  possède  $n$  éléments.

(2) On a  $\dim \mathbb{K}_n[X] = n + 1$  car la base canonique de  $\mathbb{K}_n[X]$  possède  $n + 1$  éléments.

(3) On a  $\dim \mathbb{K}[X] = +\infty$  car  $(X^n)_{n \in \mathbb{N}}$  est une famille libre infinie de vecteurs de  $\mathbb{K}[X]$ .

(4) On a  $\dim \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R}) = +\infty$  car  $\left(t \mapsto e^{\lambda t}\right)_{\lambda \in \mathbb{R}}$  est une famille libre infinie de vecteurs de  $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ .

(5) On a vu que  $\mathcal{S}_0$  admet pour base la famille  $(f_0)$  où  $f_0 : \begin{array}{ccc} I & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ t & \longmapsto & e^{-A(t)} \end{array}$  où  $A$  est une primitive de  $a$ . Donc  $\dim \mathcal{S}_0 = 1$ .

(6) De même, on a  $\dim \mathcal{S}_0 = 2$  (cf. chapitre 13).

---

#### Proposition 14.26

Soit  $E$  un  $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension finie.

On sait que  $E$  est naturellement un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

Notons  $\dim_{\mathbb{C}} E$  la dimension de  $E$  comme  $\mathbb{C}$ -espace vectoriel et  $\dim_{\mathbb{R}} E$  la dimension de  $E$  comme  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

Alors on a :

$$\dim_{\mathbb{R}} E = 2 \dim_{\mathbb{C}} E.$$

---

*Démonstration 14.27*

Soit  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  une base de  $E$  en tant que  $\mathbb{C}$ -espace vectoriel.

On a  $n = \dim_{\mathbb{C}} E$ .

Posons  $\mathcal{B}' = (e_1, ie_1, \dots, e_n, ie_n)$ .

Montrons que  $\mathcal{B}'$  est une base de  $E$  en tant que  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

Montrons que  $\mathcal{B}'$  est génératrice de  $E$  sur  $\mathbb{R}$ .

Comme  $\mathcal{B}$  est une base de  $E$  sur  $\mathbb{C}$ , on a :

$$\forall x \in E, \exists z_1, \dots, z_n \in \mathbb{C}, x = z_1 e_1 + \dots + z_n e_n.$$

Donc  $\forall x \in E, \exists a_1, b_1, \dots, a_n, b_n \in \mathbb{R}, x = a_1 e_1 + i b_1 e_1 + \dots + a_n e_n + i b_n e_n$ .

Donc  $\forall x \in E, x \in \text{Vect}_{\mathbb{R}}(\mathcal{B}')$ .

Donc  $\mathcal{B}'$  est génératrice de  $E$  sur  $\mathbb{R}$ .

Montrons que  $\mathcal{B}'$  est libre sur  $\mathbb{R}$ .

Soient  $a_1, b_1, \dots, a_n, b_n \in \mathbb{R}$  tels que  $a_1 e_1 + i b_1 e_1 + \dots + a_n e_n + i b_n e_n = 0$ .

On a  $(a_1 + i b_1) e_1 + \dots + (a_n + i b_n) e_n = 0$ .

Or  $\mathcal{B}$  est libre sur  $\mathbb{C}$ .

Donc  $\forall k \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, a_k + i b_k = 0$ .

Donc  $\forall k \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, a_k = b_k = 0$ .

Donc  $\mathcal{B}'$  est libre sur  $\mathbb{R}$ .

Donc  $\mathcal{B}'$  est une base de  $E$  sur  $\mathbb{R}$  possédant  $2n$  vecteurs.

Donc  $\dim_{\mathbb{R}} E = 2n$ . ■

## 14.3 Familles de vecteurs en dimension finie

---

### **Théorème 14.28**

*Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie.*

*On pose  $n = \dim E$ .*

*Alors :*

- (1) *Toute famille libre de  $E$  possède au plus  $n$  vecteurs.*

(2) Toute famille génératrice de  $E$  possède au moins  $n$  vecteurs.

---

*Démonstration 14.29*

Soit  $\mathcal{B}$  une base de  $E$  (qui possède donc  $n$  vecteurs).

- (1) Comme  $\mathcal{B}$  est une famille génératrice de  $E$  possédant  $n$  vecteurs, toute famille libre de  $E$  possède au plus  $n$  vecteurs.
- (2) Comme  $\mathcal{B}$  est une famille libre de  $E$  possédant  $n$  vecteurs, toute famille génératrice de  $E$  possède au moins  $n$  vecteurs. ■

---

**Proposition 14.30**

Soient  $E$  et  $F$  deux espaces vectoriels.

(1) S'il existe une application linéaire injective de  $E$  vers  $F$  alors

$$\dim E \leq \dim F.$$

(2) S'il existe une application linéaire surjective de  $E$  vers  $F$  alors

$$\dim E \geq \dim F.$$

(3) Si  $E$  et  $F$  sont isomorphes alors

$$\dim E = \dim F.$$

---

*Démonstration 14.31 (1)*

Soit  $u \in \mathcal{L}(E, F)$  injective.

Si  $\dim E < +\infty$  :

Soit  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  une base de  $E$ .

Comme  $u$  est injective,  $(u(e_1), \dots, u(e_n))$  est une famille libre de  $F$  selon le Rappel 14.4.

Donc  $n \leq \dim F$  car  $F$  possède une famille libre de  $n$  vecteurs.

Si  $\dim E = +\infty$  alors il existe une famille libre infinie  $(x_i)_{i \in I} \in E^I$  de vecteurs de  $E$  et  $(u(x_i))_{i \in I}$  est une famille libre infinie de vecteurs de  $F$  (selon le Rappel 14.4).

Donc  $\dim E \leq \dim F$ . ■

---

*Démonstration 14.32 (2)*

Soit  $u \in \mathcal{L}(E, F)$  surjective.

Si  $\dim E = +\infty$  alors  $\dim E \geq \dim F$ .

Si  $\dim E < +\infty$  :

Soit  $(e_1, \dots, e_n)$  une base de  $E$ .

Selon le Rappel 14.4,  $(u(e_1), \dots, u(e_n))$  est une famille génératrice de  $F$ .

Donc  $\dim F \leq n$ . ■

---

*Démonstration 14.33 (3)*

Découle de (1) et (2). ■

---

### **Théorème 14.34**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie  $n$  et  $(e_1, \dots, e_p)$  une famille d'éléments de  $E$ .

Alors  $(e_1, \dots, e_p)$  est une base de  $E$  si elle vérifie deux des trois propositions suivantes :

(1)  $p = n$

(2)  $(e_1, \dots, e_p)$  est une famille libre

(3)  $(e_1, \dots, e_p)$  est une famille génératrice de  $E$ .

---

*Démonstration 14.35*

Si on a (2) et (3) alors  $(e_1, \dots, e_p)$  est une base de  $E$ .

Si on a (1) et (2) alors on peut compléter  $(e_1, \dots, e_p)$  en une base de  $E$  selon le théorème de la base incomplète. Donc  $(e_1, \dots, e_p)$  est une base de  $E$ .

Si on a (3) alors on peut extraire de  $(e_1, \dots, e_p)$  une base de  $E$  selon le théorème de la base extraite. Si, de plus,  $n = p$  alors  $(e_1, \dots, e_p)$  est une base de  $E$ . ■

---

### **Exercice 14.36**

Montrer que la famille  $\mathcal{B} = \left( \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$  est une base de  $\mathbb{R}^3$ .

---

*Correction 14.37*

Montrons que  $\mathcal{B}$  est libre.

Soient  $a, b, c \in \mathbb{R}$  tels que  $a \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$ .

$$\text{Alors } \begin{cases} a + 2c = 0 \\ 2a + b + c = 0 \\ 2b = 0 \end{cases} \text{ donc } \begin{cases} -3c = 0 & L_1 \leftarrow L_2 - 2L_1 \\ -3a = 0 & L_2 \leftarrow L_1 - 2L_2 \\ b = 0 \end{cases}$$

Donc  $\mathcal{B}$  est libre.

De plus, elle possède 3 éléments et  $\dim \mathbb{R}^3 = 3$  donc c'est une base de  $\mathbb{R}^3$ .

## 14.4 Sous-espaces vectoriels en dimension finie

### 14.4.1 Dimension d'un sous-espace vectoriel

---

#### **Théorème 14.38**

*Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et  $F$  un sous-espace vectoriel de  $E$ .*

*Alors :*

$$\dim F \leq \dim E,$$

*avec égalité si, et seulement si,  $E = F$ .*

---

*Démonstration 14.39*

On pose  $n = \dim E$ .

Toute famille libre de  $F$  est une famille libre de  $E$  et possède donc au plus  $n$  éléments.

Donc  $F$  est de dimension finie.

Soit  $(e_1, \dots, e_p)$  une base de  $F$  où  $p \in \mathbb{N}$ .

Comme  $(e_1, \dots, e_p)$  est une famille libre de vecteurs de  $E$ , on a  $p \leq n$ .

Donc

$$\dim F = p \leq n = \dim E.$$

Montrons que  $\dim E = \dim F \iff E = F$ .

$\boxed{\Leftarrow}$  Claire.

$\boxed{\Rightarrow}$

Si  $p = n$  alors  $(e_1, \dots, e_p)$  est une famille libre de vecteurs de  $E$  possédant  $p = \dim E$  vecteurs de  $E$ .

C'est donc une base de  $E$ .

Donc  $E = \text{Vect}(e_1, \dots, e_p) = F$ . ■

#### Définition 14.40 (Base adaptée à un sous-espace vectoriel)

Soient  $E$  un espace vectoriel de dimension finie et  $F$  un sous-espace vectoriel de  $E$ .

On dit qu'une base  $\mathcal{B}$  de  $E$  est adaptée au sous-espace vectoriel  $F$  si ses premiers vecteurs forment une base de  $F$ , c'est-à-dire si elle est de la forme

$$\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p, \dots, e_n) \in E^n$$

avec  $p = \dim F$ ,  $n = \dim E$  et  $(e_1, \dots, e_p)$  est une base de  $F$ .

Il est facile de voir si un vecteur de  $E$  appartient à  $F$  à partir de ses coordonnées dans  $\mathcal{B}$  :

$$\forall x_1, \dots, x_n \in \mathbb{K}, \quad x_1 e_1 + \dots + x_n e_n \in F \iff x_{p+1} = \dots = x_n = 0.$$

#### Exercice/Exemple 14.41

Donner une base de  $E$  adaptée au sous-espace vectoriel  $F$  dans les situations suivantes :

- (1)  $E = \mathbb{K}_N[X]$  et  $F = \mathbb{K}_n[X]$  où les entiers  $n, N \in \mathbb{N}$  vérifient  $n \leq N$ .
- (2)  $E = \mathbb{K}_4[X]$  et  $F = \{P \in \mathbb{K}_4[X] \mid 3 \text{ est racine multiple de } P\}$ .

*Correction 14.42 (1)*  
La base canonique de  $\mathbb{K}_N[X]$   $\left( \underbrace{1, \dots, X^n}_{\text{base de } \mathbb{K}_n[X]}, \dots, X^N \right)$  est adaptée à  $\mathbb{K}_n[X]$ .

*Correction 14.43 (2)*

On a  $\dim E = 5$ .

On a

$$\begin{aligned} \forall P \in E, \quad P \in F &\iff (X-3)^2 \mid P \\ &\iff \exists a, b, c \in \mathbb{K}, \quad P = (X-3)^2 (aX^2 + bX + c) \\ &\iff \exists a, b, c \in \mathbb{K}, \quad P = aX^2(X-3)^2 + bX(X-3)^2 + c(X-3)^2 \\ &\iff P \in \text{Vect} \left( (X-3)^2, X(X-3)^2, X^2(X-3)^2 \right) \end{aligned}$$

D'où une base de  $E$  adaptée à  $F$  :  $\left( (X-3)^2, X(X-3)^2, X^2(X-3)^2, 1, X \right)$ .

C'est bien une base de  $E$  car c'est une famille de polynômes à degrés échelonnés.

---

**Proposition 14.44**

Soient  $E$  un espace vectoriel de dimension finie et  $F$  un sous-espace vectoriel de  $E$ .

Il existe une base de  $E$  adaptée à  $F$ .

---

*Démonstration 14.45*

Comme  $F$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ , il est de dimension finie.

Soit  $(e_1, \dots, e_p)$  une base de  $F$  (avec  $p \in \mathbb{N}$ ).

Comme  $(e_1, \dots, e_p)$  est une famille libre de vecteurs de  $F$ , c'est une famille libre de vecteurs de  $E$ .

Selon le théorème de la base incomplète, on peut la compléter en une base de  $E$  :

$$\left( \underbrace{e_1, \dots, e_p}_{\text{base de } F}, \dots, e_n \right).$$

■

## 14.4.2 Rang d'une famille de vecteurs

---

**Définition 14.46**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $\mathcal{F} = (x_1, \dots, x_p) \in E^p$  une famille de vecteurs de  $E$  (où  $p \in \mathbb{N}$ ).

Le rang de la famille  $\mathcal{F}$  est la dimension du sous-espace vectoriel qu'elle engendre :

$$\text{rg } \mathcal{F} = \dim \text{Vect } (\mathcal{F}).$$

---

*Remarque 14.47*

On ne modifie pas le rang d'une famille de vecteurs :

- en permutant ses vecteurs ;
- en multipliant l'un de ses vecteurs par un scalaire non-nul ;
- en ajoutant à l'un de ses vecteurs une combinaison linéaire de ses autres vecteurs ;
- en lui ôtant le vecteur nul.

---

*Démonstration 14.48*

C'est clair puisque ces transformations ne modifient pas l'espace vectoriel engendré par la famille. ■



---

**Exercice/Exemple 14.49**

Donner le rang des familles de vecteurs suivantes :

- (1) La famille  $\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}\right)$  (famille de vecteurs de  $\mathbb{R}^3$ );
- (2) La famille  $(X-1, X^3-X^2, X^3-3X^2+2, X^2-1)$  (famille de vecteurs de  $\mathbb{R}[X]$ ).

---

*Correction 14.50 (1)*

On a, comme  $\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$  :

$$\begin{aligned} \operatorname{rg} \left( \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} \right) &= \operatorname{rg} \left( \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} \right) \\ &= \operatorname{rg} \left( \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \\ &= 2 \end{aligned} \quad \begin{array}{l} \swarrow \text{car } \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ \searrow \text{car } \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ et } \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ ne sont pas} \\ \quad \text{colinéaires} \end{array}$$

---

*Correction 14.51 (2)*

On remarque  $X^3-3X^2+2 = (X^3-X^2) - 2(X^2-1)$ .

Donc  $\operatorname{rg}(X-1, X^3-X^2, X^3-3X^2+2, X^2-1) = \operatorname{rg}(X-1, X^3-X^2, X^2-1) = 3$ .

En effet, la famille  $(X-1, X^3-X^2, X^2-1)$  est libre car c'est une famille de polynômes non-nuls de degrés deux à deux distincts.

Donc c'est une base de  $\operatorname{Vect}(X-1, X^3-X^2, X^2-1)$ .

Donc on a  $\dim \operatorname{Vect}(X-1, X^3-X^2, X^2-1) = 3$ .

---

*Remarque 14.52*

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $\mathcal{F} = (x_1, \dots, x_p) \in E^p$  une famille de vecteurs de  $E$  (où  $p \in \mathbb{N}$ ).

On a d'une part (selon le Théorème 14.28) :

$$\operatorname{rg} \mathcal{F} \leq p,$$

avec égalité si, et seulement si, la famille  $\mathcal{F}$  est libre (selon le Théorème 14.34).

On a d'autre part (selon le Théorème 14.38) :

$$\operatorname{rg} \mathcal{F} \leq \dim E,$$

avec égalité si, et seulement si, la famille  $\mathcal{F}$  est une famille génératrice de  $E$ .

### 14.4.3 Sommes directes en dimension finie

#### Définition 14.53

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Si  $\mathcal{F}_1 = (v_1^{(1)}, \dots, v_{d_1}^{(1)}), \dots, \mathcal{F}_m = (v_1^{(m)}, \dots, v_{d_m}^{(m)})$  sont des familles de vecteurs de  $E$ , on appelle famille obtenue en juxtaposant  $\mathcal{F}_1, \dots, \mathcal{F}_m$  la famille :

$$(v_1^{(1)}, \dots, v_{d_1}^{(1)}, \dots, v_1^{(m)}, \dots, v_{d_m}^{(m)}).$$

#### Proposition 14.54

Soient  $E$  un espace vectoriel de dimension finie,  $F$  et  $G$  deux sous-espaces vectoriels supplémentaires dans  $E$ ,  $\mathcal{B}_F = (v_1, \dots, v_n)$  une base de  $F$  et  $\mathcal{B}_G = (w_1, \dots, w_m)$  une base de  $G$ .

Alors la famille

$$\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n, w_1, \dots, w_m)$$

obtenue en juxtaposant  $\mathcal{B}_F$  et  $\mathcal{B}_G$  est une base de  $E$ .

#### Démonstration 14.55

Montrons que  $\mathcal{B}$  est libre.

Soient  $\lambda_1, \dots, \lambda_n, \mu_1, \dots, \mu_m \in \mathbb{K}$  tels que

$$\underbrace{\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n}_{\in F} + \underbrace{\mu_1 w_1 + \dots + \mu_m w_m}_{\in G} = 0_E.$$

Donc comme  $F$  et  $G$  sont en somme directe : 
$$\begin{cases} \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n = 0_E \\ \mu_1 w_1 + \dots + \mu_m w_m = 0_E \end{cases}$$

Donc comme  $\mathcal{B}_F$  et  $\mathcal{B}_G$  sont libres : 
$$\begin{cases} \lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0 \\ \mu_1 = \dots = \mu_m = 0 \end{cases}$$

Donc  $\mathcal{B}$  est libre.

Montrons que  $\mathcal{B}$  est génératrice de  $E$ .

Soit  $x \in E$ .

Comme  $E = F + G$ , il existe  $x_F \in F$  et  $x_G \in G$  tels que  $x = x_F + x_G$ .

Comme  $\mathcal{B}_F$  est génératrice de  $F$ , il existe  $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$  tels que

$$x_F = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n.$$

Comme  $\mathcal{B}_G$  est génératrice de  $G$ , il existe  $\mu_1, \dots, \mu_m \in \mathbb{K}$  tels que

$$x_G = \mu_1 w_1 + \dots + \mu_m w_m.$$

Finalement, on a  $x = \lambda_1 v_1 + \cdots + \lambda_n v_n + \mu_1 w_1 + \cdots + \mu_m w_m$ .

Donc  $x \in \text{Vect}(\mathcal{B})$ .

Donc  $\mathcal{B}$  est génératrice de  $E$ .

Finalement,  $\mathcal{B}$  est une base de  $E$ . ■

---

**Corollaire 14.56**

Soient  $E$  un espace vectoriel et  $F$  et  $G$  deux sous-espaces vectoriels de  $E$  en somme directe :

$$F \cap G = \{0_E\}.$$

Alors on a :

$$\dim F \oplus G = \dim F + \dim G.$$

---

*Démonstration 14.57*

Posons  $E' = F \oplus G$ .

Si  $F$  ou  $G$  est de dimension infinie, alors  $E'$  aussi donc on a bien  $\dim E' = \dim F + \dim G$ .

Supposons  $F$  et  $G$  de dimension finie.

Soient  $\mathcal{B}_F$  une base de  $F$  et  $\mathcal{B}_G$  une base de  $G$ .

On note  $\mathcal{B}$  la famille obtenue en juxtaposant  $\mathcal{B}_F$  et  $\mathcal{B}_G$ .

Selon la Proposition 14.54,  $\mathcal{B}$  est une base de  $E'$ .

Donc

$$\dim E' = \text{Card } \mathcal{B} = \text{Card } \mathcal{B}_F + \text{Card } \mathcal{B}_G = \dim F + \dim G. \quad \blacksquare$$

---

**Définition 14.58 (Base adaptée à une somme directe)**

Soient  $E$  un espace vectoriel de dimension finie et  $F$  et  $G$  deux sous-espaces vectoriels supplémentaires dans  $E$  :

$$E = F \oplus G.$$

Une base de  $E$  obtenue en juxtaposant une base de  $F$  et une base de  $G$  est dite adaptée à la décomposition de  $E$  en somme directe.

On a vu à la Proposition 14.54 qu'une telle base existe.

---

**Exercice 14.59**

Soient  $F$  et  $G$  deux plans vectoriels de  $\mathbb{K}^3$  tels que  $F \neq G$ .

Quelle est la dimension de leur intersection ?

On a  $\begin{cases} F \cap G \text{ est un sous-espace vectoriel de } F \\ \dim F = 2 \end{cases}$  donc  $\dim F \cap G \leq 2$ .

Si  $\dim F \cap G = 2$  :

On a  $\begin{cases} F \cap G \subseteq F \\ \dim F \cap G = \dim F < +\infty \end{cases}$  donc  $F \cap G = F$  donc  $F \subseteq G$ .

Ainsi  $\begin{cases} F \subseteq G \\ \dim F = \dim G < +\infty \end{cases}$  donc  $F = G$  : contradiction.

Si  $\dim F \cap G = 0$  alors on a  $F \cap G = \{0\}$  donc  $F \oplus G$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{K}^3$  tel que  $\dim F \oplus G = \dim F + \dim G = 4$  : contradiction car  $\dim \mathbb{K}^3 = 3$ .

Donc  $\dim F \cap G = 1$ .

#### 14.4.4 Supplémentaire en dimension finie

---

##### **Théorème 14.61 (Existence d'un supplémentaire en dimension finie)**

*Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et  $F$  un sous-espace vectoriel de  $E$ .*

*Alors  $F$  admet un supplémentaire dans  $E$ .*

---

*Démonstration 14.62*

Soit  $(e_1, \dots, e_p)$  une base de  $F$  (avec  $p \in \mathbb{N}$ ).

La famille  $(e_1, \dots, e_p)$  est une famille libre de vecteurs de  $E$ .

Donc selon le théorème de la base incomplète, on peut la compléter en une base  $(e_1, \dots, e_n)$  de  $E$  (avec  $n \in \mathbb{N}$  tel que  $n \geq p$ ).

Posons  $S = \text{Vect}(e_{p+1}, \dots, e_n)$ .

Montrons que  $S$  est un supplémentaire de  $F$  dans  $E$ , c'est-à-dire

$$F \cap S = \{0_E\}.$$

Soit  $x \in F \cap S$ .

On a  $x \in F = \text{Vect}(e_1, \dots, e_p)$  donc il existe  $x_1, \dots, x_p \in \mathbb{K}$  tels que

$$x = x_1 e_1 + \dots + x_p e_p$$

et  $x \in S = \text{Vect}(e_{p+1}, \dots, e_n)$  donc il existe  $x_{p+1}, \dots, x_n \in \mathbb{K}$  tels que

$$x = x_{p+1}e_{p+1} + \dots + x_n e_n.$$

On a  $x_1 e_1 + \dots + x_p e_p - x_{p+1} e_{p+1} - \dots - x_n e_n = x - x = 0_E$ .

Or  $(e_1, \dots, e_n)$  est libre.

Donc  $\forall k \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, x_k = 0$ .

Donc  $x = 0_E$  donc  $F \cap S = \{0_E\}$ .

Montrons que  $F + S = E$ .

Soit  $x \in E$ .

Comme  $(e_1, \dots, e_n)$  est une base de  $E$ , il existe  $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{K}$  tels que

$$x = \underbrace{x_1 e_1 + \dots + x_p e_p}_{\in F} + \underbrace{x_{p+1} e_{p+1} + \dots + x_n e_n}_{\in S}.$$

Donc  $x \in F + S$ .

Finalement,  $E = F \oplus S$ . ■

## 14.5 Autres exemples de dimensions

### 14.5.1 Dimension d'un produit d'espaces vectoriels

---

#### Proposition 14.63

Soient  $F_1, \dots, F_m$  des espaces vectoriels de dimension finie.

On pose :

$$\begin{cases} F'_1 = F_1 \times \{0_{F_2}\} \times \dots \times \{0_{F_m}\} \\ \vdots \\ F'_m = \{0_{F_1}\} \times \dots \times \{0_{F_{m-1}}\} \times F_m \end{cases}$$

On a  $\forall k \in \llbracket 1 ; m \rrbracket, F_k$  est isomorphe à  $F'_k$  donc  $\dim F_k = \dim F'_k$ .

Soient  $\mathcal{B}_1$  une base de  $F'_1$ , ...,  $\mathcal{B}_m$  une base de  $F'_m$ .

On note  $\mathcal{B}$  la famille obtenue en juxtaposant  $\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_m$ .

Alors  $\mathcal{B}$  est une base de l'espace vectoriel produit  $F_1 \times \dots \times F_m$ .

---

Démonstration 14.64

★★ Exercice ★★

■

---

### Corollaire 14.65

Soient  $F_1, \dots, F_m$  des espaces vectoriels.

Alors :

$$\dim (F_1 \times \cdots \times F_m) = \dim F_1 + \cdots + \dim F_m.$$

---

Démonstration 14.66

On distingue deux cas :

- Si l'un des espaces vectoriels  $F_1, \dots, F_m$  est de dimension infinie, alors  $F_1 \times \cdots \times F_m$  est aussi de dimension infinie.
- Si les espaces vectoriels  $F_1, \dots, F_m$  sont de dimension finie alors la formule découle de la proposition précédente.

■

## 14.5.2 Dimension de $\mathcal{L}(E, F)$

---

### Théorème 14.67

Soient  $E$  et  $F$  deux espaces vectoriels de dimension finie.

Alors on a :

$$\dim \mathcal{L}(E, F) = (\dim E) (\dim F).$$

En particulier, l'espace vectoriel  $\mathcal{L}(E, F)$  est de dimension finie.

---

Démonstration 14.68

Soit  $(e_1, \dots, e_n)$  une base de  $E$ .

On sait que

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{L}(E, F) & \longrightarrow & F^n \\ u & \longmapsto & (u(e_1), \dots, u(e_n)) \end{array}$$

est un isomorphisme d'espaces vectoriels.

Donc

$$\begin{aligned} \dim \mathcal{L}(E, F) &= \dim F^n \\ &= n \dim F \\ &= (\dim E) (\dim F). \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} \dim \mathcal{L}(E, F) &= \dim F^n \\ &= n \dim F \\ &= (\dim E) (\dim F). \end{aligned}} \right\} \text{ selon le Corollaire 14.65}$$

■

---

**Corollaire 14.69**

Soit  $E$  un espace vectoriel de dimension finie.

Alors on a :

$$\dim \mathcal{L}(E) = (\dim E)^2$$

et :

$$\dim E^* = \dim E.$$

En particulier, les espaces vectoriels  $\mathcal{L}(E)$  et  $E^*$  sont de dimension finie.

---

**Démonstration 14.70**

Posons  $n = \dim E$ .

On a  $\dim \mathcal{L}(E) = \dim \mathcal{L}(E, E) = n^2$ .

On a  $\dim E^* = \dim \mathcal{L}(E, \mathbb{K}) = n \times 1 = n$ . ■

---

**Remarque 14.71**

Soit  $E$  un espace vectoriel de dimension finie.

On a vu en TD (cf. Exercice 12.37) que si  $\mathcal{B}$  est une base de  $E$  alors la base duale  $\mathcal{B}'$  possède le même nombre d'éléments que  $\mathcal{B}$ , ce qui redémontre que  $\dim E^* = \dim E$ .

## 14.6 Rang d'une application linéaire

### 14.6.1 Définition

---

**Définition 14.72**

Soient  $E$  et  $F$  deux  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et  $u \in \mathcal{L}(E, F)$ .

On appelle rang de l'application linéaire  $u$  la dimension de son image :

$$\operatorname{rg} u = \dim \operatorname{Im} u.$$

---

**Remarque 14.73**

Soient  $E$  et  $F$  deux  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et  $u \in \mathcal{L}(E, F)$ .

On suppose que  $(e_1, \dots, e_p) \in E^p$  est une famille génératrice de  $E$ .

Alors

$$\operatorname{rg} u = \operatorname{rg} (u(e_1), \dots, u(e_p)).$$

---

*Démonstration 14.74*

On a :

$$\begin{aligned}\operatorname{rg} u &= \dim \operatorname{Im} u \\ &= \dim u(E) \\ &= \dim u(\operatorname{Vect}(e_1, \dots, e_p)) \\ &= \dim \operatorname{Vect}(u(e_1), \dots, u(e_p)) \\ &= \operatorname{rg}(u(e_1), \dots, u(e_p)).\end{aligned}$$

■

---

**Proposition 14.75**

Soient  $E$  et  $F$  deux  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et  $u \in \mathcal{L}(E, F)$ .

On a :

$$\operatorname{rg} u \leq \min \{\dim E ; \dim F\}.$$

---

*Démonstration 14.76*

Montrons que  $\operatorname{rg} u \leq \dim E$ .

C'est vrai si  $\dim E < +\infty$ .

Sinon, on considère une base  $(e_1, \dots, e_n)$  de  $E$  (où  $n \in \mathbb{N}$ ) et on a :

$$\begin{aligned}\operatorname{rg} u &= \operatorname{rg}(u(e_1), \dots, u(e_n)) \\ &\leq n.\end{aligned}\quad \left. \vphantom{\begin{aligned}\operatorname{rg} u &= \operatorname{rg}(u(e_1), \dots, u(e_n)) \\ &\leq n.\end{aligned}} \right\} \text{selon la Remarque 14.52}$$

Montrons que  $\operatorname{rg} u \leq \dim F$ .

On a  $\operatorname{Im} u \subseteq F$  donc  $\operatorname{rg} u = \dim \operatorname{Im} u \leq \dim F$ .

■

---

**Exercice/Exemple 14.77**

Soit  $n \in \mathbb{N}$ .

Quel est le rang de l'endomorphisme

$$D : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_n[X] & \longrightarrow & \mathbb{R}_n[X] \\ P & \longmapsto & P' \end{array} ?$$



---

Correction 14.78

On a  $\mathbb{R}_n[X] = \text{Vect}(1, X, \dots, X^n)$ .

Donc selon la Remarque 14.73 :

$$\begin{aligned} \text{rg } D &= \text{rg}(D(1), \dots, D(X^n)) \\ &= \text{rg}(0, 1, 2X, 3X^2, \dots, nX^{n-1}) \\ &= \text{rg}(1, 2X, 3X^2, \dots, nX^{n-1}) \quad \left. \begin{array}{l} \text{car Vect}(1, 2X, \dots, nX^{n-1}) \\ \downarrow \mathbb{R}_{n-1}[X] \end{array} \right\} = \\ &= n. \end{aligned}$$

---

**Proposition 14.79 (Invariance du rang par composition par un isomorphisme)**

Soient  $E, F$  et  $G$  des  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et  $u \in \mathcal{L}(E, F)$  et  $v \in \mathcal{L}(F, G)$ .

(1) Si  $u$  est un isomorphisme, alors :  $\text{rg } vu = \text{rg } v$ .

(2) Si  $v$  est un isomorphisme, alors :  $\text{rg } vu = \text{rg } u$ .

---

Démonstration 14.80 (1)

On a :

$$\begin{aligned} \text{rg } vu &= \dim vu(E) \\ &= \dim v(u(E)) \\ &= \dim v(F) \quad \left. \begin{array}{l} \text{car } u(E) = F \text{ car } u \text{ est surjectif} \end{array} \right\} \\ &= \text{rg } v. \end{aligned}$$

■

---

Démonstration 14.81 (2)

On a

$$\text{Im } vu = vu(E) = v(\text{Im } u).$$

Comme  $v$  est un isomorphisme, les espaces vectoriels  $\text{Im } vu$  et  $\text{Im } u$  sont isomorphes.

Donc  $\dim \text{Im } vu = \dim \text{Im } u$ .

Donc  $\text{rg } vu = \text{rg } u$ .

■

## 14.6.2 Théorème du rang

---

### Théorème 14.82 (Forme géométrique du théorème du rang)

Soient  $E$  et  $F$  deux  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel,  $u \in \mathcal{L}(E, F)$  et  $S$  un supplémentaire de  $\ker u$  dans  $E$  :

$$E = \ker u \oplus S.$$

Alors  $u$  induit un isomorphisme de  $S$  vers  $\operatorname{Im} u$ .

Cela signifie que l'application

$$\begin{aligned} v : S &\longrightarrow \operatorname{Im} u \\ x &\longmapsto u(x) \end{aligned}$$

est un isomorphisme.

---

#### Démonstration 14.83

On a  $u \in \mathcal{L}(E, F)$  et  $S$  est un sous-espace vectoriel de  $E$  donc  $u|_S \in \mathcal{L}(S, F)$  et  $\operatorname{Im} u|_S \subseteq \operatorname{Im} u$  donc  $v \in \mathcal{L}(S, \operatorname{Im} u)$ .

Montrons que  $\ker v = \{0_E\}$ .

Soit  $x \in S$  tel que  $v(x) = 0_F$ .

On a  $u(x) = 0_F$  car  $v(x) = u(x)$ .

Donc  $x \in \ker v \cap S = \{0_E\}$ .

Donc  $x = 0_E$ .

Donc  $v$  est injectif.

Montrons que  $v$  est surjectif de  $S$  vers  $\operatorname{Im} u$ .

Soient  $y \in \operatorname{Im} u$  et  $x \in E$  tel que  $u(x) = y$ .

Comme  $\ker u + S = E$ , il existe  $x_0 \in \ker u$  et  $x_1 \in S$  tels que  $x = x_0 + x_1$ .

On a

$$y = u(x) = u(x_0) + u(x_1) = 0_E + v(x_1).$$

Donc  $y \in \operatorname{Im} v$ .

Donc  $v$  est surjectif.

Donc  $v$  est un isomorphisme de  $S$  vers  $\operatorname{Im} u$ . ■

---

**Théorème 14.84 (Théorème du rang)**

Soient  $E$  et  $F$  deux  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et  $u \in \mathcal{L}(E, F)$ .

On suppose que  $E$  est de dimension finie.

On a :

$$\dim E = \operatorname{rg} u + \dim \ker u.$$

---

*Démonstration 14.85*

Soit  $S$  un supplémentaire de  $\ker u$  dans  $E$ .

Selon le théorème précédent,  $S$  et  $\operatorname{Im} u$  sont isomorphes donc  $\dim S = \dim \operatorname{Im} u$ , c'est-à-dire  $\dim E - \dim \ker u = \operatorname{rg} u$ .

Donc

$$\dim E = \operatorname{rg} u + \dim \ker u. \quad \blacksquare$$

---

*Remarque 14.86*

Le théorème est également vrai en dimension infinie.

## 14.6.3 Applications

### 14.6.3.1 Isomorphismes en dimension finie

---

**Théorème 14.87**

Soient  $E$  et  $F$  deux  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de même dimension finie et  $u \in \mathcal{L}(E, F)$ .

Les propositions suivantes sont équivalentes :

- (1)  $u$  est injective (c'est-à-dire  $\ker u = \{0_E\}$ )
- (2)  $u$  est surjective (c'est-à-dire  $\operatorname{rg} u = \dim F$ )
- (3)  $u$  est bijective.

---

*Démonstration 14.88*

On a :

$$\begin{aligned} u \text{ est surjectif} &\iff \operatorname{Im} u = F \\ &\iff \dim \operatorname{Im} u = \dim F \\ &\iff \operatorname{rg} u = \dim F. \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} u \text{ est surjectif} &\iff \operatorname{Im} u = F \\ &\iff \dim \operatorname{Im} u = \dim F \\ &\iff \operatorname{rg} u = \dim F. \end{aligned}} \right\} \begin{array}{l} \text{car } \operatorname{Im} u \text{ est un sous-espace} \\ \text{vectoriel de } F \text{ et } \dim F < +\infty \end{array}$$

Les implications (3)  $\implies$  (1) et (3)  $\implies$  (2) sont claires.

Selon le théorème du rang appliqué à  $u$ , on a

$$\dim E = \operatorname{rg} u + \dim \ker u.$$

D'où

$$\begin{aligned} u \text{ est injective} &\iff \ker u = \{0_E\} \\ &\iff \dim \ker u = 0 \\ &\iff \operatorname{rg} u = \dim E \\ &\iff \operatorname{rg} u = \dim F \\ &\iff u \text{ est surjective.} \end{aligned}$$

D'où les équivalences. ■

---

**Corollaire 14.89**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et  $u \in \mathcal{L}(E)$ .

On rappelle que l'anneau  $(\mathcal{L}(E), +, \circ)$  n'est pas commutatif (sauf si  $\dim E \leq 1$ ).

Les propositions suivantes sont équivalentes :

- (1)  $u$  est inversible :  $u \in \operatorname{GL}(E)$ .
- (2)  $u$  est inversible à droite :  $\exists v \in \mathcal{L}(E), uv = \operatorname{id}_E$ .
- (3)  $u$  est inversible à gauche :  $\exists v \in \mathcal{L}(E), vu = \operatorname{id}_E$ .

---

*Démonstration 14.90*

Supposons  $u$  inversible à droite.

Alors  $u$  est une surjection.

Donc  $u$  est un isomorphisme car  $\dim E < +\infty$ .

D'où (1).

Supposons  $u$  inversible à gauche.

Alors  $u$  est une injection.

Donc  $u$  est un isomorphisme car  $\dim E < +\infty$ .

D'où (1).

Finalement, les implications (1)  $\implies$  (2) et (1)  $\implies$  (3) sont claires. ■

### 14.6.3.2 Formule de Grassmann

#### Proposition 14.91 (Formule de Grassmann)

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $F$  et  $G$  deux sous-espaces vectoriels de  $E$  de dimension finie.

On a :

$$\dim(F + G) = \dim F + \dim G - \dim F \cap G.$$

---

Démonstration 14.92

On pose :

$$\begin{aligned} u : F \times G &\longrightarrow E \\ (x, y) &\longmapsto x + y \end{aligned}$$

$$\text{On a } \begin{cases} u \in \mathcal{L}(F \times G, E) \\ \text{Im } u = F + G \end{cases}$$

Selon le théorème du rang appliqué à  $u$ , on a :

$$\dim(F \times G) = \dim \ker u + \text{rg } u,$$

$$\text{avec } \begin{cases} \dim(F \times G) = \dim F + \dim G \\ \text{rg } u = \dim(F + G) \\ \ker u = \{(x, y) \in F \times G \mid x + y = 0_E\} = \{(z, -z)\}_{z \in F \cap G} \end{cases}$$

Or  $\{(z, -z)\}_{z \in F \cap G}$  est isomorphe à  $F \cap G$  (en effet,  $\begin{array}{ccc} F \cap G & \longrightarrow & \{(z, -z)\}_{z \in F \cap G} \\ z & \longmapsto & (z, -z) \end{array}$  est clairement linéaire et bijective donc c'est un isomorphisme).

Donc  $\dim \ker u = \dim F \cap G$ .

Finalement, on a  $\dim F + \dim G = \dim F \cap G + \dim(F + G)$ , c'est-à-dire :

$$\dim(F + G) = \dim F + \dim G - \dim F \cap G. \quad \blacksquare$$

---

**Corollaire 14.93**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $F$  et  $G$  deux sous-espaces vectoriels de  $E$  de dimension finie.

On a :

$$\dim(F + G) \leq \dim F + \dim G$$

avec égalité si, et seulement si,  $F$  et  $G$  sont en somme directe.

---

*Démonstration 14.94*

Selon la formule de Grassmann, on a

$$\begin{aligned}\dim(F + G) &= \dim F + \dim G - \dim F \cap G \\ &\leq \dim F + \dim G\end{aligned}$$

avec égalité ssi  $\dim F \cap G = 0$  ssi  $F \cap G = \{0_E\}$  ssi  $F$  et  $G$  sont en somme directe. ■

### 14.6.3.3 Supplémentaires

---

**Proposition 14.95 (Caractérisation des supplémentaires)**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et  $F$  et  $G$  deux sous-espaces vectoriels de  $E$ .

On a

$$E = F \oplus G$$

si deux des trois conditions suivantes sont satisfaites :

(1) Les sous-espaces vectoriels  $F$  et  $G$  sont en somme directe

(2)  $E = F + G$

(3)  $\dim E = \dim F + \dim G$ .

---

*Démonstration 14.96* (((1) et (3))  $\implies$  (2))

Supposons (1) et (3).

Selon la formule de Grassmann et (1), on a :

$$\begin{aligned}\dim(F + G) &= \dim F + \dim G - 0 \\ &= \dim E\end{aligned}\quad \left. \vphantom{\begin{aligned}\dim(F + G) &= \dim F + \dim G - 0 \\ &= \dim E\end{aligned}} \right\} \text{selon (3)}$$

Ainsi, on a  $\begin{cases} F + G \subseteq E \\ \dim(F + G) = \dim E < +\infty \end{cases}$

Donc  $F + G = E$ . ■

---

*Démonstration 14.97 ((2) et (3))  $\implies$  (1)*

Supposons (2) et (3).

Selon la formule de Grassmann, on a :

$$\begin{aligned}\dim F \cap G &= \underbrace{\dim F + \dim G}_{=\dim E \text{ selon (3)}} - \underbrace{\dim (F + G)}_{=\dim E \text{ selon (2)}} \\ &= 0\end{aligned}$$

Donc  $F \cap G = \{0_E\}$ . ■

## 14.7 Hyperplans

### 14.7.1 Hyperplans en dimension quelconque

---

#### Définition 14.98

Soient  $E$  un espace vectoriel et  $H$  un sous-espace vectoriel de  $E$ .

On dit que  $H$  est un hyperplan (de  $E$ ) si  $H$  est le noyau d'une forme linéaire non-nulle :

$$\exists \ell \in E^* \setminus \{0\}, \quad H = \ker \ell.$$

---

#### Proposition 14.99

Soient  $E$  un espace vectoriel,  $D$  une droite vectorielle de  $E$  et  $H$  un hyperplan de  $E$  ne contenant pas  $D$  :

$$D \not\subseteq H.$$

Alors  $H$  et  $D$  sont supplémentaires dans  $E$  :

$$H \oplus D = E.$$

---

#### Démonstration 14.100

Montrons que  $H \cap D = \{0_E\}$ .

On a  $H \cap D \subseteq D$  et  $\dim D = 1$  donc  $\dim H \cap D = 0$  ou  $\dim H \cap D = 1$ .

Si  $\dim H \cap D = 1$  :

$$\text{Alors } \begin{cases} H \cap D \subseteq D \\ \dim H \cap D = \dim D < +\infty \end{cases}$$

Donc  $H \cap D = D$ .

Donc  $D \subseteq H$  : contradiction.

Donc  $\dim H \cap D = 0$  donc  $H \cap D = \{0_E\}$ .

Montrons que  $H + D = E$ .

Comme  $H$  est un hyperplan de  $E$ , il existe  $\ell \in E^* \setminus \{0\}$  telle que  $H = \ker \ell$ .

Soit  $x \in E$ .

Montrons que  $x \in H + D$ .

On a  $D \not\subseteq H$  donc  $D \not\subseteq \ker \ell$ .

Donc  $\exists x \in D, \ell(x) \neq 0$ .

Donc  $\ell|_D \neq 0$  donc  $\ell|_D$  est surjective.

Donc  $\exists y \in D, \ell(y) = \ell(x)$ .

Donc

$$\exists y \in D, y - x \in \ker \ell$$

$$\exists z \in \ker \ell, y - x = z$$

$$\exists z \in H, y - z = x.$$

Donc  $H + D = E$ . ■

---

**Proposition 14.101**

*Les hyperplans de  $E$  sont les sous-espaces vectoriels de  $E$  qui admettent comme supplémentaire une droite vectorielle.*

---

*Démonstration 14.102*

Soit  $H \subseteq E$ .

Montrons que

$$H \text{ est un hyperplan de } E \iff H \text{ admet comme supplémentaire une droite.}$$

$\Rightarrow$

Supposons que  $H$  est un hyperplan de  $E$ .

Soit  $\ell \in E^* \setminus \{0\}$  telle que  $H = \ker \ell$ .

Comme  $\ell \neq 0$ , on a  $H \neq E$ .

Soit  $x \in E \setminus H$ .

Alors  $D = \text{Vect}(x)$  est une droite (car  $x \neq 0_E$  car  $x \notin H$ ) non-incluse dans  $H$  (car  $x \notin H$ ).

Donc  $D$  est une droite supplémentaire de  $H$  dans  $E$  selon la Proposition 14.99.





Supposons  $E = H \oplus D$  où  $D$  est une droite de  $E$ .

On a  $\dim D = \dim \mathbb{K} = 1$ .

Donc il existe un isomorphisme  $\ell_1 \in D^*$ .

Notons  $\ell_0 \in H^*$  la forme linéaire nulle sur  $H$ .

Soit  $\ell \in E^*$  l'unique forme linéaire sur  $E$  telle que

$$\ell|_H = \ell_0 \quad \text{et} \quad \ell|_D = \ell_1.$$

On a :

$$\begin{aligned} \forall h \in H, \forall d \in D, h + d \in \ker \ell &\iff \ell(h + d) = 0_{\mathbb{K}} \\ &\iff \ell_0(h) + \ell_1(d) = 0_{\mathbb{K}} \\ &\iff \ell_1(d) = 0_{\mathbb{K}} \\ &\iff d = 0 \\ &\iff h + d = h \\ &\iff h + d \in H \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} \ell_1(d) = 0_{\mathbb{K}} \\ d = 0 \end{aligned}} \right\} \text{car } \ell_1 \text{ est injective}$$

Donc  $\ker \ell = H$  donc  $H$  est un hyperplan car  $\ell \in E^* \setminus \{0\}$ . ■

### Proposition 14.103

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel,  $H$  un hyperplan de  $E$  et  $\ell \in E^* \setminus \{0\}$  une forme linéaire non-nulle de  $E$  telle que  $\ker \ell = H$ .

Les formes linéaires nulles sur  $H$  sont celles qui sont colinéaires à  $\ell$  :

$$\forall \ell' \in E^*, H \subseteq \ker \ell' \iff [\exists \lambda \in \mathbb{K}, \ell' = \lambda \ell].$$

Les formes linéaires dont  $H$  est le noyau sont donc celles de la forme  $\lambda \ell$  où  $\lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$ .

### Démonstration 14.104

Soient  $D$  une droite telle que  $H \oplus D = E$  et  $x \in E$  tel que  $D = \text{Vect}(x)$ .

Soit  $\ell' \in E^*$ .

Montrons que

$$\forall \ell' \in E^*, H \subseteq \ker \ell' \iff [\exists \lambda \in \mathbb{K}, \ell' = \lambda \ell].$$

⇐ S'il existe  $\lambda \in \mathbb{K}$  tel que  $\ell' = \lambda \ell$  alors  $\forall h \in H, \ell'(h) = \lambda \ell(h) = 0$  donc  $H \subseteq \ker \ell'$ .

⇒

Supposons  $H \subseteq \ker \ell'$ .

On a  $\ell(x) \neq 0$ .

Posons  $\lambda = \frac{\ell'(x)}{\ell(x)}$ .

On a  $\ell'(x) = \lambda\ell(x)$  donc comme  $\ell'$  est linéaire :

$$\begin{aligned}\forall h \in H, \forall \mu \in \mathbb{K}, \ell'(h + \mu x) &= \ell'(h) + \mu\ell'(x) \\ &= 0 + \mu\lambda\ell(x) \\ &= \lambda\ell(h) + \mu\lambda\ell(x) \\ &= \lambda\ell(h + \mu x).\end{aligned}$$

Ainsi,  $\forall y \in H + \text{Vect}(x), \ell'(y) = \lambda\ell(y)$ .

Donc  $\ell' = \lambda\ell$  car  $E = H + \text{Vect}(x)$ . ■

## 14.7.2 Hyperplans en dimension finie

---

### Proposition 14.105

Soit  $E$  un espace vectoriel de dimension finie  $n \in \mathbb{N}^*$ .

Les hyperplans de  $E$  sont ses sous-espaces vectoriels de dimension  $n - 1$ .

---

*Démonstration 14.106*

Rappel : si  $\ell \in E^* = \mathcal{L}(E, \mathbb{K})$  alors  $\text{rg } \ell \leq \dim \mathbb{K} = 1$  donc toute forme linéaire non-nulle est surjective.

$\subseteq$

Soient  $H$  un hyperplan de  $E$  et  $\ell \in E^* \setminus \{0\}$  telle que  $H = \ker \ell$ .

D'après le théorème du rang appliqué à  $\ell$ , on a :

$$\dim E = \dim \ker \ell + \text{rg } \ell.$$

Donc  $n = \dim H + 1$  donc  $\dim H = n - 1$ .

$\supseteq$

Soient  $H$  un sous-espace vectoriel de  $E$  de dimension  $n - 1$  et  $D$  un supplémentaire de  $H$  dans  $E$  :

$$E = H \oplus D.$$

On a  $\dim E = \dim H + \dim D$  donc  $\dim D = 1$ .

Donc  $H$  est un hyperplan selon la Proposition 14.101. ■

---

*Démonstration 14.107 (Autre méthode)*

Soient  $H$  un sous-espace vectoriel de  $E$  de dimension  $n-1$  et  $\left(\underbrace{e_1, \dots, e_{n-1}}_{\text{base de } H}, e_n\right)$  une base de  $E$  adaptée à  $H$ .

On note  $(e_1^*, \dots, e_n^*)$  la base duale de  $(e_1, \dots, e_n)$ .

On a  $H = \ker e_n^*$  avec  $e_n^*$  une forme linéaire non-nulle.

Donc  $H$  est un hyperplan de  $E$ . ■

---

**Proposition 14.108 (Équation cartésienne d'un hyperplan dans une base)**

Soient  $E$  un espace vectoriel de dimension finie  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $H$  un hyperplan de  $E$  et  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  une base de  $E$ .

Alors  $H$  admet dans  $\mathcal{B}$  une équation cartésienne de la forme :

$$a_1x_1 + \dots + a_nx_n = 0,$$

où  $a_1, \dots, a_n$  sont des scalaires non-tous nuls.

En d'autres termes, on a :

$$\exists (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\}, \quad \forall x_1, \dots, x_n \in \mathbb{K}, \quad x_1e_1 + \dots + x_ne_n \in H \iff a_1x_1 + \dots + a_nx_n = 0.$$

De plus, l'équation cartésienne d'un hyperplan de  $E$  est unique à un facteur multiplicatif non-nul près.

Autrement dit, si  $a_1x_1 + \dots + a_nx_n = 0$  est une équation cartésienne de  $H$  dans  $\mathcal{B}$ , alors les autres équations cartésiennes de  $H$  dans  $\mathcal{B}$  sont celles de la forme :

$$\lambda a_1x_1 + \dots + \lambda a_nx_n = 0$$

où  $\lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$ .

---

*Remarque 14.109*

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  une base de  $E$ .

Déterminons les formes linéaires sur  $E$ .

analyse

Soit  $\ell \in E^*$ .

On note  $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$  les coordonnées de  $x$  dans  $\mathcal{B}$  :  $x = x_1e_1 + \dots + x_ne_n$ .

On a

$$\begin{aligned} \ell(x) &= \ell(x_1e_1 + \dots + x_ne_n) \\ &= x_1\ell(e_1) + \dots + x_n\ell(e_n) \\ &= a_1x_1 + \dots + a_nx_n \end{aligned}$$

en posant  $a_1 = \ell(e_1), \dots, a_n = \ell(e_n)$ .

synthèse

Si  $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K}$  alors la fonction

$$\begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ x_1 e_1 + \dots + x_n e_n & \longmapsto & a_1 x_1 + \dots + a_n x_n \end{array}$$

est clairement une forme linéaire sur  $E$ .

conclusion

Les formes linéaires sur  $E$  sont les fonctions de la forme

$$\begin{array}{ccc} \ell : E & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ x_1 e_1 + \dots + x_n e_n & \longmapsto & a_1 x_1 + \dots + a_n x_n \end{array}$$

où  $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K}$ .

De plus, comme  $\forall k \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, a_k = \ell(e_k)$ , on remarque :

$$\ell = 0 \iff a_1 = \dots = a_n = 0$$

---

*Démonstration 14.110 (De la proposition précédente)*

Soient  $\ell \in E^* \setminus \{0\}$  telle que  $H = \ker \ell$  et  $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\}$  tel que

$$\forall x_1, \dots, x_n \in \mathbb{K}, \ell(x_1 e_1 + \dots + x_n e_n) = a_1 x_1 + \dots + a_n x_n.$$

On a

$$\begin{aligned} \forall x_1, \dots, x_n \in \mathbb{K}, x_1 e_1 + \dots + x_n e_n \in H &\iff \ell(x_1 e_1 + \dots + x_n e_n) = 0 \\ &\iff a_1 x_1 + \dots + a_n x_n = 0. \end{aligned}$$

■

---

*Exemple 14.111*

On pose

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{K}^3 \mid 2x + z = 0\}$$

.

Alors  $F$  est un hyperplan de  $\mathbb{K}^3$  car les hyperplans de  $\mathbb{K}^3$  sont les noyaux de ses formes linéaires non-nulles.

### 14.7.3 Intersections d'hyperplans en dimension finie

---

#### Proposition 14.112

Soient  $E$  un espace vectoriel de dimension finie  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $H_1, \dots, H_m$  des hyperplans de  $E$  (où  $m \in \mathbb{N}^*$ ).

Alors :

$$\dim \bigcap_{i=1}^m H_i \geq n - m.$$

---

*Démonstration 14.113*

Soient  $\ell_1, \dots, \ell_m \in E^* \setminus \{0\}$  telles que  $\forall i \in \llbracket 1 ; m \rrbracket, H_i = \ker \ell_i$ .

On pose

$$\begin{aligned} u : E &\longrightarrow \mathbb{K}^m \\ x &\longmapsto (\ell_1(x), \dots, \ell_m(x)) \end{aligned}$$

de sorte que

$$\ker u = \bigcap_{i=1}^m \ker \ell_i = \bigcap_{i=1}^m H_i.$$

Appliquons le théorème du rang à  $u$  :

$$\dim E = \dim \ker u + \operatorname{rg} u \quad \text{avec} \quad \begin{cases} \dim E = n \\ \dim \ker u = \dim \bigcap_{i=1}^m H_i \\ \operatorname{rg} u \leq m \end{cases}$$

Donc  $\dim \bigcap_{i=1}^m H_i \geq n - m$ . ■

---

**Proposition 14.114**

Soient  $E$  un espace vectoriel de dimension finie  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $F$  un sous-espace vectoriel de  $E$  de dimension  $m \in \llbracket 0 ; n - 1 \rrbracket$ .

Alors  $F$  est l'intersection de  $n - m$  hyperplans de  $E$ .

---

*Démonstration 14.115*

Soit  $\left( \underbrace{e_1, \dots, e_m}_{\text{base de } F}, \dots, e_n \right)$  une base de  $E$  adaptée à  $F$ .

On a

$$F = \underbrace{\bigcap_{i=m+1}^n \ker e_i^*}_{n-m \text{ hyperplans}}.$$
■

---

**Corollaire 14.116**

Soient  $E$  un espace vectoriel de dimension finie  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $F$  un sous-espace vectoriel de  $E$  tel que  $E \neq F$ .

Alors il existe un hyperplan  $H$  de  $E$  tel que  $F \subseteq H$ .

---

*Démonstration 14.117*

On a  $F = \bigcap_{i=1}^m H_i$  avec  $m \geq 1$  donc  $F \subseteq H_1$ . ■

---

*Exemple 14.118*

Les droites vectorielles du plan  $\mathbb{R}^2$  sont les parties de  $\mathbb{R}^2$  définies par une équation cartésienne de la forme

$$ax + by = 0$$

où  $(a, b) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ .

---

*Exemple 14.119*

Les droites affines du plan  $\mathbb{R}^2$  sont les parties de  $\mathbb{R}^2$  définies par une équation cartésienne de la forme

$$ax + by = c$$

où  $(a, b) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$  et  $c \in \mathbb{R}$ .

---

*Exemple 14.120*

Les plans vectoriels de  $\mathbb{R}^3$  sont les parties de  $\mathbb{R}^3$  définies par une équation cartésienne de la forme

$$ax + by + cz = 0$$

où  $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$ .

---

*Exemple 14.121*

Les plans affines de  $\mathbb{R}^3$  sont les parties de  $\mathbb{R}^3$  définies par une équation cartésienne de la forme

$$ax + by + cz = d$$

où  $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$  et  $d \in \mathbb{R}$ .

---

*Exemple 14.122*

Les droites vectorielles de  $\mathbb{R}^3$  sont les parties de  $\mathbb{R}^3$  définies par un système cartésien de la forme

$$\begin{cases} ax + by + cz = 0 \\ a'x + b'y + c'z = 0 \end{cases}$$

où les vecteurs  $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$  et  $\begin{pmatrix} a' \\ b' \\ c' \end{pmatrix}$  sont non-colinéaires.

---

*Exemple 14.123*

Les droites affines de  $\mathbb{R}^3$  sont les parties de  $\mathbb{R}^3$  définies par un système cartésien de la forme

$$\begin{cases} ax + by + cz = d \\ a'x + b'y + c'z = d' \end{cases}$$

où les vecteurs  $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$  et  $\begin{pmatrix} a' \\ b' \\ c' \end{pmatrix}$  sont non-colinéaires et  $d, d' \in \mathbb{R}$ .

# Chapitre 15

## Matrices I

### Sommaire

---

<b>15.1</b>	<b>Matrices.</b>	<b>.509</b>
<b>15.2</b>	<b>Combinaisons linéaires de matrices.</b>	<b>.511</b>
<b>15.3</b>	<b>Produit matriciel.</b>	<b>.513</b>
15.3.1	Produits de matrices	513
15.3.2	Produits de matrices carrées	517
15.3.3	Matrices inversibles, groupe linéaire	519
<b>15.4</b>	<b>Matrices diagonales, matrices triangulaires</b>	<b>.521</b>
<b>15.5</b>	<b>Transposition</b>	<b>.523</b>
<b>15.6</b>	<b>Matrices symétriques, matrices antisymétriques.</b>	<b>.525</b>
<b>15.7</b>	<b>Lignes et colonnes d'une matrice.</b>	<b>.527</b>
15.7.1	Abus autorisés	527
15.7.2	Produits matriciels	529
15.7.3	Opérations élémentaires sur les matrices	531
<b>15.8</b>	<b>Rang d'une matrice</b>	<b>.532</b>
<b>15.9</b>	<b>Application linéaire canoniquement associée à une matrice</b>	<b>.534</b>
15.9.1	Définition	534
15.9.2	Propriétés	537
15.9.3	Conséquences sur l'inversibilité des matrices	540
15.9.4	Remarque	541
<b>15.10</b>	<b>Matrices équivalentes.</b>	<b>.541</b>
<b>15.11</b>	<b>Matrices semblables</b>	<b>.543</b>
<b>15.12</b>	<b>Rang d'une matrice (suite)</b>	<b>.545</b>
<b>15.13</b>	<b>Trace d'une matrice carrée</b>	<b>.548</b>
<b>15.14</b>	<b>Matrices et systèmes linéaires</b>	<b>.550</b>
<b>15.15</b>	<b>Calculer l'inverse d'une matrice</b>	<b>.553</b>

---

On considère un corps  $\mathbb{K}$  (en pratique,  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ ).

### 15.1 Matrices

---

**Définition 15.1 (Matrice)**

On appelle matrice toute famille de scalaires de la forme

$$A = (a_{ij})_{(i,j) \in \llbracket 1;n \rrbracket \times \llbracket 1;p \rrbracket} \in \mathbb{K}^{\llbracket 1;n \rrbracket \times \llbracket 1;p \rrbracket}$$

avec  $n, p \in \mathbb{N}^*$ .

On représente aussi une telle matrice sous la forme d'un tableau :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1p} \\ a_{21} & & & \vdots \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & \dots & a_{np} \end{pmatrix}$$

et on dit que  $A$  est une matrice à  $n$  lignes et  $p$  colonnes ou que  $A$  est de taille  $(n, p)$  ou encore que  $A$  est une matrice  $n \times p$ .

Son coefficient  $a_{ij}$  est appelé coefficient de  $A$  en position  $(i, j)$ .

Si  $n = 1$ , on dit que  $A$  est une matrice-ligne.

Si  $p = 1$ , on dit que  $A$  est une matrice-colonne.

L'ensemble des matrices de taille  $(n, p)$  à coefficients dans  $\mathbb{K}$  est noté

$$\mathcal{M}_{np}(\mathbb{K}) = \mathbb{K}^{\llbracket 1;n \rrbracket \times \llbracket 1;p \rrbracket}.$$

On pose enfin, si  $n = p$  :

$$\mathcal{M}_n(\mathbb{K}) = \mathcal{M}_{nn}(\mathbb{K}) = \mathbb{K}^{\llbracket 1;n \rrbracket^2}.$$

Une matrice de taille  $(n, n)$  est appelée matrice carrée de taille  $n$ .

---

**Exemple 15.2**

On a :

$$(100i + j)_{(i,j) \in \llbracket 1;2 \rrbracket \times \llbracket 1;4 \rrbracket} = \begin{pmatrix} 101 & 102 & 103 & 104 \\ 201 & 202 & 203 & 204 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{24}(\mathbb{R}).$$

---

**Notation 15.3**

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

On appelle matrice identité de taille  $n$  la matrice carrée

$$I_n = (\delta_{ij})_{(i,j) \in \llbracket 1;n \rrbracket^2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}).$$



---

**Notation 15.4 (Non-officielle)**

Soient  $n, p \in \mathbb{N}^*$ .

On appelle matrice nulle de taille  $(n, p)$  la matrice de taille  $(n, p)$  dont tous les coefficients sont nuls et on la note parfois  $0_{np}$  :

$$0_{np} = (0)_{(i,j) \in \llbracket 1;n \rrbracket \times \llbracket 1;p \rrbracket} = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K}).$$

Enfin, on pose :  $0_n = 0_{nn} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

## 15.2 Combinaisons linéaires de matrices

---

**Proposition 15.5**

Soient  $n, p \in \mathbb{N}^*$ .

L'ensemble  $\mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$  des matrices à  $n$  lignes et  $p$  colonnes est naturellement un espace vectoriel.

---

**Notation 15.6 (Matrices élémentaires)**

Soient  $n, p \in \mathbb{N}^*$ .

On définit pour tout  $(i_0, j_0) \in \llbracket 1 ; n \rrbracket \times \llbracket 1 ; p \rrbracket$  la matrice élémentaire

$$E_{i_0 j_0} = (\delta_{ii_0} \delta_{jj_0})_{(i,j) \in \llbracket 1;n \rrbracket \times \llbracket 1;p \rrbracket} \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K}).$$

Tous ses coefficients sont nuls, sauf celui en position  $(i_0, j_0)$  qui vaut 1.

---

*Exemple 15.7*

Les matrices élémentaires de  $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$  sont :

$$E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad E_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad E_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

---

**Proposition 15.8**

Soient  $n, p \in \mathbb{N}^*$ .

La famille des matrices élémentaires de  $\mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$

$$(E_{ij})_{(i,j) \in \llbracket 1;n \rrbracket \times \llbracket 1;p \rrbracket} \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})^{\llbracket 1;n \rrbracket \times \llbracket 1;p \rrbracket}$$

est une base de  $\mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$  appelée base canonique de  $\mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$ .

Les coordonnées d'une matrice dans cette base sont ses coefficients.

---

*Démonstration 15.9*

On note  $\mathcal{B}$  la famille des matrices élémentaires de  $\mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$ .

Montrons que  $\mathcal{B}$  est libre.

Soit  $(\lambda_{ij})_{(i,j)} \in \mathbb{K}^{\llbracket 1;n \rrbracket \times \llbracket 1;p \rrbracket}$  telle que

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p \lambda_{ij} E_{ij} = 0_{np}.$$

$$\text{On a } \begin{pmatrix} \lambda_{11} & \dots & \lambda_{1p} \\ \vdots & & \vdots \\ \lambda_{n1} & \dots & \lambda_{np} \end{pmatrix} = 0_{np}.$$

Donc

$$\forall i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, \quad \forall j \in \llbracket 1 ; p \rrbracket, \quad \lambda_{ij} = 0.$$

Donc  $\mathcal{B}$  est libre.

Montrons que  $\mathcal{B}$  est génératrice de  $\mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$ .

$$\text{Soit } A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1p} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{np} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K}).$$

On remarque

$$A = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p a_{ij} E_{ij}.$$

Donc  $\mathcal{B}$  est génératrice de  $\mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$ .

Donc  $\mathcal{B}$  est une base de  $\mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$ . ■

---

*Exemple 15.10*

On a :

$$\forall a, b, c, d \in \mathbb{K}, \quad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = aE_{11} + bE_{12} + cE_{21} + dE_{22}.$$

---

**Corollaire 15.11**

On a :

$$\forall n, p \in \mathbb{N}^*, \quad \dim \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K}) = np.$$

## 15.3 Produit matriciel

### 15.3.1 Produits de matrices

---

**Définition 15.12 (Produit matriciel)**

Soient  $m, n, p \in \mathbb{N}^*$ ,  $A = (a_{ij})_{(i,j) \in \llbracket 1;m \rrbracket \times \llbracket 1;n \rrbracket} \in \mathcal{M}_{mn}(\mathbb{K})$  et  $B = (b_{jk})_{(j,k) \in \llbracket 1;n \rrbracket \times \llbracket 1;p \rrbracket} \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$ .

On appelle produit des matrices  $A$  et  $B$  la matrice  $C$  de taille  $(m, p)$  :

$$C = (c_{ik})_{(i,k) \in \llbracket 1;m \rrbracket \times \llbracket 1;p \rrbracket} = A \times B = AB \in \mathcal{M}_{mp}(\mathbb{K})$$

définie par :

$$\forall (i, k) \in \llbracket 1 ; m \rrbracket \times \llbracket 1 ; p \rrbracket, \quad c_{ik} = \sum_{j=1}^n a_{ij} b_{jk}.$$

L'application ainsi définie

$$\mathcal{M}_{mn}(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K}) \longrightarrow \mathcal{M}_{mp}(\mathbb{K})$$

est appelée le produit matriciel.

---

**Proposition 15.13 (Bilinéarité du produit matriciel)**

Soient  $m, n, p \in \mathbb{N}^*$ .

Le produit matriciel  $\mathcal{M}_{mn}(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K}) \longrightarrow \mathcal{M}_{mp}(\mathbb{K})$  est bilinéaire, c'est-à-dire qu'on a :

$$(A, B) \longmapsto AB$$

$$\begin{cases} \forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{K}, \quad \forall A_1, A_2 \in \mathcal{M}_{mn}(\mathbb{K}), \quad \forall B \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K}), \quad (\lambda_1 A_1 + \lambda_2 A_2) B = \lambda_1 A_1 B + \lambda_2 A_2 B \\ \forall \mu_1, \mu_2 \in \mathbb{K}, \quad \forall A \in \mathcal{M}_{mn}(\mathbb{K}), \quad \forall B_1, B_2 \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K}), \quad A (\mu_1 B_1 + \mu_2 B_2) = \mu_1 A B_1 + \mu_2 A B_2 \end{cases}$$

Cela équivaut à :

$$\begin{aligned} \forall \lambda_1, \lambda_2, \mu_1, \mu_2 \in \mathbb{K}, \quad \forall A_1, A_2 \in \mathcal{M}_{mn}(\mathbb{K}), \quad \forall B_1, B_2 \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K}), \quad (\lambda_1 A_1 + \lambda_2 A_2) (\mu_1 B_1 + \mu_2 B_2) = & \lambda_1 \mu_1 A_1 B_1 \\ & + \lambda_1 \mu_2 A_1 B_2 \\ & + \lambda_2 \mu_1 A_2 B_1 \\ & + \lambda_2 \mu_2 A_2 B_2 \end{aligned}$$

---

**Proposition 15.14 (Matrices nulles, matrices identités)**

Soient  $n, p \in \mathbb{N}^*$ .

On a :

$$0_n \times A = A \times 0_p = 0_{np} \quad \text{et} \quad I_n \times A = A \times I_p = A.$$

---

*Démonstration 15.15*

Les égalités sont claires pour les produits avec les matrices nulles.

On pose  $C = (c_{ik})_{(i,k)} = I_n A$ .

Montrons que  $C = A$ .

On a  $C \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$  et  $\forall i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, \forall k \in \llbracket 1 ; p \rrbracket, c_{ik} = \sum_{j=1}^n \delta_{ij} a_{jk} = a_{ik}$ .

Donc  $C = A$ .

On montre de même  $A I_p = A$ . ■

---

*Remarque 15.16 (Matrices « scalaires »)*

Soient  $m, n, p \in \mathbb{N}^*$ .

On a, selon la Proposition 15.13 :

$$\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall A \in \mathcal{M}_{mn}(\mathbb{K}), \forall B \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K}), (\lambda A) B = A (\lambda B) = \lambda AB.$$

D'où, selon la Proposition 15.14 :

$$\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall A \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K}), \lambda A = (\lambda I_n) A = A (\lambda I_p).$$

En particulier, les matrices de la forme  $\lambda I_n$  où  $\lambda \in \mathbb{K}$  (qu'on appelle parfois « matrices scalaires ») commutent avec toute matrice carrée de taille  $n$  :

$$\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \lambda A = (\lambda I_n) A = A (\lambda I_n).$$

---

**Exercice/Exemple 15.17**

Compléter la table de multiplication (ne rien mettre dans la case quand le produit n'est pas défini) :

$\times$	$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$	$(0 \ 0 \ 7)$	$\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 3 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$	$(2 \ 4)$	$(9)$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$							
$(1 \ 2 \ 3 \ 4)$							
$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$							
$(7)$							
$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$							
$\begin{pmatrix} 3 & -3 \end{pmatrix}$							
$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$							

---

*Correction 15.18*

$\times$	$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 3 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 2 & 4 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 9 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$		$\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 3 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$				
$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$							
$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$		$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 14 \\ 0 & 0 & 21 \\ 0 & 0 & 28 \end{pmatrix}$		$\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 8 \\ 6 & 12 \\ 8 & 16 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 9 \\ 18 \\ 27 \\ 36 \end{pmatrix}$		
$\begin{pmatrix} 7 \end{pmatrix}$		$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 49 \end{pmatrix}$		$\begin{pmatrix} 14 & 28 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 63 \end{pmatrix}$		
$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$						$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} 3 & -3 \end{pmatrix}$						$\begin{pmatrix} 3 & -3 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 6 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$		$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$		$\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 9 \\ 0 \end{pmatrix}$		

---

**Proposition 15.19 (Associativité du produit matriciel)**

Soient  $m, n, p, q \in \mathbb{N}^*$ .

On a :

$$\forall A \in \mathcal{M}_{mn}(\mathbb{K}), \forall B \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K}), \forall C \in \mathcal{M}_{pq}(\mathbb{K}), (AB)C = A(BC).$$

En pratique, on n'écrit pas les parenthèses.

---

*Démonstration 15.20*

On a

$$\begin{cases} AB \in \mathcal{M}_{mp}(\mathbb{K}) \text{ donc } (AB)C \in \mathcal{M}_{mq}(\mathbb{K}) \\ BC \in \mathcal{M}_{nq}(\mathbb{K}) \text{ donc } A(BC) \in \mathcal{M}_{mq}(\mathbb{K}) \end{cases}$$

Posons  $D = AB$ ;  $E = BC$ ;  $F = DC$  et  $G = AE$ .

Montrons que  $F = G$ .

On a vu que  $F, G \in \mathcal{M}_{mq}(\mathbb{K})$ .

Par définition du produit matriciel, on a  $\forall i \in \llbracket 1 ; m \rrbracket, \forall k \in \llbracket 1 ; p \rrbracket, d_{ik} = \sum_{j=1}^n a_{ij}b_{jk}$  donc

$$\forall i \in \llbracket 1 ; m \rrbracket, \forall \ell \in \llbracket 1 ; q \rrbracket, f_{i\ell} = \sum_{k=1}^p d_{ik}c_{k\ell} = \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^p a_{ij}b_{jk}c_{k\ell}.$$

De même, on a  $\forall j \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, \forall \ell \in \llbracket 1 ; q \rrbracket, e_{j\ell} = \sum_{k=1}^p b_{jk} c_{k\ell}$  donc

$$\forall i \in \llbracket 1 ; m \rrbracket, \forall \ell \in \llbracket 1 ; q \rrbracket, g_{i\ell} = \sum_{j=1}^n a_{ij} e_{j\ell} = \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^p a_{ij} b_{jk} c_{k\ell}.$$

D'où  $F = G$ . ■

### Proposition 15.21 (Produit de matrices élémentaires)

Soient  $m, n, p \in \mathbb{N}^*$ .

Considérons deux matrices élémentaires

$$E_{ij} \in \mathcal{M}_{mn}(\mathbb{K}) \quad \text{et} \quad E_{k\ell} \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$$

avec  $i \in \llbracket 1 ; m \rrbracket, j, k \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$  et  $\ell \in \llbracket 1 ; p \rrbracket$ .

Alors on a :

$$E_{ij} E_{k\ell} = \delta_{jk} E_{i\ell} = \begin{cases} E_{i\ell} & \text{si } j = k \\ 0_{mp} & \text{sinon} \end{cases}$$

*Démonstration 15.22*

On a  $E_{ij} \in \mathcal{M}_{mn}(\mathbb{K})$  et  $E_{k\ell} \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$  donc

$$E_{ij} E_{k\ell} \in \mathcal{M}_{mp}(\mathbb{K}).$$

Posons  $A = (a_{xz})_{(x,z)} = E_{ij} \times E_{k\ell}$ .

On a :

$$\begin{aligned} \forall x \in \llbracket 1 ; m \rrbracket, \forall z \in \llbracket 1 ; p \rrbracket, a_{xz} &= \sum_{y=1}^n \underbrace{\delta_{xi} \delta_{yj}}_{\text{coefficient de } E_{ij} \text{ en } (x,y)} \times \underbrace{\delta_{yk} \delta_{z\ell}}_{\text{coefficient de } E_{k\ell} \text{ en } (y,z)} \\ &= \begin{cases} 1 & \text{si } (x, z) = (i, \ell) \text{ et } j = k \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \end{aligned}$$

D'où le résultat. ■

## 15.3.2 Produits de matrices carrées

---

**Proposition 15.23 (Anneau des matrices carrées)**

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

Alors  $(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +, \times)$  est un anneau.

Son élément neutre pour  $+$  est la matrice nulle  $0_n$ .

Son élément neutre pour  $\times$  est la matrice identité  $I_n$ .

C'est un anneau non-commutatif si  $n \geq 2$ .

---

**Démonstration 15.24**

$(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +)$  est clairement un groupe abélien car  $(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +, \cdot)$  est un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

$\times$  est une loi de composition interne sur  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  : on a

$$\forall A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \quad AB \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}),$$

c'est une loi associative selon la Proposition 15.19 et elle admet  $I_n$  comme élément neutre selon la Proposition 15.14.

De plus, elle est distributive par rapport à  $+$  car le produit matriciel est bilinéaire.

Donc  $(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +, \times)$  est un anneau.

Enfin, si  $n \geq 2$ , l'anneau est non-commutatif :

$$\begin{cases} E_{12}E_{21} = E_{11} \\ E_{21}E_{12} = E_{22} \neq E_{11} \end{cases}$$

■

---

**Remarque 15.25**

Tout ce qu'on a vu sur les anneaux s'applique donc à l'anneau des matrices carrées.

Par exemple, on note  $A^k$  la puissance  $k$ -ème d'une matrice si  $k \in \mathbb{N}$ , voire si  $k \in \mathbb{Z}$  dans le cas où  $A$  est inversible.

La proposition suivante s'applique aussi :

---

**Proposition 15.26**

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

Si  $A$  et  $B$  sont deux éléments de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  qui commutent (c'est-à-dire tels que  $AB = BA$ ), alors on a la formule du binôme de Newton :

$$\forall m \in \mathbb{N}, \quad (A + B)^m = \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} A^k B^{m-k}$$

et la formule :

$$\forall m \in \mathbb{N}, \quad A^m - B^m = (A - B) \sum_{k=0}^{m-1} A^k B^{m-1-k} = \left( \sum_{k=0}^{m-1} A^k B^{m-1-k} \right) (A - B).$$



---

*Remarque 15.27 (« Diviseurs de zéro »)*

Soit  $n \in \llbracket 2 ; +\infty \rrbracket$ .

On a :

$$\exists A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \begin{cases} A \neq 0 \\ B \neq 0 \\ AB = 0 \end{cases}$$

---

*Démonstration 15.28*

On a :

$$\begin{cases} E_{11}E_{22} = 0 \\ E_{11} \neq 0 \\ E_{22} \neq 0 \end{cases} \quad \blacksquare$$

---

*Remarque 15.29 (Matrices nilpotentes)*

Soit  $n \in \llbracket 2 ; +\infty \rrbracket$ .

On a :

$$\exists A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \exists k \in \mathbb{N}^*, \begin{cases} A \neq 0 \\ A^k = 0 \end{cases}$$

Une telle matrice  $A$  est appelée matrice nilpotente.

---

*Démonstration 15.30*

On a :

$$\begin{cases} E_{12}^2 = 0 \\ E_{12} \neq 0 \end{cases} \quad \blacksquare$$

### 15.3.3 Matrices inversibles, groupe linéaire

---

**Définition 15.31 (Matrice inversible)**

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

On dit qu'une matrice carrée  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  est inversible si elle est inversible dans l'anneau  $(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +, \times)$ .

On rappelle que cela signifie qu'elle admet un inverse à gauche et à droite pour le produit matriciel :

$$\exists B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), AB = BA = I_n.$$

On sait que la matrice  $B$  est alors unique, on l'appelle l'inverse de  $A$  et on la note  $A^{-1}$ .

---

*Exemple 15.32*

On a :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

En effet, on a bien :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

---

*Remarque 15.33*

On verra (cf. Bilan 15.95) que pour qu'une matrice  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  soit inversible, il suffit qu'elle soit « inversible à gauche » ou « inversible à droite » :

$$[\exists B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \quad BA = I_n] \quad \text{ou} \quad [\exists B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \quad AB = I_n].$$

La matrice  $B$  est alors automatiquement l'inverse de  $A$  (à gauche et à droite).

---

**Définition/Proposition 15.34 (Groupe linéaire)**

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

L'ensemble des matrices carrées de taille  $n$  qui sont inversibles est appelé le groupe linéaire d'ordre  $n$  et est noté  $\text{GL}_n(\mathbb{K})$ .

On a donc :

$$\text{GL}_n(\mathbb{K}) = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mid \exists B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \quad AB = BA = I_n\}.$$

Le groupe linéaire est un groupe pour le produit matriciel.

Son élément neutre est la matrice identité  $I_n$ .

Le produit de deux matrices inversibles est une matrice inversible et on a :

$$\forall P, Q \in \text{GL}_n(\mathbb{K}), \quad (PQ)^{-1} = Q^{-1}P^{-1}.$$

---

*Démonstration 15.35*

On a vu que  $(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +, \times)$  est un anneau d'éléments neutres  $I_n$  pour  $\times$ .

On sait que l'ensemble de ses éléments inversibles est un groupe pour  $\times$ , d'éléments neutres  $I_n$ . ■

## 15.4 Matrices diagonales, matrices triangulaires

### Définition 15.36 (Matrice diagonale)

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

Une matrice carrée  $A = (a_{ij})_{(i,j) \in \llbracket 1;n \rrbracket^2} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  est dite diagonale si :

$$\forall i, j \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, [i \neq j \implies a_{ij} = 0],$$

c'est-à-dire si  $A$  s'écrit :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

### Notation 15.37

Soient  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ .

La matrice diagonale de taille  $n$  et de coefficients diagonaux  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  est parfois notée

$$\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

### Proposition 15.38

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

L'ensemble des matrices diagonales de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  est :

- un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension  $n$  (sous-espace vectoriel de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ );
- un anneau commutatif (sous-anneau de  $(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +, \times)$ ).

### Démonstration 15.39

Notons  $F$  l'ensemble des matrices diagonales de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

On remarque  $F = \text{Vect}(E_{11}, E_{22}, \dots, E_{nn})$  donc  $F$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

De plus,  $(E_{11}, E_{22}, \dots, E_{nn})$  est génératrice de  $F$  et libre (sous-famille de famille libre (base canonique de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ )) donc c'est une base de  $F$  et on a  $\dim F = n$ .

Montrons que  $F$  est un sous-anneau de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

On a  $I_n \in F$ , on sait que  $F$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  et on a :

$$\begin{aligned} \forall \lambda_1, \dots, \lambda_n, \mu_1, \dots, \mu_n \in \mathbb{K}, \quad \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \text{diag}(\mu_1, \dots, \mu_n) &= (\lambda_1 E_{11} + \dots + \lambda_n E_{nn})(\mu_1 E_{11} + \dots + \mu_n E_{nn}) \\ &= \lambda_1 \mu_1 E_{11} + \dots + \lambda_n \mu_n E_{nn} \\ &= \text{diag}(\lambda_1 \mu_1, \dots, \lambda_n \mu_n) \end{aligned}$$

Donc  $F$  est stable par produit et deux matrices diagonales commutent toujours.

Donc  $F$  est un sous-anneau de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ . ■

---

**Définition 15.40 (Matrice triangulaire)**

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

Une matrice carrée  $A = (a_{ij})_{(i,j) \in \llbracket 1;n \rrbracket^2} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  est dite triangulaire supérieure si :

$$\forall i, j \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, \quad [i > j \implies a_{ij} = 0],$$

c'est-à-dire si  $A$  s'écrit :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & \dots & a_{1n} \\ 0 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

La matrice  $A$  est dite triangulaire inférieure si :

$$\forall i, j \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, \quad [i < j \implies a_{ij} = 0],$$

c'est-à-dire si  $A$  s'écrit :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & 0 \\ a_{n1} & \dots & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Cela revient à dire que sa transposée  ${}^tA$  est triangulaire supérieure.

On appelle matrice triangulaire toute matrice triangulaire supérieure ou triangulaire inférieure.

---

**Proposition 15.41**

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

L'ensemble des matrices triangulaires supérieures de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  est :

- un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension  $\frac{n(n+1)}{2}$  (sous-espace vectoriel de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ );
- un sous-anneau de  $(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +, \times)$ .

Même chose pour l'ensemble des matrices triangulaires inférieures.

---

**Démonstration 15.42**

Notons  $F$  l'ensemble des matrices triangulaires supérieures.

On pose  $I = \left\{ (i, j) \in \llbracket 1 ; n \rrbracket^2 \mid i \leq j \right\}$ .

Alors  $F = \text{Vect} \left( (E_{ij})_{(i,j) \in I} \right)$ .

Donc  $F$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

De plus,  $(E_{ij})_{(i,j) \in I}$  est une famille génératrice de  $F$  et libre (car c'est une sous-famille de la base canonique de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ) donc c'est une base de  $F$  et  $\dim F = \text{Card } I = \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$ .

Montrons que  $F$  est un sous-anneau de  $(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +, \times)$ .

On a  $I_n \in F$  et  $\forall A, B \in F, A - B \in F$ .

Soient  $A = (a_{ij})_{(i,j) \in I}, B = (b_{jk})_{(j,k) \in I} \in F$ .

Posons  $C = (c_{ik})_{(i,k) \in I} = AB$ .

Montrons que  $C \in F$ , c'est-à-dire

$$\forall (i, k) \in \llbracket 1 ; n \rrbracket^2, [i > k \implies c_{ik} = 0].$$

Soit  $(i, k) \in \llbracket 1 ; n \rrbracket^2$  tel que  $i > k$ .

On a

$$\begin{aligned} c_{ik} &= \sum_{j=1}^n \underbrace{a_{ij}}_{=0 \text{ si } i > j} \underbrace{b_{jk}}_{=0 \text{ si } j > k} \\ &= \sum_{j=1}^{i-1} \underbrace{a_{ij}}_{=0 \text{ car } j < i} b_{jk} + \sum_{j=i}^n a_{ij} \underbrace{b_{jk}}_{=0 \text{ car } j \geq i > k} \end{aligned}$$

Donc  $F$  est un sous-anneau de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ . ■

## 15.5 Transposition

### Définition 15.43 (Transposée d'une matrice)

Soient  $n, p \in \mathbb{N}^*$  et  $A = (a_{ij})_{(i,j) \in \llbracket 1;n \rrbracket \times \llbracket 1;p \rrbracket} \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$  une matrice de taille  $(n, p)$ .

On appelle transposée de  $A$  et on note  ${}^tA$  ou  $A^T$  la matrice de taille  $(p, n)$  suivante :

$${}^tA = (a_{ij})_{(j,i) \in \llbracket 1;p \rrbracket \times \llbracket 1;n \rrbracket} \in \mathcal{M}_{pn}(\mathbb{K}).$$

On a donc :

$${}^t \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1p} \\ a_{21} & & & \vdots \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & \dots & a_{np} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{n1} \\ a_{12} & & & \vdots \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{1p} & \dots & \dots & a_{np} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{pn}(\mathbb{K}).$$

---

Exemple 15.44

On a :

$${}^t \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}.$$

---

**Proposition 15.45 (Linéarité de la transposition)**

Soient  $n, p \in \mathbb{N}^*$ .

L'application

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K}) & \longrightarrow & \mathcal{M}_{pn}(\mathbb{K}) \\ A & \longmapsto & {}^t A \end{array}$$

est linéaire.

---

Démonstration 15.46

★★ Exercice ★★

■

---

**Proposition 15.47 (Transposée d'un produit)**

Soient  $m, n, p \in \mathbb{N}^*$ .

On a :

$$\forall A \in \mathcal{M}_{mn}(\mathbb{K}), \forall B \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K}), {}^t(AB) = {}^t B {}^t A \in \mathcal{M}_{pm}(\mathbb{K}).$$

---

Démonstration 15.48

On a  $AB \in \mathcal{M}_{mp}(\mathbb{K})$  donc  ${}^t(AB) \in \mathcal{M}_{pm}(\mathbb{K})$  et  $\begin{cases} {}^t B \in \mathcal{M}_{pn}(\mathbb{K}) \\ {}^t A \in \mathcal{M}_{nm}(\mathbb{K}) \end{cases}$  donc  ${}^t B {}^t A \in \mathcal{M}_{pm}(\mathbb{K})$ .

On pose  $C = AB$ ;  $D = {}^t C$  et  $F = {}^t B {}^t A$ .

On a :

$$\forall i \in \llbracket 1 ; m \rrbracket, \forall k \in \llbracket 1 ; p \rrbracket, \begin{cases} c_{ik} = \sum_{j=1}^n a_{ij} b_{jk} \\ d_{ki} = c_{ik} = \sum_{j=1}^n a_{ij} b_{jk} \\ f_{ki} = \sum_{j=1}^n b_{jk} a_{ij} = d_{ki} \end{cases}$$

D'où l'égalité.

■

---

**Corollaire 15.49**

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

On a :

$$\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \forall k \in \mathbb{N}, {}^t(A^k) = ({}^tA)^k.$$

On écrit donc simplement «  ${}^tA^k$  ».

---

**Proposition 15.50 (Transposition et inversibilité)**

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

On a :

$$\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K}) \iff {}^tA \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K}).$$

Les matrices  ${}^t(A^{-1})$  et  $({}^tA)^{-1}$  sont donc égales et notées  ${}^tA^{-1}$ .

---

*Démonstration 15.51*

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

$\Rightarrow$

Supposons  $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ .

$$\text{On a } \begin{cases} AA^{-1} = I_n \\ A^{-1}A = I_n \end{cases} \text{ donc } \begin{cases} {}^t(A^{-1}){}^tA = {}^tI_n \\ {}^tA {}^t(A^{-1}) = {}^tI_n \end{cases}$$

Or  ${}^tI_n = I_n$  donc  ${}^tA$  est inversible, d'inverse  $({}^tA)^{-1} = {}^t(A^{-1})$ .

$\Leftarrow$

Supposons  ${}^tA \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ .

Alors  ${}^t({}^tA) \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$  selon  $\Rightarrow$

Donc  $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ . ■

## 15.6 Matrices symétriques, matrices antisymétriques

---

**Définition 15.52**

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

Une matrice  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  est dite  $\begin{cases} \text{symétrique} & \text{si } {}^t A = A \\ \text{antisymétrique} & \text{si } {}^t A = -A \end{cases}$

---

**Proposition 15.53**

On suppose ici que  $\mathbb{K}$  est un sous-corps de  $\mathbb{C}$ .

On note  $\mathcal{S}_n(\mathbb{K})$  (respectivement  $\mathcal{A}_n(\mathbb{K})$ ) l'ensemble des matrices symétriques (respectivement antisymétriques) de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

Alors  $\mathcal{S}_n(\mathbb{K})$  et  $\mathcal{A}_n(\mathbb{K})$  sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  :

$$\mathcal{M}_n(\mathbb{K}) = \mathcal{S}_n(\mathbb{K}) \oplus \mathcal{A}_n(\mathbb{K}).$$

On a :

$$\dim \mathcal{S}_n(\mathbb{K}) = \frac{n(n+1)}{2} \quad \text{et} \quad \dim \mathcal{A}_n(\mathbb{K}) = \frac{n(n-1)}{2}.$$

---

*Démonstration 15.54*

Posons  $I = \left\{ (i, j) \in \llbracket 1 ; n \rrbracket^2 \mid i < j \right\}$ .

On a  $\mathcal{A}_n(\mathbb{K}) = \text{Vect} \left( (E_{ij} - E_{ji})_{(i,j) \in I} \right)$  donc  $\mathcal{A}_n(\mathbb{K})$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  de dimension

$$\dim \mathcal{A}_n(\mathbb{K}) = \text{Card } I$$

$$\begin{aligned} &= \sum_{k=1}^{n-1} k \\ &= \frac{n(n-1)}{2}. \end{aligned}$$

Notons  $\mathcal{B}$  la famille obtenue en juxtaposant les familles  $(E_{ii})_{i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket}$  et  $(E_{ij} + E_{ji})_{(i,j) \in I}$ .

$\mathcal{B}$  est clairement libre et on a  $\mathcal{S}_n(\mathbb{K}) = \text{Vect}(\mathcal{B})$ .

Donc  $\mathcal{S}_n(\mathbb{K})$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  de dimension

$$\dim \mathcal{S}_n(\mathbb{K}) = n + \text{Card } I$$

$$\begin{aligned} &= n + \sum_{k=1}^{n-1} k \\ &= \frac{n(n+1)}{2}. \end{aligned}$$

Montrons que  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K}) = \mathcal{S}_n(\mathbb{K}) \oplus \mathcal{A}_n(\mathbb{K})$ .



On note  $u$  la transposition :  $u : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \longrightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  .  
 $M \longmapsto {}^t M$

On a  $\begin{cases} u \in \mathcal{L}(\mathcal{M}_n(\mathbb{K})) \\ u^2 = \text{id}_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})} \end{cases}$  donc  $u$  est une symétrie de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

Donc

$$\mathcal{M}_n(\mathbb{K}) = \underbrace{\ker(u - \text{id}_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})})}_{=\mathcal{S}_n(\mathbb{K})} \oplus \underbrace{\ker(u + \text{id}_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})})}_{=\mathcal{A}_n(\mathbb{K})} .$$

■

## 15.7 Lignes et colonnes d'une matrice

### 15.7.1 Abus autorisés

#### Abus 15.55 (Matrice-colonne = vecteur)

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

L'application

$$\begin{aligned} \mathbb{K}^n &\longrightarrow \mathcal{M}_{n1}(\mathbb{K}) \\ (a_1, \dots, a_n) &\longmapsto \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

est un isomorphisme d'espaces vectoriels.

On s'autorise (abusivement) à identifier les espaces vectoriels  $\mathbb{K}^n$  et  $\mathcal{M}_{n1}(\mathbb{K})$  :

$$\mathbb{K}^n = \mathcal{M}_{n1}(\mathbb{K}) .$$

On identifie donc les  $n$ -uplets de scalaires et les matrices-colonne :

$$\forall a_1, \dots, a_n, \quad (a_1, \dots, a_n) = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} .$$

En particulier, si  $n = 1$ , on identifie matrice de taille  $(1, 1)$  et scalaire :

$$\mathbb{K} = \mathcal{M}_1(\mathbb{K}) \quad \text{et} \quad \forall \lambda \in \mathbb{K}, \quad \lambda = (\lambda) .$$

---

**Définition 15.56**

Soient  $n, p \in \mathbb{N}^*$  et  $A = (a_{ij})_{(i,j)} \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$ .

On appelle famille des vecteurs-colonne de  $A$  la famille  $(C_1, \dots, C_p) \in (\mathbb{K}^n)^p$  définie par :

$$\forall j \in \llbracket 1 ; p \rrbracket, \quad C_j = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^n.$$

On s'autorise à noter la matrice  $A$  « par colonnes » :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1p} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{np} \end{pmatrix} = (C_1 \quad \dots \quad C_p).$$

---

*Rappel 15.57*

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

Les formes linéaires sur  $\mathbb{K}^n$  sont les fonctions de la forme

$$\begin{aligned} \ell_{b_1, \dots, b_n} : \quad \mathbb{K}^n &\longrightarrow \mathbb{K} \\ (a_1, \dots, a_n) &\longmapsto b_1 a_1 + \dots + b_n a_n \end{aligned}$$

où  $b_1, \dots, b_n \in \mathbb{K}$ .

De plus, la fonction

$$\begin{aligned} \mathbb{K}^n &\longrightarrow (\mathbb{K}^n)^* \\ (b_1, \dots, b_n) &\longmapsto \ell_{b_1, \dots, b_n} \end{aligned}$$

est un isomorphisme.

---

**Abus 15.58 (Matrice-ligne = forme linéaire)**

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

L'application

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_{1n}(\mathbb{K}) &\longrightarrow (\mathbb{K}^n)^* \\ L &\longmapsto [C \longmapsto LC] \end{aligned}$$

c'est-à-dire

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_{1n}(\mathbb{K}) &\longrightarrow \mathcal{L}(\mathbb{K}^n, \mathbb{K}) \\ (b_1 \quad \dots \quad b_n) &\longmapsto \left[ \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \longmapsto (b_1 \quad \dots \quad b_n) \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = b_1 a_1 + \dots + b_n a_n \right] \end{aligned}$$

est un isomorphisme d'espaces vectoriels.

On s'autorise (abusivement) à identifier les espaces vectoriels  $(\mathbb{K}^n)^*$  et  $\mathcal{M}_{1n}(\mathbb{K})$  :

$$(\mathbb{K}^n)^* = \mathcal{M}_{1n}(\mathbb{K}).$$

On identifie donc les formes linéaires sur  $\mathbb{K}^n$  et les matrices-ligne :

$$\forall b_1, \dots, b_n \in \mathbb{K}, \quad \ell_{b_1, \dots, b_n} = (b_1 \quad \dots \quad b_n).$$

---

**Définition 15.59**

Soient  $n, p \in \mathbb{N}^*$  et  $A = (a_{ij})_{(i,j)} \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$ .

On appelle famille des lignes de  $A$  la famille  $(L_1, \dots, L_n) \in \mathcal{M}_{1p}(\mathbb{K})^n$  définie par :

$$\forall i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, \quad L_i = (a_{i1} \quad \dots \quad a_{ip}) \in \mathcal{M}_{1p}(\mathbb{K}).$$

On s'autorise à noter la matrice  $A$  « par lignes » :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1p} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{np} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L_n \end{pmatrix}.$$

## 15.7.2 Produits matriciels

---

*Remarque 15.60 (Produit avec une matrice-colonne ou une matrice-ligne)*

Soient  $n, p \in \mathbb{N}^*$  et  $M = (m_{ij})_{(i,j)} \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$ .

On note  $(L_1, \dots, L_n) \in \mathcal{M}_{1p}(\mathbb{K})^n$  la famille des lignes de  $M$  et  $(C_1, \dots, C_p) \in (\mathbb{K}^n)^p$  la famille des colonnes de  $M$ .

On peut donc écrire :

$$M = \begin{pmatrix} m_{11} & \dots & m_{1p} \\ \vdots & & \vdots \\ m_{n1} & \dots & m_{np} \end{pmatrix} = (C_1 \quad \dots \quad C_p) = \begin{pmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L_n \end{pmatrix}.$$

Soient enfin une matrice-ligne  $L = (b_1 \quad \dots \quad b_n)$  et une matrice-colonne  $C = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_p \end{pmatrix}$ .

Alors on a :

$$LM = (b_1 \quad \dots \quad b_n) \begin{pmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L_n \end{pmatrix} = b_1 L_1 + \dots + b_n L_n$$

et :

$$MC = (C_1 \quad \dots \quad C_p) \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = a_1 C_1 + \dots + a_p C_p.$$

---

*Exemple 15.61*

On a :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

---

**Corollaire 15.62**

Soient  $n, p \in \mathbb{N}^*$  et  $M = (m_{ij})_{(i,j)} \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$ .

On note  $(L_1, \dots, L_n) \in \mathcal{M}_{1p}(\mathbb{K})^n$  la famille des lignes de  $M$  et  $(C_1, \dots, C_p) \in (\mathbb{K}^n)^p$  la famille des colonnes de  $M$  :

$$M = \begin{pmatrix} m_{11} & \dots & m_{1p} \\ \vdots & & \vdots \\ m_{n1} & \dots & m_{np} \end{pmatrix} = (C_1 \quad \dots \quad C_p) = \begin{pmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L_n \end{pmatrix}.$$

De plus, on note  $(e_1, \dots, e_p)$  la base canonique de  $\mathbb{K}^p$  et  $(e'_1, \dots, e'_n)$  la base canonique de  $\mathbb{K}^n$ .

Alors on a :

$$\forall j \in \llbracket 1 ; p \rrbracket, \quad M \times e_j = C_j$$

et :

$$\forall i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, \quad {}^t e'_i \times M = L_i.$$

---

**Remarque 15.63**

Soient  $m, n, p \in \mathbb{N}^*$ ,  $B = (b_{ij})_{(i,j)} \in \mathcal{M}_{mn}(\mathbb{K})$  et  $A = (a_{jk})_{(j,k)} \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$ .

On note  $(L_1, \dots, L_m) \in \mathcal{M}_{1n}(\mathbb{K})^m$  la famille des lignes de  $B$  et  $(C_1, \dots, C_p) \in (\mathbb{K}^n)^p$  la famille des colonnes de  $A$  :

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & \dots & b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{m1} & \dots & b_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L_m \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1p} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{np} \end{pmatrix} = (C_1 \quad \dots \quad C_p).$$

Alors on a, par définition du produit matriciel :

$$BA = (L_i C_k)_{(i,k)} \in \mathcal{M}_{mp}(\mathbb{K}).$$

On a aussi :

$$BA = \begin{pmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L_m \end{pmatrix} A = \begin{pmatrix} L_1 A \\ \vdots \\ L_m A \end{pmatrix}$$

et :

$$BA = B (C_1 \quad \dots \quad C_p) = (BC_1 \quad \dots \quad BC_p).$$

Ainsi, calculer le produit matriciel  $BA$  revient à multiplier chaque ligne de  $B$  par  $A$  (à droite) ou chaque colonne de  $A$  par  $B$  (à gauche).

---

*Exemple 15.64*

En utilisant la Remarque 15.60 et la Remarque 15.63, on calcule les produits matriciels suivants :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 2b & 3c \\ 4a & 5b & 6c \\ 7a & 8b & 9c \end{pmatrix}$$

et

$$\begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 2a & 3a \\ 4b & 5b & 6b \\ 7c & 8c & 9c \end{pmatrix}.$$

### 15.7.3 Opérations élémentaires sur les matrices

---

**Définition 15.65 (Opérations élémentaires sur une matrice)**

On appelle opérations élémentaires sur une matrice les opérations suivantes :

- Opérations élémentaires sur les lignes :

$$L_i \leftrightarrow L_j \quad \text{échange des lignes } L_i \text{ et } L_j$$

$$L_i \leftarrow \lambda L_i \quad \text{multiplication de la ligne } L_i \text{ par } \lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$$

$$L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j \quad \text{ajout à } L_i \text{ de } \lambda L_j \text{ où } \lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$$

- Opérations élémentaires sur les colonnes :

$$C_i \leftrightarrow C_j \quad \text{échange des colonnes } C_i \text{ et } C_j$$

$$C_i \leftarrow \lambda C_i \quad \text{multiplication de la colonne } C_i \text{ par } \lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$$

$$C_i \leftarrow C_i + \lambda C_j \quad \text{ajout à } C_i \text{ de } \lambda C_j \text{ où } \lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$$

---

**Exercice/Exemple 15.66**

Soit  $M \in \mathcal{M}_{32}(\mathbb{K})$ .

Donner les produits matriciels ayant même effet que les opérations élémentaires suivantes :

$$L_1 \leftrightarrow L_3 \quad L_2 \leftarrow \lambda L_2 \quad L_1 \leftarrow L_1 + \lambda L_3 \quad C_1 \leftrightarrow C_2 \quad C_2 \leftarrow \lambda C_2 \quad C_2 \leftarrow C_2 + \lambda C_1.$$

$$L_1 \leftrightarrow L_3 : \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} M.$$

$$L_2 \leftarrow \lambda L_2 : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} M.$$

$$L_1 \leftarrow L_1 + \lambda L_3 : \begin{pmatrix} 1 & 0 & \lambda \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} M.$$

$$C_1 \leftrightarrow C_2 : M \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$C_2 \leftarrow \lambda C_2 : M \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

$$C_2 \leftarrow C_2 + \lambda C_1 : M \begin{pmatrix} 1 & \lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

---

### Bilan 15.68

Appliquer une opération élémentaire aux lignes d'une matrice  $M$  revient à multiplier  $M$  à gauche par une matrice  $G$  qui ne dépend que de l'opération élémentaire et du nombre de lignes de  $M$ .

Appliquer une opération élémentaire aux colonnes d'une matrice  $M$  revient à multiplier  $M$  à droite par une matrice  $D$  qui ne dépend que de l'opération élémentaire et du nombre de colonnes de  $M$ .

Les matrices  $G$  et  $D$  sont faciles à déterminer : il suffit de prendre comme matrice  $M$  une matrice identité.

## 15.8 Rang d'une matrice

---

### Définition 15.69

Soient  $n, p \in \mathbb{N}^*$ .

Le rang d'une matrice  $A \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$  est le rang de la famille de ses vecteurs-colonne (famille de  $p$  vecteurs de  $\mathbb{K}^n$ ).

---

*Remarque 15.70*

Soient  $n, p \in \mathbb{N}^*$  et  $A \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$ .

On note  $(C_1, \dots, C_p)$  la famille des vecteurs-colonne de  $A$ .

On a :

$$0 \leq \operatorname{rg} A \leq \min \{n ; p\}.$$

Cas d'égalité :

$$(1) \operatorname{rg} A = 0 \iff A = 0_{np};$$

$$(2) \operatorname{rg} A = n \iff (C_1, \dots, C_p) \text{ est génératrice de } \mathbb{K}^n;$$

$$(3) \operatorname{rg} A = p \iff (C_1, \dots, C_p) \text{ est libre.}$$

---

*Démonstration 15.71 (1)*

On a :

$$\begin{aligned} A = 0 &\iff \forall j \in \llbracket 1 ; p \rrbracket, C_j = 0 \\ &\iff \operatorname{rg} (C_1, \dots, C_p) = 0. \end{aligned}$$

■

---

*Démonstration 15.72 (2)*

On a :

$$\begin{aligned} \operatorname{rg} A = n &\iff \operatorname{rg} (C_1, \dots, C_p) = n \\ &\iff \dim \operatorname{Vect} (C_1, \dots, C_p) = n \\ &\iff \operatorname{Vect} (C_1, \dots, C_p) = \mathbb{K}^n \\ &\iff (C_1, \dots, C_p) \text{ est génératrice de } \mathbb{K}^n. \end{aligned}$$

■

---

*Démonstration 15.73 (3)*

On a :

$$\begin{aligned} \operatorname{rg} A = p &\iff \operatorname{rg} (C_1, \dots, C_p) = p \\ &\iff (C_1, \dots, C_p) \text{ est libre.} \end{aligned}$$

■

## 15.9 Application linéaire canoniquement associée à une matrice

### 15.9.1 Définition

---

**Définition 15.74 (Application linéaire canoniquement associée à une matrice)**

Soient  $n, p \in \mathbb{N}^*$  et  $A \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$ .

On appelle application linéaire canoniquement associée à  $A$  le « produit à gauche par  $A$  » :

$$\begin{aligned} u_A : \mathbb{K}^p &\longrightarrow \mathbb{K}^n \\ X &\longmapsto AX \end{aligned}$$

C'est l'unique application linéaire  $u_A \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^n)$  telle que :

$$\forall i \in \llbracket 1 ; p \rrbracket, \quad u_A(e_i) = C_i$$

en notant  $e_1, \dots, e_p$  les vecteurs de la base canonique de  $\mathbb{K}^p$  et  $(C_1, \dots, C_p)$  la famille des vecteurs-colonne de  $A$ .

---

**Définition 15.75 (Endomorphisme canoniquement associé à une matrice)**

Soient  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

On appelle endomorphisme de  $\mathbb{K}^n$  canoniquement associé à  $A$  le « produit à gauche par  $A$  » :

$$\begin{aligned} u_A : \mathbb{K}^n &\longrightarrow \mathbb{K}^n \\ X &\longmapsto AX \end{aligned}$$

C'est l'unique endomorphisme  $u_A \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n)$  tel que :

$$\forall i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, \quad u_A(e_i) = C_i$$

en notant  $e_1, \dots, e_n$  les vecteurs de la base canonique de  $\mathbb{K}^n$  et  $(C_1, \dots, C_n)$  la famille des vecteurs-colonne de  $A$ .

---

**Exercice/Exemple 15.76**

Que dire des endomorphismes canoniquement associés aux matrices suivantes (savoir lire ces matrices colonne par colonne et ligne par ligne) :

$$M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad M_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$



On a :

$$\forall \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3, \quad u_{M_1} \left( \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ 0 \end{pmatrix}$$

et

$$\begin{cases} u_{M_1} \left( \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ u_{M_1} \left( \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ u_{M_1} \left( \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \end{cases}$$

On reconnaît le projecteur sur  $\text{Vect} \left( \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$  parallèlement à  $\text{Vect} \left( \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ .

De même, on a :

$$\forall \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2, \quad u_{M_2} \left( \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}$$

et

$$\begin{cases} u_{M_2} \left( \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ u_{M_2} \left( \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} \end{cases}$$

---

*Remarque 15.78*

Soient  $n, p \in \mathbb{N}^*$  et  $A \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$ .

On note  $u_A \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^n)$  l'application linéaire canoniquement associée à  $A$ ,  $(L_1, \dots, L_n) \in \mathcal{M}_{1p}(\mathbb{K})^n$  la famille des lignes de  $A$  et  $(C_1, \dots, C_p) \in (\mathbb{K}^n)^p$  la famille des colonnes de  $A$  :

$$A = (C_1 \quad \dots \quad C_p) = \begin{pmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L_n \end{pmatrix}.$$

Alors :

- (1) L'ensemble image de  $u_A$  est le sous-espace vectoriel engendré par les colonnes de  $A$ , vues comme des vecteurs de  $\mathbb{K}^n$  :

$$\text{Im } u_A = \text{Vect} (C_1, \dots, C_p).$$

- (2) Le noyau de  $u_A$  est l'intersection des noyaux des lignes de  $A$ , vues comme des formes linéaires :

$$\ker u_A = \{X \in \mathbb{K}^p \mid L_1 X = \dots = L_n X = 0_{n1}\}.$$

(3) On a :

$$\begin{aligned} u_A \text{ est injective} &\iff (C_1, \dots, C_p) \text{ est libre} \\ &\iff \operatorname{rg} A = p. \end{aligned}$$

(4) On a :

$$\begin{aligned} u_A \text{ est surjective} &\iff (C_1, \dots, C_p) \text{ est génératrice de } \mathbb{K}^n \\ &\iff \operatorname{rg} A = n. \end{aligned}$$

(5) On a :

$$\begin{aligned} u_A \text{ est bijective} &\iff \begin{cases} n = p \\ (C_1, \dots, C_p) \text{ est une base de } \mathbb{K}^n \end{cases} \\ &\iff \operatorname{rg} A = n = p. \end{aligned}$$

(6) On a :

$$\operatorname{rg} A = \operatorname{rg} u_A.$$

---

*Démonstration 15.79 (1)*

$\operatorname{Im} u_A$  est l'ensemble des vecteurs de  $\mathbb{K}^n$  de la forme  $u_A \left( \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} \right) = A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} = x_1 C_1 + \dots + x_p C_p$  où  $x_1, \dots, x_p \in \mathbb{K}$ .

D'où  $\operatorname{Im} u_A = \operatorname{Vect}(C_1, \dots, C_p)$ . ■

---

*Démonstration 15.80 (2)*

Soit  $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^p$ .

On a :

$$\begin{aligned} X \in \ker u_A &\iff u_A(X) = 0_{\mathbb{K}^n} \\ &\iff AX = 0_{n1} \\ &\iff \forall i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, L_i X = 0. \end{aligned}$$
■

---

*Démonstration 15.81*

On a :

$$\begin{aligned} u_A \text{ est injective} &\iff \ker u_A = \{0\} \\ &\iff [\forall X \in \mathbb{K}^p, AX = 0 \iff X = 0] \\ &\iff [\forall x_1, \dots, x_p \in \mathbb{K}, x_1 C_1 + \dots + x_p C_p = 0 \implies x_1 = \dots = x_p = 0] \\ &\iff (C_1, \dots, C_p) \text{ est libre.} \end{aligned}$$
■

---

Démonstration 15.82 (4)

On a :

$$\begin{aligned} u_A \text{ est surjective} &\iff \text{Im } u_A = \mathbb{K}^n \\ &\iff \text{Vect } (C_1, \dots, C_p) = \mathbb{K}^n \\ &\iff (C_1, \dots, C_p) \text{ est génératrice de } \mathbb{K}^n. \end{aligned}$$

■

---

Démonstration 15.83 (5)

Découle de (3) et (4).

■

---

Démonstration 15.84 (6)

On a :

$$\begin{aligned} \text{rg } u_A &= \dim \text{Im } u_A \\ &= \dim \text{Vect } (C_1, \dots, C_p) \\ &= \text{rg } (C_1, \dots, C_p) \\ &= \text{rg } A. \end{aligned}$$

■

## 15.9.2 Propriétés

Dans ce paragraphe, on note  $u_A \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^n)$  l'application linéaire canoniquement associée à la matrice  $A \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$ .

---

### Proposition 15.85 (Matrices quelconques)

Soient  $n, p \in \mathbb{N}^*$ .

L'application

$$\begin{array}{ccc} \varphi : \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K}) & \longrightarrow & \mathcal{L}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^n) \\ A & \longmapsto & u_A \end{array}$$

est un isomorphisme d'espaces vectoriels.

---

Démonstration 15.86

Montrons que  $\varphi$  est linéaire.

Soient  $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$  et  $A, B \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$ .

Montrons que  $u_{\lambda A + \mu B} = \lambda u_A + \mu u_B$ .

On a :

$$\begin{aligned} \forall X \in \mathbb{K}^p, \quad u_{\lambda A + \mu B}(X) &= (\lambda A + \mu B)X \\ &= \lambda AX + \mu BX \\ &= \lambda u_A(X) + \mu u_B(X). \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} \forall X \in \mathbb{K}^p, \quad u_{\lambda A + \mu B}(X) &= (\lambda A + \mu B)X \\ &= \lambda AX + \mu BX \\ &= \lambda u_A(X) + \mu u_B(X). \end{aligned}} \right\} \begin{array}{l} \text{par bilinéarité du} \\ \text{produit matriciel} \end{array}$$

Donc  $\varphi$  est linéaire.

Montrons que  $\varphi$  est injective.

Soit  $A \in \ker \varphi$ .

On a  $\varphi(A) = u_A = 0$ .

Donc les colonnes  $C_1, \dots, C_p$  de  $A$  sont nulles car  $\forall j \in \llbracket 1 ; p \rrbracket$ ,  $C_j = u_A(e_j)$  en notant  $(e_1, \dots, e_p)$  la base canonique de  $\mathbb{K}^p$ .

Donc  $A = 0$ .

Donc  $\ker \varphi = \{0_{np}\}$ .

Donc  $\varphi$  est injective.

Finalement, on a  $\dim \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K}) = \dim \mathcal{L}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^n) = np < +\infty$ .

Donc  $\varphi$  est un isomorphisme d'espaces vectoriels. ■

---

### Proposition 15.87

Soient  $m, n, p \in \mathbb{N}^*$ ,  $A \in \mathcal{M}_{mn}(\mathbb{K})$  et  $B \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$ .

On a :

$$u_{AB} = u_A \circ u_B.$$

---

*Démonstration 15.88*

On a  $u_A \circ u_B, u_{AB} \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^m)$  et

$$\begin{aligned} \forall X \in \mathbb{K}^p, \quad u_A \circ u_B(X) &= u_A(u_B(X)) \\ &= A(BX) \\ &= (AB)X \\ &= u_{AB}(X). \end{aligned}$$

■

---

### Proposition 15.89 (Matrices carrées)

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

*L'application*

$$\begin{array}{ccc} \varphi : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) & \longrightarrow & \mathcal{L}(\mathbb{K}^n) \\ A & \longmapsto & u_A \end{array}$$

est un isomorphisme d'anneaux de  $(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +, \times)$  vers  $(\mathcal{L}(\mathbb{K}^n), +, \circ)$

---

*Démonstration 15.90*

Montrons que  $\varphi$  est un morphisme d'anneaux.

On a  $\varphi(I_n) = \text{id}_{\mathbb{K}^n}$ . En effet :  $\forall X \in \mathbb{K}^n, u_{I_n}(X) = I_n X = X$ .

De plus, selon la Proposition 15.85, on a :

$$\forall A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \quad \begin{cases} \varphi(A+B) = \varphi(A) + \varphi(B) \\ \varphi(AB) = \varphi(A) \circ \varphi(B) \end{cases}$$

Donc  $\varphi$  est un morphisme d'anneaux.

De plus, d'après la même proposition,  $\varphi$  est une bijection.

Donc  $\varphi$  est un isomorphisme d'anneaux. ■

---

**Proposition 15.91**

Soient  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

La matrice  $A$  est inversible dans l'anneau  $(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +, \times)$  si, et seulement si, l'endomorphisme  $u_A$  est inversible dans l'anneau  $(\mathcal{L}(\mathbb{K}^n), +, \circ)$  :

$$A \in \text{GL}_n(\mathbb{K}) \iff u_A \in \text{GL}(\mathbb{K}^n).$$

---

*Démonstration 15.92*

Cela découle de la proposition précédente car un isomorphisme d'anneaux conserve les éléments inversibles. ■

---

**Proposition 15.93**

Soient  $n, p \in \mathbb{N}^*$  et  $A \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$ .

On ne change pas le rang de  $A$  en la multipliant à gauche ou à droite par une matrice inversible :

$$\forall P \in \text{GL}_n(\mathbb{K}), \forall Q \in \text{GL}_p(\mathbb{K}), \quad \text{rg } PAQ = \text{rg } A.$$

---

*Démonstration 15.94*

On sait qu'on ne change pas le rang d'une application linéaire quand on la compose à gauche ou à droite par un isomorphisme.

Donc si  $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$  et  $Q \in \text{GL}_p(\mathbb{K})$  alors

$$\text{rg } u_P \circ u_A \circ u_Q = \text{rg } u_A$$

car  $u_P$  et  $u_Q$  sont des isomorphismes selon la proposition précédente.

Donc selon la Proposition 15.87 :  $\text{rg } u_{PAQ} = \text{rg } u_A$ .

Donc selon la Remarque 15.78 :

$$\text{rg } PAQ = \text{rg } A. \quad \text{■}$$

### 15.9.3 Conséquences sur l'inversibilité des matrices

---

#### Bilan 15.95

Soient  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

On note  $u_A \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n)$  l'endomorphisme canoniquement associé à  $A$ ,  $(C_1, \dots, C_n)$  la famille des vecteurs-colonne de  $A$  et  $(L_1, \dots, L_n)$  la famille des lignes de  $A$ .

Les propositions suivantes sont équivalentes :

(1)  $A$  est une matrice inversible

(2)  $A$  est « inversible à droite » dans l'anneau  $(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +, \times)$  :

$$\exists B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \quad AB = I_n$$

(3)  $A$  est « inversible à gauche » dans l'anneau  $(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +, \times)$  :

$$\exists B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \quad BA = I_n$$

(4)  $u_A : \mathbb{K}^n \longrightarrow \mathbb{K}^n$  est un automorphisme de  $\mathbb{K}^n$

(5)  $u_A : \mathbb{K}^n \longrightarrow \mathbb{K}^n$  est une injection

(6)  $u_A : \mathbb{K}^n \longrightarrow \mathbb{K}^n$  est une surjection

(7)  $\text{rg } u_A = n$

(8)  $\text{rg } A = n$

(9)  $(C_1, \dots, C_n)$  est une famille génératrice de  $\mathbb{K}^n$

(10)  $(C_1, \dots, C_n)$  est une famille libre

(11)  $(C_1, \dots, C_n)$  est une base de  $\mathbb{K}^n$

(12)  ${}^t A$  est une matrice inversible

(13)  $(L_1, \dots, L_n)$  est une famille génératrice de  $\mathcal{M}_{1n}(\mathbb{K})$

(14)  $(L_1, \dots, L_n)$  est une famille libre

(15)  $(L_1, \dots, L_n)$  est une base de  $\mathcal{M}_{1n}(\mathbb{K})$ .

## 15.9.4 Remarque

---

### Abus 15.96

Soient  $n, p \in \mathbb{N}^*$ .

Le programme de MP2I autorise à confondre une matrice  $A \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$  et l'application linéaire qui lui est canoniquement associée.

On peut donc écrire, par exemple : «  $\ker A$  » ou «  $\operatorname{Im} A$  ».

Nous ne ferons jamais cet abus (sauf parfois, dans le cas où  $A$  est une matrice-ligne) car il rend les choses un peu confuses.

## 15.10 Matrices équivalentes

---

### Définition 15.97

Soient  $n, p \in \mathbb{N}^*$  et  $A, B \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$ .

On dit que la matrice  $B$  est équivalente à la matrice  $A$  si on a :

$$\exists P \in \operatorname{GL}_n(\mathbb{K}), \exists Q \in \operatorname{GL}_p(\mathbb{K}), B = PAQ.$$

---

### Proposition 15.98

Soit  $n, p \in \mathbb{N}^*$ .

La relation « être équivalente à » est une relation d'équivalence sur  $\mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$ .

---

### Démonstration 15.99

Notons  $\sim$  la relation « être équivalente à » :

$$\forall A, B \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K}), B \sim A \iff [\exists P \in \operatorname{GL}_n(\mathbb{K}), \exists Q \in \operatorname{GL}_p(\mathbb{K}), B = PAQ].$$

On a  $\forall A \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K}), A = I_n A I_p$  donc  $\forall A \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K}), A \sim A$  donc  $\sim$  est réflexive.

Soient  $A, B \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$  telles que  $B \sim A$ .

Il existe  $P \in \operatorname{GL}_n(\mathbb{K})$  et  $Q \in \operatorname{GL}_p(\mathbb{K})$  telles que  $B = PAQ$ .

D'où  $P^{-1}BQ^{-1} = P^{-1}PAQQ^{-1}$  donc  $P^{-1}BQ^{-1} = A$  avec  $\begin{cases} P^{-1} \in \operatorname{GL}_n(\mathbb{K}) \\ Q^{-1} \in \operatorname{GL}_p(\mathbb{K}) \end{cases}$

D'où  $A \sim B$  donc  $\sim$  est symétrique.

Soient  $A, B, C \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$  telles que  $C \sim B$  et  $B \sim A$ .

Il existe  $P_1, P_2 \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$  et  $Q_1, Q_2 \in \text{GL}_p(\mathbb{K})$  telles que  $C = P_1 B Q_1$  et  $B = P_2 A Q_2$ .

Donc  $C = P_1 P_2 A Q_2 Q_1$  avec  $\begin{cases} P_1 P_2 \in \text{GL}_n(\mathbb{K}) \\ Q_2 Q_1 \in \text{GL}_p(\mathbb{K}) \end{cases}$

Donc  $C \sim A$  donc  $\sim$  est transitive.

Finalement,  $\sim$  est une relation d'équivalence. ■

### Exercice/Exemple 15.100

Montrer que les matrices  $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  et  $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$  sont équivalentes.

*Correction 15.101*

On remarque  $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  donc :

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_{\in \text{GL}_2(\mathbb{K})} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}}_{\in \text{GL}_2(\mathbb{K})} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

*Remarque 15.102*

Soient  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

On suppose que  $A$  et  $B$  sont équivalentes.

Alors  $A$  est inversible si, et seulement si,  $B$  est inversible.

De plus,  $\text{rg } A = \text{rg } B$ .

### Proposition 15.103

Soient  $n, p \in \mathbb{N}^*$ ,  $A \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$  et  $r \in \mathbb{N}$ .

Alors :

$$\text{rg } A = r \iff \exists P \in \text{GL}_n(\mathbb{K}), \exists Q \in \text{GL}_p(\mathbb{K}), A = P J_r Q,$$

en posant

$$J_r = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & & \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots & & \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & & \\ 0 & \dots & 0 & 1 & & \\ & & & & 0 & \\ & & & & & 0 \end{pmatrix}.$$

1
 $r$ 
 $p$



---

*Démonstration 15.104*

$\Rightarrow$  Admise provisoirement. On verra dans le chapitre suivant que cette proposition découle naturellement de la forme géométrique du théorème du rang.

$\Leftarrow$  Découle de la Proposition 15.93. ■

---

### Corollaire 15.105

Soient  $n, p \in \mathbb{N}^*$  et  $A, B \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$ .

Alors :

$$A \text{ et } B \text{ sont équivalentes} \iff \text{rg } A = \text{rg } B.$$

---

*Démonstration 15.106*

$\Rightarrow$  Claire car on ne change pas le rang d'une matrice en la multipliant à gauche et à droite par des matrices inversibles.

$\Leftarrow$

Supposons  $\text{rg } A = \text{rg } B$ .

Selon la proposition précédente,  $A$  et  $B$  sont équivalentes à  $J_r$  en posant  $r = \text{rg } A$ .

Donc  $A$  est équivalente à  $B$ . ■

## 15.11 Matrices semblables

---

### Définition 15.107

Soient  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

On dit que la matrice  $B$  est semblable à la matrice  $A$  si :

$$\exists P \in \text{GL}_n(\mathbb{K}), \quad B = PAP^{-1}.$$

---

### Proposition 15.108

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

La relation « être semblable à » est une relation d'équivalence sur  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

---

*Démonstration 15.109*

On pose la relation binaire  $\mathcal{R}$  sur  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  telle que :

$$\forall A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \quad A \mathcal{R} B \iff [\exists P \in \text{GL}_n(\mathbb{K}), \quad B = PAP^{-1}].$$

Soient  $A, B, C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

Montrons que  $\mathcal{R}$  est réflexive.

On a  $A = I_n A I_n^{-1}$  donc  $A \mathcal{R} A$ .

Montrons que  $\mathcal{R}$  est symétrique.

Supposons  $A \mathcal{R} B$ .

Il existe  $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$  telle que  $B = PAP^{-1}$ .

On a  $P^{-1}BP = P^{-1}PAP^{-1}P$  donc  $P^{-1}B(P^{-1})^{-1} = A$ .

Donc  $B \mathcal{R} A$ .

Montrons que  $\mathcal{R}$  est transitive.

Supposons  $A \mathcal{R} B$  et  $B \mathcal{R} C$ .

Il existe  $P, Q \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$  telles que 
$$\begin{cases} B = PAP^{-1} \\ C = QBQ^{-1} \end{cases}$$

Donc  $C = QPAP^{-1}Q^{-1} = QPA(QP)^{-1}$ .

Donc  $A \mathcal{R} C$ .

Donc  $\mathcal{R}$  est une relation d'équivalence sur  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ . ■

---

**Exercice/Exemple 15.110**

Montrer que les matrices  $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  et  $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  sont semblables.

---

*Correction 15.111*

L'idée est qu'on a :

$$\begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda a & \lambda b \\ c & d \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda^{-1} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a\lambda^{-1} & b \\ c\lambda^{-1} & d \end{pmatrix}.$$

On remarque :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1}.$$

---

*Remarque 15.112*

Soient  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ .

L'application

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) & \longrightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ M & \longmapsto & PMP^{-1} \end{array}$$

est un automorphisme de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  en tant qu'espace vectoriel et en tant qu'anneau (elle conserve les combinaisons linéaires et les produits).

---

*Remarque 15.113*

Soient  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  et  $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$  tels que  $B = PAP^{-1}$ .

Alors on a :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad B^k = PA^kP^{-1}.$$

De plus, si  $A$  est inversible, alors  $B$  aussi et on a :

$$\forall k \in \mathbb{Z}, \quad B^k = PA^kP^{-1}.$$

---

*Remarque 15.114*

Si deux matrices sont semblables, elles ont même rang.

On retrouve en particulier que l'une est inversible si, et seulement si, l'autre est inversible.

---

*Démonstration 15.115*

On ne change pas le rang d'une matrice en la multipliant à gauche ou à droite par une matrice inversible (cf. Proposition 15.93). ■

## 15.12 Rang d'une matrice (suite)

---

### Proposition 15.116

Soient  $n, p \in \mathbb{N}^*$  et  $A \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$ .

On note  $u_A \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^n)$  l'application linéaire canoniquement associée à  $A$ ,  $(C_1, \dots, C_p)$  la famille des vecteurs-colonne de  $A$  et  $(L_1, \dots, L_n)$  la famille des lignes de  $A$ .

Alors :

$$\text{rg } A = \text{rg } u_A = \text{rg } (C_1, \dots, C_p) = \text{rg } (L_1, \dots, L_n) = \text{rg } ({}^t A).$$

---

*Démonstration 15.117*

Il s'agit de montrer  $\text{rg } A = \text{rg } ({}^t A)$ .

Méthode 1 :

Posons  $r = \text{rg } A$ .

Selon la Proposition 15.103, il existe  $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$  et  $Q \in \text{GL}_p(\mathbb{K})$  telles que  $A = PJ_rQ$  où  $J_r \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$ .

On a  ${}^t A = {}^t Q {}^t J_r {}^t P$ .

Donc, comme  ${}^t Q$  et  ${}^t P$  sont inversibles, on a :

$$\text{rg } ({}^t A) = \text{rg } ({}^t J_r) = r.$$

Méthode 2 :

On a vu que  $u_A : \mathbb{K}^p \longrightarrow \mathbb{K}^n$  est de rang  $\text{rg } u_A = \text{rg } (\ell_1, \dots, \ell_n)$  (en notant  $\ell_i$  la  
 $x \longmapsto (\ell_1(x), \dots, \ell_n(x))$   
forme linéaire canoniquement associée à  $L_i$  pour tout  $i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$ ).

Donc

$$\text{rg } A = \text{rg } (L_1, \dots, L_n) = \text{rg } ({}^t A).$$

■

---

### **Lemme 15.118**

*On ne change pas le rang d'une matrice en appliquant des opérations élémentaires à ses lignes ou à ses colonnes.*

---

*Démonstration 15.119*

Découle de la Proposition 15.93 et du Bilan 15.68.

■

---

### **Algorithme 15.120 (Calcul du rang d'une matrice)**

Pour calculer le rang d'une matrice, il suffit d'appliquer des opérations élémentaires à ses lignes et ses colonnes jusqu'à obtenir une matrice de rang évident.

NB : on peut opérer tantôt sur les lignes, tantôt sur les colonnes, ce qui rend le calcul facile et rapide.

*Exemple 15.121*

On a :

$$\begin{aligned}
 \operatorname{rg} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & 5 \end{pmatrix} &= \operatorname{rg} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{matrix} L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \end{matrix} \\
 &= \operatorname{rg} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{matrix} C_2 \leftarrow C_2 - C_1 - C_3 \end{matrix} \\
 &= \operatorname{rg} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} C_3 \leftarrow C_3 - C_1 - 2C_2 \end{matrix} \\
 &= \operatorname{rg} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} L_2 \leftarrow L_2 - \frac{1}{2}L_3 \end{matrix} \\
 &= 3
 \end{aligned}$$

et :

$$\begin{aligned}
 \operatorname{rg} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} &= \operatorname{rg} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & -4 & -2 \\ 0 & -8 & -4 \end{pmatrix} \begin{matrix} L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1 \end{matrix} \\
 &= \operatorname{rg} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & -4 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2 \end{matrix} \\
 &= \operatorname{rg} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} L_2 \leftarrow \frac{-1}{2}L_2 \end{matrix} \quad \left. \begin{matrix} \text{car } (1, 3, 2) \text{ et } (0, 2, 1) \\ \text{ne sont pas colinéaires} \end{matrix} \right\} \\
 &= 2.
 \end{aligned}$$

**Définition 15.122 (Matrice extraite)**

Soient  $n, p \in \mathbb{N}^*$  et  $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1p} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{np} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$ .

On appelle matrice extraite de  $A$  toute matrice de la forme

$$M = \begin{pmatrix} a_{i_1 j_1} & \dots & a_{i_1 j_s} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i_r j_1} & \dots & a_{i_r j_s} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{rs}(\mathbb{K}) \quad \text{où} \quad \begin{cases} r \in \llbracket 1 ; n \rrbracket \\ s \in \llbracket 1 ; p \rrbracket \\ 1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_r \leq n \\ 1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_s \leq p \end{cases}$$

Concrètement, cela signifie qu'on obtient  $M$  à partir de  $A$  en supprimant quelques lignes et quelques colonnes.

---

**Proposition 15.123**

Le rang d'une matrice  $A$  est la taille de la plus grande matrice inversible extraite de  $A$ .

---

*Démonstration 15.124*

On note  $(C_1, \dots, C_p)$  la famille des vecteurs-colonne de  $A$  et on pose  $r = \text{rg } A$ .

On a  $\text{rg } A = \text{rg } (C_1, \dots, C_p) = \dim \text{Vect } (C_1, \dots, C_p)$ .

Selon le théorème de la base extraite, il existe  $j_1, \dots, j_r \in \mathbb{N}$  tels que  $1 \leq j_1 < \dots < j_r \leq p$  et  $(C_{j_1}, \dots, C_{j_r})$  est une base de  $\text{Vect } (C_1, \dots, C_p)$ .

Posons  $B = (C_{j_1} \ \dots \ C_{j_r}) \in \mathcal{M}_{nr}(\mathbb{K})$  (matrice extraite de  $A$ ).

On note  $(L_1, \dots, L_n)$  la famille des lignes de  $B$ .

On a  $r = \text{rg } B = \text{rg } (L_1, \dots, L_n) = \dim \text{Vect } (L_1, \dots, L_n)$ .

Selon le théorème de la base extraite, il existe  $i_1, \dots, i_r \in \mathbb{N}$  tels que  $1 \leq i_1 < \dots < i_r \leq n$  et  $(L_{i_1}, \dots, L_{i_r})$  est une base de  $\text{Vect } (L_1, \dots, L_n)$ .

Posons  $C = \begin{pmatrix} L_{i_1} \\ \vdots \\ L_{i_r} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_r(\mathbb{K})$ .

$C$  est extraite de  $A$  et on a  $\text{rg } C = r$  donc  $C \in \text{GL}_r(\mathbb{K})$ .

Ainsi, il existe une matrice inversible de taille  $r$  extraite de  $A$ .

Enfin, toute matrice extraite de  $A$  est de rang inférieur à  $r$ .

Donc il n'existe aucune matrice inversible de taille supérieure à  $r + 1$  extraite de  $A$ . ■

## 15.13 Trace d'une matrice carrée

---

**Définition 15.125**

On appelle trace d'une matrice carrée la somme de ses coefficients diagonaux.

Ainsi, si  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $A = (a_{ij})_{(i,j)} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ , on appelle trace de  $A$  le scalaire :

$$\text{tr } A = \sum_{i=1}^n a_{ii}.$$

---

Exemple 15.126

(1) On a :

$$\forall a, b, c, d \in \mathbb{K}, \quad \text{tr} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = a + d.$$

(2) La trace d'une matrice antisymétrique est toujours nulle.

---

Remarque 15.127

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

On a clairement :

$$\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \quad \text{tr}({}^t A) = \text{tr} A.$$

---

**Proposition 15.128**

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

L'application  $\text{tr} : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \longrightarrow \mathbb{K}$  est une forme linéaire sur  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

---

**Proposition 15.129**

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

On a :

$$\forall A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \quad \text{tr}(AB) = \text{tr}(BA).$$

---

Démonstration 15.130

On pose  $C = (c_{ik})_{(i,k)} = AB$  et  $D = (d_{ik})_{(i,k)} = BA$ .

Montrons que  $\text{tr} C = \text{tr} D$ .

On a :

$$\forall (i, k) \in \llbracket 1 ; n \rrbracket^2, \quad \begin{cases} c_{ik} = \sum_{j=1}^n a_{ij} b_{jk} \\ d_{ik} = \sum_{j=1}^n b_{ij} a_{jk} \end{cases}$$

D'où :

$$\begin{cases} \text{tr} C = \sum_{i=1}^n c_{ii} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} b_{ji} \\ \text{tr} D = \sum_{i=1}^n d_{ii} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n b_{ij} a_{ji} \end{cases}$$

Donc  $\text{tr} C = \text{tr} D$  (changement d'indice  $(i', j) = (j, i)$ ). ■

---

Exemple 15.131

On pose  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$  et  $B = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix}$ .

On a :

$$\operatorname{tr}(AB) = aa' + bc' + cb' + dd' \quad \text{et} \quad \operatorname{tr}({}^tAA) = a^2 + b^2 + c^2 + d^2.$$

---

**Corollaire 15.132**

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

Deux matrices semblables ont même trace :

$$\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \forall P \in \operatorname{GL}_n(\mathbb{K}), \operatorname{tr}(PAP^{-1}) = \operatorname{tr} A.$$

---

Démonstration 15.133

Soient  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  et  $P \in \operatorname{GL}_n(\mathbb{K})$ .

On a :

$$\operatorname{tr}(PAP^{-1}) = \operatorname{tr}(APP^{-1}) = \operatorname{tr} A. \quad \blacksquare$$

## 15.14 Matrices et systèmes linéaires

Dans cette section, on utilise les notations suivantes :

Soient  $n, p \in \mathbb{N}^*$  et deux matrices :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1p} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{np} \end{pmatrix} = (C_1 \quad \cdots \quad C_p) \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K}) \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n1}(\mathbb{K})$$

(en notant  $(C_1, \dots, C_p)$  la famille des vecteurs-colonne de  $A$ ).

Le système linéaire de  $n$  équations à  $p$  inconnues

$$(S) \quad \begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1p}x_p = b_1 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + \cdots + a_{np}x_p = b_n \end{cases}$$

d'inconnue  $(x_1, \dots, x_p) \in \mathbb{K}^p$  peut se réécrire « matriciellement » ou « vectoriellement ».



Écriture matricielle de  $(S)$  :

$$(S) \quad AX = B \quad \text{équation matricielle d'inconnue } X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{p1}(\mathbb{K}).$$

Écriture vectorielle de  $(S)$  :

$$(S) \quad x_1 C_1 + \cdots + x_p C_p = B \quad \text{équation vectorielle d'inconnue } X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^p.$$

---

*Remarque 15.134*

- (1) Notons  $(S_0)$  le système homogène associé à  $(S)$  (c'est-à-dire celui obtenu en « remplaçant  $B$  par  $0_{n1}$  »). L'écriture matricielle de  $(S_0)$  montre que son espace vectoriel solution  $\mathcal{S}_0$  est le noyau de l'application linéaire canoniquement associée à  $A$  :

$$\ker u_A = \mathcal{S}_0 \subseteq \mathbb{K}^p.$$

- (2) L'écriture vectorielle de  $(S)$  montre que  $(S)$  possède au moins une solution<sup>1</sup> si, et seulement si, le second membre  $B$  est combinaison linéaire des vecteurs-colonne de  $A$  :

$$\mathcal{S} \neq \emptyset \iff B \in \text{Vect}(C_1, \dots, C_p).$$

- (3) Cette solution est alors unique si, et seulement si, la famille  $(C_1, \dots, C_p)$  des vecteurs-colonne de  $A$  est libre.

---

### Exercice/Exemple 15.135

Écrire matriciellement et vectoriellement le système linéaire suivant :

$$(S) \quad \begin{cases} a + 2b + c + 3d = 0 \\ 3a + 7b + 3c + 6d = 0 \\ a + 3b + c = 7 \end{cases}$$

---

*Correction 15.136*

On a :

$$(S) \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 3 & 7 & 3 & 6 \\ 1 & 3 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 7 \end{pmatrix} \quad \text{ou} \quad (S) \quad a \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \\ 3 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

---

1. Si le système  $(S)$  possède au moins une solution, on dit que  $(S)$  est compatible.

---

**Définition 15.137**

On appelle rang du système linéaire  $(S)$  le rang de la matrice  $A$  (dans l'écriture matricielle), c'est-à-dire le rang de la famille de vecteurs  $(C_1, \dots, C_p)$  (dans l'écriture vectorielle).

---

**Proposition 15.138**

Notons  $r$  le rang du système  $(S)$ .

L'ensemble solution  $\mathcal{S}$  du système  $(S)$  est soit l'ensemble vide, soit un sous-espace affine de  $\mathbb{K}^p$  de dimension  $p - r$ .

---

*Démonstration 15.139*

Supposons  $\mathcal{S} \neq \emptyset$ .

On a vu que  $\mathcal{S}$  est un sous-espace affine de  $\mathbb{K}^p$  dirigé par  $\mathcal{S}_0 = \ker u_A$ .

Selon le théorème du rang appliqué à  $u_A \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^n)$ , on a :

$$\dim \mathbb{K}^p = \operatorname{rg} u_A + \dim \ker u_A$$

$$p = r + \dim \mathcal{S}_0.$$

Donc  $\mathcal{S}_0$  est un espace vectoriel de dimension  $p - r$  et  $\mathcal{S}$  est un sous-espace affine de  $\mathbb{K}^p$  dirigé par  $\mathcal{S}_0$ . ■

---

**Définition 15.140 (Système de Cramer)**

On dit que  $(S)$  est un système de Cramer si  $n = p$  et si la matrice  $A$  est inversible.

---

**Proposition 15.141**

Tout système de Cramer admet une unique solution.

---

*Démonstration 15.142*

C'est clair avec l'écriture matricielle :

$$\forall X \in \mathbb{K}^p, \quad AX = B \iff X = A^{-1}B. \quad \blacksquare$$

## 15.15 Calculer l'inverse d'une matrice

---

### Algorithme 15.143

Soient  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

En appliquant l'algorithme du pivot de Gauss aux lignes de  $A$ , on arrive à  $I_n$  si  $A$  est inversible ou à une matrice simple de même rang que  $A$  si  $A$  n'est pas inversible.

---

### Exercice/Exemple 15.144

Décider si  $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$  est inversible et calculer son inverse.

---

#### Correction 15.145

On applique l'algorithme :

$$\left( \begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\left( \begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right) L_1 \leftrightarrow L_2$$

$$\left( \begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \end{array} \right) L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$$

$$\left( \begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{array} \right) L_2 \leftarrow -L_2$$

$$\left( \begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{array} \right) L_1 \leftarrow L_1 - L_2$$

Donc  $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$  est inversible, d'inverse  $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ .

Vérification : on a bien  $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = I_2$ .

# Chapitre 16

## Matrices II

### Sommaire

<b>16.1</b>	<b>Matrice d'une famille de vecteurs</b>	<b>. 554</b>
16.1.1	Définition	554
16.1.2	Formules de changement de base	556
16.1.3	Isomorphisme entre familles de vecteurs et matrices	558
<b>16.2</b>	<b>Matrice d'une application linéaire</b>	<b>. 560</b>
16.2.1	Définition	560
16.2.2	Formules de changement de base	563
16.2.3	Isomorphismes entre applications linéaires et matrices	565
16.2.4	Trace d'un endomorphisme	568

On considère un corps  $\mathbb{K}$  (en pratique  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ ).

## 16.1 Matrice d'une famille de vecteurs

### 16.1.1 Définition

#### Définition 16.1 (Matrice d'une famille de vecteurs dans une base)

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  une base de  $E$  et  $(x_1, \dots, x_p) \in E^p$  une famille d'éléments de  $E$ .

La matrice de la famille  $(x_1, \dots, x_p)$  dans la base  $\mathcal{B}$  est la matrice :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_p) = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1p} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{np} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$$

dont les colonnes sont les coordonnées respectives des vecteurs de la famille  $(x_1, \dots, x_p)$  :

$$\forall j \in \llbracket 1 ; p \rrbracket, \quad x_j = \sum_{i=1}^n a_{ij} e_i.$$

---

*Remarque 16.2*

On garde les notations de la définition précédente.

Si  $p = 1$  (c'est-à-dire si la famille de vecteurs ne possède qu'un seul vecteur), alors la matrice  $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(x_1)$  de la famille  $(x_1)$  dans la base  $\mathcal{B}$  est la matrice-colonne (c'est-à-dire le  $n$ -uplet) des coordonnées de  $x_1$  dans la base  $\mathcal{B}$ .

---

**Exercice/Exemple 16.3**

On note  $T_0, T_1$  et  $T_2$  les trois premiers polynômes de Tchebychev.

Écrire la matrice de la famille  $(T_0, T_1, T_2)$  dans la base canonique de  $\mathbb{R}_2[X]$  puis dans la base canonique de  $\mathbb{R}_3[X]$ .

---

*Correction 16.4*

On a :

$$\text{Mat}_{(1,X,X^2)}(1, X, 2X^2 - 1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \text{Mat}_{(1,X,X^2,X^3)}(1, X, 2X^2 - 1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

---

**Définition 16.5 (Matrice de passage)**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  et  $\mathcal{B}' = (x_1, \dots, x_n)$  deux bases de  $E$ .

La matrice  $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n)$  est appelée matrice de passage de la base  $\mathcal{B}$  à la base  $\mathcal{B}'$  et est notée  $\mathcal{P}_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'}$  :

$$\mathcal{P}_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'} = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n).$$

---

*Remarque 16.6*

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $\mathcal{B}$  une base de  $E$ .

On a :

$$\mathcal{P}_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}} = I_n.$$

## 16.1.2 Formules de changement de base

**Proposition 16.7 (Formule de changement de base pour les coordonnées d'un vecteur)**  
Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\mathcal{B}$  et  $\mathcal{B}'$  deux bases de  $E$  et  $x$  un vecteur de  $E$ .

On considère les coordonnées  $X \in \mathbb{K}^n$  et  $X' \in \mathbb{K}^n$  de  $x$  dans les bases  $\mathcal{B}$  et  $\mathcal{B}'$  :

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(x) \quad \text{et} \quad X' = \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix} = \text{Mat}_{\mathcal{B}'}(x).$$

On a :

$$X = \mathcal{P}_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'} X',$$

c'est-à-dire :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(x) = \mathcal{P}_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'} \text{Mat}_{\mathcal{B}'}(x).$$

---

*Démonstration 16.8*

On note  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ ,  $\mathcal{B}' = (e'_1, \dots, e'_n)$  et  $\mathcal{P}_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'} = (a_{ij})_{(i,j)}$ .

On a :

$$x = \sum_{k=1}^n x_k e_k = \sum_{k=1}^n x'_k e'_k \quad \text{et} \quad \forall j \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, \quad e'_j = \sum_{i=1}^n a_{ij} e_i.$$

Donc :

$$x = \sum_{j=1}^n x'_j \sum_{i=1}^n a_{ij} e_i = \sum_{i=1}^n e_i \sum_{j=1}^n a_{ij} x'_j.$$

D'où  $\forall i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$ ,  $x_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} x'_j$ , c'est-à-dire :

$$X = \mathcal{P}_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'} X'. \quad \blacksquare$$

---

### Exercice/Exemple 16.9

On note  $\mathcal{C}$  le cercle unité de  $\mathbb{R}^2$ , d'équation cartésienne (dans la base canonique  $\mathcal{B}$ ) :

$$\mathcal{C} : x^2 + y^2 = 1.$$

- (1) Justifier que la famille  $\mathcal{B}' = \left( \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$  est une base de  $\mathbb{R}^2$ .
- (2) Donner une équation cartésienne de  $\mathcal{C}$  dans la base  $\mathcal{B}'$ , c'est-à-dire, pour tout point  $M \in \mathbb{R}^2$ , une CNS en fonction des coordonnées  $(x', y')$  de  $M$  dans  $\mathcal{B}'$  pour que  $M$  appartienne à  $\mathcal{C}$ .

---

*Correction 16.10 (1)*

$\mathcal{B}'$  est clairement libre et possède deux éléments donc c'est une base de  $\mathbb{R}^2$ .

---

*Correction 16.11 (2)*

Soit  $M \in \mathbb{R}^2$  dont on note  $(x, y)$  les coordonnées dans  $\mathcal{B}$  et  $(x', y')$  les coordonnées dans  $\mathcal{B}'$ .

On a :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \mathcal{P}_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x' + y' \\ y' \end{pmatrix}.$$

$$\text{Donc } \begin{cases} x = 2x' + y' \\ y = y' \end{cases}$$

D'où :

$$\begin{aligned} M \in \mathcal{C} &\iff x^2 + y^2 = 1 \\ &\iff (2x' + y')^2 + y'^2 = 1 \\ &\iff 4x'^2 + 4x'y' + 2y'^2 = 1. \end{aligned}$$

---

### Proposition 16.12

(Formule de changement de base pour la matrice d'une famille de vecteurs)

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\mathcal{B}$  et  $\mathcal{B}'$  deux bases de  $E$  et  $\mathcal{F}$  une famille de vecteurs.

On a :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{F}) = \mathcal{P}_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'} \text{Mat}_{\mathcal{B}'}(\mathcal{F}).$$

---

*Démonstration 16.13*

On note  $\mathcal{F} = (x_1, \dots, x_p) \in E^p$ ,  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ ,  $\mathcal{B}' = (e'_1, \dots, e'_n)$ ,  $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{F}) = (C_1 \dots C_p)$  et  $\text{Mat}_{\mathcal{B}'}(\mathcal{F}) = (C'_1 \dots C'_p)$ .

On a  $\forall j \in \llbracket 1 ; p \rrbracket$ ,  $C_j = \mathcal{P}_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'} C'_j$  donc :

$$\begin{aligned} \text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{F}) &= (\mathcal{P}_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'} C'_1 \dots \mathcal{P}_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'} C'_p) \\ &= \mathcal{P}_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'} (C'_1 \dots C'_p) \\ &= \mathcal{P}_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'} \text{Mat}_{\mathcal{B}'}(\mathcal{F}). \end{aligned}$$

■

---

### Corollaire 16.14

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $\mathcal{B}$ ,  $\mathcal{B}'$  et  $\mathcal{B}''$  trois bases de  $E$ .

On a :

$$\mathcal{P}_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}''} = \mathcal{P}_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'} \mathcal{P}_{\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{B}''}.$$

---

*Démonstration 16.15*

On a, selon la Proposition 16.12 :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}'') = \mathcal{P}_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'} \text{Mat}_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}'').$$

Comme  $\mathcal{B}''$  est aussi une base, cette formule s'écrit :

$$\mathcal{P}_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}''} = \mathcal{P}_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'} \mathcal{P}_{\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{B}''}. \quad \blacksquare$$

---

**Proposition 16.16 (Inversibilité des matrices de passage)**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $\mathcal{B}$  et  $\mathcal{B}'$  deux bases de  $E$ .

La matrice de passage  $\mathcal{P}_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'}$  est inversible, d'inverse :

$$\mathcal{P}_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'}^{-1} = \mathcal{P}_{\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{B}}.$$

---

*Démonstration 16.17*

On a :

$$I_n = \mathcal{P}_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}} = \mathcal{P}_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'} \mathcal{P}_{\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{B}}.$$

Donc  $\mathcal{P}_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'}$  est inversible, d'inverse  $\mathcal{P}_{\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{B}}$ . ■

### 16.1.3 Isomorphisme entre familles de vecteurs et matrices

---

**Proposition 16.18**

Soient  $n, p \in \mathbb{N}^*$ ,  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension  $n$  et  $\mathcal{B}$  une base de  $E$ .

L'application

$$\begin{aligned} \varphi : \quad E^p &\longrightarrow \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K}) \\ (x_1, \dots, x_p) &\longmapsto \text{Mat}_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_p) \end{aligned}$$

est un isomorphisme d'espaces vectoriels.

De plus, cet isomorphisme conserve le rang :

$$\forall \mathcal{F} \in E^p, \quad \text{rg } \mathcal{F} = \text{rg } \text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{F}).$$

Ainsi, étant donnée une famille de vecteurs en dimension finie, on peut calculer son rang et décider si elle est libre ou génératrice en écrivant sa matrice dans une base de l'espace et en calculant le rang de cette matrice.



---

**Exercice/Exemple 16.19**

On considère la famille de polynômes de  $\mathbb{R}_3[X]$  :

$$\mathcal{F} = \left( X^3 + X^2 + X + 1, X^2 - 1, (X + 1)^3, X^3 - X \right).$$

- (1) Écrire la matrice de  $\mathcal{F}$  dans la base canonique de  $\mathbb{R}_3[X]$ .
- (2) En déduire le rang de  $\mathcal{F}$ .
- (3) Est-ce une famille libre ? une famille génératrice de  $\mathbb{R}_3[X]$  ?

---

*Correction 16.20 (1)*

On pose :

$$A = \text{Mat}_{(1, X, X^2, X^3)}(\mathcal{F}) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & -1 \\ 1 & 1 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

---

Correction 16.21 (2)

On a :

$$\begin{aligned}
 \operatorname{rg} \mathcal{F} &= \operatorname{rg} A \\
 &= \operatorname{rg} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & -1 \\ 1 & 1 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\
 &= \operatorname{rg} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} L_1 \leftarrow L_1 - L_4 \\ \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_2 \\ \end{matrix} \\
 &= \operatorname{rg} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\
 &= \operatorname{rg} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \end{matrix} \\
 &= \operatorname{rg} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} C_3 \leftarrow C_3 + C_4 - C_2 \\ \\ \end{matrix} \\
 &= \operatorname{rg} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} C_3 \leftarrow C_3 - 2C_1 \\ C_4 \leftarrow C_4 + C_1 - C_2 \\ \end{matrix} \\
 &= \operatorname{rg} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \\
 &= 3.
 \end{aligned}$$

---

Correction 16.22 (3)

$\mathcal{F}$  n'est pas libre car son rang diffère de son nombre de vecteurs et n'est pas génératrice de  $\mathbb{R}_3[X]$  car son rang diffère de la dimension de  $\mathbb{R}_3[X]$ .

## 16.2 Matrice d'une application linéaire

### 16.2.1 Définition

---

**Définition 16.23 (Matrice d'une application linéaire dans deux bases)**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension  $p \in \mathbb{N}^*$ ,  $F$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$  une base de  $E$ ,  $\mathcal{C} = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$  une base de  $F$  et  $u \in \mathcal{L}(E, F)$ .

On appelle matrice de l'application linéaire  $u$  dans les bases  $\mathcal{B}$  et  $\mathcal{C}$  la matrice de la famille  $(u(e_1), \dots, u(e_p))$  de vecteurs de  $F$  dans la base  $\mathcal{C}$  :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u) = \text{Mat}_{\mathcal{C}}(u(e_1), \dots, u(e_n)).$$

Dans le cas où  $E = F$ , c'est-à-dire le cas où  $u$  est un endomorphisme, on choisit la même base « au départ » et « à l'arrivée ». On définit alors la matrice de l'endomorphisme  $u$  dans la base  $\mathcal{B}$  :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}}(u) = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u(e_1), \dots, u(e_p)).$$

### Exercice/Exemple 16.24

On pose  $E = \mathbb{R}_3[X]$ .

On note  $\mathcal{B}$  la base canonique de  $E$  et  $\mathcal{C} = (1)$  la base canonique de  $\mathbb{R}$ .

- (1) Écrire la matrice de  $D : \begin{matrix} E & \longrightarrow & E \\ P & \longmapsto & P' \end{matrix}$  dans la base  $\mathcal{B}$ .
- (2) Écrire la matrice de  $u : \begin{matrix} E & \longrightarrow & E \\ P & \longmapsto & P(X+1) \end{matrix}$  dans la base  $\mathcal{B}$ .
- (3) Écrire la matrice de  $\ell : \begin{matrix} E & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ P & \longmapsto & P(2) \end{matrix}$  dans les bases  $\mathcal{B}$  et  $\mathcal{C}$ .

*Correction 16.25 (1)*

On a :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(D) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

*Correction 16.26 (2)*

On a :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

*Correction 16.27 (3)*

On a :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(\ell) = (1 \quad 2 \quad 4 \quad 8).$$

---

*Remarque 16.28*

Soient  $n, p \in \mathbb{N}^*$ .

Si  $A \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$ , l'application linéaire de  $\mathbb{K}^p$  dans  $\mathbb{K}^n$  canoniquement associée à  $A$  est l'application linéaire  $u_A \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^n)$  dont la matrice dans les bases canoniques respectives  $\mathcal{B}_0$  et  $\mathcal{C}_0$  de  $\mathbb{K}^p$  et  $\mathbb{K}^n$  est  $A$  :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}_0, \mathcal{C}_0}(u_A) = A.$$

Si  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ , l'endomorphisme de  $\mathbb{K}^n$  canoniquement associé à  $A$  est l'endomorphisme  $u_A \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n)$  dont la matrice dans la base canonique  $\mathcal{B}_0$  de  $\mathbb{K}^n$  est  $A$  :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}_0}(u_A) = A.$$

---

**Proposition 16.29 (Calcul de l'image d'un vecteur)**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension  $p \in \mathbb{N}^*$ ,  $F$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$  une base de  $E$ ,  $\mathcal{C} = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$  une base de  $F$  et  $u \in \mathcal{L}(E, F)$ .

La matrice  $\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u)$  permet de « calculer » l'image par  $u$  d'un vecteur de  $E$  :

Posons  $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u)$ .

Si  $x$  est un vecteur de  $E$  de coordonnées  $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix}$  dans  $\mathcal{B}$ , alors son image  $y = u(x)$  est le vecteur

de  $F$  dont les coordonnées  $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$  dans  $\mathcal{C}$  sont données par la formule :

$$Y = AX \quad \text{c'est-à-dire : } \text{Mat}_{\mathcal{C}}(u(x)) = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u) \text{Mat}_{\mathcal{B}}(x).$$

Cette propriété caractérise la matrice  $A$ .

---

*Démonstration 16.30*

On note  $\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u) = (C_1 \ \dots \ C_p)$ , c'est-à-dire :

$$\forall j \in \llbracket 1 ; p \rrbracket, \quad C_j = \text{Mat}_{\mathcal{C}}(u(e_j)).$$

On a  $x = x_1 e_1 + \dots + x_p e_p$  donc  $u(x) = x_1 u(e_1) + \dots + x_p u(e_p) \in F$ .

Donc en prenant les coordonnées dans  $\mathcal{C}$  :

$$\begin{aligned} Y &= x_1 C_1 + \dots + x_p C_p \\ &= (C_1 \ \dots \ C_p) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} \\ &= AX. \end{aligned}$$

Si  $B$  est une autre matrice vérifiant la même propriété, on a :

$$\forall Z \in \mathbb{K}^p, \quad AZ = BZ.$$

Donc en prenant comme vecteur  $Z$  le  $j$ -ème vecteur de la base canonique de  $\mathbb{K}^p$ ,  $A$  et  $B$  ont même  $j$ -ème colonne.

Donc  $A = B$ . ■

### Exemple 16.31

On reprend les exemples (1) et (3) de l'Exercice/Exemple 16.24.

$$\text{On a } \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d \\ c \\ b \\ a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c \\ 2b \\ 3a \\ 0 \end{pmatrix} \text{ donc :}$$

$$D(aX^3 + bX^2 + cX + d) = 3aX^2 + 2bX + c.$$

$$\text{De même, on a } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d \\ c \\ b \\ a \end{pmatrix} = d + 2c + 4b + 8a \text{ donc } \ell(aX^3 + bX^2 + cX + d) = 8a + 4b + 2c + d$$

donc :

$$(aX^3 + bX^2 + cX + d)(2) = 8a + 4b + 2c + d.$$

## 16.2.2 Formules de changement de base

### Proposition 16.32

(Formule de changement de base pour la matrice d'une application linéaire)

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension  $p \in \mathbb{N}^*$ ,  $F$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\mathcal{B}$  et  $\mathcal{B}'$  deux bases de  $E$ ,  $\mathcal{C}$  et  $\mathcal{C}'$  deux bases de  $F$  et  $u \in \mathcal{L}(E, F)$ .

On a :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u) = \mathcal{P}_{\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}'} \text{Mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{C}'}(u) \mathcal{P}_{\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{B}}.$$

### Démonstration 16.33

Soit  $x \in E$ .

On note  $y = u(x)$ ,  $X, X' \in \mathbb{K}^p$  les coordonnées de  $x$  dans les bases  $\mathcal{B}$  et  $\mathcal{B}'$  respectivement,  $Y, Y' \in \mathbb{K}^n$  les coordonnées de  $y$  dans les bases  $\mathcal{C}$  et  $\mathcal{C}'$  respectivement,  $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u)$ ,  $A' = \text{Mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{C}'}(u)$ ,  $P = \mathcal{P}_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'}$  et  $Q = \mathcal{P}_{\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}'}$ .

$$\text{On a vu } \begin{cases} X = PX' \\ Y = QY' \end{cases} \text{ et } \begin{cases} Y = AX \\ Y' = A'X' \end{cases}$$

$$\text{Donc } QY' = APX'.$$

$$\text{Donc } Y' = Q^{-1}APX'.$$

$$\text{Donc } Q^{-1}AP = A', \text{ c'est-à-dire :}$$

$$\mathcal{P}_{\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}'}^{-1} \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{E}}(u) \mathcal{P}_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'} = \text{Mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{E}'}(u).$$

$$\text{D'où la formule souhaitée car } \mathcal{P}_{\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}'}^{-1} = \mathcal{P}_{\mathcal{E}' \rightarrow \mathcal{E}}.$$

■

### Corollaire 16.34

(Formule de changement de base pour la matrice d'un endomorphisme)

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\mathcal{B}$  et  $\mathcal{B}'$  deux bases de  $E$  et  $u \in \mathcal{L}(E)$ .

On a :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \mathcal{P}_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'} \text{Mat}_{\mathcal{B}'}(u) \mathcal{P}_{\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{B}}.$$

### Remarque 16.35

Deux matrices carrées sont semblables si, et seulement si, ce sont les matrices d'un même endomorphisme dans deux bases différentes.

### Remarque 16.36

On peut maintenant démontrer que toute matrice de rang  $r$  est équivalente à  $J_r$  (on l'avait admis dans la Démonstration 15.104).

### Application 16.37

Soient  $n, p \in \mathbb{N}^*$ ,  $A \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$  et  $r \in \mathbb{N}$ .

Alors :

$$\text{rg } A = r \iff \exists P \in \text{GL}_n(\mathbb{K}), \exists Q \in \text{GL}_p(\mathbb{K}), A = PJ_rQ,$$

en posant

$$J_r = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & & \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots & & \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & & \\ 0 & \dots & 0 & 1 & & \\ & & & & 0 & \\ & & & & & 0 \end{pmatrix}.$$

$\begin{matrix} n & & & & & \\ \downarrow & & & & & \\ 1 & & r & & p \end{matrix}$

---

Démonstration 16.38

Il reste à montrer  $\boxed{\Rightarrow}$ .

Supposons  $\text{rg } A = r$ .

On considère l'application linéaire canoniquement associée à  $A : u_A \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^n)$ .

On a  $\text{rg } u_A = \text{rg } A = r$ .

Soit  $S$  un supplémentaire de  $\ker u_A$  dans  $\mathbb{K}^p$  :

$$\mathbb{K}^p = S \oplus \ker u_A.$$

Selon le théorème du rang,  $u_A$  induit un isomorphisme de  $S$  vers  $\text{Im } u_A$ .

On a donc :

$$\dim S = \dim \text{Im } u_A = \text{rg } u_A = r.$$

Soit  $(e_1, \dots, e_r)$  une base de  $S$ .

Comme les isomorphismes conservent les bases,  $(u_A(e_1), \dots, u_A(e_r))$  est une base de  $\text{Im } u_A$ .

Soit  $(e_{r+1}, \dots, e_p)$  une base de  $\ker u_A$ .

La famille  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$  est une base de  $\mathbb{K}^p$  car  $\mathbb{K}^p = S \oplus \ker u_A$ .

Enfin, la famille  $(u_A(e_1), \dots, u_A(e_r))$  est une famille libre de  $\mathbb{K}^n$  donc selon le théorème de la base incomplète, on peut la compléter en une base  $\mathcal{C} = (u_A(e_1), \dots, u_A(e_r), e_{r+1}, \dots, e_n)$  de  $\mathbb{K}^n$ .

On note  $\mathcal{B}_0$  et  $\mathcal{C}_0$  les bases respectives de  $\mathbb{K}^p$  et  $\mathbb{K}^n$ .

On a, d'une part,  $\text{Mat}_{\mathcal{B}_0, \mathcal{C}_0}(u_A) = A$ .

D'autre part :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u_A) = J_r.$$

On a donc

$$A = \text{Mat}_{\mathcal{B}_0, \mathcal{C}_0}(u_A) = \mathcal{P}_{\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}_0} \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u_A) \mathcal{P}_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}_0} = PJ_rQ$$

en posant 
$$\begin{cases} P = \mathcal{P}_{\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}_0} \in \text{GL}_n(\mathbb{K}) \\ Q = \mathcal{P}_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}_0} \in \text{GL}_p(\mathbb{K}) \end{cases}$$

■

### 16.2.3 Isomorphismes entre applications linéaires et matrices

---

#### Proposition 16.39

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension  $p \in \mathbb{N}^*$ ,  $F$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\mathcal{B}$  une base de  $E$  et  $\mathcal{C}$  une base de  $F$ .

L'application

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(E, F) &\longrightarrow \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K}) \\ u &\longmapsto \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u)\end{aligned}$$

est un isomorphisme d'espaces vectoriels.

De plus, elle conserve le rang :

$$\forall u \in \mathcal{L}(E, F), \text{rg } u = \text{rg } \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u).$$

#### Proposition 16.40 (Matrice d'une composée)

Soient  $E, F$  et  $G$  des espaces vectoriels de dimensions finies non-nulles,  $\mathcal{B}_E$  une base de  $E$ ,  $\mathcal{B}_F$  une base de  $F$  et  $\mathcal{B}_G$  une base de  $G$ ,  $u \in \mathcal{L}(E, F)$  et  $v \in \mathcal{L}(F, G)$ .

On a :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_G}(v \circ u) = \text{Mat}_{\mathcal{B}_F, \mathcal{B}_G}(v) \text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(u).$$

Cas des endomorphismes : si  $E = F = G$  et  $\mathcal{B}_E = \mathcal{B}_F = \mathcal{B}_G = \mathcal{B}$ , la formule s'écrit :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(v \circ u) = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(v) \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u).$$

Démonstration 16.41

Soit  $x \in E$ .

On note  $y = u(x)$ ,  $z = v(y) = v \circ u(x)$ ,  $X = \text{Mat}_{\mathcal{B}_E}(x)$ ,  $Y = \text{Mat}_{\mathcal{B}_F}(y)$ ,  $Z = \text{Mat}_{\mathcal{B}_G}(z)$ ,  $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(u)$  et  $B = \text{Mat}_{\mathcal{B}_F, \mathcal{B}_G}(v)$ .

On a  $Y = AX$  et  $Z = BY$  donc  $Z = BAX$ .

D'où  $\text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_G}(v \circ u) = BA$ . ■

#### Proposition 16.42 (Matrice d'une bijection réciproque)

Soient  $E$  et  $F$  deux espaces vectoriels de dimension  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\mathcal{B}_E$  une base de  $E$ ,  $\mathcal{B}_F$  une base de  $F$  et  $u \in \mathcal{L}(E, F)$ .

On a :

$$u \text{ est un isomorphisme de } E \text{ vers } F \iff \text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(u) \in \text{GL}_n(\mathbb{K}).$$

On a alors :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}_F, \mathcal{B}_E}(u^{-1}) = \text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(u)^{-1}.$$



---

*Démonstration 16.43*

Posons  $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(u)$ .

On a  $\text{rg } A = \text{rg } u$ .

Donc, comme  $\dim E = \dim F$  :

$$\begin{aligned} u \text{ est un isomorphisme de } E \text{ vers } F &\iff u \text{ est une surjection de } E \text{ vers } F \\ &\iff \text{rg } u = \dim F \\ &\iff \text{rg } A = n \\ &\iff A \in \text{GL}_n(\mathbb{K}). \end{aligned}$$

Soient  $x \in E$  et  $y \in F$ .

On pose  $X = \text{Mat}_{\mathcal{B}_E}(x)$  et  $Y = \text{Mat}_{\mathcal{B}_F}(y)$ .

On a :

$$\begin{aligned} x = u^{-1}(y) &\iff u(x) = y \\ &\iff AX = Y \\ &\iff X = A^{-1}Y. \end{aligned}$$

Donc  $A^{-1} = \text{Mat}_{\mathcal{B}_F, \mathcal{B}_E}(u^{-1})$ . ■

---

### **Proposition 16.44**

Soient  $E$  un espace vectoriel de dimension  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $\mathcal{B}$  une base de  $E$ .

*L'application*

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(E) &\longrightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ u &\longmapsto \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) \end{aligned}$$

est un isomorphisme d'anneaux de  $(\mathcal{L}(E), +, \circ)$  vers  $(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +, \times)$ .

En particulier, on a :

$$\forall u \in \mathcal{L}(E), \quad u \in \text{GL}(E) \iff \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) \in \text{GL}_n(\mathbb{K}),$$

et on a alors :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u^{-1}) = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)^{-1}.$$

De plus, on a :

$$\forall u \in \mathcal{L}(E), \quad \forall k \in \mathbb{N}, \quad \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u^k) = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)^k.$$

## 16.2.4 Trace d'un endomorphisme

---

### Définition/Proposition 16.45

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et  $u \in \mathcal{L}(E)$ .

Les matrices de l'endomorphisme  $u$  (en prenant les mêmes bases « au départ » et « à l'arrivée ») ont toutes la même trace (car elles sont toutes semblables).

Leur trace commune est appelée trace de l'endomorphisme  $u$ .

On a ainsi, pour toute base  $\mathcal{B}$  de  $E$  :

$$\operatorname{tr} u = \operatorname{tr} \operatorname{Mat}_{\mathcal{B}}(u).$$

---

### Exemple 16.46

Soit  $E$  un espace vectoriel de dimension  $n \in \mathbb{N}^*$ .

On a  $\operatorname{tr} \operatorname{id}_E = n$ .

---

### Démonstration 16.47

Soit  $\mathcal{B}$  une base de  $E$ .

On a  $\operatorname{Mat}_{\mathcal{B}}(\operatorname{id}_E) = I_n$  donc on a :

$$\operatorname{tr} \operatorname{id}_E = \operatorname{tr} \operatorname{Mat}_{\mathcal{B}}(\operatorname{id}_E)$$

$$= \operatorname{tr} I_n$$

$$= n. \quad \blacksquare$$

---

### Proposition 16.48

Soit  $E$  un espace vectoriel de dimension  $n \in \mathbb{N}^*$ .

L'application  $\operatorname{tr} : \mathcal{L}(E) \longrightarrow \mathbb{K}$  est une forme linéaire sur  $\mathcal{L}(E)$ .

---

### Proposition 16.49

Soit  $E$  un espace vectoriel de dimension  $n \in \mathbb{N}^*$ .

On a :

$$\forall u, v \in \mathcal{L}(E), \quad \operatorname{tr} uv = \operatorname{tr} vu.$$

---

### Proposition 16.50

En dimension finie non-nulle, la trace d'un projecteur est égale à son rang.

---

*Démonstration 16.51*

Soient  $E$  un espace vectoriel de dimension  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $p \in \mathcal{L}(E)$  un projecteur.

On sait que  $p$  est le projecteur sur  $\text{Im } p$ , parallèlement à  $\ker p$  et qu'on a  $E = \text{Im } p \oplus \ker p$ .

Posons  $r = \text{rg } p$ .

Soit  $\mathcal{B}$  une base de  $E$  adaptée à la décomposition de  $E$  en somme directe :

$$\mathcal{B} = \left( \underbrace{e_1, \dots, e_r}_{\text{base de } \text{Im } p}, \underbrace{e_{r+1}, \dots, e_n}_{\text{base de } \ker p} \right).$$

$$\text{On a : } \begin{cases} \forall j \in \llbracket 1 ; r \rrbracket, & p(e_j) = e_j \text{ car } e_j \in \text{Im } p \\ \forall j \in \llbracket r+1 ; n \rrbracket, & p(e_j) = 0_E \text{ car } e_j \in \ker p \end{cases}$$

D'où :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(p) = J_r \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}).$$

Donc  $\text{tr } p = \text{tr } J_r = r = \text{rg } p$ . ■

---

**Exercice/Exemple 16.52**

Soient  $E$  un espace vectoriel de dimension finie non-nulle et  $F$  et  $G$  deux sous-espaces vectoriels supplémentaires dans  $E$ .

On note  $s$  la symétrie par rapport à  $F$  parallèlement à  $G$ .

Exprimer la trace de  $s$  en fonction des dimensions de  $F$  et  $G$ .

---

*Correction 16.53*

On pose  $a = \dim F$  et  $b = \dim G$ .

Soit  $\mathcal{B}$  une base adaptée à la décomposition de  $E$  en somme directe :

$$\mathcal{B} = \left( \underbrace{e_1, \dots, e_a}_{\text{base de } F}, \underbrace{e'_1, \dots, e'_b}_{\text{base de } G} \right).$$

$$\text{On a : } \begin{cases} \forall j \in \llbracket 1 ; a \rrbracket, & s(e_j) = e_j \\ \forall j \in \llbracket 1 ; b \rrbracket, & s(e'_j) = -e'_j \end{cases}$$

D'où :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(s) = \begin{pmatrix} I_a & 0 \\ 0 & -I_b \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{a+b}(\mathbb{K}).$$

Donc  $\text{tr } s = \text{tr } \text{Mat}_{\mathcal{B}}(s) = a - b = \dim F - \dim G$ .

# Chapitre 17

## Relations de comparaison, développements limités

### Sommaire

---

<b>17.1</b>	<b>Relations de comparaison : cas des suites . . . . .</b>	<b>571</b>
17.1.1	Relation de domination $\mathcal{O}$ . . . . .	571
17.1.2	Relation de négligeabilité $o$ . . . . .	572
17.1.3	Propriétés de $\mathcal{O}$ et $o$ . . . . .	573
17.1.4	Croissances comparées . . . . .	575
17.1.5	Relation d'équivalence $\sim$ . . . . .	579
17.1.6	Propriétés de $\sim$ . . . . .	581
17.1.7	Formule de Stirling . . . . .	584
<b>17.2</b>	<b>Relations de comparaison : cas général . . . . .</b>	<b>584</b>
17.2.1	Relation de domination $\mathcal{O}$ . . . . .	585
17.2.2	Relation de négligeabilité $o$ . . . . .	586
17.2.3	Propriétés de $\mathcal{O}$ et $o$ . . . . .	587
17.2.4	Relation d'équivalence $\sim$ . . . . .	589
17.2.5	Propriétés de $\sim$ . . . . .	591
17.2.6	Changements de variable . . . . .	592
17.2.7	Croissances comparées . . . . .	593
17.2.8	Erreurs à ne pas faire . . . . .	594
17.2.8.1	Sommes d'équivalents . . . . .	594
17.2.8.2	Limite nulle donc équivalent nul . . . . .	594
17.2.8.3	Appliquer une fonction à un équivalent . . . . .	594
17.2.8.4	Changement de variable inadéquat . . . . .	594
<b>17.3</b>	<b>Développements limités . . . . .</b>	<b>595</b>
17.3.1	Définition . . . . .	595
17.3.2	Propriétés des développements limités . . . . .	597
17.3.3	Applications . . . . .	600
<b>17.4</b>	<b>Formule de Taylor . . . . .</b>	<b>602</b>
17.4.1	Primitivation de développements limités . . . . .	602
17.4.2	Application . . . . .	608
<b>17.5</b>	<b>Développements asymptotiques . . . . .</b>	<b>610</b>
<b>17.6</b>	<b>Méthodes à bien connaître . . . . .</b>	<b>614</b>
17.6.1	Composer des développements limités . . . . .	614
17.6.2	Inverse d'un développement limité . . . . .	614

Dans tout le chapitre, on pose :  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ .

## 17.1 Relations de comparaison : cas des suites

### 17.1.1 Relation de domination $\mathcal{O}$

---

#### Définition/Proposition 17.1

Soient  $(u_n)_n, (v_n)_n \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ .

Les propositions suivantes sont équivalentes :

$$(1) \exists M \in \mathbb{R}_+, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \llbracket N ; +\infty \llbracket, |u_n| \leq M |v_n|$$

(2) Il existe une suite  $(\lambda_n)_n \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$  telle que :

$$(\lambda_n)_n \text{ est bornée} \quad \text{et} \quad \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \llbracket N ; +\infty \llbracket, u_n = \lambda_n v_n.$$

Lorsqu'elles sont vérifiées, on dit que

$$(v_n)_n \text{ domine } (u_n)_n$$

ou que

$$v_n \text{ domine } u_n \text{ quand } n \text{ tend vers } +\infty$$

et on note :

$$u_n = \mathcal{O}(v_n) \text{ quand } n \text{ tend vers } +\infty$$

ou :

$$u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \mathcal{O}(v_n).$$

---

#### Proposition 17.2

Soient  $(u_n)_n, (v_n)_n \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ .

Si les termes de  $(v_n)_n$  sont non-nuls à partir d'un certain rang  $N \in \mathbb{N}$  :

$$\forall n \in \llbracket N ; +\infty \llbracket, v_n \neq 0,$$

alors :

$$u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \mathcal{O}(v_n) \iff \text{la suite } \left( \frac{u_n}{v_n} \right)_{n \geq N} \text{ est bornée.}$$

Si les termes de  $(v_n)_n$  sont tous non-nuls :

$$\forall n \in \mathbb{N}, v_n \neq 0,$$

alors :

$$u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \mathcal{O}(v_n) \iff \text{la suite } \left( \frac{u_n}{v_n} \right)_{n \in \mathbb{N}} \text{ est bornée.}$$

---

*Exemple 17.3*

Soient  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ . On a :

$$n^\alpha \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \mathcal{O}(n^\beta) \iff \alpha \leq \beta.$$

Soient  $a, b \in \mathbb{R}_+^*$ . On a :

$$a^n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \mathcal{O}(b^n) \iff a \leq b.$$

Soit  $(u_n)_n \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ . On a :

$$u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \mathcal{O}(0) \iff (u_n)_n \text{ est nulle à partir d'un certain rang}$$

et :

$$u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \mathcal{O}(1) \iff (u_n)_n \text{ est bornée.}$$

### 17.1.2 Relation de négligeabilité $o$

---

**Définition/Proposition 17.4**

Soient  $(u_n)_n, (v_n)_n \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ .

Les propositions suivantes sont équivalentes :

(1)  $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \llbracket N ; +\infty \llbracket, |u_n| \leq \varepsilon |v_n|$

(2) Il existe une suite  $(\varepsilon_n)_n \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$  telle que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \varepsilon_n = 0 \quad \text{et} \quad \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \llbracket N ; +\infty \llbracket, u_n = \varepsilon_n v_n.$$

Lorsqu'elles sont vérifiées, on dit que

$$(u_n)_n \text{ est négligeable devant } (v_n)_n$$

ou que

$$u_n \text{ est négligeable devant } v_n \text{ quand } n \text{ tend vers } +\infty$$

et on note :

$$u_n = o(v_n) \text{ quand } n \text{ tend vers } +\infty$$

ou :

$$u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(v_n).$$

---

**Proposition 17.5**

Soient  $(u_n)_n, (v_n)_n \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ .

Si les termes de  $(v_n)_n$  sont non-nuls à partir d'un certain rang :

$$\exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \llbracket N ; +\infty \llbracket, v_n \neq 0,$$

alors :

$$u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(v_n) \iff \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} = 0.$$

---

**Exemple 17.6**

Soient  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ . On a :

$$n^\alpha \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(n^\beta) \iff \alpha < \beta.$$

Soient  $a, b \in \mathbb{R}_+^*$ . On a :

$$a^n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(b^n) \iff a < b.$$

Soit  $(u_n)_n \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ . On a :

$$u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(0) \iff (u_n)_n \text{ est nulle à partir d'un certain rang}$$

et :

$$u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(1) \iff \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0.$$

### 17.1.3 Propriétés de $\mathcal{O}$ et $o$

---

**Proposition 17.7**

Soient  $(u_n)_n, (v_n)_n \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ .

On a :

$$u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(v_n) \implies u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \mathcal{O}(v_n).$$

---

**Proposition 17.8**

Soient  $(u_n)_n, (v_n)_n \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$  et  $\ell, \ell' \in [0 ; +\infty]$  tels que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} |u_n| = \ell \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} |v_n| = \ell'.$$

On a, quand  $n$  tend vers  $+\infty$  :

(1) Si  $\ell = 0$  et  $\ell' \neq 0$  alors  $u_n = o(v_n)$ .

(2) Si  $\ell \in [0 ; +\infty[$  et  $\ell' = +\infty$  alors  $u_n = o(v_n)$ .

(3) Si  $\ell, \ell' \in ]0 ; +\infty[$  alors  $u_n = \mathcal{O}(v_n)$ .

(4) Si  $\ell = \ell' = 0$  ou  $\ell = \ell' = +\infty$  alors on ne peut rien dire.

---

**Proposition 17.9 (Transitivités)**

Soient  $(u_n)_n, (v_n)_n, (w_n)_n \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ .

On a, quand  $n$  tend vers  $+\infty$  :

(1) Si  $\begin{cases} u_n = \mathcal{O}(v_n) \\ v_n = \mathcal{O}(w_n) \end{cases}$  alors  $u_n = \mathcal{O}(w_n)$ .

Autrement dit : la relation de domination est transitive.

(2) Si  $\begin{cases} u_n = \mathcal{O}(v_n) \\ v_n = o(w_n) \end{cases}$  ou  $\begin{cases} u_n = o(v_n) \\ v_n = \mathcal{O}(w_n) \end{cases}$  alors  $u_n = o(w_n)$ .

(3) En particulier, la relation de négligeabilité est transitive.

---

**Proposition 17.10 (Sommes)**

Soient  $(u_n)_n, (v_n)_n, (w_n)_n \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ .

On a, quand  $n$  tend vers  $+\infty$  :

(1) Si  $\begin{cases} u_n = \mathcal{O}(w_n) \\ v_n = \mathcal{O}(w_n) \end{cases}$  alors  $u_n + v_n = \mathcal{O}(w_n)$ .

(2) Si  $\begin{cases} u_n = o(w_n) \\ v_n = o(w_n) \end{cases}$  alors  $u_n + v_n = o(w_n)$ .

---

**Proposition 17.11 (Produits)**

Soient  $(a_n)_n, (b_n)_n, (c_n)_n, (d_n)_n \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ .

On a, quand  $n$  tend vers  $+\infty$  :

(1) Si  $\begin{cases} a_n = \mathcal{O}(b_n) \\ c_n = \mathcal{O}(d_n) \end{cases}$  alors  $a_n c_n = \mathcal{O}(b_n d_n)$ .

(2) En particulier : si  $a_n = \mathcal{O}(b_n)$  alors  $a_n c_n = \mathcal{O}(b_n c_n)$ .

(3) Si  $\begin{cases} a_n = o(b_n) \\ c_n = \mathcal{O}(d_n) \end{cases}$  alors  $a_n c_n = o(b_n d_n)$ .

(4) En particulier : si  $a_n = o(b_n)$  alors  $a_n c_n = o(b_n c_n)$ .



---

**Proposition 17.12 (Puissances)**

Soient  $(u_n)_n, (v_n)_n \in (\mathbb{R}_+^*)^{\mathbb{N}}$  et  $\alpha \in \mathbb{R}$ .

On a, quand  $n$  tend vers  $+\infty$  :

$$(1) \text{ Si } \begin{cases} u_n = \mathcal{O}(v_n) \\ \alpha \geq 0 \end{cases} \text{ alors } u_n^\alpha = \mathcal{O}(v_n^\alpha).$$

$$(2) \text{ Si } \begin{cases} u_n = \mathcal{O}(v_n) \\ \alpha \leq 0 \end{cases} \text{ alors } v_n^\alpha = \mathcal{O}(u_n^\alpha).$$

$$(3) \text{ Si } \begin{cases} u_n = o(v_n) \\ \alpha > 0 \end{cases} \text{ alors } u_n^\alpha = o(v_n^\alpha).$$

$$(4) \text{ Si } \begin{cases} u_n = o(v_n) \\ \alpha < 0 \end{cases} \text{ alors } v_n^\alpha = o(u_n^\alpha).$$

On retient en particulier :

$$u_n = \mathcal{O}(v_n) \implies \frac{1}{v_n} = \mathcal{O}\left(\frac{1}{u_n}\right) \quad \text{et} \quad u_n = o(v_n) \implies \frac{1}{v_n} = o\left(\frac{1}{u_n}\right).$$

La même proposition est vraie en prenant  $(u_n)_n, (v_n)_n \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$  et  $\alpha \in \mathbb{N}$  ou en prenant  $(u_n)_n, (v_n)_n \in (\mathbb{C}^*)^{\mathbb{N}}$  et  $\alpha \in \mathbb{Z}$ .

---

**Proposition 17.13 (Suites extraites)**

Soient  $(u_n)_n, (v_n)_n \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$  et  $\varphi : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$  une fonction strictement croissante.

On a, quand  $n$  tend vers  $+\infty$  :

$$u_n = \mathcal{O}(v_n) \implies u_{\varphi(n)} = \mathcal{O}(v_{\varphi(n)}) \quad \text{et} \quad u_n = o(v_n) \implies u_{\varphi(n)} = o(v_{\varphi(n)}).$$

### 17.1.4 Croissances comparées

---

#### Remarque 17.14 (Culturelle)

Il existe d'autres notations que les « notations de Landau »  $\mathcal{O}$ ,  $o$  et  $\sim$  qu'on utilise en mathématiques de CPGE.

Soient  $(u_n)_n, (v_n)_n \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ .

- « Notations de Hardy » (peu utilisées mais très commodes pour énoncer la proposition suivante) :

$$u_n < v_n \iff u_n = o(v_n)$$

et :

$$u_n \leq v_n \iff u_n = \mathcal{O}(v_n).$$

- « Notation de Vinogradov » :

$$u_n \ll v_n \iff u_n = \mathcal{O}(v_n).$$

- « Notation  $\Theta$  » :

$$u_n = \Theta(v_n) \iff [u_n = \mathcal{O}(v_n) \quad \text{et} \quad v_n = \mathcal{O}(u_n)]$$

$$\iff \exists M_1, M_2 \in \mathbb{R}_+^*, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \llbracket N ; +\infty \llbracket, M_1 |v_n| \leq |u_n| \leq M_2 |v_n|.$$

Cette notation est surtout utilisée en informatique (pour étudier la complexité des algorithmes).

On verra qu'on a :

$$u_n = \Theta(v_n) \implies u_n \sim v_n.$$

### Proposition 17.15 (Croissances comparées)

On utilise exceptionnellement les notations de Hardy pour gagner en concision.

Soient  $a_1, a_2, \alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2 \in \mathbb{R}$  tels que :

$$0 < a_1 < 1 < a_2 \quad \text{et} \quad \alpha_1 < 0 < \alpha_2 \quad \text{et} \quad \beta_1 < 0 < \beta_2.$$

Alors on a, quand  $n$  tend vers  $+\infty$  :

$$\underbrace{a_1^n < n^{\alpha_1} < \ln^{\beta_1} n < 1}_{\text{suites de limite nulle}} < \underbrace{\ln^{\beta_2} n < n^{\alpha_2} < a_2^n < n!}_{\text{suites de limite } +\infty}$$

### Démonstration 17.16

Montrons que  $a^n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(n!)$  avec  $a \in \mathbb{R}_+^*$ , c'est-à-dire  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n!} = 0$ .

On a :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad a \times \frac{a}{2} \times \cdots \times \frac{a}{n} = \frac{a^n}{n!}.$$

Soit  $N \in \mathbb{N}^*$  tel que  $\frac{a}{N} \leq \frac{1}{2}$  (un tel  $N$  existe car  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a}{n} = 0$ ).

Posons  $M = \frac{a^{N-1}}{(N-1)!} > 0$ .

On a :

$$\forall n \in \llbracket N ; +\infty \llbracket, \quad \frac{a^n}{n!} = \underbrace{a \times \cdots \times \frac{a}{N-1}}_{=M} \times \underbrace{\frac{a}{N}}_{\leq \frac{1}{2}} \times \cdots \times \underbrace{\frac{a}{n}}_{\leq \frac{1}{2}}.$$

Donc :

$$\forall n \in \llbracket N ; +\infty \llbracket, \quad 0 \leq \frac{a^n}{n!} \leq M \frac{1}{2^{n-N+1}}.$$

Or  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{M}{2^{n-N+1}} = 0$ .

Donc selon le théorème des gendarmes, on a  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n!} = 0$  donc :

$$a^n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(n!).$$

■

---

*Démonstration 17.17*

Soient  $a \in ]1; +\infty[$  et  $\alpha \in \mathbb{R}$ .

Montrons que  $n^\alpha \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(a^n)$ , c'est-à-dire  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^\alpha}{a^n} = 0$ .

Posons  $f : \mathbb{R}_+^* \longrightarrow \mathbb{R}$   
$$x \longmapsto \frac{x^\alpha}{a^x} = x^\alpha e^{-x \ln a}$$

On a :

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad f'(x) &= \alpha x^{\alpha-1} a^{-x} - x^\alpha a^{-x} \ln a \\ &= x^{\alpha-1} a^{-x} (\alpha - x \ln a). \end{aligned}$$

On a  $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad f'(x) \geq 0 \iff x \leq \frac{\alpha}{\ln a}$  donc  $f$  est décroissante sur  $\left[ \frac{\alpha}{\ln a}; +\infty \right[$ .

Donc  $f$  admet une limite en  $+\infty$ .

De plus,  $f$  est minorée par 0 donc  $\ell = \lim_{+\infty} f \in \mathbb{R}_+^*$ .

De plus :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad f(2x) = \frac{2^\alpha}{a^x} f(x).$$

D'où, en passant à la limite quand  $x \longrightarrow +\infty$  :

$$\ell = 0 \times \ell = 0 \text{ car } \ell \text{ est finie.}$$

Donc  $n^\alpha \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(a^n)$ . ■

---

*Démonstration 17.18*

Soient  $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$  et  $\beta \in \mathbb{R}$ .

Montrons que  $\ln^\beta n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(n^\alpha)$ , c'est-à-dire  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln^\beta n}{n^\alpha} = 0$ .

Posons  $f : ]1; +\infty[ \longrightarrow \mathbb{R}$   
$$x \longmapsto \frac{\ln^\beta x}{x^\alpha} = x^{-\alpha} \ln^\beta x$$

On a :

$$\begin{aligned} \forall x \in ]1; +\infty[, \quad f'(x) &= \frac{\beta}{x} x^{-\alpha} \ln^{\beta-1} x - \alpha x^{-\alpha-1} \ln^\beta x \\ &= x^{-\alpha-1} \ln^{\beta-1} x (\beta - \alpha \ln x). \end{aligned}$$

On a :

$$\begin{aligned} \forall x \in ]1; +\infty[, \quad f'(x) \geq 0 &\iff \alpha \ln x \leq \beta \\ &\iff x \leq e^{\beta/\alpha}. \end{aligned}$$

Donc  $f$  est décroissante sur  $\left[ e^{\beta/\alpha} ; +\infty \right[$ .

Donc  $f$  admet une limite en  $+\infty$ .

De plus,  $f$  est minorée par 0 donc  $\ell = \lim_{+\infty} f \in \mathbb{R}_+$ .

De plus, on a  $\forall x \in ]1 ; +\infty[$ ,  $f(x^2) = \frac{2^\beta}{x^\alpha} f(x)$ .

Donc en passant à la limite quand  $x \longrightarrow +\infty$  :

$$\ell = 0 \times \ell = 0 \text{ car } \ell \text{ est finie.}$$

D'où  $\ln^\beta n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(n^\alpha)$ . ■

---

*Démonstration 17.19*

Soit  $\beta \in \mathbb{R}_+^*$ .

On a  $\lim_n \ln^\beta n = +\infty$  donc  $1 \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(\ln^\beta n)$  car  $\lim_n \frac{1}{\ln^\beta n} = 0$ . ■

---

*Démonstration 17.20*

Soit  $\beta \in \mathbb{R}_-^*$ .

On a  $-\beta > 0$  donc  $1 \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(\ln^{-\beta} n)$ .

Donc  $\ln^\beta n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(1)$ . ■

---

*Démonstration 17.21*

Soient  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}_-^*$ .

On a  $-\alpha > 0$  et  $-\beta > 0$ .

Donc selon ce qui précède, on a, quand  $n \longrightarrow +\infty$  :  $\ln^{-\beta} n = o(n^{-\alpha})$ .

D'où :

$$n^\alpha \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(\ln^\beta n). \quad \blacksquare$$

---

*Démonstration 17.22*

Soient  $a \in ]0 ; 1[$  et  $\alpha \in \mathbb{R}_-^*$ .

De même,  $a^n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(n^\alpha)$  découle de ce qui précède. ■

### 17.1.5 Relation d'équivalence $\sim$

#### Définition/Proposition 17.23

Soient  $(u_n)_n, (v_n)_n \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ .

Les propositions suivantes sont équivalentes :

$$(1) \quad v_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} u_n + o(u_n)$$

$$(2) \quad u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} v_n + o(v_n)$$

(3) Il existe une suite  $(\lambda_n)_n \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$  telle que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \lambda_n = 1 \quad \text{et} \quad \exists N \in \mathbb{N}, \quad \forall n \in \llbracket N ; +\infty \llbracket, \quad u_n = \lambda_n v_n$$

(4) Il existe une suite  $(\mu_n)_n \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$  telle que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mu_n = 1 \quad \text{et} \quad \exists N \in \mathbb{N}, \quad \forall n \in \llbracket N ; +\infty \llbracket, \quad v_n = \mu_n u_n.$$

Lorsqu'elles sont vérifiées, on dit que

$$(u_n)_n \text{ est équivalente à } (v_n)_n$$

ou que

$$u_n \text{ est équivalent à } v_n \text{ quand } n \text{ tend vers } +\infty$$

$$u_n \text{ est un équivalent de } v_n \text{ quand } n \text{ tend vers } +\infty$$

et on note :

$$u_n \sim v_n \text{ quand } n \text{ tend vers } +\infty$$

ou :

$$u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n.$$

*Démonstration 17.24 ((2)  $\iff$  (3))*

On a :

$$\begin{aligned} u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} v_n + o(v_n) &\iff \exists (\varepsilon_n)_n \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}, \quad \begin{cases} \exists N \in \mathbb{N}, \quad \forall n \in \llbracket N ; +\infty \llbracket, \quad u_n = v_n + \varepsilon_n v_n \\ \lim_n \varepsilon_n = 0 \end{cases} \\ &\iff \exists (\varepsilon_n)_n \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}, \quad \begin{cases} \exists N \in \mathbb{N}, \quad \forall n \in \llbracket N ; +\infty \llbracket, \quad u_n = (1 + \varepsilon_n) v_n \\ \lim_n \varepsilon_n = 0 \end{cases} \\ &\iff \exists (\lambda_n)_n \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}, \quad \begin{cases} \exists N \in \mathbb{N}, \quad \forall n \in \llbracket N ; +\infty \llbracket, \quad u_n = \lambda_n v_n \\ \lim_n \lambda_n = 1 \end{cases} \end{aligned}$$

■

---

Démonstration 17.25 ((1)  $\Longleftrightarrow$  (4))

Idem. ■

---

Démonstration 17.26 ((3)  $\Longleftrightarrow$  (4))

Claire en prenant  $\mu_n = \frac{1}{\lambda_n}$  à partir d'un certain rang. ■

---

**Proposition 17.27**

Soient  $(u_n)_n, (v_n)_n \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ .

Si les termes de  $(v_n)_n$  sont non-nuls à partir d'un certain rang :

$$\exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in [N ; +\infty[ , v_n \neq 0,$$

alors :

$$u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n \Longleftrightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} = 1.$$

---

Exemple 17.28

Soient  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ . On a :

$$n^\alpha \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n^\beta \Longleftrightarrow \alpha = \beta.$$

Soient  $a, b \in \mathbb{R}_+^*$ . On a :

$$a^n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} b^n \Longleftrightarrow a = b.$$

Soient  $d \in \mathbb{N}$ ,  $a_0, \dots, a_d \in \mathbb{C}$  tels que  $a_d \neq 0$  et  $P = a_d X^d + \dots + a_0 X^0 \in \mathbb{C}[X]$ . On a :

$$P(n) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} a_d n^d.$$

Soit  $(u_n)_n \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ . On a :

$$u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} 0 \Longleftrightarrow (u_n)_n \text{ est nulle à partir d'un certain rang}$$

et :

$$\forall \ell \in \mathbb{K} \setminus \{0\}, u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \ell \Longleftrightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell.$$

NB : l'équivalence précédente est valable pour toute limite finie non-nulle. En particulier, deux suites admettant une même limite finie non-nulle sont équivalentes.

## 17.1.6 Propriétés de $\sim$

### Proposition 17.29

La relation  $\sim$  est une relation d'équivalence sur  $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ .

### Proposition 17.30

Soient  $(u_n)_n, (v_n)_n \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ .

On a :

$$u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n \implies \begin{cases} u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \mathcal{O}(v_n) \\ v_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \mathcal{O}(u_n) \end{cases}$$

### Proposition 17.31 (Cas réel : limite et signe)

Soient  $(u_n)_n, (v_n)_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  et  $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$ .

$$\text{Si } \begin{cases} \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell \\ u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n \end{cases} \text{ alors } \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \ell.$$

Si  $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$  alors  $(u_n)_n$  et  $(v_n)_n$  sont de même signe au sens strict à partir d'un certain rang :

$$\exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \llbracket N ; +\infty \llbracket, \text{sg } u_n = \text{sg } v_n.$$

*Démonstration 17.32*

On suppose  $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$ .

$$\text{Soit } (\lambda_n)_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \text{ telle que } \begin{cases} \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \llbracket N ; +\infty \llbracket, v_n = \lambda_n u_n \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} \lambda_n = 1 \end{cases}$$

Supposons  $\lim_n u_n = \ell$ . Alors  $\lim_n \lambda_n u_n = \ell$  donc  $\lim_n v_n = \ell$ .

$$\text{Comme } \lim_n \lambda_n = 1, \text{ il existe } N \in \mathbb{N} \text{ tel que } \forall n \in \llbracket N ; +\infty \llbracket, \begin{cases} \lambda_n \geq \frac{1}{2} \\ v_n = \lambda_n u_n \end{cases} \text{ donc}$$

$$\forall n \in \llbracket N ; +\infty \llbracket, \text{sg } v_n = \text{sg } u_n. \quad \blacksquare$$

---

**Proposition 17.33 (Cas complexe : limite)**

Soient  $(u_n)_n, (v_n)_n \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$  et  $\ell \in \mathbb{C}$ .

$$\text{Si } \begin{cases} \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell \\ u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n \end{cases} \text{ alors } \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \ell.$$

---

**Proposition 17.34 (Produits)**

Soient  $(a_n)_n, (b_n)_n, (c_n)_n, (d_n)_n \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ .

On a, quand  $n$  tend vers  $+\infty$  :

$$\begin{cases} a_n \sim b_n \\ c_n \sim d_n \end{cases} \implies a_n c_n \sim b_n d_n.$$

---

**Proposition 17.35 (Puissances)**

Soient  $(u_n)_n, (v_n)_n \in (\mathbb{R}_+^*)^{\mathbb{N}}$  et  $\alpha \in \mathbb{R}$ .

On a, quand  $n$  tend vers  $+\infty$  :

$$u_n \sim v_n \implies u_n^\alpha \sim v_n^\alpha.$$

On retient en particulier :

$$u_n \sim v_n \implies \frac{1}{u_n} \sim \frac{1}{v_n}.$$

La même proposition est vraie en prenant  $(u_n)_n, (v_n)_n \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$  et  $\alpha \in \mathbb{N}$  ou en prenant  $(u_n)_n, (v_n)_n \in (\mathbb{C}^*)^{\mathbb{N}}$  et  $\alpha \in \mathbb{Z}$ .

---

**Proposition 17.36 (Suites extraites)**

Soient  $(u_n)_n, (v_n)_n \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$  et  $\varphi : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$  une fonction strictement croissante.

On a :

$$u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n \implies u_{\varphi(n)} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_{\varphi(n)}.$$

---

**Proposition 17.37 (Sommes)**

On ne fait pas de sommes d'équivalents.



---

*Démonstration 17.38*

Quand  $n$  tend vers  $+\infty$  :

$$\text{On a } \begin{cases} 1 + \frac{1}{n} \sim 1 \\ -1 + \frac{1}{n} \sim -1 \end{cases} \quad \text{mais on n'a pas } \frac{2}{n} \sim 0.$$

■

---

**Proposition 17.39**

Soient  $(a_n)_n, (b_n)_n, (c_n)_n, (d_n)_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ .

On suppose  $\begin{cases} \forall n \in \mathbb{N}, a_n \leq b_n \leq c_n \\ \text{quand } n \longrightarrow +\infty, a_n \sim c_n \sim d_n \end{cases}$

Alors :

$$b_n \underset{n \longrightarrow +\infty}{\sim} d_n.$$

---

*Démonstration 17.40*

Soient  $(\lambda_n)_n, (\mu_n)_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  telles que  $\begin{cases} \lim_n \lambda_n = \lim_n \mu_n = 1 \\ \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \llbracket N ; +\infty \llbracket, \begin{cases} a_n = \lambda_n d_n \\ c_n = \mu_n d_n \end{cases} \end{cases}$

Soit un tel  $N \in \mathbb{N}$ .

On a :

$$\forall n \in \llbracket N ; +\infty \llbracket, \begin{cases} \lambda_n = \frac{a_n}{d_n} \leq \frac{b_n}{d_n} \leq \frac{c_n}{d_n} = \mu_n & \text{si } d_n > 0 \\ \mu_n \leq \frac{c_n}{d_n} \leq \frac{b_n}{d_n} \leq \frac{a_n}{d_n} = \lambda_n & \text{si } d_n < 0 \\ b_n = 0 & \text{si } d_n = 0 \end{cases}$$

$$\text{Posons } \forall n \in \mathbb{N}, \nu_n = \begin{cases} 1 & \text{si } d_n = 0 \\ \frac{b_n}{d_n} & \text{si } d_n \neq 0 \end{cases}$$

On a :

$$\forall n \in \llbracket N ; +\infty \llbracket, b_n = \nu_n d_n$$

et :

$$\forall n \in \llbracket N ; +\infty \llbracket, \min \{ \lambda_n ; \mu_n \} \leq \nu_n \leq \max \{ \lambda_n ; \mu_n \} \quad \text{ou} \quad \nu_n = 1.$$

Donc  $\lim_n \nu_n = 1$  donc  $b_n \underset{n \longrightarrow +\infty}{\sim} d_n$ .

■

---

*Exemple 17.41*

Soit  $(u_n)_n \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$  telle que  $\forall n \in \mathbb{N}, n-1 \leq u_n \leq n+2$ .

On a, quand  $n \longrightarrow +\infty : n-1 \sim n+2 \sim n$ .

Donc  $u_n \underset{n \longrightarrow +\infty}{\sim} n$ .

## 17.1.7 Formule de Stirling

---

### Théorème 17.42 (Formule de Stirling)

On a :

$$n! \underset{n \longrightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n.$$

---

*Démonstration 17.43*

★★ Admise ★★

■

## 17.2 Relations de comparaison : cas général

On va maintenant étendre ce qui précède au cas des fonctions définies sur un ensemble  $A \subseteq \mathbb{R}$ , à valeurs dans  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$  et dont on étudie le comportement au voisinage d'un point  $a \in \overline{\mathbb{R}}$ .

Pour cela, on suppose qu'il existe des points où la fonction  $f$  est définie et qui sont arbitrairement proches de  $a$  (autrement, étudier le comportement de  $f$  au voisinage de  $a$  n'a pas de sens).

Précisément, on supposera que tout voisinage de  $a$  dans  $\mathbb{R}$  rencontre  $A$  :

$$\forall V \in \mathcal{V}(a), V \cap A \neq \emptyset.$$

- Si  $a = +\infty$ , cela signifie que  $A$  est une partie de  $\mathbb{R}$  non-majorée.
- Si  $a = -\infty$ , cela signifie que  $A$  est une partie de  $\mathbb{R}$  non-minorée.
- Si  $a \in \mathbb{R}$ , cela signifie :  $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists a' \in A, |a' - a| \leq \varepsilon$ .

On fixe dans la suite une telle partie  $A$  et un tel point  $a \in \overline{\mathbb{R}}$ .

### 17.2.1 Relation de domination $\mathcal{O}$

---

**Définition/Proposition 17.44**

Soient  $f, g \in \mathcal{F}(A, \mathbb{K})$ .

Les propositions suivantes sont équivalentes :

(1)  $\exists M \in \mathbb{R}_+, \exists V \in \mathcal{V}(a), \forall t \in V, |f(t)| \leq M |g(t)|$

(2) Il existe une fonction  $\lambda \in \mathcal{F}(A, \mathbb{K})$  telle que :

$$\lambda \text{ est bornée} \quad \text{et} \quad \exists V \in \mathcal{V}(a), \forall t \in V, f(t) = \lambda(t) g(t).$$

Lorsqu'elles sont vérifiées, on dit que

$g$  domine  $f$

ou que

$g(t)$  domine  $f(t)$  quand  $t$  tend vers  $a$

et on note :

$$f(t) = \mathcal{O}(g(t)) \text{ quand } t \text{ tend vers } a$$

ou :

$$f(t) \underset{t \rightarrow a}{=} \mathcal{O}(g(t)).$$

---

**Proposition 17.45**

Soient  $f, g \in \mathcal{F}(A, \mathbb{K})$ .

Si  $g$  ne s'annule pas sur un voisinage  $V$  de  $a$  :

$$\forall t \in V, g(t) \neq 0,$$

alors :

$$f(t) \underset{t \rightarrow a}{=} \mathcal{O}(g(t)) \iff \frac{f}{g} \text{ est bornée sur } V.$$

Si  $g$  ne s'annule pas :

$$\forall t \in A, g(t) \neq 0,$$

alors :

$$f(t) \underset{t \rightarrow a}{=} \mathcal{O}(g(t)) \iff \frac{f}{g} \text{ est bornée sur un voisinage de } a.$$

---

*Exemple 17.46*

Soient  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ . On a, quand  $t$  tend vers  $+\infty$  :

$$t^\alpha = \mathcal{O}(t^\beta) \iff \alpha \leq \beta.$$

Soit  $f \in \mathcal{F}(A, \mathbb{K})$ . On a, quand  $t$  tend vers  $a$  :

$$\begin{aligned} f(t) = \mathcal{O}(0) &\iff f \text{ est nulle sur un voisinage de } a \\ &\iff \exists V \in \mathcal{V}(a), \forall t \in V \cap A, f(t) = 0 \end{aligned}$$

et :

$$f(t) = \mathcal{O}(1) \iff f \text{ est bornée sur un voisinage de } a,$$

c'est-à-dire :

$$f(t) = \mathcal{O}(1) \iff \exists V \in \mathcal{V}(a), \exists M \in \mathbb{R}_+, \forall t \in V \cap A, |f(t)| \leq M.$$

## 17.2.2 Relation de négligeabilité $o$

---

### Définition/Proposition 17.47

Soient  $f, g \in \mathcal{F}(A, \mathbb{K})$ .

Les propositions suivantes sont équivalentes :

$$(1) \forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists V \in \mathcal{V}(a), \forall t \in V, |f(t)| \leq \varepsilon |g(t)|$$

(2) Il existe une fonction  $\varepsilon \in \mathcal{F}(A, \mathbb{K})$  telle que :

$$\lim_{t \rightarrow a} \varepsilon(t) = 0 \quad \text{et} \quad \exists V \in \mathcal{V}(a), \forall t \in V, f(t) = \varepsilon(t) g(t).$$

Lorsqu'elles sont vérifiées, on dit que

$f$  est négligeable devant  $g$

ou que

$f(t)$  est négligeable devant  $g(t)$  quand  $t$  tend vers  $a$

et on note :

$$f(t) = o(g(t)) \text{ quand } t \text{ tend vers } a$$

ou :

$$f(t) \underset{t \rightarrow a}{=} o(g(t)).$$

---

**Proposition 17.48**

Soient  $f, g \in \mathcal{F}(A, \mathbb{K})$ .

Si  $g$  ne s'annule pas au voisinage de  $a$  :

$$\exists V \in \mathcal{V}(a), \forall t \in V, g(t) \neq 0,$$

alors :

$$f(t) \underset{t \rightarrow a}{=} o(g(t)) \iff \lim_{t \rightarrow a} \frac{f(t)}{g(t)} = 0.$$

---

**Exemple 17.49**

Soient  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ . On a, quand  $t$  tend vers  $a$  :

$$t^\alpha = o(t^\beta) \iff \alpha < \beta.$$

Soit  $f \in \mathcal{F}(A, \mathbb{K})$ . On a :

$$f(t) \underset{t \rightarrow a}{=} o(0) \iff f \text{ est nulle sur un voisinage de } a$$

et :

$$f(t) \underset{t \rightarrow a}{=} o(1) \iff \lim_{t \rightarrow a} f(t) = 0.$$

### 17.2.3 Propriétés de $\mathcal{O}$ et $o$

---

**Proposition 17.50**

Soient  $f, g \in \mathcal{F}(A, \mathbb{K})$ .

On a :

$$f(t) \underset{t \rightarrow a}{=} o(g(t)) \implies f(t) \underset{t \rightarrow a}{=} \mathcal{O}(g(t)).$$

---

**Proposition 17.51**

Soient  $f, g \in \mathcal{F}(A, \mathbb{K})$  et  $\ell, \ell' \in [0; +\infty]$  tels que :

$$\lim_{t \rightarrow a} |f(t)| = \ell \quad \text{et} \quad \lim_{t \rightarrow a} |g(t)| = \ell'.$$

On a, quand  $t$  tend vers  $a$  :

- (1) Si  $\ell = 0$  et  $\ell' \neq 0$  alors  $f(t) = o(g(t))$
- (2) Si  $\ell \in [0; +\infty[$  et  $\ell' = +\infty$  alors  $f(t) = o(g(t))$
- (3) Si  $\ell, \ell' \in ]0; +\infty[$  alors  $f(t) = \mathcal{O}(g(t))$
- (4) Si  $\ell = \ell' = 0$  ou  $\ell = \ell' = +\infty$ , on ne peut rien dire.

---

**Proposition 17.52 (Transitivités)**

Soient  $f, g, h \in \mathcal{F}(A, \mathbb{K})$ .

On  $a$ , quand  $t$  tend vers  $a$  :

$$(1) \text{ Si } \begin{cases} f(t) = \mathcal{O}(g(t)) \\ g(t) = \mathcal{O}(h(t)) \end{cases} \text{ alors } f(t) = \mathcal{O}(h(t)).$$

Autrement dit : la relation de domination est transitive.

$$(2) \text{ Si } \begin{cases} f(t) = \mathcal{O}(g(t)) \\ g(t) = o(h(t)) \end{cases} \text{ ou } \begin{cases} f(t) = o(g(t)) \\ g(t) = \mathcal{O}(h(t)) \end{cases} \text{ alors } f(t) = o(h(t)).$$

(3) En particulier, la relation de négligeabilité est transitive.

---

**Proposition 17.53 (Sommes)**

Soient  $f, g, h \in \mathcal{F}(A, \mathbb{K})$ .

On  $a$ , quand  $t$  tend vers  $a$  :

$$(1) \text{ Si } \begin{cases} f(t) = \mathcal{O}(h(t)) \\ g(t) = \mathcal{O}(h(t)) \end{cases} \text{ alors } f(t) + g(t) = \mathcal{O}(h(t)).$$

$$(2) \text{ Si } \begin{cases} f(t) = o(h(t)) \\ g(t) = o(h(t)) \end{cases} \text{ alors } f(t) + g(t) = o(h(t)).$$

---

**Proposition 17.54 (Produits)**

Soient  $f, g, h, k \in \mathcal{F}(A, \mathbb{K})$ .

On  $a$ , quand  $t$  tend vers  $a$  :

$$(1) \text{ Si } \begin{cases} f(t) = \mathcal{O}(g(t)) \\ h(t) = \mathcal{O}(k(t)) \end{cases} \text{ alors } f(t) h(t) = \mathcal{O}(g(t) k(t)).$$

(2) En particulier : si  $f(t) = \mathcal{O}(g(t))$  alors  $f(t) h(t) = \mathcal{O}(g(t) h(t))$ .

$$(3) \text{ Si } \begin{cases} f(t) = o(g(t)) \\ h(t) = \mathcal{O}(k(t)) \end{cases} \text{ alors } f(t) h(t) = o(g(t) k(t)).$$

(4) En particulier : si  $f(t) = o(g(t))$  alors  $f(t) h(t) = o(g(t) h(t))$ .

---

**Proposition 17.55 (Puissances)**

Soient  $f, g \in \mathcal{F}(A, \mathbb{R}_+^*)$  et  $\alpha \in \mathbb{R}$ .

On a, quand  $t$  tend vers  $a$  :

$$(1) \text{ Si } \begin{cases} f(t) = \mathcal{O}(g(t)) \\ \alpha \geq 0 \end{cases} \quad \text{alors } f(t)^\alpha = \mathcal{O}(g(t)^\alpha).$$

$$(2) \text{ Si } \begin{cases} f(t) = \mathcal{O}(g(t)) \\ \alpha \leq 0 \end{cases} \quad \text{alors } g(t)^\alpha = \mathcal{O}(f(t)^\alpha).$$

$$(3) \text{ Si } \begin{cases} f(t) = o(g(t)) \\ \alpha > 0 \end{cases} \quad \text{alors } f(t)^\alpha = o(g(t)^\alpha).$$

$$(4) \text{ Si } \begin{cases} f(t) = o(g(t)) \\ \alpha < 0 \end{cases} \quad \text{alors } g(t)^\alpha = o(f(t)^\alpha).$$

On retient en particulier :

$$f(t) = \mathcal{O}(g(t)) \implies \frac{1}{g(t)} = \mathcal{O}\left(\frac{1}{f(t)}\right) \quad \text{et} \quad f(t) = o(g(t)) \implies \frac{1}{g(t)} = o\left(\frac{1}{f(t)}\right).$$

La même proposition est vraie en prenant  $f, g \in \mathcal{F}(A, \mathbb{C})$  et  $\alpha \in \mathbb{N}$  ou en prenant  $f, g \in \mathcal{F}(A, \mathbb{C}^*)$  et  $\alpha \in \mathbb{Z}$ .

## 17.2.4 Relation d'équivalence $\sim$

---

**Définition/Proposition 17.56**

Soient  $f, g \in \mathcal{F}(A, \mathbb{K})$ .

Les propositions suivantes sont équivalentes :

$$(1) \quad g(t) \underset{t \rightarrow a}{\sim} f(t) + o(f(t))$$

$$(2) \quad f(t) \underset{t \rightarrow a}{\sim} g(t) + o(g(t))$$

(3) Il existe une fonction  $\lambda \in \mathcal{F}(A, \mathbb{K})$  telle que :

$$\lim_{t \rightarrow a} \lambda(t) = 1 \quad \text{et} \quad \exists V \in \mathcal{V}(a), \quad \forall t \in V, \quad f(t) = \lambda(t) g(t)$$

(4) Il existe une fonction  $\mu \in \mathcal{F}(A, \mathbb{K})$  telle que :

$$\lim_{t \rightarrow a} \mu(t) = 1 \quad \text{et} \quad \exists V \in \mathcal{V}(a), \quad \forall t \in V, \quad g(t) = \mu(t) f(t).$$

Lorsqu'elles sont vérifiées, on dit que

$f$  est équivalente à  $g$

ou

$f(t)$  est équivalent à  $g(t)$  quand  $t$  tend vers  $a$

$f(t)$  est un équivalent de  $g(t)$  quand  $t$  tend vers  $a$

et on note :

$f(t) \sim g(t)$  quand  $t$  tend vers  $a$

ou :

$$f(t) \underset{t \rightarrow a}{\sim} g(t).$$

### Proposition 17.57

Soient  $f, g \in \mathcal{F}(A, \mathbb{K})$ .

Si  $g$  ne s'annule pas au voisinage de  $a$  :

$$\exists V \in \mathcal{V}(a), \forall t \in V, g(t) \neq 0,$$

alors :

$$f(t) \underset{t \rightarrow a}{\sim} g(t) \iff \lim_{t \rightarrow a} \frac{f(t)}{g(t)} = 1.$$

### Exemple 17.58

Soient  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ . On a :

$$t^\alpha \underset{t \rightarrow a}{\sim} t^\beta \iff \alpha = \beta.$$

Soient  $d \in \mathbb{N}$ ,  $a_0, \dots, a_d \in \mathbb{C}$  tels que  $a_d \neq 0$  et  $P = a_d X^d + \dots + a_0 X^0 \in \mathbb{C}[X]$ . On a :

$$P(t) \underset{t \rightarrow +\infty}{\sim} a_d t^d.$$

Soit  $f \in \mathcal{F}(A, \mathbb{K})$ . On a :

$$f(t) \underset{t \rightarrow a}{\sim} 0 \iff f \text{ est nulle sur un voisinage de } a$$

et :

$$\forall \ell \in \mathbb{K} \setminus \{0\}, f(t) \underset{t \rightarrow a}{\sim} \ell \iff \lim_{t \rightarrow a} f(t) = \ell.$$

NB : l'équivalence précédente est valable pour toute limite finie non-nulle. En particulier, deux fonctions admettant un même limite finie non-nulle sont équivalentes.



## 17.2.5 Propriétés de $\sim$

---

### Proposition 17.59

La relation « être équivalentes au voisinage de  $a$  » est une relation d'équivalence sur  $\mathcal{F}(A, \mathbb{K})$ .

---

### Proposition 17.60

Soient  $f, g \in \mathcal{F}(A, \mathbb{K})$ .

On a :

$$f(t) \underset{t \rightarrow a}{\sim} g(t) \implies \begin{cases} f(t) \underset{t \rightarrow a}{=} \mathcal{O}(g(t)) \\ g(t) \underset{t \rightarrow a}{=} \mathcal{O}(f(t)) \end{cases}$$

---

### Proposition 17.61 (Cas réel : limite et signe)

Soient  $f, g \in \mathcal{F}(A, \mathbb{R})$  et  $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$ .

$$\text{Si } \begin{cases} \lim_{t \rightarrow a} f(t) = \ell \\ f(t) \underset{t \rightarrow a}{\sim} g(t) \end{cases} \text{ alors } \lim_{t \rightarrow a} g(t) = \ell.$$

Si  $f(t) \underset{t \rightarrow a}{\sim} g(t)$  alors  $f$  et  $g$  sont de même signe au sens strict sur un voisinage de  $a$  :

$$\exists V \in \mathcal{V}(a), \forall t \in V, \text{sg } f(t) = \text{sg } g(t).$$

---

### Proposition 17.62 (Cas complexe : limite)

Soient  $f, g \in \mathcal{F}(A, \mathbb{C})$  et  $\ell \in \mathbb{C}$ .

$$\text{Si } \begin{cases} \lim_{t \rightarrow a} f(t) = \ell \\ f(t) \underset{t \rightarrow a}{\sim} g(t) \end{cases} \text{ alors } \lim_{t \rightarrow a} g(t) = \ell.$$

---

### Proposition 17.63 (Produits)

Soient  $f, g, h, k \in \mathcal{F}(A, \mathbb{K})$ .

On a, quand  $t$  tend vers  $a$  :

$$\begin{cases} f(t) \sim g(t) \\ h(t) \sim k(t) \end{cases} \implies f(t)h(t) \sim g(t)k(t).$$

---

**Proposition 17.64 (Puissances)**

Soient  $f, g \in \mathcal{F}(A, \mathbb{R}_+^*)$  et  $\alpha \in \mathbb{R}$ .

On a, quand  $t$  tend vers  $a$  :

$$f(t) \sim g(t) \implies f(t)^\alpha \sim g(t)^\alpha.$$

On retient en particulier :

$$f(t) \sim g(t) \implies \frac{1}{f(t)} \sim \frac{1}{g(t)}.$$

La même proposition est vraie en prenant  $f, g \in \mathcal{F}(A, \mathbb{C})$  et  $\alpha \in \mathbb{N}$  ou en prenant  $f, g \in \mathcal{F}(A, \mathbb{C}^*)$  et  $\alpha \in \mathbb{Z}$ .

---

**Proposition 17.65 (Sommes)**

On ne fait pas de sommes d'équivalents.

---

**Proposition 17.66**

Soient  $f, g, h, k \in \mathcal{F}(A, \mathbb{R})$ .

$$\text{Si } \begin{cases} f \leq g \leq h \\ f \sim h \sim k \end{cases} \text{ alors } g \sim k.$$

## 17.2.6 Changements de variable

---

**Proposition 17.67**

Soient  $B \subseteq \mathbb{R}$  et  $b \in \overline{\mathbb{R}}$  tels que tout voisinage de  $b$  dans  $\mathbb{R}$  rencontre  $B$  :

$$\forall V \in \mathcal{V}(b), V \cap B \neq \emptyset.$$

Soient  $\varphi : B \longrightarrow A$  telle que  $\lim_{s \rightarrow b} \varphi(s) = a$  et  $f, g \in \mathcal{F}(A, \mathbb{K})$ .

On a :

$$(1) \text{ Si } f(t) \underset{t \rightarrow a}{=} \mathcal{O}(g(t)) \text{ alors } f(\varphi(s)) \underset{s \rightarrow b}{=} \mathcal{O}(g(\varphi(s))).$$

$$(2) \text{ Si } f(t) \underset{t \rightarrow a}{=} o(g(t)) \text{ alors } f(\varphi(s)) \underset{s \rightarrow b}{=} o(g(\varphi(s))).$$

$$(3) \text{ Si } f(t) \underset{t \rightarrow a}{\sim} g(t) \text{ alors } f(\varphi(s)) \underset{s \rightarrow b}{\sim} g(\varphi(s)).$$

## 17.2.7 Croissances comparées

### Proposition 17.68 (Croissances comparées en $+\infty$ )

Soient  $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2, \gamma_1, \gamma_2 \in \mathbb{R}$  tels que :

$$\alpha_1 < 0 < \alpha_2 \quad \text{et} \quad \beta_1 < 0 < \beta_2 \quad \text{et} \quad \gamma_1 < 0 < \gamma_2.$$

On a, quand  $t$  tend vers  $+\infty$  :

$$\underbrace{e^{\gamma_1 t} < t^{\alpha_1} < \ln^{\beta_1} t}_{\text{fonctions de } t \text{ de limite nulle}} < 1 < \underbrace{\ln^{\beta_2} t < t^{\alpha_2} < e^{\gamma_2 t}}_{\text{fonctions de } t \text{ de limite } +\infty}.$$

Démonstration 17.69

Cf. Proposition 17.15. ■

### Proposition 17.70 (Croissances comparées en $0^+$ )

Soient  $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2 \in \mathbb{R}$  tels que :

$$\alpha_1 < 0 < \alpha_2 \quad \text{et} \quad \beta_1 < 0 < \beta_2.$$

On a, quand  $t$  tend vers  $0^+$  :

$$\underbrace{t^{\alpha_2} < |\ln t|^{\beta_1}}_{\text{fonctions de } t \text{ de limite nulle}} < 1 < \underbrace{|\ln t|^{\beta_2} < t^{\alpha_1}}_{\text{fonctions de } t \text{ de limite } +\infty}.$$

Démonstration 17.71

Découle de la Proposition 17.68 par un changement de variable.

Par exemple, on a vu  $\ln^{\beta_2} s \underset{s \rightarrow +\infty}{=} o(s^{-\alpha_1})$  car  $-\alpha_1 > 0$ .

Or  $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t} = +\infty$  donc  $\ln^{\beta_2} \frac{1}{t} \underset{t \rightarrow 0^+}{=} o\left(\left(\frac{1}{t}\right)^{-\alpha_1}\right)$ .

D'où  $|\ln t|^{\beta_2} \underset{t \rightarrow 0^+}{=} o(t^{\alpha_1})$ . ■

### Exercice/Exemple 17.72

Calculer :

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} t \ln t.$$

Correction 17.73

On a  $\ln t \underset{t \rightarrow 0^+}{=} o\left(\frac{1}{t}\right)$  donc  $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln t}{1/t} = 0$ .

Donc

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} t \ln t = 0.$$

## 17.2.8 Erreurs à ne pas faire

### 17.2.8.1 Sommes d'équivalents

Quand  $t \rightarrow 0^+$  :

On a  $\frac{1}{t} + \ln t \sim \frac{1}{t} + 1$  car  $\ln t = o\left(\frac{1}{t}\right)$ .

De plus, on a  $1 = o\left(\frac{1}{t}\right)$  donc

$$\frac{1}{t} + \ln t = \frac{1}{t} + o\left(\frac{1}{t}\right) \sim \frac{1}{t} \quad \text{et} \quad \frac{1}{t} + 1 = \frac{1}{t} + o\left(\frac{1}{t}\right) \sim \frac{1}{t}.$$

D'autre part,  $\frac{-1}{t} \sim \frac{-1}{t}$  mais on n'a pas  $\ln t \sim 1$ .

### 17.2.8.2 Limite nulle donc équivalent nul

L'affirmation «  $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{t} = 0$  donc  $\frac{1}{t} \underset{t \rightarrow +\infty}{\sim} 0$  » est fausse car  $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{0}{1/t} \neq 1$ .

### 17.2.8.3 Appliquer une fonction à un équivalent

On a, quand  $n \rightarrow +\infty$  :  $\frac{1}{n} + 1 \sim \frac{2}{n} + 1$  mais on n'a pas  $\ln\left(\frac{1}{n} + 1\right) \sim \ln\left(\frac{2}{n} + 1\right)$ .

En effet, on a  $\lim_{\substack{t \rightarrow 0 \\ t \neq 0}} \frac{\ln(1+t) - \ln 1}{t - 0} = \ln' 1 = 1$  donc  $\ln(1+t) \underset{t \rightarrow 0}{\sim} t$ .

Or  $\lim_n \frac{1}{n} = \lim_n \frac{2}{n} = 0$ .

$$\text{Donc} \begin{cases} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n} \\ \ln\left(1 + \frac{2}{n}\right) \sim \frac{2}{n} \end{cases}$$

Autre exemple : on a  $n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n+1$  mais on n'a pas  $e^n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} e^{n+1}$  car  $\lim_n \frac{e^{n+1}}{e^n} = e \neq 1$ .

### 17.2.8.4 Changement de variable inadéquat

On a  $\ln(1+t) \underset{t \rightarrow 0}{\sim} t$ .

L'affirmation « donc  $\ln(1+e^x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} e^x$  » est fausse car  $e^x \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty \neq 0$ .

## 17.3 Développements limités

### Développements limités usuels

Soit  $\alpha \in \mathbb{R}$ .

On a, quand  $x$  tend vers 0 :

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{k=0}^n (-x)^k + o(x^n) = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots + (-1)^n x^n + o(x^n)$$

$$\ln(1+x) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k} + o(x^n) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n)$$

$$e^x = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + o(x^n) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

$$\cos x = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n+1}) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1})$$

$$\sin x = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+2}) = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2})$$

$$\operatorname{ch} x = \sum_{k=0}^n \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n+1}) = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + \cdots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1})$$

$$\operatorname{sh} x = \sum_{k=0}^n \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+2}) = x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2})$$

$$\operatorname{Arctan} x = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1} + o(x^{2n+2}) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+2})$$

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \frac{17x^7}{315} + o(x^8)$$

$$(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^n \binom{\alpha}{k} x^k + o(x^n) = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2} x^2 + \cdots + \binom{\alpha}{n} x^n + o(x^n)$$

en posant :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad \binom{\alpha}{k} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)}{k!}$$

(même si  $\alpha$  n'est pas un entier).

#### 17.3.1 Définition

---

**Définition 17.74 (Développement limité)**

Soient  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$ ,  $f : I \longrightarrow \mathbb{K}$ ,  $a \in I$  et  $n \in \mathbb{N}$ .

On dit que  $f$  admet un développement limité à l'ordre  $n$  en  $a$  s'il existe  $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{K}$  tels que :

$$f(a+h) \underset{h \rightarrow 0}{=} a_0 h^0 + \dots + a_n h^n + o(h^n),$$

c'est-à-dire :

$$f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} a_0 (x-a)^0 + \dots + a_n (x-a)^n + o((x-a)^n).$$

Autrement dit : il existe  $P \in \mathbb{K}[X]$  tel que :

$$f(a+h) \underset{h \rightarrow 0}{=} P(h) + o(h^n).$$

NB : les termes de  $P$  de degrés strictement supérieurs à  $n$  vont « dans le  $o$  ».

---

*Exemple 17.75*

Soit  $n \in \mathbb{N}$ .

On a :

$$\frac{1}{1-x} \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + x + x^2 + \dots + x^n + o(x^n).$$

---

*Démonstration 17.76*

On a  $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$ ,  $1 + x + \dots + x^n = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}$  donc :

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}, \quad \frac{1}{1-x} = x^0 + \dots + x^n + \frac{x^{n+1}}{1-x}.$$

Or, quand  $x \longrightarrow 0$  :

$$\frac{x^{n+1}}{1-x} = x^n \frac{x}{1-x} = x^n o(1) = o(x^n).$$

Donc :

$$\frac{1}{1-x} \underset{x \rightarrow 0}{=} x^0 + \dots + x^n + o(x^n). \quad \blacksquare$$

---

**Corollaire 17.77**

Soit  $n \in \mathbb{N}$ .

On a :

$$\frac{1}{1+x} \underset{x \rightarrow 0}{=} \sum_{k=0}^n (-1)^k x^k + o(x^n).$$

## 17.3.2 Propriétés des développements limités

### Proposition 17.78 (Unicité du développement limité)

Soient  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$ ,  $f : I \longrightarrow \mathbb{K}$ ,  $a \in I$ ,  $n \in \mathbb{N}$  et  $a_0, \dots, a_n, b_0, \dots, b_n \in \mathbb{K}$ .

On suppose qu'on a, quand  $h \longrightarrow 0$  :

$$f(a+h) = a_0 h^0 + \dots + a_n h^n + o(h^n) = b_0 h^0 + \dots + b_n h^n + o(h^n).$$

Alors  $\forall k \in \llbracket 0 ; n \rrbracket$ ,  $a_k = b_k$ .

*Démonstration 17.79*

On raisonne par l'absurde.

Soit  $k \in \llbracket 0 ; n \rrbracket$  tel que  $\begin{cases} \forall \ell \in \llbracket 0 ; k-1 \rrbracket, & a_\ell = b_\ell \\ a_k \neq b_k \end{cases}$

On obtient, par différence :

$$\begin{aligned} \underbrace{(a_k - b_k) h^k}_{\neq 0} &= \underbrace{(b_{k+1} - a_{k+1}) h^{k+1}}_{=o(h^k)} + \dots + \underbrace{(b_n - a_n) h^n}_{=o(h^k)} + \underbrace{o(h^n)}_{=o(h^k)} \\ &= o(h^k). \end{aligned}$$

Donc  $h^k = o(h^k)$  : contradiction. ■

### Proposition 17.80

Soient  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$ ,  $f : I \longrightarrow \mathbb{K}$  et  $a \in I$ .

On a :

- (1)  $f$  admet un développement limité à l'ordre 0 en  $a \iff f$  est continue en  $a$
- (2)  $f$  admet un développement limité à l'ordre 1 en  $a \iff f$  est dérivable en  $a$ .

*Démonstration 17.81 (1)*

$\implies$

On suppose qu'il existe  $a_0 \in \mathbb{K}$  tel que  $f(a+h) \underset{h \rightarrow 0}{=} a_0 + o(1)$ .

On a  $\lim_{h \rightarrow 0} f(a+h) = a_0 \in \mathbb{K}$ .

Donc  $f$  est continue en  $a$  et  $f(a) = a_0$ .



Supposons  $f$  continue en  $a$ .

$$\text{Alors } \lim_{h \rightarrow 0} f(a+h) = f(a).$$

$$\text{Donc } f(a+h) \underset{h \rightarrow 0}{=} f(a) + o(1).$$

Donc  $f$  admet un développement limité à l'ordre 0 en  $a$ . ■

*Démonstration 17.82 (2)*



On suppose qu'il existe  $a_0, a_1 \in \mathbb{K}$  tels que  $f(a+h) \underset{h \rightarrow 0}{=} a_0 + a_1 h + o(h)$ .

On a, en prenant  $h = 0$  :  $f(a) = a_0$ .

$$\text{D'où } f(a+h) - f(a) \underset{h \rightarrow 0}{=} a_1 h + o(h).$$

$$\text{Donc } \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \underset{\substack{h \rightarrow 0 \\ h \neq 0}}{=} a_1 + o(1).$$

$$\text{Donc } \lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h \neq 0}} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = a_1 \in \mathbb{K}.$$

Donc  $f$  est dérivable en  $a$  et  $a_1 = f'(a)$ .



Supposons  $f$  dérivable en  $a$ .

$$\text{On a } \lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h \neq 0}} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = f'(a) \in \mathbb{K}.$$

$$\text{Donc } \lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h \neq 0}} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} - f'(a) = 0.$$

$$\text{Donc } \frac{f(a+h) - f(a) - hf'(a)}{h} \underset{\substack{h \rightarrow 0 \\ h \neq 0}}{=} o(1).$$

$$\text{Donc } f(a+h) - f(a) - hf'(a) \underset{h \rightarrow 0}{=} o(h).$$

D'où le développement limité à l'ordre 1 en  $a$  :

$$f(a+h) \underset{h \rightarrow 0}{=} f(a) + f'(a)h + o(h). \quad \text{■}$$

*Remarque 17.83*

On a aussi obtenu que le coefficient de degré 0 est  $f(a)$  et que le coefficient de degré 1 est  $f'(a)$ .



---

Exemple 17.84

On a, quand  $h \rightarrow 0$  :

$$\begin{array}{lll} \ln(1+h) = 0 + h + o(h) & \exp(h) = 1 + h + o(h) & \sin h = 0 + h + o(h) \\ = h + o(h) & \exp(h) - 1 \sim h & = h + o(h) \\ \sim h & & \sim h. \end{array}$$

---

**Proposition 17.85 (Tronquer un développement limité)**

Soient  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$ ,  $a \in I$ ,  $f : I \rightarrow \mathbb{K}$  et  $n \in \mathbb{N}$ .

Si  $f$  admet un développement limité d'ordre  $n+1$  en  $a$  alors  $f$  admet un développement limité d'ordre  $n$  en  $a$  obtenu en « tronquant » son développement limité à l'ordre  $n+1$  en  $a$ .

---

Démonstration 17.86

Supposons qu'on a :

$$f(a+h) \underset{h \rightarrow 0}{=} a_0 h^0 + \cdots + a_n h^n + \underbrace{a_{n+1} h^{n+1}}_{=o(h^n)} + \underbrace{o(h^{n+1})}_{=o(h^n)}.$$

Alors on a :

$$f(a+h) \underset{h \rightarrow 0}{=} a_0 h^0 + \cdots + a_n h^n + o(h^n).$$

D'où la proposition. ■

---

**Proposition 17.87**

Soient  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$ ,  $a \in I$ ,  $n \in \mathbb{N}$  et  $f, g \in \mathcal{F}(I, \mathbb{K})$ .

Si  $f$  et  $g$  admettent un développement limité d'ordre  $n$  en  $a$  alors  $f+g$  et  $fg$  aussi.

---

Démonstration 17.88

Soient  $P, Q \in \mathbb{K}_n[X]$  tels que, quand  $h \rightarrow 0$  :

$$\begin{cases} f(a+h) = P(h) + o(h^n) \\ g(a+h) = Q(h) + o(h^n) \end{cases}$$

On a :

$$(f+g)(a+h) = (P+Q)(a+h) + o(h^n)$$

et

$$\begin{aligned}
 (fg)(a+h) &= [P(h) + o(h^n)] [Q(h) + o(h^n)] \\
 &= P(h)Q(h) + \underbrace{P(h)o(h^n)}_{=o(h^n)\mathcal{O}(1)=o(h^n)} + \underbrace{o(h^n)Q(h)}_{=o(h^n)\mathcal{O}(1)=o(h^n)} + \underbrace{o(h^n)o(h^n)}_{=o(h^{2n})=o(h^n)} \\
 &= \underbrace{P(h)Q(h)}_{\star} + o(h^n).
 \end{aligned}$$

★ : il peut y avoir des termes de degré appartenant à l'intervalle entier  $\llbracket n+1 ; 2n \rrbracket$  mais ils sont négligeables devant  $h^n$ . ■

---

*Remarque 17.89*

On peut également faire des quotients et des composées de développements limités : on le montrera au cas par cas.

### 17.3.3 Applications

---

**Proposition 17.90**

Soient  $I$  et  $J$  deux intervalles de  $\mathbb{R}$ ,  $a \in I$ ,  $f : I \longrightarrow J$  dérivable en  $a$  et  $g : J \longrightarrow \mathbb{K}$  dérivable en  $f(a)$ .

Alors  $g \circ f$  est dérivable en  $a$  et on a :

$$(g \circ f)'(a) = f'(a) \times g'(f(a)).$$

---

*Démonstration 17.91*

Comme  $f$  et  $g$  sont dérivables en  $a$  et  $f(a)$  respectivement, on a :

$$\begin{cases} f(a+h) \underset{h \rightarrow 0}{=} f(a) + f'(a)h + o(h) \\ g(f(a)+h) \underset{h \rightarrow 0}{=} g(f(a)) + g'(f(a))h + o(h) \end{cases}$$

Comme  $f$  est dérivable en  $a$ ,  $f$  est continue en  $a$  donc on a :

$$\lim_{h \rightarrow 0} f(a+h) - f(a) = 0.$$

On a donc, quand  $h \rightarrow 0$  :

$$\begin{aligned}
 g(f(a+h)) &= g\left(f(a) + \underbrace{f(a+h) - f(a)}_{\rightarrow 0}\right) \\
 &= g\left(f(a) + \underbrace{f'(a)h + o(h)}_{\rightarrow 0}\right) \\
 &= g(f(a)) + g'(f(a)) [f'(a)h + o(h)] + \underbrace{o\left(\underbrace{f'(a)h + o(h)}_{=O(h)}\right)}_{=o(h)} \\
 &= g \circ f(a) + g'(f(a)) \times f'(a) \times h + o(h).
 \end{aligned}$$

développement limité de  $f$   
développement limité de  $g$

Donc  $g \circ f$  admet un développement limité à l'ordre 1 en  $a$ .

Donc  $g \circ f$  est dérivable en  $a$  et on a :

$$(g \circ f)'(a) = f'(a) \times g'(f(a)).$$

■

### Proposition 17.92

Soient  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$ ,  $a \in I$ ,  $n \in \mathbb{N}$  et  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  admettant un développement limité à l'ordre  $n$  en  $a$  :

$$\exists a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}, \quad f(a+h) \underset{h \rightarrow 0}{=} a_0 h^0 + \dots + a_n h^n + o(h^n).$$

On suppose qu'il existe  $d \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$  tel que  $\begin{cases} a_1 = \dots = a_{d-1} = 0 \\ a_d \neq 0 \end{cases}$

Alors  $f(a+h) - f(a)$  est du signe de  $a_d h^d$  quand  $h$  est petit.

*Démonstration 17.93*

On a, quand  $h \rightarrow 0$  :

$$f(a+h) = f(a) + a_d h^d + \underbrace{a_{d+1} h^{d+1}}_{=o(h^d)} + \dots + \underbrace{a_n h^n}_{=o(h^d)} + \underbrace{o(h^n)}_{=o(h^d)}.$$

Donc on a :

$$f(a+h) - f(a) = a_d h^d + o(h^d) \underset{\text{car } a_d \neq 0}{\sim} a_d h^d.$$

D'où le résultat.

■

## 17.4 Formule de Taylor

### 17.4.1 Primitivation de développements limités

---

**Lemme 17.94**

Soient  $J$  un intervalle de  $\mathbb{R}$  contenant 0,  $n \in \mathbb{N}$  et  $g : J \rightarrow \mathbb{K}$  dérivable et telle que

$$g'(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} o(x^n).$$

Alors on a :

$$g(x) - g(0) \underset{x \rightarrow 0}{=} o(x^{n+1}).$$

---

*Démonstration 17.95*  
Soit  $\varepsilon : J \rightarrow \mathbb{K}$  telle que  $\begin{cases} \lim_0 \varepsilon = 0 \\ \forall x \in J, \quad g'(x) = x^n \varepsilon(x) \end{cases}$

On remarque :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \underbrace{\sup_{t \in [-|x|; |x|]} |\varepsilon(t)|}_{M_x} = 0.$$

Soit  $x \in J$ .

Selon l'inégalité des accroissements finis appliquée à  $g'$  entre 0 et  $x$ , on a :

$$\begin{cases} \forall t \in [0; x], \quad |g'(t)| = \varepsilon(t) t^n \leq M_x |x|^n & \text{si } x > 0 \\ \forall t \in [x; 0], \quad |g'(t)| = \varepsilon(t) t^n \leq M_x |x|^n & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Donc, si  $x \neq 0$ , on a :

$$|g(x) - g(0)| \leq M_x |x|^n |x - 0| = M_x |x|^{n+1}.$$

Cela est aussi vrai si  $x = 0$ .

D'où :

$$g(x) - g(0) \underset{x \rightarrow 0}{=} o(x^{n+1}).$$

■

---

*Remarque 17.96*

On ne peut pas « dériver un développement limité ».

---

Démonstration 17.97

Posons  $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$

$$x \longmapsto \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

On a, quand  $x \longrightarrow 0$  :

$$\begin{cases} \sin \frac{1}{x} = \mathcal{O}(1) \\ x^2 = o(x) \end{cases}$$

D'où :

$$f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} o(x),$$

on a un développement limité à l'ordre 1 en 0 donc  $f$  est dérivable en 0.

Or, on a :

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, \quad f'(x) = \underbrace{2x \sin \frac{1}{x}}_{\underset{x \rightarrow 0}{\longrightarrow} 0} - \underbrace{\cos \frac{1}{x}}_{\substack{\text{pas de} \\ \text{limite} \\ \text{en } 0}}.$$

Donc  $f'$  n'a pas de limite en 0.

Donc  $f'$  n'est pas continue en 0 :  $f'$  n'admet pas de développement limité à l'ordre 0 en 0. ■

---

**Proposition 17.98 (Primitivation de développement limité)**

Soient  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$ ,  $a \in I$ ,  $n \in \mathbb{N}$  et  $f : I \longrightarrow \mathbb{K}$  dérivable et telle qu'il existe  $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{K}$  tels que :

$$f'(a+h) \underset{h \rightarrow 0}{=} \sum_{k=0}^n a_k h^k + o(h^n).$$

Alors  $f$  admet le développement limité à l'ordre  $n+1$  en  $a$  suivant :

$$f(a+h) \underset{h \rightarrow 0}{=} f(a) + \sum_{k=0}^n a_k \frac{h^{k+1}}{k+1} + o(h^{n+1}).$$

---

Démonstration 17.99

La fonction  $g : h \longmapsto f(a+h) - \sum_{k=0}^n a_k \frac{h^{k+1}}{k+1}$  est dérivable et on a :

$$\forall h \in \mathbb{R}, \quad g'(h) = f'(a+h) - \sum_{k=0}^n a_k h^k = o(h^n).$$

Selon le lemme précédent, on en déduit, quand  $h \longrightarrow 0$  :

$$g(h) - g(0) = o(h^{n+1}),$$

c'est-à-dire :

$$f(a+h) - \sum_{k=0}^n a_k \frac{h^{k+1}}{k+1} - f(a) = o(h^{n+1}).$$

■

---

**Application 17.100**

Établissons le développement limité à l'ordre 5 en 0 de la fonction  $\tan$ .

Comme  $\tan$  est dérivable en 0, on a, quand  $x$  tend vers 0 :

$$\tan x = \tan(0) + \tan'(0)x + o(x) = x + o(x).$$

D'où :

$$\tan^2 x = (x + o(x))^2 = x^2 + 2xo(x) + o(x^2) = x^2 + o(x^2).$$

D'où :

$$\tan' x = 1 + x^2 + o(x^2).$$

D'où, en primitivant le développement limité :

$$\tan x = 0 + x + \frac{x^3}{3} + o(x^3).$$

D'où :

$$\begin{aligned}\tan^2 x &= x^2 + \frac{x^6}{9} + o(x^6) + 2\left(\frac{x^4}{3} + o(x^4) + o(x^6)\right) \\ &= x^2 + \frac{x^6}{9} + \frac{2x^4}{3} + o(x^4).\end{aligned}$$

D'où :

$$\tan' x = 1 + x^2 + \frac{2x^4}{3} + \frac{x^6}{9} + o(x^4).$$

D'où, en primitivant le développement limité :

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + o(x^5).$$

---

**Théorème 17.101 (Formule de Taylor-Young)**

Soient  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ ,  $a \in I$  et  $f \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{K})$ .

Alors  $f$  admet le développement limité à l'ordre  $n$  en  $a$  suivant :

$$f(a+h) \underset{h \rightarrow 0}{=} \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} h^k + o(h^n).$$

---

*Démonstration 17.102*

Raisonnons par récurrence sur  $n \in \mathbb{N}$ .

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on note  $\mathcal{P}(n)$  la proposition «  $\forall f \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{K}), f(a+h) \underset{h \rightarrow 0}{=} \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} h^k + o(h^n)$  ».

On a déjà vu  $\mathcal{P}(0)$  et  $\mathcal{P}(1)$ .

Soit  $n \in \mathbb{N}$  tel que  $\mathcal{P}(n)$ . Montrons  $\mathcal{P}(n+1)$ .

Soit  $f \in \mathcal{C}^{n+1}(I, \mathbb{K})$ .

On a  $f' \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{K})$ .

D'où, selon  $\mathcal{P}(n)$  :

$$f'(a+h) \underset{h \rightarrow 0}{=} \sum_{k=0}^n \frac{(f')^{(k)}(a)}{k!} h^k + o(h^n).$$

D'où, en primitivant le développement limité :

$$\begin{aligned} f(a+h) &\underset{h \rightarrow 0}{=} f(a) + \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k+1)}(a)}{k!} \times \frac{h^{k+1}}{k+1} + o(h^{n+1}) \\ &\underset{h \rightarrow 0}{=} \frac{f^{(0)}(a)}{0!} + \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k+1)}(a)}{(k+1)!} h^{k+1} + o(h^{n+1}) \\ &\underset{h \rightarrow 0}{=} \sum_{k=0}^{n+1} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} h^k + o(h^{n+1}). \end{aligned}$$

D'où  $\mathcal{P}(n+1)$ .

D'où la formule. ■

---

*Exemple 17.103*

Cf. développements limités usuels.

---

*Démonstration 17.104 (exp)*

Soit  $n \in \mathbb{N}$ .

Déterminons le développement limité de  $\exp$  à l'ordre  $n$  en 0.

On a  $\exp \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  donc :

$$\begin{aligned} e^x &\underset{x \rightarrow 0}{=} \sum_{k=0}^n \frac{\exp^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(x^n) \\ &\underset{x \rightarrow 0}{=} \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + o(x^n). \end{aligned}$$
■

---

*Démonstration 17.105* (sh & ch)

Soit  $n \in \mathbb{N}$ .

Les développements limités de sh et ch à l'ordre  $n$  en 0 se déduisent de celui de exp car on a :

$$\begin{cases} \text{ch} : x \mapsto \frac{e^x + e^{-x}}{2} \\ \text{sh} : x \mapsto \frac{e^x - e^{-x}}{2} \end{cases}$$

■

---

*Démonstration 17.106* (cos & sin)

Soit  $n \in \mathbb{N}$ .

Les développements limités de cos et sin à l'ordre  $n$  en 0 découlent de la formule de Taylor-Young. ■

---

*Démonstration 17.107* (ln)

Soit  $n \in \mathbb{N}$ .

Déterminons le développement limité de ln à l'ordre  $n$  en 1.

On a, quand  $x \rightarrow 0$  :

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{k=0}^n (-1)^k x^k + o(x^n).$$

D'où, en primitivant le développement limité :

$$\ln(1+x) = \ln 1 + \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{k+1}}{k+1} + o(x^{n+1}).$$

■

---

*Démonstration 17.108* (Arctan)

Soit  $n \in \mathbb{N}$ .

Déterminons le développement limité de Arctan à l'ordre  $n$  en 0.

On a, quand  $x \rightarrow 0$  :

$$\frac{1}{1+x^2} = \sum_{k=0}^n (-1)^k x^{2k} + o(x^{2n}).$$

D'où, en primitivant le développement limité :

$$\text{Arctan } x = \text{Arctan } 0 + \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1} + o(x^{2n+1}).$$

■



---

*Démonstration 17.109* ( $x \mapsto (1+x)^\alpha$ )

Soient  $n \in \mathbb{N}$ ,  $\alpha \in \mathbb{R}$  et  $f : x \mapsto (1+x)^\alpha$ .

Déterminons le développement limité de  $f$  à l'ordre  $n$  en 0.

On remarque :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \forall x \in ]-1; +\infty[, f^{(k)}(x) = (1+x)^{\alpha-k} \prod_{\ell=0}^{k-1} (\alpha - \ell).$$

D'où :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \frac{f^{(k)}(0)}{k!} = \frac{1}{k!} \prod_{\ell=0}^{k-1} (\alpha - \ell) = \binom{\alpha}{k}.$$

■

---

*Remarque 17.110*

Il est parfois bien plus facile de calculer une dérivée en un point à partir des développements limités plutôt que par les méthodes souvent rencontrées jusqu'ici (calcul « classique » de dérivée, théorème de la limite de la dérivée).

---

### Exercice/Exemple 17.111

(1) Calculer la dérivée en 0 de la fonction

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{e^x (1 + \operatorname{sh} x) (1 + \sin x) (1 + \tan x) (1 + \ln(1+x))}{1-x} \end{aligned}$$

(2) Calculer la dérivée en 0 de la fonction

$$\begin{aligned} g : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \begin{cases} \frac{\sin x - x}{e^x - 1 - x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \end{aligned}$$

---

*Correction 17.112 (1)*

On a les développements limités à l'ordre 1 en 0 suivants :

$$\left\{ \begin{array}{l} e^x = 1 + x + o(x) \\ 1 + \operatorname{sh} x = 1 + x + o(x) \\ 1 + \sin x = 1 + x + o(x) \\ 1 + \tan x = 1 + x + o(x) \\ 1 + \ln(1+x) = 1 + x + o(x) \\ \frac{1}{1-x} = 1 + x + o(x) \end{array} \right.$$

D'où le développement limité à l'ordre 1 en 0 de  $f$  :

$$\underbrace{(1+x+o(x)) \dots (1+x+o(x))}_{6 \text{ facteurs}} = 1+6x+o(x).$$

Donc la dérivée de  $f$  en 0 est 6.

*Correction 17.113 (2)*

On a, quand  $x \rightarrow 0$  :

$$\begin{cases} \sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) \\ e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2) \end{cases}$$

Donc :

$$\begin{cases} \sin x - x = -\frac{x^3}{6} + o(x^3) \sim -\frac{x^3}{6} \\ e^x - 1 - x = \frac{x^2}{2} + o(x^2) \sim \frac{x^2}{2} \end{cases}$$

Donc on a :

$$\begin{aligned} g(x) &\sim \frac{-\frac{x^3}{6}}{\frac{x^2}{2}} \\ &= -\frac{x}{3} + o(x). \end{aligned}$$

D'où  $g'(0) = -\frac{1}{3}$ .

## 17.4.2 Application

### Application 17.114 (Extrema locaux)

Soient  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$ ,  $a \in I$ ,  $n \in \mathbb{N}$  et  $f \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$  tels que :

$$I \in \mathcal{V}(a) \quad \text{et} \quad f^{(n)}(a) \neq 0 \quad \text{et} \quad \forall k \in \llbracket 1 ; n-1 \rrbracket, \quad f^{(k)}(a) = 0.$$

On peut en déduire le comportement de  $f$  au voisinage de  $a$  :

- si  $n$  est pair et  $f^{(n)}(a) > 0$  alors  $f$  admet un minimum local en  $a$  ;
- si  $n$  est pair et  $f^{(n)}(a) < 0$  alors  $f$  admet un maximum local en  $a$  ;
- si  $n$  est impair alors  $f$  n'admet pas d'extremum local en  $a$ .

---

*Démonstration 17.115*

Comme  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^n$ , d'après la formule de Taylor-Young, quand  $h \rightarrow 0$ , on a :

$$f(a+h) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} h^k + o(h^n) = f(a) + \frac{f^{(n)}(a)}{n!} h^n + o(h^n).$$

Donc, comme  $f^{(n)}(a) \neq 0$ , on a :

$$f(a+h) - f(a) \sim \frac{f^{(n)}(a)}{n!} h^n.$$

Donc :

$$\text{sg}(f(a+h) - f(a)) = \text{sg}\left(f^{(n)}(a) h^n\right).$$

D'où les conclusions. ■

---

**Exercice/Exemple 17.116**

Étudier les extrema (globaux et locaux) de  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$   
 $x \mapsto e^x \sin x$

---

*Correction 17.117*

On remarque :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad f\left(\frac{\pi}{2} + k\pi\right) = (-1)^k e^{\frac{\pi}{2} + k\pi}.$$

Donc :

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} f\left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{k \rightarrow +\infty} f\left(\frac{\pi}{2} + (2k+1)\pi\right) = -\infty.$$

Donc  $f$  n'est ni majorée, ni minorée, et n'admet donc aucun extremum global.

De plus, on a :

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R}, \quad f'(x) &= e^x (\sin x + \cos x) \\ &= \sqrt{2} e^x \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \sin x + \frac{1}{\sqrt{2}} \cos x \right) \\ &= \sqrt{2} e^x \left( \cos \frac{\pi}{4} \sin x + \sin \frac{\pi}{4} \cos x \right) \\ &= \sqrt{2} e^x \sin \left( x + \frac{\pi}{4} \right). \end{aligned}$$

On obtient de même :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f''(x) = 2e^x \sin \left( x + \frac{\pi}{2} \right).$$

Soit  $x \in \mathbb{R}$  tel que  $f$  admette un extremum local en  $x$ .

Comme  $\mathbb{R}$  est un voisinage de  $x$ , on a  $f'(x) = 0$  donc  $\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = 0$  donc  $x \equiv -\frac{\pi}{4} [\pi]$ .

synthèse

Soient  $x \in \mathbb{R}$  tel que  $x \equiv -\frac{\pi}{4} [\pi]$  et  $k \in \mathbb{Z}$  tel que  $x = -\frac{\pi}{4} + k\pi$ .

On a :

$$f''(x) = 2e^{-\frac{\pi}{4} + k\pi} \sin\left(\frac{\pi}{4} + k\pi\right) = (-1)^k \sqrt{2}e^{-\frac{\pi}{4} + k\pi}.$$

Si  $k$  est pair alors  $f''(x) > 0$  donc  $f$  admet un minimum local en  $x$ .

Si  $k$  est impair alors  $f''(x) < 0$  donc  $f$  admet un maximum local en  $x$ .

conclusion

$f$  admet un minimum local en tout point de la forme  $-\frac{\pi}{4} + 2k\pi$  avec  $k \in \mathbb{Z}$  et un maximum local en tout point de la forme  $-\frac{\pi}{4} + (2k+1)\pi$  avec  $k \in \mathbb{Z}$ .

---

#### Remarque 17.118

En pratique, on se sert peu de la proposition précédente : il est plus facile de calculer un développement limité à l'ordre  $n$  et d'en déduire un équivalent que de calculer  $n$  dérivées successives (de plus, si l'on peut déterminer le signe de la dérivée première, on peut lire dans le tableau de variations quels sont les extrema locaux de la fonction).

## 17.5 Développements asymptotiques

---

### Définition 17.119

Soient  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  et  $a \in \overline{\mathbb{R}}$  tel que tout voisinage de  $a$  dans  $\mathbb{R}$  rencontre  $A$ , de sorte qu'on peut parler du comportement de  $f$  au voisinage de  $a$ .

On appelle développement asymptotique de  $f$  en  $a$  (à la précision  $f_n$ ) toute écriture de  $f$  sous la forme :

$$f(t) \underset{t \rightarrow a}{=} f_0(t) + \cdots + f_n(t) + o(f_n(t))$$

où  $n \in \mathbb{N}$  et  $f_0, \dots, f_n$  sont des fonctions définies sur  $A$  (du moins au voisinage de  $a$ ) telles que :

$$\forall i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, \quad f_i(t) \underset{t \rightarrow a}{=} o(f_{i-1}(t)).$$

On a alors :

$$f(t) \underset{t \rightarrow a}{\sim} f_0(t)$$

et :

$$f(t) - f_0(t) \underset{t \rightarrow a}{\sim} f_1(t)$$

et :

$$f(t) - f_0(t) - f_1(t) \underset{t \rightarrow a}{\sim} f_2(t)$$

etc.

---

*Exemple 17.120*

Développement asymptotique à la précision  $\ln^2 n$  :

$$u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} n! + n + \sqrt{n} \ln n + \ln^2 n + o(\ln^2 n).$$

Développement asymptotique à la précision  $\frac{1}{x^2}$  :

$$f(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{=} \frac{x}{\ln x} + \sqrt{x} + \pi + \frac{2}{x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right).$$

Développement asymptotique à la précision  $x$  :

$$f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{1}{x} + \frac{\ln x}{\sqrt{x}} + 7 + \sqrt{x} + x + o(x).$$

---

### Exercice/Exemple 17.121

Donner un développement asymptotique de  $\ln(n!)$  quand  $n$  tend vers  $+\infty$  à la précision 1.

---

*Correction 17.122*

On a, quand  $n \rightarrow +\infty$  :  $n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$  donc  $\lim_n \frac{n!}{\sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n} = 1$  donc :

$$\lim_n \ln \frac{n!}{\sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n} = 0.$$

Donc  $\ln \frac{n!}{\sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n} = o(1)$  donc :

$$\ln(n!) - \frac{1}{2} \ln(2\pi n) - n \ln n + n \ln e = o(1).$$

Finalement, on a le développement asymptotique suivant :

$$\ln(n!) = n \ln n - n + \frac{1}{2} \ln n + \frac{1}{2} \ln(2\pi) + o(1).$$

---

**Exercice/Exemple 17.123**

- (1) Donner un développement asymptotique de  $\text{Arctan } x$  quand  $x$  tend vers  $+\infty$  à la précision  $\frac{1}{x^5}$ .
- (2) Application : en déduire un équivalent de  $\text{Arctan}(2x) - \text{Arctan } x$  quand  $x$  tend vers  $+\infty$ .
- 

*Correction 17.124 (1)*

Rappel : on a  $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$ ,  $\text{Arctan } x + \text{Arctan } \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$ .

On a, quand  $h \rightarrow 0$  :

$$\text{Arctan } h = h - \frac{h^3}{3} + \frac{h^5}{5} + o(h^5).$$

Donc, quand  $x \rightarrow +\infty$  :

$$\text{Arctan } \frac{1}{x} = \frac{1}{x} - \frac{1}{3x^3} + \frac{1}{5x^5} + o\left(\frac{1}{x^5}\right).$$

Donc :

$$\text{Arctan } x \underset{x \rightarrow +\infty}{=} \frac{\pi}{2} - \frac{1}{x} + \frac{1}{3x^3} - \frac{1}{5x^5} + o\left(\frac{1}{x^5}\right).$$

---

*Correction 17.125 (2)*

On a :

$$\begin{aligned} \text{Arctan}(2x) - \text{Arctan } x &\underset{x \rightarrow +\infty}{=} -\frac{1}{2x} + \frac{1}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right) \\ &\underset{x \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{2x} + o\left(\frac{1}{x}\right). \end{aligned}$$

Donc  $\text{Arctan}(2x) - \text{Arctan } x \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{2x}$ .

---

**Exercice/Exemple 17.126**

Donner un développement asymptotique de  $\frac{\ln(1-x)}{\cos x - 1}$  quand  $x$  tend vers 0 à la précision  $x^2$ .

On a :

$$\ln(1-x) \underset{x \rightarrow 0}{=} -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + o(x^4) \quad \text{et} \quad \cos x - 1 \underset{x \rightarrow 0}{=} -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^5).$$

Donc :

$$\begin{aligned} f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} & \frac{-x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + o(x^4)}{-\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^5)} \\ \underset{x \rightarrow 0}{=} & \frac{-2}{x^2} \left( \frac{-x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + o(x^4)}{1 - \frac{x^2}{12} + o(x^3)} \right). \end{aligned}$$

Or :  $\frac{1}{1+h} \underset{h \rightarrow 0}{=} 1 + h + \mathcal{O}(h^2).$

Donc :

$$\frac{1}{1 - \frac{x^2}{12} + o(x^3)} \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + \frac{x^2}{12} + o(x^3).$$

D'où, quand  $x \rightarrow 0$  :

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{-2}{x^2} \left( 1 + \frac{x^2}{12} + o(x^3) \right) \left( -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + o(x^4) \right) \\ &= \frac{-2}{x^2} \left( -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{12} - \frac{x^4}{24} + o(x^4) \right) \\ &= \frac{2}{x} + 1 + \frac{5}{6}x + \frac{7}{12}x^2 + o(x^2). \end{aligned}$$

---

*Remarque 17.128*

Apprenez à obtenir des développements limités à l'aide de votre calculatrice.

On peut aussi les obtenir avec Python, par exemple avec le module `sympy` (les paramètres de la méthode `series` sont la variable, le point où l'on se place et le nombre de termes du développement asymptotique voulu) :

```
>>> from sympy import sin, cos, log, pprint, latex
>>> from sympy.abc import x
>>> pprint(sin(x).series(x, 0, 9))    # "pretty print"
```

$$x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \frac{x^7}{5040} + \mathcal{O}(x^9)$$

```
>>> print(latex(sin(x).series(x, 0, 7)))    # code LaTeX
x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \mathcal{O}\left(x^7\right)
```

```
>>> a = log(1 - x) / (cos(x) - 1)
>>> b = a.series(x, 0, 6)
>>> pprint(b)
```

$$\frac{2}{x} + 1 + \frac{5x}{6} + \frac{7x^2}{12} + \frac{167x^3}{360} + \frac{91x^4}{240} + \frac{4871x^5}{15120} + \mathcal{O}(x^6)$$

## 17.6 Méthodes à bien connaître

### 17.6.1 Composer des développements limités

---

*Exemple 17.129*

On pose  $f : x \mapsto \operatorname{Arctan}(\sin x)$ .

Déterminons le développement limité de  $f$  à l'ordre 4 en 0.

On a :

$$\operatorname{Arctan} h \underset{h \rightarrow 0}{=} h - \frac{h^3}{3} + o(h^4) \quad \text{et} \quad \sin x \underset{x \rightarrow 0}{=} x - \frac{x^3}{6} + o(x^4).$$

Donc, comme  $\sin x \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$ , on a, quand  $x \rightarrow 0$  :

$$\begin{aligned} \operatorname{Arctan}(\sin x) &= x - \frac{x^3}{6} + o(x^4) - \frac{1}{3} \left( x - \frac{x^3}{6} + o(x^4) \right)^3 + o \left( \underbrace{\left( \underbrace{x - \frac{x^3}{6} + o(x^4)}_{\sim x} \right)^4}_{=o(x^4)} \right) \\ &= x - \frac{x^3}{6} + o(x^4) - \frac{1}{3} (x^3 + o(x^4)) + o(x^4) \\ &= x - \frac{x^3}{2} + o(x^4). \end{aligned}$$

### 17.6.2 Inverse d'un développement limité

---

*Exemple 17.130*

Posons  $f : x \mapsto \frac{1}{\cos x}$ .

Déterminons le développement limité de  $f$  à l'ordre 4 en 0.

On a :

$$\cos x \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4).$$



Or, on a  $\frac{1}{1+h} \underset{h \rightarrow 0}{=} 1 - h + h^2 + o(h^2)$  donc, quand  $x \rightarrow 0$  :

$$\begin{aligned} f(x) &= 1 - \left( -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4) \right) + \left( -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4) \right)^2 + o(x^4) \\ &= 1 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24} + \left( -\frac{x^2}{2} \right)^2 + o(x^4) \\ &= 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5x^4}{24} + o(x^4). \end{aligned}$$

### 17.6.3 Se ramener aux développements limités connus

---

*Exemple 17.131*

On pose  $f : x \mapsto \ln(1 + \cos x)$ .

Déterminons le développement limité de  $f$  à l'ordre 4 en 0.

On a :

$$\ln(1+h) \underset{h \rightarrow 0}{=} h - \frac{h^2}{2} + o(h^2).$$

Il ne faut surtout pas remplacer  $h$  par  $\cos x$ .

Quand  $x \rightarrow 0$  :

On a :

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4).$$

Donc :

$$\begin{aligned} f(x) &= \ln \left( 2 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4) \right) \\ &= \ln 2 + \ln \left( 1 - \frac{x^2}{4} + \frac{x^4}{48} + o(x^4) \right) \\ &= \ln 2 + \left( -\frac{x^2}{4} + \frac{x^4}{48} + o(x^4) \right) - \frac{1}{2} \left( -\frac{x^2}{4} + \frac{x^4}{48} + o(x^4) \right)^2 + o(x^4) \\ &= \ln 2 - \frac{x^2}{4} + \frac{x^4}{48} + o(x^4) - \frac{x^4}{32} + o(x^4) \\ &= \ln 2 - \frac{x^2}{4} - \frac{x^4}{96} + o(x^4). \end{aligned}$$

---

*Exemple 17.132*

On pose  $f : x \mapsto \frac{1}{1 + \operatorname{ch} x}$ .

Déterminons le développement limité de  $f$  à l'ordre 4 en 0.

On a :

$$\frac{1}{1+h} \underset{h \rightarrow 0}{=} 1 - h + h^2 + o(h^2).$$

Quand  $x \rightarrow 0$  :

On a :

$$\operatorname{ch} x = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4).$$

Donc :

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{2 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)} \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{1 + \frac{x^2}{4} + \frac{x^4}{48} + o(x^4)} \\ &= \frac{1}{2} \left[ 1 - \left( \frac{x^2}{4} + \frac{x^4}{48} + o(x^4) \right) + \left( \frac{x^2}{4} + \frac{x^4}{48} + o(x^4) \right)^2 + o(x^4) \right] \\ &= \frac{1}{2} \left( 1 - \frac{x^2}{4} - \frac{x^4}{48} + o(x^4) + \frac{x^4}{16} + o(x^4) \right) \\ &= \frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^4}{48} + o(x^4). \end{aligned}$$

---

*Exemple 17.133*

On pose  $f : x \mapsto e^{\cos x}$ .

Déterminons le développement limité de  $f$  à l'ordre 2 en 0.

On a :

$$e^h \underset{h \rightarrow 0}{=} 1 + h + o(h).$$

Quand  $x \rightarrow 0$  :

On a :

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2).$$

Donc :

$$\begin{aligned} f(x) &= \exp\left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) \\ &= e \exp\left(-\frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) \\ &= e \left[1 + \left(-\frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) + o(x^2)\right] \\ &= e \left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) \\ &= e - \frac{ex^2}{2} + o(x^2). \end{aligned}$$

---

*Exemple 17.134*

Déterminons un développement asymptotique à la précision  $x^3$  de  $f : x \mapsto \ln(\sin x)$  quand  $x \rightarrow 0^+$ .

On a :

$$\sin h \underset{h \rightarrow 0}{=} x - \frac{x^3}{6} + o(x^4).$$

D'où, quand  $x \rightarrow 0^+$  :

$$\begin{aligned} f(x) &= \ln\left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^4)\right) \\ &= \ln\left(x\left(1 - \frac{x^2}{6} + o(x^3)\right)\right) \\ &= \ln x + \ln\left(1 - \frac{x^2}{6} + o(x^3)\right) \\ &= \ln x + \left[-\frac{x^2}{6} - \frac{1}{2}\left(-\frac{x^2}{6} + o(x^3)\right)^2 + o(x^3)\right] \\ &= \ln x - \frac{x^2}{6} + o(x^3). \end{aligned}$$

# Chapitre 18

## Groupe symétrique

★★ À VENIR ★★

# Chapitre 19

## Déterminants

★★ À VENIR ★★

# Chapitre 20

## Séries, familles sommables

★★ À VENIR ★★

# Chapitre 21

## Espaces préhilbertiens

### Sommaire

---

<b>21.1</b>	<b>Produit scalaire, norme associée . . . . .</b>	<b>621</b>
21.1.1	Produit scalaire . . . . .	621
21.1.2	Norme associée à un produit scalaire . . . . .	624
21.1.3	Propriétés . . . . .	628
<b>21.2</b>	<b>Orthogonalité, base orthonormale . . . . .</b>	<b>629</b>
21.2.1	Vocabulaire . . . . .	629
21.2.2	Propriétés des familles orthogonales . . . . .	631
21.2.3	Calculs dans une base orthonormale . . . . .	633
<b>21.3</b>	<b>Sous-espaces vectoriels . . . . .</b>	<b>634</b>
21.3.1	Sous-espaces vectoriels orthogonaux . . . . .	634
21.3.2	Supplémentaire orthogonal . . . . .	637
21.3.3	Projecteur orthogonal sur un sous-espace vectoriel de dimension finie . . . . .	639
21.3.4	Procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt . . . . .	642
21.3.5	Hyperplans d'un espace euclidien . . . . .	645

---

## 21.1 Produit scalaire, norme associée

### 21.1.1 Produit scalaire

---

#### Définition 21.1 (Produit scalaire)

Soit  $E$  un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

On appelle produit scalaire sur  $E$  tout forme bilinéaire symétrique définie positive, c'est-à-dire toute application

$$\begin{aligned}\langle \cdot | \cdot \rangle : E \times E &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\longmapsto \langle x | y \rangle\end{aligned}$$

qui vérifie :

$$\left\{ \begin{array}{l} \langle \cdot | \cdot \rangle \text{ est bilinéaire : } \left\{ \begin{array}{l} \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \forall x_1, x_2, y \in E, \langle \lambda x_1 + \mu x_2 | y \rangle = \lambda \langle x_1 | y \rangle + \mu \langle x_2 | y \rangle \\ \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \forall x, y_1, y_2 \in E, \langle x | \lambda y_1 + \mu y_2 \rangle = \lambda \langle x | y_1 \rangle + \mu \langle x | y_2 \rangle \end{array} \right. \\ \langle \cdot | \cdot \rangle \text{ est symétrique : } \forall x, y \in E, \langle x | y \rangle = \langle y | x \rangle \\ \langle \cdot | \cdot \rangle \text{ est définie positive : } \forall x \in E, \left\{ \begin{array}{l} \langle x | x \rangle \geq 0 \\ \langle x | x \rangle = 0 \iff x = 0_E \end{array} \right. \end{array} \right.$$

Le produit scalaire de deux vecteurs  $x$  et  $y$  est traditionnellement noté  $\langle x | y \rangle$ ,  $(x | y)$ ,  $\langle x, y \rangle$  ou  $x \cdot y$ . On le notera  $\langle x | y \rangle$  dans tout ce cours.

### Définition 21.2 (Espace euclidien)

On appelle espace préhilbertien (réel) tout  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel muni d'un produit scalaire.

On appelle espace euclidien tout  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie muni d'un produit scalaire.

### Exemple 21.3

Les exemples suivants sont à connaître parfaitement :

(1) Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . L'application :

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ \left( \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix} \right) & \longmapsto & x_1 x'_1 + \cdots + x_n x'_n \end{array}$$

est un produit scalaire sur  $\mathbb{R}^n$  appelé le produit scalaire canonique de  $\mathbb{R}^n$ .

Ce produit scalaire s'écrit aussi :

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ (X, X') & \longmapsto & {}^t X X' \end{array}$$

(2) Soient  $a, b \in \mathbb{R}$  tels que  $a < b$ . On pose  $E = \mathcal{C}^0([a; b], \mathbb{R})$ . L'application :

$$\begin{array}{ccc} E \times E & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ (f, g) & \longmapsto & \int_a^b f(t) g(t) dt \end{array}$$

est un produit scalaire sur  $E$ .

(3) L'application :

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \times \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ (A, B) & \longmapsto & \text{tr}({}^t A B) \end{array}$$

est un produit scalaire sur  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  appelé le produit scalaire canonique de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ .

On a, pour toutes matrices  $A = (a_{ij})_{(i,j) \in \llbracket 1;n \rrbracket^2}$  et  $B = (b_{ij})_{(i,j) \in \llbracket 1;n \rrbracket^2}$  :

$$\text{tr}({}^t A B) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} b_{ij}.$$



(4) Plus généralement, l'application :

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{M}_{np}(\mathbb{R}) \times \mathcal{M}_{np}(\mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ (A, B) & \longmapsto & \text{tr}({}^tAB) \end{array}$$

est un produit scalaire sur  $\mathcal{M}_{np}(\mathbb{R})$  appelé le produit scalaire canonique de  $\mathcal{M}_{np}(\mathbb{R})$ .

On a, pour toutes matrices  $A = (a_{ij})_{(i,j) \in \llbracket 1;n \rrbracket \times \llbracket 1;p \rrbracket}$  et  $B = (b_{ij})_{(i,j) \in \llbracket 1;n \rrbracket \times \llbracket 1;p \rrbracket}$  :

$$\text{tr}({}^tAB) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p a_{ij} b_{ij}.$$

*Démonstration 21.4 (2)*

On note  $\varphi : E^2 \longrightarrow \mathbb{R}$  l'application.

On a :

$$\forall f, g \in E, \quad \varphi(f, g) = \varphi(g, f).$$

Donc  $\varphi$  est symétrique.

On a :

$$\begin{aligned} \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \quad \forall f_1, f_2, g \in E, \quad \varphi(\lambda f_1 + \mu f_2, g) &= \int_a^b (\lambda f_1(t) + \mu f_2(t)) g(t) dt \\ &= \lambda \int_a^b f_1(t) g(t) dt + \mu \int_a^b f_2(t) g(t) dt \\ &= \lambda \varphi(f_1, g) + \mu \varphi(f_2, g). \end{aligned}$$

Donc  $\varphi$  est linéaire à gauche.

Comme  $\varphi$  est symétrique,  $\varphi$  est aussi linéaire à droite.

Donc  $\varphi$  est bilinéaire.

Soit  $f \in E$ .

On a :

$$\varphi(f, f) = \int_a^b f^2(t) dt \geqslant 0.$$

Donc  $\varphi$  est définie positive.

Enfin, si  $\varphi(f, f) = 0$  alors  $\int_a^b f^2(t) dt = 0$ .

Or la fonction  $f^2$  est continue et positive sur  $[a ; b]$  donc  $f^2 = 0$  donc  $f = 0$ .

Finalement,  $\varphi$  est un produit scalaire sur  $E$ . ■

*Démonstration 21.5 (Autres exemples)*

★★ Exercice ★★ ■

## 21.1.2 Norme associée à un produit scalaire

---

### Notation 21.6

Soit  $E$  un espace préhilbertien.

On pose :

$$\forall x \in E, \quad \|x\| = \sqrt{\langle x | x \rangle}.$$

On étudie dans la suite l'application :

$$\begin{aligned} \|\cdot\| : E &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \|x\| = \sqrt{\langle x | x \rangle} \end{aligned}$$

appelée norme associée au produit scalaire de  $E$ .

---

### Théorème 21.7 (Inégalité de Cauchy-Schwarz)

Soient  $E$  un espace préhilbertien et  $x, y \in E$ .

On a l'inégalité de Cauchy-Schwarz :

$$|\langle x | y \rangle| \leq \|x\| \|y\|.$$

De plus, on a les cas d'égalités dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz :

$$|\langle x | y \rangle| = \|x\| \|y\| \iff x \text{ et } y \text{ sont colinéaires}$$

et :

$$\langle x | y \rangle = \|x\| \|y\| \iff \exists \lambda \in \mathbb{R}_+, \begin{cases} x = \lambda y \\ \text{ou} \\ y = \lambda x \end{cases}$$

---

### Démonstration 21.8 (Inégalité de Cauchy-Schwarz)

Si  $y = 0_E$  alors  $\langle x | y \rangle = \|x\| \|y\| = 0$ .

Supposons  $y \neq 0_E$ .

$$\begin{aligned} \text{On pose } f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ \lambda &\longmapsto \|x + \lambda y\|^2 \end{aligned}$$

On a :

$$\begin{aligned} \forall \lambda \in \mathbb{R}, \quad f(\lambda) &= \langle x + \lambda y | x + \lambda y \rangle \\ &= \langle x | x \rangle + \lambda \langle x | y \rangle + \lambda^2 \langle y | x \rangle + \langle y | y \rangle \\ &= \underbrace{\lambda^2 \|y\|^2}_{\neq 0} + 2\lambda \langle x | y \rangle + \|x\|^2 \\ &\geq 0. \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \text{car } \langle \cdot | \cdot \rangle \text{ est bilinéaire} \\ \text{car } \langle \cdot | \cdot \rangle \text{ est symétrique} \\ \text{car } \langle \cdot | \cdot \rangle \text{ est positif} \end{array} \right\}$$

Donc  $f$  est une fonction polynomiale de degré 2 positive sur  $\mathbb{R}$ .

Donc le discriminant de  $\|y\|^2 X^2 + 2 \langle x | y \rangle X + \|x\|^2$  est négatif :

$$\Delta = 4 \langle x | y \rangle^2 - 4 \|x\|^2 \|y\|^2 \leq 0.$$

D'où  $|\langle x | y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$ . ■

*Démonstration 21.9 (Cas d'égalité en valeur absolue)*

Si  $y = 0_E$ , l'équivalence est vraie.

Supposons  $y \neq 0_E$ .

On a :

$$\begin{aligned} |\langle x | y \rangle| = \|x\| \|y\| &\iff \Delta = 0 \\ &\iff \exists \lambda \in \mathbb{R}, \quad f(\lambda) = 0 \\ &\iff \exists \lambda \in \mathbb{R}, \quad \|x + \lambda y\|^2 = 0 \\ &\iff \exists \lambda \in \mathbb{R}, \quad x = -\lambda y \\ &\iff x \text{ et } y \text{ sont colinéaires.} \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} &\iff \exists \lambda \in \mathbb{R}, \quad x = -\lambda y \\ &\iff x \text{ et } y \text{ sont colinéaires.} \end{aligned}} \right\} \text{car } y \neq 0_E$$
■

*Démonstration 21.10 (Cas d'égalité)*

On a :

$$\begin{aligned} \langle x | y \rangle = \|x\| \|y\| &\iff \begin{cases} x \text{ et } y \text{ sont colinéaires} \\ \langle x | y \rangle = \|x\| \|y\| \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} \exists \lambda \in \mathbb{R}, & \begin{cases} x = \lambda y \\ \text{ou} \\ y = \lambda x \end{cases} \\ \langle x | y \rangle = \|x\| \|y\| \end{cases} \\ &\iff \exists \lambda \in \mathbb{R}_+, \begin{cases} x = \lambda y \\ \text{ou} \\ y = \lambda x \end{cases} \end{aligned}$$
■

*Exemple 21.11*

Soient  $a, b \in \mathbb{R}$  tels que  $a < b$  et  $f, g \in \mathcal{C}^0([a; b], \mathbb{R})$ .

On a :

$$\left| \int_a^b f(t) g(t) dt \right| \leq \sqrt{\int_a^b f^2(t) dt} \sqrt{\int_a^b g^2(t) dt}.$$

*Démonstration 21.12*

C'est l'inégalité de Cauchy-Schwarz appliquée au produit scalaire (2) de l'Exemple 21.3. ■

---

**Théorème 21.13 (Inégalité de Minkowski ou inégalité triangulaire pour la norme)**

Soient  $E$  un espace préhilbertien et  $x, y \in E$ .

On a l'inégalité de Minkowski :

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

De plus, on a le cas d'égalité dans l'inégalité de Minkowski :

$$\|x + y\| = \|x\| + \|y\| \iff \exists \lambda \in \mathbb{R}_+, \begin{cases} x = \lambda y \\ \text{ou} \\ y = \lambda x \end{cases}$$

---

**Démonstration 21.14 (Inégalité de Minkowski)**

On a :

$$\begin{aligned} \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\| &\iff \|x + y\|^2 \leq (\|x\| + \|y\|)^2 \\ &\iff \langle x + y \mid x + y \rangle \leq (\|x\| + \|y\|)^2 \\ &\iff \|x\|^2 + 2\langle x \mid y \rangle + \|y\|^2 \leq \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2 \\ &\text{ce qui est vrai selon l'inégalité de Cauchy-Schwarz.} \end{aligned}$$

■

---

**Démonstration 21.15 (Cas d'égalité)**

Découle du cas d'égalité sans valeur absolue dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz.

■

---

**Exemple 21.16**

Soient  $a, b \in \mathbb{R}$  tels que  $a < b$  et  $f, g \in \mathcal{C}^0([a; b], \mathbb{R})$ .

On a :

$$\sqrt{\int_a^b (f(t) + g(t))^2 dt} \leq \sqrt{\int_a^b f^2(t) dt} + \sqrt{\int_a^b g^2(t) dt}.$$

---

**Démonstration 21.17**

C'est l'inégalité de Minkowski appliquée au produit scalaire (2) de l'Exemple 21.3.

■

---

*Remarque 21.18*

Soit  $E$  un espace préhilbertien.

La norme  $\|\cdot\|$  associée au produit scalaire de  $E$  vérifie :

$$\begin{cases} \forall x \in E, \|x\| = 0 \implies x = 0_E \\ \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall x \in E, \|\lambda x\| = |\lambda| \|x\| \\ \forall x, y \in E, \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\| \end{cases}$$

En deuxième année, vous étudierez les fonction  $E \longrightarrow \mathbb{R}_+$  vérifiant ces trois propriétés. Une telle fonction sur un  $\mathbb{R}$  (ou  $\mathbb{C}$ )-espace vectoriel est appelée une « norme ».

Ainsi, dans ce paragraphe, on a montré que la « norme associée à un produit scalaire » est bien ce qu'on appelle une « norme ».

---

*Démonstration 21.19*

Soit  $x \in E$ .

On a :

$$\begin{aligned} \|x\| = 0 &\iff \sqrt{\langle x | x \rangle} = 0 \\ &\iff \langle x | x \rangle = 0 \\ &\iff x = 0. \end{aligned}$$

Soit  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

On a :

$$\begin{aligned} \|\lambda x\| &= \sqrt{\langle \lambda x | \lambda x \rangle} \\ &= \sqrt{\lambda^2 \langle x | x \rangle} \\ &= |\lambda| \|x\|. \end{aligned}$$

■

---

**Définition/Proposition 21.20 (Distance)**

Soit  $E$  un espace préhilbertien.

On appelle distance associée au produit scalaire de  $E$  l'application :

$$\begin{aligned} d : E \times E &\longrightarrow \mathbb{R}_+ \\ (x, y) &\longmapsto \|y - x\| \end{aligned}$$

Elle vérifie :

$$\begin{cases} \forall x, y \in E, d(x, y) = 0 \iff x = y \\ \forall x, y \in E, d(x, y) = d(y, x) \\ \forall x, y, z \in E, d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z) \end{cases}$$

### 21.1.3 Propriétés

Soit  $E$  un espace préhilbertien dont on note  $\langle \cdot | \cdot \rangle$  le produit scalaire et  $\|\cdot\|$  la norme associée.

---

**Proposition 21.21**

Soient  $x, y \in E$ .

On a :

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2 \langle x | y \rangle + \|y\|^2 \quad \text{et} \quad \|x - y\|^2 = \|x\|^2 - 2 \langle x | y \rangle + \|y\|^2.$$

---

*Démonstration 21.22*

On a :

$$\|x + y\|^2 = \langle x + y | x + y \rangle = \langle x | x \rangle + \langle x | y \rangle + \langle y | x \rangle + \langle y | y \rangle = \|x\|^2 + 2 \langle x | y \rangle + \|y\|^2$$

et :

$$\|x - y\|^2 = \langle x - y | x - y \rangle = \langle x | x \rangle - \langle x | y \rangle - \langle y | x \rangle + \langle y | y \rangle = \|x\|^2 - 2 \langle x | y \rangle + \|y\|^2. \quad \blacksquare$$

---

**Théorème 21.23 (Identité du parallélogramme)**

Soient  $x, y \in E$ .

On a :

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2 \|x\|^2 + 2 \|y\|^2.$$

---

*Démonstration 21.24*

Découle de la Proposition 21.21 par somme des deux égalités.  $\blacksquare$

---

**Théorème 21.25 (Identités de polarisation)**

Soient  $x, y \in E$ .

On a :

$$\begin{cases} \langle x | y \rangle = \frac{1}{2} \left( \|x + y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2 \right) \\ \langle x | y \rangle = \frac{1}{4} \left( \|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 \right) \end{cases}$$

---

*Démonstration 21.26*

Découle de la Proposition 21.21.  $\blacksquare$

## 21.2 Orthogonalité, base orthonormale

### 21.2.1 Vocabulaire

---

**Définition 21.27**

Soit  $E$  un espace préhilbertien.

On dit qu'un vecteur  $x \in E$  est unitaire s'il est de norme 1 :

$$\|x\| = 1.$$

On dit que deux vecteurs  $x, y \in E$  sont orthogonaux et on note  $x \perp y$  si leur produit scalaire est nul :

$$\langle x | y \rangle = 0.$$

On dit qu'une famille de vecteurs  $(x_i)_{i \in I} \in E^I$  est orthogonale si ses vecteurs sont deux à deux orthogonaux :

$$\forall i, j \in I, i \neq j \implies \langle x_i | x_j \rangle = 0.$$

On dit qu'une famille de vecteurs  $(x_i)_{i \in I} \in E^I$  est orthonormale ou orthonormée si ses vecteurs sont unitaires et deux à deux orthogonaux :

$$\forall i, j \in I, \langle x_i | x_j \rangle = \delta_{ij}.$$

On dit qu'une famille de vecteurs est une base orthonormale ou orthonormée de  $E$  si c'est une famille orthonormale et une base de  $E$ .

---

**Exemple 21.28**

La base canonique de  $\mathbb{R}^n$ , pour le produit scalaire canonique de  $\mathbb{R}^n$ , est orthonormale.

La base canonique de  $\mathcal{M}_{np}(\mathbb{R})$ , pour le produit scalaire canonique de  $\mathcal{M}_{np}(\mathbb{R})$ , est orthonormale.

---

**Exercice 21.29**

On note  $\mathcal{C}_{2\pi}$  l'ensemble des fonctions continues  $2\pi$ -périodiques de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ .

(1) Montrer que l'application :

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_{2\pi} \times \mathcal{C}_{2\pi} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (f, g) &\longmapsto \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) g(t) dt \end{aligned}$$

est un produit scalaire. L'espace vectoriel  $\mathcal{C}_{2\pi}$  est-il un espace euclidien ?

(2) On pose :

$$\forall k \in \llbracket 0 ; n \rrbracket, \quad f_k : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ t \longmapsto \cos(kt)$$

La famille  $(f_0, \dots, f_n)$  est-elle orthogonale ? orthonormale ?

(3) Même question avec la famille  $(f_0, \dots, f_n, g_1, \dots, g_n)$ , en posant :

$$\forall k \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, \quad g_k : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ t \longmapsto \sin(kt)$$

*Correction 21.30 (1)*

Cf. Démonstration 21.4.

On note tout de même :

Soit  $f \in \mathcal{C}_{2\pi}$ .

Si  $\langle f | f \rangle = 0$  alors  $\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f^2(t) dt = 0$ .

Or  $f^2$  est continue et positive.

Donc  $\forall t \in [0 ; 2\pi]$ ,  $f^2(t) = 0$ .

Donc  $f = 0$  car  $f$  est  $2\pi$ -périodique.

*Correction 21.31 (2)*

On a :

$$\begin{aligned} \forall k, \ell \in \llbracket 0 ; n \rrbracket, \quad \langle f_k | f_\ell \rangle &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f_k(t) f_\ell(t) dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos(kt) \cos(\ell t) dt \\ &= \frac{1}{4\pi} \left( \int_0^{2\pi} \cos((k+\ell)t) dt + \int_0^{2\pi} \cos((k-\ell)t) dt \right) \\ &= \begin{cases} \frac{1}{4\pi} \left( \left[ \frac{\sin((k+\ell)t)}{k+\ell} \right]_0^{2\pi} + \left[ \frac{\sin((k-\ell)t)}{k-\ell} \right]_0^{2\pi} \right) = 0 & \text{si } k \neq \ell \\ \frac{1}{4\pi} \left( \left[ \frac{\sin(2kt)}{2k} \right]_0^{2\pi} + 2\pi \right) = \frac{1}{2} \neq 1 & \text{si } k = \ell \neq 0 \\ \frac{1}{4\pi} (2\pi + 2\pi) = 1 & \text{si } k = \ell = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Donc  $(f_0, \dots, f_n)$  est orthogonale mais pas orthonormée car  $\forall k \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$ ,  $\|f_k\| = \frac{1}{\sqrt{2}} \neq 1$ .



---

Correction 21.32 (3)

On a :

$$\begin{aligned}\forall k \in \llbracket 0 ; n \rrbracket, \forall \ell \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, \langle f_k | g_\ell \rangle &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f_k(t) g_\ell(t) dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos(kt) \sin(\ell t) dt \\ &= \frac{1}{4\pi} \left( \int_0^{2\pi} \sin((k+\ell)t) dt + \int_0^{2\pi} \sin((\ell-k)t) dt \right) \\ &= \begin{cases} \frac{1}{4\pi} \left( \left[ \frac{-\cos((k+\ell)t)}{k+\ell} \right]_0^{2\pi} + \left[ \frac{-\cos((\ell-k)t)}{\ell-k} \right]_0^{2\pi} \right) = 0 & \text{si } k \neq \ell \\ \frac{1}{4\pi} \left( \left[ \frac{-\cos(2kt)}{2k} \right]_0^{2\pi} + 0 \right) = 0 & \text{si } k = \ell \end{cases}\end{aligned}$$

Donc  $\forall k \in \llbracket 0 ; n \rrbracket, \forall \ell \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, f_k \perp g_\ell$ .

De plus, on a :

$$\begin{aligned}\forall k, \ell \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, \langle g_k | g_\ell \rangle &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} g_k(t) g_\ell(t) dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sin(kt) \sin(\ell t) dt \\ &= \frac{1}{4\pi} \left( \int_0^{2\pi} \cos((k-\ell)t) dt - \int_0^{2\pi} \cos((k+\ell)t) dt \right) \\ &= \begin{cases} \frac{1}{4\pi} \left( \left[ \frac{\sin((k-\ell)t)}{k-\ell} \right]_0^{2\pi} - \left[ \frac{\sin((k+\ell)t)}{k+\ell} \right]_0^{2\pi} \right) = 0 & \text{si } k \neq \ell \\ \frac{1}{4\pi} \left( - \left[ \frac{\sin(2kt)}{2k} \right]_0^{2\pi} + 2\pi \right) = \frac{1}{2} & \text{si } k = \ell \end{cases}\end{aligned}$$

Donc  $\forall k, \ell \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, g_k \perp g_\ell$ .

Finalement,  $(f_0, \dots, f_n, g_1, \dots, g_n)$  est orthogonale mais pas orthonormée car  $\forall k \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, \|g_k\| = \frac{1}{\sqrt{2}} \neq 1$ .

## 21.2.2 Propriétés des familles orthogonales

---

**Théorème 21.33 (Théorème de Pythagore)**

Soient  $E$  un espace préhilbertien et  $(x_1, \dots, x_n)$  une famille orthogonale de vecteurs de  $E$ .

On a :

$$\left\| \sum_{j=1}^n x_j \right\|^2 = \sum_{j=1}^n \|x_j\|^2.$$

---

*Démonstration 21.34*

On a :

$$\begin{aligned} \left\| \sum_{j=1}^n x_j \right\|^2 &= \left\langle \sum_{j=1}^n x_j \left| \sum_{k=1}^n x_k \right. \right\rangle \\ &= \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \underbrace{\langle x_j | x_k \rangle}_{=0 \text{ si } j \neq k} \\ &= \sum_{j=1}^n \|x_j\|^2 \end{aligned}$$

■

---

**Proposition 21.35**

Soient  $E$  un espace préhilbertien et  $(x_1, \dots, x_n) \in E^n$  une famille orthogonale dont tous les vecteurs sont non-nuls.

Alors  $(x_1, \dots, x_n)$  est une famille libre.

---

*Démonstration 21.36*

Soient  $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$  tels que  $\sum_{j=1}^n \lambda_j x_j = 0_E$  et  $k \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$ .

$$\text{On a } \left\langle \sum_{j=1}^n \lambda_j x_j \left| x_k \right. \right\rangle = 0.$$

$$\text{Donc } \sum_{j=1}^n \lambda_j \underbrace{\langle x_j | x_k \rangle}_{=0 \text{ si } j \neq k} = 0.$$

$$\text{Donc } \lambda_k \|x_k\|^2 = 0.$$

$$\text{Donc } \lambda_k = 0 \text{ car } x_k \neq 0.$$

Donc  $(x_1, \dots, x_n)$  est libre.

■

---

**Proposition 21.37**

Soient  $E$  un espace euclidien de dimension  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $(x_1, \dots, x_n) \in E^n$  une famille orthonormale possédant  $n$  vecteurs.

Alors  $(x_1, \dots, x_n)$  est une base orthonormale de  $E$ .

---

*Démonstration 21.38*

La famille  $(x_1, \dots, x_n)$  est libre car c'est une famille orthogonale de vecteurs non-nuls. De plus, elle possède  $n$  vecteurs et  $\dim E = n$  donc c'est une base de  $E$  et donc une base orthonormale de  $E$ . ■

### 21.2.3 Calculs dans une base orthonormale

---

**Proposition 21.39**

Soient  $E$  un espace euclidien de dimension  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  une base orthonormale de  $E$  et

$x$  et  $y$  deux vecteurs de  $E$  dont on note  $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$  et  $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$  les coordonnées respectives dans  $\mathcal{B}$ .

On a :

$$(1) \quad \forall i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, \quad x_i = \langle e_i \mid x \rangle ;$$

$$(2) \quad \langle x \mid y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i = {}^t X Y ;$$

$$(3) \quad \|x\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} = \sqrt{{}^t X X}.$$

---

*Démonstration 21.40*

Tout découle de :

$$\begin{cases} x = \sum_{i=1}^n x_i e_i \\ y = \sum_{i=1}^n y_i e_i \\ \forall i, j \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, \quad \langle e_i \mid e_j \rangle = \delta_{ij} \end{cases}$$

On a :

$$\begin{aligned} \forall i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, \quad \langle e_i \mid x \rangle &= \left\langle e_i \mid \sum_{j=1}^n x_j e_j \right\rangle \\ &= \sum_{j=1}^n x_j \langle e_i \mid e_j \rangle \\ &= x_i \end{aligned}$$

et :

$$\begin{aligned}\langle x | y \rangle &= \left\langle \sum_{i=1}^n x_i e_i \left| \sum_{j=1}^n y_j e_j \right. \right\rangle \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i y_j \langle e_i | e_j \rangle \\ &= \sum_{i=1}^n x_i y_i.\end{aligned}$$

■

---

#### Remarque 21.41

Attention au fait que les formules précédentes ne sont valables que dans une base orthonormale.

Ainsi, si  $(e_1, \dots, e_n)$  est une base orthonormale de  $E$ , alors on a :

$$\forall x \in E, \quad x = \sum_{i=1}^n \langle e_i | x \rangle e_i.$$

---

#### Corollaire 21.42

Soient  $E$  un espace euclidien,  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  une base orthonormale de  $E$  et  $u \in \mathcal{L}(E)$ .

La matrice de  $u$  dans  $\mathcal{B}$  est :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} \langle e_1 | u(e_1) \rangle & \dots & \langle e_1 | u(e_n) \rangle \\ \vdots & & \vdots \\ \langle e_n | u(e_1) \rangle & \dots & \langle e_n | u(e_n) \rangle \end{pmatrix}.$$

## 21.3 Sous-espaces vectoriels

### 21.3.1 Sous-espaces vectoriels orthogonaux

---

#### Définition 21.43

Soient  $E$  un espace préhilbertien et  $F$  et  $G$  deux sous-espaces vectoriels de  $E$ .

On dit que  $F$  et  $G$  sont deux sous-espaces vectoriels orthogonaux et on note  $F \perp G$  si on a :

$$\forall x \in F, \quad \forall y \in G, \quad x \perp y.$$

---

*Exemple 21.44*

Soit  $E$  un espace préhilbertien.

Soient  $x, y \in E$  tels que  $x \perp y$ . On a alors  $\text{Vect}(x) \perp \text{Vect}(y)$ .

Le sous-espace vectoriel nul  $\{0_E\}$  est orthogonal à tous les sous-espaces vectoriels de  $E$  (car le vecteur nul de  $E$  est orthogonal à tous les vecteurs de  $E$ ).

---

**Définition 21.45 (Orthogonal d'une partie)**

Soient  $E$  un espace préhilbertien et  $A \subseteq E$ .

On appelle orthogonal de  $A$  (dans  $E$ ) et on note  $A^\perp$  l'ensemble des vecteurs de  $E$  qui sont orthogonaux à tous les vecteurs de  $A$  :

$$A^\perp = \{x \in E \mid \forall y \in A, x \perp y\}.$$

L'ensemble  $A^\perp$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ .

---

**Proposition 21.46 (Orthogonal d'un sous-espace vectoriel)**

Soient  $E$  un espace préhilbertien et  $F$  un sous-espace vectoriel de  $E$ .

On a :

(1)  $F^\perp$  est un sous-espace vectoriel de  $E$  ;

(2)  $F \perp F^\perp$  ;

(3)  $F \cap F^\perp = \{0_E\}$  ;

(4)  $F \subseteq (F^\perp)^\perp$ .

---

*Démonstration 21.47 (1)*

On a  $F^\perp \subseteq E$  et  $0_E \in F^\perp$  car  $\forall y \in F, 0_E \perp y$ .

Soient  $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$  et  $x_1, x_2 \in F^\perp$ .

On a :

$$\forall y \in F, \langle \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 \mid y \rangle = \lambda_1 \underbrace{\langle x_1 \mid y \rangle}_{=0} + \lambda_2 \underbrace{\langle x_2 \mid y \rangle}_{=0} = 0.$$

Donc  $\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 \in F^\perp$ .

Donc  $F^\perp$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ . ■

---

*Démonstration 21.48 (2)*

Clair par définition de  $F^\perp$ . ■

---

*Démonstration 21.49 (3)*

Soit  $x \in F \cap F^\perp$ .

On a  $x \perp x$  donc  $\langle x | x \rangle = 0$ .

Donc  $x = 0_E$ . ■

---

*Démonstration 21.50 (4)*

Soit  $x \in F$ .

On a  $\forall y \in F^\perp, x \perp y$ .

Donc  $x \in (F^\perp)^\perp$ . ■

---

*Remarque 21.51*

Soient  $E$  un espace préhilbertien et  $F$  et  $G$  deux sous-espaces vectoriels de  $E$ .

Les propositions suivantes sont équivalentes :

(1)  $F \perp G$

(2)  $F \subseteq G^\perp$

(3)  $G \subseteq F^\perp$

---

*Démonstration 21.52*

On a :

$$F \perp G \iff \forall x \in F, \forall y \in G, x \perp y$$

$$\iff \forall x \in F, x \in G^\perp$$

$$\iff F \subseteq G^\perp.$$

D'où (1)  $\iff$  (2).

Idem pour (1)  $\iff$  (3). ■

### 21.3.2 Supplémentaire orthogonal

---

*Rappel 21.53*

Soient  $E$  un espace préhilbertien et  $F$  un sous-espace vectoriel de  $E$ .

Selon la Proposition 21.46, on a :

$$F \cap F^\perp = \{0_E\}.$$

Donc  $F$  et  $F^\perp$  sont en somme directe.

---

#### Définition 21.54 (Supplémentaire orthogonal)

Soient  $E$  un espace préhilbertien et  $F$  un sous-espace vectoriel de  $E$ .

Un supplémentaire orthogonal de  $F$  (dans  $E$ ) est un supplémentaire de  $F$  (dans  $E$ ) qui est orthogonal à  $F$ .

En d'autres termes, c'est un sous-espace vectoriel  $G$  de  $E$  tel que :

$$\begin{cases} F \oplus G = E \\ F \perp G \end{cases}$$

On résume parfois ce système avec la notation  $F \oplus G = E$  ou des variantes de cette notation.

---

#### Proposition 21.55 (Unicité du supplémentaire orthogonal)

Soient  $E$  un espace préhilbertien et  $F$  un sous-espace vectoriel de  $E$ .

Si  $G$  est un supplémentaire orthogonal de  $F$  alors  $G = F^\perp$ .

---

*Démonstration 21.56*

$\subseteq$  Claire car  $G \perp F$ .

$\supseteq$

Soit  $x \in F^\perp$ .

Montrons que  $x \in G$ .

Soient  $x_F \in F$  et  $x_G \in G$  tels que  $x = x_F + x_G$ .

On a  $\langle x_F | x_F + x_G \rangle = \langle x_F | x \rangle$  donc

$$\|x_F\|^2 + \underbrace{\langle x_F | x_G \rangle}_{=0 \text{ car } F \perp G} = \underbrace{\langle x_F | x \rangle}_{=0 \text{ car } F \perp G}.$$

Donc  $x_F = 0_E$ .

Donc  $x = x_G$ .

Donc  $x \in G$ . ■

---

*Remarque 21.57*

Soient  $E$  un espace préhilbertien et  $F$  un sous-espace vectoriel de  $E$ .

D'après la proposition précédente,  $F$  admet un supplémentaire orthogonal si, et seulement si,  $F^\perp$  est un supplémentaire de  $F$  :  $F + F^\perp = E$ .

---

**Exercice 21.58**

Soient  $E$  un espace préhilbertien et  $F$  un sous-espace vectoriel de  $E$ .

On suppose que  $F$  admet un supplémentaire orthogonal dans  $E$ .

Montrer :

$$(F^\perp)^\perp = F.$$

---

*Correction 21.59*

On a  $E = F \oplus F^\perp$  donc  $F$  est un supplémentaire orthogonal de  $F^\perp$ .

Donc  $F = (F^\perp)^\perp$  selon la Proposition 21.55.

---

**Définition 21.60**

Soit  $E$  un espace préhilbertien.

Un projecteur  $p \in \mathcal{L}(E)$  est dit orthogonal si son image et son noyau sont orthogonaux :

$$\text{Im } p \perp \ker p.$$

---

*Remarque 21.61*

Soient  $E$  un espace préhilbertien et  $F$  et  $G$  deux sous-espaces vectoriels supplémentaires dans  $E$ .

- (1) Notons  $p$  le projecteur sur  $F$ , parallèlement à  $G$ .

Si  $p$  est un projecteur orthogonal, alors  $G = F^\perp$ .

On dit simplement que  $p$  est le projecteur orthogonal sur  $F$ .

- (2) Le « projecteur orthogonal sur  $F$  » est bien défini si, et seulement si,  $F$  admet un supplémentaire orthogonal.

---

*Démonstration 21.62 (1)*

Si  $p$  est un projecteur orthogonal alors  $F \perp G$  et  $F \oplus G = E$  donc  $G = F^\perp$ . ■

---

*Remarque 21.63*

On sait que tout projecteur est le projecteur sur son image, parallèlement à son noyau.

De même, tout projecteur orthogonal  $p$  est le projecteur orthogonal sur son image, c'est-à-dire le projecteur sur  $\text{Im } p$ , parallèlement à  $(\text{Im } p)^\perp$ .



### 21.3.3 Projecteur orthogonal sur un sous-espace vectoriel de dimension finie

---

**Définition/Théorème 21.64**

Soient  $E$  un espace préhilbertien et  $F$  un sous-espace vectoriel de  $E$ .

On suppose que  $F$  est de dimension finie.

Alors  $F$  et son orthogonal  $F^\perp$  sont supplémentaires dans  $E$  :

$$E = F \oplus F^\perp.$$

Soit  $(e_1, \dots, e_n)$  une base orthonormale de  $F$ .

Le projecteur orthogonal  $p_F$  sur  $F$  est donné par :

$$\forall x \in E, \quad p_F(x) = \sum_{k=1}^n \langle e_k | x \rangle e_k.$$

---

*Démonstration 21.65*

Posons  $q : E \longrightarrow F$

$$x \longmapsto \sum_{k=1}^n \langle e_k | x \rangle e_k$$

On a bien  $q \in \mathcal{L}(E, F)$ .

On remarque :  $\forall x \in E, \quad x = \underbrace{q(x)}_{\in F} + \underbrace{x - q(x)}_{\in F^\perp ?}$ .

Soit  $x \in E$ . Il suffit de montrer que  $x - q(x) \in F^\perp$ .

En effet, on en déduira que  $E = F + F^\perp$  donc  $E = F \oplus F^\perp$  et que le projecteur orthogonal sur  $F$  est  $q$ .

On a :

$$\begin{aligned} \forall k \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, \quad \langle e_k | x - q(x) \rangle &= \langle e_k | x \rangle - \left\langle e_k \left| \sum_{\ell=1}^n \langle e_\ell | x \rangle e_\ell \right. \right\rangle \\ &= \langle e_k | x \rangle - \langle e_k | x \rangle \\ &= 0. \end{aligned}$$

Donc par combinaison linéaire :  $\forall y \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_n), \quad \langle y | x - q(x) \rangle = 0$ .

Donc  $x - q(x) \in F^\perp$ . ■

---

**Corollaire 21.66**

Soient  $E$  un espace euclidien et  $F$  un sous-espace vectoriel de  $E$ .

On a :

$$\dim F^\perp = \dim E - \dim F.$$

---

*Démonstration 21.67*

Comme  $F$  est de dimension finie, on sait (selon le théorème précédent) que  $F^\perp$  est un supplémentaire de  $F$ . La formule en découle. ■

---

**Définition 21.68**

Soient  $E$  un espace préhilbertien,  $F$  un sous-espace vectoriel de  $E$  et  $x$  un vecteur de  $E$ .

On appelle distance de  $x$  à  $F$  le réel :

$$d(x, F) = \inf_{z \in F} d(x, z) = \inf_{z \in F} \|x - z\| \in \mathbb{R}_+.$$

---

*Démonstration 21.69*

Cette borne inférieure est bien définie car  $\{d(x, z)\}_{z \in F}$  est une partie non-vide de  $\mathbb{R}$  (elle contient  $d(x, 0)$ ) et minorée (par 0). ■

---

**Proposition 21.70**

Soient  $E$  un espace préhilbertien,  $F$  un sous-espace vectoriel de  $E$  de dimension finie et  $x$  un vecteur de  $E$ .

On note  $p_F$  le projecteur orthogonal sur  $F$ .

Alors :

$$d(x, F) = \|x - p_F(x)\|.$$

Ainsi, la distance (qui est une borne inférieure) est en fait atteinte.

De plus,  $p_F(x)$  est l'unique élément de  $F$  où la distance de  $x$  à  $F$  est atteinte.

Enfin :

$$\|x\|^2 = \|p_F(x)\|^2 + \|x - p_F(x)\|^2.$$

---

*Démonstration 21.71*

On a :

$$\begin{aligned}\forall z \in F, \quad \|x - z\|^2 &= \left\| \underbrace{x - p_F(x)}_{\in F^\perp} + \underbrace{p_F(x) - z}_{\in F} \right\|^2 \\ &= \|x - p_F(x)\|^2 + \|p_F(x) - z\|^2 \\ &\geq \|x - p_F(x)\|^2 \text{ avec égalité ssi } p_F(x) = z.\end{aligned}\quad \left. \vphantom{\begin{aligned}\forall z \in F, \quad \|x - z\|^2 &= \left\| \underbrace{x - p_F(x)}_{\in F^\perp} + \underbrace{p_F(x) - z}_{\in F} \right\|^2 \\ &= \|x - p_F(x)\|^2 + \|p_F(x) - z\|^2 \\ &\geq \|x - p_F(x)\|^2 \text{ avec égalité ssi } p_F(x) = z.\end{aligned}} \right\} \begin{array}{l} \text{selon le} \\ \text{théorème de} \\ \text{Pythagore} \end{array}$$

D'où  $\min_{z \in F} \|x - z\| = \|x - p_F(x)\|$ .

Enfin, en prenant  $z = 0_E$ , on a :  $\|x\|^2 = \|p_F(x)\|^2 + \|x - p_F(x)\|^2$ . ■

---

**Exercice/Exemple 21.72**

Soient  $E$  un espace euclidien et  $v \in E$  unitaire.

On pose :

$$D = \text{Vect}(v) \quad \text{et} \quad H = \text{Vect}(v)^\perp.$$

Soit  $x \in E$ .

- (1) Donner le projeté orthogonal de  $x$  sur  $D$ .
- (2) Donner le projeté orthogonal de  $x$  sur  $H$ .
- (3) Donner la distance de  $x$  à  $D$ .
- (4) Donner la distance de  $x$  à  $H$ .

---

*Correction 21.73*

On remarque que  $(v)$  est une base orthonormale de  $D$ .

On a le projeté orthogonal de  $x$  sur  $D$  :  $p_D(x) = \langle v | x \rangle v$ .

On a le projeté orthogonal de  $x$  sur  $H$  :  $p_H(x) = x - \langle v | x \rangle v$ .

On a la distance de  $x$  à  $D$  :  $\|x - p_D(x)\| = \|x - \langle v | x \rangle v\|$ .

On a la distance de  $x$  à  $H$  :

$$\begin{aligned}\|x - p_H(x)\| &= \|x - x + \langle v | x \rangle v\| \\ &= \|\langle v | x \rangle v\| \\ &= |\langle v | x \rangle|\end{aligned}\quad \left. \vphantom{\begin{aligned}\|x - p_H(x)\| &= \|x - x + \langle v | x \rangle v\| \\ &= \|\langle v | x \rangle v\| \\ &= |\langle v | x \rangle|\end{aligned}} \right\} \text{car } v \text{ est unitaire}$$

### 21.3.4 Procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt

#### **Théorème 21.74**

Soient  $E$  un espace euclidien et  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  une base de  $E$ .

Alors il existe une base orthonormale  $\mathcal{B}' = (e'_1, \dots, e'_n)$  de  $E$  telle que :

$$\forall j \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, \quad e'_j \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_j),$$

c'est-à-dire telle que la matrice de passage  $\mathcal{P}_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'}$  soit triangulaire supérieure.

*Démonstration 21.75*

On calcule successivement :

$$e'_1 = \frac{e_1}{\|e_1\|} \quad e'_2 = \frac{e_2 - \langle e'_1 | e_2 \rangle e'_1}{\|e_2 - \langle e'_1 | e_2 \rangle e'_1\|} \quad e'_3 = \frac{e_3 - \langle e'_1 | e_3 \rangle e'_1 - \langle e'_2 | e_3 \rangle e'_2}{\|e_3 - \langle e'_1 | e_3 \rangle e'_1 - \langle e'_2 | e_3 \rangle e'_2\|} \quad \dots$$

Formule générale :  $\forall k \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, \quad e'_k = \frac{e_k - \sum_{j=1}^{k-1} \langle e'_j | e_k \rangle e'_j}{\left\| e_k - \sum_{j=1}^{k-1} \langle e'_j | e_k \rangle e'_j \right\|}.$  ■

#### **Corollaire 21.76**

Tout espace euclidien admet une base orthonormale.

*Démonstration 21.77*

Soit  $E$  un espace euclidien.

Il existe une base  $\mathcal{B}$  de  $E$  car  $\dim E < +\infty$ .

On en déduit une base orthonormale de  $E$  en appliquant à  $\mathcal{B}$  l'algorithme de Gram-Schmidt. ■

#### **Théorème 21.78 (Théorème de la base orthonormée incomplète)**

Soient  $E$  un espace euclidien et  $(e_1, \dots, e_r)$  une famille orthonormale de vecteurs de  $E$ .

Alors on peut compléter  $(e_1, \dots, e_r)$  en une base orthonormale de  $E$ .

---

*Démonstration 21.79*

La famille  $(e_1, \dots, e_r)$  est une famille libre de vecteurs de  $E$ .

Selon le théorème de la base incomplète, on peut la compléter en une base  $(e_1, \dots, e_n)$  de  $E$ .

En appliquant l'algorithme de Gram-Schmidt à cette base, on obtient une base orthonormale  $(e'_1, \dots, e'_n)$  de  $E$ .

On remarque  $\forall k \in \llbracket 1 ; r \rrbracket$ ,  $e'_k = e_k$  donc on a complété  $(e_1, \dots, e_r)$  en la base orthonormale

$$(e_1, \dots, e_r, e'_{r+1}, \dots, e'_n).$$

■

---

### Exercice/Exemple 21.80

On munit  $\mathbb{R}^4$  de son produit scalaire canonique et on pose :

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad e_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad e_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} \quad v = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

(1) Déterminer une base orthonormale de  $F = \text{Vect}(e_1, e_2, e_3)$ .

(2) Calculer le projeté orthogonal de  $v$  sur  $F$  et la distance de  $v$  à  $F$ .

---

*Correction 21.81 (1)*

On sait que  $(e_1, e_2, e_3)$  est une base de  $F$ . Orthonormalisons cette base.

On pose :

$$e'_1 = \frac{e_1}{\|e_1\|} \quad e'_2 = \frac{e_2 - \langle e'_1 | e_2 \rangle e'_1}{\|e_2 - \langle e'_1 | e_2 \rangle e'_1\|} \quad e'_3 = \frac{e_3 - \langle e'_1 | e_3 \rangle e'_1 - \langle e'_2 | e_3 \rangle e'_2}{\|e_3 - \langle e'_1 | e_3 \rangle e'_1 - \langle e'_2 | e_3 \rangle e'_2\|}$$

$$\text{On a } \|e_1\| = \sqrt{2} \text{ donc } e'_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\text{De plus, on a } \langle e'_1 | e_2 \rangle = \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} \text{ et } e_2 - \sqrt{2}e'_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ et } \left\| \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{2}.$$

$$\text{Donc } e'_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

De plus, on a  $\langle e'_1 | e_3 \rangle = \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} \right\rangle = \frac{3}{\sqrt{2}}$  et  $\langle e'_2 | e_3 \rangle = \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} \right\rangle = \frac{7}{\sqrt{2}}$  et  $e_3 - \frac{3}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{7}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} =$

$$\frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ et } \left\| \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\| = \frac{1}{2} \times 2 = 1.$$

Donc  $e'_3 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ .

Finalement,  $(e'_1, e'_2, e'_3)$  est une base orthonormale de  $F$ .

*Correction 21.82 (2)*

On a :

$$p_F(v) = \langle e'_1 | v \rangle e'_1 + \langle e'_2 | v \rangle e'_2 + \langle e'_3 | v \rangle e'_3.$$

Or, on a :

$$\langle e'_1 | v \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \langle e'_2 | v \rangle = 0 \quad \langle e'_3 | v \rangle = \frac{-1}{2}$$

D'où :

$$\begin{aligned} p_F(v) &= \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{4} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

D'où :

$$\begin{aligned}
 d(v, F) &= \|v - p_F(v)\| \\
 &= \left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\| \\
 &= \left\| \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\| \\
 &= \frac{1}{4} \times 2 \\
 &= \frac{1}{2}.
 \end{aligned}$$

### 21.3.5 Hyperplans d'un espace euclidien

---

#### Définition/Proposition 21.83

Soient  $E$  un espace euclidien et  $H$  un hyperplan de  $E$ .

On appelle vecteur normal à  $H$  tout vecteur  $v$  non-nul et orthogonal à tout vecteur de  $H$  :

$$v \in H^\perp \setminus \{0_E\}.$$

Il vérifie :

$$\forall x \in E, \quad x \in H \iff v \perp x.$$

---

*Démonstration 21.84*

On a  $\dim E < +\infty$  donc  $\dim H^\perp = \dim E - \dim H = 1$  donc il existe  $v \in H^\perp \setminus \{0_E\}$  donc  $H$  admet un vecteur normal.

Posons  $D = \text{Vect}(v)$ .

On a  $D = H^\perp$  donc  $H = D^\perp$  selon l'Exercice 21.58.

Donc :

$$\begin{aligned}
 \forall x \in E, \quad x \in H &\iff x \in D^\perp \\
 &\iff x \perp v \\
 &\iff \langle x | v \rangle = 0 \quad (\text{équation cartésienne de } H).
 \end{aligned}$$

■

---

**Proposition 21.85 (Isomorphisme canonique entre un espace euclidien et son dual)**

Soient  $E$  un espace euclidien et  $\ell \in E^*$  une forme linéaire sur  $E$ .

Il existe un unique vecteur  $v \in E$  tel que :

$$\forall x \in E, \ell(x) = \langle v | x \rangle.$$

---

*Démonstration 21.86*

$$\begin{array}{lcl} \text{Posons } \varphi : E & \longrightarrow & E^* \\ v & \longmapsto & E \longrightarrow \mathbb{R} \\ & & x \longmapsto \langle v | x \rangle \end{array}$$

On a  $\varphi \in \mathcal{L}(E, E^*)$ .

Montrons que  $\varphi$  est une injection.

Soit  $v \in \ker \varphi$ .

On a  $\varphi(v) = 0$  donc  $\forall x \in E, \langle v | x \rangle = 0$ .

Donc  $\langle v | v \rangle = 0$ .

Donc  $v = 0$ .

Donc  $\ker \varphi = \{0\}$  donc  $\varphi$  est une injection.

De plus,  $\dim E = \dim E^* < +\infty$  donc  $\varphi$  est une surjection.

Donc  $\varphi$  est un isomorphisme :  $\forall \ell \in E^*, \exists ! v \in E, \ell = \varphi(v)$ .

Donc :

$$\forall \ell \in E^*, \exists ! v \in E, \forall x \in E, \ell(x) = \langle v | x \rangle. \quad \blacksquare$$

---

**Exercice/Exemple 21.87**

On a vu dans l'Exercice/Exemple 21.80 un hyperplan  $F$  de  $\mathbb{R}^4$ .

Donner un vecteur normal à  $F$ .

---

*Correction 21.88*

On a  $v - p_F(v) \in F^\perp$  et  $v - p_F(v) \neq 0_{\mathbb{R}^4}$  donc  $v = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$  est un vecteur normal à  $F$  et donc

aussi.

Ainsi :

$$\forall \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4, \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} \in F \iff \left\langle \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle = 0$$

$$\iff a - b - c + d = 0 \quad (\text{équation cartésienne de } F).$$



---

*Remarque 21.89*

Soit  $E$  un espace euclidien.

On retrouve que les hyperplans de  $E$  sont les noyaux des formes linéaires non-nulles de  $E$ .

---

*Démonstration 21.90*

Soient  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  une base orthonormale de  $E$ ,  $H$  un hyperplan de  $E$  et  $v$  un vecteur normal à  $H$  de coordonnées  $(a_1, \dots, a_n)$  dans  $\mathcal{B}$ .

On a :

$$\begin{aligned} \forall \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n, \quad \sum_{k=1}^n x_k e_k \in H &\iff \sum_{k=1}^n x_k e_k \perp \sum_{k=1}^n a_k e_k \\ &\iff \sum_{k=1}^n a_k x_k = 0 \\ &\iff \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \ker \ell \end{aligned}$$

$$\text{avec } \ell : \begin{cases} e_1 \mapsto a_1 \\ \vdots \\ e_n \mapsto a_n \end{cases}$$

■

# Chapitre 22

## Fonctions de deux variables réelles

### Sommaire

<b>22.1</b>	<b>Ouverts de <math>\mathbb{R}^2</math></b>	<b>. 648</b>
<b>22.2</b>	<b>Continuité.</b>	<b>. 650</b>
<b>22.3</b>	<b>Fonctions de classe <math>\mathcal{C}^1</math></b>	<b>. 652</b>
22.3.1	Développement limité d'ordre 1	652
22.3.2	Dérivées partielles	652
22.3.3	Fonctions de classe $\mathcal{C}^1$	653
22.3.4	Règle de la chaîne	655
22.3.5	Équations aux dérivées partielles	657
<b>22.4</b>	<b>Extrema globaux, locaux</b>	<b>. 658</b>

Dans tout le chapitre, on note  $\|\cdot\|$  la norme euclidienne canonique de  $\mathbb{R}^2$ , c'est-à-dire la norme associée au produit scalaire canonique  $\langle \cdot | \cdot \rangle$  de  $\mathbb{R}^2$  :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^2, \quad \|(x, y)\| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

### 22.1 Ouverts de $\mathbb{R}^2$

#### Définition 22.1 (Boules)

Soient  $a = (a_1, a_2) \in \mathbb{R}^2$  et  $r \in \mathbb{R}_+$ .

La boule ouverte de centre  $a$  et de rayon  $r$  est l'ensemble des points  $x$  dont la distance à  $a$  est strictement inférieure à  $r$  :

$$\mathbb{B}(a, r) = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid \|a - x\| < r\}.$$

La boule fermée de centre  $a$  et de rayon  $r$  est l'ensemble des points  $x$  dont la distance à  $a$  est inférieure à  $r$  :

$$\mathbb{B}'(a, r) = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid \|a - x\| \leq r\}.$$

La sphère de centre  $a$  et de rayon  $r$  est l'ensemble des points  $x$  dont la distance à  $a$  est égale à  $r$  :

$$\mathbb{S}(a, r) = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid \|a - x\| = r\}.$$

Les notations  $\mathbb{B}(a, r)$ ,  $\mathbb{B}'(a, r)$  et  $\mathbb{S}(a, r)$  ne sont pas « officielles ».

---

**Définition 22.2**

Soient  $a \in \mathbb{R}^2$  et  $V \subseteq \mathbb{R}^2$ .

On dit que  $V$  est un voisinage de  $a$  dans  $\mathbb{R}^2$  s'il contient une boule centrée en  $a$  et de rayon strictement positif :

$$\exists \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \quad \mathbb{B}(a, \varepsilon) \subseteq V.$$

---

**Définition 22.3 (Ouvert)**

Soit  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ .

On dit que  $\Omega$  est un ouvert de  $\mathbb{R}^2$  (ou une partie ouverte de  $\mathbb{R}^2$ ) si  $\Omega$  est un voisinage de chacun de ses points, c'est-à-dire :

$$\forall a \in \Omega, \quad \exists \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \quad \mathbb{B}(a, \varepsilon) \subseteq \Omega.$$

---

**Exercice/Exemple 22.4**

Parmi les parties de  $\mathbb{R}^2$  suivantes, lesquelles sont des ouverts ?

$$\emptyset \quad \mathbb{R}^2 \quad (\mathbb{R}_+^*)^2 \quad (\mathbb{R}_+)^2 \quad \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \quad (\mathbb{R}^*)^2 \quad ]0 ; 1] \times \mathbb{R} \quad ]0 ; 1[ \times \mathbb{R}$$

---

*Correction 22.5*

$\emptyset$  est un ouvert.

$\mathbb{R}^2$  est un ouvert car  $\forall a \in \mathbb{R}^2, \quad \mathbb{B}(a, 1) \subseteq \mathbb{R}^2$ .

$(\mathbb{R}_+^*)^2$  est un ouvert car  $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad \mathbb{B}((x, y), \min\{|x| ; |y|\}) \subseteq (\mathbb{R}_+^*)^2$ .

$(\mathbb{R}_+)^2$  n'est pas un ouvert.

$\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$  est un ouvert car  $\forall a \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}, \quad \mathbb{B}(a, \|a\|) \subseteq \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ .

$(\mathbb{R}^*)^2$  est un ouvert.

$]0 ; 1] \times \mathbb{R}$  n'est pas un ouvert.


$]0 ; 1[ \times \mathbb{R}$  est un ouvert.

## 22.2 Continuité

Le graphe de  $f : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$  où  $\Omega$  est un ouvert de  $\mathbb{R}^2$  est l'ensemble :

$$\{(x, y, z) \in \Omega \times \mathbb{R} \mid z = f(x, y)\} \subseteq \mathbb{R}^3.$$

Par exemple :




---

### Définition 22.6 (Fonction continue sur un ouvert de $\mathbb{R}^2$ )

Soient  $\Omega$  un ouvert de  $\mathbb{R}^2$ ,  $f : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$  et  $a \in \Omega$ .

On dit que  $f$  est continue en  $a$  si on a :

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists \delta \in \mathbb{R}_+^*, \forall x \in \Omega, \|x - a\| \leq \delta \implies |f(x) - f(a)| \leq \varepsilon,$$

c'est-à-dire :

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists \delta \in \mathbb{R}_+^*, f(\Omega \cap \mathbb{B}'(a, \delta)) \subseteq [f(a) - \varepsilon ; f(a) + \varepsilon],$$

c'est-à-dire :

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists \delta \in \mathbb{R}_+^*, \begin{cases} \mathbb{B}'(a, \delta) \subseteq \Omega \\ f(\mathbb{B}'(a, \delta)) \subseteq [f(a) - \varepsilon ; f(a) + \varepsilon] \end{cases}$$

On dit que  $f$  est continue si elle est continue en tout de  $\Omega$ .

---

### Proposition 22.7

Soit  $\Omega$  un ouvert de  $\mathbb{R}^2$ .

L'ensemble  $\mathcal{C}^0(\Omega, \mathbb{R})$  des fonctions continues de  $\Omega$  dans  $\mathbb{R}$  est un sous-anneau de  $\mathcal{F}(\Omega, \mathbb{R})$ .

Si  $f : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$  et  $g : \text{Im } f \longrightarrow \mathbb{R}$  sont des fonctions continues alors  $g \circ f : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$  est continue.

Si  $f : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$  est continue alors l'ensemble

$$\Omega' = f^{-1}(\mathbb{R}^*) = \{x \in \Omega \mid f(x) \neq 0\}$$

est un ouvert de  $\mathbb{R}^2$  et la fonction

$$\begin{aligned} \frac{1}{f} : \Omega' &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{1}{f(x)} \end{aligned}$$

est continue.

---

Démonstration 22.8

★★ Exercice ★★

■

---

### Exercice/Exemple 22.9

On pose :

$$f : (x, y) \longmapsto x \quad \text{et} \quad g : (x, y) \longmapsto \operatorname{Arctan} \frac{y}{x}.$$

Pour chacune de ces fonctions, donner son ensemble de définition, dire si c'est un ouvert de  $\mathbb{R}^2$  et dire si la fonction est continue.

---

Correction 22.10

$f$  est définie sur  $\mathbb{R}^2$  qui est un ouvert de  $\mathbb{R}^2$ .

Soit  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ . Montrons que  $f$  est continue en  $(a, b)$ .

On a :

$$\begin{aligned} \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad |f(x, y) - f(a, b)| &= |x - a| \\ &= \sqrt{(x - a)^2} \\ &\leq \sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2} \\ &= \|(x, y) - (a, b)\|. \end{aligned}$$

On a donc :

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \quad \exists \delta \in \mathbb{R}_+^*, \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad \|(x, y) - (a, b)\| \leq \delta \implies |f(x, y) - f(a, b)| \leq \varepsilon$$

car  $\delta = \varepsilon$  convient.

Donc  $f$  est continue.

$g$  est définie sur  $\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$  qui est un ouvert de  $\mathbb{R}^2$ .

De même que précédemment,  $(x, y) \longmapsto y$  est continue.

Donc  $(x, y) \longmapsto \frac{y}{x}$  est continue sur  $\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ .

Or  $\operatorname{Arctan} : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$  est continue donc  $g$  est continue par composition.

## 22.3 Fonctions de classe $\mathcal{C}^1$

### 22.3.1 Développement limité d'ordre 1

---

**Notation 22.11**

Soient  $\Omega$  un ouvert de  $\mathbb{R}^2$  contenant  $(0, 0)$  et  $g : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ .

On dit que  $g(x)$  est négligeable devant  $\|x\|$  et on note  $g(x) \underset{x \rightarrow (0,0)}{=} o(\|x\|)$  si on a :

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists \delta \in \mathbb{R}_+^*, \forall x \in \Omega, \|x\| \leq \delta \implies |g(x)| \leq \varepsilon \|x\|.$$

---

**Définition 22.12**

Soient  $\Omega$  un ouvert de  $\mathbb{R}^2$ ,  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  et  $a = (a_1, a_2) \in \Omega$ .

On dit que  $f$  admet un développement limité à l'ordre 1 en  $a$  s'il existe  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$  tels que :

$$f(a_1 + h_1, a_2 + h_2) \underset{h=(h_1, h_2) \rightarrow (0,0)}{=} f(a_1, a_2) + \lambda h_1 + \mu h_2 + o(\|h\|).$$

Les réels  $\lambda$  et  $\mu$  sont alors uniques.

### 22.3.2 Dérivées partielles

---

**Définition 22.13**

Soient  $\Omega$  un ouvert de  $\mathbb{R}^2$ ,  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  et  $a = (a_1, a_2) \in \Omega$ .

On dit que  $f$  admet une dérivée partielle par rapport à  $x$  en  $a$  si la fonction  $\gamma : t \mapsto f(t, a_2)$  est dérivable en  $a_1$ .

On pose alors :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(a) = \gamma'(a_1).$$

On définit de même  $\frac{\partial f}{\partial y}$ .

---

**Exercice/Exemple 22.14**

Calculer les dérivées partielles de

$$f : (x, y) \mapsto x^3 y^2 + x + 1 \quad \text{et} \quad g : (x, y) \mapsto \text{Arctan} \frac{y}{x}.$$

---

*Correction 22.15*

On a :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 3x^2y^2 + 1 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 2x^3y \end{cases}$$

et :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}, \begin{cases} \frac{\partial g}{\partial x}(x, y) = \frac{-y}{x^2} \times \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} = \frac{-y}{x^2 + y^2} \\ \frac{\partial g}{\partial y}(x, y) = \frac{1}{x} \times \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} = \frac{x}{x^2 + y^2} \end{cases}$$

---

*Remarque 22.16*

Soient  $\Omega$  un ouvert de  $\mathbb{R}^2$ ,  $f : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$  et  $a \in \Omega$ .

Le fait que  $f$  admette des dérivées partielles en  $a$  n'implique pas la continuité de  $f$  en  $a$ .

### 22.3.3 Fonctions de classe $\mathcal{C}^1$

---

**Définition 22.17**

Soit  $\Omega$  un ouvert de  $\mathbb{R}^2$ .

On dit qu'une fonction  $f : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  si ses dérivées partielles  $\frac{\partial f}{\partial x}$  et  $\frac{\partial f}{\partial y}$  sont définies et continues.

---

**Théorème 22.18**

Soient  $\Omega$  un ouvert de  $\mathbb{R}^2$  et  $f : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$  de classe  $\mathcal{C}^1$ .

Alors  $f$  admet un développement limité à l'ordre 1 en tout point de  $\Omega$ .

Soit  $(x_0, y_0) \in \Omega$ .

Alors on a :

$$f(x_1, y_1) \underset{(x_1, y_1) \longrightarrow (x_0, y_0)}{=} f(x_0, y_0) + (x_1 - x_0) \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + (y_1 - y_0) \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) + o(\|(x_1 - x_0, y_1 - y_0)\|)$$

On a :

$$\begin{aligned}
 f(x_1, y_1) - f(x_0, y_0) &= f(x_1, y_1) - f(x_1, y_0) + f(x_1, y_0) - f(x_0, y_0) \\
 &= \int_{y_0}^{y_1} \frac{\partial f}{\partial y}(x_1, t) dt + \int_{x_0}^{x_1} \frac{\partial f}{\partial x}(t, y_0) dt \\
 &= \int_{y_0}^{y_1} \left( \frac{\partial f}{\partial y}(x_1, t) - \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right) dt + \int_{y_0}^{y_1} \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) dt \\
 &\quad + \int_{x_0}^{x_1} \left( \frac{\partial f}{\partial x}(t, y_0) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \right) dt + \int_{x_0}^{x_1} \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) dt
 \end{aligned}$$

Soient  $\varepsilon, \delta \in \mathbb{R}_+^*$  tels que

$$\begin{cases} \mathbb{B}((x_0, y_0), \delta) \subseteq \Omega \\ \forall a \in \mathbb{B}((x_0, y_0), \delta), \begin{cases} \left| \frac{\partial f}{\partial x}(a) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \right| \leq \varepsilon \\ \left| \frac{\partial f}{\partial y}(a) - \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right| \leq \varepsilon \end{cases} \end{cases}$$

On a :

$$\begin{aligned}
 f(x_1, y_1) - f(x_0, y_0) &= \underbrace{\int_{y_0}^{y_1} \left( \frac{\partial f}{\partial y}(x_1, t) - \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right) dt}_{\substack{|\cdot| \leq \varepsilon \\ \leq |y_1 - y_0| \varepsilon}} + \underbrace{\int_{y_0}^{y_1} \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) dt}_{=(y_1 - y_0) \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)} \\
 &\quad + \underbrace{\int_{x_0}^{x_1} \left( \frac{\partial f}{\partial x}(t, y_0) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \right) dt}_{\substack{|\cdot| \leq \varepsilon \\ \leq |x_1 - x_0| \varepsilon}} + \underbrace{\int_{x_0}^{x_1} \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) dt}_{=(x_1 - x_0) \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)}
 \end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned}
 \int_{y_0}^{y_1} \left( \frac{\partial f}{\partial y}(x_1, t) - \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right) dt + \int_{x_0}^{x_1} \left( \frac{\partial f}{\partial x}(t, y_0) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \right) dt &\leq 2\varepsilon \|(x_1, y_1) - (x_0, y_0)\| \\
 &= o(\|(x_1 - x_0, y_1 - y_0)\|).
 \end{aligned}$$

D'où le résultat. ■

### Définition 22.20 (Gradient)

Soient  $\Omega$  un ouvert de  $\mathbb{R}^2$ ,  $f \in \mathcal{C}^1(\Omega, \mathbb{R})$  et  $a \in \Omega$ .

On appelle gradient de  $f$  en  $a$  le vecteur

$$\nabla f(a) = \left( \frac{\partial f}{\partial x}(a), \frac{\partial f}{\partial y}(a) \right).$$



Selon le théorème précédent, il vérifie :

$$f(a+h) \underset{h \rightarrow (0,0)}{=} f(a) + \langle \nabla f(a) \mid h \rangle + o(\|h\|).$$

---

### Exercice/Exemple 22.21

Calculer le gradient des fonctions

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} &\longrightarrow \mathbb{R} & \text{et} & & g : \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x,y) &\longmapsto \sqrt{x^2 + y^2} & & & (x,y) &\longmapsto \operatorname{Arctan} \frac{y}{x} \end{aligned}$$

---

*Correction 22.22*

On a :

$$\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}, \quad \nabla f(x,y) = \left( \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} (x,y)$$

et :

$$\forall (x,y) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}, \quad \nabla g(x,y) = \left( \frac{-y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2} \right) = \frac{1}{x^2 + y^2} (-y,x).$$

## 22.3.4 Règle de la chaîne

---

### Proposition 22.23

Soient  $\Omega$  un ouvert de  $\mathbb{R}^2$ ,  $f \in \mathcal{C}^1(\Omega, \mathbb{R})$  et  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$  tel que  $\operatorname{Card} I \geq 2$ .

$$\begin{aligned} \text{Soit } \gamma : I &\longrightarrow \Omega \\ t &\longmapsto (\gamma_1(t), \gamma_2(t)) \end{aligned}$$

On suppose que  $\gamma_1$  et  $\gamma_2$  sont de classe  $\mathcal{C}^1$ .

$$\begin{aligned} \text{Alors } g : I &\longrightarrow \mathbb{R} & \text{est de classe } \mathcal{C}^1 & \text{et sa dérivée est :} \\ t &\longmapsto f(\gamma(t)) \end{aligned}$$

$$\forall t \in I, \quad g'(t) = \frac{\partial f}{\partial x}(\gamma(t)) \gamma_1'(t) + \frac{\partial f}{\partial y}(\gamma(t)) \gamma_2'(t).$$

---

*Démonstration 22.24*

Soit  $t \in I$ .

On a, quand  $h \rightarrow 0$  :

$$\begin{cases} \gamma_1(t+h) = \gamma_1(t) + \gamma_1'(t)h + o(h) \\ \gamma_2(t+h) = \gamma_2(t) + \gamma_2'(t)h + o(h) \end{cases}$$

Donc :

$$\begin{aligned} g(t+h) &= f\left(\underbrace{\gamma_1(t) + \gamma_1'(t)h + o(h)}_{\rightarrow 0}, \underbrace{\gamma_2(t) + \gamma_2'(t)h + o(h)}_{\rightarrow 0}\right) \\ &= f(\gamma(t)) + \frac{\partial f}{\partial x}(\gamma(t))(\gamma_1'(t)h + o(h)) + \frac{\partial f}{\partial y}(\gamma(t))(\gamma_2'(t)h + o(h)) \\ &\quad + o\left(\underbrace{\left(\underbrace{\gamma_1'(t)h + o(h)}_{\mathcal{O}(h)}, \underbrace{\gamma_2'(t)h + o(h)}_{\mathcal{O}(h)}\right)}_{o(h)}\right) \\ &= g(t) + \left(\frac{\partial f}{\partial x}(\gamma(t))\gamma_1'(t) + \frac{\partial f}{\partial y}(\gamma(t))\gamma_2'(t)\right)h + o(h) \end{aligned}$$

Donc  $g$  est dérivable, de dérivée  $\frac{\partial f}{\partial x}(\gamma(t))\gamma_1'(t) + \frac{\partial f}{\partial y}(\gamma(t))\gamma_2'(t)$ . ■

---

**Définition/Proposition 22.25 (Dérivée selon un vecteur)**

Soient  $\Omega$  un ouvert de  $\mathbb{R}^2$ ,  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $a \in \Omega$  et  $v \in \mathbb{R}^2$ .

On appelle dérivée de  $f$  en  $a$  selon  $v$  la dérivée en 0 (si elle existe) de  $t \mapsto f(a + tv)$ .

On la note  $D_v f(a)$ .

Si  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  alors  $D_v f(a)$  existe et vaut

$$D_v f(a) = \langle \nabla f(a) \mid v \rangle.$$

---

*Démonstration 22.26*

Notons  $v = (v_1, v_2)$ .

On a, pour tout  $t$  suffisamment petit :

$$f(a + tv) = f(a_1 + tv_1, a_2 + tv_2).$$

Donc selon la règle de la chaîne :

$$\begin{aligned} D_v f(a) &= v_1 \frac{\partial f}{\partial x}(a) + v_2 \frac{\partial f}{\partial y}(a) \\ &= \left\langle \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} \mid \nabla f(a) \right\rangle. \end{aligned}$$
■

---

**Corollaire 22.27**

Soient  $\Omega, \Omega'$  deux ouverts de  $\mathbb{R}^2$ ,  $f \in \mathcal{C}^1(\Omega, \mathbb{R})$  et  $\varphi, \psi \in \mathcal{C}^1(\Omega', \mathbb{R})$ .

On suppose  $\forall u, v \in \Omega', (\varphi(u, v), \psi(u, v)) \in \Omega$ .

On pose  $g : \begin{array}{ccc} \Omega' & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ (u, v) & \longmapsto & f(\varphi(u, v), \psi(u, v)) \end{array}$

Alors  $g$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  et on a :

$$\forall a \in \Omega', \quad \begin{cases} \frac{\partial g}{\partial u}(a) = \frac{\partial f}{\partial x}(\varphi(a), \psi(a)) \frac{\partial \varphi}{\partial u}(u, v) + \frac{\partial f}{\partial y}(\varphi(a), \psi(a)) \frac{\partial \psi}{\partial u}(u, v) \\ \frac{\partial g}{\partial v}(a) = \frac{\partial f}{\partial x}(\varphi(a), \psi(a)) \frac{\partial \varphi}{\partial v}(u, v) + \frac{\partial f}{\partial y}(\varphi(a), \psi(a)) \frac{\partial \psi}{\partial v}(u, v) \end{cases}$$

### 22.3.5 Équations aux dérivées partielles

---

*Exemple 22.28*

Réolvons sur  $\mathbb{R}^2$  l'équation aux dérivées partielles (E)  $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = x^2 y^2$ .

Soit  $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$ .

On a :

$$f \text{ est solution de (E)} \iff \exists g \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}), \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad f(x, y) = \frac{1}{3}x^3 y^2 + g(y).$$

*Exemple 22.29*

Réolvons sur  $\mathbb{R}^2$  l'équation aux dérivées partielles (E)  $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = \cos x + \sin y + \exp(xe^y)$ .

Soit  $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$  (c'est-à-dire  $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$ ).

On a :

$$\begin{aligned} f \text{ est solution de (E)} &\iff \exists g \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}), \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \sin x + x \sin y \\ &\quad + e^{-y} \exp(xe^y) + g(y) \\ &\iff \exists g, h \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}), \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad f(x, y) = -\cos x + \frac{1}{2}x^2 \sin y \\ &\quad + e^{-2y} \exp(xe^y) + xg(y) + h(y) \end{aligned}$$

où  $g, h \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ .

---

*Exemple 22.30*  
*Cf. Exercice 22.26.*

---

*Remarque 22.31*

On retrouve que le gradient d'une fonction est « orthogonal aux lignes de niveau ».

Soient  $\Omega$  un ouvert de  $\mathbb{R}^2$ ,  $f \in \mathcal{C}^1(\Omega, \mathbb{R})$ ,  $\lambda \in \mathbb{R}$  et  $\gamma \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R}^2)$  où  $I$  est un intervalle de  $\mathbb{R}$  tels que

$$\forall t \in I, \gamma(t) \in \Omega \quad \text{et} \quad f(\gamma(t)) = \lambda.$$

On a, selon la règle de la chaîne :

$$\forall t \in I, \langle \nabla f(\gamma(t)) \mid \gamma'(t) \rangle = 0.$$

## 22.4 Extrema globaux, locaux

---

### Définition 22.32

Soient  $A \subseteq \mathbb{R}^2$  non-vide,  $f : A \longrightarrow \mathbb{R}$  et  $a \in A$ .

On dit que  $f$  admet un maximum (global) en  $a$  si on a :

$$\forall x \in A, f(x) \leq f(a).$$

On dit que  $f$  admet un minimum (global) en  $a$  si on a :

$$\forall x \in A, f(x) \geq f(a).$$

On dit que  $f$  admet un maximum local en  $a$  si on a :

$$\exists \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \forall x \in A \cap \mathbb{B}(a, \varepsilon), f(x) \leq f(a).$$

On dit que  $f$  admet un minimum local en  $a$  si on a :

$$\exists \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \forall x \in A \cap \mathbb{B}(a, \varepsilon), f(x) \geq f(a).$$

On dit que  $f$  admet un extremum global en  $a$  si  $f$  admet un maximum ou un minimum en  $a$ .

On dit que  $f$  admet un extremum local en  $a$  si  $f$  admet un maximum local ou un minimum local en  $a$ .

---

*Exemple 22.33*

La fonction  $N : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$  admet un minimum global en  $(0,0)$  et n'admet pas de maximum car elle n'est pas majorée.

$$(x, y) \longmapsto \sqrt{x^2 + y^2}$$

---

**Définition 22.34 (Point critique)**

Soient  $\Omega$  un ouvert de  $\mathbb{R}^2$  et  $f \in \mathcal{C}^1(\Omega, \mathbb{R})$ .

On dit que  $f$  admet un point critique en  $a \in \Omega$  si

$$\nabla f(a) = (0, 0).$$

---

**Théorème 22.35**

Soient  $\Omega$  un ouvert de  $\mathbb{R}^2$ ,  $f \in \mathcal{C}^1(\Omega, \mathbb{R})$  et  $a \in \Omega$ .

Si  $f$  admet un extremum local en  $a$  alors

$$\nabla f(a) = (0, 0).$$

NB : la réciproque est fausse. Par exemple, en posant  $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ , on a  $\nabla f(0,0) = (0,0)$

$$(x, y) \longmapsto x^3$$

mais  $f$  n'admet pas d'extremum local en  $(0,0)$ .

---

*Démonstration 22.36*

Quitte à remplacer  $f$  par  $-f$ , on peut supposer que  $f$  admet un minimum local en  $a$ .

Soit  $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$  tel que 
$$\begin{cases} \mathbb{B}(a, \varepsilon) \subseteq \Omega \\ \forall b \in \mathbb{B}(a, \varepsilon), f(b) \geq f(a) \end{cases}$$

Posons  $(a_1, a_2) = a$ .

La fonction  $g : ]a_1 - \varepsilon ; a_1 + \varepsilon[ \longrightarrow \mathbb{R}$  admet un minimum en  $a_1$ .

$$t \longmapsto f(t, a_2)$$

De plus,  $]a_1 - \varepsilon ; a_1 + \varepsilon[$  est un voisinage de  $a_1$  et  $g$  est dérivable donc  $g'(a_1) = 0$ , c'est-à-dire  $\frac{\partial f}{\partial x}(a) = 0$ .

On montre de même  $\frac{\partial f}{\partial y}(a) = 0$ . ■

---

*Remarque 22.37*

L'hypothèse selon laquelle  $\Omega$  est un ouvert est importante.

Par exemple, la fonction

$$\begin{aligned} h : \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\longmapsto x \end{aligned}$$

admet un minimum en  $(0, 0)$  mais  $\frac{\partial h}{\partial x}(0, 0) \neq 0$ .

---

*Exemple 22.38*

Cf. Exercice 22.18.

# Chapitre 23

## Probabilités

### Sommaire

---

<b>23.1</b>	<b>Rappels et compléments sur les ensembles . . . . .</b>	<b>662</b>
23.1.1	Ensembles finis . . . . .	662
23.1.2	Dénombrement des ensembles finis . . . . .	662
<b>23.2</b>	<b>Espaces probabilisés . . . . .</b>	<b>665</b>
23.2.1	Cadre formel . . . . .	665
23.2.1.1	Univers . . . . .	665
23.2.1.2	Événements . . . . .	665
23.2.1.3	Probabilité . . . . .	666
23.2.1.4	Distribution de probabilités . . . . .	668
23.2.2	Exemple : probabilité uniforme sur un ensemble fini . . . . .	669
<b>23.3</b>	<b>Conditionnement . . . . .</b>	<b>671</b>
23.3.1	Définitions . . . . .	671
23.3.2	Propriétés . . . . .	673
23.3.2.1	Formule des probabilités composées . . . . .	673
23.3.2.2	Formule des probabilités totales . . . . .	673
23.3.2.3	Formules de Bayes . . . . .	674
<b>23.4</b>	<b>Événements indépendants . . . . .</b>	<b>675</b>
<b>23.5</b>	<b>Variables aléatoires . . . . .</b>	<b>677</b>
23.5.1	Définition . . . . .	677
23.5.2	Exemples . . . . .	679
23.5.2.1	Loi uniforme sur un ensemble fini . . . . .	680
23.5.2.2	Loi de Bernoulli de paramètre $p \in [0 ; 1]$ . . . . .	680
23.5.2.3	Loi binomiale de paramètres $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in [0 ; 1]$ . . . . .	681
23.5.3	Couples de variables aléatoires . . . . .	681
<b>23.6</b>	<b>Variables aléatoires indépendantes . . . . .</b>	<b>683</b>
23.6.1	Définition . . . . .	683
23.6.2	Lemme des coalitions . . . . .	685
23.6.3	Interprétation de la loi binomiale . . . . .	686
<b>23.7</b>	<b>Espérance, variance . . . . .</b>	<b>687</b>
23.7.1	Espérance . . . . .	688
23.7.1.1	Définition . . . . .	688
23.7.1.2	Propriétés . . . . .	689
23.7.2	Variance, écart-type, covariance . . . . .	691
23.7.2.1	Définitions . . . . .	691

23.7.2.2	Propriétés . . . . .	693
23.7.3	Inégalités . . . . .	695
23.7.3.1	Inégalité de Markov . . . . .	695
23.7.3.2	Inégalité de Bienaymé-Tchebychev . . . . .	696
23.7.4	Compléments . . . . .	697

---

## 23.1 Rappels et compléments sur les ensembles

### 23.1.1 Ensembles finis

---

#### Définition 23.1

Un ensemble  $E$  est dit fini s'il contient un nombre fini d'éléments.

Le nombre d'éléments de  $E$  est appelé cardinal de  $E$  et est noté  $|E|$ ,  $\text{Card } E$  ou encore  $\#E$ .

---

#### Théorème 23.2

Soient  $E$  un ensemble fini et  $A \subseteq E$  une partie de  $E$ .

Alors  $A$  est un ensemble fini.

De plus, on a :

$$\text{Card } A \leq \text{Card } E$$

avec égalité si, et seulement si,  $A = E$ .

---

#### Théorème 23.3

Soient  $E$  et  $F$  deux ensembles finis de même cardinal et une fonction  $f : E \longrightarrow F$ .

Les trois propositions suivantes sont équivalentes :

(1)  $f$  est une bijection

(2)  $f$  est une injection

(3)  $f$  est une surjection.

### 23.1.2 Dénombrement des ensembles finis

Soient  $E$  un ensemble fini et  $A, B \in \mathcal{P}(E)$ .

On a :



$\text{Card } A \cup B = \text{Card } A + \text{Card } B$  si  $A$  et  $B$  sont disjoints

$\text{Card } A \cup B = \text{Card } A + \text{Card } B - \text{Card } A \cap B$

$\text{Card } E \setminus A = \text{Card } E - \text{Card } A$

$\text{Card } A \times B = \text{Card } A \times \text{Card } B$

$\text{Card } B^A = \text{Card } \mathcal{F}(A, B) = (\text{Card } B)^{\text{Card } A}$

$\text{Card } \mathcal{P}(E) = 2^{\text{Card } E}$

$\text{Card } E^p = (\text{Card } E)^p.$

Soit  $p \in \llbracket 0 ; n \rrbracket$ .

On appelle :

$p$ -arrangement de  $E$  tout  $p$ -uplet d'éléments de  $E$  deux à deux distincts ;

$p$ -combinaison de  $E$  toute partie de  $E$  contenant  $p$  éléments.

On a alors, en notant  $n$  le cardinal de  $E$  :

le nombre de  $p$ -arrangements de  $E$  est  $A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$

le nombre de  $p$ -combinaisons de  $E$  est  $C_n^p = \binom{n}{p} = \frac{n!}{p! (n-p)!}$

Enfin,  $A_n^p$  est aussi le nombre d'injections d'un ensemble de cardinal  $p$  vers  $E$ . En particulier, si  $p = n$  et en notant  $\mathfrak{S}_E$  l'ensemble des bijections de  $E$  vers  $E$  :

$$\text{Card } \mathfrak{S}_E = n!$$

---

### Exercice/Exemple 23.4

Soient  $k, n \in \mathbb{N}^*$  tels que  $k \leq n$ .

Une urne contient  $n$  boules numérotées de 1 à  $n$ . On tire  $k$  boules dans cette urne.

Donner le nombre de résultats possibles en fonction du type de tirage :

- (1) On tire  $k$  boules simultanément.
- (2) On tire  $k$  boules une par une, avec remise.
- (3) On tire  $k$  boules une par une, sans remise.

- (1) Il y a  $\binom{n}{k}$  résultats possibles.
- (2) Il y a  $n^k$  résultats possibles.
- (3) Il y a  $A_n^k$  résultats possibles.

---

**Exercice/Exemple 23.6 (Mines-Télécom 2016)**

Soit  $E$  un ensemble fini dont on note  $n$  le cardinal.

Donner le cardinal des ensembles suivants :

- (1)  $E_1 = \{(X, Y) \in \mathcal{P}(E)^2 \mid \{X; Y\} \text{ est une partition de } E\}$ ;
- (2)  $E_2 = \{(X, Y) \in \mathcal{P}(E)^2 \mid X \cap Y = \emptyset\}$ ;
- (3)  $E_3 = \{(X, Y) \in \mathcal{P}(E)^2 \mid X \cup Y = E\}$ ;
- (4)  $E_4 = \{(X, Y) \in \mathcal{P}(E)^2 \mid X \subseteq Y\}$ ;
- (5)  $E_5 = \{(X, Y, Z) \in \mathcal{P}(E)^3 \mid X \cup Y \cup Z = E\}$ .

On a :

- (1)  $\text{Card } E_1 = 2^n - 2$
- (2)  $\text{Card } E_2 = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 2^{n-k} = 3^n$
- (3)  $\text{Card } E_3 = 3^n$
- (4)  $\text{Card } E_4 = 3^n$
- (5)  $\text{Card } E_5 = 7^n$

## 23.2 Espaces probabilisés

### 23.2.1 Cadre formel

#### 23.2.1.1 Univers

On considère un ensemble fini non-vidé  $\Omega$  appelé l'univers.

---

*Exemple 23.8*

- On lance un dé une fois :  $\Omega = \llbracket 1 ; 6 \rrbracket$ .
- On lance un dé deux fois :  $\Omega = \llbracket 1 ; 6 \rrbracket^2$ .
- On lance un dé  $n$  fois :  $\Omega = \llbracket 1 ; 6 \rrbracket^n$ .

---

*Remarque 23.9*

En pratique, on ne précisera pas quel est l'univers (il y a beaucoup de façons de modéliser une situation et la modélisation choisie ne change pas les probabilités obtenues).

#### 23.2.1.2 Événements

Les parties de  $\Omega$  sont appelées les événements.

---

*Exemple 23.10*

- Expérience aléatoire : on lance un dé une fois.  
Univers :  $\Omega = \llbracket 1 ; 6 \rrbracket$ .  
Événement « le résultat vaut 6 » :  $\{6\}$ .  
Événement « le résultat est pair » :  $\{2 ; 4 ; 6\}$ .
- Expérience aléatoire : on lance un dé deux fois.  
Univers :  $\Omega = \llbracket 1 ; 6 \rrbracket^2$ .  
Événement « les deux lancers donnent le même résultat » :  $\{(1, 1) ; (2, 2) ; (3, 3) ; (4, 4) ; (5, 5) ; (6, 6)\}$ .

---

#### Définition 23.11

L'ensemble vide  $\emptyset$  est un événement, appelé l'événement impossible.

L'événement  $\Omega$  est appelé l'événement certain.

Les événements qui ne contiennent qu'un seul élément (*i.e.* les singletons) sont appelés événements élémentaires.

---

**Définition 23.12**

Deux événements sont dits incompatibles (ou disjoints) si leur intersection est vide.

---

**Définition 23.13 (Système complet d'événements)**

Soient  $\Omega$  un univers et  $N \in \mathbb{N}^*$ .

On appelle système complet d'événements toute famille  $(A_1, \dots, A_N) \in \mathcal{P}(\Omega)^N$  d'événements deux à deux incompatibles telle que

$$\bigcup_{n=1}^N A_n = \Omega.$$

### 23.2.1.3 Probabilité

---

**Définition 23.14 (Probabilité)**

Soit  $\Omega$  un univers.

On appelle probabilité sur  $\Omega$  toute application  $\mathbb{P} : \mathcal{P}(\Omega) \longrightarrow [0 ; 1]$  telle que :

(1)  $\mathbb{P}(\Omega) = 1$

(2) Pour tout entier  $N \in \mathbb{N}^*$  et toute famille  $(A_1, \dots, A_N) \in \mathcal{P}(\Omega)^N$  d'événements deux à deux incompatibles :

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^N A_n\right) = \sum_{n=1}^N \mathbb{P}(A_n).$$

---

**Définition 23.15 (Espace probabilisé)**

Un couple  $(\Omega, \mathbb{P})$ , où  $\Omega$  est un univers et  $\mathbb{P}$  est une probabilité sur  $\Omega$ , est appelé un espace probabilisé.

---

*Remarque 23.16*

Soit  $(\Omega, \mathbb{P})$  un espace probabilisé.

On a :

$$\mathbb{P}(\emptyset) = 0.$$

---

*Démonstration 23.17*

On a  $\emptyset = \emptyset \cup \emptyset$  (événements incompatibles) donc  $\mathbb{P}(\emptyset) = \mathbb{P}(\emptyset) + \mathbb{P}(\emptyset)$ .

Donc  $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$ . ■

---

*Remarque 23.18*

Soit  $\Omega$  un univers.

Dans ce chapitre, on note généralement  $\overline{A}$  le complémentaire dans  $\Omega$  de l'événement  $A \in \mathcal{P}(\Omega)$ .

Le complémentaire d'une partie n'est jamais noté ainsi dans le cadre de la topologie (notation alors réservée à l'adhérence).

---

**Proposition 23.19**

Soient  $(\Omega, \mathbb{P})$  un espace probabilisé et  $A, B \in \mathcal{P}(\Omega)$  deux événements.

(1) Si  $A \subseteq B$  alors  $\mathbb{P}(B \setminus A) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A)$ . En particulier, on a  $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$ .

(2) On a  $\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$ .

(3) On a  $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$ .

---

*Démonstration 23.20 (1)*

On a  $B = A \cup (B \setminus A)$  (réunion disjointe) donc  $\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \setminus A)$ . ■

---

*Démonstration 23.21 (2)*

Découle du (1) en prenant  $B = \Omega$ . ■

---

*Démonstration 23.22 (3)*

On a  $A \cup B = (A \setminus B) \cup (A \cap B) \cup (B \setminus A)$  (réunion disjointe).

Donc  $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A \setminus B) + \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(B \setminus A)$ .

D'autre part, on a 
$$\begin{cases} A = (A \setminus B) \cup (A \cap B) \\ B = (B \setminus A) \cup (A \cap B) \end{cases} \quad (\text{réunions disjointes}).$$

Donc on a 
$$\begin{cases} \mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A \setminus B) + \mathbb{P}(A \cap B) \\ \mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B \setminus A) + \mathbb{P}(A \cap B) \end{cases}$$

D'où la formule. ■

---

**Proposition 23.23 (Sous-additivité)**

Soient  $(\Omega, \mathbb{P})$  un espace probabilisé et  $N \in \mathbb{N}^*$ .

Pour toute famille d'événements  $(A_1, \dots, A_N) \in \mathcal{P}(\Omega)^N$ , on a :

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^N A_n\right) \leq \sum_{n=1}^N \mathbb{P}(A_n).$$

---

*Démonstration 23.24*

On pose  $\forall k \in \llbracket 1 ; N \rrbracket$ ,  $A'_k = A_k \setminus \bigcup_{i=1}^{k-1} A_i$  de sorte que  $\bigcup_{k=1}^N A_k = \bigcup_{k=1}^N A'_k$  (réunion disjointe).

On a alors :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(\bigcup_{k=1}^N A_k\right) &= \sum_{k=1}^N \mathbb{P}(A'_k) \\ &\leq \sum_{k=1}^N \mathbb{P}(A_k) \end{aligned} \quad \begin{array}{l} \text{car } \forall k \in \llbracket 1 ; N \rrbracket, \quad A'_k \subseteq A_k \end{array}$$

■

#### 23.2.1.4 Distribution de probabilités

---

**Définition 23.25**

Soit  $\Omega$  un univers.

On appelle distribution de probabilités sur  $\Omega$  toute famille  $(p_\omega)_{\omega \in \Omega}$  de réels positifs de somme 1 :

$$\forall \omega \in \Omega, \quad p_\omega \geq 0 \quad \text{et} \quad \sum_{\omega \in \Omega} p_\omega = 1.$$

---

**Proposition 23.26**

Soit  $\Omega$  un univers.

La donnée d'une probabilité sur  $\Omega$  revient à la donnée d'une distribution de probabilités sur  $\Omega$ .

---

*Démonstration 23.27*

analyse

Soient  $\mathbb{P}$  une probabilité sur  $\Omega$  et  $A \subseteq \Omega$ .

On a  $A = \bigcup_{\omega \in A} \{\omega\}$  (réunion disjointe).

Donc, en posant  $\forall \omega \in \Omega, p_\omega = \mathbb{P}(\{\omega\})$ , on a :

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega \in A} \mathbb{P}(\{\omega\}) = p_\omega.$$

On a bien 
$$\begin{cases} \forall \omega \in \Omega, p_\omega \geq 0 \\ \sum_{\omega \in \Omega} p_\omega = \mathbb{P}(\Omega) = 1 \end{cases}$$

Donc  $(p_\omega)_{\omega \in \Omega}$  est une distribution de probabilités sur  $\Omega$ .

synthèse

Soit  $(p_\omega)_{\omega \in \Omega}$  une distribution de probabilités sur  $\Omega$ .

On pose :

$$\begin{aligned} \mathbb{P} : \mathcal{P}(\Omega) &\longrightarrow \mathbb{R} \\ A &\longmapsto \sum_{\omega \in A} p_\omega \end{aligned}$$

Montrons que  $\mathbb{P}$  est une probabilité sur  $\Omega$ .

Soient  $N \in \mathbb{N}^*$  et  $A_1, \dots, A_N \in \mathcal{P}(\Omega)$  des événements deux à deux incompatibles.

On a :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^N A_i\right) &= \sum_{\omega \in \bigcup_{i=1}^N A_i} p_\omega \\ &= \sum_{i=1}^N \sum_{\omega \in A_i} p_\omega \\ &= \sum_{i=1}^N \mathbb{P}(A_i). \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \nearrow \\ \searrow \end{array} \right\} \text{car } \bigcup_{i=1}^N A_i \text{ est une réunion disjointe}$$

De plus, on a  $\mathbb{P}(\Omega) = \sum_{\omega \in \Omega} p_\omega = 1$ .

Donc  $\mathbb{P}$  est une probabilité sur  $\Omega$ . ■

### 23.2.2 Exemple : probabilité uniforme sur un ensemble fini

#### Définition 23.28 (Probabilité uniforme)

Soit  $\Omega$  un univers.

On appelle probabilité uniforme sur  $\Omega$  la probabilité  $\mathbb{P}$  définie par :

$$\forall A \in \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P}(A) = \frac{\text{Card } A}{\text{Card } \Omega}.$$

Pour cette probabilité, tous les événements élémentaires sont équiprobables, de probabilité  $\frac{1}{\text{Card } \Omega}$ .

---

*Exemple 23.29 (Lancer d'un dé)*

On lance un dé (non-pipé, à six faces).

Le résultat peut être modélisé par l'univers  $\Omega = \llbracket 1 ; 6 \rrbracket$  muni de la probabilité uniforme.

---

### **Exercice/Exemple 23.30**

On tire simultanément trois cartes dans un jeu de trente-deux cartes. On suppose que tous les tirages sont équiprobables.

- (1) Quelle est la probabilité de tirer trois as ?
  - (2) Quelle est la probabilité de tirer trois cartes qui se suivent ?
  - (3) Quelle est la probabilité de tirer deux rois et une dame ?
- 

*Correction 23.31 (1)*

On a  $\text{Card } \Omega = \binom{32}{3}$ .

On note  $A$  l'événement « on tire trois as ».

On a  $\text{Card } A = \binom{4}{3}$ .

Donc :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A) &= \frac{\text{Card } A}{\text{Card } \Omega} \\ &= \frac{\binom{4}{3}}{\binom{32}{3}} \\ &= \frac{\frac{4 \times 3 \times 2}{3 \times 2 \times 1}}{\frac{32 \times 31 \times 30}{3 \times 2 \times 1}} \\ &= \frac{4 \times 3 \times 2}{32 \times 31 \times 30} \\ &= \frac{1}{4 \times 31 \times 10} \\ &= \frac{1}{1240}. \end{aligned}$$



---

*Correction 23.32 (2)*

On note  $B$  l'événement « on tire trois cartes qui se suivent ».

On a  $\text{Card } B = 6 \times 4^3$ .

Donc :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(B) &= \frac{6 \times 4^3}{\frac{32 \times 31 \times 30}{3 \times 2 \times 1}} \\ &= \frac{2 \times 3 \times 6 \times 2^6}{30 \times 31 \times 32} \\ &= \frac{2^2 \times 3}{5 \times 31} \\ &= \frac{12}{155}.\end{aligned}$$

---

*Correction 23.33 (3)*

On note  $C$  l'événement « on tire deux rois et une dame ».

On a  $\text{Card } C = \binom{4}{2} \times \binom{4}{1} = 4 \times 6$ .

Donc :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(C) &= \frac{6 \times 4}{\frac{32 \times 31 \times 30}{3 \times 2 \times 1}} \\ &= \frac{2^4 \times 3^2}{2^5 \times 31 \times 2 \times 5 \times 3} \\ &= \frac{3}{2^2 \times 5 \times 31} \\ &= \frac{3}{620}.\end{aligned}$$

## 23.3 Conditionnement

### 23.3.1 Définitions

On considère un espace probabilisé  $(\Omega, \mathbb{P})$ .

---

**Définition 23.34**

Soient  $A, B \in \mathcal{P}(\Omega)$  deux événements tels que  $\mathbb{P}(B) \neq 0$ .

On appelle probabilité conditionnelle de  $A$  sachant  $B$  le réel :

$$\mathbb{P}_B(A) = \mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

---

*Remarque 23.35*

On a donc  $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(B) \mathbb{P}(A | B)$ .

---

**Exercice/Exemple 23.36**

On lance deux dés.

- (1) Quelle est la probabilité d'avoir au total au moins 10 ?
- (2) Quelle est la probabilité d'avoir au total au moins 10 sachant que l'un des deux dés donne 2 ?
- (3) Quelle est la probabilité d'avoir au total au moins 10 sachant que l'un des deux dés donne 6 ?

---

*Correction 23.37 (1)*

On a l'univers  $\Omega = \llbracket 1 ; 6 \rrbracket^2$  de cardinal 36.

On note  $A$  l'événement « avoir au total au moins 10 ».

On a  $A = \{(4, 6) ; (5, 5) ; (5, 6) ; (6, 4) ; (6, 5) ; (6, 6)\}$  donc  $\text{Card } A = 6$ .

Donc  $\mathbb{P}(A) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$ .

---

*Correction 23.38 (2)*

La probabilité est nulle.

---

*Correction 23.39 (3)*

On note  $A$  l'événement « avoir au total au moins 10 » et  $B$  l'événement « l'un des deux dés donne 6 ».

On a :

$$\mathbb{P}(A | B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{5}{11}.$$

---

**Proposition 23.40**

Soit  $B$  un événement de probabilité non-nulle.

L'application  $\mathbb{P}_B : \mathcal{P}(\Omega) \longrightarrow [0 ; 1]$  est une probabilité sur  $\Omega$ .

## 23.3.2 Propriétés

### 23.3.2.1 Formule des probabilités composées

---

**Proposition 23.41**

Soient  $N \in \mathbb{N}^*$  et  $A_1, \dots, A_N$  des événements tels que  $\mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_{N-1}) \neq 0$ .

Alors

$$\mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_N) = \mathbb{P}(A_1) \mathbb{P}_{A_1}(A_2) \mathbb{P}_{A_1 \cap A_2}(A_3) \dots \mathbb{P}_{A_1 \cap \dots \cap A_{N-1}}(A_N).$$

---

*Démonstration 23.42*

Découle de la Remarque 23.35, par récurrence sur  $N$ . ■

### 23.3.2.2 Formule des probabilités totales

---

**Proposition 23.43 (Formule des probabilités totales)**

Soient  $N \in \mathbb{N}^*$ ,  $(A_1, \dots, A_N)$  un système complet fini d'événements et  $B$  un événement.

On a :

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{n=1}^N \mathbb{P}(B \cap A_n) = \sum_{n=1}^N \mathbb{P}(B \mid A_n) \mathbb{P}(A_n),$$

avec la convention  $\mathbb{P}(B \mid A_n) \mathbb{P}(A_n) = 0$  si  $\mathbb{P}(A_n) = 0$ .

---

*Démonstration 23.44*

On a  $B = \bigcup_{n=1}^N (A_n \cap B)$  (réunion disjointe).

Donc

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(B) &= \sum_{n=1}^N \mathbb{P}(A_n \cap B) \\ &= \sum_{n=1}^N \mathbb{P}(A_n) \mathbb{P}(B \mid A_n). \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \nearrow \\ \searrow \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{selon la formule des} \\ \text{probabilités composées} \end{array}$$
■

### 23.3.2.3 Formules de Bayes

---

**Proposition 23.45 (Formule de Bayes)**

- Soient  $A$  et  $B$  deux événements de probabilité non-nulle. On a :

$$\mathbb{P}(A | B) = \frac{\mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B | A)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B | A)}{\mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B | A) + \mathbb{P}(\overline{A}) \mathbb{P}(B | \overline{A})}.$$

- Soient  $N \in \mathbb{N}^*$ ,  $(A_1, \dots, A_n)$  un système complet fini d'événements de probabilité non-nulle,  $B$  un événement de probabilité non-nulle et  $k \in \llbracket 1 ; N \rrbracket$ . On a :

$$\mathbb{P}(A_k | B) = \frac{\mathbb{P}(A_k) \mathbb{P}(B | A_k)}{\sum_{n=1}^N \mathbb{P}(A_n) \mathbb{P}(B | A_n)}.$$

---

**Exercice/Exemple 23.46**

Dans une population de 60 millions d'individus, 6000 personnes sont porteuses d'un virus.

Il existe un test, mais celui-ci n'est pas complètement fiable :

Si un patient sain est testé, le résultat est négatif avec une probabilité de 98%.

Si un patient malade est testé, le résultat est positif avec une probabilité de 99%.

Un patient a fait un test dont le résultat est positif.

Quelle est la probabilité qu'il soit malade ?

---

*Correction 23.47*

On note  $M$  l'événement « le patient est malade » et  $P$  l'événement « le test est positif ».

On a :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(M | P) &= \frac{\mathbb{P}(M) \mathbb{P}(P | M)}{\mathbb{P}(M) \mathbb{P}(P | M) + \mathbb{P}(\overline{M}) \mathbb{P}(P | \overline{M})} \\ &= \frac{10^{-4} \times 0,99}{10^{-2} \times 0,99 + (1 - 10^{-4}) \times 0,02} \\ &= \frac{1}{203}. \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\frac{10^{-4} \times 0,99}{10^{-2} \times 0,99 + (1 - 10^{-4}) \times 0,02}} \right\} \text{on calcule}$$

---

**Exercice/Exemple 23.48**

Je possède 20 dés : 18 sont non-pipés (probabilité uniforme sur  $\llbracket 1 ; 6 \rrbracket$ ) et 2 sont pipés (une chance sur deux d'obtenir 6 quand on les lance).

Je prends l'un des 20 dés, le lance et obtiens 6.

Quelle est la probabilité que ce dé soit truqué ? Et si j'obtiens autre chose que 6 ?

---

*Correction 23.49*

On note  $P$  l'événement « le dé est pipé » et  $S$  l'événement « on obtient un 6 ».

On a :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(P | S) &= \frac{\mathbb{P}(P) \mathbb{P}(S | P)}{\mathbb{P}(P) \mathbb{P}(S | P) + \mathbb{P}(\overline{P}) \mathbb{P}(S | \overline{P})} \\ &= \frac{\frac{1}{10} \times \frac{1}{2}}{\frac{1}{10} \times \frac{1}{2} + \frac{9}{10} \times \frac{1}{6}} \\ &= \frac{1}{4}.\end{aligned}$$

⤵ *on calcule*

et

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(P | \overline{S}) &= \frac{\mathbb{P}(P) \mathbb{P}(\overline{S} | P)}{\mathbb{P}(P) \mathbb{P}(\overline{S} | P) + \mathbb{P}(\overline{P}) \mathbb{P}(\overline{S} | \overline{P})} \\ &= \frac{\frac{1}{10} \times \frac{1}{2}}{\frac{1}{10} \times \frac{1}{2} + \frac{9}{10} \times \frac{5}{6}} \\ &= \frac{1}{16}.\end{aligned}$$

⤵ *on calcule*

## 23.4 Événements indépendants

On considère toujours un espace probabilisé  $(\Omega, \mathbb{P})$ .

---

**Définition 23.50**

Deux événements  $A$  et  $B$  sont dits indépendants si on a :

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B).$$

---

*Exemple 23.51*

On pioche une carte dans un jeu de 52 cartes.

Les événements « la carte est un 7 » et « la carte est un cœur » sont indépendants.

---

*Remarque 23.52*

Soient deux événements  $A$  et  $B$  tels que  $\mathbb{P}(B) \neq 0$ .

Alors

$$A \text{ et } B \text{ sont indépendants} \iff \mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A | B).$$

---

*Démonstration 23.53*

On a :

$$\begin{aligned} A \text{ et } B \text{ sont indépendants} &\iff \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B) \\ &\iff \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \mathbb{P}(A) \\ &\iff \mathbb{P}(A | B) = \mathbb{P}(A). \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \text{car } \mathbb{P}(B) \neq 0$$

■

---

**Définition 23.54**

Soit  $N \in \mathbb{N}^*$ .

Des événements  $A_1, \dots, A_N$  sont dits :

- deux à deux indépendants si pour tous  $i, j \in \llbracket 1 ; N \rrbracket$  tels que  $i \neq j$  on a :

$$\mathbb{P}(A_i \cap A_j) = \mathbb{P}(A_i) \mathbb{P}(A_j).$$

- mutuellement indépendants si pour tout  $J \subseteq \llbracket 1 ; N \rrbracket$  on a :

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{j \in J} A_j\right) = \prod_{j \in J} \mathbb{P}(A_j).$$

---

*Remarque 23.55*

On a :

$$\text{indépendance mutuelle} \implies \text{indépendance deux à deux}.$$

La réciproque est fausse.

---

**Exercice/Exemple 23.56**

Soient  $A$  et  $B$  deux événements indépendants.

Montrer que  $A$  et  $\overline{B}$  sont indépendants, que  $\overline{A}$  et  $B$  sont indépendants et que  $\overline{A}$  et  $\overline{B}$  sont indépendants.

---

*Correction 23.57*

On a  $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$ .

Donc, comme  $A = (A \cap B) \cup (A \cap \overline{B})$  :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A \cap \overline{B}) &= \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B) \\ &= \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) \\ &= \mathbb{P}(A)(1 - \mathbb{P}(B)) \\ &= \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(\overline{B}).\end{aligned}$$

Donc  $A$  et  $\overline{B}$  sont indépendants.

Idem pour les autres.

## 23.5 Variables aléatoires

On considère toujours un espace probabilisé  $(\Omega, \mathbb{P})$ .

### 23.5.1 Définition

---

#### Définition 23.58 (Variable aléatoire)

On appelle variable aléatoire sur  $\Omega$  toute application de l'univers  $\Omega$  vers un ensemble  $E$  :

$$X : \Omega \longrightarrow E.$$

Si  $E = \mathbb{R}$ , on dit que  $X$  est une variable aléatoire réelle.

---

#### Notation 23.59

Soient  $E$  et  $F$  des ensembles,  $X : \Omega \longrightarrow E$  une variable aléatoire et  $f : E \longrightarrow F$  une fonction quelconque.

Alors  $f \circ X$  est une variable aléatoire, notée abusivement  $f(X)$ .

Par exemple, la valeur absolue d'une variable aléatoire réelle  $X$  est une variable aléatoire réelle notée  $|X|$ .

---

*Remarque 23.60*

Une somme de variables aléatoires réelles est une variable aléatoire réelle.

Un produit de variables aléatoires réelles est une variable aléatoire réelle.

L'ensemble des variables aléatoires réelles (sur  $\Omega$ ) est un anneau et un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

---

**Notation 23.61**

Soit  $E$  un ensemble.

Lorsque  $X : \Omega \longrightarrow E$  est une variable aléatoire, on s'autorise, pour tout  $F \subseteq E$ , à noter  $(X \in F)$  ou  $\{X \in F\}$  l'image réciproque de  $X$  par  $F$  :

$$(X \in F) = \{X \in F\} = X^{-1}(F).$$

Il s'agit d'un événement.

---

**Définition 23.62 (Loi d'une variable aléatoire)**

Soient  $E$  un ensemble et  $X : \Omega \longrightarrow E$  une variable aléatoire.

Quitte à remplacer  $E$  par  $\text{Im } X$ , on peut supposer que  $E$  est fini.

On appelle loi de  $X$  la probabilité (sur l'univers  $E$ ) :

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{P}_X : \mathcal{P}(E) & \longrightarrow & [0 ; 1] \\ F & \longmapsto & \mathbb{P}(\{X \in F\}) \end{array}$$

On note simplement  $\mathbb{P}_X(F)$  ou  $\mathbb{P}(X \in F)$  la probabilité  $\mathbb{P}(\{X \in F\})$  (intuitivement : la « probabilité que  $X$  appartienne à  $F$  »).

---

*Remarque 23.63*

Mêmes notations.

Le couple  $(E, \mathbb{P}_X)$  est un espace probabilisé.

---

**Définition 23.64**

Soient  $X$  et  $Y$  deux variables aléatoires.

On dit que  $X$  et  $Y$  suivent la même loi si on a  $\mathbb{P}_X = \mathbb{P}_Y$ .

On note alors :

$$X \sim Y.$$



---

**Exercice/Exemple 23.65**

On lance deux dés à quatre faces.

Le lancer peut être modélisé en posant :

$$\Omega = \llbracket 1 ; 4 \rrbracket^2 \quad \forall A \in \mathcal{P}(\Omega), \quad \mathbb{P}(A) = \frac{\text{Card } A}{\text{Card } \Omega}$$

et

$$\begin{array}{ccc} X : \Omega & \longrightarrow & \llbracket 1 ; 4 \rrbracket \\ (x, y) & \longmapsto & x \end{array} \quad \begin{array}{ccc} Y : \Omega & \longrightarrow & \llbracket 1 ; 4 \rrbracket \\ (x, y) & \longmapsto & y \end{array}$$

On pose enfin  $S = X + Y$  et  $P = XY$ .

Les fonctions  $X$ ,  $Y$ ,  $S$  et  $P$  sont des variables aléatoires.

Quelles sont leurs lois ?

---

*Correction 23.66*

$X$  est à valeurs dans  $\llbracket 1 ; 4 \rrbracket$  et on a :

$$\forall k \in \llbracket 1 ; 4 \rrbracket, \quad \mathbb{P}(X = k) = \frac{1}{4}.$$

Idem pour  $Y$ .

$S$  est à valeurs dans  $\llbracket 2 ; 8 \rrbracket$  et on a :

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathbb{P}(S = 2) = \mathbb{P}(S = 8) = \frac{1}{16} \\ \mathbb{P}(S = 3) = \mathbb{P}(S = 7) = \frac{1}{8} \\ \mathbb{P}(S = 4) = \mathbb{P}(S = 6) = \frac{3}{16} \\ \mathbb{P}(S = 5) = \frac{1}{4} \end{array} \right.$$

$P$  est à valeurs dans  $\{1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 9 ; 12 ; 16\}$  et on a :

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathbb{P}(P = 1) = \mathbb{P}(P = 9) = \mathbb{P}(P = 16) = \frac{1}{16} \\ \mathbb{P}(P = 2) = \mathbb{P}(P = 3) = \mathbb{P}(P = 6) = \mathbb{P}(P = 8) = \mathbb{P}(P = 12) = \frac{1}{8} \\ \mathbb{P}(P = 4) = \frac{3}{16} \end{array} \right.$$

## 23.5.2 Exemples

On considère toujours un espace probabilisé  $(\Omega, \mathbb{P})$  et on note  $X$  une variable aléatoire.

### 23.5.2.1 Loi uniforme sur un ensemble fini

---

#### Définition 23.67

Soit  $E$  un ensemble fini non-vide.

On dit que  $X : \Omega \longrightarrow E$  suit une loi uniforme sur  $E$  si on a :

$$\forall A \in \mathcal{P}(E), \quad \mathbb{P}(X \in A) = \frac{\text{Card } A}{\text{Card } E}.$$

---

#### Notation 23.68

Mêmes notations.

On note  $\mathcal{U}(E)$  la loi uniforme sur  $E$  et  $X \sim \mathcal{U}(E)$  si  $X$  suit une loi uniforme sur  $E$ .

### 23.5.2.2 Loi de Bernoulli de paramètre $p \in [0 ; 1]$

---

#### Définition 23.69

Soit  $p \in [0 ; 1]$ .

On dit que  $X : \Omega \longrightarrow \{0 ; 1\}$  suit une loi de Bernoulli de paramètre  $p$  si on a :

$$\begin{cases} \mathbb{P}(X = 1) = p \\ \mathbb{P}(X = 0) = 1 - p \end{cases}$$

---

#### Notation 23.70

Mêmes notations.

On note  $\mathcal{B}(p)$  la loi de Bernoulli de paramètre  $p$  et  $X \sim \mathcal{B}(p)$  si  $X$  suit une loi de Bernoulli de paramètre  $p$ .

---

#### Exemple 23.71

- Pile ou face ;
- Si  $A$  est un événement de probabilité  $p$ , alors  $\mathbb{1}_A \sim \mathcal{B}(p)$ .

### 23.5.2.3 Loi binomiale de paramètres $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in [0 ; 1]$

---

**Définition 23.72**

Soient  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $p \in [0 ; 1]$ .

On dit que  $X : \Omega \longrightarrow \llbracket 0 ; n \rrbracket$  suit une loi binomiale de paramètres  $n$  et  $p$  si on a :

$$\forall k \in \llbracket 0 ; n \rrbracket, \quad \mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}.$$

---

**Notation 23.73**

Mêmes notations.

On note  $\mathcal{B}(n, p)$  la loi binomiale de paramètres  $n$  et  $p$  et  $X \sim \mathcal{B}(n, p)$  si  $X$  suit une loi binomiale de paramètres  $n$  et  $p$ .

---

*Exemple 23.74*

- Si l'on fait  $n$  tirages avec remise dans une urne contenant une proportion  $p$  de boules bleues et qu'on note  $X$  le nombre de boules bleues tirées, alors  $X \sim \mathcal{B}(n, p)$  ;
- Nombre de « piles » quand on lance  $n$  pièces en l'air.

### 23.5.3 Couples de variables aléatoires

On considère toujours l'espace probabilisé  $(\Omega, \mathbb{P})$ .

Soient  $E$  et  $F$  deux ensembles et  $X : \Omega \longrightarrow E$  et  $Y : \Omega \longrightarrow F$  deux variables aléatoires.

On leur associe la variable aléatoire :

$$\begin{aligned} Z : \Omega &\longrightarrow E \times F \\ \omega &\longmapsto (X(\omega), Y(\omega)) \end{aligned}$$

(que l'on note parfois  $Z = (X, Y)$ ).

---

**Définition 23.75**

La loi de  $Z$  est appelée loi conjointe de  $X$  et  $Y$ .

Les lois de  $X$  et  $Y$  sont appelées lois marginales de  $Z$ .

---

*Remarque 23.76*

Si on connaît la loi conjointe, on connaît les lois marginales.

Cependant, connaître les lois marginales ne suffit pas pour connaître la loi conjointe.

---

*Exemple 23.77*

On lance deux dés à quatre faces et on note  $X$  et  $Y$  les résultats.

Alors  $(X, Y)$  et  $(X, X)$  ont mêmes lois marginales, mais pas mêmes lois conjointes :

$(X, Y)$

	$1/4$	$1/4$	$1/4$	$1/4$	$\rightarrow Y$
$1/4$	$1/16$	$1/16$	$1/16$	$1/16$	
$1/4$	$1/16$	$1/16$	$1/16$	$1/16$	
$1/4$	$1/16$	$1/16$	$1/16$	$1/16$	
$1/4$	$1/16$	$1/16$	$1/16$	$1/16$	
$\downarrow X$					

$(X, X)$

	$1/4$	$1/4$	$1/4$	$1/4$	$\rightarrow X$
$1/4$	$1/4$	0	0	0	
$1/4$	0	$1/4$	0	0	
$1/4$	0	0	$1/4$	0	
$1/4$	0	0	0	$1/4$	
$\downarrow X$					

---

**Définition 23.78**

Soit  $y \in F$  tel que  $\mathbb{P}(Y = y) \neq 0$ .

On appelle loi conditionnelle de  $X$  sachant  $Y = y$  la loi de  $X$  pour la probabilité conditionnelle  $\mathbb{P}_{\{Y=y\}}$ .

On a :

$$\forall A \subseteq E, \quad \mathbb{P}(X \in A \mid Y = y) = \frac{\mathbb{P}(X \in A \text{ et } Y = y)}{\mathbb{P}(Y = y)}.$$

---

*Remarque 23.79*

La connaissance de la loi de  $X$  et de la loi de  $X$  sachant  $Y = y$  pour tout  $y \in F$  tel que  $\mathbb{P}(Y = y) \neq 0$  détermine complètement la loi conjointe de  $Z$ .

---

*Remarque 23.80 (Vecteurs aléatoires)*

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

Plus généralement, si  $X_1, \dots, X_n$  sont des variables aléatoires sur  $(\Omega, \mathbb{P})$ , on peut considérer le vecteur aléatoire  $Z = (X_1, \dots, X_n)$ .

La loi de  $Z$  est appelée loi conjointe des variables  $X_1, \dots, X_n$  et les lois de  $X_1, \dots, X_n$  sont appelées lois marginales de  $Z$ .

## 23.6 Variables aléatoires indépendantes

### 23.6.1 Définition

On considère toujours l'espace probabilisé  $(\Omega, \mathbb{P})$  ainsi que deux ensembles  $E$  et  $F$  et deux variables aléatoires  $X : \Omega \longrightarrow E$  et  $Y : \Omega \longrightarrow F$ .

---

**Définition 23.81**

Les variables aléatoires  $X$  et  $Y$  sont dites indépendantes si :

$$\forall x \in E, \forall y \in F, \mathbb{P}(X = x \text{ et } Y = y) = \mathbb{P}(X = x) \mathbb{P}(Y = y).$$

---

**Proposition 23.82**

Les variables aléatoires  $X$  et  $Y$  sont indépendantes si, et seulement si :

$$\forall A \subseteq E, \forall B \subseteq F, \mathbb{P}(X \in A \text{ et } Y \in B) = \mathbb{P}(X \in A) \mathbb{P}(Y \in B).$$

---

*Démonstration 23.83*

$\boxed{\Leftarrow}$  Claire en prenant  $A = \{x\}$  et  $B = \{y\}$  pour tous  $x \in E$  et  $y \in F$ .

$\boxed{\Rightarrow}$

Supposons  $X$  et  $Y$  indépendantes.

Soient  $A \subseteq E$  et  $B \subseteq F$ .

On a  $\{X \in A \text{ et } Y \in B\} = \bigcup_{x \in A} \bigcup_{y \in B} \{X = x \text{ et } Y = y\}$  (réunion disjointe).

Donc :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X \in A \text{ et } Y \in B) &= \sum_{x \in A} \sum_{y \in B} \mathbb{P}(X = x \text{ et } Y = y) \\ &= \sum_{x \in A} \sum_{y \in B} \mathbb{P}(X = x) \mathbb{P}(Y = y) \quad \left. \begin{array}{l} \swarrow \\ \searrow \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{car } X \text{ et } Y \text{ sont} \\ \text{indépendantes} \end{array} \\ &= \left( \sum_{x \in A} \mathbb{P}(X = x) \right) \left( \sum_{y \in B} \mathbb{P}(Y = y) \right) \quad \left. \begin{array}{l} \swarrow \\ \searrow \end{array} \right\} \star \\ &= \mathbb{P}(X \in A) \mathbb{P}(Y \in B) \end{aligned}$$

$\star$  : car  $\{X \in A\} = \bigcup_{x \in A} \{X = x\}$  et  $\{Y \in B\} = \bigcup_{y \in B} \{Y = y\}$  (réunions disjointes). ■

---

**Exercice/Exemple 23.84**

On modélise le lancer de deux dés par deux variables aléatoires  $X : \Omega \longrightarrow \llbracket 1 ; 6 \rrbracket$  et  $Y : \Omega \longrightarrow \llbracket 1 ; 6 \rrbracket$ .

La loi conjointe de  $X$  et  $Y$  est la loi uniforme sur  $\llbracket 1 ; 6 \rrbracket^2$ , c'est-à-dire :

$$\forall (k, \ell) \in \llbracket 1 ; 6 \rrbracket^2, \quad \mathbb{P}(X = k \text{ et } Y = \ell) = \frac{1}{36}.$$

Posons  $S = X + Y$  et  $P = XY$ .

Les variables aléatoires  $X$  et  $Y$  sont-elles indépendantes ?

Les variables aléatoires  $S$  et  $P$  sont-elles indépendantes ?

---

*Correction 23.85*

Les lois de  $X$  et  $Y$  sont les lois marginales de  $(X, Y)$  :

$$\forall k \in \llbracket 1 ; 6 \rrbracket, \quad \mathbb{P}(X = k) = \sum_{\ell=1}^6 \mathbb{P}(X = k \text{ et } Y = \ell) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}.$$

De même pour  $Y$ , d'où  $X \sim Y \sim \mathcal{U}(\llbracket 1 ; 6 \rrbracket)$ .

On a :

$$\forall k, \ell \in \llbracket 1 ; 6 \rrbracket, \quad \mathbb{P}(X = k \text{ et } Y = \ell) = \frac{1}{36} = \mathbb{P}(X = k) \mathbb{P}(Y = \ell).$$

Donc  $X$  et  $Y$  sont indépendantes.

De plus, on remarque  $\mathbb{P}(S = 2 \text{ et } P = 36) = 0$ .

$$\text{Or } \begin{cases} \mathbb{P}(S = 2) = \mathbb{P}(X = Y = 1) = \frac{1}{36} \\ \mathbb{P}(P = 36) = \mathbb{P}(X = Y = 6) = \frac{1}{36} \end{cases}$$

Donc  $\mathbb{P}(S = 2 \text{ et } P = 36) \neq \mathbb{P}(S = 2) \mathbb{P}(P = 36)$ .

Donc  $S$  et  $P$  sont indépendantes.

---

**Proposition 23.86**

Soient  $E'$  et  $F'$  deux ensembles et  $f : E \longrightarrow E'$  et  $g : F \longrightarrow F'$  deux fonctions.

On suppose que  $X : \Omega \longrightarrow E$  et  $Y : \Omega \longrightarrow F$  sont indépendantes.

Alors les variables aléatoires  $f(X)$  et  $g(Y)$  sont indépendantes.

---

*Démonstration 23.87*

Soient  $x' \in E'$  et  $y' \in F'$ .

$$\text{On a } \begin{cases} \{f(X) = x'\} = \{X \in f^{-1}(\{x'\})\} \\ \{g(Y) = y'\} = \{Y \in g^{-1}(\{y'\})\} \end{cases}$$

D'où :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(f(X) = x' \text{ et } g(Y) = y') &= \mathbb{P}\left(X \in f^{-1}(\{x'\}) \text{ et } Y \in g^{-1}(\{y'\})\right) \\ &= \mathbb{P}\left(X \in f^{-1}(\{x'\})\right) \mathbb{P}\left(Y \in g^{-1}(\{y'\})\right) \quad \left. \begin{array}{l} \text{car } X \text{ et } Y \\ \text{sont indé-} \\ \text{pendantes} \end{array} \right\} \\ &= \mathbb{P}(f(X) = x') \mathbb{P}(g(Y) = y'). \end{aligned}$$

Donc  $f(X)$  et  $g(Y)$  sont indépendantes. ■

---

### Définition 23.88

Soient  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $X_1, \dots, X_n$  des variables aléatoires.

- On dit que les variables aléatoires  $X_1, \dots, X_n$  sont deux à deux indépendantes si  $X_i$  et  $X_j$  sont indépendantes pour tous  $i, j \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$  tels que  $i \neq j$  (cf. Définition 23.81 et Proposition 23.82).
- On dit que les variables aléatoires  $X_1, \dots, X_n$  sont mutuellement indépendantes si les conditions équivalentes suivantes sont satisfaites :

$$(1) \text{ Pour tout } (x_1, \dots, x_n), \quad \mathbb{P}(X_1 = x_1 \text{ et } \dots \text{ et } X_n = x_n) = \prod_{k=1}^n \mathbb{P}(X_k = x_k)$$

$$(2) \text{ Pour tout } (A_1, \dots, A_n), \quad \mathbb{P}(X_1 \in A_1 \text{ et } \dots \text{ et } X_n \in A_n) = \prod_{k=1}^n \mathbb{P}(X_k \in A_k).$$

NB : si un énoncé ne précise pas « mutuellement » ou « deux à deux », cela signifie « mutuellement ».

## 23.6.2 Lemme des coalitions

---

### Lemme 23.89 (Lemme des coalitions I)

Soient  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $X_1, \dots, X_n$  des variables aléatoires mutuellement indépendantes,  $m \in \llbracket 1 ; n-1 \rrbracket$  et deux fonctions  $f$  et  $g$  définies respectivement sur  $X_1(\Omega) \times \dots \times X_m(\Omega)$  et  $X_{m+1}(\Omega) \times \dots \times X_n(\Omega)$ .

Les variables aléatoires  $f(X_1, \dots, X_m)$  et  $g(X_{m+1}, \dots, X_n)$  sont indépendantes.

---

*Démonstration 23.90*

Soient  $A \subseteq \text{Im } f$  et  $B \subseteq \text{Im } g$ .

On a :

$$\begin{aligned} & \mathbb{P}(f(X_1, \dots, X_m) \in A \text{ et } g(X_{m+1}, \dots, X_n) \in B) \\ &= \mathbb{P}\left((X_1, \dots, X_m) \in f^{-1}(A) \text{ et } (X_{m+1}, \dots, X_n) \in g^{-1}(B)\right) \\ &= \sum_{(x_1, \dots, x_m) \in f^{-1}(A)} \sum_{(x_{m+1}, \dots, x_n) \in g^{-1}(B)} \mathbb{P}(X_1 = x_1 \text{ et } \dots \text{ et } X_n = x_n) \\ &= \sum_{(x_1, \dots, x_m) \in f^{-1}(A)} \sum_{(x_{m+1}, \dots, x_n) \in g^{-1}(B)} \mathbb{P}(X_1 = x_1) \dots \mathbb{P}(X_n = x_n) \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{car } X_1, \dots, X_n \text{ sont} \\ \text{mutuellement indépendantes} \end{array} \\ &= \left( \sum_{(x_1, \dots, x_m) \in f^{-1}(A)} \underbrace{\mathbb{P}(X_1 = x_1 \text{ et } \dots \text{ et } X_m = x_m)}_{\text{car } X_1, \dots, X_m \text{ sont} \\ \text{mutuellement indépendantes}} \right) \left( \sum_{(x_{m+1}, \dots, x_n) \in g^{-1}(B)} \underbrace{\mathbb{P}(X_{m+1} = x_{m+1} \text{ et } \dots \text{ et } X_n = x_n)}_{\text{car } X_{m+1}, \dots, X_n \text{ sont} \\ \text{mutuellement indépendantes}} \right) \\ &= \mathbb{P}(f(X_1, \dots, X_m) \in A) \mathbb{P}(g(X_{m+1}, \dots, X_n) \in B). \end{aligned}$$

■

---

**Lemme 23.91 (Lemme des coalitions II)**

Soient  $n, r \in \mathbb{N}^*$ ,  $X_1, \dots, X_n$  des variables mutuellement indépendantes et  $I_1, \dots, I_r$  des parties de  $\llbracket 1 ; n \rrbracket$  supposées non-vides et deux à deux disjointes.

Pour tout  $k \in \llbracket 1 ; r \rrbracket$ , on considère une fonction  $f_k$  définie sur  $\prod_{i \in I_k} X_i(\Omega)$ .

Alors les variables aléatoires  $f_1((X_i)_{i \in I_1}), \dots, f_r((X_i)_{i \in I_r})$  sont mutuellement indépendantes.

---

*Démonstration 23.92*

★★ Exercice ★★

■

### 23.6.3 Interprétation de la loi binomiale

---

**Lemme 23.93**

Soient  $p \in [0 ; 1]$ ,  $n, m \in \mathbb{N}^*$  et  $X$  et  $Y$  des variables aléatoires indépendantes telles que

$$X \sim \mathcal{B}(n, p) \quad \text{et} \quad Y \sim \mathcal{B}(m, p).$$

Alors on a  $X + Y \sim \mathcal{B}(n + m, p)$ .



---

*Démonstration 23.94*

$X$  et  $Y$  sont à valeurs dans  $\llbracket 0 ; n \rrbracket$  et  $\llbracket 0 ; m \rrbracket$  respectivement.

$$\text{On a : } \begin{cases} \forall i \in \llbracket 0 ; n \rrbracket, \mathbb{P}(X = i) = \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i} \\ \forall j \in \llbracket 0 ; m \rrbracket, \mathbb{P}(Y = j) = \binom{m}{j} p^j (1-p)^{m-j} \end{cases}$$

$X + Y$  est à valeurs dans  $\llbracket 0 ; n + m \rrbracket$  et on a :

$$\begin{aligned} \forall k \in \llbracket 0 ; n + m \rrbracket, \mathbb{P}(X + Y = k) &= \sum_{i=0}^n \mathbb{P}(X = i \text{ et } Y = k - i) \\ &= \sum_{i=0}^n \mathbb{P}(X = i) \mathbb{P}(Y = k - i) \quad \left. \begin{array}{l} \text{car } X \text{ et } Y \text{ sont} \\ \text{indépendantes} \end{array} \right\} \\ &= \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i} \binom{m}{k-i} p^{k-i} (1-p)^{m-k+i} \\ &= p^k (1-p)^{n-k} \sum_{i=0}^n \underbrace{\binom{n}{i} \binom{m}{k-i}}_{= \binom{n+m}{k}}. \end{aligned}$$

Donc  $X + Y \sim \mathcal{B}(n + m, p)$ . ■

---

### Proposition 23.95

Soient  $p \in [0 ; 1]$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $X_1, \dots, X_n$  des variables aléatoires mutuellement indépendantes qui suivent chacune une loi de Bernoulli  $\mathcal{B}(p)$ .

Alors  $X_1 + \dots + X_n \sim \mathcal{B}(n, p)$ .

---

*Démonstration 23.96*

Découle du Lemme 23.93 par récurrence car  $\mathcal{B}(p) = \mathcal{B}(1, p)$ . ■

## 23.7 Espérance, variance

On considère toujours un espace probabilisé  $(\Omega, \mathbb{P})$ .

## 23.7.1 Espérance

### 23.7.1.1 Définition

---

#### Définition 23.97

Soit  $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$  une variable aléatoire réelle.

On appelle espérance de  $X$  et on note  $E(X)$  la somme :

$$E(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} \mathbb{P}(X = x) x.$$

---

#### Exemple 23.98

Lancer de dé :  $X \sim \mathcal{U}([1; 6])$ .

On a :

$$E(X) = \sum_{k=1}^6 \frac{k}{6} = \frac{7}{2}.$$

---

#### Exemple 23.99

Loi de Bernoulli :  $X \sim \mathcal{B}(p)$ .

On a :

$$E(X) = 0 \times \mathbb{P}(X = 0) + 1 \times \mathbb{P}(X = 1) = p.$$

---

#### Exemple 23.100

Loi binomiale :  $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ .

On a :  $E(X) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$

Posons  $P(T) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} T^k \in \mathbb{R}[T].$

On a  $P(T) = (pT + 1 - p)^n$  selon la formule du binôme de Newton.

Donc :

$$P'(T) = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} T^{k-1} = np (pT + 1 - p)^{n-1}.$$

D'où, en évaluant en 1 :

$$P'(1) = E(X) = np.$$

### 23.7.1.2 Propriétés

---

**Proposition 23.101 (Linéarité de l'espérance)**

Soient  $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$  et  $Y : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$  deux variables aléatoires réelles et  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

On a :

$$E(\lambda X) = \lambda E(X) \quad \text{et} \quad E(X + Y) = E(X) + E(Y).$$

On parle de « linéarité » car l'ensemble  $\mathcal{F}(\Omega, \mathbb{R})$  des variables aléatoires sur  $\Omega$  est un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel et  $E$  est une forme linéaire sur cet espace vectoriel.

---

*Démonstration 23.102*

Si  $\lambda \neq 0$  :

$$\begin{aligned} E(\lambda X) &= \sum_{x \in X(\Omega)} \mathbb{P}(\lambda X = \lambda x) \lambda x \\ &= \sum_{x \in X(\Omega)} \mathbb{P}(X = x) \lambda x \\ &= \lambda E(X). \end{aligned}$$

Si  $\lambda = 0$  : vrai aussi.

D'autre part, on a :  $(X + Y)(\Omega) \subseteq X(\Omega) + Y(\Omega)$ .

Donc :

$$\begin{aligned} E(X + Y) &= \sum_{z \in X(\Omega) + Y(\Omega)} \mathbb{P}(X + Y = z) \\ &= \sum_{z \in X(\Omega) + Y(\Omega)} \sum_{\substack{(a,b) \in X(\Omega) \times Y(\Omega) \\ a+b=z}} \mathbb{P}(X = a \text{ et } Y = b) (a + b) \\ &= \sum_{a \in X(\Omega)} \sum_{b \in Y(\Omega)} \mathbb{P}(X = a \text{ et } Y = b) (a + b) \\ &= \sum_{a \in X(\Omega)} a \underbrace{\sum_{b \in Y(\Omega)} \mathbb{P}(X = a \text{ et } Y = b)}_{\mathbb{P}(X=a)} + \sum_{b \in Y(\Omega)} b \underbrace{\sum_{a \in X(\Omega)} \mathbb{P}(X = a \text{ et } Y = b)}_{\mathbb{P}(Y=b)} \\ &= E(X) + E(Y). \end{aligned}$$

■

---

*Remarque 23.103*

On retrouve que si  $X \sim \mathcal{B}(n, p)$  alors  $E(X) = np$  car  $X \sim X_1 + \dots + X_n$  où  $X_1 \sim \dots \sim X_n \sim \mathcal{B}(p)$  donc  $E(X) = E(X_1) + \dots + E(X_n) = np$ .

---

*Exemple 23.104 (Espérance de  $aX + b$ )*

Soient  $a, b \in \mathbb{R}$  et  $X$  une variable aléatoire réelle.

On a :

$$E(aX + b) = a E(X) + b.$$

---

**Proposition 23.105**

Soient  $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  et  $Y : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  deux variables aléatoires réelles.

*Positivité* : si  $X \geq 0$  alors  $E(X) \geq 0$ .

*Croissance* : si  $X \leq Y$  alors  $E(X) \leq E(Y)$ .

*Inégalité triangulaire* : on a  $|E(X)| \leq E(|X|)$ .

---

*Démonstration 23.106*

★★ Exercice ★★

■

---

**Proposition 23.107 (Espérance d'un produit)**

Soient  $X$  et  $Y$  deux variables aléatoires réelles indépendantes.

On a :

$$E(XY) = E(X) E(Y).$$

---

*Démonstration 23.108*

On a  $(XY)(\Omega) \subseteq X(\Omega)Y(\Omega) = \{xy\}_{(x,y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)}$ .

Donc :

$$\begin{aligned} E(XY) &= \sum_{z \in X(\Omega)Y(\Omega)} \mathbb{P}(XY = z) z \\ &= \sum_{z \in X(\Omega)Y(\Omega)} \sum_{\substack{(x,y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega) \\ xy=z}} \mathbb{P}(X = x \text{ et } Y = y) xy \\ &= \sum_{x \in X(\Omega)} \sum_{y \in Y(\Omega)} \mathbb{P}(X = x) \mathbb{P}(Y = y) xy \\ &= E(X) E(Y). \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{car } X \text{ et } Y \text{ sont} \\ \text{indépendantes} \end{array}$$

■

---

**Corollaire 23.109 (Espérance d'un produit)**

Soient  $N \in \mathbb{N}^*$  et  $X_1, \dots, X_N$  des variables aléatoires réelles mutuellement indépendantes.

On a :

$$E(X_1 \dots X_N) = E(X_1) \dots E(X_N).$$

---

*Démonstration 23.110*

On raisonne par récurrence sur  $N \in \mathbb{N}^*$ .

Le corollaire est clairement vrai si  $N = 1$  et si  $N = 2$  selon la Proposition 23.107.

Soit  $N \in \mathbb{N}^*$ . On suppose que le corollaire est vrai pour  $N$ . Montrons qu'il est vrai pour  $N + 1$ .

Soient  $X_1, \dots, X_{N+1}$  des variables aléatoires réelles mutuellement indépendantes.

Selon le lemme des coalitions, les variables aléatoires  $X_1$  et  $X_2, \dots, X_{N+1}$  sont indépendantes.

Donc selon la Proposition 23.107 :

$$\begin{aligned} E(X_1 \dots X_{N+1}) &= E(X_1) E(X_2 \dots X_{N+1}) \\ &= E(X_1) \dots E(X_{N+1}) \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} E(X_1 \dots X_{N+1}) &= E(X_1) E(X_2 \dots X_{N+1}) \\ &= E(X_1) \dots E(X_{N+1}) \end{aligned}} \right\} \begin{array}{l} \text{selon l'hypothèse de} \\ \text{récurrence} \end{array}$$

D'où le corollaire pour  $N + 1$ . ■

---

**Proposition 23.111 (Formule de transfert)**

Soient  $N \in \mathbb{N}^*$ ,  $X$  une variable aléatoire d'image finie  $\text{Im } X = \{x_1, \dots, x_N\}$  et  $f : \text{Im } X \rightarrow \mathbb{R}$  une application.

Alors  $f(X)$  admet pour espérance :

$$E(f(X)) = \sum_{n=1}^N \mathbb{P}(X = x_n) f(x_n).$$

---

*Démonstration 23.112*

★★ Exercice ★★ ■

## 23.7.2 Variance, écart-type, covariance

### 23.7.2.1 Définitions

---

**Définition/Proposition 23.113**

Soit  $X$  une variable aléatoire réelle.

La variance de  $X$  est le réel :

$$V(X) = E\left((X - E(X))^2\right) = E(X^2) - E(X)^2.$$

L'écart-type de  $X$  est le réel :

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}.$$

---

*Démonstration 23.114*

On a :

$$\begin{aligned} E\left((X - E(X))^2\right) &= E\left(X^2 - 2X E(X) - E(X)^2\right) \\ &= E\left(X^2\right) - 2E(X E(X)) + E\left(E(X)^2\right) \\ &= E\left(X^2\right) - 2E(X)^2 + E(X)^2 \\ &= E\left(X^2\right) - E(X)^2 \end{aligned}$$

■

---

*Exemple 23.115*

On s'intéresse au lancer d'un dé.

Soit  $X$  une variable aléatoire telle que  $X \sim \mathcal{U}([1; 6])$ .

On a :

$$\begin{aligned} V(X) &= E\left(X^2\right) - E(X)^2 \\ &= \sum_{k=1}^6 \mathbb{P}(X = k) k^2 - \left(\frac{7}{2}\right)^2 \\ &= \frac{1}{6} \sum_{k=1}^6 k^2 - \frac{49}{4} \\ &= \frac{1}{6} \times \frac{6 \times 7 \times 13}{6} - \frac{49}{4} \\ &= \frac{35}{12}. \end{aligned}$$

) on calcule

---

**Définition/Proposition 23.116**

Soient  $X$  et  $Y$  deux variables aléatoires réelles.

La covariance de  $X$  et  $Y$  est le réel :

$$\text{Cov}(X, Y) = E((X - E(X))(Y - E(Y))) = E(XY) - E(X)E(Y).$$

---

*Démonstration 23.117*

On a :

$$\begin{aligned} E((X - E(X))(Y - E(Y))) &= E(XY - X E(Y) - E(X) Y + E(X) E(Y)) \\ &= E(XY) - E(Y) E(X) - E(X) E(Y) + E(X) E(Y) \\ &= E(XY) - E(X) E(Y). \end{aligned}$$

■

---

*Remarque 23.118*

Si  $X$  et  $Y$  sont indépendantes, alors  $\text{Cov}(X, Y) = 0$ .

---

*Démonstration 23.119*

Si  $X$  et  $Y$  sont indépendantes, alors  $E(XY) = E(X)E(Y)$  donc  $\text{Cov}(X, Y) = 0$ . ■

---

### Exercice/Exemple 23.120

On lance deux dés et on note  $X$  et  $Y$  les résultats obtenus.

On pose  $S = X + Y$  et  $P = XY$ .

Calculer la covariance de  $S$  et  $P$ .

---

*Correction 23.121*

On a :

$$\begin{aligned}\text{Cov}(S, P) &= E(SP) - E(S)E(P) \\ &= E((X + Y)XY) - E(X + Y)E(XY) \\ &= E(X^2Y) + E(XY^2) - E(X + Y)E(X)E(Y) \quad \left. \begin{array}{l} \text{car } X \text{ et } Y \text{ sont} \\ \text{indépendantes} \end{array} \right\} \\ &= 2E(X^2Y) - 2E(X)^2E(Y) \quad \left. \begin{array}{l} \text{symétrie} \\ \text{car } X^2 \text{ et } Y \text{ sont} \\ \text{indépendantes} \end{array} \right\} \\ &= 2E(X^2)E(Y) - 2E(X)^2E(Y) \\ &= 2V(X)E(Y) \\ &= 2 \times \frac{35}{12} \times \frac{7}{2} \\ &= \frac{245}{12}.\end{aligned}$$

### 23.7.2.2 Propriétés

---

#### Proposition 23.122

Soient  $X$  une variable aléatoire réelle et  $a, b \in \mathbb{R}$ .

On a :

$$V(aX + b) = a^2 V(X).$$

---

*Démonstration 23.123*

On a :

$$\begin{aligned} V(aX + b) &= E\left((aX + b - E(aX + b))^2\right) \\ &= E\left((aX + b - aE(X) - b)^2\right) \\ &= E\left(a^2(X - E(X))^2\right) \\ &= a^2 V(X). \end{aligned}$$

■

---

**Proposition 23.124**

Soient  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $X_1, \dots, X_n$  des variables aléatoires réelles.

On a :

$$V\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n V(X_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{Cov}(X_i, X_j).$$

---

*Démonstration 23.125*

On a, en utilisant la définition de la variance et la linéarité de l'espérance :

$$\begin{aligned} V\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) &= E\left(\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)^2\right) - E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)^2 \\ &= E\left(\sum_{i=1}^n X_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} X_i X_j\right) - \left(\sum_{i=1}^n E(X_i)\right)^2 \\ &= \sum_{i=1}^n E(X_i^2) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} E(X_i X_j) - \left(\sum_{i=1}^n E(X_i)^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} E(X_i) E(X_j)\right) \\ &= \sum_{i=1}^n (E(X_i^2) - E(X_i)^2) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} (E(X_i X_j) - E(X_i) E(X_j)) \\ &= \sum_{i=1}^n V(X_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{Cov}(X_i, X_j). \end{aligned}$$

■

---

**Corollaire 23.126**

Soient  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $X_1, \dots, X_n$  des variables aléatoires réelles deux à deux indépendantes.

On a :

$$V(X_1 + \dots + X_n) = V(X_1) + \dots + V(X_n).$$



---

*Démonstration 23.127*

Découle de la proposition précédente, car la covariance de deux variables aléatoires indépendantes est nulle. ■

---

**Proposition 23.128**

Soient  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $p \in [0 ; 1]$  et  $X$  une variable aléatoire.

(1) Si  $X \sim \mathcal{B}(p)$  alors  $V(X) = p(1 - p)$ .

(2) Si  $X \sim \mathcal{B}(n, p)$  alors  $V(X) = np(1 - p)$

---

*Démonstration 23.129 (1)*

On a :

$$\begin{aligned} V(X) &= E(X^2) - E(X)^2 \\ &= p - p^2 \\ &= p(1 - p). \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \text{car } X^2 \sim X$$

---

*Démonstration 23.130 (2)*

Soient  $X_1, \dots, X_n$  des variables aléatoires mutuellement indépendantes suivant toutes une loi  $\mathcal{B}(p)$ .

On a  $X \sim X_1 + \dots + X_n$ .

D'après le Corollaire 23.126, on a donc :

$$\begin{aligned} V(X) &= V(X_1) + \dots + V(X_n) \\ &= np(1 - p). \end{aligned}$$

## 23.7.3 Inégalités

### 23.7.3.1 Inégalité de Markov

---

**Proposition 23.131**

Soient  $X$  une variable aléatoire réelle et  $a \in \mathbb{R}_+^*$ .

On a :

$$\mathbb{P}(|X| \geq a) \leq \frac{E(|X|)}{a}.$$

---

Démonstration 23.132

On pose :

$$Y : \Omega \longrightarrow \mathbb{R} \\ \omega \longmapsto \begin{cases} a & \text{si } |X(\omega)| \geq a \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

de sorte que  $Y \leq |X|$  et  $E(Y) = a\mathbb{P}(|X| \geq a)$ .

Par croissance de l'espérance, on a  $E(Y) \leq E(|X|)$  et donc :

$$a\mathbb{P}(|X| \geq a) \leq E(|X|).$$

■

### 23.7.3.2 Inégalité de Bienaymé-Tchebychev

---

#### Proposition 23.133

Soient  $X$  une variable aléatoire réelle et  $a \in \mathbb{R}_+^*$ .

On a :

$$\mathbb{P}(|X - E(X)| \geq a) \leq \frac{V(X)}{a^2}.$$

---

Démonstration 23.134

On pose  $Y = (X - E(X))^2$ .

Selon l'inégalité de Markov, on a  $\mathbb{P}(|Y| \geq a^2) \leq \frac{E(Y)}{a^2}$ .

Donc  $\mathbb{P}((X - E(X))^2 \geq a^2) \leq \frac{E((X - E(X))^2)}{a^2} = \frac{V(X)}{a^2}$ , c'est-à-dire :

$$\mathbb{P}(|X - E(X)| \geq a) \leq \frac{V(X)}{a^2}$$

car  $a > 0$ .

■

---

#### Application 23.135

Soient  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $X_1, \dots, X_n$  des variables aléatoires réelles deux à deux indépendantes et de même loi.

$$\text{On pose : } \begin{cases} \forall n \in \mathbb{N}^*, S_n = \sum_{k=1}^n X_k \\ m = E(X_1) \\ \sigma = \sigma(X_1) \end{cases}$$

Soit  $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$ .

On a :

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n}{n} - m\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}.$$

---

*Démonstration 23.136*

Appliquons l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev à  $\frac{S_n}{n}$ .

On a :

$$\begin{cases} \mathbb{E} \left( \frac{S_n}{n} \right) = \frac{\mathbb{E}(X_1) + \cdots + \mathbb{E}(X_n)}{n} = m \\ \mathbb{V} \left( \frac{S_n}{n} \right) = \frac{1}{n^2} (\mathbb{V}(X_1) + \cdots + \mathbb{V}(X_n)) = \frac{\sigma^2}{n} \end{cases}$$

On obtient  $\mathbb{P} \left( \left| \frac{S_n}{n} - m \right| \geq \varepsilon \right) \leq \frac{\frac{\sigma^2}{n}}{\varepsilon^2}$ .

■

## 23.7.4 Compléments

---

### Définition 23.137

Soit  $X$  une variable aléatoire réelle de variance non-nulle.

- La variable aléatoire  $X - \mathbb{E}(X)$  a une espérance nulle et est appelée variable centrée associée à  $X$ .
- La variable aléatoire  $\frac{X - \mathbb{E}(X)}{\sigma(X)}$  a un écart-type égal à 1 et est appelée variable réduite associée à  $X$ .
- La variable aléatoire  $\frac{X - \mathbb{E}(X)}{\sigma(X)}$  a une espérance nulle et un écart-type égal à 1 et est appelée variable centrée réduite associée à  $X$ .

## Deuxième partie

### TDs

# Chapitre 0

## Préliminaires

### Sommaire

0.1	Logique . . . . .	.699
0.2	Quantificateurs. . . . .	.700
0.3	Raisonnement par analyse-synthèse . . . . .	.702
0.4	Congruences . . . . .	.702

### 0.1 Logique

#### Exercice 0.1 (Exercice 1)

Soient  $P$ ,  $Q$  et  $R$  des propositions.

(1) Montrer que les propositions suivantes sont vraies à l'aide de tables de vérité :

(a)  $(P \Rightarrow Q) \vee P$

(b)  $(P \Rightarrow Q) \iff (Q \vee \neg P)$

(c)  $[P \wedge (P \Rightarrow Q)] \Rightarrow Q$

(2) Dédurre de (b) une nouvelle démonstration de l'équivalence

$$(P \Rightarrow Q) \iff (\neg Q \Rightarrow \neg P).$$

---

*Correction 0.2*

★★ à venir ★★

## 0.2 Quantificateurs

---

### Exercice 0.3 (Exercice 2)

Les propositions suivantes sont-elles vraies ?

- (1)  $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \ln(x) = 0$
- (2)  $\exists x \in \mathbb{R}_+^*, \ln(x) = 0$
- (3)  $\exists x \in \mathbb{R}, \exp(x) = 0$
- (4)  $\forall x, y \in \mathbb{R}, 2xy \geq x^2 + y^2$  (en justifiant)
- (5)  $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x < y$
- (6)  $\exists y \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, x < y$

---

*Correction 0.4*

★★ à venir ★★

---

### Exercice 0.5 (Exercice 3)

Soit  $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$  une fonction et  $T$  un réel strictement positif.

Écrire à l'aide de quantificateurs les propositions suivantes :

- (1) La fonction  $f$  est paire
- (2) La fonction  $f$  est impaire
- (3) La fonction  $f$  est périodique, de période  $T$
- (4) La fonction  $f$  est périodique

---

*Correction 0.6*

★★ à venir ★★

---

### Exercice 0.7 (Exercice 4)

Écrire à l'aide de quantificateurs les négations des propositions des exercices 2 et 3.

---

*Correction 0.8*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 0.9 (Exercice 5)**

Soit  $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$  une fonction.

Écrire à l'aide de quantificateurs les propositions suivantes :

- (1) La fonction  $f$  est constante
  - (2) La fonction  $f$  est croissante
  - (3) La fonction  $f$  est strictement décroissante
- 

*Correction 0.10*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 0.11 (Exercice 6)**

Les propositions suivantes sont-elles vraies ?

- (1)  $\forall a, b \in \mathbb{R}^*, a \leq b \implies \frac{1}{a} \geq \frac{1}{b}$
  - (2)  $\forall a, b \in \mathbb{R}_+^*, a \leq b \implies \frac{1}{a} \geq \frac{1}{b}$
  - (3)  $\forall a, b \in \mathbb{R}_+^*, a < b \implies \frac{1}{a} > \frac{1}{b}$
  - (4)  $\forall a, b, c, d \in \mathbb{R}, (a \leq b \text{ et } c \leq d) \implies a + c \leq b + d$
  - (5)  $\forall a, b, c, d \in \mathbb{R}, (a \leq b \text{ et } c \leq d) \implies ac \leq bd$
  - (6)  $\forall a, b, c, d \in \mathbb{R}_+, (a \leq b \text{ et } c \leq d) \implies ac \leq bd$
- 

*Correction 0.12*

★★ à venir ★★

## 0.3 Raisonnement par analyse-synthèse

---

### Exercice 0.13 (Exercice 7)

Déterminer les suites  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de réels vérifiant :

$$\forall m, n \in \mathbb{N}, \quad u_{m+n} = u_m + u_n.$$

---

*Correction 0.14*

★★ à venir ★★

## 0.4 Congruences

---

### Exercice 0.15 (Exercice 8)

Les propositions suivantes sont-elles vraies ?

(1)  $\forall x, y \in \mathbb{Z}, \quad x \equiv y [5] \implies x^2 \equiv y^2 [5]$

(2)  $\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad x \equiv y [5] \implies x^2 \equiv y^2 [5]$

(3)  $\exists x \in \mathbb{Z}, \quad x^2 \equiv -1 [5]$

(4)  $\exists x \in \mathbb{Z}, \quad x^2 \equiv -1 [7]$

(5)  $\exists x \in \mathbb{R}, \quad x^2 \equiv -1 [7]$

---

*Correction 0.16*

★★ à venir ★★

---

### Exercice 0.17 (Exercice 9)

Soient  $x$  et  $y$  deux nombres réels.

Chercher quelles implications sont vraies entre les propositions suivantes :

(1)  $x \equiv y [\pi]$

(2)  $x \equiv y + \pi [\pi]$

(3)  $x \equiv y [2\pi]$



$$(4) \quad x \equiv y + \pi \, [2\pi]$$

$$(5) \quad 2x \equiv 2y \, [2\pi]$$

$$(6) \quad \frac{x}{2} \equiv \frac{y}{2} \, \left[ \frac{\pi}{2} \right]$$

$$(7) \quad \frac{x}{2} \equiv \frac{y}{2} + \frac{\pi}{2} \, [\pi]$$

---

*Correction 0.18*

**★★ à venir ★★**

# Chapitre 1

## Inégalités, calculs

---

### Exercice 1.1 (Exercice 1)

(1) Montrer :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}_+^*, \quad \frac{xy}{x+y} \leq \frac{x+y}{4}.$$

(2) En déduire :

$$\forall x, y, z \in \mathbb{R}_+^*, \quad \frac{xy}{x+y} + \frac{yz}{y+z} + \frac{xz}{x+z} \leq \frac{x+y+z}{2}.$$

---

*Correction 1.2*

★★ à venir ★★

---

### Exercice 1.3 (Exercice 2)

Résoudre les inéquations d'inconnue  $x \in \mathbb{R}$  :

(1)  $\ln(1+x) \leq 1 + \ln x$

(2)  $\sqrt{\ln(1+x^2)} \geq 2$

(3)  $\frac{1}{x} < -1$

(4)  $\frac{1}{x} \leq 1$

(5)  $\sqrt{3-x} - \sqrt{x+1} > \frac{1}{2}$

(6)  $\lfloor \sqrt{x^2+1} \rfloor \leq 2$

(7)  $\lfloor x^2 - 4x \rfloor = 0$

---

*Correction 1.4*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 1.5 (Exercice 3)**

Soit  $x \in [1 ; +\infty[$ .

Montrer :

$$\frac{(x-1)^2}{8x} \leq \frac{x+1}{2} - \sqrt{x} \leq \frac{(x-1)^2}{8}.$$

---

*Correction 1.6*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 1.7 (Exercice 4)**

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

Calculer

$$\sum_{k=1}^n \ln \left( 1 + \frac{1}{k} \right) \quad \text{et} \quad \sum_{k=1}^n \ln \left( 1 + \frac{2}{k} \right).$$

---

*Correction 1.8*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 1.9 (Exercice 5)**

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

Calculer

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}.$$

---

*Correction 1.10*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 1.11 (Exercice 6)**

Soit  $n \in \mathbb{N}$ .

Calculer

$$\sum_{k=1}^n k \times k!$$

---

*Correction 1.12*

**★★ à venir ★★**

---

**Exercice 1.13 (Exercice 7)**

Soit  $n \in \mathbb{N}$ .

Calculer

$$\sum_{k=1}^n \frac{k}{k^4 + k^2 + 1}.$$

*Indication* : factoriser le dénominateur en remarquant  $k^4 + k^2 + 1 = k^4 + 2k^2 + 1 - k^2$ .

---

*Correction 1.14*

**★★ à venir ★★**

---

**Exercice 1.15 (Exercice 8)**

Soit  $n \in \mathbb{N}$ .

Calculer

$$\sum_{k=1}^n k^3.$$

Que remarque-t-on ?

*Indication* : s'inspirer du calcul de  $\sum_{k=1}^n k^2$  vu en cours.

---

*Correction 1.16*

**★★ à venir ★★**

---

**Exercice 1.17 (Exercice 9)**

Montrer la proposition suivante :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}, \quad \prod_{k=0}^n (x^{2^k} + 1) = \frac{x^{2^{n+1}} - 1}{x - 1}.$$

---

*Correction 1.18*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 1.19 (Exercice 10)**

Soit  $n \in \mathbb{N}$ .

Calculer les sommes suivantes :

$$S_1 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n 2 \quad S_2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n 2^i \quad S_3 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n 2^j \quad S_4 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n 2^{i+j}.$$

---

*Correction 1.20*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 1.21 (Exercice 11)**

Soit  $n \in \mathbb{N}$ .

Calculer les sommes suivantes :

$$S_1 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{1}{j} \quad S_2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{i+j}{j} \quad S_3 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{(i+j)^2}{j}.$$

---

*Correction 1.22*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 1.23 (Exercice 12)**

Soit  $n \in \mathbb{N}$ .

Calculer

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \min \{i ; j\}.$$

---

*Correction 1.24*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 1.25 (Exercice 13)**

On définit la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  en posant :

$$u_1 = 1 \quad u_2 = u_3 = 2 \quad u_4 = u_5 = u_6 = 3 \quad u_7 = u_8 = u_9 = u_{10} = 4 \quad \dots$$

Combien vaut  $u_{30}$  ?

Exprimer  $u_n$  en fonction de  $n \in \mathbb{N}^*$  à l'aide de la fonction partie entière.

---

*Correction 1.26*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 1.27 (Exercice 14)**

Soit  $n \in \mathbb{N}$ .

Montrer :

$$\left\lfloor \left( \sqrt{n} + \sqrt{n+1} \right)^2 \right\rfloor = 4n + 1.$$

---

*Correction 1.28*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 1.29 (Exercice 15)**

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

Montrer que la partie entière de  $\left(2 + \sqrt{3}\right)^n$  est un entier impair.

---

*Correction 1.30*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 1.31 (Exercice 16, classique)**

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

Calculer

$$\prod_{k=1}^n 2k \quad \text{puis} \quad \prod_{k=1}^n (2k-1).$$

NB : on exprimera le résultat à l'aide de factorielles, sans symbole  $\prod$  ni points de suspension.

---

*Correction 1.32*

★★ à venir ★★

# Chapitre 2

## Révisions de trigonométrie

---

### Exercice 2.1 (Exercice 1)

Calculer

$$\cos \frac{\pi}{12} \quad \sin \frac{\pi}{12} \quad \tan \frac{\pi}{12} \quad \tan \frac{\pi}{8} \quad \tan \frac{\pi}{16} \quad \sin \frac{\pi}{8} \quad \cos \frac{\pi}{8}.$$

---

*Correction 2.2*

★★ à venir ★★

---

### Exercice 2.3 (Exercice 2)

Résoudre les équations suivantes, d'inconnue  $x$  :

(1)  $\frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x} = 3 \tan x$

(2)  $\sin x + \cos x = 1$

(3)  $\sqrt{3} \sin x + \cos x = 1$

---

*Correction 2.4*

★★ à venir ★★

---

### Exercice 2.5 (Exercice 3)

Soit  $t$  un réel.

On note  $M$  (respectivement  $N$ ) le point de coordonnées  $(1, t)$  (respectivement  $(-1, 0)$ ) et  $\mathcal{C}$  le cercle unité.

(1) Déterminer  $\mathcal{C} \cap (MN)$ .

(2) Retrouver des formules connues.

---

*Correction 2.6*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 2.7 (Exercice 4)**

Soient  $n$  un entier relatif et  $x$  un réel tels que

$$\cos x + \cos (nx) + \cos ((2n-1)x) \neq 0.$$

Simplifier l'expression

$$\frac{\sin x + \sin (nx) + \sin ((2n-1)x)}{\cos x + \cos (nx) + \cos ((2n-1)x)}.$$

---

*Correction 2.8*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 2.9 (Exercice 5)**

Montrer

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad |\sin (nx)| \leq n |\sin x|.$$

---

*Correction 2.10*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 2.11 (Exercice 6)**

Montrer

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad \cos x^2 + \cos y^2 - \cos (xy) < 3.$$

---

*Correction 2.12*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 2.13 (Exercice 7)**

Soient  $n$  un entier naturel et  $x$  un réel tels que  $x \not\equiv 0 \left[ \frac{\pi}{2^{n+1}} \right]$ .

Montrer que la somme  $S = \sum_{k=0}^n 2^k \tan \left( 2^k x \right)$  est bien définie et calculer  $S$ .

*Indication :* montrer que pour tout réel  $\theta$  tel que  $\theta \not\equiv 0 \left[ \frac{\pi}{2} \right]$ , on a

$$\tan \theta = \cotan \theta - 2 \cotan (2\theta)$$

en posant  $\cotan = \frac{\cos}{\sin}$ .



---

*Correction 2.14*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 2.15 (Exercice 8)**

Soient  $n \in \mathbb{N}$  et  $x \in ]0 ; \pi[$ .

Calculer

$$P = \prod_{k=1}^n \cos \frac{x}{2^k}.$$

---

*Correction 2.16*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 2.17 (Exercice 9)**

Soient  $n \in \mathbb{N}$  et  $x \in \left]0 ; \frac{\pi}{2^{n+1}}\right[$ .

En utilisant l'exercice précédent, calculer

$$Q = \prod_{k=0}^n \left(1 + \frac{1}{\cos(2^k x)}\right).$$

---

*Correction 2.18*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 2.19 (Exercice 10)**

Soient  $x$  un réel et  $n$  un entier naturel.

Calculer

$$S = \sum_{k=0}^n \frac{1}{(-3)^k} \cos^3(3^k x).$$

*Indication* : montrer  $\forall \theta \in \mathbb{R}, \cos^3 \theta = \frac{3}{4} \cos \theta + \frac{1}{4} \cos(3\theta)$ .

---

*Correction 2.20*

★★ à venir ★★

# Chapitre 3

## Nombres complexes

---

### Exercice 3.1 (Exercice 1)

Écrire les nombres complexes suivants sous forme algébrique et sous forme trigonométrique :

$$1+i \quad 1+j \quad \frac{i}{1-i} \quad \frac{\sqrt{3}+3i}{1+i}.$$

---

*Correction 3.2*

★★ à venir ★★

---

### Exercice 3.3 (Exercice 2)

Calculer

$$i^{2022} \quad j^{2022} \quad (1+j)^{2022} \quad (1+i)^{2022}.$$

---

*Correction 3.4*

★★ à venir ★★

---

### Exercice 3.5 (Exercice 3)

Écrire  $z = \sqrt{2+\sqrt{2}} + i\sqrt{2-\sqrt{2}}$  sous forme trigonométrique.

*Indication* : déterminer  $\cos(2 \arg z)$ .

---

*Correction 3.6*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 3.7 (Exercice 4)**

Résoudre les équations suivantes, d'inconnue  $z \in \mathbb{C}$  :

(1)  $z^2 + 2z + 5 = 0$

(2)  $z^2 + (1+i)z - i = 0$

(3)  $z^4 + z^2 + 1 = 0$

(4)  $z^4 - 4iz^2 - 4 = 0$

---

*Correction 3.8*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 3.9 (Exercice 5)**

Résoudre le système suivant, d'inconnues  $x, y \in \mathbb{C}$  :

$$\begin{cases} x + y = 1 + i \\ xy = 2 - i \end{cases}$$

---

*Correction 3.10*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 3.11 (Exercice 6, CCP 2016)**

On pose

$$\omega = \exp \frac{2i\pi}{7} \quad S = \omega + \omega^2 + \omega^4 \quad T = \omega^3 + \omega^5 + \omega^6.$$

(1) Calculer  $S + T$  et  $ST$ .

(2) En déduire les valeurs de  $S$  et  $T$ .

---

*Correction 3.12*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 3.13 (Exercice 7)**

Décrire l'ensemble  $\mathbb{U}_{10}$  des racines dixièmes de l'unité.

Quels éléments de  $\mathbb{U}_{10}$  sont racines carrées de l'unité ? racines cinquièmes ? racines septièmes ? racines quinièmes ? racines vingtièmes ?

---

*Correction 3.14*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 3.15 (Exercice 8)**

Soient  $x, y \in \mathbb{C}$ .

Montrer les propositions suivantes :

(1)  $|x| + |y| \leq |x + y| + |x - y|$

(2)  $|x + y|^2 + |x - y|^2 = 2|x|^2 + 2|y|^2$  « identité du parallélogramme » dans  $\mathbb{C}$

---

*Correction 3.16*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 3.17 (Exercice 9)**

Soient  $A, B$  et  $C$  des points du plan d'affixes respectives  $a, b$  et  $c$ .

(1) Montrer que le triangle  $ABC$  est équilatéral direct si, et seulement si

$$a + jb + j^2c = 0.$$

*Si  $A = B = C$ , on convient que le triangle  $ABC$  est équilatéral direct et indirect.*

(2) Donner une CNS analogue pour que le triangle  $ABC$  soit équilatéral indirect.

(3) Montrer que le triangle  $ABC$  est équilatéral si, et seulement si

$$a^2 + b^2 + c^2 = ab + bc + ca.$$

---

*Correction 3.18*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 3.19 (Exercice 10)**

Soit  $(n, a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ .

Calculer

$$\sum_{k=0}^n \sin(a + kb) \quad \text{et} \quad \sum_{k=0}^n \cos(a + kb).$$

---

*Correction 3.20*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 3.21 (Exercice 11)**

Soit  $\theta \in \mathbb{R}$ .

Développer

$$\sin(5\theta) \quad \cos(5\theta) \quad \tan(5\theta) \quad \sin(7\theta) \quad \cos(7\theta) \quad \tan(7\theta).$$

---

*Correction 3.22*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 3.23 (Exercice 12)**

Soit  $\theta \in \mathbb{R}$ .

Linéariser

$$\cos^5 \theta \quad \sin^5 \theta \quad \cos^4 \theta \sin^2 \theta.$$

---

*Correction 3.24*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 3.25 (Exercice 13)**

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

Calculer

$$S = \sum_{\omega \in \mathbb{U}_n} \omega \quad \text{et} \quad P = \prod_{\omega \in \mathbb{U}_n} \omega.$$

---

*Correction 3.26*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 3.27 (Exercice 14)**

Calculer  $\cos \frac{2\pi}{5}$ .

Indication : on pourra utiliser la somme  $\sum_{\omega \in \mathbb{U}_5} \omega$ .

---

*Correction 3.28*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 3.29 (Exercice 15)**

Résoudre les équations suivantes, d'inconnue  $z \in \mathbb{C}$  :

(1)  $e^z = 0$

(2)  $e^z = 1$

(3)  $e^z = i$

(4)  $e^z = 2j$

---

*Correction 3.30*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 3.31 (Exercice 16)**

Déterminer les nombres complexes  $z \in \mathbb{C}$  tels que

$$z + \bar{z} = |z|.$$

---

*Correction 3.32*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 3.33 (Exercice 17)**

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

Résoudre l'équation d'inconnue  $z \in \mathbb{C}$  :

$$(z+1)^n = (z-1)^n.$$

---

*Correction 3.34*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 3.35 (Exercice 18)**

Soient  $a, b, c \in \mathbb{R}$  avec  $a \neq 0$ .

Montrer que les racines du polynôme  $P = aX^2 + bX + c$  ont leurs parties réelles respectives strictement négatives si, et seulement si, on a :

$$a, b, c \in \mathbb{R}_+^* \quad \text{ou} \quad a, b, c \in \mathbb{R}_-^*.$$

---

*Correction 3.36*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 3.37 (Exercice 19)**

Soit  $z \in \mathbb{C}$ .

Donner une CNS pour que les points  $z$ ,  $z^2$  et  $z^4$  soient alignés.

---

*Correction 3.38*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 3.39 (Exercice 20)**

On pose  $\mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Im} z > 0\}$  et  $\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < 1\}$ .

Montrer que la fonction  $f : \mathbb{H} \longrightarrow \mathbb{D}$  est une bijection de  $\mathbb{H}$  vers  $\mathbb{D}$ .

$$z \longmapsto \frac{z-i}{z+i}$$

*NB : On vérifiera que la fonction  $f$  est bien définie.*

---

*Correction 3.40*

★★ à venir ★★

# Chapitre 4

## Notions ensemblistes

### Sommaire

4.1	Ensembles . . . . .	.718
4.2	Fonctions . . . . .	.720
4.3	Ensembles ordonnés . . . . .	.723
4.4	Entiers naturels . . . . .	.725

### 4.1 Ensembles

#### Exercice 4.1 (Exercice 1)

Soient  $A$ ,  $B$  et  $C$  des ensembles.

Montrer les propositions suivantes :

- (1)  $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$
- (2)  $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$
- (3)  $C \setminus (A \cup B) = (C \setminus A) \cap (C \setminus B)$
- (4)  $(A \cup B) \setminus (A \cap B) = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$

---

*Correction 4.2*

★★ à venir ★★

---

#### Exercice 4.3 (Exercice 2)

Soient  $E$  et  $F$  deux ensembles.

- (1) Montrer l'équivalence

$$E \subseteq F \iff \mathcal{P}(E) \subseteq \mathcal{P}(F)$$



(2) La proposition suivante est-elle vraie ?

$$\mathcal{P}(E \cup F) = \mathcal{P}(E) \cup \mathcal{P}(F)$$

(3) La proposition suivante est-elle vraie ?

$$\mathcal{P}(E \cap F) = \mathcal{P}(E) \cap \mathcal{P}(F)$$

---

*Correction 4.4*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 4.5 (Exercice 3)**

On pose  $\mathcal{C} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$ .

Existe-t-il deux parties  $A, B \subseteq \mathbb{R}$  telles que  $\mathcal{C} = A \times B$  ?

---

*Correction 4.6*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 4.7 (Exercice 4, pas d'« ensemble de tous les ensembles »)**

Montrer qu'il n'existe pas d'ensemble dont les éléments sont les ensembles.

Pour cela, on pourra supposer par l'absurde qu'un tel ensemble  $E$  existe, considérer l'ensemble

$$A = \{X \in E \mid X \notin X\}$$

et aboutir à une contradiction.

---

*Correction 4.8*

★★ à venir ★★

## 4.2 Fonctions

---

### Exercice 4.9 (Exercice 5)

Soient  $E$  et  $F$  deux ensembles et deux fonctions  $f : E \longrightarrow F$  et  $g : F \longrightarrow E$ .

On suppose que la fonction  $f \circ g \circ f$  est une bijection de  $E$  dans  $F$ .

Montrer que  $f$  et  $g$  sont des bijections.

---

*Correction 4.10*

★★ à venir ★★

---

### Exercice 4.11 (Exercice 6, images directes, images réciproques)

Soient  $E$  et  $F$  deux ensembles, la fonction  $f : E \longrightarrow F$ , la partie  $A \subseteq E$  et la partie  $B \subseteq F$ .

(1) Montrer l'équivalence

$$A \subseteq f^{-1}(B) \iff f(A) \subseteq B.$$

(2) Quelle inclusion est toujours vraie entre  $A$  et  $f^{-1}(f(A))$ ? Donner un contre-exemple pour l'autre inclusion.

(3) Même chose entre  $B$  et  $f(f^{-1}(B))$ .

---

*Correction 4.12*

★★ à venir ★★

---

### Exercice 4.13 (Exercice 7)

Soient  $a$  et  $b$  des réels.

Donner une CNS sur  $a$  et  $b$  pour que la fonction

$$\begin{array}{ccc} f : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & ax + b \end{array}$$

soit une bijection.

Déterminer alors sa bijection réciproque.

---

*Correction 4.14*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 4.15 (Exercice 8)**

Montrer que la fonction « sinus hyperbolique » :

$$\begin{aligned} \text{sh} : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{e^x - e^{-x}}{2} \end{aligned}$$

est bijective et déterminer sa bijection réciproque.

---

*Correction 4.16*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 4.17 (Exercice 9)**

Soit  $E$  un ensemble non-vide et  $A \subseteq E$  une partie de  $E$ .

Montrer que la fonction

$$\begin{aligned} f : \mathcal{P}(E) &\longrightarrow \mathcal{P}(E)^2 \\ X &\longmapsto (X \cap A, X \cup A) \end{aligned}$$

est une injection.

Est-ce une surjection ?

---

*Correction 4.18*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 4.19 (Exercice 10)**

Soient  $E$  et  $F$  deux ensembles et deux fonctions  $f : E \longrightarrow F$  et  $g : F \longrightarrow E$ .

On suppose

$$g \circ f = \text{id}_E \quad \text{et} \quad f \circ g = \text{id}_F.$$

Montrer que  $f$  et  $g$  sont des bijections, réciproques l'une de l'autre.

---

*Correction 4.20*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 4.21 (Exercice 11, fonctions indicatrices)**

Soient  $E$  un ensemble et  $A, B, C \in \mathcal{P}(E)$ .

- (1) Montrer que la fonction

$$\begin{array}{ccc} \Phi : \mathcal{P}(E) & \longrightarrow & \{0; 1\}^E \\ A & \longmapsto & \mathbb{1}_A \end{array}$$

est une bijection et déterminer sa bijection réciproque.

- (2) Déterminer, en fonction de  $\mathbb{1}_A$  et  $\mathbb{1}_B$ , les fonctions indicatrices des parties suivantes :

$$A \cap B \quad A \cup B \quad E \setminus A.$$

- (3) Utiliser ce qui précède pour montrer l'égalité :

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

---

*Correction 4.22*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 4.23 (Exercice 12)**

Soient  $E$  et  $F$  deux ensembles non-vides.

Montrer que les deux propositions suivantes sont équivalentes :

- (1) Il existe une injection  $f : E \longrightarrow F$ .
- (2) Il existe une surjection  $g : F \longrightarrow E$ .

---

*Correction 4.24*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 4.25 (Exercice 13)**

Soit  $E$  un ensemble.

Montrer qu'il n'existe pas de surjection  $f : E \longrightarrow \mathcal{P}(E)$ .

---

*Correction 4.26*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 4.27 (Exercice 14)**

Soient  $E, E', F$  et  $F'$  des ensembles et  $f : E \longrightarrow F$ .

On suppose que l'ensemble  $E'$  est non-vidé et que l'ensemble  $F'$  possède au moins deux éléments distincts.

On définit les fonctions :

$$\begin{array}{ccc} F_1 : \mathcal{F}(E', E) & \longrightarrow & \mathcal{F}(E', F) \\ \varphi & \longmapsto & f \circ \varphi \end{array} \quad \text{et} \quad \begin{array}{ccc} F_2 : \mathcal{F}(F, F') & \longrightarrow & \mathcal{F}(E, F') \\ \varphi & \longmapsto & \varphi \circ f \end{array}$$

- (1) Donner une CNS sur  $f$  pour que  $F_1$  soit injective.
- (2) Donner une CNS sur  $f$  pour que  $F_1$  soit surjective.
- (3) Donner une CNS sur  $f$  pour que  $F_2$  soit injective.
- (4) Donner une CNS sur  $f$  pour que  $F_2$  soit surjective.

---

*Correction 4.28*

★★ à venir ★★

## 4.3 Ensembles ordonnés

---

**Exercice 4.29 (Exercice 15, ordre produit sur  $E \times F$ )**

Soient  $(E, \leq_E)$  et  $(F, \leq_F)$  deux ensembles ordonnés.

On définit une relation binaire sur  $E \times F$  en posant :

$$\forall (x_1, y_1), (x_2, y_2) \in E \times F, \quad (x_1, y_1) \leq (x_2, y_2) \iff \begin{cases} x_1 \leq_E x_2 \\ y_1 \leq_F y_2 \end{cases}$$

Montrer que  $\leq$  est une relation d'ordre sur  $E \times F$ .

---

*Correction 4.30*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 4.31 (Exercice 16, ordre lexicographique sur  $\mathbb{R}^2$ )**

On définit une relation binaire  $\sqsubseteq$  sur  $\mathbb{R}^2$  en posant :

$$\forall (x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2, (x_1, y_1) \sqsubseteq (x_2, y_2) \iff \begin{cases} x_1 < x_2 \\ \text{ou} \\ x_1 = x_2 \quad \text{et} \quad y_1 \leq y_2 \end{cases}$$

Montrer que  $\sqsubseteq$  est une relation d'ordre sur  $\mathbb{R}^2$  et que cet ordre est total.

---

*Correction 4.32*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 4.33 (Exercice 17)**

Soient  $A, B \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$  deux parties de  $\mathbb{R}$  admettant chacune une borne supérieure.

- (1) Montrer que  $A \cup B$  admet une borne supérieure, et déterminer cette borne supérieure en fonction de  $\sup A$  et  $\sup B$ .
- (2) Montrer que la partie

$$A + B = \{a + b\}_{(a,b) \in A \times B}$$

admet une borne supérieure, et déterminer cette borne supérieure en fonction de  $\sup A$  et  $\sup B$ .

---

*Correction 4.34*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 4.35 (Exercice 18)**

Soit  $X$  un ensemble.

On considère l'ensemble  $E = \mathcal{P}(X)$ , ordonné par la relation d'inclusion  $\subseteq$ .

- (1) Soient  $A, B \in E$ . La partie  $\{A ; B\} \subseteq E$  admet-elle une borne supérieure dans  $E$  ? une borne inférieure dans  $E$  ?
- (2) Soit  $(A_i)_{i \in I} \in E^I$  une famille d'éléments de  $E$ . Cette famille admet-elle une borne supérieure dans  $E$  ? une borne inférieure dans  $E$  ?

*NB : dans le cas présent, où tous les ensembles  $A_i$  sont des parties de  $E$ , on convient que l'intersection  $\bigcap_{i \in I} A_i$  vaut  $E$  si  $I$  est vide.*

---

*Correction 4.36*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 4.37 (Exercice 19)**

On considère la droite réelle achevée  $\overline{\mathbb{R}}$ , munie de sa relation d'ordre usuelle.

Montrer que toute partie de  $\overline{\mathbb{R}}$  admet une borne supérieure et une borne inférieure dans  $\overline{\mathbb{R}}$ .

---

*Correction 4.38*

★★ à venir ★★

## 4.4 Entiers naturels

---

**Exercice 4.39 (Exercice 20, descente infinie de Fermat)**

Montrer qu'il n'existe pas de suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$  d'entiers naturels strictement décroissante.

---

*Correction 4.40*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 4.41 (Exercice 21)**

On considère la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = \sum_{k=0}^n u_k \end{cases}$$

Montrer la proposition suivante :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad u_n = 2^{n-1}.$$

---

*Correction 4.42*

★★ à venir ★★

# Chapitre 5

## Suites

---

### Exercice 5.1 (Exercice 1, exemples fondamentaux)

Soit  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

Étudier la limite des suites suivantes en fonction de  $\lambda$  :

$$(n^\lambda)_{n \in \mathbb{N}^*} \quad (\ln^\lambda n)_{n \in \llbracket 2; +\infty \llbracket} \quad (\lambda^n)_{n \in \mathbb{N}} \quad (n!)_{n \in \mathbb{N}}$$

---

*Correction 5.2*

★★ à venir ★★

---

### Exercice 5.3 (Exercice 2)

Étudier la convergence (et déterminer la limite éventuelle) des suites de terme général :

$$(1) \quad u_n = \frac{n! + (-1)^n \cos n}{n! + \cos n}$$

$$(2) \quad v_n = \frac{(-1)^n n! + \cos n}{n! + \cos n}$$

$$(3) \quad w_n = \frac{(-1)^n n! + \cos n}{(n+1)! + \cos(n+1)}$$

$$(4) \quad x_n = \int_{-1}^1 t^n \sin t \, dt$$

---

*Correction 5.4*

★★ à venir ★★



---

**Exercice 5.5 (Exercice 3, moyennes)**

On définit, pour tous réels strictement positifs  $a$  et  $b$  :

- leur moyenne arithmétique :  $m_a(a, b) = \frac{a+b}{2}$  ;
- leur moyenne géométrique :  $m_g(a, b) = \sqrt{ab}$  ;
- leur moyenne harmonique :  $m_h(a, b) = \frac{2ab}{a+b}$ .

(1) Soient  $a, b \in \mathbb{R}_+^*$ . Montrer qu'on a

$$m_g(a^{-1}, b^{-1})^{-1} = m_g(a, b) \quad \text{et} \quad m_a(a^{-1}, b^{-1})^{-1} = m_h(a, b)$$

et

$$m_h(a, b) \leq m_g(a, b) \leq m_a(a, b) \quad \text{et} \quad m_g(m_h(a, b), m_a(a, b)) = m_g(a, b).$$

On se fixe pour la suite deux réels  $x$  et  $y$  tels que  $0 < x < y$ .

(2) On pose

$$\begin{cases} x_0 = x \\ y_0 = y \end{cases} \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad \begin{cases} x_{n+1} = m_g(x_n, y_n) \\ y_{n+1} = m_a(x_n, y_n) \end{cases}$$

Montrer que  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$  sont convergentes et de même limite.

(3) On pose

$$\begin{cases} u_0 = x \\ v_0 = y \end{cases} \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad \begin{cases} u_{n+1} = m_h(u_n, v_n) \\ v_{n+1} = m_a(u_n, v_n) \end{cases}$$

Montrer que  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  sont convergentes et de même limite. Quelle est cette limite ?

---

*Correction 5.6*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 5.7 (Exercice 4, série harmonique)**

On pose

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}.$$

(1) Montrer que la suite  $(H_n)_{n \in \mathbb{N}}$  admet une limite.

(2) Montrer :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad H_{2n} - H_n \geq \frac{1}{2}.$$

(3) En déduire la limite de la suite  $(H_n)_{n \in \mathbb{N}}$ .

---

*Correction 5.8*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 5.9 (Exercice 5)**

Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite réelle.

Quelles implications sont vraies entre les propositions suivantes ?

(1) La suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est convergente.

(2)  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} - u_n = 0$

---

*Correction 5.10*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 5.11 (Exercice 6)**

Soit  $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite complexe telle que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad z_{n+1} = \frac{z_n + |z_n|}{2}.$$

Montrer que  $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est convergente et que sa limite est réelle.

---

*Correction 5.12*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 5.13 (Exercice 7)**

Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite réelle.

(1) Montrer que si  $(u_n)_n$  est décroissante et si on a  $\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \in \mathbb{N}$  alors  $(u_n)_n$  est stationnaire.

(2) Montrer que si  $(u_n)_n$  est convergente et si on a  $\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \in \mathbb{Z}$  alors  $(u_n)_n$  est stationnaire.

---

*Correction 5.14*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 5.15 (Exercice 8)**

Soit  $A \subseteq \mathbb{R}$ .

- (1) Montrer que si  $A$  n'est pas majorée, alors il existe une suite d'éléments de  $A$  qui tend vers  $+\infty$ .
  - (2) Montrer que si  $A$  est majorée, alors il existe une suite d'éléments de  $A$  qui tend vers  $\sup A$ .
- 

*Correction 5.16*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 5.17 (Exercice 9)**

Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite réelle.

Montrer que  $(u_n)_n$  ne tend pas vers  $+\infty$  si, et seulement si, elle admet une suite extraite majorée.

---

*Correction 5.18*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 5.19 (Exercice 10)**

Soient  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  et  $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$ .

Montrer que  $(u_n)_n$  tend vers  $\ell$  si, et seulement si, de toute suite extraite de  $(u_n)_n$  on peut extraire une suite qui tend vers  $\ell$ .

---

*Correction 5.20*

★★ à venir ★★

---

---

**Exercice 5.21 (Exercice 11, théorème des segments emboîtés)**

Soient  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}, (b_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  deux suites réelles telles que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad a_n \leq b_n.$$

On suppose que la suite des segments  $([a_n ; b_n])_{n \in \mathbb{N}}$  est décroissante pour l'inclusion, c'est-à-dire :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad [a_{n+1} ; b_{n+1}] \subseteq [a_n ; b_n]$$

et que la suite des longueurs des segments tend vers 0, c'est-à-dire :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n - a_n = 0.$$

Montrer que  $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} [a_n ; b_n]$  est un singleton.

---

*Correction 5.22*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 5.23 (Exercice 12)**

(1) Soit  $A$  une partie de  $\mathbb{R}$  telle que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \exists a, b \in A, \quad a < x < b \quad \text{et} \quad \forall a, b \in A, \quad \frac{a+b}{2} \in A.$$

Montrer que  $A$  est dense dans  $\mathbb{R}$ .

(2) Retrouver le fait que  $\mathbb{Q}$  est dense dans  $\mathbb{R}$ .

---

*Correction 5.24*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 5.25 (Exercice 13, moyenne de Cesàro d'une suite)**

Soient  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  deux suites réelles et  $\ell$  un réel.

On considère la suite  $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$  définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad U_n = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n u_k.$$

(1) Montrer que si  $(u_n)_n$  diverge vers  $+\infty$ , alors  $(U_n)_n$  diverge vers  $+\infty$ .

- (2) Montrer que si  $(u_n)_n$  converge vers  $\ell$ , alors  $(U_n)_n$  converge vers  $\ell$ .
- (3) Montrer que les implications réciproques des propositions ci-dessus ne sont pas toujours vraies.
- (4) Montrer que si la suite  $(v_{n+1} - v_n)_n$  converge vers  $\ell$ , alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{v_n}{n} = \ell$ .
- (5) On suppose qu'on a :

$$\forall n \in \mathbb{N}, v_n \in \mathbb{R}_+^* \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{v_{n+1}}{v_n} = +\infty.$$

Montrer :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{v_n} = +\infty.$$

- (6) On suppose qu'on a :

$$\forall n \in \mathbb{N}, v_n \in \mathbb{R}_+^* \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{v_{n+1}}{v_n} = \ell.$$

Montrer :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{v_n} = \ell.$$

- (7) Calculer  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n!}$ .

- (8) Calculer  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n^2}$ .

*Correction 5.26*

★★ à venir ★★

### Exercice 5.27 (Exercice 14)

- (1) Montrer que pour tout entier  $n \in \mathbb{N}^*$ , l'équation d'inconnue  $x \in \mathbb{R}_+^*$  :

$$x + \ln x = n$$

admet une unique solution.

Dans la suite, on note  $u_n$  cette unique solution et on s'intéresse à la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ .

- (2) Montrer que  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  est croissante.
- (3) Déterminer sa limite.

*Correction 5.28*

★★ à venir ★★

# Chapitre 6

## Algèbre générale

### Sommaire

6.1	Lois de composition internes . . . . .	.732
6.2	Groupes . . . . .	.733
6.3	Anneaux . . . . .	.736
6.4	Corps . . . . .	.739

### 6.1 Lois de composition internes

#### Exercice 6.1 (Exercice 1)

On considère la loi de composition interne  $*$  sur  $\mathbb{R}$  définie par :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad x * y = \ln(e^x + e^y).$$

Est-elle associative ? commutative ? Possède-t-elle un élément neutre ?

---

*Correction 6.2*

★★ à venir ★★

---

#### Exercice 6.3 (Exercice 2)

Soit  $E$  un ensemble muni d'une loi  $*$ .

On suppose que la loi  $*$  est associative et qu'elle possède un élément neutre  $e$ .

Un élément  $x \in E$  est dit idempotent s'il vérifie  $x * x = x$ .

- (1) Soient  $x, y \in E$ . On suppose que  $x$  et  $y$  sont idempotents et qu'ils commutent. Montrer que  $x * y$  est idempotent.
- (2) Soit  $x \in E$  un élément inversible et idempotent. Montrer que son inverse  $x^{-1}$  est idempotent.

---

*Correction 6.4*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 6.5 (Exercice 3, plus difficile)**

Soient  $E$  un ensemble fini et  $*$  une loi de composition interne associative sur  $E$ .

Soit  $x \in E$ . On suppose que  $x$  est régulier pour la loi  $*$ .

- (1) Montrer que toute puissance de  $x$  est régulière :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, x^n \text{ est régulier.}$$

- (2) Montrer que la loi  $*$  admet un élément neutre.

- (3) Montrer que  $x$  est inversible.

---

*Correction 6.6*

★★ à venir ★★

## 6.2 Groupes

---

**Exercice 6.7 (Exercice 4, exemple important)**

Soit  $E$  un ensemble.

On appelle permutation de  $E$  toute bijection  $f : E \longrightarrow E$ .

On note  $S_E$  l'ensemble des permutations de  $E$ .

Montrer que  $(S_E, \circ)$  est un groupe. Est-il commutatif?

---

*Correction 6.8*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 6.9 (Exercice 5)**

Montrer que l'ensemble des applications de la forme

$$\begin{aligned} f_{ab} : \mathbb{C} &\longrightarrow \mathbb{C} \\ z &\longmapsto az + b \end{aligned}$$

avec  $(a, b) \in \mathbb{C}^* \times \mathbb{C}$  est un groupe pour la composition.

---

*Correction 6.10*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 6.11 (Exercice 6)**

On pose  $E = \{0 ; 1 ; 2\}$ .

- (1) Combien y a-t-il de lois de composition internes sur  $E$  ?
- (2) Combien y a-t-il de lois de composition internes commutatives sur  $E$  ?
- (3) Combien y a-t-il de lois de composition internes admettant 0 comme élément neutre sur  $E$  ?
- (4) Combien y a-t-il de lois de composition internes « unitaires » (c'est-à-dire admettant un élément neutre) sur  $E$  ?
- (5) Combien y a-t-il de structures de groupe pour lesquelles 0 est l'élément neutre sur  $E$  ?
- (6) Combien y a-t-il de structures de groupe sur  $E$  ?
- (7) Ces dernières sont-elles commutatives ?
- (8) On munit  $E$  de sa structure de groupe telle que 0 soit l'élément neutre. Quels sont les sous-groupes de  $E$  ? Déterminer  $\text{Aut}(E)$ .

---

*Correction 6.12*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 6.13 (Exercice 7)**

On note  $\mathbb{U}$  l'ensemble des nombres complexes de module 1.

Rappeler les structures naturelles de groupe de  $\mathbb{C}^*$  et  $\mathbb{U}$  et montrer que la fonction

$$\begin{aligned} f : \mathbb{C}^* &\longrightarrow \mathbb{U} \\ z &\longmapsto \frac{z}{|z|} \end{aligned}$$

est un morphisme de groupes.



---

*Correction 6.14*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 6.15 (Exercice 8, intersection de sous-groupes)**

Soient  $G$  un groupe et  $(H_i)_{i \in I}$  une famille de sous-groupes de  $G$ .

Montrer que l'intersection  $\bigcap_{i \in I} H_i$  est un sous-groupe de  $G$ .

---

*Correction 6.16*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 6.17 (Exercice 9)**

Soit  $(G, *)$  un groupe d'élément neutre  $e$  tel que

$$\forall g \in G, \quad g * g = e.$$

Montrer que  $G$  est abélien.

---

*Correction 6.18*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 6.19 (Exercice 10)**

Soit  $(G, *)$  un groupe de cardinal pair et d'élément neutre  $e$ .

(1) Vérifier que la relation  $\mathcal{R}$  sur  $G$  définie par

$$\forall g, h \in G, \quad g \mathcal{R} h \iff \left\{ \begin{array}{l} g = h \\ \text{ou} \\ g = h^{-1} \end{array} \right.$$

est une relation d'équivalence.

(2) En déduire que  $G$  possède un élément  $g$  tel que  $g \neq e$  et  $g * g = e$ .

---

*Correction 6.20*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 6.21 (Exercice 11)**

Soit  $G$  un groupe et  $g$  un élément de  $G$ .

- (1) Montrer qu'il existe un unique morphisme de groupes  $\varphi : \mathbb{Z} \longrightarrow G$  tel que

$$\varphi(1) = g.$$

Que vient-on de montrer à propos de l'application

$$\begin{array}{ccc} f : \operatorname{Hom}(\mathbb{Z}, G) & \longrightarrow & G \\ \varphi & \longmapsto & \varphi(1) \end{array} \quad ?$$

- (2) Montrer par des exemples que l'image d'un morphisme de groupes  $\varphi : \mathbb{Z} \longrightarrow G$  peut être finie ou infinie.

---

*Correction 6.22*

★★ à venir ★★

## 6.3 Anneaux

---

**Exercice 6.23 (Exercice 12)**

Quels sont les sous-anneaux de  $\mathbb{Z}$  ?

---

*Correction 6.24*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 6.25 (Exercice 13)**

Montrer que toute structure d'anneau sur un ensemble à trois éléments est une structure d'anneau commutatif.

---

*Correction 6.26*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 6.27 (Exercice 14)**

Montrer que l'ensemble des suites réelles convergentes (indiquées par  $\mathbb{N}$ ) est un sous-anneau de  $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ .

Que dire des suites complexes convergentes ?

---

*Correction 6.28*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 6.29 (Exercice 15)**

- (1) Les anneaux  $(\mathbb{Z}, +, \times)$  et  $(\mathbb{Q}, +, \times)$  sont-ils isomorphes ?
- (2) Les anneaux  $(\mathbb{R}, +, \times)$  et  $(\mathbb{Q}, +, \times)$  sont-ils isomorphes ?
- (3) Les anneaux  $(\mathbb{R}, +, \times)$  et  $(\mathbb{C}, +, \times)$  sont-ils isomorphes ?

---

*Correction 6.30*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 6.31 (Exercice 16)**

On pose :

$$\mathbb{Z}[\sqrt{2}] = \left\{ x + \sqrt{2}y \right\}_{(x,y) \in \mathbb{Z}^2} = \left\{ a \in \mathbb{R} \mid \exists x, y \in \mathbb{Z}, a = x + \sqrt{2}y \right\}.$$

- (1) Montrer que  $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$  est un anneau commutatif.
- (2) On pose :

$$\forall x, y \in \mathbb{Z}, N(x + \sqrt{2}y) = x^2 - 2y^2.$$

Montrer que cela définit une application  $N : \mathbb{Z}[\sqrt{2}] \longrightarrow \mathbb{Z}$ .

- (3) Montrer que si  $a$  et  $b$  sont des éléments de  $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$  alors

$$N(ab) = N(a)N(b).$$

- (4) Montrer que

$$\forall a \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}], a = 0 \iff N(a) = 0.$$

(5) Montrer que

$$\forall a \in \mathbb{Z} \left[ \sqrt{2} \right], \quad a \in \mathbb{Z} \left[ \sqrt{2} \right]^{\times} \iff N(a) \in \mathbb{Z}^{\times}.$$

(6) On pose

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ v_0 = 0 \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} u_{n+1} = u_n + 2v_n \\ v_{n+1} = u_n + v_n \end{cases}$$

Montrer que pour tout entier naturel  $n$ , l'élément  $u_n + \sqrt{2}v_n$  est inversible dans  $\mathbb{Z} \left[ \sqrt{2} \right]$ .

---

*Correction 6.32*

★★ à venir ★★

---

### Exercice 6.33 (Exercice 17)

Soient  $(A, +, \times)$  un anneau intègre et  $a, b \in A$ .

On dit que  $a$  divise  $b$  et on note  $a \mid b$  si on a :

$$\exists c \in A, \quad ac = b.$$

Montrer :

$$(\exists \lambda \in A^{\times}, \quad a = \lambda b) \iff \begin{cases} a \mid b \\ b \mid a \end{cases}$$

---

*Correction 6.34*

★★ à venir ★★

---

### Exercice 6.35 (Exercice 18)

On note  $\mathbb{D}$  l'ensemble des nombres décimaux :

$$\mathbb{D} = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \exists \alpha \in \mathbb{N}, \quad \exists \lambda \in \mathbb{Z}, \quad x = \frac{\lambda}{10^{\alpha}} \right\}.$$

(1) Montrer que  $\mathbb{D}$  est naturellement muni d'une structure d'anneau.

(2) Quels sont ses éléments inversibles ?

---

*Correction 6.36*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 6.37 (Exercice 19)**

Soit  $(A, +, \times)$  un anneau. On note 0 et 1 ses éléments neutres.

Un élément  $a \in A$  est dit nilpotent s'il vérifie :

$$\exists n \in \mathbb{N}^*, \quad a^n = 0.$$

- (1) Si  $A$  est intègre, quels sont ses éléments nilpotents ?
- (2) Soient  $a, b \in A$ . On suppose que  $a$  et  $b$  sont nilpotents et qu'ils commutent.

Montrer que  $a + b$  et  $ab$  sont nilpotents.

- (3) Soit  $a \in A$  un élément nilpotent.

Montrer que  $1 + a$  est inversible et déterminer son inverse.

---

*Correction 6.38*

★★ à venir ★★

## 6.4 Corps

---

**Exercice 6.39 (Exercice 20)**

Quels sont les sous-corps de  $\mathbb{Q}$  ?

---

*Correction 6.40*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 6.41 (Exercice 21)**

On pose :

$$\mathbb{Q}[\sqrt{2}] = \left\{ x + \sqrt{2}y \right\}_{(x,y) \in \mathbb{Q}^2} = \left\{ a \in \mathbb{R} \mid \exists x, y \in \mathbb{Q}, \quad a = x + \sqrt{2}y \right\}.$$

Montrer que  $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$  est un corps. Quels sont ses sous-corps ?

---

*Correction 6.42*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 6.43 (Exercice 22)**

Soient  $K$  un corps et  $A$  un anneau non-nul.

Montrer que tout morphisme d'anneaux  $\varphi : F \longrightarrow A$  est injectif.

---

*Correction 6.44*

★★ à venir ★★

---

**Exercice 6.45 (Exercice 23)**

Montrer que tout anneau intègre fini est un corps.

---

*Correction 6.46*

★★ À venir ★★

# Chapitre 7

## Limites de fonctions, continuité

### Sommaire

7.1	Limites & continuité . . . . .	.741
7.2	Principaux théorèmes. . . . .	.744
7.3	Fonctions circulaires réciproques. . . . .	.747
7.4	Fonctions lipschitziennes . . . . .	.749

### 7.1 Limites & continuité

#### Exercice 7.1 (Exercice 1)

On admet  $\lim_{t \rightarrow 0^+} t \ln t = 0$ .

Déterminer, lorsqu'elle existent, les limites suivantes :

(1)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 - 2x + x \ln x$

(2)  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2 + x}{x^6 + 2x^5 - 2x^3 - x^2}$  avec  $a$  valant  $+\infty$ , puis  $-\infty$ , puis 0, puis 1, puis  $-1$ .

On commencera par déterminer l'ensemble de définition du quotient.

(3)  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$

(4)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{-1/\ln x}$

(5)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x+1} - \sqrt{x-1}$

(6)  $\lim_{x \rightarrow 1^+} \ln x \times \ln(\ln x)$

---

Correction 7.2

★★ À venir ★★

---

**Exercice 7.3 (Exercice 2)**

- (1) Quel est l'ensemble de définition de la fonction  $f : x \mapsto \frac{x \ln x}{x-1}$  ?
- (2) En quels points peut-on prolonger  $f$  par continuité ?

---

Correction 7.4

★★ À venir ★★

---

**Exercice 7.5 (Exercice 3)**

Soient  $T \in \mathbb{R}_+^*$  et  $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$  une fonction  $T$ -périodique.

- (1) Montrer que  $f$  est continue si, et seulement si, sa restriction  $f|_{[0;T]}$  est continue.
- (2) Montrer que  $f$  admet une limite en  $+\infty$  si, et seulement si, elle est constante.
- (3) Soit  $f$  la fonction 2-périodique telle que

$$\forall x \in [0 ; 1[ , \quad f(x) = 1 - x \quad \text{et} \quad \forall x \in [1 ; 2[ , \quad f(x) = x - 1.$$

Que dire de  $f$  (continuité, limite en  $+\infty$ , en  $-\infty$ ) ?

---

Correction 7.6

★★ À venir ★★

---

**Exercice 7.7 (Exercice 4)**

Soit  $\alpha \in \mathbb{R}$ . On pose

$$f_\alpha : \mathbb{R}_+^* \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto x^\alpha \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor$$

- (1) On suppose dans cette question que  $\alpha = 0$ . Déterminer en quels points  $f_0$  est continue, continue à droite, continue à gauche.
- (2) Faire la même chose pour  $f_\alpha$  (où  $\alpha$  est un réel quelconque).
- (3) Étudier la limite de  $f_\alpha$  en 0 et en  $+\infty$ .



---

Correction 7.8

★★ À venir ★★

---

**Exercice 7.9 (Exercice 5)**

On pose

$$\begin{aligned} f : \mathbb{Q} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \cos x \end{aligned}$$

Déterminer les prolongements continus de  $f$  à  $\mathbb{R}$ .

---

Correction 7.10

★★ À venir ★★

---

**Exercice 7.11 (Exercice 6, CCP MPI 2023)**

Soit  $x_0 \in \mathbb{R}$ . On définit la suite  $(u_n)_n$  en posant :

$$\begin{cases} u_0 = x_0 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \operatorname{Arctan} u_n \end{cases}$$

- (1) Démontrer que la suite  $(u_n)_n$  est monotone et déterminer, en fonction de la valeur de  $x_0$ , le sens de variation de  $(u_n)_n$ .
- (2) Montrer que  $(u_n)_n$  converge et déterminer sa limite.
- (3) Déterminer l'ensemble des fonctions continues  $h : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$  telles que

$$\forall x \in \mathbb{R}, h(x) = h(\operatorname{Arctan} x).$$

---

Correction 7.12

★★ À venir ★★

---

**Exercice 7.13 (Exercice 7)**

Soit  $\varphi : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$  un endomorphisme de groupe (la loi étant l'addition usuelle).

On pose  $\alpha = \varphi(1)$ .

- (1) Déterminer, en fonction de  $\alpha$ , la restriction de  $\varphi$  à  $\mathbb{Z}$ .
- (2) Déterminer, en fonction de  $\alpha$ , la restriction de  $\varphi$  à  $\mathbb{Q}$ .
- (3) On suppose  $\varphi$  continu. Déterminer  $\varphi$  en fonction de  $\alpha$ .
- (4) Quels sont les endomorphismes continus du groupe  $\mathbb{R}$  ?

---

*Correction 7.14*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 7.15 (Exercice 8)**

Soient  $a, b \in \mathbb{R}$  tels que  $a < b$ . Soient  $f : [a ; b] \longrightarrow [a ; b]$  continue et  $(u_n)_n$  une suite d'éléments de  $[a ; b]$  telle que

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n).$$

On suppose que  $(u_n)_n$  est convergente.

Montrer que sa limite  $\ell$  est un point fixe de  $f$  (on n'oubliera pas de justifier que  $f$  est bien définie en  $\ell$ ).

---

*Correction 7.16*

★★ À venir ★★

## 7.2 Principaux théorèmes

---

**Exercice 7.17 (Exercice 9)**

Démontrer le Théorème 7.99 (inutile de traiter tous les cas).

---

*Correction 7.18*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 7.19 (Exercice 10, très classique)**

Soit  $f : [0 ; 1] \longrightarrow [0 ; 1]$  continue.

Montrer que  $f$  admet un point fixe, c'est-à-dire :

$$\exists x \in [0 ; 1], f(x) = x.$$

---

*Correction 7.20*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 7.21 (Exercice 11)**

Soit  $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$  continue et décroissante.

Montrer que  $f$  admet un unique point fixe.

---

*Correction 7.22*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 7.23 (Exercice 12)**

Montrer que la fonction tangente admet une infinité de points fixes, c'est-à-dire qu'il existe une infinité de réels  $x$  tels que  $\tan x = x$ .

---

*Correction 7.24*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 7.25 (Exercice 13)**

Soit  $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$  continue et périodique.

Montrer que  $f$  est bornée.

---

*Correction 7.26*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 7.27 (Exercice 14)**

Soit  $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$  continue.

On suppose :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty.$$

Montrer que  $f$  admet un minimum (global).

---

*Correction 7.28*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 7.29 (Exercice 15)**

Soient  $f, g \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ .

On suppose  $f$  continue et  $g$  bornée.

Montrer que  $g \circ f$  et  $f \circ g$  sont bornées.

---

*Correction 7.30*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 7.31 (Exercice 16, démonstration du Théorème 7.119)**

Soient  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$  et  $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$  injective et continue.

On veut montrer dans les questions (1) à (3) que  $f$  est monotone en raisonnant par l'absurde. Pour cela, on suppose  $f$  non-monotone.

(1) Montrer qu'il existe des éléments  $a, b, c, d \in I$  tels que

$$\left\{ \begin{array}{l} a < b \\ c < d \\ f(a) < f(b) \\ f(c) > f(d) . \end{array} \right.$$

(2) On pose

$$\begin{array}{ccc} g : [0 ; 1] & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ t & \longmapsto & f(ta + (1-t)c) - f(tb + (1-t)d) \end{array}$$

Montrer :

$$\exists t_0 \in [0 ; 1] , \quad g(t_0) = 0.$$

(3) Conclure.

(4) Montrer par un exemple qu'on ne pourrait conclure sans supposer que  $f$  est définie sur un intervalle (c'est-à-dire donner une fonction  $f_1 : J \longrightarrow \mathbb{R}$  injective, continue et non-monotone, où  $J$  est une partie quelconque de  $\mathbb{R}$ ).

(5) Montrer par un exemple qu'on ne pourrait pas conclure sans l'hypothèse de continuité de  $f$  (c'est-à-dire donner une fonction  $f_2 : K \longrightarrow \mathbb{R}$  injective et non-monotone, où  $K$  est un intervalle de  $\mathbb{R}$ ).

---

*Correction 7.32*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 7.33 (Exercice 17)**

Soient  $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$  tels que  $a < b$ . Soit  $f : ]a ; b[ \longrightarrow \mathbb{R}$  continue.

On suppose que  $f$  possède la même limite en  $a$  et en  $b$ .

Montrer que  $f$  n'est pas injective.

---

*Correction 7.34*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 7.35 (Exercice 18)**

Soient  $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$  et  $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$  continue et telle que

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad |f(x) - f(y)| \geq \lambda |x - y|.$$

Montrer que  $f$  est une bijection de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ .

---

*Correction 7.36*

★★ À venir ★★

## 7.3 Fonctions circulaires réciproques

---

**Exercice 7.37 (Exercice 19)**

Montrer

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, \quad \operatorname{Arctan} x + \operatorname{Arctan} \frac{1}{x} = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & \text{si } x > 0 \\ -\frac{\pi}{2} & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

---

*Correction 7.38*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 7.39 (Exercice 20)**

Soient  $x, y \in ]-1 ; 1[$ .

(1) Montrer

$$\operatorname{Arctan} x + \operatorname{Arctan} y = \operatorname{Arctan} \frac{x+y}{1-xy}.$$

(2) Montrer

$$\operatorname{Arctan} \frac{1}{2} + \operatorname{Arctan} \frac{1}{3} = \frac{\pi}{4}.$$

---

*Correction 7.40*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 7.41 (Exercice 21)**

Soit  $x \in \mathbb{R}$ .

Dire pour quelles valeurs de  $x$  les expressions suivantes sont bien définies et simplifier ces expressions :

(1)  $\cos(\operatorname{Arctan} x)$

*Indication* : utiliser la relation entre  $\tan^2$  et  $\cos^2$ .

(2)  $\sin(\operatorname{Arctan} x)$

(3)  $\sin(2 \operatorname{Arctan} x)$

Quelle formule reconnaît-on ?

(4)  $\cos(2 \operatorname{Arctan} x)$

Quelle formule reconnaît-on ?

(5)  $\operatorname{Arctan} \sqrt{\frac{1-\cos x}{1+\cos x}}$

---

*Correction 7.42*

★★ À venir ★★

## 7.4 Fonctions lipschitziennes

---

### Exercice 7.43 (Exercice 22)

Soient  $k \in [0 ; 1[$  et  $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$   $k$ -lipschitzienne.

- (1) Montrer que  $f$  admet un point fixe.
- (2) Montrer que ce point fixe est unique.
- (3) Soit  $(u_n)_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ . On suppose

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = f(u_n).$$

Montrer que  $(u_n)_n$  converge vers le point fixe de  $f$ .

---

*Correction 7.44*

★★ À venir ★★

---

### Exercice 7.45 (Exercice 23)

Soient  $a, b, \lambda \in \mathbb{R}$  tels que  $a \leq \lambda \leq b$ . Soit  $f : [a ; b] \longrightarrow [a ; b]$  1-lipschitzienne.

On considère la suite  $(u_n)_n$  définie par :

$$\begin{cases} u_0 = \lambda \\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = \frac{u_n + f(u_n)}{2} \end{cases}$$

- (1) Justifier que la suite  $(u_n)_n$  est bien définie.
- (2) Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Montrer que  $u_{n+2} - u_{n+1}$  est de même signe (au sens large) que  $u_{n+1} - u_n$ .
- (3) Montrer que la suite  $(u_n)_n$  converge vers un point fixe de  $f$ .

---

*Correction 7.46*

★★ À venir ★★

# Chapitre 8

## Arithmétique

### Sommaire

8.1	Compléments sur les groupes . . . . .	.750
8.2	Arithmétique . . . . .	.751

### 8.1 Compléments sur les groupes

★★ Les exercices 1 et 2 étaient en fait les démonstrations de la Définition/Proposition 8.17 et du Théorème 8.21 ★★

#### Exercice 8.1 (Exercice 3)

Soit  $(G, +)$  un groupe abélien. On note  $E$  l'ensemble de ses sous-groupes.

On munit  $E$  de la loi de composition interne  $+$  (somme de sous-groupes) et de la relation d'ordre  $\subseteq$ .

Soit  $r \in \mathbb{N}^*$  et  $H_1, \dots, H_r$  des sous-groupes de  $G$ .

- (1)  $(E, +)$  est-il un groupe ?
- (2) Montrer que  $\{H_1 ; \dots ; H_r\}$  admet une borne inférieure et une borne supérieure dans  $E$ .

---

*Correction 8.2*

★★ À venir ★★

---

#### Exercice 8.3 (Exercice 4, familles d'entiers presque tous nuls)

Soit  $I$  un ensemble.

On appelle support d'une famille d'entiers relatifs  $\mathcal{F} = (x_i)_{i \in I} \in \mathbb{Z}^I$  l'ensemble :

$$\text{supp } \mathcal{F} = \{i \in I \mid x_i \neq 0\}.$$



On dit que  $\mathcal{F}$  est une famille d'entiers presque tous nuls si son support est un ensemble fini, c'est-à-dire si les termes de  $\mathcal{F}$  sont tous nuls sauf un nombre fini d'entre eux. L'ensemble de ces familles est noté  $\mathbb{Z}^{(I)}$  :

$$\mathbb{Z}^{(I)} = \{ \mathcal{F} \in \mathbb{Z}^I \mid \text{Card supp } \mathcal{F} < +\infty \}.$$

Montrer que  $\mathbb{Z}^{(I)}$  est un sous groupe de  $(\mathbb{Z}^I, +)$ .

---

*Correction 8.4*

★★ À venir ★★

## 8.2 Arithmétique

---

### Exercice 8.5 (Exercice 5)

Calculer :

(1)  $100^{1234567} \text{ modulo } 13$

(2)  $1234^{12345678910} \text{ modulo } 21$

(3)  $1234^{12345^{123456}} \text{ modulo } 256$

(4)  $1000^{1000^{1000}} \text{ modulo } 17$

*Indication* : on pourra utiliser le petit théorème de Fermat.

---

*Correction 8.6 (1)*

On a  $100 \equiv 9 [13]$ .

Or on a  $9^2 \equiv 3 [13]$ ,  $9^3 \equiv 1 [13]$  et  $9^4 \equiv 9 [13]$ .

Donc, avec  $N$  un entier relatif,  $9^N \text{ modulo } 13$  ne dépend que de  $N \text{ modulo } 3$ .

Or  $1234567 \equiv 1 [3]$ .

Donc  $100^{1234567} \equiv 9^1 [13] \equiv 9 [13]$ .

---

### Exercice 8.7 (Exercice 6)

Soient  $a, b \in \mathbb{Z}$ .

(1) Montrer que 8 divise  $a^2 - 1$  si, et seulement si,  $a$  est impair.

(2) Montrer que 7 divise  $a^2 + b^2$  si, et seulement si, 7 divise  $a$  et  $b$ .

---

Correction 8.8

★★ À venir ★★

---

**Exercice 8.9 (Exercice 7)**

- (1) Soient  $n$  et  $\alpha$  deux entiers supérieurs ou égaux à 2. Montrer que si  $n^\alpha$  est un nombre premier alors  $n = 2$  et  $\alpha$  est un nombre premier. La réciproque est-elle vraie ?
- (2) Soit  $\beta$  un entier naturel. Montrer que si  $2^\beta + 1$  est premier alors  $\beta$  est une puissance de 2.
- 

Correction 8.10

★★ À venir ★★

---

**Exercice 8.11 (Exercice 8)**

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on note  $u_n$  l'entier naturel dont l'écriture en base 10 possède  $3^n$  chiffres, tous égaux à 1 :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = \underbrace{1111 \dots 1}_{3^n \text{ chiffres}}.$$

Déterminer la valuation 3-adique de  $u_n$ .

*Indication :* remarquer  $\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = u_n \left( 1 + 10^{3^n} + 10^{3^n \times 2} \right).$

---

Correction 8.12

★★ À venir ★★

---

**Exercice 8.13 (Exercice 9)**

Soit  $n \in \mathbb{N}$ .

- (1) Justifier que  $n + 1$  et  $2n + 1$  sont premiers entre eux.
- (2) Montrer que  $n + 1$  divise  $\binom{2n}{n}$ .

*Indication :* considérer  $\binom{2n+1}{n+1}$ .

---

*Correction 8.14*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 8.15 (Exercice 10)**

Soient  $m, n \in \llbracket 2 ; +\infty \rrbracket$ .

On suppose  $\frac{\ln m}{\ln n} \in \mathbb{Q}$ .

Montrer que  $m$  et  $n$  ont les mêmes diviseurs premiers.

---

*Correction 8.16*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 8.17 (Exercice 11)**  $\begin{cases} x \equiv 2 [7] \\ x \equiv 3 [9] \end{cases}$   
Trouver un entier  $x \in \mathbb{Z}$  tel que

---

*Correction 8.18*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 8.19 (Exercice 12)**  $\begin{cases} x \equiv 5 [7] \\ x \equiv 10 [16] \end{cases}$   
Trouver un entier  $x \in \mathbb{Z}$  tel que

---

*Correction 8.20*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 8.21 (Exercice 13)**  $\begin{cases} x \equiv 5 [9] \\ x \equiv 10 [15] \end{cases}$   
Trouver un entier  $x \in \mathbb{Z}$  tel que

---

*Correction 8.22*

★★ À venir ★★

---

---

**Exercice 8.23 (Exercice 14)**

Soit  $p \in \mathbb{P}$ .

- (1) Montrer  $\forall k \in \llbracket 1 ; p-1 \rrbracket, p \mid \binom{p}{k}$ .
- (2) En déduire  $\forall k \in \llbracket 0 ; p-1 \rrbracket, \binom{p-1}{k} \equiv (-1)^k [p]$ .

---

*Correction 8.24*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 8.25 (Exercice 15)**

Soit  $n \in \llbracket 2 ; +\infty \rrbracket$ .

Montrer

$$n \in \mathbb{P} \iff \forall k \in \llbracket 1 ; n-1 \rrbracket, n \mid \binom{n}{k}.$$

---

*Correction 8.26*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 8.27 (Exercice 16, valuations  $p$ -adiques des rationnels)**

- (1) Soit  $a \in \mathbb{P}$ . Montrer qu'on définit une fonction  $w_p : \mathbb{Q}^* \longrightarrow \mathbb{Z}$  en posant :

$$\forall a \in \mathbb{Z}^*, \forall b \in \mathbb{N}^*, w_p\left(\frac{a}{b}\right) = v_p(a) - v_p(b).$$

*Indication* : il s'agit de montrer que l'image d'un rationnel ne dépend pas de l'écriture  $\frac{a}{b}$  choisie.

- (2) En utilisant l'Exercice 8.3, montrer que les groupes  $(\mathbb{Q}^*, \times)$  et  $(\mathbb{Z}^{(\mathbb{P})}, +)$  sont isomorphes.

---

*Correction 8.28*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 8.29 (Exercice 17)**

On note  $(p_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite strictement croissante des nombres premiers (c'est-à-dire  $p_0 = 2$ ,  $p_1 = 3$ ,  $p_2 = 5$ , ...).

(1) Montrer  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $p_{n+1} \leq p_0 \times p_1 \times \cdots \times p_n + 1$ .

(2) En déduire  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $p_n \leq 2^{2^n}$ .

Pour tout  $N \in \mathbb{N}$ , on note  $\pi(N)$  le nombre de nombres premiers inférieurs à  $N$  :

$$\forall N \in \mathbb{N}, \pi(N) = \text{Card } \mathbb{P} \cap \llbracket 1 ; N \rrbracket.$$

(3) Montrer l'encadrement  $\forall N \in \llbracket 2 ; +\infty \llbracket$ ,  $\log_2 \circ \log_2(N) \leq \pi(N) \leq N$ .

*Remarque* : le logarithme en base 2 est la fonction  $\log_2 : \mathbb{R}_+^* \longrightarrow \mathbb{R}$  qui est la bijection réciproque de la fonction

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R}_+^* \\ x & \longmapsto & 2^x \end{array}$$

On montre facilement :  $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$ ,  $\log_2 x = \frac{\ln x}{\ln 2}$ .

---

*Correction 8.30*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 8.31 (Exercice 18)**

Soit  $p$  un nombre premier impair.

On suppose que  $-1$  est un carré modulo  $p$  :

$$\exists x \in \mathbb{Z}, -1 \equiv x^2 [p].$$

Montrer  $p \equiv 1 [4]$ .

*Indication* : utiliser le petit théorème de Fermat.

*Remarque* : la CN prouvée est en fait une CNS :  $[\exists x \in \mathbb{Z}, -1 \equiv x^2 [p]] \iff p \equiv 1 [4]$ .

---

*Correction 8.32*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 8.33 (Exercice 19)**

- (1) Montrer qu'il existe une infinité de nombres premiers  $p$  tels que  $p \equiv 3 \pmod{4}$ .
- (2) En utilisant l'exercice précédent, montrer qu'il existe une infinité de nombres premiers  $p$  tels que  $p \equiv 1 \pmod{4}$ .

*Indications :*

- (1) S'intéresser aux diviseurs premiers de  $4(n!) - 1$  avec  $n \in \mathbb{N}$ .
- (2) S'intéresser aux diviseurs premiers de  $(n!)^2 + 1$  avec  $n \in \mathbb{N}$ .

---

*Correction 8.34*

**★★ À venir ★★**

# Chapitre 9

## Fonctions dérivables

### Sommaire

9.1	Étude locale . . . . .	.757
9.2	Étude globale . . . . .	.759
9.3	Convexité . . . . .	.762

### 9.1 Étude locale

#### Exercice 9.1 (Exercice 1)

Étudier la dérivabilité des fonctions suivantes (en précisant leurs ensembles de définition) :

(1)  $f : x \mapsto \cos \sqrt{x}$

(2)  $f : x \mapsto \sin |x|$

(3)  $f : x \mapsto \ln(1 + \sqrt{x})$

(4)  $f : x \mapsto x|x|$

(5)  $f : x \mapsto \sqrt{x^2 - x^3}$

(6)  $f : x \mapsto (1 - x) \operatorname{Arccos} x$

*Correction 9.2*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 9.3 (Exercice 2)**

Montrer que la fonction

$$f : x \mapsto \ln \left( \frac{e^x - 1}{x} \right)$$

est définie sur  $\mathbb{R}^*$  et se prolonge en une fonction de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}$ .

---

*Correction 9.4*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 9.5 (Exercice 3)**

Soient  $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$  et  $a \in \mathbb{R}$ .

On suppose que  $f$  est dérivable en  $a$ .

Déterminer  $\lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h \neq 0}} \frac{f(a+2h) - f(a-h)}{h}$ .

---

*Correction 9.6*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 9.7 (Exercice 4)**

Pour tout  $k \in \mathbb{N}$ , calculer la dérivée  $k$ -ème des fonctions suivantes :

(1)  $f : x \mapsto \ln x$

(2)  $f : x \mapsto x^2 \ln x$

(3)  $f : x \mapsto \cos^4 x$

(4)  $f : x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x}}$

(5)  $f : x \mapsto \frac{x-1}{x+1}$

On simplifiera les résultats en utilisant des factorielles si c'est utile.

---

*Correction 9.8*

★★ À venir ★★



---

**Exercice 9.9 (Exercice 5)**

Soit  $n \in \mathbb{N}$ .

- (1) Pour tout  $k \in \mathbb{N}$ , calculer la dérivée  $k$ -ème de  $f : x \mapsto x^n$ .
- (2) En calculant de deux façons la dérivée  $n$ -ème de  $g : x \mapsto x^{2n}$ , calculer :

$$S = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2.$$

---

*Correction 9.10*

★★ À venir ★★

## 9.2 Étude globale

---

**Exercice 9.11 (Exercice 6)**

Étudier la fonction  $f : x \mapsto \operatorname{Arccos} \left( \frac{1-x^2}{1+x^2} \right)$ .

On précisera l'ensemble de définition de  $f$ , en quels points  $f$  est continue, en quels points  $f$  est dérivable, les variations de  $f$  (avec ses limites), et le graphe de  $f$ .

---

*Correction 9.12*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 9.13 (Exercice 7)**

Dessiner le graphe de la fonction :

$$f : x \mapsto \operatorname{Arccos} \sqrt{\frac{1+\sin x}{2}} - \operatorname{Arcsin} \sqrt{\frac{1+\cos x}{2}}.$$

---

*Correction 9.14*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 9.15 (Exercice 8)**

Montrer

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad \operatorname{Arcsin} \left( \frac{1-x}{1+x} \right) = \operatorname{Arctan} \left( \frac{1-x}{2\sqrt{x}} \right)$$

de deux façons :

- (1) En calculant  $\tan \left( \operatorname{Arcsin} \left( \frac{1-x}{1+x} \right) \right)$ .
- (2) En dérivant.

---

*Correction 9.16*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 9.17 (Exercice 9)**

Soit  $\alpha \in ]1 ; +\infty[$ .

- (1) Déterminer toutes les fonctions  $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$  telles que :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad |f(x) - f(y)| \leq |x - y|^\alpha.$$

*Indication* : montrer qu'une telle fonction est nécessairement dérivable.

- (2) Déterminer toutes les fonctions  $f : \mathbb{R}^* \longrightarrow \mathbb{R}$  telles que :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^*, \quad |f(x) - f(y)| \leq |x - y|^\alpha.$$

---

*Correction 9.18*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 9.19 (Exercice 10)**

Soit  $f : \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}$  une fonction dérivable telle que :

$$f(0) = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

- (1) Montrer que  $f$  est bornée.
- (2) À l'aide du théorème de Rolle, montrer :

$$\exists c \in \mathbb{R}_+^*, \quad f'(c) = 0.$$

---

Correction 9.20

★★ À venir ★★

---

**Exercice 9.21 (Exercice 11)**

Soient  $a, b \in \mathbb{R}$  tels que  $a < b$  et  $f, g \in \mathcal{F}([a; b], \mathbb{R})$  continues.

On suppose que  $f$  et  $g$  sont dérivables sur  $]a; b[$ .

Montrer :

$$\exists c \in ]a; b[, \quad f'(c)(g(b) - g(a)) = g'(c)(f(b) - f(a)).$$

---

Correction 9.22

★★ À venir ★★

---

**Exercice 9.23 (Exercice 12)**

On pose :

$$\begin{aligned} f : [0; 1] &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{e^x}{x+2} \end{aligned}$$

(1) Soit  $a \in [0; 1]$ . Montrer que l'on définit une suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in [0; 1]^{\mathbb{N}}$  en posant :

$$u_0 = a \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = f(u_n).$$

(2) Montrer que  $f$  est  $\frac{2e}{9}$ -lipschitzienne.

(3) Montrer que  $f$  admet un unique point fixe  $\alpha$  dans  $[0; 1]$ .

(4) Montrer que la suite  $(u_n)_n$  converge vers  $\alpha$  et que l'on a :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad |u_n - \alpha| \leq \left(\frac{2e}{9}\right)^n.$$

(5) Donner un rang  $n \in \mathbb{N}$  tel que  $u_n$  soit une approximation de  $\alpha$  à  $10^{-3}$  près.

---

Correction 9.24

★★ À venir ★★

## 9.3 Convexité

---

### Exercice 9.25 (Exercice 13)

Soient  $a, b, c \in \mathbb{R}$ .

Donner une CNS pour que la fonction

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto ax^2 + bx + c \end{aligned}$$

soit convexe.

---

*Correction 9.26*

★★ À venir ★★

---

### Exercice 9.27 (Exercice 14)

Soit  $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$ .

On pose :

$$\begin{aligned} f_\alpha : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \exp\left(\frac{-x^2}{2\alpha^2}\right) \end{aligned}$$

Étudier la convexité de  $f_\alpha$  en fonction de  $\alpha$ .

---

*Correction 9.28*

★★ À venir ★★

---

### Exercice 9.29 (Exercice 15)

Soit  $x \in [0 ; 1]$ .

Montrer :

$$\frac{\pi}{4}x \leq \operatorname{Arctan} x \leq x \leq \operatorname{Arcsin} x \leq \frac{\pi}{2}x.$$

---

*Correction 9.30*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 9.31 (Exercice 16)**

Montrer :

$$\forall x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}_+, \sqrt{x_1 + \dots + x_n} \leq \sqrt{x_1} + \dots + \sqrt{x_n} \leq \sqrt{n(x_1 + \dots + x_n)}.$$

---

*Correction 9.32*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 9.33 (Exercice 17)**

- (1) Donner un exemple de fonction dérivable de  $\mathbb{R}_+$  dans  $\mathbb{R}$  qui soit convexe, majorée et non-constante.
- (2) Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction dérivable, convexe et majorée. Montrer que  $f$  est constante.
- (3) Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction convexe et majorée. Montrer que  $f$  est constante.

---

*Correction 9.34*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 9.35 (Exercice 18)**

Soit  $f : [0 ; 1] \rightarrow \mathbb{R}$  convexe.

- (1) Montrer que  $f$  est dérivable à droite et à gauche en tout point de  $]0 ; 1[$ .
- (2) La fonction  $f$  est-elle nécessairement dérivable en 0 ? en 1 ? en  $\frac{1}{2}$  ?
- (3) La fonction  $f$  est-elle nécessairement continue en 0 ? en 1 ? en  $\frac{1}{2}$  ?

---

*Correction 9.36*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 9.37 (Exercice 19)**

Soit  $f : \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}$  convexe.

- (1) Montrer que  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$  existe. On la note  $\ell$ .
- (2) Montrer que si  $\ell \leq 0$  alors  $f$  est décroissante sur  $\mathbb{R}_+$ .  
*Indication* : raisonner par l'absurde.
- (3) Montrer que  $f$  admet une limite en  $+\infty$ .
- (4) Établir, pour chaque valeur de  $\ell$ , quelles sont les différentes limites possibles pour  $f$  en  $+\infty$ , en illustrant chaque possibilité par un exemple.

---

*Correction 9.38*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 9.39 (Exercice 20)**

- (1) Montrer que la fonction  $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$  est convexe.  
$$x \longmapsto \ln(1 + e^x)$$
- (2) En déduire :

$$\forall x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}_+^*, \quad 1 + \left( \prod_{k=1}^n x_k \right)^{1/n} \leq \left( \prod_{k=1}^n (1 + x_k) \right)^{1/n}$$

puis :

$$\forall a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n \in \mathbb{R}_+^*, \quad \left( \prod_{k=1}^n a_k \right)^{1/n} + \left( \prod_{k=1}^n b_k \right)^{1/n} \leq \left( \prod_{k=1}^n (a_k + b_k) \right)^{1/n}.$$

---

*Correction 9.40*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 9.41 (Exercice 21)**

Soient  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $x \in [1 ; +\infty[$ .

Montrer :

$$n \left( x^{n+1/2} - x^{n-1/2} \right) \leq x^n - 1.$$

*Indication* : factoriser par  $x - 1$ .

**Exercice 9.43 (Exercice 22)**

Soient  $a, b \in \mathbb{R}$  tels que  $a < b$  et  $f \in \mathcal{C}^2([a; b], \mathbb{R})$  telle que  $f(a) = f(b) = 0$ .

- (1) Justifier que

$$M = \max_{[a; b]} |f''|$$

est bien défini.

- (2) Étudier la convexité des fonctions

$$\begin{aligned} g : [a; b] &\longrightarrow \mathbb{R} & \text{et} & & h : [a; b] &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto f(x) + M \frac{(x-a)(b-x)}{2} & & & x &\longmapsto f(x) - M \frac{(x-a)(b-x)}{2} \end{aligned}$$

- (3) En déduire :

$$\forall x \in [a; b], \quad |f(x)| \leq M \frac{(x-a)(b-x)}{2}.$$

**Exercice 9.45 (Exercice 23, inégalités de Hölder et de Minkowski)**

Soient  $p, q \in ]1; +\infty[$  tels que :

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

- (1) Montrer :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}_+, \quad xy \leq \frac{1}{p}x^p + \frac{1}{q}y^q.$$

- (2) Soient  $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n \in \mathbb{R}_+^*$  tels que  $\sum_{k=1}^n x_k^p = \sum_{k=1}^n y_k^q = 1$ .

Montrer :

$$\sum_{k=1}^n x_k y_k \leq 1.$$

- (3) En déduire l'inégalité de Hölder :

$$\forall a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n \in \mathbb{R}_+, \quad \sum_{k=1}^n a_k b_k \leq \left( \sum_{k=1}^n a_k^p \right)^{1/p} \left( \sum_{k=1}^n b_k^q \right)^{1/q}.$$

- (4) En déduire l'inégalité de Minkowski :

$$\forall a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n \in \mathbb{R}_+, \quad \left( \sum_{k=1}^n (a_k + b_k)^p \right)^{1/p} \leq \left( \sum_{k=1}^n a_k^p \right)^{1/p} + \left( \sum_{k=1}^n b_k^p \right)^{1/p}.$$

# Chapitre 10

## Polynômes, fractions rationnelles

Soit  $\mathbb{K}$  un corps.

### 10.1 Polynômes

---

#### Exercice 10.1 (Exercice 1)

On pose

$$P_1 = X^4 + 3X - 1 \quad P_2 = X^2 + 4 \quad P_3 = X + 1.$$

(1) Faire, pour tout  $(i, j) \in \{1 ; 2 ; 3\}$ , la division euclidienne de  $P_i$  par  $P_j$ .

(2) Calculer

$$P_3(P_2) \quad P_2(P_3) \quad P_2(P_1) \quad P_2'(P_1) \quad P_1'(P_3).$$

---

*Correction 10.2*

★★ À venir ★★

---

#### Exercice 10.3 (Exercice 2)

(1) Déterminer tous les polynômes  $P \in \mathbb{R}[X]$  tels que

$$P(X^3) = P^2.$$

(2) Déterminer tous les polynômes  $P \in \mathbb{R}[X]$  tels que

$$X^2 P(X^2) = P(X^3) + 2(X - 1)(X^3 + X + 1).$$



---

*Correction 10.4*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 10.5 (Exercice 3)**

(1) Déterminer les polynômes  $P$  à coefficients complexes tels que

$$P = P'P''.$$

(2) Déterminer les polynômes  $P$  à coefficients complexes tels que

$$P = P^{(1)}P^{(2)}P^{(3)}.$$

(3) Déterminer les polynômes  $P$  à coefficients complexes tels que

$$P = P^{(1)}P^{(2)}P^{(3)}P^{(4)}.$$

---

*Correction 10.6*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 10.7 (Exercice 4)**

Déterminer tous les polynômes  $P \in \mathbb{R}[X]$  tels que

$$\begin{cases} P(-1) = -17 \\ P(0) = -7 \\ P(1) = -3 \\ P(3) = 35 \end{cases}$$

*Indication* : commencer par calculer l'unique polynôme  $P \in \mathbb{R}_3[X]$  solution du système.

---

*Correction 10.8*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 10.9 (Exercice 5)**

Décomposer en produit de polynômes irréductibles dans  $\mathbb{C}[X]$  puis dans  $\mathbb{R}[X]$  les polynômes suivants :

$$P_1 = X^4 - 4 \quad P_2 = X^3 - 2X^2 + 2X \quad P_3 = X^6 + 64.$$

---

*Correction 10.10*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 10.11 (Exercice 6)**

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

Calculer

$$\prod_{\omega \in \mathbb{U}_n \setminus \{1\}} (X - \omega).$$

---

*Correction 10.12*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 10.13 (Exercice 7)**

Soit  $n \in \mathbb{N}$ .

Calculer

$$S_1 = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} \quad S_2 = \sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} \quad S_3 = \sum_{k=0}^n k^3 \binom{n}{k}.$$

---

*Correction 10.14*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 10.15 (Exercice 8, algorithme d'Euclide)**

Appliquer l'algorithme d'Euclide étendu à  $A = X^8 + X$  et  $B = X^5 + X$  pour trouver un PGCD  $D$  de  $A$  et  $B$  et des polynômes  $U$  et  $V$  tels que  $UA + VB = D$ .

*Il s'agit d'un simple exercice d'application, ne pas chercher à ruser pour aller plus vite.*

---

*Correction 10.16*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 10.17 (Exercice 9)**

Soient  $A, B \in \mathbb{R}[X]$ .

Montrer que  $A$  divise  $B$  dans  $\mathbb{R}[X]$  si, et seulement si,  $A$  divise  $B$  dans  $\mathbb{C}[X]$ .

---

*Correction 10.18*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 10.19 (Exercice 10)**

Soient  $m, n \in \mathbb{N}^*$ .

Montrer que  $X^n - 1$  divise  $X^m - 1$  dans  $\mathbb{R}[X]$  si, et seulement si,  $n$  divise  $m$  dans  $\mathbb{Z}$ .

---

*Correction 10.20*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 10.21 (Exercice 11)**

Déterminer les polynômes  $P \in \mathbb{C}[X]$  tels que  $P'$  divise  $P$ .

---

*Correction 10.22*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 10.23 (Exercice 12)**

Soit  $P \in \mathbb{K}[X]$ .

Montrer que  $P - X$  divise  $P \circ P - X$ .

---

*Correction 10.24*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 10.25 (Exercice 13, devinettes)**

Soient  $a, b, c \in \mathbb{R}$  et  $P \in \mathbb{R}[X]$ .

Quel est le reste de la division euclidienne de  $P$  par  $(X - a)(X - b)(X - c)$

(1) si  $a, b$  et  $c$  sont deux à deux distincts ?

(2) si  $a = b = c$  ?

---

*Correction 10.26*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 10.27 (Exercice 14)**

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

On pose

$$P_n = \sum_{k=0}^n \frac{X^k}{k!}$$

.

Montrer que  $P_n$  est scindé à racines simples dans  $\mathbb{C}[X]$ .

---

*Correction 10.28*

★★ À venir ★★

---

---

**Exercice 10.29 (Exercice 15)**

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

(1) Calculer  $\sum_{x \in \mathbb{U}_n} x^k$  en fonction de  $k \in \mathbb{Z}$ .

(2) Soient  $P \in \mathbb{C}[X]$  et  $M \in \mathbb{R}_+$  tels que

$$\deg P < n \quad \text{et} \quad \forall x \in \mathbb{U}_n, \quad |P(x)| \leq M.$$

Montrer que les coefficients de  $P$  sont de module majoré par  $M$ .

---

*Correction 10.30*

★★ À venir ★★

---

---

**Exercice 10.31 (Exercice 16, classique)**

Dans tout l'exercice, « scindé » signifie « scindé sur  $\mathbb{R}$  ».

Soit  $P \in \mathbb{R}[X]$ .

(1) Montrer que si  $P$  est scindé à racines simples, alors  $P'$  est scindé à racines simples.

(2) Montrer que si  $P$  est scindé, alors  $P'$  est scindé.

---

*Correction 10.32*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 10.33 (Exercice 17, suite de l'exercice précédent, moins classique)**

Soit  $P \in \mathbb{R}[X]$ .

On suppose que  $P$  s'écrit  $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$  avec

$$n \geq 3 \quad a_0 \neq 0 \quad a_n \neq 0 \quad \exists k \in \llbracket 1 ; n-2 \rrbracket, \quad a_k = a_{k+1} = 0.$$

Montrer que  $P$  n'est pas scindé sur  $\mathbb{R}$ .

---

*Correction 10.34*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 10.35 (Exercice 18)**

On pose  $P = X^3 + 3X^2 + 3X + 9$ .

- (1) Montrer que toutes les racines complexes de  $P$  sont simples.
- (2) Calculer la somme des racines complexe de  $P$ .
- (3) Calculer la somme des carrés des racines complexes de  $P$ .
- (4) Calculer la somme des cubes des racines complexes de  $P$ .

---

*Correction 10.36*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 10.37 (Exercice 19)**

On pose  $P = X^6 + 4X^5 - 3X^4 - 32X^3 - 53X^2 - 36X - 9$ .

- (1) Montrer que  $-1$  est racine de  $P$  et calculer sa multiplicité.
- (2) Déterminer les autres racines de  $P$ .

---

*Correction 10.38*

★★ À venir ★★

## 10.2 Fractions rationnelles

---

### Exercice 10.39 (Exercice 20)

Soit  $F \in \mathbb{C}(X)$ .

Montrer :

$$F = \overline{F} \iff F \in \mathbb{R}(X).$$

---

*Correction 10.40*

★★ À venir ★★

---

### Exercice 10.41 (Exercice 21)

Calculer la décomposition en éléments simples des fractions rationnelles suivantes :

(1)  $\frac{X^2 + 2X + 5}{X^2 - 3X + 2}$

(2)  $\frac{X^2 + 1}{(X - 1)(X - 2)(X - 3)}$

(3)  $\frac{4}{X^4 - 1}$  (sur  $\mathbb{C}$  puis sur  $\mathbb{R}$ )

(4)  $\frac{1}{X(X - 1)^2}$

(5)  $\frac{2X}{X^2 + 1}$  (sur  $\mathbb{C}$ )

(6)  $\frac{3X - 1}{X^2(X + 1)^2}$

---

*Correction 10.42*

★★ À venir ★★

---

### Exercice 10.43 (Exercice 22)

(1) Rappeler les lois des groupes  $\mathbb{K}(X) \setminus \{0\}$  et  $\mathbb{K}(X)$ .

(2) Montrer que  $\varphi : \mathbb{K}(X) \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{K}(X)$  est un morphisme de groupes.

$$F \longmapsto \frac{F'}{F}$$

Quel est son noyau ?

(3) Soit  $F \in \mathbb{C}(X) \setminus \{0\}$ .

Quelle est la décomposition en éléments simples de  $\frac{F'}{F}$  ? On l'exprimera en fonction des racines et pôles de  $F$ , et de leurs multiplicités respectives.

---

Correction 10.44

★★ À venir ★★

---

**Exercice 10.45 (Exercice 23)**

Soient  $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$  et  $\mu \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$ .

On pose  $P = \mu (X - \lambda_1) \dots (X - \lambda_n)$ .

Exprimer en fonction de  $P$ ,  $P'$  et  $P''$  les fractions rationnelles suivantes :

$$F = \sum_{k=1}^n \frac{1}{X - \lambda_k} \quad G = \sum_{k=1}^n \frac{1}{(X - \lambda_k)^2} \quad H = \sum_{1 \leq k < \ell \leq n} \frac{1}{(X - \lambda_k)(X - \lambda_\ell)}.$$

---

Correction 10.46

★★ À venir ★★

---

**Exercice 10.47 (Exercice 24)**

Soient  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$  tels que  $a_n \neq 0$ .

On suppose que le polynôme  $P = a_n X^n + \dots + a_0 X^0$  est scindé sur  $\mathbb{R}$ .

(1) Montrer :  $\forall x \in \mathbb{R}, P'(x)^2 - P(x)P''(x) \geq 0$ .

(2) En déduire :  $\forall k \in \llbracket 0 ; n-2 \rrbracket, a_k a_{k+2} \leq a_{k+1}^2$ .

*Indication* : utiliser l'Exercice 10.31.

---

Correction 10.48

★★ À venir ★★

---

**Exercice 10.49 (Exercice 25)**

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

On pose  $\omega = e^{\frac{2i\pi}{n}}$ .

(1) Soit  $P \in \mathbb{C}[X]$  tel que  $P(\omega X) = P$ . Montrer :

$$\exists Q \in \mathbb{C}[X], P = Q(X^n).$$

(2) En déduire la forme irréductible de la fraction rationnelle :

$$F = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{X + \omega^k}{X - \omega^k}.$$

---

**Exercice 10.51 (Exercice 26, un peu calculatoire)**

Soit  $n \in \mathbb{N}$ .

On pose :

$$A_n = \sum_{\ell=0}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} (-1)^\ell \binom{n}{2\ell+1} X^{2\ell+1} \quad B_n = \sum_{\ell=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} (-1)^\ell \binom{n}{2\ell} X^{2\ell} \quad F_n = \frac{A_n}{B_n}.$$

- (1) Soit  $\theta \in \mathbb{R}$  tel que  $\theta \not\equiv \frac{\pi}{2} [\pi]$  et  $n\theta \not\equiv \frac{\pi}{2} [\pi]$ .

Montrer :  $\tan(n\theta) = F_n(\tan \theta)$ .

*Indication* : utiliser la formule du binôme de Newton à  $(\cos \theta + i \sin \theta)^n$  pour calculer

$$\tan(n\theta) = \frac{\operatorname{Im}((\cos \theta + i \sin \theta)^n)}{\operatorname{Re}((\cos \theta + i \sin \theta)^n)}.$$

- (2) Quelle formule retrouve-t-on si  $n = 2$  ?
- (3) Quels sont les pôles de  $F_n$  ? En déduire que  $A_n$  et  $B_n$  sont premiers entre eux.
- (4) Quelle est la partie entière de  $F_n$  ? On donnera le résultat en fonction de la parité de  $n$ .
- (5) Donner la décomposition en éléments simples de  $F_n$ .



# Chapitre 11

## Intégrales sur un segment

---

### Exercice 11.1 (Exercice 1)

Soit  $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$ .

Calculer l'intégrale

$$\int_0^1 \frac{dt}{1+t^\alpha}$$

pour  $\alpha = 1$ ,  $\alpha = 2$ ,  $\alpha = 3$  et  $\alpha = 4$ .

---

*Correction 11.2*

★★ À venir ★★

---

### Exercice 11.3 (Exercice 2)

Déterminer une primitive pour chacun des fonctions suivantes (on précisera sur quel ensemble de définition) :

(1)  $f : x \mapsto \frac{1}{x^4 - x^2 - 2}$

(2)  $f : x \mapsto \frac{x}{1+x^4}$

(3)  $f : x \mapsto \frac{x^2}{1+x^3}$

(4)  $f : x \mapsto \frac{1}{x+i}$

(5)  $f = \cos^3$

(6)  $f = \tan$

(7)  $f = \text{Arctan}$

$$(8) \quad f : x \mapsto x \operatorname{Arctan} x$$

$$(9) \quad f : x \mapsto \frac{1}{\cos x}$$

$$(10) \quad f : x \mapsto \frac{\sin x}{\cos^2 x + 2}$$

$$(11) \quad f : x \mapsto x^7 \ln x$$

$$(12) \quad f : x \mapsto \ln^3 x$$

$$(13) \quad f : x \mapsto \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$(14) \quad f : x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x} + 2x}$$

$$(15) \quad f : x \mapsto \frac{1}{x \ln x}$$

$$(16) \quad f : x \mapsto \frac{1}{1 + e^x}$$

*Correction 11.4*

★★ À venir ★★

### Exercice 11.5 (Exercice 3)

On pose

$$f : x \mapsto \int_0^{\sin^2 x} \operatorname{Arcsin} \sqrt{t} \, dt + \int_0^{\cos^2 x} \operatorname{Arccos} \sqrt{t} \, dt.$$

(1) Quel est l'ensemble de définition de  $f$  ?

(2) Déterminer  $f$ .

*Correction 11.6*

★★ À venir ★★

### Exercice 11.7 (Exercice 4)

Soient  $a, b \in \mathbb{R}$  tels que  $a < b$ .

On pose :

$$f : x \mapsto \frac{1}{\sqrt{(x-a)(b-x)}}.$$

(1) Quel est l'ensemble de définition de  $f$  ?

(2) Déterminer une primitive de  $f$ .

*Indication* : faire le changement de variable

$$y = \frac{2}{b-a} \left( x - \frac{a+b}{2} \right).$$

---

*Correction 11.8*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 11.9 (Exercice 5)**

On pose

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin t}{\sin t + \cos t} dt \quad \text{et} \quad J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos t}{\sin t + \cos t} dt.$$

(1) Justifier que les intégrales  $I$  et  $J$  sont bien définies.

(2) Montrer  $I = J$  par un changement de variable.

(3) En déduire la valeur de  $I$  et  $J$ .

(4) En déduire  $\int_0^1 \frac{dt}{t + \sqrt{1-t^2}}$ .

---

*Correction 11.10*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 11.11 (Exercice 6)**

Soit  $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ .

On suppose

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f''(x) = 0.$$

Montrer :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0.$$

*Indication* : on pourra utiliser la formule de Taylor avec reste intégral.

---

**Exercice 11.13 (Exercice 7, classique à l'oral, de CCP à l'X)**

On pose

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \int_x^{x^2} \frac{dt}{\ln t} \end{aligned}$$

- (1) Vérifier que la fonction  $f$  est bien définie. Quel est son signe ?
- (2) Dresser le tableau de variations de  $f$  (en précisant les limites en  $0^+$ ,  $1^-$ ,  $1^+$  et  $+\infty$ ).  
*Indication* : pour la limite en  $1^+$ , montrer :

$$\forall x \in ]1; +\infty[, \quad \int_x^{x^2} \frac{x \, dt}{t \ln t} \leq f(x) \leq \int_x^{x^2} \frac{x^2 \, dt}{t \ln t}.$$

- (3) En déduire que  $f$  se prolonge en une fonction continue  $g : \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}$ .
- (4) Montrer que  $g$  est de classe  $\mathcal{C}^1$ .

---

**Exercice 11.15 (Exercice 8, lemme de Lebesgue)**

Soient  $a, b \in \mathbb{R}$  tels que  $a < b$  et  $f \in \mathcal{C}^1([a; b], \mathbb{C})$ .

Montrer :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) \cos(nt) \, dt = 0.$$

*Indication* : faire une intégration par parties.

---

**Exercice 11.17 (Exercice 9)**

À l'aide de la formule de Taylor avec reste intégral, montrer :

$$(1) \quad \forall x \in ]-1 ; 1], \quad \ln(1+x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1} x^k}{k}.$$

$$(2) \quad \forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \forall x \in ]-1 ; 0], \quad \ln(1+x) \leq \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1} x^k}{k}.$$

$$(3) \quad \forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \forall x \in [0 ; +\infty[, \quad \sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^{k-1} x^k}{k} \leq \ln(1+x) \leq \sum_{k=1}^{2n+1} \frac{(-1)^{k-1} x^k}{k}.$$

---

*Correction 11.18*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 11.19 (Exercice 10)**

Soit  $f : [0 ; 1] \rightarrow [0 ; 1]$  une fonction continue telle que :

$$\int_0^1 f(t) dt = \int_0^1 f(t)^2 dt.$$

Montrer que  $f$  est constante, égale à 0 ou 1.

---

*Correction 11.20*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 11.21 (Exercice 11)**

Soit une fonction continue  $f : [0 ; 1] \rightarrow \mathbb{R}$  telle que :

$$\int_0^1 f(t) dt = \frac{1}{2}.$$

Montrer que  $f$  admet un point fixe.

Donner un contre-exemple quand  $f$  n'est pas supposée continue (et seulement supposée continue par morceaux).

---

*Correction 11.22*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 11.23 (Exercice 12)**

Calculer la fonction

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^* &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \int_{\frac{1}{x}}^x \frac{t}{1+t+t^2+t^3} dt \end{aligned}$$

---

*Correction 11.24*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 11.25 (Exercice 13, Démonstration 11.40)**

Soient  $a, b \in \mathbb{R}$  tels que  $a < b$  et  $f : [a ; b] \longrightarrow \mathbb{R}$  continue.

On considère les sommes de Riemann de  $f$  :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad R_n(f) = \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right).$$

Montrer que la suite  $(R_n(f))_{n \in \mathbb{N}^*}$  converge vers l'intégrale de  $f$  sur  $[a ; b]$ .

---

*Correction 11.26*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 11.27 (Exercice 14)**

Déterminer

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^{2n} \frac{k}{n^2 + k^2}.$$

---

*Correction 11.28*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 11.29 (Exercice 15)**

Déterminer

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{k}.$$

---

*Correction 11.30*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 11.31 (Exercice 16)**

Déterminer

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{2k+1}.$$

---

*Correction 11.32*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 11.33 (Exercice 17)**

Déterminer

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sqrt[n]{\frac{(2n)!}{n!}}.$$

*Indication* : remarquer que pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , on a :

$$\prod_{k=1}^n (n+k) = n^n \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n}\right).$$

---

*Correction 11.34*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 11.35 (Exercice 18, ENSEA 2018)**

(1) À l'aide de la formule de Taylor avec reste intégral, montrer :

$$\forall x \in [0 ; 1], \quad 0 \leq e^x - 1 - x \leq \frac{e}{2} x^2.$$

(2) En déduire la limite de la suite  $(u_n)_n$  définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad u_n = \sum_{k=1}^n e^{\frac{1}{n+k}} - n.$$

---

*Correction 11.36*

★★ À venir ★★

---

# Chapitre 12

## Espaces vectoriels

### Sommaire

12.1	Espaces vectoriels . . . . .	.782
12.2	Applications linéaires . . . . .	.783
12.3	Sommes directes, projecteurs . . . . .	.786
12.4	Familles libres / génératrices . . . . .	.787

Soit  $\mathbb{K}$  un corps.

### 12.1 Espaces vectoriels

#### Exercice 12.1 (Exercice 1)

Les ensembles suivants sont-ils (naturellement) des  $\mathbb{R}$ -espaces vectoriels ?

- (1)  $\{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 \mid a + 2b - c - d = \lambda\}$  où  $\lambda$  est un réel fixé.
- (2)  $\{y \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid y'' + 2y' + fy = g\}$  où  $f$  et  $g$  sont deux fonctions fixées.
- (3)  $\{y \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid y \text{ est croissante sur } \mathbb{R}\}$ .
- (4)  $\{y \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid y \text{ est monotone sur } \mathbb{R}\}$ .

*Correction 12.2*

★★ À venir ★★

#### Exercice 12.3 (Exercice 2, Mines-Telecom PSI 2016)

Soient  $E$  un espace vectoriel et  $F$  et  $G$  deux sous-espaces vectoriels de  $E$ .

Montrer :

$$F \cup G \text{ est un sous-espace vectoriel de } E \iff \begin{cases} F \subseteq G \\ \text{ou} \\ G \subseteq F \end{cases}$$



## 12.2 Applications linéaires

---

### Exercice 12.5 (Exercice 3)

Les applications suivantes sont-elles des applications linéaires (pour les structures naturelles d'espaces vectoriels) ?

$$\begin{array}{lll} u_1 : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} & u_2 : \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R} \times \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R}) & u_3 : \mathbb{R}[X] \longrightarrow \mathbb{R}[X] \\ x \longmapsto x^2 & f \longmapsto (f'(1), f'') & P \longmapsto P(X^2) \end{array}$$

### Exercice 12.7 (Exercice 4)

On note  $B$  l'ensemble des suites réelles bornées et  $C$  l'ensemble des suites réelles convergentes.

(1) Montrer que  $B$  et  $C$  sont naturellement des  $\mathbb{R}$ -espaces vectoriels.

(2) L'application

$$\begin{array}{lll} u : B & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ (u_n)_{n \in \mathbb{N}} & \longmapsto & \sup_{n \in \mathbb{N}} u_n \end{array}$$

est-elle une forme linéaire ?

(3) L'application

$$\begin{array}{lll} v : C & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ (u_n)_{n \in \mathbb{N}} & \longmapsto & \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \end{array}$$

est-elle une forme linéaire ?

---

**Exercice 12.9 (Exercice 5)**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $u, v \in \mathcal{L}(E)$ .

On suppose que les endomorphismes  $u$  et  $v$  commutent.

Montrer que  $u$  stabilise  $\ker v$  et  $\operatorname{Im} v$ , c'est-à-dire :

$$u(\ker v) \subseteq \ker v \quad \text{et} \quad u(\operatorname{Im} v) \subseteq \operatorname{Im} v.$$

---

*Correction 12.10*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 12.11 (Exercice 6, résultats à bien connaître)**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $u, v \in \mathcal{L}(E)$ .

(1) Montrer :

$$v \circ u = 0 \iff \operatorname{Im} u \subseteq \ker v.$$

(2) Donner les inclusions qui sont vraies entre les sous-espaces vectoriels de  $E$  suivants :

(a)  $\operatorname{Im}(v \circ u)$  et  $\operatorname{Im} v$ .

(b)  $\ker(v \circ u)$  et  $\ker u$ .

(c)  $\operatorname{Im}(u + v)$  et  $\operatorname{Im} u + \operatorname{Im} v$ .

(d)  $\ker(u + v)$  et  $\ker u \cap \ker v$ .

(3) Que peut-on en déduire pour les suites de sous-espaces vectoriels de  $E$  :

$$\left(\operatorname{Im} u^k\right)_{k \in \mathbb{N}} \quad \text{et} \quad \left(\ker u^k\right)_{k \in \mathbb{N}} ?$$

---

*Correction 12.12*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 12.13 (Exercice 7, classique)**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $u \in \mathcal{L}(E)$ .

On suppose que pour tout vecteur  $x \in E$ , le vecteur  $u(x)$  est colinéaire à  $x$ .

(1) Justifier que  $u$  vérifie :

$$\forall x \in E, \exists \lambda_x \in \mathbb{K}, u(x) = \lambda_x x.$$

(2) Montrer que  $u$  est une homothétie.

---

*Correction 12.14*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 12.15 (Exercice 8, Arts & Métiers PSI 2016)**

On pose

$$E = \{f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid \forall x \in \mathbb{R}, f(x + 2\pi) = f(x)\} \quad \text{et} \quad \forall f \in E, u(f) = f''.$$

- (1) Montrer que  $E$  est un espace vectoriel et que  $u \in \mathcal{L}(E)$ .
- (2) Déterminer  $\ker u$ .
- (3) Déterminer les vecteurs  $f \in E$  tels que  $u(f) = \sin$  et les vecteurs  $f \in E$  tels que  $u(f) = \sin^2$ .
- (4) Déterminer  $\operatorname{Im} u$ .
- (5) Montrer  $\ker u \oplus \operatorname{Im} u = E$ .

---

*Correction 12.16*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 12.17 (Exercice 9)**

Soient  $E, F$  et  $G$  des  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et  $f : E \longrightarrow F$  et  $g : F \longrightarrow G$  des applications linéaires.

- (1) Montrer :

$$f(\ker(g \circ f)) = \operatorname{Im} f \cap \ker g.$$

- (2) Montrer :

$$\ker(g \circ f) = \ker f \iff \operatorname{Im} f \cap \ker g = \{0_F\}.$$

---

*Correction 12.18*

★★ À venir ★★

## 12.3 Sommes directes, projecteurs

---

### Exercice 12.19 (Exercice 10)

Soient  $E$  un espace vectoriel et  $p, q \in \mathcal{L}(E)$  des projecteurs.

Montrer que les propositions suivantes sont équivalentes :

(1)  $p + q$  est un projecteur

(2)  $pq + qp = 0$

(3)  $pq = qp = 0$

---

*Correction 12.20*

★★ À venir ★★

---

### Exercice 12.21 (Exercice 11)

Soient  $E$  un espace vectoriel et  $f, g \in \mathcal{L}(E)$  tels que  $f \circ g = \text{id}_E$ .

Montrer que  $g \circ f$  est un projecteur. Déterminer son image et son noyau.

---

*Correction 12.22*

★★ À venir ★★

---

### Exercice 12.23 (Exercice 12)

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $p$  et  $q$  des projecteurs de  $E$  qui commutent.

(1) Montrer que  $pq$  est un projecteur.

(2) Montrer  $\text{Im}(pq) = \text{Im } p \cap \text{Im } q$ .

(3) Montrer  $\ker(pq) = \ker p + \ker q$ .

---

*Correction 12.24*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 12.25 (Exercice 13, polynômes interpolateurs de Lagrange)**

Soient  $x_0, \dots, x_n \in \mathbb{K}$  deux à deux distincts.

On note  $L_0, \dots, L_n \in \mathbb{K}_n[X]$  les polynômes définis par :

$$\forall j \in \llbracket 0 ; n \rrbracket, \quad L_j = \prod_{k \in \llbracket 0 ; n \rrbracket \setminus \{j\}} \frac{X - x_k}{x_j - x_k}.$$

(1) Montrer que  $(L_0, \dots, L_n)$  est une base de  $\mathbb{K}_n[X]$ .

(2) Montrer que l'application

$$\begin{array}{ccc} u : \mathbb{K}[X] & \longrightarrow & \mathbb{K}[X] \\ P & \longmapsto & P(x_0) L_0 + \dots + P(x_n) L_n \end{array}$$

est un projecteur.

(3) Déterminer l'image et le noyau de  $u$ .

---

*Correction 12.26*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 12.27 (Exercice 14)**

Donner un supplémentaire de  $\mathbb{K}[X]$  dans  $\mathbb{K}(X)$ .

---

*Correction 12.28*

★★ À venir ★★

## 12.4 Familles libres / génératrices

---

**Exercice 12.29 (Exercice 15)**

On considère le système linéaire homogène :

$$(S) \begin{cases} a + ib + c + id = 0 \\ ia - b + ic - d = 0 \\ (1 - i)a + (1 + i)b + (1 + i)c - (1 - i)d = 0 \end{cases}$$

On note  $\mathcal{S} \subseteq \mathbb{C}^4$  son ensemble solution.

C'est un  $\mathbb{C}$ -espace vectoriel et donc également un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

- (1) Donner une base du  $\mathbb{C}$ -espace vectoriel  $\mathcal{S}$ .
- (2) Donner une base du  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel  $\mathcal{S}$ .

*Correction 12.30*

★★ À venir ★★

### Exercice 12.31 (Exercice 16)

On pose

$$\forall \lambda \in \mathbb{R}, \quad \begin{array}{ccc} f_\lambda : & \mathbb{R} & \longrightarrow \mathbb{R} \\ & t & \longmapsto e^{\lambda t} \end{array}$$

On considère la famille  $\mathcal{F} = (f_\lambda)_{\lambda \in \mathbb{R}}$  de vecteurs de  $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ .

- (1) La famille  $\mathcal{F}$  est-elle une base de  $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  ?
- (2) La famille  $\mathcal{F}$  est-elle une base de  $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  ?
- (3) Montrer que la famille  $\mathcal{F}$  n'est pas libre
  - (a) en utilisant des limites en  $+\infty$ .
  - (b) en utilisant des polynômes interpolateurs de Lagrange.

*Correction 12.32*

★★ À venir ★★

### Exercice 12.33 (Exercice 17)

On se place dans le  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel  $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ .

On définit les vecteurs suivants :

$$\forall \lambda \in \mathbb{R}, \quad \begin{array}{ccc} f_\lambda : & \mathbb{R} & \longrightarrow \mathbb{R} \\ & t & \longmapsto \sin(\lambda t) \end{array}$$

Les familles suivantes sont-elles libres ?

- (1)  $(f_\lambda)_{\lambda \in \mathbb{R}}$
- (2)  $(f_\lambda)_{\lambda \in \mathbb{R}^*}$
- (3)  $(f_\lambda)_{\lambda \in \mathbb{R}_+^*}$

---

Correction 12.34

★★ À venir ★★

---

**Exercice 12.35 (Exercice 18)**

Donner une base de l'image et du noyau des endomorphismes suivants :

(1)

$$\begin{aligned} u : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (a, b, c) &\longmapsto (a - b, b - c, c - a) \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} u : \mathbb{R}_3[X] &\longrightarrow \mathbb{R}_3[X] \\ P &\longmapsto P(X + 1) - P \end{aligned}$$

---

Correction 12.36

★★ À venir ★★

---

**Exercice 12.37 (Exercice 19, base duale)**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  une base de  $E$ .

Pour tout  $k \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$ , on note  $e_k^* : E \longrightarrow \mathbb{K}$  l'application qui associe à tout vecteur de  $E$  sa  $k$ -ème coordonnée dans la base  $\mathcal{B}$ .

Les applications  $e_1^*, \dots, e_n^*$  sont donc caractérisées par :

$$\forall x \in E, \quad x = \sum_{k=1}^n e_k^*(x) e_k.$$

Montrer que la famille  $\mathcal{B}^* = (e_1^*, \dots, e_n^*)$  est une base de  $E^*$  (appelée base duale de  $\mathcal{B}$ ).

---

Correction 12.38

★★ À venir ★★

---

**Exercice 12.39 (Exercice 20)**

Montrer que la famille infinie  $(\ln p)_{p \in \mathbb{P}}$  est une famille libre du  $\mathbb{Q}$ -espace vectoriel  $\mathbb{R}$ .

---

*Correction 12.40*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 12.41 (Exercice 21)**

On se place dans le  $\mathbb{Q}$ -espace vectoriel  $\mathbb{R}$ .

- (1) Soit  $p \in \mathbb{P}$ . Montrer que la famille  $(1, \sqrt{p})$  est libre sur  $\mathbb{Q}$ .
  - (2) En déduire que la famille  $(1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6})$  est libre sur  $\mathbb{Q}$ .
- 

*Correction 12.42*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 12.43 (Exercice 22)**

Résoudre les systèmes linéaires suivants en appliquant l'algorithme du pivot de Gauss.

Lorsque l'ensemble solution est un espace affine, on précisera une base de sa direction.

$$(S_1) \begin{cases} a + b + 2c + d = 7 \\ 4a + 5b + 3c + 4d = 17 \\ a + 2b - 3c + d = -4 \end{cases} \quad (S_2) \begin{cases} a + b + 2c = 7 \\ 4a + 5b + 3c = 17 \\ a + 2b - 3c = 7 \end{cases}$$

---

*Correction 12.44*

★★ À venir ★★

---



# Chapitre 13

## Équations différentielles

### 13.1 Équations différentielles linéaires d'ordre 1

---

#### Exercice 13.1 (Exercice 1)

Résoudre l'équation différentielle :

$$(E) \quad y' + y = \sin t.$$

---

*Correction 13.2*

★★ À venir ★★

---

#### Exercice 13.3 (Exercice 2)

Résoudre l'équation différentielle :

$$(E) \quad y' + \frac{\sin t}{\cos t - 2} y = \frac{2 \sin t}{\cos t - 2}.$$

---

*Correction 13.4*

★★ À venir ★★

---

#### Exercice 13.5 (Exercice 3)

Résoudre le problème de Cauchy :

$$\begin{cases} y' - \frac{t^3 + t + 1}{t^2 + 1} y = \frac{t^4 + t - 1}{t^2 + 1} \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

---

*Correction 13.6*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 13.7 (Exercice 4)**

Résoudre l'équation différentielle suivante sur l'intervalle  $]0 ; 1[$  :

$$(E) \quad t \ln t y' - y = 2t^2 \ln^2 t.$$

---

*Correction 13.8*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 13.9 (Exercice 5)**

Résoudre l'équation différentielle suivante sur l'intervalle  $] -1 ; 1[$  :

$$(E) \quad \sqrt{1 - t^2} y' - y = 1.$$

---

*Correction 13.10*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 13.11 (Exercice 6)**

On considère l'équation différentielle :

$$(E) \quad t y' + y = \cos t.$$

- (1) Déterminer les solutions de  $(E)$  sur  $\mathbb{R}_+^*$  (respectivement  $\mathbb{R}_-^*$ ).
  - (2) En déduire les solutions définies sur  $\mathbb{R}$ .
- 

*Correction 13.12 (1)*

On pose  $I = \mathbb{R}_+^*$  ou  $\mathbb{R}_-^*$ .

Résolvons  $(E)$  sur  $I$ .

Résolvons  $(E_0) \quad y' + \frac{1}{t}y = 0$ .

Une primitive de  $t \mapsto \frac{1}{t}$  est  $t \mapsto \ln |t|$ .

Donc les solutions de  $(E_0)$  sont les fonctions de la forme  $t \mapsto \lambda e^{-\ln|t|} = \frac{\lambda}{|t|}$  avec  $\lambda \in \mathbb{R}$ , c'est-à-dire de la forme :

$$t \mapsto \frac{\lambda}{t}$$

avec  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

Déterminons une solution de  $(E)$ .

Soit  $\lambda \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$ .

On pose  $y_1 : t \mapsto \frac{\lambda(t)}{t} = \lambda(t) t^{-1}$ .

On a :

$$\begin{aligned} y_1 \text{ est solution de } (E) &\iff \forall t \in I, \quad t \left( \lambda'(t) t^{-1} - \lambda(t) t^{-2} \right) + \lambda(t) t^{-1} = \cos t \\ &\iff \forall t \in I, \quad \lambda'(t) = \cos t \\ &\iff \lambda = \sin. \end{aligned}$$

Donc  $y_1 : t \mapsto \frac{\sin t}{t}$  est solution de  $(E)$ .

Finalement, les solutions de  $(E)$  sur  $I$  sont les fonctions de la forme :

$$t \mapsto \frac{\lambda}{t} + \frac{\sin t}{t} = \frac{\lambda + \sin t}{t}$$

où  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ .

*Correction 13.13 (2)*

analyse

Soit  $y \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  telle que  $\forall t \in \mathbb{R}, \quad ty'(t) + y(t) = \cos t$ .

Comme  $y$  est solution de  $(E)$  sur  $\mathbb{R}_+^*$ , il existe  $\lambda \in \mathbb{R}$  tel que

$$\forall t \in \mathbb{R}_+^*, \quad y(t) = \frac{\lambda}{t} + \frac{\sin t}{t}.$$

Comme  $y$  est solution de  $(E)$  sur  $\mathbb{R}_-^*$ , il existe  $\mu \in \mathbb{R}$  tel que

$$\forall t \in \mathbb{R}_-^*, \quad y(t) = \frac{\mu}{t} + \frac{\sin t}{t}.$$

De plus, en  $t = 0$ , on a  $0 + y(0) = 1$ .

D'où :

$$y : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ t \longmapsto \begin{cases} \frac{\lambda}{t} + \frac{\sin t}{t} & \text{si } t > 0 \\ \frac{\mu}{t} + \frac{\sin t}{t} & \text{si } t < 0 \\ 1 & \text{si } t = 0 \end{cases}$$

Comme  $y$  est continue en  $0$ , on a  $\lim_{0^+} y = 1$ .

$$\text{Or } \lim_{0^+} y = \begin{cases} +\infty & \text{si } \lambda > 0 \\ -\infty & \text{si } \lambda < 0 \\ 1 & \text{si } \lambda = 0 \end{cases}$$

Donc  $\lambda = 0$ .

De même, comme  $\lim_{0^-} y = 1$ , on a  $\mu = 0$ .

Donc :

$$\begin{aligned} y : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ t &\longmapsto \begin{cases} \frac{\sin t}{t} & \text{si } t \neq 0 \\ 1 & \text{sinon} \end{cases} \end{aligned}$$

synthèse

$$\text{Posons } y : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ t \longmapsto \begin{cases} \frac{\sin t}{t} & \text{si } t \neq 0 \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$$

On a  $y \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  selon le théorème de la limite de la dérivée et  $y$  est solution de  $(E)$ .

conclusion

La fonction

$$\begin{aligned} y : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ t &\longmapsto \begin{cases} \frac{\sin t}{t} & \text{si } t \neq 0 \\ 1 & \text{sinon} \end{cases} \end{aligned}$$

est l'unique solution de  $(E)$ .

### Exercice 13.14 (Exercice 7, Mines MP 2006)

Résoudre l'équation différentielle suivante sur l'intervalle  $]0 ; +\infty[$  :

$$(E) \quad t \ln t y' - (3 \ln t + 1) y = 0.$$

*Correction 13.15*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 13.16 (Exercice 8)**

Trouver les solutions réelles sur  $\mathbb{R}$  à l'équation différentielle :

$$(E) \quad ty' - (2t + 1)y = 2t + 1.$$

Quelles sont les solutions vérifiant  $y(0) = 0$  ? celles vérifiant  $y(0) = -1$  ?

---

*Correction 13.17*

★★ À venir ★★

## 13.2 Équations différentielles linéaires d'ordre 2

---

**Exercice 13.18 (Exercice 9)**

Résoudre les équations différentielles suivantes :

(1)  $y'' - 2y' + y = e^{3t} + 3te^t$

(2)  $y'' + 4y' - 5y = \operatorname{sh} t$

(3)  $y'' + 4y = t \sin t.$

---

*Correction 13.19*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 13.20 (Exercice 10)**

Résoudre sur l'intervalle  $\mathbb{R}_+^*$  l'équation différentielle :

$$(E) \quad t^2 y'' + 3ty' + y = (t + 1)^2$$

en faisant le changement de variable  $s = \ln t$ .

---

*Correction 13.21*

---

*Brouillon*

On a  $s = \ln t \iff t = e^s$  et  $y(t) = y(e^s) = z(s) = z(\ln t)$ .

---

Soit  $y \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$ .

On pose  $z : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$   
 $s \longmapsto y(e^s)$

$$\text{On a } \forall t \in \mathbb{R}_+, \begin{cases} y(t) = z(\ln t) \\ y'(t) = \frac{1}{t} z'(\ln t) \\ y''(t) = \frac{1}{t^2} z''(t) - \frac{1}{t^2} z'(\ln t) \end{cases}$$

Donc :

$$\begin{aligned} y \text{ est solution de } (E) &\iff \forall t \in \mathbb{R}_+, t^2 y''(t) + 3ty'(t) + y(t) = (t+1)^2 \\ &\iff \forall t \in \mathbb{R}_+, z''(\ln t) - z'(\ln t) + 3z'(\ln t) + z(\ln t) = (t+1)^2 \\ &\iff \forall s \in \mathbb{R}, z''(s) + 2z'(s) + z(s) = (e^s + 1)^2 \\ &\iff z \text{ est solution de } (E') \quad z'' + 2z' + z = (e^s + 1)^2. \end{aligned}$$

Réolvons  $(E')$ .

Réolvons  $(E'_0) \quad z'' + 2z' + z = 0$ .

L'équation caractéristique  $x^2 + 2x + 1$  admet  $-1$  comme solution double.

Donc les solutions de  $(E'_0)$  sont les fonctions de la forme  $z_0 : s \longmapsto (\lambda s + \mu) e^{-t}$  avec  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ .

Déterminons une solution de  $(E')$ .

On pose :

$$(E'_1) \quad y'' + 2y' + y = e^{2s} \quad (E'_2) \quad y'' + 2y' + y = e^s \quad (E'_3) \quad y'' + 2y' + y = 1.$$

Déterminons une solution de  $(E'_1)$ .

*Brouillon*  
 On a  $P(s) e^{\gamma s}$  avec  $\begin{cases} P = 1 \text{ donc } \deg P = 0 \\ \gamma = 2 \end{cases}$

Donc on cherche une solution de la forme  $Q(s) e^{\gamma s}$  avec  $\deg Q = 0$ , c'est-à-dire de la forme  $ae^{2s}$ .

Soit  $a \in \mathbb{R}$ .

On pose  $z_1 : s \longmapsto ae^{2s}$ .

$$\text{On a } \forall s \in \mathbb{R}, \begin{cases} z'_1(s) = 2ae^{2s} \\ z''_1(s) = 4ae^{2s} \end{cases}$$

Donc

$$\begin{aligned} z_1 \text{ est solution de } (E'_1) &\iff \forall s \in \mathbb{R}, 4ae^{2s} + 4ae^{2s} + ae^{2s} = e^{2s} \\ &\iff \forall s \in \mathbb{R}, 9ae^{2s} = e^{2s} \\ &\iff a = \frac{1}{9}. \end{aligned}$$

Donc  $z_1 : s \mapsto \frac{1}{9}e^{2s}$  est solution de  $(E'_1)$ .

Déterminons une solution de  $(E'_2)$ .

Soit  $a \in \mathbb{R}$ .

On pose  $z_2 : s \mapsto ae^s$ .

On a :

$$\begin{aligned} z_2 \text{ est solution de } (E'_2) &\iff ae^s + 2ae^s + ae^s = e^s \\ &\iff a = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

Donc  $z_2 : s \mapsto \frac{1}{4}e^s$  est solution de  $(E'_2)$ .

On remarque que  $z_3 : s \mapsto 1$  est solution de  $(E'_3)$ .

Donc  $z : s \mapsto \frac{1}{9}e^{2s} + \frac{1}{2}e^s + 1$  est solution de  $(E')$  selon le principe de superposition.

Ainsi, les solutions de  $(E')$  sont les fonctions de la forme

$$s \mapsto (\lambda s + \mu) e^{-s} + \frac{1}{9}e^{2s} + \frac{1}{2}e^s + 1$$

avec  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ .

Finalement :

$$\begin{aligned} y \text{ est solution de } (E) &\iff \exists \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \forall s \in \mathbb{R}, z(s) = (\lambda s + \mu) e^{-s} + \frac{1}{9}e^{2s} + \frac{1}{2}e^s + 1 \\ &\iff \exists \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \forall t \in \mathbb{R}_+, z(\ln t) = (\lambda \ln t + \mu) e^{-\ln t} + \frac{1}{9}e^{2\ln t} + \frac{1}{2}e^{\ln t} + 1 \\ &\iff \exists \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \forall t \in \mathbb{R}_+, y(t) = \frac{\lambda \ln t + \mu}{t} + \frac{1}{9}t^2 + \frac{1}{2}t + 1. \end{aligned}$$

---

### Exercice 13.22 (Exercice 11)

Résoudre l'équation différentielle :

$$(E) \quad (1+t^2)^2 y'' + 2t(1+t^2)y' + y = \operatorname{Arctan} t$$

en faisant le changement de variable  $x = \operatorname{Arctan} t$ .

---

*Correction 13.23*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 13.24 (Exercice 12)**

Résoudre sur l'intervalle  $\mathbb{R}_+^*$  l'équation différentielle :

$$(E) \quad t^2 y'' + t y' - y = t^2$$

en faisant le changement de variable  $x = \ln t$ .

---

*Correction 13.25*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 13.26 (Exercice 13, Mines-Ponts PSI 2017)**

Soit  $a$  un réel non-nul.

Résoudre

$$(E) \quad (1+x^2)^2 y'' + 2x(1+x^2) y' + a^2 y = 0$$

en faisant le changement de variable  $\theta = \operatorname{Arctan} x$ .

---

*Correction 13.27*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 13.28 (Exercice 14)**

Résoudre sur  $\mathbb{R}$  l'équation différentielle réelle :

$$(E) \quad t y'' + 2(t+1) y' + (t+2) y = 0.$$

*Indication* : on pourra considérer la fonction  $z : t \mapsto t y(t)$ .

---

*Correction 13.29*

★★ À venir ★★



## 13.3 Applications

---

### Exercice 13.30 (Exercice 15)

Résoudre<sup>1</sup> de deux façons le système linéaire :

$$(E) \quad \begin{cases} y_1' = -y_2 \\ y_2' = y_1 \end{cases}$$

- (1) À l'aide d'une équation différentielle d'ordre 1 vérifiée par la fonction complexe  $y_1 + iy_2$ .
  - (2) À l'aide d'une équation différentielle d'ordre 2 vérifiée par la fonction réelle  $y_1$ .
- 

*Correction 13.31*

★★ À venir ★★

---

### Exercice 13.32 (Exercice 16)

Résoudre le système linéaire :

$$(E) \quad \begin{cases} y_1' = 2y_1 - y_2 + \cos t \\ y_2' = y_1 + 2y_2 + \sin t \end{cases}$$

---

*Correction 13.33*

★★ À venir ★★

---

### Exercice 13.34 (Exercice 17)

Si  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  est une fonction dérivable, on note  $\mathcal{P}(f)$  la propriété :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f'(x) = 2f(-x) + x.$$

- (1) Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction dérivable. Montrer que si  $\mathcal{P}(f)$  est vraie, alors  $f$  est deux fois dérivable et satisfait une certaine équation différentielle linéaire d'ordre 2.
  - (2) Résoudre l'équation différentielle obtenue.
  - (3) Déterminer l'ensemble des fonctions dérivables  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  telles que  $\mathcal{P}(f)$  soit vraie.
- 

*Correction 13.35*

★★ À venir ★★

---

1. C'est-à-dire déterminer les couples  $(y_1, y_2) \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})^2$  qui sont solution

# Chapitre 14

## Espaces vectoriels en dimension finie

---

### Exercice 14.1 (Exercice 1)

Si  $p \in \mathbb{N}^*$ , on note  $E_p$  l'espace vectoriel des suites  $p$ -périodiques d'éléments de  $\mathbb{K}$  :

$$E_p = \{(x_n)_n \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} \mid \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+p} = u_n\}.$$

On note  $E$  l'espace vectoriel des suites périodiques d'éléments de  $\mathbb{K}$  :

$$E = \{(x_n)_n \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} \mid \exists p \in \mathbb{N}^*, \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+p} = u_n\}.$$

- (1) Soit  $p \in \mathbb{N}^*$ . Quelle est la dimension de  $E_p$  ?
- (2) Quelle est la dimension de  $E$  ?

---

*Correction 14.2*

★★ À venir ★★

---

### Exercice 14.3 (Exercice 2, TPE MP 2018)

On pose :

$$E = \left\{ P \in \mathbb{C}[X] \mid (X^4 + 1)P = P(X^2) \right\}.$$

- (1) Montrer que  $E$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{C}[X]$ .
- (2) Si  $P \in E \setminus \{0\}$ , déterminer le degré de  $P$ .
- (3) Donner un polynôme non-nul appartenant à  $E$ .
- (4) Déterminer la dimension de  $E$ .

---

Correction 14.4

★★ À venir ★★

---

**Exercice 14.5 (Exercice 3, relations de récurrence d'ordre 2)**

Soient  $a, b, c \in \mathbb{C}$  tels que  $a \neq 0$ .

On note  $E$  le  $\mathbb{C}$ -espace vectoriel des suites  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$  à coefficients dans  $\mathbb{C}$  vérifiant la relation de récurrence linéaire homogène d'ordre 2 à coefficients constants suivant :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad au_{n+2} + bu_{n+1} + cu_n = 0.$$

(1) Montrer que l'application

$$\begin{aligned} \varphi : \quad E &\longrightarrow \mathbb{C}^2 \\ (u_n)_n &\longmapsto (u_0, u_1) \end{aligned}$$

est un isomorphisme d'espaces vectoriels.

(2) Quelle est la dimension de  $E$  ?

(3) En déduire le théorème suivant (à retenir) :

- Si le polynôme  $aX^2 + bX + c$  admet deux racines distinctes  $x, y \in \mathbb{C}$ , alors  $E$  est l'ensemble des suites de la forme :

$$(\lambda x^n + \mu y^n)_{n \in \mathbb{N}}$$

où  $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$ .

- Si le polynôme  $aX^2 + bX + c$  admet une racine double  $x \in \mathbb{C}$ , alors  $E$  est l'ensemble des suites de la forme :

$$((\lambda n + \mu) x^n)_{n \in \mathbb{N}}$$

où  $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$ .

---

Correction 14.6

★★ À venir ★★

---

**Exercice 14.7 (Exercice 4)**

Donner un exemple d'espace vectoriel  $E$  et d'endomorphisme  $u \in \mathcal{L}(E)$  tels que  $u$  soit inversible à droite mais pas à gauche (dans l'anneau  $(\mathcal{L}(E), +, \circ)$ ).

---

Correction 14.8

★★ À venir ★★

---

**Exercice 14.9 (Exercice 5)**

Soient  $E$  et  $F$  deux  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie.

- (1) Montrer qu'il existe une application linéaire injective  $u : E \longrightarrow F$  si, et seulement si,  $\dim E \leq \dim F$ .
- (2) Montrer qu'il existe une application linéaire surjective  $u : E \longrightarrow F$  si, et seulement si,  $\dim E \geq \dim F$ .
- (3) Montrer qu'il existe un isomorphisme (d'espaces vectoriels)  $u : E \longrightarrow F$  si, et seulement si,  $\dim E = \dim F$ .

---

*Correction 14.10*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 14.11 (Exercice 6, endomorphismes de rang 1)**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $u \in \mathcal{L}(E)$ .

- (1) Justifier que l'endomorphisme  $u$  est de rang 1 si, et seulement si, il s'écrit :

$$\begin{aligned} u : E &\longrightarrow E \\ x &\longmapsto \ell(x) a \end{aligned}$$

où  $a$  est un vecteur non-nul de  $E$  et  $\ell \in E^*$  est une forme linéaire non-nulle.

On suppose désormais que  $u$  est de rang 1.

- (2) Montrer :  $\exists \lambda \in \mathbb{K}, u^2 = \lambda u$ .
- (3) Montrer que les trois propositions suivantes sont équivalentes :
  - (a)  $\exists \lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\}, \lambda u$  est un projecteur
  - (b)  $E = \ker u \oplus \operatorname{Im} u$
  - (c)  $u^2 \neq 0$ .

---

*Correction 14.12*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 14.13 (Exercice 7)**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $u \in \mathcal{L}(E)$ .

On suppose :

$$\dim E = 3 \quad \text{et} \quad u^2 = 0.$$

Montrer :  $\operatorname{rg} u \leq 1$ .

---

*Correction 14.14*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 14.15 (Exercice 8)**

Soient  $E$  un espace vectoriel de dimension finie et  $u, v \in \mathcal{L}(E)$ .

Montrer :

$$|\operatorname{rg} u - \operatorname{rg} v| \leq \operatorname{rg}(u + v) \leq \operatorname{rg} u + \operatorname{rg} v.$$

---

*Correction 14.16*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 14.17 (Exercice 9)**

Soient  $E$  un espace vectoriel de dimension finie et  $u, v \in \mathcal{L}(E)$ .

Montrer :

$$\operatorname{rg}(uv) \leq \min \{\operatorname{rg} u ; \operatorname{rg} v\}.$$

---

*Correction 14.18*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 14.19 (Exercice 10)**

Soient  $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3)$  et  $v \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^2)$ .

On suppose que  $u \circ v$  est un projecteur de rang 2 de  $\mathbb{R}^3$ .

Montrer que  $v$  est une surjection et que  $u$  est une injection puis que  $v \circ u = \operatorname{id}_{\mathbb{R}^2}$ .

---

Correction 14.20

★★ À venir ★★

---

**Exercice 14.21 (Exercice 11)**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et  $u, v \in \mathcal{L}(E)$ .

Montrer l'équivalence :

$$\ker u = \operatorname{Im} u \iff \begin{cases} u^2 = 0 \\ \dim E = 2 \operatorname{rg} u \end{cases}$$

---

Correction 14.22

★★ À venir ★★

---

**Exercice 14.23 (Exercice 12, formule de Grassmann)**

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $F$  et  $G$  deux sous-espaces vectoriels de  $E$  de dimension finie.

- (1) Montrer qu'il existe  $a, b, c \in \mathbb{N}$  et une base de  $F + G$  :

$$(e_1, \dots, e_a, e'_1, \dots, e'_b, e''_1, \dots, e''_c)$$

tels que

$$\begin{cases} F \cap G = \operatorname{Vect}(e_1, \dots, e_a) \\ F = \operatorname{Vect}(e_1, \dots, e_a, e'_1, \dots, e'_b) \\ G = \operatorname{Vect}(e_1, \dots, e_a, e''_1, \dots, e''_c) \end{cases}$$

- (2) En déduire une nouvelle démonstration de la formule de Grassmann.

---

Correction 14.24

★★ À venir ★★

---

**Exercice 14.25 (Exercice 13, Centrale 2008 (extrait))**

Soient  $E$  et  $F$  deux espaces vectoriels de dimension finie,  $f \in \mathcal{L}(E, F)$  et  $G$  un sous-espace vectoriel de  $F$ .

Montrer :

$$\dim f^{-1}(G) = \dim E - \operatorname{rg} f + \dim (\operatorname{Im} f \cap G).$$

---

Correction 14.26

★★ À venir ★★

---

**Exercice 14.27 (Exercice 14)**

Soient  $E$  un espace vectoriel de dimension finie et  $u, v \in \mathcal{L}(E)$ .

Montrer :

$$\operatorname{rg}(u + v) = \operatorname{rg} u + \operatorname{rg} v \iff \begin{cases} \operatorname{Im} u \cap \operatorname{Im} v = \{0_E\} \\ \ker u + \ker v = E \end{cases}$$

---

Correction 14.28

★★ À venir ★★

---

**Exercice 14.29 (Exercice 15)**

Soient  $E$  un espace vectoriel de dimension finie et  $\ell_1, \dots, \ell_m \in E^*$ .

On considère l'application :

$$\begin{aligned} \varphi : E &\longrightarrow \mathbb{K}^m \\ x &\longmapsto (\ell_1(x), \dots, \ell_m(x)) \end{aligned}$$

(1) Montrer que la famille  $(\ell_1, \dots, \ell_m)$  est une famille libre si, et seulement si, l'application  $\varphi$  est surjective.

(2) Montrer :

$$\operatorname{rg} \varphi = \operatorname{rg} (\ell_1, \dots, \ell_m).$$

*Indication* : considérer une base  $(\ell_{i_1}, \dots, \ell_{i_r})$  de  $\operatorname{Vect}(\ell_1, \dots, \ell_m)$ .

(3) En déduire que la famille  $(\ell_1, \dots, \ell_m)$  engendre  $E^*$  si, et seulement si, l'application  $\varphi$  est injective.

---

Correction 14.30

★★ À venir ★★

---

**Exercice 14.31 (Exercice 16)**

Soient  $E$  un espace vectoriel de dimension finie et  $u \in \mathcal{L}(E)$ .

Montrer que les propositions suivantes sont équivalentes :

(1)  $\operatorname{Im} u^2 = \operatorname{Im} u$

(2)  $\ker u^2 = \ker u$

(3)  $E = \ker u \oplus \operatorname{Im} u$ .

---

*Correction 14.32*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 14.33 (Exercice 17)**

Soient  $E$  un espace vectoriel de dimension finie et  $u, v \in \mathcal{L}(E)$ .

On suppose :

$$u \circ v = 0 \quad \text{et} \quad u + v \in \text{GL}(E).$$

Montrer :

$$\text{rg } u + \text{rg } v = \dim E \quad \text{et} \quad \ker u \oplus \ker v = E.$$

---

*Correction 14.34*

★★ À venir ★★



# Chapitre 15

## Matrices I

---

### Exercice 15.1 (Exercice 1)

Soient  $a, b, c \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$ .

On pose

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Calculer  $A^n$  et  $B^n$  pour tout  $n \in \mathbb{Z}$ .

---

*Correction 15.2*

★★ À venir ★★

---

### Exercice 15.3 (Exercice 2)

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

L'ensemble des matrices symétriques de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  est-il stable par le produit matriciel ? Qu'en est-il de l'ensemble des matrices antisymétriques ?

---

*Correction 15.4*

★★ À venir ★★

---

### Exercice 15.5 (Exercice 3)

Dire pour chaque système quel est son rang et ce qu'on le peut en déduire sur l'espace  $\mathcal{S}$  de ses solutions. Le résoudre ensuite.

(1) Système d'inconnue  $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$  :

$$\begin{cases} x + 2z = 1 \\ x + y + z = 2 \end{cases}$$

(2) Système d'inconnue  $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$ , où  $\lambda$  est un paramètre réel fixé :

$$\begin{cases} a + b + c + d = 0 \\ a - b + 2c - d = 1 \\ 3a + b + 4c + d = \lambda \end{cases}$$

---

*Correction 15.6*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 15.7 (Exercice 4)**

Soient  $n, p \in \mathbb{N}^*$  et  $A \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{R})$ .

On considère les équations matricielles d'inconnue  $X \in \mathcal{M}_{p1}(\mathbb{R})$  :

$$(E_1) \quad AX = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad (E_2) \quad AX = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

On suppose que  $(E_1)$  n'admet aucune solution et que  $(E_2)$  admet une unique solution.

Quelles sont les valeurs possibles pour les entiers  $n$  et  $p$  ?

Donner, pour chaque possibilité, un exemple de matrice  $A$ .

---

*Correction 15.8*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 15.9 (Exercice 5)**

Soit  $(S)$  un système linéaire de  $n$  équations à  $p$  inconnues. On note  $r$  son rang.

Justifier les propositions suivantes :

(1) Si  $r = p$  alors  $(S)$  admet au plus une solution.

(2) Si  $r = n$  alors  $(S)$  admet au moins une solution.

---

*Correction 15.10*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 15.11 (Exercice 6)**

Montrer que les matrices  $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  et  $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$  sont semblables.

---

*Correction 15.12*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 15.13 (Exercice 7)**

Calculer les inverses des matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 7 & 8 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 7 & 0 \end{pmatrix} \quad E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

---

*Correction 15.14*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 15.15 (Exercice 8)**

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

On pose :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \dots & \dots & 1 \\ 0 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & \dots & \dots & \dots & 1 \\ \vdots & 2 & \dots & \dots & 2 \\ \vdots & \vdots & 3 & \dots & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 2 & 3 & \dots & n \end{pmatrix}$$

(1) Déterminer l'inverse de  $A$ .

(2) Calculer  ${}^tAA$ .

(3) En déduire l'inverse de  $B$ .

---

*Correction 15.16*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 15.17 (Exercice 9)**

Soient  $a, b, c, d, e, f, g, h, i \in \mathbb{K}$  et  $\lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$ .

Montrer que les matrices  $\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$  et  $\begin{pmatrix} a & b\lambda^{-1} & c\lambda^{-2} \\ d\lambda & e & f\lambda^{-1} \\ g\lambda^2 & h\lambda & i \end{pmatrix}$  sont semblables.

---

*Correction 15.18*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 15.19 (Exercice 10)**

Montrer que l'application

$$\begin{aligned} \varphi : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) &\longrightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R})^* \\ A &\longmapsto B \longmapsto \operatorname{tr}(AB) \end{aligned}$$

est un isomorphisme de l'espace vectoriel  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  vers son dual.

---

*Correction 15.20*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 15.21 (Exercice 11)**

On suppose que le corps  $\mathbb{K}$  est fini et on note  $q$  son cardinal :

$$q = \operatorname{Card} \mathbb{K} < +\infty.$$

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

Déterminer le cardinal des ensembles suivants :

- (1)  $\mathbb{K}^n$
- (2)  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$
- (3)  $\operatorname{GL}_n(\mathbb{K})$

*Indications pour le (3) :*

- Commencer par  $n = 2$  ou  $3$ .
- Une matrice carrée est inversible si, et seulement si, la famille de ses vecteurs colonnes est libre. Compter les matrices inversibles de taille  $n$  revient donc à compter les familles libres de  $n$  vecteurs de  $\mathbb{K}^n$ .

---

*Correction 15.22*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 15.23 (Exercice 12)**

Soient  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $f : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \longrightarrow \mathbb{K}$  une fonction non-constante telle que :

$$\forall A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \quad f(AB) = f(A)f(B).$$

Montrer que pour toute matrice  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ , on a l'équivalence :

$$A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K}) \iff f(A) \neq 0.$$

---

*Correction 15.24*

★★ À venir ★★

# Chapitre 16

## Matrices II

---

### Exercice 16.1 (Exercice 1)

On note  $E$  un espace vectoriel,  $\mathcal{B}$  une base de  $E$  et  $u$  un endomorphisme de  $E$ .

Donner, dans chaque cas, la matrice  $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$  de  $u$  dans  $\mathcal{B}$ .

- (1)  $E = \mathbb{C}$ , vu comme un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel ;  $\mathcal{B} = (1, i)$

$$\begin{aligned} u : \mathbb{C} &\longrightarrow \mathbb{C} && \text{où } a, b \in \mathbb{R}. \\ z &\longmapsto (a + ib)z \end{aligned}$$

- (2)  $E = \mathbb{C}$ , vu comme un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel ;  $\mathcal{B} = (1, i)$

$$\begin{aligned} u : \mathbb{C} &\longrightarrow \mathbb{C} && \text{où } \lambda \in \mathbb{R}. \\ z &\longmapsto i\lambda z + 2\bar{z} \end{aligned}$$

- (3)  $E = \mathbb{C}$ , vu comme un  $\mathbb{C}$ -espace vectoriel ;  $\mathcal{B} = (1)$

$$\begin{aligned} u : \mathbb{C} &\longrightarrow \mathbb{C} && \text{où } a, b \in \mathbb{R}. \\ z &\longmapsto (a + ib)z \end{aligned}$$

- (4)  $E = \mathbb{C}$ , vu comme un  $\mathbb{C}$ -espace vectoriel ;  $\mathcal{B} = (1)$

$$\begin{aligned} u : \mathbb{C} &\longrightarrow \mathbb{C} && \text{où } \lambda \in \mathbb{R}. \\ z &\longmapsto i\lambda z + 2\bar{z} \end{aligned}$$

- (5)  $E = \text{Vect}(\cos, \sin)$ , sous-espace vectoriel de  $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  ;  $\mathcal{B} = (\cos, \sin)$

$$\begin{aligned} u : E &\longrightarrow E \\ f &\longmapsto 2f + f' \end{aligned}$$

- (6)  $E = \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$  ;  $\mathcal{B} = (E_{11}, E_{21}, E_{12}, E_{22})$

$$\begin{aligned} u : E &\longrightarrow E && \text{où } A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in E \text{ est une matrice fixée.} \\ M &\longmapsto AM \end{aligned}$$

- (7)  $E = \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$  ;  $\mathcal{B} = (E_{11}, E_{21}, E_{12}, E_{22})$

$$\begin{aligned} u : E &\longrightarrow E && \text{où } A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in E \text{ est une matrice fixée.} \\ M &\longmapsto MA \end{aligned}$$

- (8)  $E = \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$  ;  $\mathcal{B} = (E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22})$

$$\begin{aligned} u : E &\longrightarrow E && \text{où } A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in E \text{ est une matrice fixée.} \\ M &\longmapsto MA \end{aligned}$$

(9)  $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ;  $\mathcal{B}$  à choisir (judicieusement)

$$\begin{aligned} u : E &\longrightarrow E \quad \text{où } A \in E \text{ est une matrice fixée.} \\ M &\longmapsto AM \end{aligned}$$

(10)  $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ;  $\mathcal{B}$  à choisir (judicieusement)

$$\begin{aligned} u : E &\longrightarrow E \quad \text{où } A \in E \text{ est une matrice fixée.} \\ M &\longmapsto MA \end{aligned}$$

---

*Correction 16.2*

★★ À venir ★★

---

### Exercice 16.3 (Exercice 2)

On pose

$$\begin{aligned} u : \mathbb{R}_n[X] &\longrightarrow \mathbb{R}_n[X] \\ P &\longmapsto X^2 P'' - 6P \end{aligned}$$

Calculer le rang et la trace de  $u$  :

(1) si  $n = 3$ .

(2) si  $n \geq 3$ .

---

*Correction 16.4*

★★ À venir ★★

---

### Exercice 16.5 (Exercice 3)

On pose

$$\begin{aligned} u : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) &\longrightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \\ A &\longmapsto {}^t A \end{aligned}$$

Calculer le rang et la trace de  $u$  :

(1) si  $n = 2$ .

(2) si  $n \in \mathbb{N}^*$ .

---

*Correction 16.6*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 16.7 (Exercice 4)**

Soient  $E$  un espace vectoriel de dimension finie non-nulle et  $\mathcal{B}$  et  $\mathcal{B}'$  deux bases de  $E$ .

Quelle est la relation entre la matrice de passage  $\mathcal{P}_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'}$  et la matrice  $\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(\text{id}_E)$  de l'application linéaire  $\text{id}_E$  dans les bases  $\mathcal{B}$  et  $\mathcal{B}'$  ?

---

*Correction 16.8*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 16.9 (Exercice 5)**

Soient  $E$  et  $F$  deux espaces vectoriels de dimension finie et  $u \in \mathcal{L}(E, F)$  une application linéaire de rang  $r \in \mathbb{N}$ .

Montrer que  $u$  est la somme de  $r$  applications linéaires de rang 1.

---

*Correction 16.10*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 16.11 (Exercice 6)**

Soient  $E$  un espace vectoriel de dimension finie non-nulle et  $u \in \mathcal{L}(E)$  tel que  $u^2 = 0$ .

(1) Quelle inclusion est vraie entre  $\ker u$  et  $\text{Im } u$  ?

(2) Montrer que  $u$  est de trace nulle.

*Indication* : construire une base de  $E$  adaptée à la situation.

*Remarque* : vous montrerez en deuxième année que tout endomorphisme nilpotent de  $E$  est de trace nulle.

---

*Correction 16.12*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 16.13 (Exercice 7, méthode à retenir)**

On pose :

$$H = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^3 \mid x_1 + 2x_3 = 0 \right\} \quad \text{et} \quad D = \text{Vect} \left( \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right).$$

(1) Justifier que  $H$  et  $D$  sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires dans  $\mathbb{C}^3$ .

(2) On note  $p_H$  la projection sur  $H$  parallèlement à  $D$  et  $p_D$  la projection sur  $D$  parallèlement à  $H$ .

Déterminer les matrices de  $p_H$  et  $p_D$  dans la base canonique.



---

Correction 16.14

★★ À venir ★★

---

**Exercice 16.15 (Exercice 8, méthode également à retenir)**

On pose  $E = \mathbb{R}^4$ .

On note  $F$  et  $G$  les ensembles solutions respectifs des systèmes

$$\begin{cases} a + b = 0 \\ b + c = 0 \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} a + b + c = 0 \\ b + c + d = 0 \end{cases}$$

- (1) Montrer que  $F$  et  $G$  sont supplémentaires dans  $\mathbb{R}^4$ .
- (2) Déterminer une base  $\mathcal{B}_F$  de  $F$  et une base  $\mathcal{B}_G$  de  $G$ .

On note  $\mathcal{B}_0$  la base canonique de  $\mathbb{R}^4$ ,  $\mathcal{B}$  la base de  $\mathbb{R}^4$  obtenue en juxtaposant  $\mathcal{B}_F$  et  $\mathcal{B}_G$ ,  $p$  la projection sur  $F$  parallèlement à  $G$  et  $s$  la symétrie par rapport à  $F$  parallèlement à  $G$ .

- (3) Donner la matrice de  $p$  dans la base  $\mathcal{B}$ .
- (4) En déduire la matrice de  $p$  dans la base  $\mathcal{B}_0$ .
- (5) En déduire la matrice de  $s$  dans la base  $\mathcal{B}_0$ .

NB : il faut savoir refaire parfaitement la question (4) sans les questions intermédiaires (2) et (3).

---

Correction 16.16

★★ À venir ★★

---

**Exercice 16.17 (Exercice 9)**

Soit  $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  une matrice de trace différente de 2.

On pose :

$$E = \{X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid X + {}^tX = (\operatorname{tr} X) M\}.$$

- (1) Montrer que  $E$  est un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel et déterminer sa dimension.
- (2) Que se passe-t-il si  $\operatorname{tr} M = 2$  ?

---

*Correction 16.18*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 16.19 (Exercice 10)**

Soient  $E$  un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie,  $\lambda \in \mathbb{R}^*$  et  $u \in \mathcal{L}(E)$ .

On suppose  $u^2 = \lambda u$ .

Donner une relation entre  $\operatorname{tr} u$  et  $\operatorname{rg} u$ .

---

*Correction 16.20*

★★ À venir ★★

# Chapitre 17

## Relations de comparaison, développements limités

---

### Exercice 17.1 (Exercice 1)

Classer les expressions suivantes de la plus « petite » à la plus « grande » quand  $x$  tend vers  $+\infty$  (on pourra exprimer la réponse à l'aide des notations de Hardy) :

$$x^2 \ln x \quad \frac{x^3}{\ln x} \quad x \ln^7 x \quad \frac{e^x}{x \ln x} \quad \frac{e^{x^2}}{x^7 \ln x} \quad \frac{e^{2x}}{x \ln x} \quad e^{\sqrt{x}}$$

---

*Correction 17.2*

★★ À venir ★★

---

### Exercice 17.3 (Exercice 2)

(1) Simplifier les expressions suivantes :

$$A \underset{x \rightarrow +\infty}{=} \left( x \ln x + \sqrt{x} \ln^2 x + \mathcal{O}(x) + \sin x + \sqrt{x} \right) x + o\left(x^2 \ln x\right)$$

et

$$B \underset{x \rightarrow 0}{=} \mathcal{O}\left(x^3 \ln x\right) + x^3 \ln^2 x + 2x^3 + \frac{x \ln^2 x}{1-x} + o\left(x^3\right) + \mathcal{O}\left(x^3\right)$$

en utilisant pour  $B$  le développement limité en 0 de  $x \mapsto \frac{1}{1-x}$ .

(2) Donner un équivalent de  $A$  et  $B$ .

---

*Correction 17.4*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 17.5 (Exercice 3)**

Donner un équivalent des fonctions suivantes :

(1)  $f : x \mapsto [x]$  quand  $x$  tend vers  $+\infty$ .

(2)  $g : x \mapsto \frac{x^\alpha}{1+x^\beta}$  quand  $x$  tend vers  $+\infty$  et quand  $x$  tend vers  $0^+$ .

(3)  $h : x \mapsto \int_0^x [t] dt$  quand  $x$  tend vers  $+\infty$ .

(4)  $k : x \mapsto \int_x^{x+1} e^t \ln t dt$  quand  $x$  tend vers  $+\infty$ .

---

*Correction 17.6*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 17.7 (Exercice 4)**

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on note  $u_n$  le nombre de zéros consécutifs situés à droite de l'écriture en base 10 de  $n!$ .

Par exemple, l'entier  $20! = 2432902008176640000$  se termine par quatre zéros donc  $u_{20} = 4$ .

Donner un équivalent de  $u_n$  quand  $n$  tend vers  $+\infty$ .

---

*Correction 17.8*

Si  $N \in \mathbb{N}^*$ , le nombre de zéros à droite de  $N$  est

$$\min \{v_2(n) ; v_5(n)\}.$$

Soit  $p \in \mathbb{P}$ .

Calculons

$$\begin{aligned} v_p(n!) &= \left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^3} \right\rfloor + \dots \\ &= \sum_{\alpha=1}^{+\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^\alpha} \right\rfloor \end{aligned}$$

Donc  $v_2(n!) \geq v_5(n!)$ .

$$\text{Donc } u_n = v_5(n!) = \sum_{\alpha=1}^{+\infty} \left\lfloor \frac{n}{5^\alpha} \right\rfloor.$$

On a

$$\begin{aligned}
 \forall \alpha \in \mathbb{N}^*, \quad \left\lfloor \frac{n}{5^\alpha} \right\rfloor = 0 &\iff \frac{n}{5^\alpha} < 1 \\
 &\iff n < 5^\alpha \\
 &\iff \alpha > \log_5 n \\
 &\iff \alpha > \lfloor \log_5 n \rfloor
 \end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned}
 u_n &= \sum_{\alpha=1}^{\lfloor \log_5 n \rfloor} \left\lfloor \frac{n}{5^\alpha} \right\rfloor \\
 &\leq \sum_{\alpha=1}^{\lfloor \log_5 n \rfloor} \frac{n}{5^\alpha} \\
 &= n \frac{\frac{1}{5} - \frac{1}{5^{\lfloor \log_5 n \rfloor + 1}}}{1 - \frac{1}{5}} \\
 &\leq \frac{n}{4}
 \end{aligned}$$

De plus, on a

$$\begin{aligned}
 u_n &\geq \sum_{\alpha=1}^{\lfloor \log_5 n \rfloor} \left( \frac{n}{5^\alpha} - 1 \right) \\
 &= n \frac{\frac{1}{5} - \frac{1}{5^{\lfloor \log_5 n \rfloor + 1}}}{1 - \frac{1}{5}} - \lfloor \log_5 n \rfloor \\
 &= \frac{n}{4} \left( 1 - \frac{1}{5^{\lfloor \log_5 n \rfloor + 1}} \right) - \lfloor \log_5 n \rfloor \\
 &\geq \frac{n}{4} \left( 1 - \frac{1}{5^{\lfloor \log_5 n \rfloor + 1}} \right) - \log_5 n \\
 &\underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{n}{4} \quad \left( n \frac{1 + o(1)}{4} + o(n) = \frac{n}{4} + o(n) \right)
 \end{aligned}$$

Donc  $u_n \sim \frac{n}{4}$ .

### Exercice 17.9 (Exercice 5)

Soient  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$  centré en 0,  $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$  et  $n \in \mathbb{N}$ .

On suppose que  $f$  admet un développement limité à l'ordre  $n$  en 0 :

$$f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + o(x^n).$$

- (1) Montrer que si la fonction  $f$  est paire, alors les termes de degré impair de son développement limité sont tous nuls :

$$0 = a_1 = a_3 = a_5 = \dots$$

- (2) Montrer que si la fonction  $f$  est impaire, alors les termes de degré pair de son développement limité sont tous nuls :

$$0 = a_0 = a_2 = a_4 = \dots$$

---

*Correction 17.10*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 17.11 (Exercice 6)**

Calculer les développements limités des fonctions suivantes en 0 :

(1)  $x \mapsto \sqrt{1 + \sin x}$  à l'ordre 4.

(2)  $x \mapsto \sqrt{1 + \cos x}$  à l'ordre 4.

(3)  $x \mapsto \ln(e^x + \cos x)$  à l'ordre 3.

(4)  $x \mapsto \ln(\cos(2x))$  à l'ordre 7.

(5)  $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$  à l'ordre  $n \in \mathbb{N}$ .

(6) Arcsin à l'ordre  $n \in \mathbb{N}$ .

(7) Arccos à l'ordre  $n \in \mathbb{N}$ .

*Indication* : pour le (5), exprimer pour tout  $k \in \mathbb{N}$  le quotient  $\frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-k+1)}{k!}$  avec  $\alpha = \frac{-1}{2}$  à l'aide de factorielles.

---

*Correction 17.12*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 17.13 (Exercice 7)**

Calculer les développements limités des fonctions suivantes :

(1)  $x \mapsto \ln(1+x^2)$  à l'ordre 3 en 2.

(2)  $x \mapsto \sin x \cos(3x)$  à l'ordre 2 en  $\frac{\pi}{3}$ .

**Exercice 17.15 (Exercice 8)**

Calculer les limites suivantes :

(1)

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x \neq 0}} \frac{\operatorname{Arctan}(2x) - 2 \operatorname{Arctan} x}{x^3}$$

(2)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{\ln(1+x)}{\ln x} \right)^{x \ln x}$$

(3)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left( 1 + \frac{\lambda}{n} \right)^n \quad \text{où } \lambda \text{ est un réel fixé}$$

(4)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left( 3 \sqrt[n]{2} - 2 \sqrt[n]{3} \right)^n$$

(5)

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x \neq 0}} \frac{\operatorname{Arctan}(x^2 - x^2 \cos x)}{(1 - \sqrt{\cos x}) \ln \frac{\sin x}{x}}$$

(6)

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x \neq 0}} \frac{x \cos x - \sin x}{\cos x - 1}$$

(7)

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left( \frac{x \cos x - \sin x}{\cos x - 1} \right)^x$$

(8)

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x \neq 0}} \left( \frac{2^x + 3^x}{2} \right)^{\frac{1}{x}}$$

(9)

$$\lim_{\substack{x \rightarrow \frac{\pi}{3} \\ x \neq \frac{\pi}{3}}} \frac{3 \cos^2 x - \sin^2(2x)}{\tan(4x) - \sqrt{3}}$$

---

*Correction 17.16*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 17.17 (Exercice 9)**

(1) Montrer que l'application

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto xe^{x^2} \end{aligned}$$

est une bijection de  $\mathbb{R}$  vers  $\mathbb{R}$ . On note  $f^{-1}$  sa bijection réciproque.

(2) Montrer que les fonctions  $f$  et  $f^{-1}$  sont impaires.

(3) Déterminer le développement limité à l'ordre 5 de  $f^{-1}$  en 0.

On pensera à utiliser l'Exercice 17.9 pour alléger les calculs.

---

*Correction 17.18*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 17.19 (Exercice 10)**

On pose

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \begin{cases} 0 & \text{si } x = 0 \\ \frac{x^2}{e^x - e^{-x}} & \text{sinon} \end{cases} \end{aligned}$$

(1) Déterminer le développement limité de  $f$  à l'ordre 3 en 0.

(2) Montrer que  $f$  est dérivable en 0 et calculer  $f'(0)$ .

(3) Déterminer la position relative du graphe de  $f$  par rapport à sa tangente en 0.

---

*Correction 17.20*

★★ À venir ★★



---

**Exercice 17.21 (Exercice 11)**

Soit  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

Déterminer un développement asymptotique de la suite de terme général

$$u_n = \left(1 + \frac{\lambda}{n}\right)^n$$

à la précision  $\frac{1}{n^2}$ .

---

*Correction 17.22*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 17.23 (Exercice 12)**

On pose :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^* &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto (x+1) \exp\left(\frac{1}{x}\right) \end{aligned}$$

Déterminer un développement asymptotique de  $f$  en  $+\infty$  à la précision  $\frac{1}{x}$ .

En déduire que le graphe de  $f$  admet une asymptote en  $+\infty$  et sa position par rapport à son asymptote (au voisinage de  $+\infty$ ).

---

*Correction 17.24*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 17.25 (Exercice 13)**

Trouver un équivalent, quand  $x$  tend vers  $0^+$ , de :

$$x^{\sin x} - \sin^x x.$$

---

*Correction 17.26*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 17.27 (Exercice 14)**

Montrer qu'on a, quand  $x$  tend vers 1 :

$$\operatorname{Arccos} x \sim \sqrt{2(1-x)}.$$

---

*Correction 17.28*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 17.29 (Exercice 15)**

(1) Montrer :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \exists ! u_n \in \mathbb{R}, u_n e^{nu_n} = 1.$$

On obtient ainsi une suite de réels  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ , que l'on étudie dans la suite.

(2) Étudier la limite de la suite  $(u_n)_n$ .

(3) Donner un équivalent de  $u_n$  quand  $n$  tend vers  $+\infty$ .

---

*Correction 17.30*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 17.31 (Exercice 16, oral 2016)**

(1) Montrer, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , l'existence et l'unicité d'un réel  $x_n$  tel que :

$$x_n - e^{-x_n} = n.$$

(2) Montrer :

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \leq x_n \leq n + 1.$$

(3) En déduire un équivalent de  $x_n$ , puis un développement asymptotique à deux termes de  $x_n$  quand  $n$  tend vers  $+\infty$ .

(4) Donner un développement asymptotique à 5 termes de  $x_n$  quand  $n$  tend vers  $+\infty$ .

NB : la question (4) est ajoutée, elle n'a pas été posée à l'oral dont provient l'exercice.

---

*Correction 17.32*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 17.33 (Exercice 17)**

On rappelle la formule du multinôme<sup>1</sup>, qui généralise la formule du binôme de Newton (obtenue quand  $r = 2$ ) :

$$\forall n, r \in \mathbb{N}, \forall z_1, \dots, z_r \in \mathbb{C}, (z_1 + \dots + z_r)^n = \sum_{\alpha_1 + \dots + \alpha_r = n} \frac{n!}{\alpha_1! \dots \alpha_r!} z_1^{\alpha_1} \dots z_r^{\alpha_r}$$

(on sous-entend pour alléger la formule que les  $\alpha_i$  sont des entiers naturels).

Soient  $I$  et  $J$  des intervalles de  $\mathbb{R}$  contenant au moins deux points,  $f \in \mathcal{C}^n(I, J)$ ,  $g \in \mathcal{C}^n(J, \mathbb{R})$  et  $a \in I$ .

Montrer la formule de Faà di Bruno :

$$(g \circ f)^{(n)}(a) = \sum_{\alpha_1 + 2\alpha_2 + \dots + n\alpha_n = n} \frac{n!}{(1!)^{\alpha_1} \dots (n!)^{\alpha_n} \alpha_1! \dots \alpha_n!} g^{(\alpha_1 + \dots + \alpha_n)}(f(a)) f^{(1)}(a)^{\alpha_1} \dots f^{(n)}(a)^{\alpha_n}$$

qui donne la dérivée  $n$ -ème de  $g \circ f$  en fonction des dérivées successives de  $f$  et  $g$ .

---

*Correction 17.34*

★★ À venir ★★

---

*Remarque 17.35*

Les deux derniers exercices sont assez calculatoires ; on pourra s'aider d'une calculatrice ou d'un ordinateur pour obtenir les développements limités utiles.

---

**Exercice 17.36 (Exercice 18)**

On considère le  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel  $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  et le vecteur  $f = \sin$ .

La famille  $(f, f \circ f, f \circ f \circ f)$  est-elle libre ?

---

*Correction 17.37*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 17.38 (Exercice 19)**

Trouver un équivalent simple quand  $x$  tend vers 0 de la fonction :

$$x \longmapsto \tan(\sin x) - \sin(\tan x).$$

---

*Correction 17.39*

★★ À venir ★★

---

1. La formule est énoncée ici pour les nombres complexes ; elle est en fait valable dans tout anneau si les éléments  $z_1, \dots, z_r$  commutent deux à deux.

# Chapitre 18

## Groupe symétrique

---

### Exercice 18.1 (Exercice 1)

On pose

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix} \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 5 & 4 & 3 \end{pmatrix} \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \sigma_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 5 & 4 & 6 & 3 & 7 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Pour tout  $k \in \llbracket 1 ; 4 \rrbracket$  :

- Décomposer  $\sigma_k$  en produit de cycles à supports disjoints.
- Calculer la signature de  $\sigma_k$ .
- Calculer  $\sigma_k^2$ ,  $\sigma_k^{-1}$  et  $\sigma_k^{2023}$ .

---

*Correction 18.2*

★★ À venir ★★

---

### Exercice 18.3 (Exercice 2, bon à retenir)

Soient  $n, k \in \mathbb{N}$  tels que  $2 \leq k \leq n$ .

Soient  $\sigma \in \mathfrak{S}_n$  et un  $k$ -cycle

$$c = (a_1 \ a_2 \ a_3 \ \dots \ a_k) \in \mathfrak{S}_n$$

(avec  $a_1, \dots, a_k \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$  deux à deux distincts).

Calculer

$$\sigma c \sigma^{-1}.$$

---

*Correction 18.4*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 18.5 (Exercice 3)**

Soit  $n \in \llbracket 2 ; +\infty \rrbracket$ .

- (1) Montrer que si  $\tau, \tau' \in \mathfrak{S}_n$  sont des transpositions alors

$$\exists \sigma \in \mathfrak{S}_n, \quad \sigma \tau \sigma^{-1} = \tau'$$

(on dit que les transpositions  $\tau$  et  $\tau'$  sont conjuguées dans  $\mathfrak{S}_n$ ).

- (2) Quels sont les morphismes de groupes de  $\mathfrak{S}_n$  vers  $\{-1 ; 1\}$  ?

---

*Correction 18.6*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 18.7 (Exercice 4)**

Soient  $n \in \llbracket 3 ; +\infty \rrbracket$  et  $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ .

On suppose que  $\sigma$  commute avec toutes les permutations de  $\mathfrak{S}_n$ .

Montrer

$$\sigma = \text{id}.$$

---

*Correction 18.8*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 18.9 (Exercice 5)**

Soit  $n \in \llbracket 2 ; +\infty \rrbracket$ .

On considère le  $n$ -cycle

$$c = (1 \ 2 \ 3 \ \dots \ n) \in \mathfrak{S}_n.$$

Quelles sont les permutations de  $\mathfrak{S}_n$  qui commutent avec  $c$  ?

On pourra identifier  $\llbracket 1 ; n \rrbracket$  avec  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  de sorte que

$$\forall x \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \quad c(x) = x + 1.$$

---

*Correction 18.10*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 18.11 (Exercice 6)**

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

Montrer que toute permutation  $\sigma \in \mathfrak{S}_n$  est produit de transpositions de la forme  $(i \ i+1)$  où  $i \in \llbracket 1 ; n-1 \rrbracket$ .

---

*Correction 18.12*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 18.13 (Exercice 7, groupe alterné  $\mathfrak{A}_n$ )**

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

- (1) Donner tous les éléments de  $\mathfrak{A}_4$  sous forme de produits de cycles à supports disjoints.
- (2) En supposant  $n \geq 2$ , quel est le cardinal de  $\mathfrak{A}_n$  ?
- (3) Donner une CNS sur  $n$  pour que le groupe  $\mathfrak{A}_n$  soit commutatif.
- (4) Montrer que tout élément de  $\mathfrak{A}_n$  est produit de 3-cycles.

On suppose désormais  $n \geq 5$ .

- (5) Soient deux 3-cycles  $c_1, c_2 \in \mathfrak{A}_n$ . Montrer

$$\exists \sigma \in \mathfrak{A}_n, \quad c_2 = \sigma c_1 \sigma^{-1}$$

(on dit que  $c_1$  et  $c_2$  sont conjugués dans  $\mathfrak{A}_n$ ).

- (6) Soient  $(G, \times)$  un groupe abélien et  $\varphi : \mathfrak{A}_5 \longrightarrow G$  un morphisme de groupes.

(a) Montrer qu'il existe deux permutations  $a, b \in \mathfrak{A}_5$  telles que :

$$\begin{cases} a^3 = \text{id} \\ b^2 = \text{id} \\ (ab)^5 = \text{id} \end{cases}$$

(b) Montrer

$$a, b \in \ker \varphi.$$

*Indication* : utiliser le système et la commutativité de  $G$ .

(c) Montrer que  $\varphi$  est constant.

- (7) Montrer que tout morphisme de groupes de  $\mathfrak{A}_n$  vers un groupe abélien est constant <sup>1</sup>.

---

1. Cela montre que le groupe  $\mathfrak{A}_n$  n'est pas « résoluble » si  $n \geq 5$ , proposition importante en « théorie de Galois ». Cette démonstration provient de la belle conférence d'Alain Connes « Évariste Galois et la théorie de l'ambiguïté » (on la trouve facilement sur internet).

---

*Correction 18.14 (1)*

On a

$$\mathfrak{A}_4 = \{\text{id} ; (1 \ 2 \ 3) ; (3 \ 2 \ 1) ; (1 \ 2 \ 4) ; (4 \ 2 \ 1) ; (1 \ 3 \ 4) ; (4 \ 3 \ 1) ; (2 \ 3 \ 4) ; \\ (4 \ 3 \ 2) ; (1 \ 2) (3 \ 4) ; (1 \ 3) (2 \ 4) ; (1 \ 4) (2 \ 3)\}$$

On remarque  $\text{Card } \mathfrak{A}_4 = 12$ .

---

*Correction 18.15 (2)*

Montrons que  $f : \mathfrak{A}_n \longrightarrow \mathfrak{S}_n \setminus \mathfrak{A}_n$  est une bijection.  
 $\sigma \longmapsto (1 \ 2) \sigma$

$f$  est bien définie car  $\forall \sigma \in \mathfrak{A}_n, f(\sigma) \in \mathfrak{S}_n \setminus \mathfrak{A}_n$ .

Soit  $\sigma' \in \mathfrak{S}_n \setminus \mathfrak{A}_n$ .

On a

$$\forall \sigma \in \mathfrak{A}_n, f(\sigma) = \sigma' \iff (1 \ 2) \sigma = \sigma' \\ \iff \sigma = (1 \ 2) \sigma'.$$

De plus :

$$\varepsilon((1 \ 2) \sigma') = \varepsilon((1 \ 2)) \varepsilon(\sigma') \\ = (-1)(-1) \\ = 1.$$

Donc  $(1 \ 2) \sigma' \in \mathfrak{A}_n$ .

Donc  $(1 \ 2) \sigma'$  est l'unique antécédent de  $\sigma$  par  $f$ .

Donc  $f$  est une bijection.

Donc  $\text{Card } \mathfrak{A}_n = \text{Card } (\mathfrak{S}_n \setminus \mathfrak{A}_n)$ .

Or  $\mathfrak{S}_n = \mathfrak{A}_n \cup (\mathfrak{S}_n \setminus \mathfrak{A}_n)$  (réunion disjointe).

Donc

$$\text{Card } \mathfrak{S}_n = \text{Card } \mathfrak{A}_n + \text{Card } (\mathfrak{S}_n \setminus \mathfrak{A}_n)$$

$$n! = 2 \text{Card } \mathfrak{A}_n$$

$$\frac{n!}{2} = \text{Card } \mathfrak{A}_n.$$

---

*Correction 18.16 (3)*

$\mathfrak{A}_1$  et  $\mathfrak{A}_2$  sont clairement commutatifs.

De plus,  $\mathfrak{A}_3 = \{\text{id} ; (1 \ 2 \ 3) ; (3 \ 2 \ 1)\}$  est commutatif car  $(3 \ 2 \ 1)^2 = (1 \ 2 \ 3)$ .

Enfin, dans  $\mathfrak{A}_n$  avec  $n \geq 4$ , on a

$$\begin{cases} (1 \ 2 \ 3) (1 \ 2 \ 4) (3) = 1 \\ (1 \ 2 \ 4) (1 \ 2 \ 3) (3) = 2 \end{cases}$$

donc  $(1 \ 2 \ 3)$  et  $(1 \ 2 \ 4)$  ne commutent pas donc  $\mathfrak{A}_n$  n'est pas commutatif.

D'où la CNS :

$$\mathfrak{A}_n \text{ est commutatif} \iff n \leq 3.$$

---

*Correction 18.17 (4)*

Soit  $\sigma \in \mathfrak{A}_n$ .

Soient  $N \in \mathbb{N}$  et  $a_1, b_1, \dots, a_N, b_N \in \llbracket 1 ; N \rrbracket$  tels que

$$\begin{cases} \sigma = (a_1 \ b_1) \dots (a_N \ b_N) \\ \forall j \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, \ a_j \neq b_j \end{cases}$$

Comme  $\sigma \in \mathfrak{A}_n$ ,  $N$  est pair donc il existe  $k \in \mathbb{N}$  tel que  $N = 2k$ .

Donc

$$\sigma = \underbrace{(a_1 \ b_1) (a_2 \ b_2) \dots (a_{N-1} \ b_{N-1})}_{\sigma_1} \underbrace{(a_N \ b_N)}_{\sigma_k}.$$

Il suffit de montrer que  $\sigma_1, \dots, \sigma_k$  sont produits de 3-cycles.

Montrons que  $\sigma_1$  est produit de 3-cycles.

Si  $\text{Card}(\{a_1 ; b_1\} \cap \{a_2 ; b_2\}) = 2$  alors

$$(a_1 \ b_1) (a_2 \ b_2) = \text{id}.$$

Si  $\text{Card}(\{a_1 ; b_1\} \cap \{a_2 ; b_2\}) = 1$  : supposons par exemple  $b_1 = a_2$ . Alors

$$(a_1 \ b_1) (a_2 \ b_2) = (a_1 \ b_1 \ b_2).$$

Si  $\text{Card}(\{a_1 ; b_1\} \cap \{a_2 ; b_2\}) = 0$  alors

$$\begin{aligned} (a_1 \ b_1) (a_2 \ b_2) &= (a_1 \ b_1) (b_1 \ a_2) (b_1 \ a_2) (a_2 \ b_2) \\ &= (a_1 \ b_1 \ a_2) (b_1 \ a_2 \ b_2). \end{aligned}$$

Donc  $\sigma_1$  est produit de 3-cycles.

De même,  $\forall i \in \llbracket 1 ; k \rrbracket$ ,  $\sigma_k$  est produit de 3-cycles.

Donc  $\sigma$  est produit de 3-cycles.



---

*Correction 18.18 (5)*

Soient  $x_1, y_1, z_1, x_2, y_2, z_2 \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$  tels que

$$\begin{cases} c_1 = (x_1 & y_1 & z_1) \\ c_2 = (x_2 & y_2 & z_2) \end{cases}$$

$x_1, y_1, z_1$  sont deux à deux distincts et  $x_2, y_2, z_2$  aussi.

Soit  $\sigma \in \mathfrak{S}_n$  telle que

$$\begin{cases} \sigma(x_1) = x_2 \\ \sigma(y_1) = y_2 \\ \sigma(z_1) = z_2 \end{cases}$$

On a

$$\begin{aligned} \sigma c_1 \sigma^{-1} &= (\sigma(x_1) \quad \sigma(y_1) \quad \sigma(z_1)) \\ &= (x_2 \quad y_2 \quad z_2) \\ &= c_2. \end{aligned}$$

Soient  $a, b \in \llbracket 1 ; n \rrbracket \setminus \{x_1 ; y_1 ; z_1\}$  tels que  $a \neq b$ .

Posons  $\sigma' = \sigma(a \ b)$ .

On a

$$\begin{cases} \sigma'(x_1) = x_2 \\ \sigma'(y_1) = y_2 \\ \sigma'(z_1) = z_2 \end{cases}$$

Donc  $\sigma' c_1 \sigma'^{-1} = c_2$ .

On a  $\varepsilon(\sigma') = -\varepsilon(\sigma)$ .


Donc  $\sigma$  ou  $\sigma'$  est pair.

Donc  $c_1$  et  $c_2$  sont conjugués dans  $\mathfrak{A}_n$ .

---

*Correction 18.19 (6a)*

On schématise la situation comme suit :



Prenons donc  $\begin{cases} a = (2 & 3 & 4) \\ b = (1 & 2) (4 & 5) \end{cases}$

On a bien

$$\begin{cases} a^3 = \text{id} \\ b^2 = \text{id} \end{cases}$$

De plus, on a aussi

$$\begin{aligned} (ab)^5 &= ((2 & 3 & 4) (1 & 2) (4 & 5))^5 \\ &= (1 & 3 & 4 & 5 & 2)^5 \\ &= \text{id}. \end{aligned}$$

*Correction 18.20 (6b)*

Posons  $\begin{cases} a' = \varphi(a) \\ b' = \varphi(b) \end{cases}$

On a  $a'^3 = \varphi(a)^3 = \varphi(a^3) = \varphi(\text{id}) = 1$ .

De même,  $b'^2 = 1$ .

Donc  $(a'b')^5 = 1$ .

De plus  $G$  est commutatif donc  $(a'b')^5 = a'^5 b'^5$ .

Donc  $1 = a'^{-1} b'$ .

Donc  $a' = b'$ .

Donc  $a'^2 = 1$ .

Donc  $a' = a'^3 a'^{-2} = 1$ .

Donc  $b' = 1$ .

Donc  $a, b \in \ker \varphi$ .

*Correction 18.21 (6c)*

Soit  $c$  un 3-cycle.

Selon (5), il existe  $\sigma \in \mathfrak{A}_n$  telle que  $c = \sigma a \sigma^{-1}$  car  $a = (2 & 3 & 4)$ .

Donc

$$\begin{aligned}
 \varphi(c) &= \varphi(\sigma a \sigma^{-1}) \\
 &= \varphi(\sigma) \varphi(a) \varphi(\sigma^{-1}) \\
 &= \varphi(a) \varphi(\sigma) \varphi(\sigma^{-1}) \quad \left. \begin{array}{l} \nearrow \\ \searrow \end{array} \right\} \text{car } G \text{ est commutatif} \\
 &= \varphi(a) \\
 &= 1.
 \end{aligned}$$

Soit  $\sigma' \in \mathfrak{A}_n$ .

Selon (4),  $\sigma'$  est produit de 3-cycles.

Donc  $\varphi(\sigma') = 1$ .

*Correction 18.22 (7)*

Soit  $\psi : \mathfrak{A}_n \longrightarrow G$  un morphisme de groupes avec  $G$  abélien.

Posons  $\varphi = \psi|_{\mathfrak{A}_5}$ .

Selon (6),  $\varphi$  est constant.

Donc

$$\psi((1 \ 2 \ 3)) = \varphi((1 \ 2 \ 3)) = 1.$$

Comme précédemment, on en déduit que tout 3-cycle de  $\mathfrak{A}_n$  appartient à  $\ker \psi$  puis que  $\psi$  est constant.

# Chapitre 19

## Déterminants

---

### Exercice 19.1 (Exercice 1)

Soient  $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ .

Calculer les déterminants suivants quand ils sont définis :

$$A = \begin{vmatrix} a^{-1} & a & a^3 \\ b^{-1} & b & b^3 \\ c^{-1} & c & c^3 \end{vmatrix} \quad B = \begin{vmatrix} a & c & c & b \\ c & a & b & c \\ c & b & a & c \\ b & c & c & a \end{vmatrix} \quad C = \begin{vmatrix} a+b & b+c & c+a \\ a^2+b^2 & b^2+c^2 & c^2+a^2 \\ a^3+b^3 & b^3+c^3 & c^3+a^3 \end{vmatrix}$$

On factorisera autant que possible les résultats.

---

*Correction 19.2*

★★ À venir ★★

---

### Exercice 19.3 (Exercice 2)

- (1) Donner une CNS sur  $\lambda \in \mathbb{R}$  pour que

$$\begin{array}{ccc} u : \mathbb{R}_2[X] & \longrightarrow & \mathbb{R}_2[X] \\ P & \longmapsto & P + \lambda X P' \end{array}$$

soit un automorphisme de  $\mathbb{R}_2[X]$ .

- (2) Donner une CNS sur  $\lambda \in \mathbb{R}$  pour que

$$\begin{array}{ccc} u : \mathbb{R}_3[X] & \longrightarrow & \mathbb{R}_3[X] \\ P & \longmapsto & P + (\lambda X + 1) P' + \lambda X^2 P(0) \end{array}$$

soit un automorphisme de  $\mathbb{R}_3[X]$ .

- (3) (Mines-Telecom 2016) Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . Calculer le déterminant de

$$\begin{array}{ccc} u : \mathbb{R}_n[X] & \longrightarrow & \mathbb{R}_n[X] \\ P & \longmapsto & X P' + P \end{array}$$

---

Correction 19.4

★★ À venir ★★

---

**Exercice 19.5 (Exercice 3)**

(1) Donner une CNS sur  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$  pour que

$$\begin{aligned} u : \mathbb{R}_2[X] &\longrightarrow \mathbb{R}_2[X] \\ P &\longmapsto (\lambda X^2 + \mu) P(1) + XP' \end{aligned}$$

soit un automorphisme de  $\mathbb{R}_2[X]$ .

(2) Plus généralement, donner une CNS sur  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$  et  $n \in \mathbb{N}^*$  pour que

$$\begin{aligned} u : \mathbb{R}_n[X] &\longrightarrow \mathbb{R}_n[X] \\ P &\longmapsto (\lambda X^n + \mu) P(1) + XP' \end{aligned}$$

soit un automorphisme de  $\mathbb{R}_n[X]$ .

---

Correction 19.6

★★ À venir ★★

---

**Exercice 19.7 (Exercice 4)**

Soient  $a, b, c, t \in \mathbb{R}$ .

On suppose que  $a, b$  et  $c$  sont deux à deux distincts.

Résoudre le système d'inconnue  $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$  :

$$(S) \begin{cases} x + y + z = t \\ ax + by + cz = t^2 \\ a^2x + b^2y + c^2z = t^3 \end{cases}$$

---

Correction 19.8

★★ À venir ★★

---

**Exercice 19.9 (Exercice 5)**

Soient  $a, b \in \mathbb{R}$ .

Résoudre le système d'inconnues  $x, y, z \in \mathbb{R}$  :

$$(S) \begin{cases} ax + (a-1)y + (a+b)z = 1 \\ ax + ay + bz = a \\ bx + by + az = b \end{cases}$$

---

Correction 19.10

★★ À venir ★★

---

**Exercice 19.11 (Exercice 6)**

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

Calculer le déterminant de la matrice  $A = (a_{ij})_{(i,j) \in \llbracket 1;n \rrbracket^2} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  définie par :

$$\forall i, j \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, \quad a_{ij} = |i - j|.$$

---

Correction 19.12

★★ À venir ★★

---

**Exercice 19.13 (Exercice 7)**

Soient  $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{C}$ .

Calculer le déterminant

$$\begin{vmatrix} 0 & \dots & 0 & x_1 \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ x_n & 0 & \dots & 0 \end{vmatrix}$$

---

Correction 19.14

★★ À venir ★★

---

**Exercice 19.15 (Exercice 8)**

(1) Soient  $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{C}$ . On pose  $\forall k \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, \quad s_k = \sum_{j=1}^k x_j$ .

Calculer le déterminant

$$\begin{vmatrix} s_1 & \dots & \dots & \dots & s_1 \\ \vdots & s_2 & \dots & \dots & s_2 \\ \vdots & \vdots & s_3 & \dots & s_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ s_1 & s_2 & s_3 & \dots & s_n \end{vmatrix}$$

(2) Que vaut le déterminant suivant ?

$$\begin{vmatrix} 1 & \dots & \dots & \dots & 1 \\ \vdots & 2 & \dots & \dots & 2 \\ \vdots & \vdots & 3 & \dots & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 2 & 3 & \dots & n \end{vmatrix}$$

Retrouver ce résultat en utilisant l'Exercice 15.15.

---

*Correction 19.16*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 19.17 (Exercice 9)**

Calculer le déterminant et la trace des endomorphismes

$$\begin{array}{ccc} f : \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) & \longrightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \\ M & \longmapsto & {}^t M \end{array} \quad \text{et} \quad \begin{array}{ccc} g : \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) & \longrightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \\ M & \longmapsto & (\text{tr } M) I_n \end{array}$$

---

*Correction 19.18*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 19.19 (Exercice 10)**

Soient  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  antisymétrique et inversible.

Montrer que l'entier  $n$  est pair.

Donner un exemple de matrice antisymétrique inversible.

---

*Correction 19.20*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 19.21 (Exercice 11)**

Soient  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  telle que  $A^2 = -I_n$ .

Montrer que l'entier  $n$  est pair.

Donner un exemple

- de matrice  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  telle que  $A^2 = -I_n$ .
- de matrice  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  telle que  $A^2 = -I_n$  avec  $n$  impair.

---

*Correction 19.22*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 19.23 (Exercice 12)**

Soient  $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  avec  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ .

Montrer que  $A$  et  $B$  sont semblables sur  $\mathbb{R}$  si, et seulement si, elles sont semblables sur  $\mathbb{C}$ , c'est-à-dire :

$$[\exists P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}), B = PAP^{-1}] \iff [\exists Q \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C}), B = QAQ^{-1}].$$

---

*Correction 19.24*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 19.25 (Exercice 13, déterminant d'une matrice « tridiagonale »)**

Soient  $x, y \in \mathbb{C}$  et  $n \in \llbracket 2 ; +\infty \rrbracket$ .

On considère la matrice  $M_n = (m_{ij})_{(i,j) \in \llbracket 1;n \rrbracket^2} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  définie par :

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1 ; n \rrbracket^2, m_{ij} = \begin{cases} 0 & \text{si } |i - j| \geq 2 \\ xy & \text{si } i - j = -1 \\ x + y & \text{si } i - j = 0 \\ 1 & \text{si } i - j = 1 \end{cases}$$

Calculer le déterminant de  $M_n$ .

*Indication* : poser  $u_n = \det M_n$  et montrer que la suite  $(u_n)_n$  vérifie une relation de récurrence linéaire d'ordre 2 :  $\forall n \in \llbracket 2 ; +\infty \rrbracket, au_{n+2} + bu_{n+1} + cu_n = 0$  (avec  $a, b, c \in \mathbb{C}$ ) puis en déduire la valeur de  $u_n$  en fonction de  $n$  (utiliser l'exercice Exercice 14.5).

---

*Correction 19.26*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 19.27 (Exercice 14)**

Soit  $x \in \mathbb{C}$ .

On considère la matrice  $M = (m_{ij})_{(i,j) \in \llbracket 1;n \rrbracket^2} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  définie par :

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1 ; n \rrbracket^2, m_{ij} = \begin{cases} 0 & \text{si } |i - j| \geq 2 \\ x & \text{si } |i - j| = 1 \\ 2x & \text{si } i = j \end{cases}$$

Calculer le déterminant de  $M$ .



---

**Exercice 19.29 (Exercice 15)**

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

On note  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  la base canonique de  $\mathbb{R}^n$ .

- (1) Soit  $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ . Justifier qu'il existe un unique endomorphisme  $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$  tel que

$$\forall j \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, \quad u(e_j) = e_{\sigma(j)}.$$

Dans la suite, on note  $u_\sigma$  cet endomorphisme et on note  $M_\sigma$  sa matrice dans  $\mathcal{B}$ . Les matrices de la forme  $M_\sigma$ , où  $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ , sont appelées matrices de permutation.

- (2) On suppose ici  $n = 3$ . Donner la matrice de permutation  $M_\sigma$  pour toute permutation  $\sigma \in \mathfrak{S}_3$ .

- (3) Montrer que l'application

$$\begin{array}{ccc} \varphi : \mathfrak{S}_n & \longrightarrow & \text{GL}(\mathbb{R}^n) \\ \sigma & \longmapsto & u_\sigma \end{array}$$

est bien définie et est un morphisme de groupes.

- (4) En déduire un morphisme de groupes de  $\mathfrak{S}_n$  vers  $\text{GL}_n(\mathbb{R})$ .

- (5) Soit  $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ . Calculer le déterminant de  $u_\sigma$ .

---

**Exercice 19.31 (Exercice 16)**

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

On note  $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$  l'ensemble des matrices carrées de taille  $n$  à coefficients dans  $\mathbb{Z}$ .

- (1) Vérifier que  $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$  est un sous-anneau de  $(\mathcal{M}_n(\mathbb{R}), +, \times)$ .
- (2) Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ . Donner une CNS sur  $\det A$  pour que  $A$  soit inversible dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ .
- (3) Montrer que  $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$  possède une infinité d'éléments inversibles si  $n \geq 2$ .

---

*Correction 19.32*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 19.33 (Exercice 17, ENSAM PSI 2016 (BEOS 2727))**

Soit  $P \in \mathbb{R}[X]$  un polynôme de degré 3.

On lui associe la famille de vecteurs de  $\mathbb{R}_4[X]$  :

$$\mathcal{F} = (P, XP, P', XP', X^2P').$$

On note  $D$  le déterminant de cette famille dans la base canonique de  $\mathbb{R}_4[X]$ .

- (1) Montrer que  $D$  est nul si, et seulement si, il existe deux polynômes non-nuls  $U \in \mathbb{R}_1[X]$  et  $V \in \mathbb{R}_2[X]$  tels que  $PU = P'V$ .
- (2) Montrer que  $D$  est nul si, et seulement si, le polynôme  $P$  admet une racine multiple.
- (3) Calculer  $D$  si  $P = aX^3 + bX^2 + cX$ .

---

*Correction 19.34*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 19.35 (Exercice 18, polynômes interpolateurs de Lagrange)**

Soient  $x_0, \dots, x_n \in \mathbb{K}$  des scalaires deux à deux distincts.

On note  $\mathcal{B} = (1, X, \dots, X^n)$  la base canonique de  $\mathbb{K}_n[X]$ .

On note  $L_0, \dots, L_n \in \mathbb{K}_n[X]$  les polynômes définis par :

$$\forall j \in \llbracket 0 ; n \rrbracket, \quad L_j = \prod_{k \in \llbracket 0 ; n \rrbracket \setminus \{j\}} \frac{X - x_k}{x_j - x_k}.$$

- (1) Montrer que  $(L_0, \dots, L_n)$  est une base de  $\mathbb{K}_n[X]$ .
- (2) Calculer  $\det_{\mathcal{B}}(L_0, \dots, L_n)$ .

---

*Correction 19.36*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 19.37 (Exercice 19, ENSEA PSI 2018)**

Soient  $E$  un espace vectoriel de dimension 3,  $u \in \mathcal{L}(E)$  et  $\mathcal{B}$  une base de  $E$ .

Étudier l'application

$$\begin{aligned} \varphi : E^3 &\longrightarrow \mathbb{K} \\ (x, y, z) &\longmapsto \det_{\mathcal{B}}(u(x), y, z) + \det_{\mathcal{B}}(x, u(y), z) + \det_{\mathcal{B}}(x, y, u(z)) \end{aligned}$$

---

*Correction 19.38*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 19.39 (Exercice 20, TPE PSI 2018)**

Soient  $a, b, r_1, \dots, r_n \in \mathbb{R}$ .

On pose :

$$A = \begin{pmatrix} r_1 & a & \dots & a \\ b & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & a \\ b & \dots & b & r_n \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \forall x \in \mathbb{R}, \Delta(x) = \begin{vmatrix} r_1 + x & a + x & \dots & a + x \\ b + x & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & a + x \\ b + x & \dots & b + x & r_n + x \end{vmatrix}$$

(1) Montrer que la fonction  $\Delta$  est polynomiale de degré au plus 1.

(2) En déduire  $\det A$  si  $a \neq b$ .

(3) Supposons  $a = b$ . Comment calculer  $\det A$  ?

---

*Correction 19.40*

★★ À venir ★★

# Chapitre 20

## Séries, familles sommables

Dans tout le TD, on admet  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$  et  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$ .

---

### Exercice 20.1 (Exercice 1)

Soient  $a, b, c \in \mathbb{R}$ .

Déterminer la nature des séries suivantes, dont on notera  $x_n$  les termes généraux :

- (1)  $\sum_n \frac{1}{n\sqrt[n]{n}}$ .
- (2)  $\sum_n \left( \exp \frac{1}{n} - \exp \frac{1}{n+1} \right)$ .
- (3)  $\sum_n \left( e - \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^n \right)$ .
- (4)  $\sum_n \ln \frac{n^2 + n + 1}{n^2 + n - 1}$ .
- (5)  $\sum_n \frac{1}{n^a 4^n} \binom{2n}{n}$ .
- (6)  $\sum_n \left( a\sqrt{n} + b\sqrt{n+1} + c\sqrt{n+2} \right)$ .
- (7)  $\sum_n \frac{1}{\ln^n n}$ .
- (8)  $\sum_n \frac{n!^a}{(2n)!}$ .
- (9)  $\sum_n \frac{\sqrt{n} \ln n}{e^n}$ .
- (10)  $\sum_n \frac{1}{(\ln(\ln n))^n}$ .
- (11)  $\sum_n \int_0^1 \tan^n t \, dt$ .

$$(12) \sum_n \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^{n^2} t \, dt.$$

---

*Correction 20.2*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 20.3 (Exercice 2)**

Déterminer si les séries suivantes sont convergentes et calculer alors leur somme :

$$\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n(n+1)(n+2)} \quad \text{et} \quad \sum_{n \geq 0} \ln \left( \cos \frac{x}{2^n} \right) \quad \text{où } x \in \left] 0 ; \frac{\pi}{2} \right[.$$

---

*Correction 20.4*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 20.5 (Exercice 3, classique)**

(1) Soit  $\sum_n u_n$  une série à termes positifs.

On suppose la série  $\sum_n u_n$  convergente. La série  $\sum_n u_n^2$  est-elle convergente ?

Inversement, si l'on suppose  $\sum_n u_n^2$  convergente, la série  $\sum_n u_n$  est-elle convergente ?

(2) L'implication montrée ci-dessus reste-t-elle vraie si l'on ne suppose pas que les termes de la suite  $(u_n)_n$  sont positifs ?

---

*Correction 20.6*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 20.7 (Exercice 4, TPE)**

On pose :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad u_n = \left( n \sin \frac{1}{n} \right)^{n^2}.$$

(1) Déterminer  $\ell = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ .

(2) Déterminer la nature de la série  $\sum_n (u_n - \ell)$ .

---

*Correction 20.8*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 20.9 (Exercice 5, ENSEA)**

(1) Montrer qu'on a, quand  $x$  tend vers 1 :

$$\operatorname{Arccos} x \sim \sqrt{2(1-x)}.$$

(2) Donner la nature de la série

$$\sum_n \operatorname{Arccos} \frac{n^2 + n + 1}{n^2 + n + 3}.$$

---

*Correction 20.10*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 20.11 (Exercice 6, séries de Bertrand)**

Donner une CNS sur  $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$  pour que la série

$$\sum_n \frac{1}{n^\alpha \ln^\beta n}$$

soit convergente.

---

*Correction 20.12*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 20.13 (Exercice 7)**

(1) Montrer que la série  $\sum_{n \geq 1} \sin\left(\pi n + \frac{\pi}{n}\right)$  est convergente.

On note  $S = \sum_{n=1}^{+\infty} \sin\left(\pi n + \frac{\pi}{n}\right)$  la somme de cette série.

(2) Donner un rang  $N \in \mathbb{N}^*$  tel que :

$$\left| S - \sum_{n=1}^N \sin\left(\pi n + \frac{\pi}{n}\right) \right| \leq 10^{-3}.$$

---

*Correction 20.14*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 20.15 (Exercice 8)**

Montrer que la somme

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-8)^n}{(2n)!}$$

est bien définie et donner sa partie entière.

---

*Correction 20.16*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 20.17 (Exercice 9, Mines)**

La série

$$\sum_n \ln \left( 1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \right)$$

est-elle convergente ?

---

*Correction 20.18*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 20.19 (Exercice 10)**

Donner une CNS sur  $x \in \mathbb{R}$  pour que la série suivante converge :

$$\sum_n \frac{x^n}{1 + x^{2n}}.$$

---

*Correction 20.20*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 20.21 (Exercice 11)**

Donner une CNS sur  $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$  pour que la série suivante converge :

$$\sum_{n \geq 2} \frac{(-1)^n}{n^\alpha + (-1)^n}.$$

---

Correction 20.22

★★ À venir ★★

---

**Exercice 20.23 (Exercice 12)**

Soit  $(u_n)_n$  une suite telle que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = \frac{e^{-u_n}}{n+1}.$$

- (1) Déterminer la nature de la série  $\sum_n u_n$ .
  - (2) Déterminer la nature de la série  $\sum_n (-1)^n u_n$ .
- 

Correction 20.24

★★ À venir ★★

---

**Exercice 20.25 (Exercice 13)**

Soit  $n \in \mathbb{N}$ .

On pose :

$$a_n = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}.$$

- (1) Justifier que  $a_n$  est un entier relatif.
  - (2) Montrer que la série  $\sum_{k \geq n+1} \frac{(-1)^k}{k!}$  converge. On note  $R_n$  sa somme.
  - (3) Donner le signe de  $R_n$  en fonction de  $n$ .
  - (4) On suppose  $n \geq 2$ . Montrer que  $a_n$  est l'entier relatif le plus proche de  $\frac{n!}{e}$ .
- 

Correction 20.26

★★ À venir ★★



---

**Exercice 20.27 (Exercice 14)**

On pose :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k!}.$$

(1) Quelle est la limite de la suite  $(R_n)_n$  ?

(2) Montrer :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad 0 \leq R_n \leq \frac{1}{nn!}.$$

(3) En déduire un équivalent de  $R_{n-1}$  quand  $n$  tend vers  $+\infty$ .

(4) Déterminer la nature des séries

$$\sum_n \sin(2e\pi n!) \quad \text{et} \quad \sum_n \sin(e\pi n!).$$

---

*Correction 20.28*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 20.29 (Exercice 15, CCP)**

On pose :

$$\forall n \in \llbracket 2 ; +\infty \llbracket, \quad u_n = \left( \frac{\ln(n+1)}{\ln n} \right)^n.$$

(1) Déterminer la limite de la suite  $(u_n)_n$ .

(2) Déterminer la nature de la série  $\sum_n \frac{u_n - 1}{n}$ .

On admet<sup>1</sup> que la série de Bertrand  $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n \ln n}$  diverge.

---

*Correction 20.30*

★★ À venir ★★

---

1. Cf. Exercice 20.11.

---

**Exercice 20.31 (Exercice 16)**

On considère une suite  $(u_n)_n$  telle que :

$$u_0 \in ]0 ; \pi[ \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = \sin u_n.$$

(1) Montrer :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad 0 < u_n < \pi.$$

(2) Étudier la croissance de la suite  $(u_n)_n$  puis sa limite.

(3) Montrer :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{u_{n+1}^2} - \frac{1}{u_n^2} = \frac{1}{3}.$$

(4) En déduire un équivalent de  $u_n$  quand  $n$  tend vers  $+\infty$ .

*On admet<sup>2</sup> que si  $(a_n)_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  converge vers  $\ell \in \mathbb{R}$  alors sa « moyenne de Cesàro » converge aussi vers  $\ell$  :*

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k = \ell.$$

---

*Correction 20.32*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 20.33 (Exercice 17)**

Soit  $(u_n)_n$  une suite décroissante de réels positifs.

On suppose que la série  $\sum_n u_n$  est convergente.

Montrer :

$$u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} o\left(\frac{1}{n}\right).$$

---

*Correction 20.34*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 20.35 (Exercice 18, astuces à retenir)**

Calculer :

$$S_2 = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} \quad S'_2 = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} \quad S_4 = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(2k+1)^4} \quad S'_4 = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^4}.$$

---

2. Cf. Exercice 5.25.

---

*Correction 20.36*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 20.37 (Exercice 19)**

Calculer

$$S = \sum_{a=1}^{+\infty} \sum_{b=a}^{+\infty} \frac{1}{b^3}.$$

---

*Correction 20.38*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 20.39 (Exercice 20)**

On pose :

$$I = \{(k, n) \in \mathbb{N}^2 \mid 1 \leq k \leq n\} \quad I' = \{(k, n) \in \mathbb{N}^2 \mid 1 \leq n \leq k\} \quad I'' = (\mathbb{N}^*)^2.$$

Les familles suivantes sont-elles sommables ? Le cas échéant, calculer leur somme :

$$\left( \frac{(-1)^{n-1}}{nk(k+1)} \right)_{(k,n) \in I} \quad \left( \frac{(-1)^{n-1}}{nk(k+1)} \right)_{(k,n) \in I'} \quad \left( \frac{(-1)^{n-1}}{nk(k+1)} \right)_{(k,n) \in I''}.$$

---

*Correction 20.40*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 20.41 (Exercice supplémentaire)**

On pose :

$$I = \{(k, n) \in \mathbb{N}^2 \mid 0 < k < n\}.$$

La famille suivante est-elle sommable ? Le cas échéant, calculer sa somme :

$$\mathcal{G} = \left( \frac{1}{2^n} \exp \frac{2ik\pi}{n} \right)_{(k,n) \in I}.$$

---

*Correction 20.42*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 20.43 (Exercice 21)**

Déterminer si la série de terme général  $u_n$  est convergente et calculer alors sa somme dans les cas suivants :

$$(1) \quad \forall n \in \llbracket 2 ; +\infty \rrbracket, \quad u_n = \sum_{p=1}^{n-1} \frac{1}{p^2 (n-p)^2}.$$

$$(2) \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{2^{n-k} k!}.$$

---

*Correction 20.44*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 20.45 (Exercice 22)**

(1) Calculer

$$S = \sum_{(a,b) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}} \frac{1}{(a^2 + b)(a^2 + b + 1)}.$$

(2) En déduire :

$$S' = \sum_{n \in \mathbb{N}^*} \frac{\lfloor \sqrt{n} \rfloor}{n(n+1)}.$$

---

*Correction 20.46*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 20.47 (Exercice 23, X MP)**

On note  $I$  l'ensemble des entiers naturels non-nuls dont l'écriture décimale ne comporte pas le chiffre 9.

La famille  $\left(\frac{1}{n}\right)_{n \in I}$  est-elle sommable ?

---

*Correction 20.48*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 20.49 (Exercice 24)**

On note  $P$  (comme « puissances ») l'ensemble des entiers qui s'écrivent sous la forme  $a^b$  où  $a, b \in \llbracket 2 ; +\infty \rrbracket$ .

- (1) Calculer  $\sum_{a=2}^{+\infty} \sum_{b=2}^{+\infty} \frac{1}{a^b}$ .
- (2) En déduire  $\sum_{m \in P} \frac{1}{m-1}$  (formule due à Euler).

---

*Correction 20.50*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 20.51 (Exercice 25)**

Calculer la partie entière des sommes suivantes :

$$S_1 = \sum_{n=1}^{10^9} \frac{1}{n^{2/3}} \quad \text{et} \quad S_2 = \sum_{n=1}^{10^{12}} \frac{1}{n^{2/3}}.$$

---

*Correction 20.52*

★★ À venir ★★

# Chapitre 21

## Espaces préhilbertiens

---

### Exercice 21.1 (Exercice 1)

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

On munit  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  de son produit scalaire canonique :

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \times \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) &\longrightarrow \\ (A, B) &\longmapsto \operatorname{tr}({}^tAB) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}b_{ij} \end{aligned}$$

et on note  $\|\cdot\|$  la norme associée.

- (1) Calculer  $\|I_n\|$ .
- (2) Déterminer l'orthogonal de  $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$  dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ .
- (3) Montrer :

$$\forall A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \quad \|AB\| \leq \|A\| \|B\|.$$

---

*Correction 21.2*

★★ À venir ★★

---

### Exercice 21.3 (Exercice 2)

Soient  $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$  un espace préhilbertien réel et  $F$  et  $G$  deux sous-espaces vectoriels de  $E$ .

- (1) Montrer  $(F + G)^\perp = F^\perp \cap G^\perp$ .
- (2) Montrer  $F \subseteq G \implies G^\perp \subseteq F^\perp$ .

On suppose désormais que  $E$  est de dimension finie.

- (3) Montrer  $(F^\perp)^\perp = F$ .

(4) Montrer  $(F \cap G)^\perp = F^\perp + G^\perp$ .

(5) Montrer  $F \subseteq G \iff G^\perp \subseteq F^\perp$ .

---

*Correction 21.4*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 21.5 (Exercice 3)**

(1) Montrer que l'application

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{R}[X] \times \mathbb{R}[X] &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (P, Q) &\longmapsto \int_{-1}^1 P(t) Q(t) dt \end{aligned}$$

est un produit scalaire sur le  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel  $\mathbb{R}[X]$ .

(2) Appliquer l'algorithme de Gram-Schmidt à la base canonique de  $\mathbb{R}_3[X]$ .

---

*Correction 21.6*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 21.7 (Exercice 4, CCP PSI 2012)**

Déterminer les réels  $a, b, c, d$  tels que l'intégrale

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left( \sin x - ax^3 - bx^2 - cx - d \right)^2 dx$$

soit la plus petite possible.

---

*Correction 21.8*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 21.9 (Exercice 5, CCP PSI)**

On munit  $\mathbb{R}^4$  de son produit scalaire canonique et de sa base canonique  $\mathcal{B}_0$ .

Donner la matrice dans  $\mathcal{B}_0$  de la projection orthogonale sur le plan

$$\Pi : \begin{cases} x + 2y + z + 2t = 0 \\ x - y + z - t = 0 \end{cases}$$

---

*Correction 21.10*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 21.11 (Exercice 6)**

Calculer :

$$\inf_{a,b,c \in \mathbb{R}} \int_{-1}^1 \left( t^3 - at^2 - bt - c \right)^2 dt.$$

---

*Correction 21.12*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 21.13 (Exercice 7)**

Calculer :

$$\inf_{a,b,c \in \mathbb{R}} \int_0^1 \left( e^t - at^2 - bt - c \right)^2 dt.$$

---

*Correction 21.14*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 21.15 (Exercice 8)**

On munit  $\mathbb{R}^3$  de son produit scalaire canonique.

On note  $H$  l'hyperplan de  $\mathbb{R}^3$  d'équation cartésienne

$$x + y - z = 0$$

(dans la base canonique).

Déterminer la matrice de la projection orthogonale sur  $H$ .

---

*Correction 21.16*

★★ À venir ★★



---

**Exercice 21.17 (Exercice 9)**

Soient  $E$  un espace euclidien,  $u \in \mathcal{L}(E)$  et  $x \in E$ .

On note  $S$  la sphère unité de  $E$  :

$$S = \{y \in E \mid \|y\| = 1\}.$$

Montrer :

$$\|x\| = \max_{y \in S} \langle y \mid x \rangle.$$

---

*Correction 21.18*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 21.19 (Exercice 10)**

Soient  $E$  et  $F$  des espaces euclidiens dont on note  $\|\cdot\|_E$  et  $\|\cdot\|_F$  les normes,  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  une base orthonormée de  $E$  et  $u \in \mathcal{L}(E, F)$ .

On suppose que la famille  $(u(e_1), \dots, u(e_n)) \in F^n$  est orthonormale.

Montrer :

$$\forall x \in E, \quad \|u(x)\|_F = \|x\|_E.$$

---

*Correction 21.20*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 21.21 (Exercice 11)**

Soit  $f \in \mathcal{C}^0([0; 1], \mathbb{R})$  positive et non-nulle.

On pose :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad I_n = \int_0^1 f^n(t) \, dt$$

et :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = \frac{I_{n+1}}{I_n}.$$

(1) Justifier :  $\forall n \in \mathbb{N}, \quad I_n > 0$ .

(2) Montrer que  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est croissante.

---

*Correction 21.22*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 21.23 (Exercice 12, Centrale)**

Soient  $E$  un espace euclidien dont on note le produit scalaire  $(x, y) \mapsto \langle x | y \rangle$  et  $f \in \mathcal{L}(E)$ .

On considère l'application

$$g : \begin{array}{ccc} E^2 & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ (x, y) & \longmapsto & \langle f(x) | f(y) \rangle \end{array}$$

(1) Donner une CNS sur  $f$  pour que  $g$  soit un produit scalaire.

(2) On suppose désormais :

$$\forall x, y \in E, \langle x | y \rangle = 0 \iff \langle f(x) | f(y) \rangle = 0.$$

(a) Montrer que  $f$  est inversible.

(b) Montrer :

$$\exists \lambda \in \mathbb{R}_+^*, \langle f(x) | f(y) \rangle = \lambda \langle x | y \rangle.$$

---

*Correction 21.24*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 21.25 (Exercice 13, CCP PSI 2016)**

On pose :

$$\forall P, Q \in \mathbb{R}_3[X], \varphi(P, Q) = \int_{-1}^1 P(t) Q(t) dt.$$

(1) Montrer que  $\varphi$  est un produit scalaire.

(2) Calculer le projeté orthogonal de  $X^3$  sur  $\mathbb{R}_2[X]$ .

---

*Correction 21.26*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 21.27 (Exercice supplémentaire)**

Soient  $E$  un espace préhilbertien réel dont on note  $\|\cdot\|$  la norme et  $p \in \mathcal{L}(E)$  un projecteur.

Montrer :

$$p \text{ est un projecteur orthogonal} \iff \forall x \in E, \|p(x)\| \leq \|x\|.$$

**Exercice 21.29 (Exercice 14, sous-espace vectoriel sans supplémentaire orthogonal)**

On considère le  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel  $E = \mathcal{C}^0([0; 1], \mathbb{R})$  muni de son produit scalaire usuel :

$$\forall f, g \in E, \quad \langle f \mid g \rangle = \int_0^1 f(t) g(t) dt$$

et de la norme associée :

$$\forall f \in E, \quad \|f\| = \sqrt{\int_0^1 f^2(t) dt}.$$

- (1) Justifier que  $F = \{f \in E \mid f(0) = 0\}$  est un hyperplan de  $E$ .

Soit  $f \in E$ . On pose :

$$\begin{aligned} \forall n \in \mathbb{N}^*, \quad f_n : [0; 1] &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \begin{cases} n f\left(\frac{1}{n}\right) x & \text{si } x \leq \frac{1}{n} \\ f(x) & \text{sinon} \end{cases} \end{aligned}$$

- (2) Montrer :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \|f_n - f\| = 0.$$

- (3) En déduire :

$$F^\perp = \{0_E\}.$$

- (4)  $F$  admet-il un supplémentaire orthogonal dans  $E$  ?

- (5) Que vaut  $(F^\perp)^\perp$  ?

**Exercice 21.31 (Exercice 15)**

Soient  $E$  un espace euclidien et  $v_1, \dots, v_p$  des vecteurs de  $E$  tels que :

$$\forall i, j \in \llbracket 1; p \rrbracket, \quad i \neq j \implies \langle v_i \mid v_j \rangle < 0.$$

- (1) Montrer :

$$\forall \lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{R}, \quad \left\| \sum_{i=1}^p |\lambda_i| v_i \right\| \leq \left\| \sum_{i=1}^p \lambda_i v_i \right\|.$$

- (2) Montrer que toute sous-famille à  $p - 1$  éléments de  $(v_1, \dots, v_p)$  est libre.

---

**Exercice 21.33 (Exercice 16, endomorphismes « symétriques »)**

Soit  $E$  un espace euclidien de dimension  $n \in \mathbb{N}^*$ .

On dit qu'un endomorphisme  $u \in \mathcal{L}(E)$  est symétrique si l'on a :

$$\forall x, y \in E, \langle u(x) | y \rangle = \langle x | u(y) \rangle.$$

- (1) Les homothéties de  $E$  sont-elles des endomorphismes symétriques ?
- (2) Soit  $u \in \mathcal{L}(E)$  un endomorphisme symétrique. Montrer que  $\ker u$  et  $\operatorname{Im} u$  sont des supplémentaires orthogonaux.
- (3) Soit  $p \in \mathcal{L}(E)$  un projecteur. Montrer l'équivalence :

$$p \text{ est un endomorphisme symétrique } \iff p \text{ est un projecteur orthogonal.}$$

- (4) Soient  $u \in \mathcal{L}(E)$  et  $\mathcal{B}$  une base orthonormée de  $E$ . Montrer :

$$u \text{ est un endomorphisme symétrique } \iff \operatorname{Mat}_{\mathcal{B}}(u) \text{ est une matrice symétrique.}$$

---

**Exercice 21.35 (Exercice 17, matrices « orthogonales »)**

Soient  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $A = (a_{ij})_{(i,j)} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ .

On note  $(C_1, \dots, C_n) \in (\mathbb{R}^n)^n$  la famille des colonnes de  $A$  :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} = (C_1 \quad \dots \quad C_n).$$

La matrice  $A$  est dite orthogonale si la famille  $(C_1, \dots, C_n)$  est une base orthonormée de  $\mathbb{R}^n$  pour le produit scalaire usuel.

- (1) Exprimer la matrice suivante en fonction de  $A$  par une formule simple :

$$M = \begin{pmatrix} \langle C_1 | C_1 \rangle & \dots & \langle C_1 | C_n \rangle \\ \vdots & & \vdots \\ \langle C_n | C_1 \rangle & \dots & \langle C_n | C_n \rangle \end{pmatrix}.$$

- (2) Compléter :

$$A \text{ est une matrice orthogonale } \iff A \text{ est inversible, d'inverse ...}$$

---

*Correction 21.36*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 21.37 (Exercice 18)**

Soit  $\sigma \in \mathfrak{S}_{\mathbb{N}}$ .

- (1) Déterminer la nature de la série  $\sum_n \frac{1}{n\sigma(n)}$ .
- (2) Montrer que la série  $\sum_n \frac{\sigma(n)}{n^2}$  est divergente.

*Indication* : considérer les sommes partielles de la série :  $\forall N \in \mathbb{N}, S_N = \sum_{n=1}^N \frac{\sigma(n)}{n^2}$  et minorer  $S_{2N} - S_N$ .

---

*Correction 21.38*

★★ À venir ★★

# Chapitre 22

## Fonctions de deux variables réelles

---

### Exercice 22.1 (Exercice 1, ouverts de $\mathbb{R}^2$ )

(1) Soit  $(U_i)_{i \in I}$  une famille d'ouverts de  $\mathbb{R}^2$  (où  $I$  est un ensemble). Montrer que  $\bigcup_{i \in I} U_i$  est un ouvert de  $\mathbb{R}^2$ .

(2) Soient  $U_1, \dots, U_n$  des ouverts de  $\mathbb{R}^2$  (où  $n \in \mathbb{N}^*$ ). Montrer que  $\bigcap_{k=1}^n U_i$  est un ouvert de  $\mathbb{R}^2$ .

---

*Correction 22.2*

★★ À venir ★★

---

### Exercice 22.3 (Exercice 2)

En quels points la fonction

$$\begin{aligned} f : \quad \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\longmapsto \begin{cases} \frac{y^2}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \end{aligned}$$

est-elle continue ?

---

*Correction 22.4*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 22.5 (Exercice 3)**

En quels points la fonction

$$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \longmapsto \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

- (1) En quels points  $f$  est-elle continue ?
- (2) En quels points  $f$  admet-elle des dérivées partielles ?
- (3)  $f$  est-elle de classe  $\mathcal{C}^1$  ?

---

*Correction 22.6*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 22.7 (Exercice 4, à propos du théorème de Schwarz)**

On pose :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

- (1) La fonction  $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$  est-elle continue ?
- (2) Admet-elle des dérivées partielles ? Le cas échéant, les calculer.
- (3) Est-elle de classe  $\mathcal{C}^1$  ?
- (4) Calculer  $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0)$  et  $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0)$ .

---

*Correction 22.8 (1)*

On a  $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}, \quad \left| \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \right| \leq 1$ .

Donc  $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}, \quad |f(x, y)| \leq |xy|$ .

Si  $\begin{cases} |x| \leq \varepsilon \\ |y| \leq 1 \end{cases}$  alors  $|f(x, y)| \leq \varepsilon$  donc  $\delta = \varepsilon$  convient.

Donc  $f$  est continue.

---

*Correction 22.9 (2)*

On a :

$$\begin{aligned}\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}, \quad \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= y \left( \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \right) + yx \left( 2y^2 \times 2x \times (x^2 + y^2)^{-2} \right) \\ &= \frac{y(x^2 - y^2)(x^2 + y^2) + 4y^3x^2}{(x^2 + y^2)^2} \\ &= \frac{y(x^4 - y^4 + 4y^2x^2)}{(x^2 + y^2)^2}\end{aligned}$$

et  $\forall x \in \mathbb{R}, f(x, 0) = 0$ .

Donc  $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 0$ .

On obtient de même :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \begin{cases} -\frac{x(y^4 - x^4 + 4x^2y^2)}{(y^2 + x^2)^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

car on a :

$$\begin{aligned}\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad f(x, y) &= -f(y, x) \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= -\frac{\partial f}{\partial x}(y, x) \quad \left. \vphantom{\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)} \right\} \frac{\partial}{\partial y}\end{aligned}$$

---

**Exercice 22.10 (Exercice 5)**

On pose :

$$f(x, y) = \operatorname{Arctan} x + \operatorname{Arctan} y - \operatorname{Arctan} \frac{x+y}{1-xy}.$$

- (1) Donner trois ouverts « naturels »  $U_1$ ,  $U_2$  et  $U_3$  tels que l'ensemble de définition de  $f$  soit  $U_1 \cup U_2 \cup U_3$ .
- (2) Montrer que  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$ .
- (3) Déterminer  $f$ .

---

*Correction 22.11*

★★ À venir ★★



---

**Exercice 22.12 (Exercice 6)**

Dire pour chacune des équations suivantes s'il existe une solution (fonction de classe  $\mathcal{C}^1$  sur l'ensemble indiqué).

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}, \quad (E_1) \quad \nabla f(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2} \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}$$

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}, \quad (E_2) \quad \nabla f(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2} \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}$$

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad (E_3) \quad \nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}$$

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}, \quad (E_4) \quad \nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}$$

*Indication :* pour  $(E_1)$ , supposer par l'absurde qu'une telle fonction  $f$  existe et calculer la dérivée de

$$\begin{aligned} g : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ \theta &\longmapsto f(\cos \theta, \sin \theta) \end{aligned}$$

*Remarque :* concernant  $(E_3)$  et  $(E_4)$ , la façon la plus simple de conclure serait d'utiliser le théorème de Schwarz que vous verrez en deuxième année.

---

*Correction 22.13*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 22.14 (Exercice 7)**

Soit  $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$  une fonction telle que :

$$\forall t, x, y \in \mathbb{R}, \quad f(tx, ty) = tf(x, y).$$

(1) Montrer :

$$\forall t, x, y \in \mathbb{R}, \quad f(x, y) = x \frac{\partial f}{\partial x}(tx, ty) + y \frac{\partial f}{\partial y}(tx, ty).$$

*Indication :* dériver de deux façons la fonction

$$\begin{aligned} g : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ t &\longmapsto f(tx, ty) \end{aligned}$$

(2) En déduire que la fonction  $f$  est linéaire.

---

Remarque 22.16 (Compléments de cours)

- On dit qu'une partie  $A \subseteq \mathbb{R}^2$  est un fermé de  $\mathbb{R}^2$  si son complémentaire est un ouvert de  $\mathbb{R}^2$ .
- On admet le résultat suivant, qui sera un théorème du cours de deuxième année.

---

**Théorème 22.17**

Soit une fonction continue  $f : A \longrightarrow \mathbb{R}$  sur une partie  $A \subseteq \mathbb{R}^2$  non-vide, fermée et bornée.

Alors  $f$  est « bornée et atteint ses bornes », ce qui signifie qu'elle admet un maximum et un minimum (globaux).

---

**Exercice 22.18 (Exercice 8)**

Étudier les extrema de la fonction

$$\begin{aligned} f : \quad \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\longmapsto x^2 + xy + y^2 - 2x - y \end{aligned}$$

---

Correction 22.19

analyse

Soit  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ .

Supposons que  $f$  admet un extremum local en  $(x, y)$ .

Comme  $\mathbb{R}^2$  est un ouvert, on a  $\nabla f(x, y) = 0$ , c'est-à-dire :

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0 \end{cases}$$

Or on a :

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x + y - 2 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = x + 2y - 1 \end{cases}$$

D'où le système  $\begin{cases} 2x + y = 2 \\ x + 2y = 1 \end{cases}$

On a  $\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \neq 0$  donc d'après les formules de Cramer, on a :

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}} = 1 \quad \text{et} \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}} = 0.$$

synthèse

Soient  $h, k \in \mathbb{R}$ .

On a :

$$\begin{aligned} f(1+h, 0+k) &= (1+h)^2 + k(1+h) + k^2 - 2(1+h) - k + 1 \\ &= h^2 + k^2 + kh \\ &= \frac{h^2}{2} + \frac{k^2}{2} + \frac{1}{2}(h+k)^2 \\ &\geq 0. \end{aligned}$$

Donc  $f$  admet un minimum en  $(1, 0)$ .

conclusion

$f$  admet un minimum en  $(1, 0)$  et n'admet pas de maximum.

### Exercice 22.20 (Exercice 9)

Étudier les extrema de la fonction

$$\begin{aligned} f : \quad \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\longmapsto \frac{x+y}{(1+x^2)(1+y^2)} \end{aligned}$$

*Correction 22.21*

★★ À venir ★★

### Exercice 22.22 (Exercice 10)

Étudier les extrema de la fonction

$$\begin{aligned} f : \quad \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\longmapsto x^3 y^2 (1+x-y) \end{aligned}$$

---

Correction 22.23

★★ À venir ★★

---

**Exercice 22.24 (Exercice 11, CCP PSI 2015 BEOS)**

Soient les ensembles

$$K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq \pi \text{ et } 0 \leq y \leq \pi\} \quad \text{et} \quad T = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 < x < y < \pi\}.$$

On pose :

$$\forall (x, y) \in K, \quad F(x, y) = \begin{cases} x(\pi - y) & \text{si } 0 \leq x \leq y \leq \pi \\ y(\pi - x) & \text{si } 0 \leq y \leq x \leq \pi \end{cases}$$

- (1) Représenter  $K$  et  $T$ .
- (2) La fonction  $F$  admet-elle des extrema locaux sur  $T$  ?
- (3) La fonction  $F$  admet-elle un minimum sur  $K$  ? un maximum sur  $K$  ? Le cas échéant, déterminer leur valeur.

---

Correction 22.25

★★ À venir ★★

---

**Exercice 22.26 (Exercice 12)**

Résoudre l'équation aux dérivées partielles :

$$(E) \quad x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = x^3 y^3$$

d'inconnue  $f \in \mathcal{C}^1\left((\mathbb{R}_+^*)^2, \mathbb{R}\right)$  à l'aide du changement de variables :

$$(u, v) = \left(xy, \frac{x}{y}\right).$$

---

Correction 22.27

---

*Brouillon*

$$\text{On a } \begin{cases} x, y \in \mathbb{R}_+^* \\ u = xy \\ v = \frac{x}{y} \end{cases} \iff \begin{cases} u, v \in \mathbb{R}_+^* \\ x = \sqrt{uv} \\ y = \sqrt{\frac{u}{v}} \end{cases} \text{ et } f(x, y) = f\left(\sqrt{uv}, \sqrt{\frac{u}{v}}\right) = g(u, v) = g\left(xy, \frac{x}{y}\right).$$

---

Soit  $f \in \mathcal{C}^1 \left( (\mathbb{R}_+^*)^2, \mathbb{R} \right)$ .

On pose  $g : (\mathbb{R}_+^*)^2 \longrightarrow \mathbb{R}$  .  $g$  est de classe  $\mathcal{C}^1$ .  
 $(u, v) \longmapsto f \left( \sqrt{uv}, \sqrt{\frac{u}{v}} \right)$

$$\text{On a } \forall (x, y) \in (\mathbb{R}_+^*)^2, \begin{cases} f(x, y) = g \left( xy, \frac{x}{y} \right) \\ \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = y \frac{\partial g}{\partial u} \left( xy, \frac{x}{y} \right) + \frac{1}{y} \frac{\partial g}{\partial v} \left( xy, \frac{x}{y} \right) \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = x \frac{\partial g}{\partial u} \left( xy, \frac{x}{y} \right) - \frac{x}{y^2} \frac{\partial g}{\partial v} \left( xy, \frac{x}{y} \right) \end{cases}$$

Donc :

$$\begin{aligned} f \text{ est solution de } (E) &\iff \forall (x, y) \in (\mathbb{R}_+^*)^2, \quad 2xy \frac{\partial g}{\partial u} \left( xy, \frac{x}{y} \right) = x^3 y^3 \\ &\iff \forall (u, v) \in (\mathbb{R}_+^*)^2, \quad 2 \frac{\partial g}{\partial u}(u, v) = u^2 \\ &\iff \exists h \in \mathcal{F}(\mathbb{R}_+^*, \mathbb{R}), \quad \forall (u, v) \in (\mathbb{R}_+^*)^2, \quad 2g(u, v) = \frac{u^3}{3} + h(v) \\ &\iff \exists h \in \mathcal{F}(\mathbb{R}_+^*, \mathbb{R}), \quad \forall (x, y) \in (\mathbb{R}_+^*)^2, \quad 2f(x, y) = \frac{x^3 y^3}{3} + h\left(\frac{x}{y}\right). \end{aligned}$$

Donc les solutions de  $(E)$  sont les fonctions de la forme

$$(x, y) \longmapsto \frac{x^3 y^3}{6} + h\left(\frac{x}{y}\right)$$

avec  $h \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+^*, \mathbb{R})$ .

### Exercice 22.28 (Exercice 13)

Résoudre l'équation aux dérivées partielles :

$$(E) \quad x \frac{\partial f}{\partial x} - y \frac{\partial f}{\partial y} = (x^2 + y^2) \frac{y}{x}$$

d'inconnue  $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}, \mathbb{R})$ , en utilisant les coordonnées polaires :

$$(x, y) = (r \cos \theta, r \sin \theta).$$

Correction 22.29

★★ À venir ★★

# Chapitre 23

## Probabilités

---

### Exercice 23.1 (Exercice 1)

Donner le nombre d'anagrammes de chacun des noms suivants :

UGO      ROBIN      EMMY      METEHAN      PRISCILLA

---

*Correction 23.2*

★★ À venir ★★

---

### Exercice 23.3 (Exercice 2)

Soient  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $(\Omega, \mathbb{P})$  un espace probabilisé.

On note  $\Sigma : \Omega \longrightarrow \mathfrak{S}_n$  une permutation aléatoire telle que  $\Sigma \sim \mathcal{U}(\mathfrak{S}_n)$ .

Calculer les probabilités suivantes :

(1)  $\mathbb{P}(\Sigma \text{ est une transposition})$

(2)  $\mathbb{P}(\Sigma \text{ est un 3-cycle})$

(3)  $\mathbb{P}(\Sigma \text{ est un cycle})$

---

*Correction 23.4*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 23.5 (Exercice 3, suite de l'Exercice 15.21)**

On suppose que le corps  $\mathbb{K}$  est fini et on note  $q$  son cardinal :

$$q = \text{Card } \mathbb{K} < +\infty.$$

Soient  $r, n \in \mathbb{N}^*$  tels que  $r \leq n$  et  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension  $n$ .

- (1) Combien  $E$  possède-t-il de bases ?
- (2) Combien  $E$  possède-t-il de sous-espaces vectoriels de dimension  $r$  ?
- (3) Soit  $F$  un sous-espace vectoriel de  $E$  de dimension  $r$ .  
Combien possède-t-il de supplémentaires dans  $E$  ?
- (4) Combien y a-t-il de projecteurs de rang  $r$  dans  $\mathcal{L}(E)$  ?
- (5) Combien y a-t-il d'endomorphismes de rang  $r$  dans  $\mathcal{L}(E)$  ?

---

*Correction 23.6*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 23.7 (Exercice 4)**

Il existe dans ma ville deux compagnies de taxis : les « taxis-rouges » (5000 taxis) et les « taxis-verts » (250 taxis).

Je suis légèrement daltonien, et j'ai oublié hier mon parapluie dans un taxi.

Il me semble que le taxi était vert, mais je sais que je ne suis pas complètement fiable : je reconnais le rouge 3 fois sur 4, et le vert 4 fois sur 5.

À quelle compagnie devrais-je téléphoner en premier ?

---

*Correction 23.8*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 23.9 (Exercice 5)**

Dans une population donnée, 80% des individus programment en Python.

Parmi ceux qui programment en Python, 10% programment aussi en OCaml.

Parmi ceux qui programment en OCaml, 90% programment aussi en Python.

Quelle proportion de la population programme en OCaml ?

---

*Correction 23.10*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 23.11 (Exercice 6, TPE EIVP 2018)**

Un enfant possède vingt figurines qu'il place sur une étagère. Parmi celles-ci se trouvent des oiseaux et d'autres animaux.

- (1) S'il y a deux oiseaux, quelle est la probabilité qu'ils soient côte à côte sur l'étagère ?
  - (2) S'il y a cinq oiseaux, quelle est la probabilité qu'au moins deux oiseaux soient côte à côte sur l'étagère ?
- 

*Correction 23.12*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 23.13 (Exercice 7)**

On dispose de dix pièces de 1 euro.

L'une des dix pièces est fausse : la probabilité d'obtenir « pile » lorsqu'on la lance est  $\frac{2}{3}$ .

Les neuf vraies pièces sont équilibrées (on obtient « pile » et « face » avec la même probabilité lorsqu'on les lance).

- (1) On choisit l'une des dix pièces, on la lance, et on obtient « pile ».  
Quelle est la probabilité que la pièce choisie soit fausse ?
  - (2) On choisit une seconde pièce (différente de la première), on la lance, et on obtient encore « pile ».  
Quelle est la probabilité que la seconde pièce choisie soit fausse ?
- 

*Correction 23.14*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 23.15 (Exercice 8, Centrale PSI 2015 (BEOS 1743))**

Au rez-de-chaussée d'un immeuble à  $n$  étages,  $p$  personnes prennent l'ascenseur et s'arrêtent à un étage au hasard et de manière indépendante.

On note  $X$  la variable aléatoire qui donne le nombre d'arrêts de l'ascenseur.

On note  $X_i$  la variable aléatoire qui vaut 1 si l'ascenseur s'arrête à l'étage  $i$  et 0 sinon.



- (1) (a) Donner la loi des  $X_i$ .
- (b) Donner l'expression de  $X$  en fonction des  $X_i$ .
- (c) Calculer l'espérance de  $X$ .
- (2) Vérification avec Python du résultat obtenu.
  - (a) Écrire une fonction qui simule la variable aléatoire  $X$ .
  - (b) Pour  $n$  variant de 3 à 20 et avec  $p = 10$ , vérifier le résultat de la question (1c) pour 1000 répétitions de l'expérience.

*Correction 23.16*

★★ À venir ★★

### Exercice 23.17 (Exercice 9)

Soient  $n, s \in \llbracket 2 ; +\infty \llbracket$ .

On considère une urne contenant des boules de couleurs  $C_1, \dots, C_s$ .

On effectue  $n$  tirages successifs d'une boule avec remise.

Pour tout  $i \in \llbracket 1 ; s \rrbracket$ , on note :

$p_i$  la proportion des boules de couleur  $C_i$

$X_i$  le nombre de boules de couleur  $C_i$  obtenues à l'issue des  $n$  tirages.

- (1) Que valent les sommes  $\sum_{i=1}^s X_i$  et  $\sum_{i=1}^s p_i$  ?
- (2) Pour tout  $i \in \llbracket 1 ; s \rrbracket$ , déterminer la loi de  $X_i$ , son espérance et sa variance.
- (3) Soient  $i, j \in \llbracket 1 ; s \rrbracket$  tels que  $i \neq j$ .  
 Déterminer la loi de  $X_i + X_j$  et sa variance.  
 En déduire  $\text{Cov}(X_i, X_j) = -np_i p_j$ .

*Correction 23.18*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 23.19 (Exercice 10, X-Cachan PSI 2015 (BEOS 1204))****Exercice 1**

On considère une suite de  $n$  convertisseurs numériques fonctionnant de manière indépendante et placés en série. Chaque convertisseur restitue correctement le bit qu'on lui fournit avec la probabilité  $p$  et renvoie le bit opposé avec la probabilité  $1 - p$ , où  $p \in [0 ; 1]$ .

On note  $X_k$  le bit en sortie du  $k$ -ème convertisseur et  $X_0$  le bit en entrée de chaîne.

On définit la suite finie  $(A_k)_{k \in \llbracket 0; n \rrbracket}$  par  $A_k = \begin{pmatrix} \mathbb{P}(X_k = 1) \\ \mathbb{P}(X_k = 0) \end{pmatrix}$ .

- (1) Déterminer une relation de récurrence pour la suite  $(A_k)_{k \in \llbracket 0; n \rrbracket}$ .
- (2) En déduire la probabilité que le bit initial soit correctement rendu en sortie du  $n$ -ème convertisseur. Que se passe-t-il lorsqu'on fait tendre  $n$  vers  $+\infty$  ?

**Exercice 2 (modifié)**

On considère un dé non-pipé à six faces numérotées de 1 à 6.

On considère une suite de  $n$  lancers.

- (1) On note  $N_k$  le nombre d'apparitions de la face  $k \in \llbracket 1 ; 6 \rrbracket$  dans la suite des  $n$  lancers. Intuitivement, que peut-on dire de  $N_k$  lorsque  $n$  tend vers  $+\infty$  ? Rigoureusement, que donne la loi faible des grands nombres ?
- (2) On suppose que  $n = 6m$  est un multiple de 6. Quelle est la probabilité d'obtenir une suite de lancers telle que
$$\forall k \in \llbracket 1 ; 6 \rrbracket, N_k = m ?$$
- (3) Vérifier le résultat de la question précédente avec Python pour  $m \in \llbracket 1 ; 10 \rrbracket$ , en faisant pour chaque valeur de  $m$  une série de  $10^5$  lancers. Que remarque-t-on ?

---

*Correction 23.20***★★ À venir ★★**

---

**Exercice 23.21 (Exercice 11, Centrale maths 1 2016)**

On lance  $N$  fois une pièce de monnaie équilibrée.

On note  $(\Omega, \mathbb{P})$  un espace probabilisé modélisant le problème,  $X$  le nombre de « pile » et  $Y$  le nombre de « face » obtenus.

- (1) On suppose que  $N$  est un entier naturel non-nul fixé.
  - (a) Calculer la covariance de  $X$  et de  $Y$ .

(b) Les variables aléatoires  $X$  et  $Y$  sont-elles indépendantes ?

(2) ...

(3) ...

---

*Correction 23.22*

★★ À venir ★★

---

**Exercice 23.23 (Exercice 12)**

Soient  $n \in \mathbb{N}^*$ .

On note  $\Sigma : \Omega \longrightarrow \mathfrak{S}_n$  une permutation aléatoire telle que  $\Sigma \sim \mathcal{U}(\mathfrak{S}_n)$  et  $N$  le nombre de points fixes de  $\Sigma$  : c'est un entier aléatoire à valeurs dans  $\llbracket 0 ; n \rrbracket$ .

Dans la suite, on calcule l'espérance et la variance de  $N$ .

Pour cela, on définit des variables aléatoires  $X_1, \dots, X_n$  en posant :

$$\forall k \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, \quad X_k = \begin{cases} 1 & \text{si } k \text{ est un point fixe de } \Sigma \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

de sorte qu'on a :

$$N = X_1 + \dots + X_n.$$

(1) Que vaut  $\mathbb{P}(N = n)$  ?

(2) Donner les lois des variables aléatoires  $X_1, \dots, X_n$ .  
Sont-elles mutuellement indépendantes ?

(3) Calculer l'espérance de  $N$ .

(4) Soient deux entiers distincts  $i, j \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$ . Calculer l'espérance de  $X_i X_j$ .  
En déduire la covariance de  $X_i$  et  $X_j$ .  
Sont-elles indépendantes ?

(5) Calculer la variance de  $N$ .

(6) Montrer :

$$\mathbb{P}(N \geq 4) \leq \frac{1}{9}.$$

---

*Correction 23.24*

★★ À venir ★★

