

Конспект по математическому анализу

October 7, 2019

1 Скалярное произведение

Определение. Для X — линейного пространства (над \mathbb{R}, \mathbb{C}) $\varphi : X \times X \rightarrow \mathbb{R}(\mathbb{C})$ называется скалярным произведением. Обозначается $\varphi(x, y) = \langle x, y \rangle$

1. $\langle \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2, y \rangle = \alpha_1 \langle x_1, y \rangle + \alpha_2 \langle x_2, y \rangle$
2. $\langle y, x \rangle = \overline{\langle x, y \rangle}$
3. $\langle x, x \rangle \geq 0 \quad \langle x, x \rangle \Leftrightarrow x = 0$

Примечание. \bar{x} — комплексное сопряжение, для вещественных чисел $\bar{x} = x$.

1. Над \mathbb{C} : $\langle x, \beta_1 y_1 + \beta_2 y_2 \rangle = \overline{\langle x, \beta_1 y_1 + \beta_2 y_2 \rangle} = \overline{\beta_1 \langle y_1, x \rangle + \beta_2 \langle y_2, x \rangle} = \overline{\beta_1} \langle x, y_1 \rangle + \overline{\beta_2} \langle x, y_2 \rangle$
2. Над \mathbb{R} : $\langle y, x \rangle = \langle x, y \rangle$

Лемма 1. Неравенство КБШ (Коши-...)

Для X — линейного пространства (над \mathbb{R}, \mathbb{C})

$$\forall x, y \in X \quad |\langle x, y \rangle|^2 \leq \langle x, x \rangle \langle y, y \rangle$$

Proof. Возьмём $\lambda \in \mathbb{R}(\mathbb{C})$

При $y = 0$ тривиально, пусть $y \neq 0$

$$0 \leq \langle x + \lambda y, x + \lambda y \rangle = \langle x, x \rangle + \lambda \langle y, x \rangle + \bar{\lambda} \langle x, y \rangle + \lambda \bar{\lambda} \langle y, y \rangle$$

$$\lambda := -\frac{\langle x, y \rangle}{\langle y, y \rangle}, \bar{\lambda} = -\frac{\langle y, x \rangle}{\langle y, y \rangle}$$

$$0 \leq \langle x, x \rangle - \frac{\langle x, y \rangle}{\langle y, y \rangle} \langle y, x \rangle - \frac{\langle y, x \rangle}{\langle y, y \rangle} \langle x, y \rangle + \frac{\langle x, y \rangle \langle y, x \rangle}{\langle y, y \rangle}$$

$$0 \leq \langle x, x \rangle - \frac{\langle x, y \rangle}{\langle y, y \rangle} \langle y, x \rangle$$

□

Пример в \mathbb{R}^m : $\langle x, y \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_m y_m$ — Евклидово скалярное произведение

Пример в \mathbb{C}^m : $\langle x, y \rangle = x_1 \bar{y}_1 + x_2 \bar{y}_2 + \dots + x_m \bar{y}_m$

Лемма 2. Для лин. пространства X , скалярного произведения $\langle \cdot, \cdot \rangle$

$\rho : X \rightarrow \mathbb{R} \quad \rho(x) = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ — норма

Proof. Докажем, что ρ удовлетворяет всем леммам нормы.

$$1. \quad \rho(x) \geq 0 \quad \rho(x) = 0 \Leftrightarrow \langle x, x \rangle = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

$$2. \quad \rho(\alpha x) = \sqrt{\alpha \bar{\alpha} \langle x, x \rangle} = |\alpha| \sqrt{\langle x, x \rangle} = |\alpha| \rho(x)$$

$$3. \quad \rho(x + y) \leq \rho(x) + \rho(y)$$

$$\langle x + y, x + y \rangle \leq (\sqrt{\langle x, x \rangle} + \sqrt{\langle y, y \rangle})^2$$

$$\langle x, x \rangle + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle \leq \langle x, x \rangle + \langle y, y \rangle + 2\sqrt{\langle x, x \rangle \langle y, y \rangle}$$

$$2\Re \langle x, y \rangle \leq 2\sqrt{\langle x, x \rangle \langle y, y \rangle}$$

$$\Re \langle x, y \rangle \leq |\langle x, y \rangle| \leq \sqrt{\langle x, x \rangle \langle y, y \rangle}$$

□

$$\|x\| = \sqrt{\sum_{i=1}^m x_i^2} \text{ — норма в } \mathbb{R}^m$$

$$\rho(x, y) = \|x - y\| \text{ — метрика в } \mathbb{R}^m$$

Не все нормы порождены скалярным произведением, например: $\|x\| = \max_i |x_i|$

Лемма 3. О непрерывности скалярного произведения.

X — лин. пространство со скалярным произведением, $\|\cdot\|$ — норма, порожденная скалярным произведением.

Тогда $\forall (x_n) x_n \rightarrow x, \forall (y_n) y_n \rightarrow y, \quad \langle x_n, y_n \rangle \rightarrow \langle x, y \rangle$

Proof.

$$\begin{aligned} |\langle x_n, y_n \rangle - \langle x, y \rangle| &= |\langle x_n, y_n \rangle - \langle x_n, y \rangle + \langle x_n, y \rangle - \langle x, y \rangle| \leq |\langle x_n, y_n \rangle - \langle x_n, y \rangle| + |\langle x_n, y \rangle - \langle x, y \rangle| \leq \\ &\leq |\langle x_n, y_n - y \rangle| + |\langle x_n - x, y \rangle| \leq \|x_n\| \cdot \|y_n - y\| + \|x_n - x\| \cdot \|y\| \rightarrow 0 \end{aligned}$$

По теореме о двух городских чтд.

□

Лемма 4. О покоординатной сходимости в \mathbb{R}^m

$(x^{(n)})$ — последовательность векторов в \mathbb{R}^m

в \mathbb{R}^m задано евклидово скалярное пространство и норма.

Тогда $(x^{(n)}) \rightarrow x \Leftrightarrow \forall i \in \{1, 2, \dots, m\} \quad x_i^{(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x_i$

Примечание. В \mathbb{R}^∞ не выполняется

Proof. Модуль координаты \leq нормы всего вектора:

$$|x_i^{(n)} - x_i| \leq \|x^{(n)} - x\| \leq \sqrt{m} \max_{1 \leq i \leq m} |x_i^n - x_i|$$

Первое неравенство доказывает \Rightarrow , второе неравенство доказывает \Leftarrow □

Определение. Параллелепипед в \mathbb{R}^m

$$a, b \in \mathbb{R}^m \quad [a, b] = \{x \in \mathbb{R}^m : \forall i \in \{1 \dots m\} \quad a_i \leq x_i \leq b_i\} = [a_1 b_1] \times [a_2 b_2] \times \dots \times [a_m b_m]$$

Определение. Куб в \mathbb{R}^m

$$[(a_1 - R, a_2 - R, \dots a_m - R), (a_1 + R, a_2 + R, \dots a_m + R)]$$

$$\overline{B(a, R)} \subset \text{Куб}(a, R) \subset \overline{B(a, \sqrt{m}R)}$$

Proof. Докажем 1: $\overline{B(a, R)} \subset \text{Куб}(a, R)$

$$x \in \overline{B(a, R)}$$

$$\forall i \quad |x_i - a_i| \leq \|x - a\| \leq R \Rightarrow x \in \text{Куб}(a, R)$$

Докажем 2: $\text{Куб}(a, R) \subset \overline{B(a, \sqrt{m}R)}$

$$x \in \text{Куб}(a, R) \quad \|x - a\| \leq \sqrt{m} \max_{1 \leq i \leq m} |x_i - a_i| \leq \sqrt{m}R$$

□

2 Точки и множества в метрическом пространстве

В этом параграфе (X, ρ) - метрическое пространство, $a \in X, D \subset X$.

Определение. a — внутренняя точка множества D , если $\exists U(a) : U(a) \subset D$

$$\exists r > 0 : B(a, r) \subset D$$

Определение. D - открытое множество $\forall a \in D : a$ — внутренняя точка D .

Пример:

1. X - откр.
2. \emptyset - откр.
3. $B(a, r)$ - откр.

Proof. Докажем 3.

$x \in B(a, r)$, доказать: x - внутр. точка

Возьмём $R < r - \rho(a, x)$. Докажем, что $B(x, R) \subset B(a, r)$

$y \in B(x, R)$. Докажем, что $y \in B(a, r)$

$$\rho(y, a) \leq \rho(y, x) + \rho(x, a) < R + \rho(x, a) < r$$

□

Теорема 1. О свойствах открытых множеств.

1. $(G_\alpha)_{\alpha \in A}$ - семейство открытых множеств в (X, ρ)

Тогда $\bigcup_{\alpha \in A} G_\alpha$ - открыто в X .

2. G_1, G_2, \dots, G_n - открыто в X .

Тогда $\bigcap_{i=1}^n G_i$ - открыто в X .

Proof. 1. Пусть $x \in \bigcup_{\alpha \in A} G_\alpha$

Тогда $\exists \alpha_0 \quad x \in G_{\alpha_0}$ - откр. $\exists r_0 : B(x, r_0) \subset G_{\alpha_0} \Rightarrow B(x, r_0) \subset \bigcup_{\alpha \in A} G_\alpha$

2. $x \in \prod_{i=1}^n G_i \Rightarrow \forall i \in \{1 \dots n\} \quad x \in G_i \Rightarrow \exists r_i > 0 : B(x, r_i) \subset G_i$

$$r := \min(r_1 \dots r_n)$$

$$\forall i \quad B(x, r) \subset G_i, \text{ т.е. } B(x, r) \subset \bigcap G_i$$

□

Примечание. Для $n = \infty$ не выполняется: $(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n})$ - откр. в \mathbb{R}

$$\bigcup_{n=1}^{+\infty} (-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}) = \{0\} \text{ не откр. в } \mathbb{R}$$

Определение. Внутренность $D \quad \text{Int}(D) = \{x \in D : x \text{ - внутр. точка } D\}$

Примечание. 1. $\text{Int}D$ - откр. множество

$$2. \text{Int}D = \bigcap_{\substack{G: \\ D \supset G \\ G \text{ - откр.}}} G$$

3. D - откр. в $X \Leftrightarrow D = \text{Int}D$

Определение. a - предельная точка множества D

$$\forall \dot{U}(a) \quad \dot{U}(a) \cap D \neq \emptyset$$

Пример: $D = (0, 1), X = \mathbb{R}$

a	Пред. точка?
-1	Нет, $B(-1, \frac{1}{2}) \cap D = \emptyset$
$\frac{1}{2}$	Да, $B(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \subset D$
0	Да, $B(0, \frac{1}{2}) \cap D = (0, \frac{1}{2})$

Примечание. a - пред. точка D

1. $\forall U(a) \quad U(a) \cap D$ - бесконечное
2. $\exists (x_n) -$ последовательность точек $D, x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} a$

Определение. a - изолированная точка D , если $a \in D$ и a - не предельная.
 $\exists U(a) \quad U(a) \cap D = \{a\}$

Пример - \mathbb{N}

Определение. D - замкнутое множество, если оно содержит все свои предельные точки.

Пример: $X, \emptyset, [0, 1], \overline{B(a, R)}, \{a\}$ - замкнутые

Пример: $(0, 1)$ - в \mathbb{R} незамкнутое

Теорема 2. D - замкнуто $\Leftrightarrow D^c = X \setminus D$ (дополнение) - открыто.

Proof. Докажем \Rightarrow : D - замкн. \Rightarrow $X \setminus D$

$x \in X \setminus D \Rightarrow x$ - не пред. точка D , т.к. D содержит все свои пред. точки и $x \notin D$

$\Rightarrow \exists r : B(x, r) \subset X \setminus D$

Докажем \Leftarrow : $X \setminus D$ - откр., D - замкн.?, т.е. $\forall x \in \{\text{пр.точки } D\} \quad \exists x \in D$

Если $x \in D$ - тривиально.

$x \notin D \quad x \in X \setminus D$

$\exists U(x) \subset X \setminus D \Rightarrow x$ - не пред. точка

□

Примечание. Если D - не замкнуто, то это НЕ значит, что D - открыто, например $(0, 1]$ - не замкнуто и не открыто.

Теорема 3. О свойствах замкнутых множеств.

1. $(F_\alpha)_{\alpha \in A}$ - замкн. в X

Тогда $\bigcap F_\alpha$ - замкн.

2. $F_1 \dots F_n$ - замкн.

Тогда $\bigcap F_i$ - замкн.

Proof. F_α - замкн. $\Leftrightarrow F_\alpha^c$ - откр. $\Rightarrow \bigcup F_\alpha^c$ - откр. $\Rightarrow (\bigcup F_\alpha^c)^c$ - замкн.

□