Линейная алгерба 1 из 2

## 1 Спектральный анализ линейных операторов

## 1.1 Инвариантные пространства линейного оператора

 $\sphericalangle \varphi: X \to X$  — автоморфизм

Определение. Подпространство L линейного пространства X называется инвариантным подпространством  $\varphi$ , если

$$\forall x \in L \quad \varphi x \in L$$

Пример. 1.  $\varphi:X o X$ , тогда инвариантные подпрострнаства:

- X
- {0}
- 2.  $\varphi = \Im$ ,  $\forall x \ \Im x = x \Rightarrow$  любое подпространство X инвариантное
- 3.  $\varphi = \Theta$ ,  $\forall x \ \Theta x = 0 \Rightarrow$  любое подпространство X инвариантное

4. 
$$\varphi: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n \Leftrightarrow A_{\varphi} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & \lambda_n \end{bmatrix} \stackrel{\triangle}{=} diag\{\lambda_1 \dots \lambda_n\}$$

$$\sphericalangle\{e_j\}$$
 — базис  $X\Rightarrow \forall j$   $A_{\varphi}e_j=\lambda_je_j$   $e_j o \mathcal{L}\{e_j\}$  — инв.

Всего  $2^n$  инвариантных подпространств

5. 
$$|X = L_1 \dot{+} L_2|$$

$$\forall x! = x_1 + x_2 \quad \varphi x = \mathcal{P}_{L_1}^{\parallel L_2} x = x_1 \in L_1$$

$$L_1$$
 — инв.,  $\forall x \in L_1 \quad \mathcal{P}_{L_1}^{\parallel L_2} x = x \quad \forall$  подпространство  $L_1$  инвариантно

$$L_2$$
 — инв.,  $\forall x \in L_2$   $\mathcal{P}_{L_1}^{\parallel L_2} x = 0$   $\forall$  подпространство  $L_2$  инвариантно

**Определение. Инвариантном** линейного оператора  $\varphi$  называется его числовая функция значений, которая не зависит от выбора базиса

Пример.  $\det \varphi$  — инвариант

$$\varphi^{\Lambda_n} z = \det \varphi \cdot z \quad \forall z \in \Lambda_n$$

 $\det \varphi = \det A_\varphi - \mathtt{B}$  некотором фиксированном базисе

$$\tilde{A}_{\varphi} = T^{-1}A_{\varphi}T \quad \det \tilde{A}_{\varphi} = \det T^{-1}\det A_{\varphi}\det T = \det A_{\varphi}$$

Определение. Характеристическим полиномом линейного оператора  $\varphi$  называется определитель следующего вида:

$$\chi_{\varphi}(\lambda) = \det(\varphi - \lambda\Im) \stackrel{\{e_j\}}{=} \det\{A_{\varphi} - \lambda E\}$$

$$\chi_{\varphi}(\lambda) \stackrel{def \, \text{det}}{=} \sum_{(j_1 \dots j_n)} (-1)^{[j_1 \dots j_n]} \prod_{i=1}^n (a_{ij_i} - \delta_{i,j_i} \lambda) = \det A_{\varphi} - \lambda \sum_{i=1}^n \left( \prod_{j=1}^n a_{ji} \right) (-1)^i + \dots + \lambda^{n-1} \sum_{i=1}^n a_{ii} + \lambda^n (-1)^n = \\ = (-\lambda)^n Z^{(0)} + (-\lambda)^{n-1} Z^{(1)} + \dots + (-\lambda) Z^{(n-1)} + Z^{(n)} \\ Z^{(K)} = \sum_{(1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n)} M_{\vec{i}}^{\vec{i}}$$

M3137y2019 Лекция 5

Лемма 1.

$$\chi_{\varphi}(\lambda) = inv$$

Доказательство.

$$\det(\tilde{A}_\varphi - \lambda E) = \det(T^{-1}A_\varphi T - \lambda T^{-1}T) = \det[S(A_\varphi - \lambda E)T] = \det T^{-1}\det(A_\varphi - \lambda E)\det T = \det(A_\varphi - \lambda E)$$

М3137у2019 Лекция 5