ЖАЛОБЫ На шум в ушах, головную боль в затылочной области, подъем АД до 190/90мм.рт.ст., приняла престариум, со слов без эффекта
АНАМНЕЗ (в т.чэпид., аллерг., гинекол по показаниям) В анамнезе: гипертоническая болезнь, гипотиреоз, ХДЭП, остеохондроз позвоночника, в 19 г пепенесла сотрясение головного мозга, операции отрицает. Менопауза с 50 лет. Аллергию отрицает. Эпиданамнез не отягощен, за пределы Москвы не выезжала более 5 лет, сезонные прививки отрицает. ЕМИАС,МГФОМС-I67.8, I11.9, M42.1, E03.8, J31.0, S06.00- от 02.04.2019
ОБЪЕКТИВНО: общее состояние (удовл., ср.тяжести, тяжелое, терминальное). Сознание: ясное, оглушенное, сопор, кома. 15
Положение активное, пассивное, вынужденное Кожные покровы: сухие, влажные, обычной окраски, бледные, гиперемия, цианоз, желтушность
Сыпь нет Зев чистый Миндалины не увеличены
Лимфоузлы не увеличены Пролежни нет Отеки нет $t^{\circ}$ С 36.6
Органы дыхания: ЧДД 16 в мин., одышка эксператорная, инспираторная, смешанная. Патологическое дыхание нет
Аускультативно: везикулярное, жесткое, бронхиалоное, пузрильное, ослаблено, отсутствует в <u>по всем полям</u> Хрипы сухие (свистящие, жужжащие) в нет
Влажные (мелко-, средне-, крупнопузырчатые) в нет
Крепитация, шум трения плевры над нет
Перкуторный звук <u>легочный,</u> тимпанический, коробочный, притупленный, тупой над по всем полям
Кашель сухой, влажный, лающий, отсутствует. Мокрота нет  Органы кровообращения: пульс 84 в мин., ритмичный, аритмичный, наполнение удовлетворительное ЧСС 84 в мин.
дефицит пульса 0 АД 160/90 привычное 120/80 максимальное 190/100 мм.рт.ст.
Тоны сердца звучные, приглушены, глухие. Шум систолический, диастолический на верхушке
проводится нет Шум трения перикарда. Акцент тона І на аорте
Органы пищеварения: Язык сухой, влажный, обложен чистый
Живот форма правильная мягкий, напряжен в не напряжен Безболезненный, болезненный в во всех отделах Положительные симптомы (Образцова,
Ровзинга, Ситковского, Ортнера, Мерфи, Мейо-Робсона, Щеткина-Блюмберга, Вааля) отрицательные
Перистальтика выслушивается Печень не увеличена Селезенка не пальпируется
Рвота (частота) нет Стул (консистенция, частота) регулярный, оформлен
<b>Нервная система:</b> Поведение <u>спокойное,</u> беспокойное, возбужден. Контакт контактен
Чувствительность сохранена $D = S$ Речь (внятная, дизартрия, афазия)         Зрачки $OD = OS$ , обычные, широкие, узкие. Фотореакция живая       Нистагм нет
Ассиметрия лица нет Менингеальные симптомы (ригидность затылочных мышц,
Кенига, Брудзинского) отрицательные Очаговые симптомы не выявлены
Координатные пробы выполняет правильно, в позе Ромберга устойчив
Мочеполовая система дизурии нет
Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон
Status locales Вес=70кг, Рост=164см, ИМТ=26, Эмоционально лабильна, когнитивно мнестические нарушения
Данные инструментальных исследований (ЭКГ, глюкометрия, пульсоксиметрия и пр.) Sp02 98%; экг(16.02.20 09:39) ритм синусовый, правильный с ЧСС 84 в мин, ЭСС- отклонена влево.ST-
изолиния. Данных за острую коронарную патологию нет
Оказанная помощь и ее эффект (в т.ч. результаты инстр. иссл. в динамике)paccпpoc, Таb.Moxonidini 0,4mg -сублингвально
Оставлен на месте, рекомендовано обратиться в поликлинику
Через 34 мин : состояние удовлетворительное, АД 130/80 мм.рт.ст., ЧСС 80 в мин, пульс 80 в мин,           ЧД 16 в мин
Рекомендации: Ведение дневника контроля АД. Регулярный прием базовой антигипертензивной терапии
Сигнальная карта: нет
Расходные материалы: Салфетки спиртовые $№ 2$ , Бахилы 1, Перчатки 1, Маска 1, Шпатель 1, Чехол
д.терм_1_, Шприц 2,0 № 0 5,0 № 0 10,0 № 0 20,0 № 0 , Катетер. куб. 0 G Фикс. пластырь 0 Скариф 0 Тест
Шприц 2,0 № 0 5,0 № 0 10,0 № 0 20,0 № 0, Катетер. куб. 0 G Фикс. пластырь 0 Скариф 0 Тест полоски 0 ,Пакет мед.отхлд. 1 Маска
для небулайзера_0_
Пото и момен моне до 16 01 21 102062006