ЖАЛОБЫ на недомогание, головную боль давящего характера в теменных областях, легкое головокружение при перемене положения тела, жалобы беспокоят постоянно более 5 лет. усиливаются после эпизодов подъема АД до 160/90 мм.рт.ст., который купировала приемом капотена25 мг.,
АНАМНЕЗ (в т.чэпид., аллерг., гинекол по показаниям) _ со слов страдает хронической ишемией мозга 2 ст, хр. гастродуоденитом в стадии ремисии, год назад перенесла пневмонию, полиартроз длительно. Травмы, операции отрицает. Эпиданамнез не отягощен, за пределы Москвы и РФ не выезжала более 3 лет, сезонные прививки отрицает. Менопауза с 50 лет. Аллергию отрицает. ЕМИАС. МГФОМС- 167.8, 180.2, 183.9, K29.9, K91.5, M15.8, J18.8
ОБЪЕКТИВНО: общее состояние (удовл., ср.тяжести, тяжелое, терминальное). Сознание: <u>ясное</u> , оглушенное, сопор, кома. 15 Положение <u>активное</u> , пассивное, вынужденное
Кожные покровы: сухие, влажные, обычной окраски, бледные, гиперемия, цианоз, желтушность
Сыпь нет Зев чистый Миндалины не увеличены Лимфоузлы не увеличены Пролежни нет Отеки нет t°C 36.6
Органы дыхания: ЧДД 18 в мин., одышка эксператорная, инспираторная, смешанная. Патологическое дыхание нет
Аускультативно: везикулярное, жесткое, бронхиалоное, пузрильное, ослаблено, отсутствует в по всем полям
Хрипы сухие (свистящие, жужжащие) в нет
Влажные (мелко-, средне-, крупнопузырчатые) в нет
Крепитация, шум трения плевры над нет Перкуторный звук легочный, тимпанический, коробочный, притупленный, тупой над по всем полям
Кашель сухой, влажный, лающий, отсутствует. Мокрота нет
Органы кровообращения: пульс 68 в мин., ритмичный, аритмичный, наполнение удовлетворительное ЧСС 68 в мин.
дефицит пульса 0 АД 130/80 привычное 130/80 максимальное 160/90 мм.рт.ст.
Тоны сердца звучные, приглушены, глухие. Шум систолический, диастолический на верхушке
проводится нет Шум трения перикарда. Акцент тона І на аорте
Органы пищеварения: Язык сухой, влажный, обложен чистый
Живот форма правильная мягкий, напряжен в не напряжен Безболезненный, болезненный в во всех отделах Положительные симптомы (Образцова,
Ровзинга, Ситковского, Ортнера, Мерфи, Мейо-Робсона, Щеткина-Блюмберга, Вааля) отрицательные
Перистальтика выслушивается Печень не увеличена Селезенка не пальпируется
Рвота (частота) нет Стул (консистенция, частота) регулярный, оформлен
Нервная система: Поведение <u>спокойное,</u> беспокойное, возбужден. Контакт контактен
Чувствительность сохранена D = S Речь (внятная, дизартрия, афазия)
Зрачки OD = OS, <u>обычные,</u> широкие, узкие. Фотореакция живая Нистагм нет Ассиметрия лица нет Менингеальные симптомы (ригидность затылочных мышц,
Ассиметрия лица нет Менингеальные симптомы (ригидность затылочных мышц, Кенига, Брудзинского) не выявлены Очаговые симптомы не выявлены
Координатные пробы пальценосовая проба- выполняет правильно, замедленно; в позе Ромберга- устойчив
Мочеполовая система дизурии нет
Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон
Status locales Вес=87кг, Рост=160см, ИМТ=34, Выявляются когнитивно-мнестические нарушения
Данные инструментальных исследований (ЭКГ, глюкометрия, пульсоксиметрия и пр.)
Оказанная помощь и ее эффект (в т.ч. результаты инстр. иссл. в динамике) _ расспрос. Таb. Glicini 500mg - сублингвально. Sol.Ketaroli 30mg/ml-1ml в/м в правую ягодичную область Оставлен на месте, рекомендовано обратиться в поликлинику
через 29 мин: состояние удовлетворительное, АД 130/80 мм.рт.ст., ЧСС 68 в мин, пульс 68 в мин., ЧД 16 в мин
Рекомендации: <u>Соблюдение режима труда и отдыха, нейропротекторная терапия под наблюдением врача</u> невролога поликлиники
Сигнальная карта: _
Д.терм_1 , Шприц 2,0 № <u>0</u> 5,0 № <u>1</u> 10,0 № <u>0</u> 20,0 № <u>0</u> , Катетер. куб. <u>0</u> G Фикс. пластырь <u>0</u> Скариф <u>0</u> Тест полоски <u>0</u> ,Пакет мед.отхлд. <u>1</u> Маска для небулайзера <u>0</u>
Лата и номер наряда 10.01.21 101786970 Подпись Карту проверил