не отмечает, жалобы беспокоят около 5 часов, связывает с чрезмерными физичест (разового характера), однако ухудшение самочувствия около недели, самостоятел	
дексалгином, - со слов эффект недостаточный. Вызвал бригаду ОНМП для обезболи	
	ночника, люмбалгия-
	иданамнез не
отягощен, за предела Москвы и РФ не выезжал более года, сезонные прививки от	рицает. ЕМИАС,
МГФОМС не доступен	
ОБЪЕКТИВНО: общее состояние (удовл., ср.тяжести, тяжелое, терминальное). Сознание: ясное, огл	
Положение активное, пассивное, вынужденное ограничение в разгибании туловища из-за болевого синд	,рома
Кожные покровы: <u>сухие,</u> влажные, <u>обычной окраски,</u> бледные, гиперемия, цианоз, желтушность	
Лимфоузлы не увеличены Пролежни нет Отеки нет	t°C 36.6
Органы дыхания: ЧДД 16 в мин., одышка эксператорная, инспираторная, смещанная. Патологичес	
Аускультативно: везикулярное, жесткое, бронхиалоное, пузрильное, ослаблено, отсутствует в По всем г	
Хрипы сухие (свистящие, жужжащие) в Нет	
Влажные (мелко-, средне-, крупнопузырчатые) в Нет	
Крепитация, шум трения плевры над Нет	
Перкуторный звук легочный, тимпанический, коробочный, притупленный, тупой над по всем полям	
Кашель сухой, влажный, лающий, отсутствует. Мокрота нет	
Органы кровообращения: пульс 80 в мин., ритмичный, аритмичный, наполнение удовлетворительно	<u>ре ЧСС 80</u> в мин.
дефицит пульса 0 АД 150/90 привычное 150/90 максимальное 200/120 мм.рт.ст.	
Тоны сердца звучные, приглушены, глухие. Шум систолический, диастолический на на верхушке	
проводится нет Шум трения перикарда. Акцент тона І на	аорте
Органы пищеварения: Язык сухой, влажный, обложен чистый	
Живот форма правильная мягкий, напряжен в не напряжен	
	ьные симптомы (Образцова,
Ровзинга, Ситковского, Ортнера, Мерфи, Мейо-Робсона, Щеткина-Блюмберга, Вааля) отрицательные	
Перистальтика выслушивается Печень не увеличена Селезенка не па	льпируется
Рвота (частота) нет Стул (консистенция, частота) регулярный, оформлен Нервная система : Поведение <u>спокойное,</u> беспокойное, возбужден. Контакт контактен	
Чувствительность сохранена $D = S$ Речь (внятная, дизартрия, афазия)	
Зрачки $OD = OS$, <u>обычные, широкие, узкие. Фотореакция живая</u> Нистагм н	er.
Ассиметрия лица нет Менингеальные симптомы (риг	
Кенига, Брудзинского) нет Очаговые симптомы нет	пдпость затыло ппых мынц,
Координатные пробы выполняет правильно	
Мочеполовая система дизурии нет	
Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон	
Status localis Вес=120кг, Рост=174см, ИМТ=40, Визуально: пояснично-кресцовая обл	асть не изменена,
умеренное напряжение мышц спины, паравертебральная пальпация- болезненная, ст	
отрицательный с обеих сторон. ВАШ 30%	
•	
Данные инструментальных исследований (ЭКГ, глюкометрия, пульсоксиметрия и пр.)	
Оказанная помощь и ее эффект (в т.ч. результаты инстр. иссл. в динамике) расспрос;	
Sol.Ketaroli 30mg/ml-2 ml в/м в левую ягодичную область;	
Оставлен на месте, рекомендовано обратиться в поликлинику	
через 30 мин: состояние удовлетворительное, АД 120/80 мм.рт.ст., ЧСС в мин,	пульс в мин. ЧЛ 16
в мин, ВАШ 10%	
2 1, 2 1	
Рекомендации: препараты НПВС 2-3 раза в день, консультация невролога в планов	OW HODGING:
	он порядке,
Сигнальная карта: <u>нет</u> Расходные материалы: Салфетки спиртовые № 6 ,Бахилы 1 ,Перчатки 1 ,Маск	o 1 III.
гасходные материалы: Салфетки спиртовые $N \ge 0$, Вахилы 1 , Перчатки 1 , маск д.терм 1 ,	a <u>i</u> ,miiarenb <u>i</u> , rexon
	стырь 0 Скариф 0 Тест
полоски 0 ,Пакет мед.отхлд. 1 Маска	лыры_ ∪ Окариф_ ∪ тест
для небулайзера 0	
——————————————————————————————————————	
-	