

ЖАЛОБЫ на головную боль, преимущественно в затылочной области, шум в ушах, мелькание мушек перед глазами, подъем АД до 150/90мм.рт.ст., беспокоит в течении полутора часов, приняла 0,2 моксонидина, со слов- без эффекта.

АНАМНЕЗ (в т.ч.-эпид., аллерг., гинекол по показаниям) В анамнезе: Хронические заболевания: гипертоническая болезнь около года, обследуется, базовая терапия не назначена. Травмы и операции отрицает. Гинекологический анамнез: менархе в 16 лет, по 4 дня, через 28 дней, регулярные, бер 0. Аллергию отрицает. Эпиданамнез: неотягощен, за пределы Москвы и РФ не выезжала, сезонные прививки отрицает. ЕМИАС, МГФОМС: I10, M42.1, M54.2, G62.9, G90.9

ОБЪЕКТИВНО: общее состояние (удовл., ср.тяжести, тяжелое, терминальное). Сознание: ясное, оглушенное, сопор, кома. 15
Положение активное, пассивное, вынужденное

Кожные покровы: сухие, влажные, обычной окраски, бледные, гиперемия, цианоз, желтушность

Сыпь нет Зев чистый Миндалины не увеличены

Лимфоузлы не увеличены Пролежни нет Отеки нет t°C 36.6

Органы дыхания: ЧДД 16 в мин., одышка экспираторная, инспираторная, смешанная. Патологическое дыхание нет

Аускультативно: везикулярное, жесткое, бронхиальное, пузрильное, ослаблено, отсутствует в по всем полям

Хрипы сухие (свистящие, жужжащие) в нет

Влажные (мелко-, средне-, крупнопузырчатые) в нет

Крепитация, шум трения плевры над нет

Перкуторный звук легочный, тимпанический, коробочный, притупленный, тупой над по всему объему

Кашель сухой, влажный, лающий, отсутствует. Мокрота нет

Органы кровообращения: пульс 93 в мин., ритмичный, аритмичный, наполнение удовлетворительное ЧСС 93 в мин.

дефицит пульса 0 АД 150/90 привычное 115/65 максимальное 160/115 мм.рт.ст.

Тоны сердца звучные, приглушены, глухие. Шум систолический, диастолический на нет

проводится нет Шум трения перикарда. Акцент тона на нет

Органы пищеварения: Язык сухой, влажный, обложен чистый

Живот форма правильная мягкий, напряжен в не напряжен

Безболезненный, болезненный в во всех отделах Положительные симптомы (Образцова,

Ровзинга, Ситковского, Ортнера, Мерфи, Мейо-Робсона, Щеткина-Блюмберга, Валя) отрицательные

Перистальтика выслушивается Печень не увеличена Селезенка не пальпируется

Рвота (частота) нет Стул (консистенция, частота) регулярный, оформлен

Нервная система: Поведение спокойное, беспокойное, возбужден. Контакт контактен

Чувствительность сохранена D = S Речь (внятная, дизартрия, афазия)

Зрачки OD = OS, обычные, широкие, узкие. Фотореакция живая Нистагм нет

Асимметрия лица нет Менингеальные симптомы (ригидность затылочных мышц,

Кенига, Брудзинского) отрицательные Очаговые симптомы не выявлены

Координатные пробы выполняет правильно, в позе Ромберга устойчив

Мочеполовая система дизурии нет

Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон

Status localis Вес=69кг, Рост=165см, ИМТ=25

Данные инструментальных исследований (ЭКГ, глюкометрия, пульсоксиметрия и пр.) SpO2 99%; ЭКГ (24.02.21г. 00:52) ритм синусовый, правильный с ЧСС 93 в мин, ЭОС- отклонена влево, ST-изолиния. Данных за острую коронарную патологию нет.

Оказанная помощь и ее эффект (в т.ч. результаты инстр. иссл. в динамике) расспрос,

Tab.Moxonidini 0,2 mg -сублингвально

Оставлен на месте, рекомендовано обратиться в поликлинику

Через 35 мин: состояние удовлетворительное, АД 120/80 мм.рт.ст., ЧСС 88 в мин, Ps 88 в мин, ЧД 16 в мин, t 36,6

Рекомендации: Ведение дневника контроля АД. Регулярный прием базовой антигипертензивной терапии

Сигнальная карта: нет

Расходные материалы: Салфетки спиртовые № 2, Бахилы 1, Перчатки 1, Маска 1, Шпатель 1, Чехол д.терм 1,

Шприц 2,0 № 0 5,0 № 0 10,0 № 0 20,0 № 0, Катетер. куб. 0 G Фикс. пластырь 0 Скариф 0 Тест полоски 0, Пакет мед.отхлд. 1 Маска для небулайзера 0