ЖАЛОВЫ На боль в поясничном отделе позвоночника, без иррадиации, потери чувствительности не отмечает, жалобы беспокоят около 6 часов, связывает с чрезмерными физическими нагрузками (разового характера), самостоятельно не лечился. Вызвал бригаду ОНМП для обезболивания.
АНАМНЕЗ (в т.чэпид., аллерг., гинекол по показаниям) В анамнезе: остеохондроз позвоночника, люмбалгия- несколько раз в год. Операций и травм не было. Эпиданамнез не отягощен, за предела Москвы и Р не выезжал более года, сезонные прививки отрицает. ЕМИАС, МГФОМС не информативен.
ОБЪЕКТИВНО: общее состояние (удовл., ср.тяжести, тяжелое, терминальное). Сознание: <u>ясное</u> , оглушенное, сопор, кома. 1 Положение активное, пассивное, вынужденное ограничение в разгибании туловища из-за болевого синдрома Кожные покровы: <u>сухие</u> , влажные, <u>обычной окраски</u> , бледные, гиперемия, цианоз, желтушность
Сыпь нет Зев чистый Миндалины не увеличены
Лимфоузлы не увеличены Пролежни нет Отеки нет t°C 36.6
Органы дыхания: ЧДД 16 в мин., одышка эксператорная, инспираторная, смешанная. Патологическое дыхание нет
Аускультативно: везикулярное, жесткое, бронхиалоное, пузрильное, ослаблено, отсутствует в По всем полям
Хрипы сухие (свистящие, жужжащие) в Нет
Влажные (мелко-, средне-, крупнопузырчатые) в <u>Нет</u> Крепитация, шум трения плевры над Нет
Перкуторный звук <u>легочный</u> , тимпанический, коробочный, притупленный, тупой над по всем полям
Кашель сухой, влажный, лающий, отсутствует. Мокрота нет
Органы кровообращения: пульс 92 в мин., ритмичный, аритмичный, наполнение удовлетворительное ЧСС 92 в мин.
дефицит пульса 0 АД 130/80 привычное 120/80 максимальное 140/90 мм.рт.ст.
Тоны сердца звучные, приглушены, глухие. Шум систолический, диастолический на нет
проводится нет Шум трения перикарда. Акцент тона I на нет
Органы пищеварения: Язык сухой, влажный, обложен чистый
Живот форма правильная мягкий, напряжен в не напряжен
Безболезненный, болезненный в во всех отделах Положительные симптомы (Образце
Ровзинга, Ситковского, Ортнера, Мерфи, Мейо-Робсона, Щеткина-Блюмберга, Вааля) отрицательные
Перистальтика выслушивается Печень не увеличена Селезенка не пальпируется Рвота (частота) нет Стул (консистенция, частота) регулярный, оформлен
Рвота (частота) нет Стул (консистенция, частота) регулярный, оформлен Нервная система: Поведение спокойное, беспокойное, возбужден. Контакт контактен
$\frac{1}{2}$ Чувствительность сохранена $D = S$ Речь (внятная, дизартрия, афазия)
Зрачки OD = OS, <u>обычные, широкие, узкие. Фотореакция</u> живая Нистагм нет
Ассиметрия лица нет Менингеальные симптомы (ригидность затылочных мы
Кенига, Брудзинского) нет Очаговые симптомы нет
Координатные пробы_ выполняет правильно
Мочеполовая система дизурии нет
Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон
Status locales визуально пояснично кресцовая область не изменена, умеренное напряжение мышц спины, паравертебральная пальпация болезненная, симптом Лассега отрицательный с обеих сторон. ВАШ 30%
Данные инструментальных исследований (ЭКГ, глюкометрия, пульсоксиметрия и пр.)
Оказанная помощь и ее эффект (в т.ч. результаты инстр. иссл. в динамике)paccпpoc, Sol.Ketaroli 30mg/ml-1ml в/м в левую ягодичную область Оставлен на месте, рекомендовано обратиться в поликлинику через 50 мин: состояние удовлетворительно, АД 120/80 мм.рт.ст., ЧСС 88 в мин, пульс 88 в мин, ЧД 16 в мин, ВАШ 10%
D UITDO O O
Рекомендации: препараты НПВС 2-3 раза в день, консультация невролога в плановом порядке
Сигнальная карта: НЕТ
Расходные материалы: Салфетки спиртовые № 6 ,Бахилы 1 ,Перчатки 1 ,Маска 1 ,Шпатель 1 ,Чех
д.терм_ $\frac{1}{2}$, Шприц $\frac{1}{2}$, № 0 5,0 № 1 10,0 № 0 20,0 № 0 , Катетер. куб. 0 G Фикс. пластырь 0 Скариф 0 Т
полоски <u>0</u> ,Пакет мед.отхлд. <u>1</u> Маска для небулайзера <u>0</u>
Дата и номер наряда 20.01.21 133678531 Подпись Карту проверил