ЖАЛОБЫ Головную боль в лобных долях и висках, подъем АД до 200/100 мм.рт.ст., приняла физиотенз 0,4 мг , эффект недостаточный
_ φησησιεπό 0,4 μι , σφφεκί πεμοτιατοчный
АНАМНЕЗ (в т.чэпид., аллерг., гинекол по показаниям) В анамнезе: ИБС, гипертоническая болезнь
короновирусную инфекцию янв 2021г., сезонные прививки сент 2020 г грипп, пневмококк, за
пределы Москвы не выезжала. ЕМИАС, МГФОМС- I48.0, I69.8, I11.9, I25.1,K21.0, M42.1, E03.8,
H25.1 ОБЪЕКТИВНО: общее состояние (удовл., ср.тяжести, тяжелое, терминальное). Сознание: ясное, оглушенное, сопор, кома. 15
Положение активное, пассивное, вынужденное
Кожные покровы: сухие, влажные, обычной окраски, бледные, гиперемия, цианоз, желтушность
Сыпь нет Зев чистый Миндалины не увеличены
Лимфоузлы не увеличены Пролежни нет Отеки нет t°C 36.6
Органы дыхания: ЧДД <u>16</u> в мин., одышка эксператорная, инспираторная, смешанная. Патологическое дыхание нет Аускультативно: везикулярное, жесткое, бронхиалоное, пузрильное, ослаблено, отсутствует в по всем полям
Хрипы сухие (свистящие, жужжащие) в нет
Влажные (мелко-, средне-, крупнопузырчатые) в нет
Крепитация, шум трения плевры над нет
Перкуторный звук <u>легочный,</u> тимпанический, коробочный, притупленный, тупой над по всем полям
Кашель сухой, влажный, лающий, отсутствует. Мокрота нет
Органы кровообращения: пульс 51 в мин., ритмичный, аритмичный, наполнение удовлетворительное ЧСС 51 в мин. дефицит пульса 0 АД 160/90 привычное 120/80 максимальное 220/120 мм.рт.ст.
дефицит пульса <u>0 АД 100/90</u> привычное <u>120/80 максимальное 220/120 мм.рт.ст.</u> Тоны сердца звучные, приглушены, глухие. Шум <u>систолический,</u> диастолический на верхушке
проводится нет Шум трения перикарда. Акцент тона I на аорте
Органы пищеварения: Язык сухой, влажный, обложен чистый
Живот форма правильная мягкий, напряжен в не напряжен
Безболезненный, болезненный в во всех отделах Положительные симптомы (Образцова,
Ровзинга, Ситковского, Ортнера, Мерфи, Мейо-Робсона, Щеткина-Блюмберга, Вааля) отрицательные Перистальтика выслушивается Печень не увеличена Селезенка не пальпируется
Рвота (частота) нет Стул (консистенция, частота) регулярный, оформлен
Нервная система: Поведение <u>спокойное,</u> беспокойное, возбужден. Контакт контактен
Чувствительность сохранена $D = S$ Речь (внятная, дизартрия, афазия)
3рачки OD = OS, <u>обычные,</u> широкие, узкие. Фотореакция <u>живая</u> <u>Нистагм</u> нет
Ассиметрия лица_ нет Менингеальные симптомы (ригидность затылочных мышц, Кенига, Брудзинского) отрицательные Очаговые симптомы не выявлены
Кенига, Брудзинского) <u>отрицательные</u> Очаговые симптомы <u>не выявлены</u> Координатные пробы выполняет правильно, в позе Ромберга устойчив
Мочеполовая система дизурии нет
Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон
Status locales Bec=90kr, Pocr=167cm, UMT=32
T
Данные инструментальных исследований (ЭКГ, глюкометрия, пульсоксиметрия и пр.) <u>Sp02 98%; ЭКГ</u> (17.02.21г.) Синусовая брадикардия с ЧСС 51 в мин, ЭОСне отклонена, ST изолиния. АВ блокада 2
ст., гипертрофия миокарда левого желудочка. Данных за острую коронарную патологию нет.
Оказанная помощь и ее эффект (в т.ч. результаты инстр. иссл. в динамике) расспрос,
Через 43 мин: состояние удовлетворительное, АД 150/80 мм.рт.ст., ЧСС 54 в мин, пульс 54 в мин,
ЧД 16 в мин
Рекомендации: Ведение дневника контроля АД. Регулярный прием базовой антигипертензивной терапии
Сигнальная карта:
Расходные материалы: Салфетки спиртовые N_2 , Бахилы 1, Перчатки 1, Маска 1, Шпатель 1, Чехол
д.терм_1_, Шприц 2,0 № 0 5,0 № 0 10,0 № 0 20,0 № 0 , Катетер. куб. 0 G Фикс. пластырь 0 Скариф 0 Тест
Шприц 2,0 № 0 5,0 № 0 10,0 № 0 20,0 № 0, Катетер. куб. 0 G Фикс. пластырь 0 Скариф 0 Тест полоски 0 ,Пакет мед.отхлд. 1 Маска
для небулайзера 0
Дата и номер наряда 17.02.21 102877598 Подпись Карту проверил