

**ЖАЛОБЫ** На боль в поясничном отделе позвоночника, без иррадиации, потери чувствительности не отмечает, жалобы беспокоят около 6 часов, связывает с чрезмерными физическими нагрузками (разового характера), самостоятельно не лечилась. Вызвала бригаду ОНМП для обезболивания.

**АНАМНЕЗ** (в т.ч.-эпид., аллерг., гинекол по показаниям) В анамнезе: остеохондроз позвоночника, грыжа поясничного отдела, люмбагия- несколько раз в год. Операций и травм не было. Также бронхиальная астма в ремиссии, гипертоническая болезнь. Эпиданамнез не отягощен, за предела Москвы и РФ не выезжал более года, сезонные прививки отрицает. Менопауза с 50 лет, аллергия- полиноз, непереносимость лекарственных средств не выявлялась. ЕМИАС, МГФОМС Т11.9, J45.0, E74.8, M51.1

**ОБЪЕКТИВНО:** общее состояние (удовл., ср.тяжести, тяжелое, терминальное). Сознание: ясное, оглушенное, сопор, кома. 15 Положение активное, пассивное, вынужденное ограничение в разгибании туловища из-за болевого синдрома

Кожные покровы: сухие, влажные, обычной окраски, бледные, гиперемия, цианоз, желтушность

Сыпь нет Зев чистый Миндалины не увеличены

Лимфоузлы не увеличены Пролежни нет Отеки нет t°C 36.6

**Органы дыхания:** ЧДД 16 в мин., одышка экспираторная, инспираторная, смешанная. Патологическое дыхание нет

Аускультативно: везикулярное, жесткое, бронхиальное, пузырьное, ослаблено, отсутствует в По всем полям

Хрипы сухие (свистящие, жужжащие) в Нет

Влажные (мелко-, средне-, крупнопузырчатые) в Нет

Крепитация, шум трения плевры над Нет

Перкуторный звук легочный, тимпанический, коробочный, притупленный, тупой над по всем полям

Кашель сухой, влажный, лающий, отсутствует. Мокрота нет

**Органы кровообращения:** пульс 92 в мин., ритмичный, аритмичный, наполнение удовлетворительное ЧСС 92 в мин.

дефицит пульса 0 АД 130/80 привычное 120/80 максимальное 140/90 мм.рт.ст.

Тоны сердца звучные, приглушены, глухие. Шум систолический, диастолический на нет

проводится нет Шум трения перикарда. Акцент тона на нет

**Органы пищеварения:** Язык сухой, влажный, обложен чистый

Живот форма правильная мягкий, напряжен в не напряжен

Безболезненный, болезненный в во всех отделах Положительные симптомы (Образцова, Ровзинга, Ситковского, Ортнера, Мерфи, Мейо-Робсона, Щеткина-Блюмберга, Валя) отрицательные

Перистальтика выслушивается Печень не увеличена Селезенка не пальпируется

Рвота (частота) нет Стул (консистенция, частота) регулярный, оформлен

**Нервная система:** Поведение спокойное, беспокойное, возбужден. Контакт контактен

Чувствительность сохранена D = S Речь (внятная, дизартрия, афазия)

Зрачки OD = OS, обычные, широкие, узкие. Фотореакция живая Нистагм нет

Асимметрия лица нет Менингеальные симптомы (ригидность затылочных мышц, Кенига, Брудзинского) нет

Очаговые симптомы нет

Координатные пробы выполняет правильно

Мочеполовая система дизурии нет

Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон

Status localis Вес=60кг, Рост=158см, ИМТ=24, визуально пояснично крестцовая область не изменена, умеренное напряжение мышц спины, паравертебральная пальпация болезненная, симптом Лассега отрицательный с обеих сторон. ВАШ 30%

Данные инструментальных исследований (ЭКГ, глюкометрия, пульсоксиметрия и пр.) SpO2 99%

Оказанная помощь и ее эффект (в т.ч. результаты INSTR. ИССЛ. в динамике) расспрос, Sol.Ketaroli 30mg/ml-1ml в/м в левую ягодичную область

Оставлен на месте, рекомендовано обратиться в поликлинику

через 19 мин: состояние удовлетворительно, АД 120/80 мм.рт.ст., ЧСС 88 в мин, пульс 88 в мин, ЧД 16 в мин, ВАШ 10%

Рекомендации: препараты НПВС 2-3 раза в день, консультация невролога в плановом порядке

Сигнальная карта: нет

Расходные материалы: Салфетки спиртовые № 6, Бахилы 1, Перчатки 1, Маска 1, Шпатель 1, Чехол д.терм 1, Шприц 2,0 № 0 5,0 № 1 10,0 № 0 20,0 № 0, Катетер. куб. 0 G Фикс. пластырь 0 Скариф 0 Тест полоски 0, Пакет мед.отхлд. 1 Маска для небулайзера 0