

ЖАЛОБЫ головную боль в височных областях, подъем АД до 190/100 мм.рт.ст., приняла капотен 25 мг, моксонидин 0,4 мг, со слов эффект недостаточный, ухудшение самочувствия около недели с плохо коррегируемой гипертонии, однако препараты базовой терапии принимает нерегулярно (валсартан)

АНАМНЕЗ (в т.ч.-эпид., аллерг., гинекол по показаниям) В анамнезе, гипертоническая болезнь, сахарный диабет 2 типа (метформин), инсульты, инфаркты отрицает. Травм и операций не было. Менопауза с 51 года. Аллергию отрицает. Эпиданамнез не отягощен, за пределы Москвы не выезжала, сезонные прививки отрицает. ЕМИАС, МГФОМС - не доступен

ОБЪЕКТИВНО: общее состояние (удовл., ср.тяжести, тяжелое, терминальное). Сознание: ясное, оглушенное, сопор, кома. 15 Положение активное, пассивное, вынужденное

Кожные покровы: сухие, влажные, обычной окраски, бледные, гиперемия, цианоз, желтушность

Сыпь нет Зев чистый Миндалины не увеличены

Лимфоузлы не увеличены Пролежни нет Отеки нет t°C 36.6

Органы дыхания: ЧДД 16 в мин., одышка экспираторная, инспираторная, смешанная. Патологическое дыхание нет

Аускультативно: везикулярное, жесткое, бронхиальное, пузрильное, ослаблено, отсутствует в по всем полям

Хрипы сухие (свистящие, жужжащие) в нет

Влажные (мелко-, средне-, крупнопузырчатые) в нет

Крепитация, шум трения плевры над нет

Перкуторный звук легочный, тимпанический, коробочный, притупленный, тупой над по всем полям

Кашель сухой, влажный, лающий, отсутствует. Мокрота нет

Органы кровообращения: пульс 72 в мин., ритмичный, аритмичный, наполнение удовлетворительное ЧСС 72 в мин.

дефицит пульса 0 АД 180/90 привычное 120/80 максимальное 220/120 мм.рт.ст.

Тоны сердца звучные, приглушены, глухие. Шум систолический, диастолический на верхушке

проводится нет Шум трения перикарда. Акцент тона I на аорте

Органы пищеварения: Язык сухой, влажный, обложен чистый

Живот форма правильная мягкий, напряжен в не напряжен

Безболезненный, болезненный в во всех отделах Положительные симптомы (Образцова,

Ровзинга, Ситковского, Ортнера, Мерфи, Мейо-Робсона, Щеткина-Блюмберга, Вааля) отрицательные

Перистальтика выслушивается Печень не увеличена Селезенка не пальпируется

Рвота (частота) нет Стул (консистенция, частота) регулярный, оформлен

Нервная система: Поведение спокойное, беспокойное, возбужден. Контакт контактен

Чувствительность сохранена D = S Речь (внятная, дизартрия, афазия)

Зрачки OD = OS, обычные, широкие, узкие. Фотореакция живая Нистагм нет

Асимметрия лица нет Менингеальные симптомы (ригидность затылочных мышц,

Кенига, Брудзинского) отрицательные Очаговые симптомы не выявлены

Координатные пробы выполняет правильно, в позе Ромберга устойчив

Мочеполовая система дизурии нет

Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон

Status locales Вес=95кг, Рост=162см, ИМТ=36

Данные инструментальных исследований (ЭКГ, глюкометрия, пульсоксиметрия и пр.) SpO2 98%;
экг(16.02.21 17:30) ритм синусовый, правильный с ЧСС 72 в мин, ЭОС- отклонена влево.ST-
изолиния.Данных за острую коронарную патологию нет

Оказанная помощь и ее эффект (в т.ч. результаты инстр. иссл. в динамике) расспрос,
Tab.Moxonidini 0,4mg -сублингвально, Sol.Ketaroli 30mg/ml-1ml в/м в правую ягодичную область
Оставлен на месте, рекомендовано обратиться в поликлинику

Через 40 мин: состояние удовлетворительное, АД 150/70мм.рт.ст., ЧСС 70 в мин, пульс 70 в мин, ЧД
16 в мин, жалоб нет

Рекомендации: Ведение дневника контроля АД. Регулярный прием базовой антигипертензивной терапии

Сигнальная карта: нет

Расходные материалы: Салфетки спиртовые № 8 ,Бахилы 1 ,Перчатки 1 ,Маска 1 ,Шпатель 1 ,Чехол
д.терм 1 ,

Шприц 2,0 № 0 5,0 № 1 10,0 № 0 20,0 № 0 , Катетер. куб. 0 G Фикс. пластырь 0 Скариф 0 Тест
полоски 0 ,Пакет мед.отхлд. 1 Маска
для небулайзера 0

Дата и номер наряда 16.02.21 102870286

Подпись

Карту проверил