ЖАЛОВЫ На боль в поясничном отделе позвоночника, без иррадиации, потери чувствительности не отмечает, жалобы беспокоят около 6 часов, связывает с чрезмерными физическими нагрузками (разового характера), самостоятельно не лечился. Вызвал бригаду ОНМП для обезболивания.
АНАМНЕЗ (в т.чэпид., аллерг., гинекол по показаниям) В анамнезе: остеохондроз позвоночника, люмбалгия- несколько раз в год. Операций и травм не было. Эпиданамнез не отягощен, за предела Москвы и РФ не выезжал более года, сезонные прививки отрицает. ЕМИАС, МГФОМС не информативен.
<b>ОБЪЕКТИВНО:</b> общее состояние (удовл., ср.тяжести, тяжелое, терминальное). Сознание: <u>ясное,</u> оглушенное, сопор, кома. 15 Положение активное, пассивное, вынужденное <u>ограничение</u> в разгибании туловища из-за болевого синдрома Кожные покровы: сухие, влажные, обычной окраски, бледные, гиперемия, цианоз, желтушность
Сыпь нет Зев чистый Миндалины не увеличены
Лимфоузлы не увеличены Пролежни нет Отеки нет $t^{\circ}$ С 36.5
Органы дыхания: ЧДД 16 в мин., одышка эксператорная, инспираторная, смешанная. Патологическое дыхание нет
Аускультативно: везикулярное, жесткое, бронхиалоное, пузрильное, ослаблено, отсутствует в По всем полям
Хрипы сухие (свистящие, жужжащие) в Нет
Влажные (мелко-, средне-, крупнопузырчатые) в Нет
Крепитация, шум трения плевры над Нет
Перкуторный звук <u>легочный,</u> тимпанический, коробочный, притупленный, тупой над по всем полям Кашель сухой, влажный, лающий, отсутствует. Мокрота нет
Органы кровообращения: пульс 92 в мин., ритмичный, аритмичный, наполнение удовлетворительное ЧСС 92 в мин.
дефицит пульса 0 АД 130/80 привычное 120/80 максимальное 140/90 мм.рт.ст.
Тоны сердца звучные, приглушены, глухие. Шум систолический, диастолический на нет
проводится нет Шум трения перикарда. Акцент тона на нет
Органы пищеварения: Язык сухой, влажный, обложен чистый
Живот форма правильная мягкий, напряжен в не напряжен
Безболезненный, болезненный в во всех отделах Положительные симптомы (Образцова,
Ровзинга, Ситковского, Ортнера, Мерфи, Мейо-Робсона, Щеткина-Блюмберга, Вааля)_отрицательные
Перистальтика выслушивается Печень не увеличена Селезенка не пальпируется
Рвота (частота) нет Стул (консистенция, частота) регулярный, оформлен
<b>Нервная система:</b> Поведение <u>спокойное,</u> беспокойное, возбужден. Контакт контактен
Чувствительность сохранена $D = S$ Речь (внятная, дизартрия, афазия)         Зрачки $OD = OS$ , обычные, широкие, узкие. Фотореакция живая       Нистагм нет
Зрачки OD = OS, <u>обычные,</u> широкие, узкие. Фотореакция <u>живая</u> <u>Нистагм нет</u> Ассиметрия лица нет <u>Менингеальные симптомы (ригидность затылочных мышц,</u>
Кенига, Брудзинского) нет Очаговые симптомы (ригидность затыло ных мыни,
Координатные пробы выполняет правильно
Мочеполовая система дизурии нет
Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон
Status locales _визуально пояснично кресцовая область не изменена, умеренное напряжение мышц спины, _паравертебральная пальпация болезненная, симптом Лассега отрицательный с обеих сторон. ВАШ 30%
Данные инструментальных исследований (ЭКГ, глюкометрия, пульсоксиметрия и пр.)
Оказанная помощь и ее эффект (в т.ч. результаты инстр. иссл. в динамике)paccпрос,  Sol.Ketaroli 30mg/ml-1ml в/м в левую ягодичную область  Оставлен на месте, рекомендовано обратиться в поликлинику  через мин: состояние удовлетворительно, АД 120/80 мм.рт.ст., ЧСС 88 в мин, пульс 88 в мин, ЧД  16 в мин, ВАШ 10%
THING O. O.
Рекомендации: _препараты НПВС 2-3 раза в день, консультация невролога в плановом порядке
Сигнальная карта: Нет
Расходные материалы: Салфетки спиртовые $N_{\underline{0}}$ , Бахилы $\underline{1}$ , Перчатки $\underline{1}$ , Маска $\underline{1}$ , Шпатель $\underline{1}$ , Чехол д. терм $1$ ,
д.терм, Шприц 2,0 № 5,0 № 10,0 № 20,0 №, Катетер. куб G Фикс. пластырь Скариф Тест полоски, Пакет мед.отхлд Маска для небулайзера 0
Дата и номер наряда 20.01.21 133678531 Подпись Карту проверил