ЖАЛОВЫ на недомогание, боль в голове, преимущественно в затылочной области, шум в ушах, мушки перед глазами, подъем АД до 190/100 мм.рт.ст., жалобы беспокоят около 2 часов, связывает с эмоциональным перенапряжением, самостоятельно не лечилась. Подобные жалобы возникают периодически, не обследована, регулярную антигипертензивную терапию не принимает
АНАМНЕЗ (в т.чэпид., аллерг., гинекол по показаниям) Хронические заболевания, травмы, операции отрицает. Менопауза 2 года. Аллергии нет. Эпиданамнез не отягощен, за пределы Москвы и РФ не выезжала, сезонные прививки отрицает. ЕМИАС, МГФОМС- не доступен
ОБЪЕКТИВНО: общее состояние (удовл., ср.тяжести, тяжелое, терминальное). Сознание: <u>ясное</u> , оглушенное, сопор, кома. 15 Положение активное, пассивное, вынужденное
Кожные покровы: сухие, влажные, обычной окраски, бледные, гиперемия, цианоз, желтушность
Сыпь нет Зев чистый Миндалины не увеличены
Лимфоузлы не увеличены Пролежни нет Отеки нет t°C 36.6
Органы дыхания: ЧДД 16 в мин., одышка эксператорная, инспираторная, смешанная. Патологическое дыхание нет
Аускультативно: везикулярное, жесткое, бронхиалоное, пузрильное, ослаблено, отсутствует в по всем полям Хрипы сухие (свистящие, жужжащие) в нет
Влажные (мелко-, средне-, крупнопузырчатые) в нет
Крепитация, шум трения плевры над нет
Перкуторный звук легочный, тимпанический, коробочный, притупленный, тупой над по всему объему
Кашель сухой, влажный, лающий, отсутствует. Мокрота нет
Органы кровообращения: пульс 64 в мин., ритмичный, аритмичный, наполнение удовлетворительное ЧСС 64 в мин.
дефицит пульса 0 АД $170/90$ привычное $120/80$ максимальное $200/100$ мм.рт.ст.
Тоны сердца звучные, приглушены, глухие. Шум систолический, диастолический на верхушке
проводится <u>нет</u> <u>Шум трения перикарда. Акцент тона I</u> <u>на аорте</u> Органы пищеварения: Язык сухой, <u>влажный,</u> обложен чистый
Живот форма правильная мягкий, напряжен в не напряжен
Безболезненный, болезненный в во всех отделах Положительные симптомы (Образцова
Ровзинга, Ситковского, Ортнера, Мерфи, Мейо-Робсона, Щеткина-Блюмберга, Вааля) отрицательные
Перистальтика выслушивается Печень не увеличена Селезенка не пальпируется
Рвота (частота) нет Стул (консистенция, частота) регулярный, оформлен
Нервная система: Поведение <u>спокойное,</u> беспокойное, возбужден. Контакт контактен
Чувствительность сохранена $D = S$ Речь (внятная, дизартрия, афазия) Врачки $OD = OS$, обычные, широкие, узкие. Фотореакция живая Нистагм нет
Ассиметрия лица нет Менингеальные симптомы (ригидность затылочных мышц
Кенига, Брудзинского) отрицательные Очаговые симптомы не выявлены
Координатные пробы выполняет правильно, в позе Ромберга устойчив
Мочеполовая система дизурии нет
Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон
Status localis Bec=80kr, Poct=161cm, MMT=31
Данные инструментальных исследований (ЭКГ, глюкометрия, пульсоксиметрия и пр.) _ЭКГ (19.01.21г.23:04)
_ ритм синусовый, правильный с ЧСС 64 в мин, ЭОС- не отклонена. ST- изолиния.Ггипертрофия миокарда левого желудочка.Данных за острую коронарную патологию нет.
пиокарда левого желудочка. данных за острую коронарную патологию нег.
Оказанная помощь и ее эффект (в т.ч. результаты инстр. иссл. в динамике)paccпpoc,
Tab.Moxonidini 0,4 mg -сублингвально
Оставлен на месте, рекомендовано обратиться в поликлинику
Через 32 мин: состояние удовлетворительное, АД 145/80 мм.рт.ст., ЧСС 64 в мин, пульс 64 в мин,
_ЧД 16 в мин
Рекомендации: Ведение дневника контроля АД. Регулярный прием базовой антигипертензивной терапии
Сигнальная карта: Нет
Расходные материалы: Салфетки спиртовые № 2 ,Бахилы 1 ,Перчатки 1 ,Маска 1 ,Шпатель 1 ,Чехол
д.терм_1_, Шприц 2,0 № 0_5,0 № 0_10,0 № 0_20,0 № 0_, Катетер. куб0 G Фикс. пластырь_0 Скариф 0_Тест
полоски 0 ,Пакет мед.отхлд. 1 Маска
для небулайзера 0
Дата и номер наряда 19.01.21 113676170 Подпись Карту проверил