ЖАЛОБЫ на боль в подколенной ямке постоянного зарактера, усиливается при ходьбе, пройдя 5 шагов останавливается. Жалобы появились 2 дня назад, усилились, лечилась мазями НПВС - без эффекта, за медпомощью не обращалась, зябкость в ногах появилась несколько дней назад.
АНАМНЕЗ (в т.чэпид., аллерг., гинекол по показаниям) В анамнезе : хронический колит- ремиссия, хр. пиелонефрит, ремиссия,другие хронические заболевания отрицает, травмы- отрицает, операции-2011г.экстирпация матки. Аллергию отрицает. Эпиданамнез не отягощен, за пределы Москвы и РФ не выезжала, сезонные прививки отрицает ЕМИАС, МГФОМС: I11.9 М 42.1
<b>ОБЪЕКТИВНО:</b> общее состояние (удовл., ср.тяжести, тяжелое, терминальное). Сознание: <u>ясное</u> , оглушенное, сопор, кома. 15 Положение <u>активное</u> , пассивное, вынужденное <u>Щадит левую ногу</u>
Кожные покровы: сухие, влажные, обычной окраски, бледные, гиперемия, цианоз, желтушность
Сыпь нет Зев чистый Миндалины не увеличены Пролежни нет Отеки пастозность голеней t°C 36.6
Органы дыхания: ЧДД 16 в мин., одышка эксператорная, инспираторная, смешанная. Патологическое дыхание нет
Аускультативно: везикулярное, жесткое, бронхиалоное, пузрильное, ослаблено, отсутствует в по всему объему
Хрипы сухие (свистящие, жужжащие) в <u>Нет</u> Влажные (мелко-, средне-, крупнопузырчатые) в <u>нет</u>
Крепитация, шум трения плевры над нет Перкуторный звук <u>легочный,</u> тимпанический, коробочный, притупленный, тупой над По всем полям
Кашель сухой, влажный, лающий, отсутствует. Мокрота нет
Органы кровообращения: пульс 88 в мин., ритмичный, аритмичный, наполнение удовлетворительное ЧСС 88 в мин.
дефицит пульса $0$ АД $140/80$ привычное $120/80$ максимальное $160/80$ мм.рт.ст.
Тоны сердца звучные, приглушены, глухие. Шум систолический, диастолический на нет проводится нет Шум трения перикарда. Акцент тона на нет
Органы пищеварения: Язык сухой, влажный, обложен Чистый
Живот форма правильная мягкий, напряжен в не напряжен
Безболезненный, болезненный в во всех отделах Положительные симптомы (Образцова,
Ровзинга, Ситковского, Ортнера, Мерфи, Мейо-Робсона, Щеткина-Блюмберга, Вааля) отрицательные Перистальтика выслушивается Печень не увеличена Селезенка не пальпируется
Рвота (частота) нет Стул (консистенция, частота) регулярный, оформлен
<b>Нервная система:</b> Поведение <u>спокойное,</u> беспокойное, возбужден. Контакт контактен
$ ext{ Чувствительность }                                   $
Зрачки OD = OS, <u>обычные,</u> широкие, узкие. Фотореакция живая Нистагм нет
Ассиметрия лица нет Менингеальные симптомы (ригидность затылочных мышц, Кенига, Брудзинского) нет Очаговые симптомы нет
Координатные пробы выполняет правильно
Мочеполовая система дизурии нет
Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон
Status locales Вес=92кг, Рост=152см, ИМТ=40, Визуально левая ного бледновата, варикозно расширенные подкожные вены, на ощупь холодная, пульс на внутренней малоберцовой артерии левой ноги ослаблен
по сравнению с правой. ВАШ 30%
Данные инструментальных исследований (ЭКГ, глюкометрия, пульсоксиметрия и пр.) Sp02 98%; Sp02 ЭКГ (11.02.21г. 14:41) ритм синусовый, правильный с ЧСС 88 в мин, ЭОС- отклонена влево.ST-
изолиния. Данных за острую коронарную патологию нет
Оказанная помощь и ее эффект (в т.ч. результаты инстр. иссл. в динамике) расспрос; изучение мед.
документов
Установлен в/в катетер, Sol. Ketaroli 30mg/ml-1ml в/м в правую ягодичную область; Tab. Acidi
acetylsalicylici 500 mg разжевать, внутрь Вызов бригады СМП
Больная передана в состоянии средней степени тяжести, АД 130/80 мм.рт.ст., ЧСС 88 в мин, пульс
_88 в мин, ЧД 16 в мин, ВАШ 30 %
Рекомендации:
Сигнальная карта: $\underline{\  \  }$
д.терм $1 - 1$ , Шприц $2,0  \mathbb{N}  0.5,0  \mathbb{N}  1.10,0  \mathbb{N}  0.20,0  \mathbb{N}  0$ , Катетер. куб. $1  \mathrm{G}  \Phi$ икс. пластырь $1  \mathrm{C}$ кариф $0  \mathrm{Tect}$
полоски 0 ,Пакет мед. отхлд. 1 Маска
для небулайзера 0
Лата и номер наряда 11.02.21 102782724 — Подпись — Карту проверил