ЖАЛОБЫ на боль в подколенной ямке постоянного характера, усиливается при ходьбе, пройдя 5 шагов останавливается. Жалобы появились 2 дня назад, усилились, лечилась мазями НПВС - без эффекта, за медпомощью не обращалась, зябкость в ногах появилась несколько дней назад.
АНАМНЕЗ (в т.чэпид., аллерг., гинекол по показаниям) В анамнезе : варикозное расширение вен нидних конечностей- не обследована, хронический колит- ремиссия, хр. пиелонефрит, ремиссия, другие хронические заболевания отрицает, травмы- отрицает, операции- 2011гэкстирпация матки. Аллергию отрицает. Эпиданамнез не отягощен, за пределы Москвы и РФ не выезжала, сезонные прививки отрицает. ЕМИАС, МГФОМС: I11.9 М 42.1
ОБЪЕКТИВНО: общее состояние (удовл., ср.тяжести, тяжелое, терминальное). Сознание: <u>ясное</u> , оглушенное, сопор, кома. 15 Положение активное, пассивное, вынужденное Щадит левую ногу
Кожные покровы: сухие, влажные, обычной окраски, бледные, гиперемия, цианоз, желтушность $+$ St.localis
Сыпь нет Зев чистый Миндалины не увеличены Лимфоузлы не увеличены Пролежни нет Отеки пастозность голеней D=S t°C 36.6 Органы дыхания: ЧДД 16 в мин., одышка эксператорная, инспираторная, смешанная. Патологическое дыхание нет
Аускультативно: везикулярное, жесткое, бронхиалоное, пузрильное, ослаблено, отсутствует в <u>по всему объему</u> Хрипы сухие (свистящие, жужжащие) в Нет Влажные (мелко-, средне-, крупнопузырчатые) в нет
Крепитация, шум трения плевры над нет
Перкуторный звук <u>легочный,</u> тимпанический, коробочный, притупленный, тупой над <u>По всем полям</u> Кашель сухой, влажный, лающий, отсутствует. Мокрота нет
Органы кровообращения: пульс 88 в мин., ритмичный, аритмичный, наполнение удовлетворительное ЧСС 88 в мин.
дефицит пульса 0 АД $140/80$ привычное $120/80$ максимальное $160/80$ мм.рт.ст. Тоны сердца звучные, приглушены, глухие. Шум систолический, диастолический на нет
проводится нет Шум трения перикарда. Акцент тона на нет
Органы пищеварения: Язык сухой, <u>влажный,</u> обложен <u>Чистый</u> Живот форма правильная мягкий, напряжен в не напряжен
Безболезненный, болезненный в во всех отделах Положительные симптомы (Образцова,
Ровзинга, Ситковского, Ортнера, Мерфи, Мейо-Робсона, Щеткина-Блюмберга, Вааля) отрицательные
Перистальтика выслушивается Печень не увеличена Селезенка не пальпируется Рвота (частота) нет Стул (консистенция, частота) регулярный, оформлен
Нервная система: Поведение <u>спокойное,</u> беспокойное, возбужден. Контакт контактен
Чувствительность сохранена $D = S$ Речь (внятная, дизартрия, афазия)
Зрачки OD = OS, <u>обычные,</u> широкие, узкие. Фотореакция <u>живая</u> <u>Нистагм нет</u> Ассиметрия лица нет <u>Менингеальные симптомы (ригидность затылочных мышц,</u>
Кенига, Брудзинского) нет Очаговые симптомы нет
Координатные пробы выполняет правильно
Мочеполовая система дизурии нет Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон
Status locales Вес=92кг, Рост=152см, ИМТ=40, Визуально левая нога бледновата, варикозно расширенные
подкожные вены, на ощупь холодная, пульс на внутренней малоберцовой артерии левой ноги ослаблен по сравнению с правой. ВАШ 30%
Данные инструментальных исследований (ЭКГ, глюкометрия, пульсоксиметрия и пр.) Sp02 98%; ЭКГ(11.02.21г.14:41) ритм синусовый, правильный с ЧСС 88 в мин, ЭОС- отклонена влево. ST-
изолиния. Данных за острую коронарную патологию нет
Оказанная помощь и ее эффект (в т.ч. результаты инстр. иссл. в динамике)расспрос; изучение мед. документов
Установлен в/в катетер, Sol.Ketaroli 30mg/ml-1ml в/м в правую ягодичную область; Tab.Acidi acetylsalicylici 500 mg разжевать, внутрь Вызов бригады СМП
Больная передана в состоянии средней степени тяжести, АД 130/80 мм.рт.ст., ЧСС 88 в мин, пульс 88 в мин, ЧД 16 в мин, ВАШ 30 %
Рекомендации:
Сигнальная карта:
Шприц 2,0 № 0 5,0 № 1 10,0 № 0 20,0 № 0, Катетер. куб. 1 G Фикс. пластырь 1 Скариф 0 Тест полоски 0 ,Пакет мед.отхлд. 1 Маска для небулайзера 0
Лата и номер наряда 11.02.21 102782724 Полнись Карту проверил